

V I L L A E
I O. B A P T I S T A E
P O R T A E, N E A P O -
L I T A N I,
L I B R I X I I:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1, Domus | 7, Vineæ |
| 2, Sylva cædua | 8, Arbustum |
| 3, Sylva glandaria | 9, Hortus coronarius |
| 4, Cultus & infitio | 10, Hortus olitorius |
| 5, Pomarium | 11, Seges |
| 6, Oliuetum | 12, Pratum. |

*IN quibus maiori ex parte, cum verus plantarum cultus, certaq;
infitionis ars, & prioribus seculis non visos producendi fructus
via monstrantur; tum ad frugum, vini ac fructuum multiplica-
tionem experimenta propemodum infinita exhibentur.*

Adiecto INVENTARIO quamcopiosissimo.



M D •

XC II.

F R A N C O F U R T I

Apud Andream Wecheli heredes, Claudium Marnium,
& Ioannem Aubrium.

Cum S. Cesarea Maiestatis privilegio.



VA



invidi (cil
videor) vi
incomptos
denig, tot
mortales
nostra se
alienam
cessent, q
eos ingre
suorum h
concinn
derant
grimati
ptas, no
pta exp
laborib
tui aqu
sit, circa
subire, q
consider



AVTORIS DE SVA VIL- LA, PROOEMIVM.



ONSTITVI, lector optime, ut Socrates sui gym-
nasi vestibulo, ἀναμνηστικὸς εἰς αὐτὸ, scriptum prae-
xerat, ne illuc ingrederentur, qui secum circinum
(quo Geometrae in metiendis figuris utuntur) non at-
tulissent, quo se ipsos metirentur intelligerent; ita
huic meae villa ianuis,

PROCVL, PROCVL ITE PROFANI,
invidi scilicet, obrectatores, & male feriat. Isti enim (ut videre iam mihi
videor) vix limine ingressi, sylvas horridas, pomariū inconcinnum, hortos
incomptos, vineam male ordinatam, segetes & pascua arida steriliaq;, ac
deniq; totius ville incompotum dicent corpus, & nostris (proh dii im-
mortales) floridis hortis Austrum, satis nebulas & rubigines, ac demum
nostrae segeti diram calamitatem exoptabunt, ac nimis quam licenter in
alienam messem manum imponent, atraq; serpentum lingua hominem in-
cessent, qui patefactis ianuis, eximia liberalitate libenter precatur, ut in
eos ingrediantur, & incundissimo aspectu, & quam vberimis fructibus
suorum hortorum utantur fruantur. quos quidem summo labore excoluit,
concinnavit, compsit, expoliuit, & in quincuncem construxit. Nec consi-
derant uniuersas quas hic satas vident plantas non sine multiplici pere-
grinatione esse conquisitas, singulari diligentia è diuersis regionibus acce-
ptas, non sine sumptu, ac summo studio quae veterum de his extarent scri-
pta experiendo, noua inueniendo, nostro vsui accommodando, ut alienis
laboribus frui possimus. Sed qui consimile munus obierunt, nostrorum cona-
tui equiori animo indulgebunt, hi nostram villulam, quantulacunque
sit, circumeant, hortulos & viridariola considerent, nec tadeat montes
subire, sylvas, & oliuetum, & tandem si optime caelo terram associauerimus
considerare. Sed cur tam ingens onus, nec nostris humeris par susceperim;

P R O O E M I V M.

quum plerisque sciam tam Græcos, quàm Latinos, singulari exactaq; doctrina præditos, huic rei specialiter incubuisse, in causa fuit, me non parum facturum esse, si studiosis omnibus, ac rerum naturæ exploratoribus integram, exactamq; agricolationis historiam conscripsissem: nam ex eis, qui extant, nemo fuit, qui id attigerit. Hesiodus Bæotus Græcus, ut altius rem exordiar, qui omnium princeps de agricultura celeberrimè cecinit, de segetibus aliqua, de arboribus aut vitibus perparum, de reliquis nihil dixit. Eius interpretes Virgilius Maro, qui Romana per oppida Ascæum carmen resonare fecit, hortorum dotè aufugit, è tantisq; quæ retulit, flores modo rerum decerpit, quindecim vuarum generibus nominatis, tribus oleæ, totidem pyrorum, malo tantum Assyrio; cæteris omnibus neglectis. Theophrastus Ereßius extra omnem ingenij aleam positus, ut singulari sua eloquentia diuinum nomen sortitus sit, cuius doctrinam tanti Aristoteles fecit, ut sue academia eum principem substituerit, absolutum opus tum de historia plantarum, tum de causis conscripsit, ex quo, tanquam è vasto mari subsecuta et atatis cæteri, ingenio & scientia præcellètes, quicquid de plantis scripserunt, hauserunt, hauriendumq; censent uno ore docti omnes: & me iam à scribendo deterruisset, nisi viderem eius libros non tam idoneos esse iis, qui agrum colere volunt, quàm qui scholas philosophorum. Nos singularis cuiusque plantæ ab eo historiam variis in locis distractam, membratim collegimus, & in unum corpus coegimus, ut Absyrus ille Medæa non tam membratim fuerit conquirendus; & obscuras cultus causas, quas ipse breuissime reddidit, nos perspicuis & quam potuimus clarioribus verbis describere conati sumus, ut non solum ingenio & arte claris, sed rudibus & rusticis clarescerent; multarumq; plantarum cognitionem, quæ iam vetustate, & in tanta nominum ambiguitate & stirpium multitudine, oblitterata erat, ex Orco reuocauimus, ut pro virili innotescerent: eumq; denique tanquam optimum præceptorem in omnibus consecrabitur. Cassianus Bassus alioquin Constantinus Cæsar, qui ex veteribus Græcis selecta agricultura præcepta compilauit, adeo omnia breuiter perstrinxit, ut qui aut hores illos viderint superflua, qui carent illis parum utilitatis colligere possint. Ex Latinis M. Cato hominum summus in omni vsu: ille triumpho & censura super cætera insignis, magis tamen etiamnum claritate literarum præceptisq; omnium rerum expetendarum datis Romano generi, inter prima verò agri colendi illius aui confessione optimus, ac sine æmulo agricola: cuius doctrinam tanti Plinius fecit, ut eius dicta, tanquam o-

racula

PROOEMIUM.

racula observari praecepiat: de agricultura non nisi aphorismos quosdam, breviaque praecepta de aliquibus, multis omisis. M. Varro philologis potius, quam rusticis librum conscripsit. Columella de vineis quam luculenter, de segetibus, horto & arboribus aliqua, de ceteris nihil attigit. Plinius & Palladius non nisi, quae ex his exceperunt, habent. Nec ignoro ingentem neotericorum esse turbam, sed sine doctrina, experientiaque: nil aliud nisi quae ex his de pagina in paginam transcripserunt. Sed & illud observandum, quod in hac arte tanquam rei caput, & summa est, rei agriculturalionis scriptores, non solum inter se varios & discordes esse, sed mutuo contrarios: nam ut qui in Bithynia Pergamo, vel sub aequinoctiali sunt, citos ferunt, demetunt, vindemiant, condunt: contra vero qui sub septentrionali polo, scripsimus: in media vero regione degentes medijs sunt: sic etiam Asiani frigidis locis aliquas plantas exponunt, contra septentrionales aestuosis, medianae regiones apricis. Vnde nec idem solum, caelum idem plantis tribuunt, & tandem secundum eorum regionem quisque regulas praescripsit, ut horum praecepta, illis e regione sint opposita, unde ius, qui eorum regulis usuri sunt maxime ansum errandi praebeant: huic defectui succurrere impossibile iudicabam: sed quum cogitarem omnia à Deo sapientissime condita, nihil sine sua doctrina: capere mecum ipse sciscitari & rem animo versare, tandem novi unamquamque secum plantam suae rationis, cultus, soli, & caeli indicia ferre, sua physiognomonia siue partium compositione hac omnia indicare, ut in physiognomonicis abunde diximus: sic & unoquoque capite sui caeli, soli, & cultus suas cuiusque regulas ex se ipsa indicavimus, ac omnium primum docuimus. Praeterea tum ex antiquis scriptoribus, tum ex neotericis, quos usque adhuc videre contigit flores, fructus, plantas, & quicquid pulchri, optimi, & utilis iudicavimus, extirpavimus, in hanc nostram villam plantavimus, digestimus, servimus, & inseruimus, ut nil eorum, quae ad plantarum cognitionem ex philosophis, philologis, poetis, medicis, agricolis, & rerum natura exploratoribus, spectant, desiderari possit. Ex quibus non transcripta solum, sed quae ex probatissimis auctoribus collecta, de his per uigili studio, perpetua observatione, sumptu, labore, & quotidiana experientia periculum fecimus, & peritissimorum agriculturalium testimonio comprobata, literis mandavimus. Nec me putetis obsecro Nicandrum Colophonium illum, qui quum ex urbe nunquam discessisset, de rustica scribere ausus sit: nam quum ab urbe, amicis, ceterorumque consortio longius exulare contigisset, ne otio tabescerem urbis & amico-

P R O O E M I V M.

rum desiderium plantis ferendis, inserendis, cicurandisq; leniebam. Et ut pratorias, triumphales, & regias maiorum nostrorum manus ab aratro, ligone, & pastino non abstinuisset legimus: sic nos nostras non illibenter adhibuimus. testes sunt vinea mea, arbuta, horti, viridaria, & amicorum, in quibus innumerabiles visuntur plantae, mea manu consitae, insitaeq; posteris relinquenda, nec solum solitos & suetos fructus ferentes, sed nec adhuc hominibus visos, & nostris maioribus inuisos, quos studio, arte & experientia producere didicimus. Stirpibus omnibus delineationes, si quae ex antiquis extarent, suffecturas apposui, sin minus, expositam oculis plantam ex omnibus partibus representauimus, & vniuis quibusdam coloribus designauimus, ut omnibus cognoscibilis esset. Nec parum opis recentioribus agricolis praestitimus, quum maiores nostri in alicuius plantae effigie representanda, notas tam paucas, & incertas apposuerunt, ut quoduis aliud potius, quam plantam illam representare videantur, ne vni vultum exhiberemus, quem alteri conuenire docebatur. Maximam me Medicorum gratiam consecuturum spero, quum in dignoscenda alicuius plantae facie a Theophrasto, Dioscoride, Galeno, vel Plinio descripta, non parum insudarim: id obiter in processu Medicis profuisse de agricultura tractanti quid obfuit? Plantarum, & fructuum nomina, praesertim Campaniae nota adiunximus, ut antiqua nostris saeculis innotescerent. Poetarum fabulas interpretati sumus, ut sub inuolucris latentes plantae cultus & vires innotescerent, ut nil nostris in his historiis nosci dignum possit desiderari. Libros, capita, & capitum partes ita ordinauimus, ut quisque facile sciat, & inueniat quae concupierit. Sed nollem vos ante nostrae villae vestibulum diutius retardare. fores iam patefactae sunt, vicina est, ingredimini hilare, & fruimini.

HÆRE-



HA
corrigent
ret: licet &
efficere, ut
deant, nec
emplar istu
incuria po
enim Gra
tatis vel tr
accentib
dæ: nam p
lois vel nu
& negation
sumpta ab a
consulendi
rentur. Qu
nobis rogat
tia tamen t
enim quod
quendum
cio relicta
ta fieri pot
sunt. In cui
pe pomariu
lirana, (na
debit, a qu
bros huius
diores f
Hunc ergo
vtilem &
monitum
librorum,
tanto equ

HÆREDES VVECHELI CAN-

DIDO LECTORI S.



VIVS operis exemplar, benevole lector, antequam ipsum prelo subiiceremus, viro cuidam erudito relegendum tradere nobis operæ pretium visum fuit, ut si qua errata in eo vel inter describendum vel alia ratione commissa forent, ea cum iudicio corrigerentur, quò opus istud quàm fieri posset emendatissimum prodiret: sicut & solemus omni conatu & opera, quantum in nobis est, curare & efficere, ut libri qui à nobis excuduntur, quàm emendatissimi in lucem prodeant, nec in eum finem ullis sumptibus parcere. Inuentum est autem exemplar istud mendosissimū atq; infinitis erratis scatens: quod describentis incuriæ potius quàm authoris oscitantia tribuendum censemus. Primum enim Græca vocabula ferè ubique erant miserè deformata, literis vel mutatis vel transpositis vocibus integris sæpenumero corruptis & deprauatis, accentibus vel omissis vel malè collocatis. In Latinis verò innumera menda: nam præter grammaticalia errata penè infinita, sensus etiam multis in locis vel nullus, vel mutilus, vel inuersus: affirmationes pro negationibus, & negationes pro affirmationibus: distinctiones prauæ: loca citata & desumpta ab authoribus antiquis pessimè descripta, ut in singulis ferè locis consulendi fuerint authores ipsi, ut loca citata suo sensui vel nitiori redderentur. Qua in re summam fidem & diligentiam ab eo, qui hoc munus à nobis rogatus in se suscepit, adhibitam esse res ipsa testatur. Cuius diligentia tamen tanta esse non potuit, ut omnia loca corrupta restitueret. Sunt enim quedam, quamuis non multa ita deprauata, ut ad eorum sensum affequendum plusquam OEdipo coniectore opus foret, quæ lectorum iudicio relicta sunt. Cætera quæ iudicio & cōiectura emendari potuere, quantà fieri potuit religione iuxta rei naturam & authoris sententiam restituta sunt. In cuius rei fidem conferat, qui volet, librū quintum & sextum, nempe pomarium & oliuetum, huius operis & editionis cum editione Neapolitana, (nam duo illi libri iam antea Neapoli seorsim fuerunt excusi) ac videbit, à quot & quantis mendis illi sint repurgati. Nec putandum alios libros huius operis manuscriptos qui nondum in lucem prodierant, emendatiores fuisse, cum potius mendosiores extitisse vere affirmari possit. Hunc ergo laborem in studiosorum gratiam susceptum speramus multis utilem & ipsi auctori gratum futurum. De hisce autem, benevole lector, te monitum volumus, ut nostram diligentiam in curandis emendationibus librorum, quos excudimus, perspectam habeas, nosq; & nostros labores tanto æquiore & gratiore animo prosequaris. Vale.

HÆRE-

PRIVILEGII SVMMA.

CÆSAREÆ Maiestatis privilegio cautum est Andrea Wecheli heredi-
bus, Claudio Marnio & Ioanni Aubrio, ne quis IOAN. BAPTISTÆ
PORTÆ Neapolitani VILLÆ libros hosce duodecim intra sacri Romani
Imperij, & omnium regnorum ac provinciarum imperialium fines, eodem vel
alio charactere excudere, aut ubicunque recudenda dare, aut alibi impressa im-
portare, vendere vel distrahere palam vel occultè auset. Idem privilegium iis
concessum, de aliis etiam auctoribus, in philosophica, medica & iuridica faculta-
te, aliisq; disciplinis liberalibus, ad sex cuiusque editionis annos. Quod sacra Ma-
iestatis interdictum si quis neglexerit, non modo libris expressis, verum etiam in-
super decem marchis auri puri, imperiali fisco, fraudis vindici & dictis Wecheli
heredibus, ex aequo soluendis, mulctabitur, ut latius in Cæsareo diplomate declara-
tum est, dato Vienna xxv mensis Maij, anno Domini M D LXXXII.

Rudolphus.

V. Io. Bapt. Weber.

Ad mandatum sacre Cæs. Maiest. proprium

P. Obernburger.

IOAN.

inter prima
tem dignita
stas, vt non
quam regi
tionis pau
non ita ex
rim. Sed
destrahere
ob oculos
astra vlti
quàm vt p
Natura ed



IOAN. BAPTISTAE
PORTÆ NEAPOLITANI

VILLAE
LIBER PRIMVS

SIVE

DOMVS.

De Agricultura laudibus, & necessitate. CAP. I.

10



ARTIS sanè inurbanum, & rusticum videretur, si nostram villam ingressurus, in ipso statim ianuæ limine, ab aliqua ingentium ipsius laudum præfatione deficerem. Animo autem volutanti, quæ, qualésve fuerint Agricultura diuitiæ, delitiæ quæ, adeo innumeræ occurrunt, vt vnde incipiam, non sat assequi possim. Nam si necessitatem confidero, tanto est humano generi emolumento, vt ea carere nullo modo possis. Si vtilitatem, inter primas non postrema: aut quæ nam illi poterit comparari? Si voluptatem dignitati commistam, ea est excellentia, ea autoritas, ea denique maiestas, vt non reperiās vnā ex maximarum artium numero, quæ non illi, tantquam reginæ famulari videatur. Sed in huius pomærij angustiis nostræ orationis pauperiem vereor & reformido, quum linguam in eloquentiæ studiis non ita exercuerim, vt strenuas manus in eius exercitatione nauiter impenderim. Sed ita suis floribus exornari velim, vt nil ipsius gloriæ authoramento detraherem, & quæ loquar omnia, & meliora, & (vt verè sunt) locupletiora ob oculos exponerem, ac vellem, si possem, vt nouus Atlas humeris terram ad astra vsque sustollere. Quod humano generi pernecessaria sit, euidentius est, quàm vt pluribus probari velit: sine enim rebus, quas rerum parens, & nutrix Natura edit, humana conditio subsistere nō posset, & qui id negauerit, & ma-

A

IO. BAPTISTÆ PORTÆ NEAP.

trem ipsam, & nutricem negabit. Arborum, herbarumq; fructibus vescimur, & iis quoque cetera vescuntur animalia, quibus & nos victitamus: iccirco plantas ante omnia animalia mundo natus Theophrastus, Porphyrius, & Eusebius enunciarunt, & ante eos verissimus Moyses, qui tertia die Deum Opt. Max. pomiferum lignū, sexta verò animalia produxisse tradidit. Diuus Chrysostomus Deum scribit terræ culturam ante omnes alias artes in vitam intulisse, ac protoplasto iussit agriculturam quandam obire, non laboriosam, non ærumnosam, sed multam sibi præbentem Philosophiam. Sardi eò dementiæ venerunt, ut arbores terra antiquiores dixerint, Apollonio Tyanæo referente. Hippocrates pomis, & seminibus homines ali debere arbitrabatur, quod iisdem per exordia usus fuisset. Idem testatur Ovidius:

Metam.
lib. I.

*Ipsa quoq; immunis, rastroq; intacta, nec ullis
Sancita vomeribus, per se dabat omnia tellus:
Contentiq; cibus nullo cogente creatis,
Arbutos fetus, montanaq; fraga legebant,
Cornuq; in duris hærentia morarubetis,
Et quæ deciderant patula Iouis arbore, glandes.*

Plato Cyclophas cibus ex fructibus spontè provenientibus vivere scripsit. Philostratus Indos, qui iuxta flumen Indum habitant, sylvestrium arborum fructibus. Plinius, & Solinus iisdem Hyperboreos, qui ultra Riphæos montes incolunt. Herodotus Aracis fluuij insularum accolas plantarum fructus maturos colligere, & ad hyemalem cibum reponere ait. Strabo Massagetæ ex sylvestribus fructibus expressos succos bibere, iisque victitare. Pollux veterum cibum drupas fuisse. Plinius Astomorum Indiæ gentem sine ore, solo odore radicum, florum, & præsertim sylvestrium malorum vivere, quæ manibus semper habet, eaque longiore itinere defert, ne desit olfactu cibus. Plutarchus in Artaxerxe Cadusios scribit pyris, malis, ac cæteris fructibus vesci: solo fruges denegante. Athenæus Athenienses solum ficibus nutrire, Argiuos, & Tirynthios pyris sylvestribus, Medos amygdalis, Indos arundinibus, Carmanos palmis, & Persas terebintho. Immo arborum nulla est, quæ plures populos alat, atque palma: nam Nasamones eius pane victitant. Arimphæi ex arbore Pontica dicta, ex Herodoto. Sunt & populi, qui ex cibo nomen adepti sunt. Libyæ populi ex loti arboris fructu viuentes, Lotophagi vocati sunt ab Homero. Ethiopes Rhizophagi, quod cibus ex radicibus, Diodoro Siculo auctore. Spermophagi non procul a Meroe Nili insula, quod è seminibus panem ad victum conficiant. Arcades è glandium esu Pythiæ oraculo Balanophagi vocati sunt, Plutarcho, & Plinio referentibus: inde esculus è genere glandiferarum, ab esu nomen indepsit: ceteros ne lectores tadio afficiamus, consulto omittimus. Nutriuntur radicibus, frondibus, & fructibus animalia, quibus percipue nutritur homo: cerui, capree, apri, lepores, cuniculi, & cetera. Nec solum quæ terrâ inhabitant, herbis viuunt, sed & quæ mare, & aëra, reptiliaq; in his

VILLÆ LIBER PRIMVS.

his auctoritates Poëtarum adducemus. Maior:

Pascitur in magna sylua, formosa iuuenca.

—— non, me pascente, capelle

Florentem cythissum, & salices carpetis amaras.

Lenta salix fæto pecori.

Dulce satis humor, depulsis arbatus hœdis.

Ex frondibus fasciculos componunt agricola, quos sub tecto ad boues, & pecora seruant, vt iis hyeme pascantur. Et frondatoris qui eas legere consueuerant, canere solebant. Idem:

—— canit frondator ad auras.

Pecus oleaster opimat, oues vlmis frondibus, capra fraxineis commodè aluntur. Glans bobus cibus est. Plautus in Truculento;

Rus mane dudum hinc ire me iussit pater, vt bubus

Glandem prandio depromerem.

Sed vt arbores primos hominibus cibos præbuerunt, ita & habitacula, quarum umbra, ramis, & truncis se aduersus solis, pluuiarum, imbrium, & niuium molestias tuerentur. Ouidius:

Pro domibus frondes norant.

Nemesianus:

Sylua domus, cubilia frondes.

Quintus Fabius Pictor, Primis hominibus non domus extructa, ornataque, sed vimina, & caua arborum ligna, in quibus tectorum vice inhabitarent. Eutropius idem, ex frondibus, & virgultis contextis casulas habitasse. Immo adhuc sunt nationes, quæ à primo more non recesserunt. Narrat Herodotus Scytharum Argippæos, eam partem ad auroram vergentem, incolentes, sub arboribus incubare. Pomponius Mela de Scythia idem scribit. Dionysius suæ Africæ Massylos per syluas, & saltus errare scribit. Arimphæos Asiæ populos nemora pro domiciliis habere. Indorum nonnullos sub ficu, ac astate, ob animalia venenosa, in arboribus lectos sternere, & Brachmanas sacerdotes illos in syluis agere, & corpus frondibus vestire. Gallorum Magos Druidas arborum lucos eligere: Arabas arbores pro tuguriis habere, Plinio, & Solino auctoribus. Ex hac antiquitus sylvarum habitatione, quum homines soli errarent per nemora, & educta secum sobole, è syluis egredierentur, ex arboribus nati existimati sunt. Ad id alludentes Poëtæ, homines ex arboribus procreatos finxerunt. Virgilius:

Gensq; virum truncis, & duro robore nata.

Arcadas iactant ante astra natos, & hominum primos fuisse, primamq; originem traxisse, narrat Statius.

Arcades hinc veteres astris Lunaq; priores,

Agmina fida datis: nemorum vos stirpe rigenti

Fama satos, quum prima pedum vestigia tellus

IO. BAPTISTÆ PORTÆ NEAP.

*Admirata tulit, nondum arua, domusq̃, nec vrbes,
Connubiisq̃, modus: quercus, laurig̃, ferebant
Cruda puerperia, ac populos umbrosa creauit
Fraxinus, & foeta viridis puer excidit orno.*

Fuerunt & syluæ non solum hominum, sed deorum habitacula. Virgil.

— *habitarunt Di quoq̃, syluas.*

Hæc fuerunt numinum templa, priscoq̃, ritu simplicia rura: etiam nunc Deo præcellentem arborem dicant: nec magis auro fulgentia, atque ebore simulachra, quàm lucos, & in iis silentia ipsa adoramus. ex Plinio. Immo in campis Elisiis, ubi beatorum sedes, nemora esse dicuntur. Nec solum arbores domos, sed earum trunci, & folia prima præbuerunt tegumenta. Cognata quidē res, à quibus & victum, & domos accepissent, item & vestes. Scribit Strabo Massageras insularum quarundam Scythiæ populos sua arbore se vestire. Plinius Astomos ex frondium lanugine. Arabes ex Cynæ arboris frondibus vestes componere. Clemens ex Sarmatis Allobios indui plantarum corticibus, Mela Germanos iisdem corpora tegi. Fæminas quasque in calceatu suberis cortice uti videmus, & Plinius antiquitus in hyberno calceatu usas fuisse tradit. Sunt & arbores lanigeræ apud varias gentes, ut pretiosis indumentis sericorum morem dederint, plutimorum authorum testimoniis memorabiles. Seres sunt hoc lanificio sylvarum nobiles perfusam aqua depeccantes frondium caniciem, apud Indos. Ethiopia illis cotermina laniferas etiam habet arbores, quæ pro fructu lanam ferunt, qua ad vestimenta utatur. Virgilius:

*Quid nemora Æthiopum molli canentia lana,
Velleraq̃, ut foliis depeccant vellera Seres?*

Ægyptus, auctore Polluce, fert plantas, è quibus lanificium contexant. In Tylo insula, arbores laniferas nasci tradit Theophrastus, ex quibus telas, ac deinde vestes, alias viles, alias pretiosas conficiant. Insulæ cuiusdam meminit Diodorus in Oceano meridiem versus positæ, ex cuius lanugine incolæ sibi vestes præparant. Plinius in Atlante monte plantas cupressi similes nasci tradit, quæ tenui lanugine obducantur. Atque in Co insula cupressi, terebinthi, fraxini, & quercus flores, decussò imbre, vermes generant, qui stamen ad bombicinas vestes faciant. Et ne longius exempla repetamus, sunt & apud nos vermiculi, mori foliis sati, qui vellus conflant, ex quibus pretiosæ vestes conficiantur.

Ad alios plures humanæ vitæ necessarios usus valet Agricultura. Cicero libro de diuinatione, Arborum autem confectio, omniq̃ materia, & culta, & syluestri, partim ad calefaciendum corpus, igni adhibito, & ad mitigandum cibum utimur, partim ad ædificandum, ut tecti septique, frigora caloresque pellamus. Magnos verò usus affert ad nauigia facienda, quorum cursibus supeditantur omnes undique copiæ, plurimisque maritimis rebus fruimur, atque utimur.

De utilitate, quæ provenit ex Agricultura. CAP. II.

ARBORVM census ed certior, & quaestuosior est, quod necessitas, commoditas & frequentior usus rerum ex Agricultura provenientium nos magis vrget, magisque illis indigemus, unde tam utilis, ut omnium utilitatum utilissimus sit. M. Cato Agriculturam mercaturæ præfert, quia ipsa periculosa, & calamitosa sit: præfert & ipsam fœnerationi, quum fœneratio illicita, & inhonesta sit ob maximum quaestum. Maiores nostri ita in legibus posuere: furem dupli condemnari, fœneratorem quadrupli: quanto peiorem ciuem fœneratorem existimant, quam furē, hinc licet existimare. Sed fœneratio, quæ cum terra fit, licita honestaque est, & quaestus maximè pius, stabilissimusque consequitur, & minimè inuidiosus. Cicero de senectute, terram nunquam imperium recusare dixit, nec vnquam sine usura reddere, quod acceperat, sed aliàs minore, plerumque maiore cum fœnore. Semper enim boni assiduique domini referta est cella vinaria, olearia, & penuaria, villaque tota locuples est. Abundat porco, hædo, agno, gallina, lacte, caseo, melle. Iam hortum ipsi Agriculturæ succidiam alteram appellant. tum conditiora facit hæc superuacui etiam operis aucupium, atque venatio. Xenophon ultra animi voluptatem, domus augmentum Agriculturam habere dixit. Aristoteles in Politicis tradens maximum Agriculturæ quaestum, exemplum affert de Thalete * Milelio, cui quum obiiceretur Philosophiæ studiū propter inopiam, quasi inutile, & infructuosum, prospexisse illum ferunt per Astrologiam oliuarum vbertatem futuram, quumque coegisset paucillum pecuniarum, hyeme adhuc vigente, emptionem fecisse olei in Mileto, & in Chio pro paruo admodum pretio, utpote nemine plus offerente, arrasque dedisse: quum itaque postea tempus venisset, multis subito quærentibus, vendidisse oleum, quanti ipse voluit, ac magnam vim pecuniarum inde superlucraturum, ostendisse amicis, per facile esse Philosophis dictari, si vellent, sed hoc non esse illis curæ. Hoc etiam Sextius à Romanis sapientia affectatoribus Athenis fecit eadem ratione, ut ex Plinio habetur. Iulius Gracinus, ex Columella, ad diligentem calculi ratiocinationem expendens quaestum, qui ex vineis excipitur, detractis impensis, quæ ex vinea solo, pedamentis, viminibus, vinitoris mercede, impensis, & pretij usura, dum vinea in infantia à fructu cessat, demum semper superexcedere quaestum semisse iudicat. Plinius cupressorum sylvas apud antiquos quaestuosissimas dicebat, quod ex his asleres, & perticæ amputarentur terdecimo anno, ac singulis denariis venirent, ut plantaria filiarum dotem appellare in more esset. Celebratur Acilius Sthenelus lxx iugerum non amplius vineis excoltis, atque cccc nummum vendidit: maxima fama Rhemmio Palæmoni in hisce xx annis mercatoris dccc nummum, passinatis de integro vineis ad vix credibile miraculum perduxit, in octauum annum cccc nummum emptori vendidit pendente vindemia: cucurritque non nemo ad spectandas vuarum in iis vineis Arues. Arborum vectigalia publica, priuataque, antiquiori recentiori que

* Plinius
Democri-
to tribuit.

IO. BAPTISTÆ PORTÆ NEAP.

plurima fuisse leguntur. Arabas singula millia talentorum thuris annua Persarum Regibus pensitasse refert Herodorus, pro quo etiam pendunt Gebahitarum Regi, cui eidem Sabæi quartam partem exoluisse scribit Plinius. E balsam Romanis Iudæi tributa pendebant. Ex cocco alteram tributi persionem Hispaniæ puperes soluebant. Rhodiorum tributa fuere ficus, vinum, oleum, aliaque, quæ piget referre. Tandem nulla est ars, ut Xenophon inquit, quæ contentibus maiores gratias reddat, & auidos magis exaturer.

De voluptate, quæ ex villa, & arborum consuetudine percipitur.

CAP. III.

DIXIMVS de necessitate, & utilitate Agriculturæ: ex iis simul coniunctis 10
partus procreatur, qui voluptas, vel iucunditas dicitur: nec puto maius
vix oblectamentum esse, ut quum feceris, quod necesse est facias, ex eo utili-
tas proveniat. Sed quæ nam maior voluptas, quàm quæ cum utilitate coniun-
cta est? Inter omnia enim quæ utilitatem simul & iucunditatem pariunt, par-
tes sibi primas vendicat Agricultura, ut ambiguum sit, utilitatisne, an amœni-
tatis plus habeat. Deus magnam primo homini voluptatem daturus, i hor-
tum deliciarum posuit, ut summa animi cum voluptate agrum coleret: non e-
nim credibile est, ut ante peccatum ad laborem damnaretur. Sed si omnium arti-
um agricultura satis habet deliciarum, tunc maximas haberet, quod nil accide-
bat aduersi, vel celo, vel terra, ut Augustinus refert. Quod enim maius, mira- 20
biliusque spectaculum est, quàm politis furculis, iactis seminibus, infitis mal-
leolis consideratione perspicere, quia neque qui plantat aut rigat, est aliquid, sed
qui incrementum dat, Deus? & si quid accedit extrinsecus, per illum accidit, qui
regit & ordinat, inuisibilem Deum. Dicit Xenophon nil similem præbere vo-
luptatem atque ager, in quo spes sit, ut cultu melior effici possit: unde ut ex volu-
ptate caperes semper utilitatem, agros, ubi optime excolueris, vendendos, atque
incultos è vestigio emendos, ob colendi iterum voluptatem. Sed quæ ex villa
capiuntur, variæ & diuersæ sunt oblectationes. Cicero: Agro benè culto nil
potest esse nec vili vberius, nec specie ornatiùs, ad quem fruendum non modò
non retardat, verum etiam inuitat, atque allecat senectus. In quamcunque enim 30
partem te verteris, incideritque visus, decussatis plantarum ordinibus, ipsa loca
circumspiciendi libertate se extendente, oculi alliciuntur, iucundiores, respro-
spectu depascuntur, ut nunquam satur sis mirari: immò oculi prospectu allecti,
veluti ex occulto magnete ex se ipsis conuertuntur, contrahunturque, ut ab-
strahere eos non possis. Si ad ramos oculos sustollis, patulis frondibus, & tre-
mulis iactantibus Solem non excludere, sed ut potius eludere videantur. Ede-
ra serpens arbores amplexatur, arbores pedamenta, ipsa eas circundat, & hilari
cæsarie comat. Nec minus subtus ferax est graminum prouenus, qui terræ su-
perficiem omnem viriditate ornat amœna, ac iucundo amicit decore: varia-
que florum lasciuia gemmeis coloribus depingit, qui non ingrato Naturæ 40
certamine

certamine dum alius alium superare nititur, smaragdi, hyacinthi, amethystique vice terræ amictum interlinunt. Odor flores comitatur, variaque odorum fragrantia nates oblectat. Pratorum medio clari, lympidique fontes internitent, nec solum eorum frigiditate tactum reficiunt, sed transparentia exaugent iucunditatem: nam lucidissimo veluti in speculo geminatum pratum, & nemus ostendunt, verum alterum, imaginarium alterum: supra verum, in imo falsum. satis admodum suaue dixit Tibullus, æstate in media, sub Canis flagranti æstu arborum umbris refocillari.

Sub canis æstiuos æstus vitare sub umbra.

10 Et Claudianus.

*Quum post labores sub platani cubes
Virentis umbra, vel gelido specu
Torrentiorem fallere Syrium,
Et membra somno fessa resolveris.*

Zephyrus præterea susurrantibus foliis, ac lasciuientibus refrigerantem auram inspirat, ut aurum cantus imitari videatur. Aufonius.

*Somniferumq; canit sepes depasta susurrum.
Est & arundineis modulatio musica ripis,
Incubuit foliis quoties lenis Euris acutis.*

10 Vento enim arundines feriente, ex earum sibilo Poëta figmentum auspicati sunt, ut inde fistula reperta sit. Tum demum non nihil est, ut variis fructibus delecteris, non tempore vno, sed diuersis, alio maturescante, alio renascente, alio decidente, ut vnusquisq; ex industria iucunditate te afficere sataget. Rami fructibus onerati pondere incuruantur, ac se infra decumbenti offerunt. O quam dulcissimum est fructus ex arboribus, quas seuisisti, inseruisti, & coluisti, propriis manibus colligere, & amicis, agnatisq; iactabundus largiri! Est & alia in arboribus delectatio, aurum scilicet modulatio: passim enim ramis insidentes, ac volantes, argutos cantus ædunt, ac ex variorum multitudinem dulcissimus efficitur concentus, auresque cantibus demulcent suis.

30 Philomela mille per discrimina vocum canit, & nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto, promittitur reuocato, infuscat ex inopinato: interdum & secum ipsa murmurat, plenus, grauis, acutus, crebet, extensus; ubi visum est, vibrans, summus, medius, imos: breuiterque omnia tam paruulis in faucibus, quæ tot exquisitis tibiarum tormentis ars hominum excogitauit. Est & in iis capiendis non minima voluptas, visco & retibus fallere. Horatius.

*Queruntur in syluis aues,
Aut amite laui rara tendit retia,
Turdis edacibus dolos,
Pavidumq; leporem, & aduenam laqueo gruem
Incunda captat premia.*

40

ris annua Per-
undum Gebah-
Plinius. E bal-
bui pelsonem
vinum, oleum,
inquit, quæ co-

itur.

hul coniuñctis 10
ecputo maius
cis, ex eo vili-
litate coniuñ-
pariunt, par-
sne, an amoni-
aturus, i hor-
toleret: non e-
omnium arti-
od nil accide-
in maius, mira-
bus, in suis mal-
est aliquid, sed
um accidit, qui
m præbere vo-
nde vix volu-
endendos, atq;
sed quæ ex villa
o bene culti nil
um non modò
amcunq; enim 30
nibus, ipsa loca
ndi re, respo-
rospectu alleci,
nturque, ut ab-
onidibus, & tre-
videantur. Edo-
cundat, & hilari-
us, qui terræ lu-
t decore: varia-
ngrato Naturæ 40
certamine

Diocletianus dum ruri Salonæ agebat, testatus est soles ibi latiores fuisse. Virgilius agricolas felices vocat.

O fortunatos nimium sua si bona norint
Agricolas: quibus ipsa procul discordibus armis
Fundit humo facilem victum iustissima tellus.
Si non ingeniem foribus domus alta superbis
Mane salutantum totis vomit adibus undam,
Nec varios inhiant pulchra testudine postes: &c.

At securæ quies, & nescia fallere vita,
Dives opum variarum: at latis otia fundis,
Spelunca, viniq; lacus, ac frigida Tempe,
Mugitusq; bouum mollesq; sub arbore somni.
Non absunt illi saltus, ac lustra ferarum,
Et patiens operum, paruoq; assueta inuentus:
Sacra Deum, sanctiq; patres: &c.

Fortunatus & ille, Deos qui nouit agrestes,
Panaq; Sylvanumq; senem, nymphasq; sorores.
Illum non populi fascēs, non purpura Regum
Flexit, & infidos agitans discordia fratres.
Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura
Sponte tulere sua, carpit: nec ferrea iura,
Insanumq; forum, aut populi tabularia vidit: &c.
Hanc olim veteres vitam coluere Sabini,
Hanc Remus, & frater: sic fortis Hetruria creuit,
Scilicet & rerum facta est pulcherrima Roma.
Aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat.

Horatius rusticam vitam beatos homines efficere posse dicit, quum in ea maxima sit voluptas, molestiis omnibus expers.

Beatus ille, qui, procul negotiis,
Vi priscæ gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis,
Solutus omni fœnore;
Nec excitatur classico miles truci,
Nec horret iratum mare;
Forumq; vitat, & superba cinium
Potentiorum limina.
Ergo aut adulta vitium propagine
Altas maritat populos,
Inutilesq; falce ramos amputans,
Feliciores inserit,

Vel quum decorum mitibus pomis caput

Autumnus arvis extulit;

Vt gaudet insitina decerpens pyra,

Certantem & vnam purpura.

Libet iacere modo sub antiqua ilice,

Modo in tenaci gramine.

Non Afra avis descendat in ventrem meum,

Non attagen Ionicus,

Incundior quam lecta de pinguis

Olinarum arborum,

Aut herba lapathi prata amanti, & graui

Malua salubres corpori.

Sed dum innumeras villæ illecebras enumero, à qua longè fastidium abest, nollem lasciuenti calamo, nimia prolixitate fastidium legentium animis parere: id solum pro coronide addam, summos nostrorum maiorum heroas, & procures viros, quoties ex labore animū relaxare vellent, tanquam ad aliquod delectabile ad villam confugisse, ad huius limina molestas curas omnes reliquisse, vbi longè ab hominum discordiis, ciuium simultatibus, vicinorum inuidiis, fori & curiæ strepitu, ad animi tranquillitatem veram consequendam quiescebant. Lucullus post imperatorias administrationes, reiectis Reipub. muneribus, in villam se contulit, vt ibi quæ pars vitæ superesset, quietè transigeret. Tiberius Princeps post multas res fortiter gestas, Romam reuersus, ad villam transmigravit. Gordianus senior in syluis, & villis suauissimè vixit. Scipio Linternum delegit, vt relictæ patriæ ingritudinis dolorem leniret. Homerus, qui multis ante seculis fuit, Laertem lenientem desiderium, quod capiebat de filio, colentem agrum, & eum stercorantem induxit. Filiscus dum Ciceroni exilium patienter ferre persuadet, vt rus colat, admonet, quod propinquum sit littori, quum nulla res sit, quæ ægrum animū tam subleuet, quàm agricultura, vt ex Dione habemus. Nec defuere Philosophi, literatique viri, qui his locis animi causa secesserunt, vt mens solutior, & quietior in profundarum causarū indagine esset. Vnde Academiæ locus Athenis in suburbio erat, quam Cimon riguis, & vmbrosis deambulachris exornauit, vt in eius vitæ Plutarchus narrat. Laydis Cyrenæi in hortis schola fuit, quos Attalus Rex a difficauit. Theophrastus hortū iuxta ædes collocauit, quem moriens testamento philosophantibus reliquit. Democritus Abderites propè hortum cellam habuit, & vt Hippocrates ad Damageratū scribit, illum sub platano philosophantem inuenit. Philo Iudæus philosophus Pythagoricus iuxta maria hortos habuit, ibiq; philosophatus est, Eusebio referente. Palemon Atheniensis in hortis docebat, iuxta quos discipuli tuguria, in quibus habitarent, construxerunt. Cicero non minus Philosophus, quàm Orator, academiam suam habuit, porticu, & nemore celebrem, littori impositam in villa, ab lacu Lucrino Puteolos

tendentibus; addiditq; Marianam quercum, & Tusculanum secessum, loca disputationibus apta, unde quæstiones Tusculanæ à disputationis loco dictæ sunt. Habuit & M. Varro studium situm in villa, qua cogitabat, qua meditabatur iura populo Romano, quod Cicero in M. Antonium exclamauit.

De agricultura dignitate. CAP. IIII.

Nunc de agricultura dignitate loquemur: nam si scientiæ aut artes aliquam dignitatē meruerint, ipsa vniuersas sibi arrogare videtur. Si antiquitatem rebus aliquibus nobilitatem addere suspicetur quis, quum Agricultura antiquissima sit, ceteris nobilissimam esse cognoscemus. M. Varro rusticam vitam urbana multo antiquiorē tradit, quod fuit tempus, quum rura colerent homines, neq; urbem habitarent: quod tempus si referas ad illud principium, quo agrū colitæceptum sit, atq; in casis, & tuguriis habitabant, nec murus, nec porta quid essent, sciebant, immani annorū numero urbanis agricolæ præstant. Nec mirum, quod dat Natura agros, ars humana ædificat vires. Nec sine causa terram eandē appellabant matrem, & Cererem, & qui eam colerēt, piam, & vtilem vitam agere dicebant, atq; eos solos ex reliquiis esse Saturni Regis. Mussonius de quæstu Philosopho decenti tradens, neminem esse tam effaminatū dicit, qui vllum Agriculturæ opus, turpe, aut indecens bono viro dicere sit ausus. Hierocles in Oeconomico paucos esse, qui credant viro indecens esse rei rusticæ opēram dare. Xenophon in libro de tuenda re familiari, nil ei tam regale videri dicit, quàm studium agri colendi. A quo Cicero in officiis. Omnium rerum ex quibus aliquid exequitur, nil esse agricultura melius, nil vberius, nil dulcius, nilq; homine libero dignius. Et in Catone. Mea quidem sententia haud scio an vlla beator esse possit vita rustica: neq; enim solum officio delector, quod vniuerso hominū generi cultura agrorum est salutaris, sed ea delectatione, & saturitate, copiaq; rerū omnium, quæ ad victum humanum, cultumq; etiam deorum pertinet. Prisca etiam ætas illa ad arborum dignitatem honestandam non auro, gemmis, vel re aliqua pretiosiori, sed ex arboribus honorari debere existimauit regum magnorū coronas, & triumphantium gestamen. Sic in certaminibus, & ludis, & sacris victores insigniuntur, sic & Poetæ. Neq; iis contenta, regiones, sinus, vrbes, & nobilium etiam familias ad perpetuam rei memoriam arborum appellatione honorauit. Alexander Magnus, qui Dariū Persarum Regē bis bello superauit, Persea arbore coronari solitus est, in atqui sui honorem, qui hanc arborem è Perside Memphis transtulerat. Cæsarem post ciuilia bella in urbē reuersum, vt aliqui cum regem exprimerent, eius imaginem lauro coronarunt, inde post victorias obtinuit, vt corona laurea ornari perpetuò liceret. Sic etiam qui de ludis, vel hostibus victoriam exportabant, ex lauro corona cingebantur, quod erat victoriæ signum. Naso.

tu ducibus latis, quum lata triumphis

Vox canet.

Scipionem

Scipionē Car-
mulū tenuiss-
tra laurū hab-
sar in triūpho-
tium honos.
nil ludos iustis

Federa

Vnde prouer-
to in Olympici-
in cuius hono-
naulibus lu-

Acc-

In ludis At-
Quinquen-
Pythionice-
plex, ex lau-

Et de laurea
ratij sola cor-

Laure-

Nec latis an-
etiam priu-
arbitraren-
cingerentur

Fuit etiam

Tantum
mina ex il-
humus,
sic dictus

Stolon
si cognos-

Scipionē Carthaginensem triumphatorē; altera manu sceptrū altera laurū mulū tenuisse scribit Appianus. Et Plutarchus, Paulū Emiliū in triumpho dextrā laurū habuisse. Papyrius de Sardis triumphans myrtea usus est corona. Cēsar in triūpho Gallico ē citro, vt ex Plutarcho habetur. Fuit nō minus decertatium honos. Theſeus deuiſo Minotauro ē Crera rediēs, Delū appulit, & Apolliludos instituit, in quibus victores Deliaa corona donarentur. Claudianus.

nutant ad nutua palme

Federantque unq̃s obſeſſat

Vnde prouerbio dicitur palmam dare, & prapcipue pro victoria accipitur. Quē in Olympicis ludis vinceret, oleastro coronabatur, quod primum Hercules, in cuius honorem inuenti, hanc arborem ex Hyperboreis attulerit. Aneas in naualibus ludis oliua victores coronari iussit. Virgilius.

tres premia primi

Accipient, flauaq̃ caput nectentur oliua.

In ludis Athenienſium, & Panathēgis etiam oleaginea corona cingebantur. Quinquennalia etiam fuere, in quibus victores pinea coronabantur: ob id Pythionices dicti, etſi Pindarus apio coronari referat. Poētarum corona duplex, ex lauro, & hederā. Virgilius.

Pastores hederā nascentem ornate Poetam

Arcades.

Et de laurea Poētarum corona etſi multæ adduci poſſint authoritates, Horatij ſola contenti erimus.

coronandis conſueta Poētis

Laurea.

Nec ſatis antiquis viſum eſt in publicis locis arboribus victores coronaffe, niſi etiam priuatim in conuiuiis frondeas coronas tribuiſſent, vt hilarius cōnaſſe arbitrantur. Dionyſium primum inſtituiſſe legimus, vt hederā conuiuæ cingerentur. Fuit etiam ex roſis. Martialis.

Pingueſcat minio madidus mihi canus amomo,

Laſſenturq̃ roſis tempora ſuilibus.

Fuit etiam corona ex philyra, vt Ouidius Faſtorum quinto.

Ebrius incinctis philyra conuina capillis

Salat, & imprudens vertitur arte meri.

Tantum quoq; arboribus tribuit antiquitas, vt nobilium Romanorū cognomina ex iis dicerentur. Ex ſyluis Syluani plures cognominati, & Syluij, vt Poſthumius, qui Syluius cognominatus: is fuit Anece ex Lauinia filius poſthumus, ſic dictus, quod in ſyluis natus eſſet. Ouidius.

Poſthumus hinc, qui, quod ſyluis eſt natus in altis,

Syluius in Latia gente vocatus erat.

Stolonum cognomen indiū fuit ex cultura diligentia. Ab hortis Hortenſij cognominati. Militi etiam Frondij nomen impoſitum, quod frondibus re-

ferro capite Vulturum transauerit, & præclara aduersus Annibalem facinora adiderit. Et Ciceronis liberto Laurea nomen fuit. Eodē etiam modo regionibus, & vrbibus arbores nomina imposuerunt. Syriæ vallis à quercu, vel terebintho denominatur, in qua David Palesthinum gigantem interfecit. Mysi populi à fago nomen acceperunt, quod Lydi *μύσση* fagum vocent. A pyrorum abundantia Peloponnesum Apiam dicunt. Insula Cotiusæ, ab oleastro illic nascente, nomen habuit, qui cotinus vocatur. Cedros insula in Germania littoribus, à cedro. Pityusæ insula in mari Balearico à pinu. Sinus Saronicus à quercu, ita antiqua Græcia quercum appellante. Buxentum Italiæ oppidum à buxo, Cyparissæ ciuitas ab Homero dicta ob cyparissi multitudinem, Cerasus ciuitas Ponti à cerasis, Laurentum Italiæ oppidum à lauro: sic Daphne Asiæ vrbs Daphnitis, & Daphiufa, & aliæ innumera.

Præterea si dignitas agriculturæ accedit ex iis, qui eam tractauerint, regalis ars, & dignissima erit. Cyrus minor Persarum Rex agriculturam curiosè admodum pertractauit: nam in Lydia apud Sardes hortos sua manu conseruit, ad quem quum Lyfander Lacedæmonius veniret, admiratus arborū elegantiam dispositionemq; magistrum vt indicaret rogatus, ille, per louem illic respondit, se nō prius prandere solitū, quàm bellicum quid, aut rusticum opus absoluerit. Fueruntq; alij Asiæ Reges agriculturæ studiosissimi. M. Curius, quum de Samnitibus, Sabinis, & Pyrrho triumphasset, cōsumpsit extremum tempus ætatis in hac villa. Ad focū sedenti magna auri pōdera Samnites quum attulissent, repudiata sunt ab eo. Non enim aurum habere præclarum sibi videri dixit, sed eis, qui haberēt aurum imperare. L. Quintio Cincinnato agrum aranti nuntiatum est eum dictatorem esse factum, cuius dictatoris iussu magister equitum C. Seruilius Hala Sp. Melium Regnum appetentē, & occupare volentem interemit, ex Cicerone, & Columella. Diocletianus maior sponte imperiales fasces relinquens, apud Nicomediam, in propriis agris consenscebat, iisdemq; decem annis vacauit, quumq; ab Herculeio, & Galerio sollicitatus esset ad rursus imperium capeffendum, respondit: O vtinam Salonæ possetis videre olea nostris manibus cōstita, profectò nunquam istud tentandum iudicaretis, authore Eusebio. Abdominus è stirpe regia Sidonis, quum ei regiæ vestis insignia portarentur, inuentus est in horto steriles repurgans herbas, & quum eum admitti Alexander iuberet, percontatusq; esset, quo animo inopiam ferret, respondit: Vtinam eodem animo regnum pati possim: Manus meæ meo desiderio sufficiunt, vt nil habenti, nil desit: ex Quinto Curtio. Alexander Magnus Arachosios populos agriculturā docuit, Plutarcho memoriæ mandante. Telephanes apud Cymesios regnauit, quorū terram excoluit, & arboribus cōseuit: ex Heraclide. Delphicam platanū Agamemnonis manu satam tradit Plinius, cuius generis Dionysius maior tyrānus in eius hortis habuit apud Rhegiū. Antoninus Pius, authore Capitolino, agriculturę diligens fuit. Alius Spartianus ad Germanos proficiscens hortos spatiosos cōparauit, in quibus

bus parca m
eūdo Salom
differuit. Se
Regē, qui on
qui arbores
nomina eis i
Gentio Illyr
chi Macedon
noshabet C
10 Telephi My
que etiam m
tum, adhu
Cariæ vxor
præstantia
roes, & Di
iuxta Her
sa, Indiæ n
fructuum m
la memora
10 culus mem
ribus conse
hac arte bo
ob frumen
nem, Circe
mortalis ha
am, quod i
lus vel, vt l
talium vita
dicata est;
30 neruæ ole
beriores de
ducat, sic
pinus Cyb
crati, & f

De fa

INTER
licet sa
aromata;
40 tatem pro

Bus parca mensa atq; humi iacens cū filiis epulatus est. Ad historias sacras trās-
eūdo Salomon qui doctissimus & sapientissimus fuit, de cedro vsq; ad hyssopū
differuit. Sed quid memorē Philometrū, Hieronem, Archelaū, Attalum Asiæ
Regē, qui omīssis Regni curis, de iis præceptiones tradiderunt? Sed nō solum,
qui arbores coluerunt, ingentes sibi laudes, sed qui virtutes inuestigarunt, &
nomina eis imposuerunt, immortalē sibi gloriam compararunt. Gentiana ab
Gentio Illyricorū Rege inuenta, & culta æternū Regis nomen tenet: Lysima-
chi Macedoniæ Regis Lysimachia: scordion Mithridatis Ponti Regis, clyme-
nos habet Clymeni Regis, euphorbium Iubæ Regis Mauritiæ, telephium
10 Telephi Mysiæ Regis, echium & anchusa Alcibiadis Atheniensium Ducis. Id-
que etiam mulieres affecutas tradunt esse historia. Helenium Helenes inuen-
tum, adhuc Helenes nomen æternum retinet. Ab Artemisia Mausoli Regis
Cariæ vxore suum nomen artemisia habet. Tanta est huius artis dignitas, &
præstantia, vt non solum qui imperatoria maiestate spectabiles fuere, sed He-
roes, & Dijs à plantarum satione manus non abstinuerint. Hercules in Ponto,
iuxta Heracleam quercum plantauit, vt memorat Plinius: Liber pater in Ni-
sa, Indiæ monte, platanum, & laurum, vt Theophrastus inquit, & fabulæ ei
fructuum inuentum tribuunt. A Venere dea punicum solum in Cypro fabu-
læ memorant. Aristeus Apollinis, & Cyrenes nymphæ filius, vt Diodorus Si-
20 culus memoria mandauit, qui Deus post mortem habitus est, Sardiniam arbo-
ribus conseruit. Nec solum dijs suis manibus serere delectati, sed qui aliquid in
hac arte boni ad mortalium vsum inuenerunt, inter deos sunt habiti: Ceres
ob frumenti inuentionem inter Deos habita est. Bacchus ob vini inuentio-
nem, Circe ob egregium herbarum munus Solis filia, & diuina potius, quàm
mortalis habita est. Cybeles currui leones adiunxerunt antiqui in eius grati-
am, quòd ipsa terram sic cicurasset, vt cicures leones currum traherent. Escu-
lus vel, vt Plutarchus placet, quercus Ioui dicata est, & sacra habita, quòd mor-
taliū vitæ causa fuerit, qui primum glandibus victitarunt. Apollini laurus
dicata est, quòd fulmine non icipitur, & diuinationem in somnis præbeat. Mi-
30 neruæ oleam dicarunt, quòd labiis nescia, & à pueris, vel virginea manu sata, v-
beriores det fructus. Myrtus sub Veneris tutela, quod venereis remediis con-
ducat, sic rosa, & philyra. Hedera, ferula, & picea Baccho, cupressus Plutoni,
pinus Cybeli, punicum malum Mercurio, populus Herculi, & persea Hæpo-
crati, & sic de aliis.

*De sanitate, & alijs, quæ ex Agricultura comparantur, & quod Agricola:
boni viri sint. CAP. V.*

INTER cætera, quæ ex villa conquiruntur, non omittenda pretiosa res, sci-
licet sanitas, quæ ex villa comparatur habitatione. Omitto quod Natura tot:
aromata, ac medicatos succos, arborum fructus, & radices ad humanam sani-
40 tatem produxerit, vt eadem quæ ad escam, & voluptatem dederat necessaria,,
B 3

etiam ad sanitatem tuendam valerent, quæ quia ab Hippocrate, Theophrasto, Dioscoride, Plinio & nostris phytognomonicis tradita sunt, libenter omittenda censuimus. Viridis primum frondium color, visum relaxatum fouet, quam rem non minimum sanitati conferre iudico: nam, vt Seneca inquit, confusis oculis profunt virêtia, & eiusmodi coloribus infirma acies acquiescit. Eas probat Galenus, & Celsus exercitationes ad corporis augendas, & confirmandas vires, & ad valetudinem tuendam, quæ sub vmbra mista fiunt, quam vocant Græci *ὑποσκιαν*, easque vtiliores dicunt, quàm quæ sub recto, & inter parietes fiunt. Vt plurimum enim syluæ leui vento, vel aura mouentur: nam valentes flatus folia rumpunt, & silentes auras sua leuitate excitant, nec aëris densitatem ibi sistere patiuntur. Syluas, quæ picis resinæque gratia raduntur, vtilissimas phthificis Plinius esse scribit, atque illis, qui longa infirmitate non adhuc retinent vires, & illum adiuuare plus cœli aëra, quàm Ægyptiam navigationem, plusquam lactis per montium æstiuæ potus herbidos. Profunt præterea sylvarum vmbra, & amœnitates non parum ad euitandam aëris contagionem, potissimum verò fragrantium. Quum Romæ pestis atrociter saui-
ret, Commodus Princeps Medicorum consilio Laurentum secessit, quòd hæc regio crebris lauri syluis opaca foret, cuius odores plurimum contra cœli maleficia prodesse omnibus notum: vt ex Herodiano habetur. Herodes, ob vxoris Mariamnae mortem, quam interfici mandauerat, tanta tristitia affectus est, vt in grauem corporis ægritudinem inciderit, quam tantum aër pestilens auxit, vt dein suorum Medicorum suasu sese in sylvarum secretis abdiderit: sic refuso paulatim vigore, simul & corporis, & mentis salubritatem receperit. Inter cæteros viri boni vocantur agricolæ à veteribus agricolationis præceptoribus. Cato rusticum opus proximum, ac quasi consanguineum sapientia dixit. Columella, sine ludicris artibus, atque sine causidicis olim satis felices fuisse, atque futuras vrbes, at sine agricultoribus neque consistere mortales, neque ali posse manifestum inquit. Est tandem rustica vita omnium fraudum expers: vnde boni viri non nisi ex agro requirebantur. Apud Aristophanem in Pluto, quia Chremilus vir iustus Charionē seruum mittit optimos viros vocatum, rus eum legat ad visendum Plutum. Quid enim eo exemplo Comicus vult innuere, nisi proborum hominum ruri esse domicilium, in vrbe sophistas, parasitos, & id genus hominum reperiri? Cato. Virum bonum quum laudabant, ita laudabant bonum agricolam, bonum colonum: amplissimè laudari existimabatur, qui ita laudabatur. Minimeque malè cogitantes sunt, qui eo studio sunt occupati. Xenophon generosam artem vocat: quippe vtilis prouentu, iucunda opere, hominibus grata, facilis cognitu, & exercitio quoque generosa: nam generosa vocamus animalia, quæ pulchra, vtilia & mansueta sunt. Ingenua quoque ars, nam quum cæterarum artium professores multum eorum disciplina occultiora abscondunt, agricola magnopere gaudet suum opus ab omnibus cerni, rogatusque quomodo id egerit, libenter explicat. adeo

adeo ingen-
ra, ac firm-
que ad opus
dulcor vxo-
acuit, ad be-
mutuam pra-
dum mutuo
Augustinus
connumera-
10 tiorem qu-
ram ab aliis
docere vid-
uus Chrys-
quum nos-
res ambire
stum voca-

Seo vide
Platone
20 cit, nisi alim
sed necessa-
gro faciend
agricolæ ad
tas fructus
Agricultur
cætera val-
garricem,
victus nec
necesse vt
30 suau verbi
ra est ars,
nore. Mo-
de inde te
scientem
raturum fr
creat. Qu
antur do-
adiungit
eam que n
40 larum, ne

ad eō ingenuos, & liberales hæc ars homines reddit. Insuper corpora vegetiora, ac firmitiora viribus reddit, impigros facit, & matutino surgere, properare-
 que ad opus, venationibus insudare hortatur. Tandem quæ amantior seruis,
 dulcior vxori, optatior filiis, gravior amicis? Colonos ad iustitiam, officiumq;
 acuit, ad belli tempus animo & corpore valentes reddit, instruit quoque vt
 mutuam præstent vtilitatem: nam ad bellum conficiendum, & agrum colen-
 dum mutuo opere indigemus, ac similitudine quadam inter se conueniunt.
 Augustinus libro de opere monachorum agriculturam inter honestas artes
 connumerat. Salomon homines ad agriculturam hortatur, vtpote ad san-
 10 tiorem quæstum. Non oderis, inquit, rusticam operationem, & agricultu-
 ram ab altissimo creatam. Et quid aliud noster seruator Christus in euangelio
 docere videtur? Et abierunt alius in villam, alius in negotiationem, nisi, vt di-
 uus Chrysostomus ait, quia omnis humanus actus aut villa, aut negotiatio est,
 quum nostris manibus rusticum opus operamur, villam colimus: sed hono-
 res ambire, aut mercari, negotiatio est, hoc inhonestum lucrum, illud hone-
 stum vocat.

Quid sit Agricultura, & quis eius inuentor. CAP. VI.

SEd videamus quidnam sit Agricultura, & qualiter ab antiquis descripta: à
 Platone autem incipiemus, qui in Eutidemo Agriculturam nil aliud esse di-
 20 cit, nisi alimenta è terra colligere. At M. Varro ait, Agricultura non modo ars,
 sed necessaria & magna, eaque est scientia, quæ docet, quæ sint in quoquo a-
 gro facienda, ferendaque, quæque terra maximè perpetuo reddat fructus. Et
 agricolæ ad duas metas intendere debent, ad vtilitatem, & voluptatem: vtili-
 tas fructus, voluptas delectationem parit. Xenophon verò in Oeconomico
 Agriculturam esse aliarum artium parentem, & altricem, quæ bene habente,
 cætera valent: neglecta verò, terra, marique iacent omnia. Esse præterea inda-
 gatricem, & accusatricem hominum vitæ, quippe quum nullus ignoret citra
 victus necessaria neminem posse degere, hac neglecta, nisi ex alia viuat arte,
 necesse vt in furandi suspicionem veniat. Cicero libro de senectute longo &
 30 suauiter verborum lenocinio agriculturam describit, eiusque opera. Agricultu-
 ra est ars, quæ docet vsuram cum terra facere, & plerunque maiore cum fæ-
 nore. Molliore terræ gremio semen sparsum excipit, occatum primo cohibet,
 deinde tepefactum vapore, & complexu suo diffundit, vt eliciat ex eo herbe-
 scentem viriditatem. Ex sic tantulo grano, aut ex acino vinaceo, aut ex cære-
 ratum frugum, & stirpium minutulis aristulis, tantos truncos, ramosque pro-
 creat. Quomodo malleoli, plantæ, sarmenta, viuiradices, & propagines effi-
 antur docet. Vitis, quæ natura caduca est, nisi fultra sit, ad terram fertur, palus
 adiungitur, vt clauiculis suis, quasi manibus, quicquid nacta est, complectatur,
 eamque multiplici, & erratico lapsu serpentem amputans coercet ars agrico-
 40 larum, ne syluescat sarmentis, & in omnes partes nimia fundatur. Sic incunte

vere in iis, quæ relicta sunt; oriens vna sese ostendit, quæ & succo terræ, & calore Solis augescens, maturata dulcescit. Sic adminiculorum ordines, capitum coniugationes, & religationes, propagationes, vitium, sarmentorumque amputationes, & aliorum remissiones: item irrigationes, agri fossiones, repastinationes, stercorationes, quibus fit ipsa terra multo fertilior, docet. Nec segetes solum & vineas curat, sed arbuta, hortos, pomaria, & prata. Nec consitiones modo, sed etiam insitiones, quibus nil inuenit agricultura solertius. Hactenus Cicero. Sed mihi videtur nil aliud esse Agriculturam, quam inspecta plantæ natura, ei cælum, terram, & idoneum cultum tribuere, & (vt ita dicam) cælum cum terra maritare, vel societatem perquirere cæli & terræ ad arbores. Sed quum cælum nullo modo queat flecti, oportet vt sedulus agricola situs varietate vtatur, vt cælo facile plura associetur. Exemplo omnia fient clariora. Quæ in siccis serenda sunt, orientem & septentrionem spectent, & quæ in humidis, meridiem. Præcoces in frigidis seremus, vt maturitas antecedit algorem. Quæ rores oderint, orientem versus serantur, vt statim nouus exoriens Solis radius, illum quamprimum deficiet. Quæ contrà rorem, exposcunt, occidentem aut Boream versus, ne tam cito à Sole deficiant, aut diutius frui liceat: sic cælum terræ parere ars cogit. Ob id omnium agricolarum superiorum & nostrorum ætatem sapientissimum Democritum existimasse puto: nam solus ipse cælo terram maritare nixus est: Vergiliarum enim ortu olearum caritatem vaticinatus est, ac vilius mercatum, carius postea vendidit. Ob id nos priuatim singulorum capitibus cæli, terræque meminimus, vt consensum cæli, terræque cognosceremus. Sed Agriculture inuentores tradamus. Ipsam primum inuentam ab Osiri, qui idem est cum Dionysio in Ægypto testatur Diodorus in primo, à Triptolemo in Græcia ab Atticis, & Eleusinis populis testis est Iustinus in secundo, à Saturno in Latio, authores sunt Virgilius, Macrobius, & Eutropius. Cererem, quam à gerendis frugibus Gererem appellatam alicubi Cicero prodidit, in Sicilia agriculturam reperisse, sunt qui scribant. Nabidi suo Hispani. Alij aliis agriculturæ inuentum acceptum referunt. Cyprianus sentit antiquitatem Saturno falcem tribuisse, cuius finis industria est, metere atque colligere fructus, quod ipse rem rusticam docuisset: quod insigne ei lanus dederit, cui posteritas rationem inferendi, & artem faciendi furculos fert acceptas: vnde Latini Saturnum à saru vocarint. Augustinus libro de ciuitate Dei refert Stercen prius fuisse peritissimum agricolam, à quo inuentum ferunt, vt fimo animalium agri fecundarentur, & ab eius nomine stercus dictum esse: vnde & hunc quidam Stercutium vocatum ferunt, hunc certum fuisse Saturnum, quem merito fecerunt Agriculturæ Deum. Philostratus, Per Nili simulachrum ita Ægyptij agriculturam indicant, ait, eiusque effigiem hac lepida descriptione effingunt. Huic enim sese ab vndis attollenti pueri ludibundo blandiuntur occurfu, sexdecim numero, quot itidem cubitis ad fertilitatem facit exundatio, quorum alij humeris insident, hi à cincinnis suspenduntur, in vlnis alij cu-

alij cubitant
illis flores
stra quatuor
appolis man

De

VT quic
rum tal

nem, cui om

uemus, si qu

10 tio lux Agri

tum voto ar

& apes, alia

è philosophi

agricultura

pes partes

cum solo h

pertinent.

homines, a

malia temi

10 hominibus

dem impera

tes, villicus,

storele in O

creti artifi

nomum no

nec quicq

strum OE

esse oport

agricultura

30 mus fieri p

phia exerci

ptum reli

Sol, & ha

modo O

rit: & qu

phonis,

Epicharm

Euphron

lingua de

40 lius Vric

Columel

alij cubitant, alij in pectore petulanter saliant. Ipse tam ex sinu, quàm ex vlna illis flores spargit, vt ex ipsis coronas contexant, & super floribus dormiant: sinistra quatiunt alij, neque absunt qui plausum, sonitumque ab aquis excitent, applois manibus.

De OEconomii siue patrisfamilias institutione. CAP. VI.

VT quicquid hoc volumine tractetur, ordinatè procedat, dicendarum rerum tabellam proponemus, vt lector diuisionem animo concipiens, finem, cui omnia ordinata sunt cognoscat. Et si veterum monumenta peruoluemus, si qui sunt qui hanc artem diuiserint, Varronem reperimus, qui initio suæ Agriculturæ id exequutus est, sed eum sequi non putamus, nisi quantum voto arrideat: nam quum in agriculturæ diuisione pecora, boues, aues, & apes, aliaque animalia clauserit, volumus, vt qui horum historias scire auent, è philosophorum, non rusticorum libris perquirant. Nos quum paulò antè agriculturam de cælo, solo, & cultu tractare dixerimus, & has suas esse principes partes, de cultu loquemur primo, & cum Varrone dicimus, aliqua esse quæ cum solo hærent, aliqua, quæ extra fundum sunt, & hæc sunt, quæ ad culturam pertinent. Res, quibus agri coluntur, alij in duas partes, alij in treis diuidunt, vt homines, animalia, & adimicula hominum. Homines vocales vocant, animalia semiuocalia, muta, in quo sunt plaustra. Sed rationi consonum est, vt de hominibus primum loquamur. Sed hominum ratio, atque conditio vna quidem imperans, altera dicto audiens: imperans, vt paterfamilias: dicto audientes, villicus, villica, & serui: de illo prius, mox de reliquis. Paterfamilias ab Aristotele in OEconomia, & ab Xenophonte OEconomus dicitur. Et vt solent ceteri artifices, qui oratores, poetas, & principes instituunt, ita & nos OEconomum nostrum à natiuitate instituemus, cuius iussibus villicus obediens erit, nec quicquam in villa fiet, nisi quod ab eo præceptum erit. Primum igitur nostrum OEconomum à Natura bono ingenio, & optimo iudicio nobilitatum esse oportet: nam quum multas artes & scientias callere necesse sit, quibus in agriculturæ exercitio vtatur, quomodo arte, & experientia bonus OEconomus fieri poterit, nisi illa ab ortu fuerit assecutus? Sit etiam in naturali Philosophia exercitatus: nam quum agriculturæ principia, vt Ennius nobis scriptum reliquit, & ab eo noster M. Varro retulit, sint terra, aqua, anima, & Sol, & hæc cognoscenda potius cæseat, quia hæc in tota arte tractantur: quomodo OEconomus noster perfectus esse poterit, si Philosophiam ignorauerit? & quomodo difficillima monumenta Hesiodi, Ascrei, Democriti, Xenophontis, Archiæ, Aristotelis, & eius alumni Theophrasti, Hieronis Siculi, & Epicharmi eius discipuli, Philoponi, Attali, Chereæ, Aristarchi, Amphilocho & Euphronis Atheniensium, & Magonis Carthaginensis percipiet, (qui Pœnica lingua duodeviginti libris res dispersas comprehendit, quos Cassius Dionysius Vticensis Græca lingua viginti libris conuertit) & aliorum, qui à Varrone, Columella, & Cassio recensentur? Et quomodo sine Philosophia tot soli qua-

litates ex colore, sapore, & quid ex his promissum, vel abnegatū sit cognoscere valuerit, nisi saltem huius scientiæ principia delibauerit? Nam etsi Natura in rebus omnibus admiranda est, in agricolationis rebus admirabilissima est. Et quomodo tot insitionis modos, sationis, & cultus cognoscet, plantarumque morbos, & medicinas, si illorum causas, & secreta nō pertractauerit? erit profectō, vt empiricus, agricola, qui casu, & experientia, & nō recta ratione medebitur. Oportet etiam Mathematicarum scientiarum, & præsertim Astrologiæ non ignarum, vt ex mundi declinationibus, syderum ortu, & occasu, felices, & infelices plantarum euentus possit præfigere: nam syderum influxus in plantis liquido, & sine vlla ambage percipiuntur, & quid negauerint, ij proprium sensum negabunt. Cassius Græcus initio suorum librorum quicquid à Didymo, Diophane, Philopatro, Arato, Zoroaste, & Ptolemæo traditur, collegit, vt his artibus agricolam instruat. Varro omne quod intra æquinoctia, & solstitia faciendum sit, docet. Virgilius non minus quàm à nautis, ab agricolis sydera obseruanda præcipit.

*Præterea tam sunt Arcturi sydera nobis,
Hædorumq; dies seruandi, & lucidus anguis:*

*Quàm quibus in patriam ventosa per aquora vectis
Pontus, & ostriferi fœces tentantur Abydi.*

Docent etiam Hesiodus primò, mox Virgilius dies felicibus operibus aptos. 20

Hesiodus. *At quintas fuge: namq; illarum pallidus Orcus,
Tum dira Eumenidum facies toto orbe vagantur,
Castigant si qua in terris periuria falsum
Affirmant, quæ his alterne agitata creant.*

Virgilius. *Ipsa dies alios alio dedit ordine Luna
Felicis operum, quintam fuge: pallidus Orcus,
Eumenidesq; sate: tum pariter terra nefando
Cœumq; Iapetumq; creat, sænumq; Typhœa,
Et consuratos cœlum rescindere fratres.*

Et statim suorum Georgicorum exordio Lunam & Solem, à quibus ferè omnia in agricultura proueniunt, inuocat:

Vos ò clarissima mundi

Lumina, labentem cœlo quæ ducitis annum.

Columella hanc scientiam serenitates, & tempestates prænoscere dicit, ne imbribus, ventisq; imminētibus agricola opera inchoet, laborē vne frustratur. Cœli & anni præsentis mores intuetur: neq; enim semper eundem velut ex præscripto habitum gerunt, nec omnibus annis eodem vultu venit æstas, aut hyems, nec pluuium semper est ver, aut humidus autumnus. Et quomodo ex agriculturæ operibus diues erit, nisi fructū caritatem, aut abundantiam prænouerit, vt de Thalete Milesio diximus? Florētinus Græcus in sui Oeconomii institutione clamat, necessariū esse temporū varietates cognoscere: nam maior ope-

ior operū pa
constitutis
rietur, & qu
solum harū
oportet: nam
lumella: agri
cet, sed audir
aduocanda p
is cultissimu
re, aut velle
faciendi, aut
gotio est ne
faculasq;
prudenter
solum rei
que re col
terur. Præ
& eximia
rit, larem fa
20 quem con
suetas religi
quiddam ei
ferias per h
vacare cog
plum omni
cientes, re
ritate orbi
iori obser
nū institui
10 bāt, impleo
cerur, & si
deprecati
igitur nos
cere ceter
nanda. E
seuerissi
domini
facultate
sentia, qu
40 tor, cū c
rū scripto

Ior operū pars ex his pendet. Vel quomodo agrū in quincuncem disponet, atq;
 constitutis cœli partibus diriget, vel ædificia collocabit? Quomodo agros me-
 tietur, & quæstus ad diligentē calculū expendet, si Geometriā neglexerit? Nec
 solum harū disciplinarum, sed quid quoquo agro faciendum consultissimū esse
 oportet: nam malē cum domino agitur, inquit Cato, quē villicus docet. Et Co-
 lumella: agrū pessimē mulctari, cuius dominus quid in eo faciendum sit, nō do-
 cet, sed audit villicum. Et qui studium agricolationi dederit, sciat hæc sibi tria
 aduocanda, prudentiā rei, facultatē impendendi, & voluntatem agendi: nam
 is cultissimum rus habebit, qui colere sciet, & poterit, & volet. Neq; enim sci-
 re, aut velle cuiq; satis fuerit sine sumptibus, quos exigunt opera, neq; rursus
 faciendi, aut impendendi voluntas profuerit, sine arte: quia caput in omni ne-
 gtorio est nosse, quid agendum sit, maximeq; in agricultura, in qua voluntas,
 facultasq; citra scientiam sepe magnam dominis iacturam afferunt, quum im-
 prudenter facta opera frustrentur impensas. Itaq; diligens paterfamilias non
 solum rei agricolationis peritissimus sit, sed prudentissimos agricolas de qua-
 que re cōsulat maxime curabit, atque commentarios antiquorum sedulo scru-
 tetur. Precipiunt etiam eiusmodi scriptores nostrum œconomum religiosum,
 & eximia bonitatis esse debere. Ait Cato. Paterfamilias vbi ad villam vene-
 rit, larem familiarem salutabit, Augurem, aruspicem, ariolum, Chaldaum ne-
 quem consuluisse velit. Addit his Florentinus. Sic agri præfectus pius, & con-
 suetas religiones obseruet, non arbores dedicatas, aut consecratas, aut aliud
 quiddam eiusmodi contumelia afficiens, verū omnes ad pietatē præparans, &
 ferias per hebdomadā fieri permittēs, & nihil graue tunc facere permittat, sed
 vacare cogens, & maxime in lunaribus, aut annuis festis: & tandem sit exem-
 plum omnium in agro degentium, vt ad illum, & illius vitam & mores respi-
 cientes, reuereantur magis, quàm pertimescant. Si igitur gentiles, & omni ve-
 ritate orbatī festos dies, & honorē illorum deorū reuerebantur, quanto ma-
 iori obseruantia noster hic œconomus optimus futurus erit, quem Christia-
 nū instituimus, euangelicāq; veritate edoctum? Si illi familiares deos saluta-
 bāt, ipse ecclesiā adeat, atq; piis orationibus à Deo felices villæ fructus depre-
 cetur, & si illi vanis superstitionibus noxios præcauebant influxus, nos sanctis
 deprecationibus à Deo prosperos nostræ villæ euentus auspicabimur. Horreat
 igitur noster hic œconomus vanas superstitiones, falsasq; religiones, vt idē fa-
 cere cæteri ab eo ediscant. Numinū aliquorū per iocū omnis attestatio elimi-
 nanda. Dei, aut numinis cuiusuis cōtemptrorē familia confestim eiiciatur, aut
 seuerissime puniatur, ne perniciosā ea inoleseat cōsuetudo. Sit in agro assidua
 domini præsentia. Ait Columella. Nō assiduus labor, aut experientia villici, nō
 facultates, aut voluntas impēdendi tantū pollent quā, vni vel vna domini præ-
 sentia, quæ nisi frequēs operibus interuenerit, vt in exercitu quā abest Impera-
 tor, cūcta cessant officia. Maxime reor hoc significantē Pœnum Magonē suo-
 rū scriptorū primordiis. Qui agrū parabit, domū vedat, ne malit vrbani, quàm

rusticum larem colere: & cui cordi fuerit urbanum domicilium, rustico prædio non erit opus. Ab eo Palladius: Præsentia domini prouentus est agri. Cassius: Agrum multò præstantiorē facit assidua domini præsentia. Quod idem à Catone, & aliis præceptum est. Sed addit alia idem. Vbi ad villam venerit paterfamilias, fundum eodem die, si potest, circumeat, si non eodem die, at postridie: ubi cognouerit quomodo fundus cultus sit, operaq; quæ facta, infectaq; siet, postridie eius dici, villicum vocet, roget quid operis siet factum, satis ne temporis opera sient cōfecta, quæ durare possint, quid restet, aut quæ reliqua sient conficienda, & quid factum vini, frumenti, aliarumve rerum omnium. Vbi ea cognouerit, rationem inire oportet operarum, dierum: si eius opus non appareret, dicit villicus sedulo se fecisse, seruos non valuisse, tempestates malas fuisse, seruos aufugisse, opus publicum effecisse. Vbi eas, aliasq; causas multas dixerit, ad rationem operū, operarumq; villicum reuoca. Quum tempestates pluuiæ fuerit, videto quot dies, quæve opera per imbrem fieri potuerint, dolia lauare, picari, villam purgari, frumentum trāsferri, sterus foras efferri, sterquilinum fieri, semen purgari, fenes veteres sarciri, nouosq; fieri, centones cuculionesq; familiam oportuisse sibi sarcire. Per ferias verò potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortū fediri, pratium purgari, virgas vinciri, spinas runcari, cremariq; ex piscina immūditias efferri, munditias fieri, seruis excocta cibaria non tanta dari, quanta quum sine tempestate operantur in aruis. Vbi hæc cognita æquo animo sient, quæve reliqua opera sient, curare vti perficiantur. Rationē item viniariam, oleariamq;, quid venierit, quid exactum siet, quid reliquū siet, quidq; siet, quod veniat, quæ satis accipienda sient, satis accipiantur, reliqua quæ sient, vt compareant. Si qua desint in annum, vti comparentur, quæ super sint, vti veneant. Quæ opus sient locato, locentur, quæ deinde opera fieri velit, & quæ locari velit, vti imperet, & ea scripta relinquat. Vendat oleum, si pretium habeat, vinum, frumentumq; quod super sit, vendat. Boves vetulos, armenta reicula, oues reiculas, lanam, pelles, plostrum vetus, ferramenta verera, seruum senem, morbosum, & si quid aliud super sit, vendat. Patremfamilias vendacem, non emacem esse oportet. Sed quum dixim nostrum hunc patremfamilias doctissimum esse oportere, ac plurimarum scientiarum callentissimum, nollem tyronum animos ex diffidentia detertere ad hanc artem consequendam, immò vellem vt maiori cum ardore, & animi alacritate ad metam aspirarent. Fulmen eloquentiæ Demosthenis Ciceronem non perterruit ad eum imitandū, neq; fulgura Ciceronianæ eloquentiæ Brutum, Cælium, Pollionē, & Messalam deteruerunt: nec Virgilium ad summum Musarum culmen ascendisse absterruit Actium, nec Platonis philosophia Aristotelē. Vnde si paterfamilias non erit Philosophus sicut Democritus, aut Pythagoras, nec Astrologus, vt Meton, Eudoxus, Calippus, aut Ptolemæus, nec de terræ qualitate iudicanda peritus, vt Triptolemus, vel Aristæus, nō ob id vellem hanc artē crassa Minerva pertractaret: nam multum à veritate absunt, (vt

rudes

rudes quam
posse consilii

Arist
curam
describendo,
bus seruos re
non sibi cōtra
tem, corpus
speculari, &
res verò cor
minare sunt
anima, secu
litus, temp
erere nos
arat, fodi
dum propo
cum, si null
thore cunct
eum consul
nificiores,
matus sit op
edocendus
spiciendus
ferui sicut
pe ra turis
hunc lenē
annum off
aprum, & i
sequentes
virga cōpe
dibus exci
tet, & vt
benē sine
solum ru
prudente
in hoc ma
valentissi
simus, si fi
dionera,

rudes quamplurimi putant) hanc artem facillimam, & ab omnibus pertractari posse constituentes.

Qualem oporteat esse rusticum officio villicationis præfectum.

CAP. VIII.

ARISTOTELES, vt diximus, in Politicis aded miris laudibus Agricul-
turam extollit, vt libero homine dignā faciat, mox optimam ciuitatem
describendo, quasi suimet oblitus, ciuili viro indignam iudicat, eiusque operi-
bus seruos relegat: sed qui id optimè considerauerint, maximū Philosophum
non sibi cōtrariari cognoscet: nam sicut in homine videmus animā imperan-
tem, corpus verò, vt instrumentum, ei seruiens, ita & viri sunt, qui non nisi
speculari, & scire apti sunt, in quibus viget anima: sunt & alij, quibus torpet, vi-
res verò corporis luculentas habent. Operatrices artes binis partibus discrimi-
natae sunt, altera modum operandi iubet, altera iussa exequitur, prima ex
anima, secunda ex corpore proficiscitur. Sic ea Agriculturae pars, quæ cœlorum
sit, tempora, & soli qualitates speculatur, liberi hominis est, & iam in ea ex-
erceri nostrum patrem familiās diximus: quæ verò corporis vires exercet, hæc
arat, fodit, pastinat, & colit: in hac rusticum villicationis præfectum institu-
dum proponimus, vt hic pareat, ille imperet. Sed quis docebit futurum villi-
cum, si nullus professor est? Difficillimum putat Columella ab vno velut au-
thore cuncta consequi rusticationis præcepta, vnde plurimos cōsulat eius par-
tium consultissimos oportet magistros, bonos aratores, optimos fossores, fœ-
nisectores, arboratores, & vinitores: cōplurium igitur agrestium artibus for-
matus sit oportet, qui villicationis officium suscepturus erit. Is ergo à pueritia
edocendus, & rusticis operibus educandus, multisq; prius experimentis in-
spiciendus erit futurus villicus. Ætas nec prima, nec vltima conueniet, nam
serui sicut runculum contemnunt vt senem. quoniam ille nondum nouit o-
pera ruris, hic exequi iam non potest: illum adolescentia negligentem reddit,
hunc senectus facit pigrū: media igitur ætas à trigésimo vsq; ad sexagesimum
annum officio aptissima. Xenophon hunc beneuolum, diligentem, imperio
aptum, & iustū exoptat. beneuolentia facit vt obsequētes habeat operas. ob-
sequentes equi à domitoribus delinimento aliquo demulcentur, reluctantes
virga cōpelluntur. Seruos qui ventri indulgēt, gula illecebris, ambiciosos lau-
dibus excitabis. In hac ætate villicus scientissimus, & robustissimus sit opor-
tet, & vt doceat subiectos, & ipse commodè faciat quæ præcipit: siquidem nil
benè sine exemplo docetur. & sit operariorum magister, non discipulus. Nec
solum rusticationis, sed imperitandi scientiam habeat. Imperitandi parum
prudentes aut sæuius, aut lenius agendo rem perdunt. Potissimum autem est
in hoc magisterio existimare quale officium cuique iniungendum: nam nec
valentissimus posset exequi quod imperatur, si nesciat quid agat, nec peritissi-
mus, si sit inualidus. Considerare debet opera virium, tanquam promouen-
di onera, portandiq; quæ minus virium plus artis, sicut putationibus, & infi-

tionibus: sic aliqua viribus & arti sociata, vt fodiendi, arandi, segetes & præsæcandi. Cato vigilantem probat. Primus cubitu surgat, postremus cubitum eat. Columella vult vt omnium primus familiam cōstantem producat, & ipse strenuus præcedat. Maximè enim referre dicit primo mane opus aggredi, vt velut in aliquod præliū cum vigore, & alacritate eum, tanquam ducē sequantur, & neminem post se relinquat, variisque exhortationibus in opere ipso exhilaret laborantes, & interdum tanquam deficienti succursurus ferramentum auferat, & ipse suo officio fungatur, moneatq; sic fieri debere, vt ab ipso fortiter sit effectum. Quum verò rectum subierit, non in suo domicilio delitescat, sed agat cuiusque maximam curam. Si quis in opere sauciatus fuerit, vel languidior factus, in valetudinarium deducat, & convenientem curam adhiberi iubeat. Nullum, inquit Xenophon, est, quod plus gratiæ sit habiturum, quàm seruos, vbi in morbos inciderint, curare vt curentur. Nec minor cura eorum, qui rectè valebunt, vt cibus & potio præbeatur. Assuescantque circa larem domini epulari, & ipse in eorum conspectu similiter epuletur. Fortissimum quenque largitionibus prosequatur, nōnunquam suæ mensæ adhibeat, & aliis honoribus dignetur. Communicanda quoque cum iis quæ faciunda sunt opera, quod ita quū sit, minus se despici putant, atque aliquo numero haberi à domino. Studiosiores ad opus fieri liberalius tractādo, aut cibariis, aut vestitu largiore, aut remissione operis, cōcessionēve, vt peculiare aliquod in fundo pascere liceat, aut huiusmodi rerum. Pro beneficio gratiā referat, vt alij rectè facere discant. Si quis quid deliquerit, bono modo vindicet. Hæc Catonis, & Varronis oracula à Columella dilucidata. Considerare debet quòd imperia in maioribus rebus difficulter custodiuntur, ne aut crudelius, aut remissiùs agat cum subiectis. Foueat bonos, parcat minus probis, & ita temperet, vt magis eius vereantur seueritatem, quàm sæuitiam detestentur, custodiatq; potius ne peccet operarius, quàm quum peccauerit, seuerè puniat. Et si aliquibus quid grauius sit imperatum, aut animaduersum, consolando eorū restituat voluntatem, ac benevolentiam in dominum. Nulla maior custodia, quàm quorundam operis exactio. Verum est M. Catonis oraculum. Nihil agendo homines malè agere discunt. Sic operarij diligenter exequentur sua munia, & post operis exercitationem fatigati, potius cibo, & somno, quàm maleficiis se dederint. **Cultā**, vestitamq; familiā vtiliter magis habeat, quàm delicatè, id est munitam diligenter à frigoribus, & imbris, quæ vtraque prohibentur pellibus manicatis, & sagatis cucullis. Et ferialibus diebus, quibus vacant ab opere, vestes quorūcunq; refarciantur, & ferramenta recognoscantur, eaq; semper duplicia cōparer, ne si quod in opere vitiatum, à vicino petendum sit, quia plus in operis seruorum auocandis, quàm in pretio rerum eiusmodi perditur. Vini sit abstinentissimus, quod est inimicissimum diligentiae; obliuionem enim inducit vini potus. Cato. Sobrius sit semper. Ad cœnam ne quò eat. Tum etiam à Venæris amoribus auersus, quibus sese si dederit, non aliud quicquam possit cogitare,

tate, quā illi
abſentia ſuſ
præcipit, Ne
villicus legat
animaduertat
rit, neq; villi
brius, quā
mino fidem,
Cato præcipi
10 minus imper
mini credat
crebro putet
uiſſe velit.
ſedeat. Fam
malo, & ali
cubet, & vi
hæc addit. A
vſuras in exp
tium ſupped
10 melius, potius
domini iuſſi
intelligere q
addicere: na
negligentia, n
nam reſultat
Columella.
ipla domini
dius, quā
tur, turbatu
10 termiſſum,
ſtudiis pluri
cia maximè
frugum præ
ante exper
ſemina de
ceſſitas ſe
Nequā eſſe
eſſe patren
tū in cœ
40 ferialis del
recto, quā

tate, quam illud, quod diligit: ob id terminos suæ coloniz egredi nō debet, nec absentia sua familiæ cessandi, aut delinquendi spatiū dare. Varro Salsernæ iussu præcipit, Ne quis de fundo exeat, præter villicum, & promum, & vnum, quem villicus legat: si quis contra exierit, ne impunè abeat, si abierit, vt in villicum animaduerratur. Quod potius ita præcipiendū fuit, ne quis iniussu villici exierit, neq; villicus iniussu domini longius, quàm eodem die redierit, neq; id crebrius, quàm opus esset fundo. Nec solum quæ diximus sapere oportet, sed domino fidem, ac beneuolentiā exhibere, sine quibus nihil potest villici scientia. Cato præcipit ei, Ne plus cēseat sapere se, quàm dominū. Consideret quæ dominus imperauerit, fiant. Amicos domini eos habeat sibi amicos. Iniussu domini credat nemini. Quod dominus crediderit exigat. Rationē cum domino crebro putet. Ne quid emisse velit, insciente domino, nec quid dominum celauisse velit. Alieno manū abstineat, sua seruet diligenter. Litibus familia superse deat. Familiæ malè ne sit, ne algeat, ne esuriat, opere benè exerceat: sic facilius malo, & alieno prohibebit. Villam videat clausa vti fiet, & vti suo quisq; loco cubet, & vti iumenta pabulū habeant. Familiā ne siueris peccare. Florentinus hæc addit. Alienas rationes ne cōducatur. Non turpis lucri apperens, neq; circa vsuras in explebilis, sed paucis cōtentus, & semper quæ necessaria sunt vsui egētium suppeditans. Mentiri & maximè peierare formidet. Et si quid inuentum melius, potius ad dominū referat, præterquā si valdè adeo vtilitas rei vrgear, vt domini iussione expectare nō possit. Sed pretiosissimū est, inquit Columella, intelligere quemquam se nescire quod nesciat, semperq; cupere quod ignoret addiscere: nam etsi multū prodest scientia, plus tamen obest imprudentia, vel negligētia, maximè in rusticatione. Cato. Opera omnia maturè cōficiās face: nam res rustica sic est, si vnā rem serò feceris, omnia opera serò facies. A quo Columella. Si quid perperam factū est, vel imprudētia, vel negligētia, res tamē ipsa domino decoxit, nec fieri potest, vt iacturā refarcias: nam si opus vnū tardius, quàm oporteat, peractū sit, cætera quoq; quæ sequuntur, serius adhibentur, turbatusq; operis ordo, spem totius anni frustratur: neq; credas diem prætermisissum, sed annū periisse. Venandi, & aucupandi studiū fugiendū: iis enim studiis plurimæ operæ auocantur. Aliquæ sunt quoq; rusticorū sententiæ. Officia maximè iuuenū congruunt, imperia seniorū. Genera omnia surculorū, vel frugum præclara, sed terris tuis experta cōmitte: in nouo enim seminū genere, ante experimentū non est tota spes ponenda. Locis humidis citius, quàm siccis semina degenerant. In agro periclitantur interiora, nisi colantur extrema. Necessitas feris caret. Benè agrū colere necessariū est, optimè verò damnosum. Nequā esse agricolā quisquis emeret, quod ei præstare fundus posset. Malum esse patrem familias quisquis interdū domi faceret, quod noctu posset, nisi tantum in cœli tempestate: peiorem quoq; quod profectis diebus ageret, quod feriatis deberet: pessimum verò quod sereno die potius operaretur sub domi tecto, quàm in agro. Sermonis, vel etiam per locum omnis à cuncta fami-

lia absit turpitudine: corrumpunt siquidem bonos mores colloquia mala. Absit mendacium, nam qui mentitur vult fallere: & qui studio fallendi inuigilat, is proditor.

Qualis villica esse debeat. CAP. IX.

NE villicus noster sine iucundissima societate in villa moretur, ut si quidem necesse foret foris rusticari, operibus præesse, vel alio genere negotiari, aliam domum relinquat, ut quæ foris peracta, & congesta essent, intus custodiantur, & cætera conficere opera possit; ideo ei villicam cõstituemus. Necesse enim est, ut alteruter foris sit, qui labore, & industria res cõparet, intus verò, qui sub tecto recondat, ut si fructus, vel reliqua utensilia, quibus hominũ genus excolitur aliturq; congerantur, habeatur, quum necesse fuerit, qui promoveat: iure igitur nostro villico domesticam hanc sociam adiungemus. Itaque virum, cui frigora, & calores, & alia rusticationis opera erant perpetianda, & victus in aperto quærendus, & iniuria propulsanda, quàm mulierem Deus fecit audaciorem, & fortiorem. Mulieri deinceps, quòd his omnibus fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit, iccirco timidiorem reddidit, quàm virum: nam metus plurimum confert ad diligentiam custodiendi, voluitq; alterum alterius indigere, quoniam quod alteri deest, præsto plerumq; est alteri. Hæc Xenophon, à quo Cicero, & Columella. Sit ergo inter eos summa reuerentia, cum concordia, & diligentia mista. Flagret mulier diligentia æmulatione viri, negotia sua curã, maiora, & meliora reddere. Nil sit in domo diuiduum, nihil quod maritus, aut femina proprium dicat, sed commune. Villica igitur iuuenis esse debet: non nimium puella propter easdem causas, quales de villici ætate diximus. Integra quoque valetudinis, nec fædi, nec pulcherrimi habitus: fæditas fastidiosum, nimia species desidiosum facit eius contubernalem: illa vagum villicum, & auersum suo contubernio, hæc intra tectum desidem, & complexibus adiacentem. Sit à vino, ab escis, superstitione, somno & à viris remotissima. Meminisse debet quid faciendum, & quid in posterum prospiciendum. Eundem tãdem morem seruet, quem villico præcepimus. Prima eius cura sit familiam pascere. Interrogatus Cato quid in re familiari primum foret? respondit familiam pascere. quid secundum? bene pascere. quid tertium? vestire. Sit ergo primum familiæ mensa necessaria, minimè sumptuosa, minimè luxuriosa, luxus inertiam gignit: nequid tamen siti, famiq; explendæ desit, ut frugalitas ubique custodiat, ebrietas, & crapula deuiteretur. Assuescat non in alto plumarum sinu sepeliri, sed aut in stramento, aut in centonibus, ita vegetior ad cuncta munia obeunda exurget. Mollities omnis arcenda, labori inuigilandũ est. Tunicas lineas, siue subuculas plures habeant singuli, permutandi causa, ne dum sordescunt, triste suggerant ministerium. Deinde laborer, ut quam minimam operã villicus intra tectum impendat, cui & primo mane cum familia prodeundum est, & crepusculo peractis

quia mala. Absit
endi inuigilat, is

pretur, vt si qui-
lio genere nego-
ellent, intus cu-
stituemus. Ne-
es cōparet, intus
a, quibus homi- 10
ecelle fuerit, qui
adiungemus. Ita-
erāt perpetiēda,
n mulierem Deus
omnibus se cerat
idiorē reddidit,
custodiēdi, vo-
pra sto pleturq;
it ergo inter eos
et mulier diligen- 20
reddere. Nil ut in
dicar, sed com-
propter eadē
tudinis, nec fedi-
desidiosiū facit
contubernio, hac
no, ab elcis, super-
pid faciendū, &
seruet, quem villi-
pgatus Cato quid 30
id secundū be-
menſa neceſſaria,
nit: nequid tamen
ebrietas, & cra-
liri, sed aut in ſtra-
obeynda exurget.
meas, ſue ſubcu-
it, triſte ſuggerant
licus intra tectū
eſt, & crepuſculo 40
peractis

peractis operibus fatigato redeundum. Ceterum munia, quę domi capeſſen-
da, non in totum muliebri officio relinquenda ſunt, ſed ita deleganda ei, vt
identidem oculis villici cuſtodiātur: perſuaſum habere debet, aut in totum,
aut certē plurimū domi ſe morari debere. Xenophon apum exemplum an-
te oculos ponit, quarum dux haud abſimile huiusmodi officio (inquit apud
illum Iſchomachus vxori) quod nos ſubituri ſumus, exequi videtur. Ille qui-
dem in otio eſſe apes non ſinit, ſed quas oportet ad opus extrā mittit, impor-
tataq; ab eis, excipit, ac ſeruat, donec tempus vſus veniat, quę æquē omnibus
diuidit, intus fauis incubantibus præſidet, vt celeriter conficiantur. Ita ipſam
20 facere neceſſe eſt: ſi quid in agro faciendū, foras ſeruos emittere, ſi quid in
villa, intra parietes continere, atque animaduertere, ne diuturna ceſſatione
frustrentur opera. Quę domum inferuntur, diligenter inſpicere ne delibata
ſint, & ita explorata, atque inuiolata recipere: tum ſeparare, quę conſumen-
da ſunt, & quę ſuperſieri poſſunt cuſtodire, ne ſumptus annuus, menſtruuſ
ſiat. Quę inferuntur idoneis locis recondat, vt ſine noxa permaneant, curan-
dūq; vbi quidq; reponatur, vt quū opus ſit, promatur. Vetus eſt prouer-
bium, pauperiem certiffimam eſſe, quū alicuius indigeas, vt eo non poſſe,
quia ignoretur, vbi proiectū iaceat, quod deſideratur. Itaque in re familiari
laborioſior eſt negligentia, quā diligentia. Excelliffimum igitur conclaue
20 pretioſa vaſa, & veſtes habeat: quod deniq; horreū ſiccū atq; aridū, frumen-
tis habetur idoneū, quod frigidū, optimē vinū cuſtodit, quod benē illuſtre,
fragile ſupelleſtile, & ea poſtulat opera quę multi luminis indigent. Hęc poſt-
quā ſecreuiſmus, & ſuo quęq; loco repoſuiſmus, villicę curę relegamus, vt quod-
cūq; opus ſit, ſciat vnde det, & meminerit, quid & quando, & cui dederit, &
quū receperat, vt quicquid ſuo loco reponat. Præterea nō minor cura eſſe de-
bet, ne ſupellex, veſtis ve condita ſitu dilabatur, aut fruges aliæ ve uſenſilia, ſua
deſidia, corrumpantur. Illud perpetuò obſeruandū, vt eos, qui foris ruſticari
debeunt, quū iam familia è villa proceſſerit, requirat ſi quis contubernalis
intra tectū tergiuerſans feſellerit, ſciſcitetur deſidiæ cauſam, an aduerſa vale-
30 tudine reſtiterit, & ſi compererit ſimulantem languorem, ſine cunctatione
in valetudinarium deducat: præſtat enim opere deſatigatum ſub cuſtodiam
requieſcere vnum, aut alterum diem, quā preſſum nimio languore veram
noxam concipere. Deniq; non ſedentaria eius opera eſt, ſed modo ad telam,
modo ad eos, qui cibum familiæ conficiunt, inuiſere, tum bubilia, & præſepia
mundanda curare. Valetudinaria ſi vacent ab imbecillis, aperire, & immun-
ditiis liberare, vt quū res exegerit, benē ordinata & ſalubria languentibus
præbeantur. Nec minus intereſſe paſtoribus in ſtabulis fructum cogentibus,
aut fœtus ouium, aliarū ve pecudum ſubrumantibus; & tonſuris vellerum
intereſſe, & lanas diligenter percipere, vellera ad numerum pecoris recenſere:
40 tum in ſiſtere atrienſibus vt ferramenta deterſa nitidentur, atque rubigine li-
berentur, & ſi reſectionem deſiderant, fabris concinnanda tradantur. Præ-

terea ea cōficere addiscat, quæ variis temporibus vsu veniunt, ad famulis quotidie ad cibum necessaria suppeditandum. Videlicet vt ex vino vapido acetum fiat: Muria quomodo dura fiat. Circa vernum æquinotium herbas has condant, & reponant, cymam, caulem, capparim, apij coliculos, rutam, olus atrum, ferulas, pastinacæ agrestis flores, & satiuæ, asparagos, ruscum, nepitum, lapsanam, & feniculum. Æstate circa messem cœpas, corna, pruna, pyra, mala acetato, vel melle feruet. Laferem, appropinquante vindemia, condiant, portulacam, olus atrum, desiccet in Sole mala, pyra, ficus, uuas; non minima enim horum pars in rusticorum cibum assumitur. Debet & vasa vindemiæ præparare, vt decemmodias, trimodias, fiscellas texendas & picandas dare: nec minus falculas, & vngues ferreos quamplurimos parandos, exacuendosque, & similia vsui necessaria. Multas vini condituras, sapam & defrutum coquere. Remedia ad acescens vinum conficere. Condere cydonia, uuas ollares, mala granata, & reliqua mala, multaque; olearum genera, eaque; præparare, quæ ad oleum conficiendum necessaria: ante vindemiam, vt lignorum copiam, scalas, corbularum, modias, decemmodias, & similia præparet.

Villa operarios quales esse oporteat. C A P. X.

NVNC villicum nostrum edocebimus, qualis corporatura, & doctrinæ villæ operarij esse debeant, vt commodè iis in operibus uti possit. Non igitur eligendi serui sunt ex vrbe, vel qui delicatas artes exercuerint, socors quidem, & somnulosum id genus hominum est, ocio, alex, popinæ, & lupanariis assuetum: nam iisdem ineptiis alios corrumpunt. Eligendi sunt ab infantia durati, & si tales obtineri non potuerint, præficiantur, qui laboriosam seruitutem tolerauerint, & primam iuuetæ ætatem transcendierint. Varro: Agri coluntur hominibus seruis, aut liberis, aut vtrisque. Grauius loca villicus noster mercenariis potius, quam seruis colere iubeat, & in salubribus quoque locis opera rustica maiora. Operarios parandos esse, qui laborem ferre possint, nec minores annorum viginti duorum; & ad agriculturam dociles. Mancipia esse oportet neque formidolosa, neque animosa, vt ex Cassio transfert. Bubulco satis est vocis, & corporis proceritas, hæ res metuendū pecoribus efficiunt: sed temperet vires clementia, quoniā terribilior esse debet, quam sauior, vt & obsequantur eius imperio, & diutius perennent boues non confecti vexatione simul operū, verberumque. Quamuis necessaria, non tamen satis est indoles mētis. Longissimum aratorem faciemus, quod in re rustica nullo minus opere fatigatur prolixior, quia in arando stiuæ penè rectus innititur. mediastinus qualiscumque; status potest esse, dummodo perpetiendi labori sit idoneus. Cassianus rationē addit Columellæ præceptis. Longum corpus fortiter incumbit stiuæ, totūque; vomerem degrauiat, ne in superficie sulcus ducatur, sed & plagæ ex alto delatæ magis cōtriungunt ipsos boues; nam si parui existant, boues præcedentes eos occultant, nec possunt ea, quæ ante boues ipsos sunt, contueri. Caprarios leues, & cele-

res esse

res esse oportet, vt caprarū velocitatem assequi possint. Vineæ non sic altos, quemadmodū latos, & lacertosos vinitores exigunt: nam hic habitus fossuris, & putationibus, cæterisq; earum culturis magis aptus. Minus in hoc officio quàm in cæteris agricolatio frugalitatem requirit, quia & in turba, & sub monitore vinitor opus facere debet. Puerilem ætatē ad agriculturā aptitudinem maximā habere dicunt, etsi vnaquæq; ætas idonea sit: nam pueri per ætatem enutrientur ad operas, & subseruientes, & ad singula quæ fiunt, diligenter animū aduertentes, facileq; flectere se potentes ad gramen euellendum, & folia decerpenda, ac frondes, & naturā terræ experientia, operaq; & industria ex senioribus addiscentes. Magistros pecoribus oportet ponere sedulos, & frugalissimos: ea res vtraque plusquam corporis statura, roburq; confert huic negotio, quoniam id ministerium custodiæ diligentis, & artis officium est. Iubet Columella operarios in classes diuidendos, & non maiores quàm denuum hominum faciendas, quas decurias appellauerunt antiqui, & maximè probauerunt, quòd is numeri modus in opere cōmodissimè custodiretur, nec præeuntis monitoris diligentia multitudo cōfunderet. Itaq; si latior est ager, in regiones deducendæ sunt & classēs, diuidendūq; ita opus, vt neq; singuli, binive sint, quoniā dispersi non facile custodiuntur. Neq; tamē supra decē, ne rursus ubi nimia sit turba id opus ad se pertinere singuli nō existiment. Hęc ordinatio nō solum cōcitāt æmulationē, sed & deprehendit ignauos. Sed qualis opportunus numerus operariorū in villa foret, Cato declarare laborauit, ad duas metas rationē dirigens, ad certū modum agri, & genus sationis, exemplūq; in oliueto & vinea tradidit. Oliuetū agri ducentorum quadraginta iugerū, habere oportet villicum, villicā, operarios quinq; bubulcos tres, subulcū vnum, asinarium vnū, opilionem vnum, summa hominum tredecim. Alteram formulam describit de vinearū iugeribus centū, vt dicat haberi oportere hæc, villicū, villicam, operarios decem, bubulcum vnum, asinarium vnū, subulcū vnum. Sed Varro Sæternæ opinione scribit, satis esse ad iugera octo hominē vnum, & debere eū fodere diebus quadragintaquinque, tametsi quaternis operis singula iugera possit, sed relinquere se operas tredecim valetudini, tēpestati, inertie, indulgētiæ. Sed Licinius satis, ait, dilucidè horū neuter modulos relinquit. Quod si Cato proportionē vti voluit, ad maiore fundum, & minore adderemus, & demeremus. Præterea extra familiā debuit dicere villicum, villicā, neq; enim si minus cccx l iugera oliueti colas, nō possis minus vno villico habere, nec si bis tanto ampliore fundum, aut eo plus colas, ideo duo villici, aut tres habendi fuere. Operarij modo, & bubulci proportionē demendi, vel addendi ad minores, maioresve modos fundorum. Hi quoq; si similis ager est: sin est ita dissimilis, vt totus arari nō possit, vt si sit cōfragosus, aut aridus cliuius, minus multi opus sunt boues, & bubulci. Vnde ex his, alijsve rationibus Catonis rationi non assentitur, sed potius Sæternæ, qui ait singula iugera quaternis operis vno operario ad cōficiendum satis esse. Sed si hoc in Gallia satis fuit, non continuo

idem in agro Ligustico montano. Itaq; de familiæ magnitudine, & de reliquo instrumento tria vult animaduertenda. In vicinitate prædii cuiusmodi sint, & quanta, & quot quæq; hominibus colantur, & quod additis operis, aut demptis, melius, aut deterius habeas cultum.

De cæli electione pro villa comparanda. CAP. XI.

PRÆCEPTA cæli electionis agri prosequemur. Primum est Catonis oraculo sancitum. Prædium quum comparare cogitabis, sic in animum habeto, uti ne cupidè emas, nève opera tua parcas visere, & ne satis habeas semel circumire. Quoties ibis, toties magis placebit quod bonum erit. Vicini quo pacto niteant id animum aduertito: in bona regione benè nitere oportebit. Circumspicias uti bonum cælum habeat, ne calamitosum fiet. Vtilissimus, inquit Varro, is ager, qui salubrior est, quàm alij, quòd ibi fructus certus, contraq; in pestilenti, calamitas, quamuis in feraci agro, ad fructus colonum peruenire non patitur. Etenim ubi ratio cum Orco habetur, ibi non modo fructus est incertus, sed etiam colentium vita. Quare si salubritas non est, cultura non aliud est, quàm alea domini vitæ, ac rei familiaris. Duoq; in primis spectasse videntur Italici homines, colendo possent ne fructus pro impensa, ac labore reddere, & vtrum saluber locus esset, an non: quorum si alterutrum decollat, & nihilominus quis vult colere, mente est captus, atq; adagnatos, & gentiles est deducendus. Nemo enim sanus mente, debet velle impensam actumptum facere in culturam, si videt non posse refici; nec si potest reficere fructus, si videt eos fore, ut pestilentia dispereant. Columella eadem, quæ hi, habet. Palladius modum demonstrat aërē cognoscendi. Quatuor rebus agriculturam constare scribens, aërē, terra, aqua, & industria. Ex his tria naturalia, vnum facultatis, & voluntatis. Naturæ est quod in primis spectare oportet, ut eis locis, quæ colere destinabis, aër sit salutaris, & clemens. Et aëris salubritatem declarant loca ab infimis vallibus libera, & nebularum noctibus absoluta, & habitatorum considerata corpuscula, si eis color sanus, capitis firma sinceritas, inoffensum lumen oculorum, purus auditus, & si fauces commeatum liquidæ vocis exercent. Hoc genere benignitas aëris approbatur, his autem contraria noxium cæli illius spiritum confitentur. Didymus. Loci marini, ut plurimum salubriores sunt, & montani, & accliuēs, ad Boream vergentes: qui verò prope paludes, & stagna, aut locis concavis, aut ad Austrum ventum, aut ad Occidentem inclinati, sunt morbosī. Vitruuius. Saluberrimus locus erit excelsus, non nebulosus, nō pruinofus, regiones cæli spectans neq; æstuosas, neq; frigidās, sed tēperatas. Euitetur palustris vicinitas: nam quum auræ matutinæ cum Sole oriente ad locum peruenierint, & iis ortę nebulæ adiungentur, spiritusq; bestiarum palustrium venenosos cum nebula mistos in habitatorum corpora flatus spargent, efficient locum pestilentem. Locus si secundum mare erit, spectabitq; ad Meridiem, aut Occidentem, non erit saluber,

luber, quia per æstatem cœlum meridianum Sole ex oriente calescit, meridie ardet. Qui spectat ad Occidentem, Sole exorto tepescit, meridie calet, vespere feruet. Plinius contraria his habet, inquiens: Attilius Regulus ille, Punico bello bis consul, aiebat, neque sæcundissimis locis insalubrem agrum parandum, neque effœtis saluberrimum. Salubritas loci non semper incolarum colore detegitur, quoniam assueti etiam in pestilentibus durant. Præterea sunt quædam partibus anni salubria, nihil tamen salutare est, nisi quod toto anno salubre. Sed tot variae de aëris salubritate sententiæ ne legentium animos in ambiguum remorentur, ita cōciliare tentabimus. Est nobis profectò, ut vil-
 10 lam in salubri aëre habeamus, vehementer elaborandum: quum viderimus maiores nostros, ne cœlum graue habituri essent, & incommodum, prudenti quidem & maxime salutari consilio, & omni penitus diligentia præcauisse: nam terram, & aquam si quid habeant in se vitij, corrigi posse docebimus: cœ-
 lum verò nulla ingenij ope, humanave industria quit flecti: & spiritus, quo ipso vno maxime vitam trahimus, & seruamus, purissimus sit oportet, ut sani
 semper viuamus. Neque est quem fugiat in nostris corporibus maximam vim habere. Acutiori ingenio præstare homines videmus, qui cœlo fruuntur pu-
 riori, quàm qui crasso, vdoque. Aëris est saluberrimus, qui purgatissimus, &
 quàm purissimus est, visus acie liberrimè peruius, pellucidus, leuissimus, coæ-
 20 quabilis, & minimè varius. Sic pestiferum illum dicimus, qui nugarum, aut vaporum spissitudine concretus, & fœtulentus, ut quasi quoddam graue hæ-
 reat superciliis, atque aciem premat. Et si alias ob causas maximè solibus, & ven-
 tis ita redditur. Aërem, qui vehementissimè effervescit, grauem, crassumque
 arguunt; argumento Solis radios acius agere si densum offendant, quàm ra-
 rum. Egyptij perpetuo, & quasi constanti aëris tenore præ cæteris à Deo do-
 nati sunt, & præsertim qui ad Libyam vergunt, quod ibi nunquam auræ va-
 riantur, & integerrima valetudine sunt, ut scribit Herodotus. Romæ aër ca-
 lescit, frigescitque; illico, ob id insaluber. Venti ex ipsa locorum facie, aërem at-
 tenuant, incrassantque. Auræ præstantiores, quàm venti, & venti mediocres,
 30 quàm immodici, & violenti. Sed hi minus molesti, quàm immobilis aër: nam immobilis, ut aqua putrescit. Aër motu hilarescit: nam surgentes è terra va-
 pores, aut dissipat, aut motu incalescendo concoquit. Commodi venti sunt, qui obiectis motibus fracti, vel syluis, vel longa commigratione lassi, sed non
 per infecta loca pertranseunt, ne malum ad nos deferant. Idcirco vitanda vi-
 cinia, ex qua noxium quid effluat, veluti teter odor barathri, cloacæ, vapor
 palustrium, fœdarumque aquarum: nam aqua nulla fœdior, quàm quæ nullo
 motu contabescit. Vitandus aërex fluitis ortus, qui imbribus excrecent:
 nam aërem frigidum, & crassum ducunt. Plinius Theophrastum, & Hippo-
 cratem sequutus, Aquilonem ait, ad restituendam, seruandamque salutē com-
 40 modum, Austrum hominū, pecudumque generi infestissimum. Ciconia nun-
 quam se Austris committit. Delphini per Aquilonem voces audiunt, Austro

tardiùs, & non nisi ex aduerso redditas. Spirante Aquilone, anguillam ternos dies sine aquis durare, Austro non item. Auster pituitosos reddit, Corus tussim affert. Meridianū mare improbat, quod duos pati soles videatur, vnum cœlo, alterū ab aquis inurentem. Maximam illic fieri aëris varietatem, Sole cadente, vbi frigentes vmbra noctis adueniunt. Matutinæ auræ improbantur, quod crudos surgentes vapores adferant. Homerus verissimè omnino antelucanas è flumine auras insalubres tradidit. Nulloloco indecentius villa erit, quàm quæ intra vallem abdita sit: nam omni prospectus amœnitate intercepta, sine vlla dignitate delitescit: nam & imbrium ruinis obruitur, & circumfluentibus aquis infunditur, & modico imbibito humore, continuo madescit, & vaporem valetudini noxium semper effumat. Ingenia hebetaris spiritibus non valebunt, nec corpora durabunt. Si ingreditur Sol, reciprocatis vndique radiis torrebuntur, si nō illustrantur Sole, torpescunt, & recrudescunt. Adde, si ventus in ea penetrat, quasi canalibus coactus, molestius quàm patet est furit: si non ingreditur, concretus illic aër putrescit. Conuallem istam non indecenter aëris lacunam, stagnūve vocare possumus. Itaque locus vbi aër amœnus sit, neque humilis, & quasi immersus, neque celsus, & supereminens, sed mediis collibus, optimus vocabitur: in eo enim latissimus aër assidue spiritum mouebitur. Arbores in vnam partem inclinatæ, aut refractæ, infestis ventorum motibus celsisse ostendunt. Saxa locis innata si sum motenus putria fuerint, aëris intemperie nunc ardescens, nunc torpentis ostentant. Vitanda igitur loca, in quibus vehementes eiusmodi tempestates grassantur: nam hominum corpora caloris, aut acri vi frigoris si vexantur, tota coagmentatio labefactatur, adq; morbos, & immaturam senectutem compellitur. Crasso aëre non famescis, sicco sities.

Quomodo cœli vitia emendari possint.

C A P. XII.

SED Columella dicit. Quàm sapientis sit patrisfamilias non vbique emere, aut vbertatis illecebris, aut deliciarum concinnitate: sic verè industrij est, quicquid aut emerit, aut acceperit facere vtile, & fructuosum, quoniā & grauioris cœli multa remedia priores tradiderūt, quibus pestifera lues mitigetur. **Varro.** Salubritas, quæ ducitur è cœlo, non est in nostra potestate, sed in Naturæ, vt tamen multum sit in nobis, quòd grauiora, quæ sunt, ea diligentia leuiora facere possumus; etenim si propter terram, aut aquam, odoremve, quem aliquo loco eructat, pestilentior est fundus, aut propter cœli regionem ager calidior sit, aut ventus nō bonus flet, hæc vitia domini scientia emendari possunt, ac sumptu, quod permagni interest vbi sint positæ villæ, quo spectent, porticibus, ostiis, ac fenestris. An non ille Hippocrates Medicus in magna pestilentia, non vnum agrum, sed multa oppida, scientia seruauit? sed quid necessum est illum vocari ad testimoniū? quum Varro ipse, quum Corcyra esset exerci-

exercitus, acc
misso nonis f
ta, cætera q
duxit? Si aër
uio petemus.
Fossis enim d
paludes redu
tiur bestiaru
tando proxim
10 de terræ infoc

DIXIM
quæ d
emendare,
runt peruer
de eius elec
agrorum ger
mis alia cultu
collinis, quò
ibi magis est
Veluio, qu
gis laborant,
tutius eadem
cognuntur. N
Propter hæc
getes melio
Campester
is, qui est ad
solet vligino
30 lacunas aqu
montis fiet
sticarum re
Campū no
clementer
morosum
formā, ait
collibus, v
cultis, atq
tis absolut
40 que prarup

exercitus, ac classis, & omnes domus repletae essent ægrotis, ac funeribus, immisso nouis fenestris Aquilone, & obstructis pestilentibus, ianuæq; permutata, cæteraq; eius generis diligentia, suos comites, ac familiam incolumes reduxit? Si aer pestifer ex vicinia palustrium locorum erit, remedium à Vitruuio petemus. Si paludes excelsiores fuerint mari, hac ratione emendabimus. Fossis enim ductis, fit aquæ exitus ad litus, & ex mari tempestatibus aucto, in paludes redundantia motionibus concitatur, amarisq; mixtionibus non patitur bestiarum palustrium genera ibi nasci, quæque de superioribus locis narranto proximè litus perueniunt, in consuetam salitudine necantur. Sic etiam
 10 de terræ infœcunditate considerare debemus.

De situ villæ eligendo. CAP. XIII.

DIXIMVS de cælo, subiungemus de situ non minus necessaria, quàm quæ de cælo dicta sunt. Potest enim optimus situs cæli malignitatem emendare, & bonitas à situ rependi potest: contra qui situ abutuntur, poterunt peruertendo damnosum reddere: ideoque non segniter maiores nostri de eius electione non prætereundas admonitiones reliquerunt. Varro tria agrorum genera tradidit, campestre, collinum, & montanum, è quibus infimis alia cultura aptior, quàm summis, quòd hæc calidiora, quàm summa; sic collinis, quòd ea tepidiora, quàm infima, aut summa. Itaque vbi lati campi,
 20 ibi magis æstus, & eò in Apulia loca calidiora, & grauiora. Et vbi montana, vt in Vesuuio, quòd leuiora, & ideo salubriora. Qui colunt deorsum, æstate magis laborant, qui sursum, magis hyeme: verno tempore in campestribus maturius eadem illa feruntur, quàm in superioribus, & celerius hic, quàm illic coguntur. Nec non sursum, quàm deorsum tardius feruntur, ac metuntur. Propter hæc tria fastigia formæ, discrimina quædam sunt sationum, quòd segetes meliores esse existimantur campestres, vineæ collinæ, syluæ montanæ. Campester locus is melior, qui totus æquabiliter in vnam partem vergit, quàm is, qui est ad libellam æquus, quòd is quàm aqua non habent delapsum, fieri solet vliginosus, eò magis si quis est in æquabilis, eò deterior, quòd fit propter
 30 lacunas aquosus. Igitur optimum villæ situm describit Cato, qui sub radice montis fiet, & in Meridiè spectet. Columella item referente, Peritissimi rusticarum rerum tria genera terreni esse dixerunt, campestre, collinū & montanum. Campū non a quissima sitū planitiæ, nec perlibrata, sed exiguè prona, collem clementer, & molliter exurgente, montē non sublimem, & asperū, sed nemorosum, & herbidum maxime probauerunt. Mox perfectā describens villæ formā, ait. Agrum habeas salubri cælo, vberi gleba, parte campestri, parte aliâ collibus, vel ad Orientem, vel ad Meridiem molliter deuenis, terrenisq; aliis cultis, atque aliis syluestribus, & asperis. Palladius verò omnia colligens satis absolute eum describit. Situs verò terrarum, neq; planus, vt stagnet, neque præruptus, vt defluat, neque obrutus, vt in imum deiecta valle subsidat,
 40

neque arduus, ut tempestates immodicè sentiat, & calores. Sed ex his omnibus utilis semper est æquata mediocritas, & vel campus apertior, & humorem pluuium cliuo fallente subducens, vel collis molliter per latera inclinata deductus, vel vallis cum quadam moderatione, & aëris laxitate submissa, vel mons alterius culminis defensus obiectu, & à molestioribus ventis aliquo liber auxilio, vel sublimis, asper, sed nemorosus, & herbidus. Didymus: ad sanitatem & speculationem, & regionis collustrationem locus aptissimus existit in altioribus locis ædificatus. Sed situs si eligendus, sit in frigidis prouinciis Orienti, aut meridiano lateri oppositus, ne alicuius magni montis obiectu, his duabus partibus exclusis, algore rigescat, aut per partem Septentrionis remoto, aut per Occidentem in vesperam Sole dilato. In calidis verò prouinciis pars potius septentrionis optanda est, quæ & utilitati, & voluptati, & salutis æqua bonitate respondeat. Plinius eadem. Spectare in æstuosis locis septentrionem debet, Meridiem in frigidis, in temperatis exortum æquinoctialem.

De villa solo idoneo eligendo. CAP. XIII.

AGRICULTURÆ omnes optimi præceptores iubent non minorem curam in soli electione, quam in cœli esse impendendam. Ob id ad eius bonitatem inuestigandam quamplurima signa docuerunt. Nos omnium sententias ad trutinam expendemus. Et si quibuscunque huius villæ partibus, utpote vinea, segete, pomario, horto, & reliquis peculiare solum descripsimus, lubet hic de vniuerso villæ solo verba facere, quum plurimum inter sit, quo solo, quam arborem seueris: neque omnes arbores omni terra gaudent, sed vnaquæque suam peculiarem exposcit, quam si adipiscantur, multo longiores radices feliciter depromunt, alius habebunt, uberioremque fructum largientur. Arbor enim eo fecundior, quo terram propriorem nacta fuerit. Inter tot terrarum genera aliquod est, quod hæc arbor felicitat, & magis amet, & hæc alio potius delectatur, & est aliud, quo plures gestiant. Xenophon multò facilius terræ ingenium, quam hominis, vel equi experiri posse dicit: nam in promptu esse, facilemque se ad cognoscendum omnibus præbere. Signa sunt à sapore, odore, colore, pondere, ab ea nascentibus, aliisque signis, quæ recensemus. A gustu incipiemus. Virgilius in Georgicis.

*Salsa autem tellus, & quæ perhibetur amara,
Tale dabit specimen. Tu spisso vimine qualos,
Colla, prælorum fumosis deripe tectis.*

*Huc ager ille malus, dulcesque a fontibus undæ
Ad plenum calcentur, aqua eluctabitur omnis,
Scilicet & grandes ibunt per vimina gutta.*

*At sapor indicium faciet manifestus, & ora
Tristitia tentantum sensu torquetur amaror.*

Columella
ex ea parte ag
facta dulci
stu explorent
lem esse dicen
terra pingued

Ph
De
Se

10 Columella
lere destinam
re: nam pete
est, & quon
lentescit hab
in esse tali n
Cognoscitu
de quæ aliqu
Sed Plinius
narum altera
10 sapiunt. Hoc
optima, quæ
dorille, qui q
quo loco at
maduit imbr
cui compara
tusque nemin
ualibus casu
quibus terra
vel solum

30

Sed Co
40 ram, hoc n
care, quon

Columella ab eo excipiens ait. Sapore quoque terram sic cognoscemus. Si ex ea parte agri, quæ maximè displicebit, effossa glebæ, & in fictili vase madefactæ dulci aqua permisceantur, ac more faculenti vini diligenter colatæ gustu explorentur: nam qualem traditum ab eis retulerit humor saporem, talem esse dicemus eius soli. Idem Palladius, & Anatolius. Possumus & tactu terræ pinguedinem experiri, Virgilio docente.

Pinguis item quæ sit tellus, hoc denique pacto

Discimus: haud unquam manibus iactata fatiscit,

Sed picis in morem ad digitos lentescit habendo.

- 10 Columella hæc declarans. Itaq; considerandum erit, si solum, quod excolere destinamus, pingue sit, quod expedita satis nobis ratione contingit discere: nam perexigua conspergitur aqua gleba, manuq; subigitur, ac si glutinosa est, & quouis leuissimo tactu pressa inhærescit, & picis in morem ad digitos lentescit habendo, eademque illisa humo non dissipatur, ea res admonet nos, inesse tali materiæ naturalem succum, & pinguedinem. Eadem Palladius. Cognoscitur & ab odore. Anatolius ita nos admonet. Effodiunt in altum, indeque aliquid terræ extrahunt, & ab olfactu quidem meliorem experiuntur. Sed Plinius Ciceronis autoritate exactius docet. Certè Cicero lux doctrinarum altera, meliora, inquit, vnguenta sunt, quæ terram, quàm quæ crocum sapiunt. Hoc enim maluit dixisse, quàm redolent. Ita est profectò: illa erit optima, quæ vnguenta sapiet. Quod si admonendi sumus qualis sit terræ odor ille, qui quaritur, contingit etiam sæpè quiescente ea, sub occasu Solis, in quo loco arcus cœlestis deiecerit capita sua; & quum à siccitate continua immaduit imbre, tunc emittit illum suum halitum diuinum è Sole conceptum, cui comparari suauitas nulla possit. Is esse odorin commota debebit, repletusq; neminem faller, ac de terra odor optimè iudicabit. Talis ferè est in noualibus cæsa vetere sylua, quæ consensu laudatur. Nec desunt alij odores, ex quibus terræ bonitatem experiri quis possit. Sed vt sciamus quale densum, vel solum solum fuerit, Virgilium audiamus.

30 *Nunc quo quamque modo possis cognoscere dicam,*

Rara sit, an supra morem si densare quiras.

Antè locum capies oculis, alièq; iubebis

In solido puteum demitti, omnemq; repones

Rursus humum, & pedibus summas aquabis arenas:

Si deerunt, rarum. Sin in sua posse negabunt

Ire loca, & scrobibus superabit terra repletis,

Spissus ager, glebas cunctantes, crassaq; terga

Expecta, & validis terram proscinde iuuentis.

- 40 Sed Columella hoc experimentum ponit ad dignoscendam pinguem terram, hoc modo. Sed & si velis scrobibus egestam humum recondere, & recalcare, quum aliquo quasi fermento abundauerit, certum erit eam esse pinguem;

quum defuerit, exilem; quū aquauerit, mediocrem. Palladius eadem iisdem refert verbis. Diophanes verò: Scrobem fodiunt, & bonam terræ partem extrahentes, postea rursus terram in foueam iniiciunt, & si quidem iniecta terra foueam expleuerit, aut redundauerit, optimam terram iudicant; si verò iniecta terra fouea non expletur, non bonam esse terram pronunciant. Idemque Poëta docet pondere posse leuem, & grauem experiri.

Que gravis est, ipso tacitam se pondere prodit,

Queq; leuis.

Sed optimā terræ qualitatem ex signis cognoscere docet doctissimus Theophrastus, princeps agricolarum, qui naturā arborum, & terrarum considerans, omnia ad mediocritatem reduxit, ut omnibus aliquo modo conueniret; atq; hoc modo decernit. Solum quod mediam continet confusionem contrariorum, id est, soluti & spissi, sicci & humidi, leuis & ponderosi, & quā ima summis conueniant modice, hoc omnium optimè consulit omnibus ferè arboribus, atq; frugibus: id enim proprius quodammodo aëris habitui, quàm cætera conuenire videtur. Cæterum inter hæc ipsa, quod ad alterā partem declinat, in proxima commendatione est, ut quod solutum, leue, atq; humectū est. id enim alimentum in se continet, hiat, ut radicibus facilem comestum suppeditet, ut se facile prolatare possint: sunt enim radices penora & promi. Spissum, ponderosum, ac sitiens contrarium præstat. Hoc idem illi sentiunt, qui solum nigrū commendant, ut Leophanes. Causam enim illic reddere tentat, quod genus id excipulū vtriusq; facile esse potest, imbriū & squalloris, utpote quod capax tam estus, quàm humoris nimium sit. Beritius ab eo. Optimum solū nigræ terræ est, & ab omnibus præ illis laudatū: nam & imbrem fert, & siccitatem. Consequens est terra fulua, quæ & flumine rigatur, limosa & vliginosa appellata, item dulcis & calida: hæc enim ad vites, & ad arbores, & ad sata aptitudinē habere cognitæ sunt. Sed & profunda terra laudatur, maximè si friabilis sit, & tractabilis, operiq; non repugnans, ad solam tamen arborum fertilitatem apta existit. Quia & rubra ad reliqua optima est, ad arbores tamen producendas ineptè habet. Palladius ex his eligendam terram his verbis docet. Sit gleba putris, & ferè nigra, & ad tegedum se graminis sui crate sufficiens, aut misti coloris, quæ et si rara sit, tamen pinguis soli adiunctione glutinetur. Quæ protulerit, nec scabra sint, nec retorrida, nec succi naturalis egentia ferat. Color namque non magnopere querendus est, sed pinguedo, atq; dulcedo. Tandem eligendus est pinguis, & resolutus ager, qui minimum laborē poscit, & fructum maximum reddit. Secundi meriti est spissus, qui labore quidem maximo, tamen ad vota responderet. Sed pulla terra maximè à Catone laudatur. De qua sic Plinius. Terra tenera quæ vocatur pulla, erit optima, & operisatior. Intelligere modò libeat dictam mira significatione teneram, & quicquid optari debet, in eo vocabulo inuenitur. Illa temperatæ vbertatis, illa mollis, facilisque cultura, nec madida, nec sitiens, illa post vomerem nitescens, qualem fons ingeniorū Ho-

merus

merus in armis
uis fieret in au
comitantes, co

Ni

Et

Aspectu fieri
dèrumpitur, r
verum omnen
tempore dorfi
10 retiri iudici
runt, iudè ocu
stres ex ipsa n
verò spinas
& non multi

Varro ex
aut ex iis, qua
10 fodiatur facil
his autem, qu
earum rerum
Cornelium C
tem virum, si
iam campi sa
lores. Nullu
eundem vel
tem aut in so
rum gignip
30 ut pluribus a
thor testis e
nitatem pra
tibus, aut qu
Albentium
anteponu
lum albu
terra perni
Non vitiq;
boribus. C
40 Nec luxur
Germania

merus in armis à Deo cœlatam dixit, addiditq; miraculum nigrescentis, quamuis fieret in auro: illam, quam recentem exquirunt improba alites, vomerem comitantes, coruiq; aratoris vestigia ipsa rodentes. Virgilius ita cecinit.

Nigra ferè, & presso pinguis sub vomere terra,

Et cui putre solum. (nanque hoc imitatur arando.)

Aspectu fieri posse probationem Anatolius refert. Si in squallore non valdè rumpitur, neq; si imbres vberes, impetuosiq; deciderint, & cœnosa fiat, verum omnem pluuiarum aquam in suum sinum excipiat, & si non frigoris tempore dorsum ipsius testaceum appareat. Hec enim, vt plurimum, bona poterit iudicari. Pulcherrimum & alium modum probationis veteres inueniunt, itidè oculis subiacentem. Si nanq; magnæ & syluosa sunt arbores syluestres ex ipsa nascentes, absolutissima pronunciari potest, si mediocres media, si verò spinas & sarmœta tenuia producat, & herbam breuem, imbecilla hæc est, & non multi pretij. Virgilius ex aspectu humidam cognoscere docet.

Humida maiores herbas alit, ipsaq; iusto

Lator: ab nimium ne sit mihi fertilis illa,

Nec se præuulidam primis ostendat aristis.

Varro ex Diophanis Bithynij autoritate dicit signa sumi posse aut ex ipsa, aut ex iis, quæ nascuntur ex ea: ex ipsa, si sit terra alba, si nigra, si leuis, quæ quum fodiat, facile frietur, naturaq; non sit cineritia, nè ue vehementer densa. Ex his autem, quæ enata sunt fera, si sunt prolixa, atq; ea, quæ ex his nasci debent earum rerum feracia. Columella satis admirari non potest cum alios, tum Cornelium Celsum non solum agricolationis, sed vniuersæ naturæ prudentem virum, sic & sententia, & visu deerrasse, vt oculis eius tot paludes, tot etiam campi salinarum non occurrerent, quibus ferè cōtribuuntur prædicti colores. Nullum videmus locum, qui modò pigrum contineat humorem, non eundem vel nigri, vel cinerei coloris, nisi in eo fortè fallor ipse, quod non putem aut in solo limosæ paludis, & viginis amaræ, aut in maritimis areis salinarum gigni posse læta frumenta. Sed est manifestior hic antiquorū error, quàm vt pluribus argumentis conuincendus sit: non ergo color, tanquam certus author testis est bonitatis aruorū. Sed Plinius omnino negat ex signis terræ bonitatem præfagiri posse. Pulla, qualem habet Campania, nec vbiq; optima vitibus, aut quæ tenues exhalat nebulas. Nec rubrica multis laudata. Cretam in Albensium Pompeianorum agro, & argillam cunctis ad vineam generibus anteponunt, quāquam præpingues: quod excipitur in eo genere. Inuicè sabulum album in Ticinensi, multisq; in locis nigrū, itemq; rubrum etiam pingui terræ permistū, infœcundum est. Argumenta quoq; iudicantium sepe fallunt. Non utiq; lætum solum est, in quo proceræ arbores nitent, præterquā illis arboribus. Quid enim abiete procerius? aut quæ vixisse possit alia in loco eodè? Nec luxuriosa pabula pinguis soli semper indicium habent: nam quid laudatius Germaniæ pabulis? & tamen statim subest harena tenuissimo cespitem corio.

Nec semper aquosa est terra, cui proceritas herbarum, non hercule magis, quam pinguis adhærens digitis, quod in argillis arguitur. Scrobes quidem regeſta in eos nulla complet, vt denſa, atque rara ad hunc modum deprehendi poſſit, ferroque omnis rubiginem obducit. Nec grauis, aut leuior iuſto deprehenditur pondere. Quod enim pondus terræ iuſtum intelligi poteſt? Nec fluminibus aggeſta ſemper laudabilis, quando ſeneſcant ſata quædam aqua.

De ſolo in agri electione fugiendo. CAP. XV.

DIXIMVS terras amplexandas, comparandasque, nunc fugiendas ex ſignis cognoscere docebimus à contrariis cauſis. Quibusdam in terris, inquit Theophrastus, ima arborum pars optimè conſtat, ſuperna verò vitioſa 10 eſt, quod in ſolo harenoso, tophoso, aduſtoque euenit. Sabulū enim alimen- to caret, ob id germina ſubminiſtrare haudquaquam valet: vnde infelix germinatio: ſuntq; in eo diſſitæ partes, ob id facilem radicibus com meatum præſtare poſſunt, vt in profundum effundantur: & ob partium raritatē item nocumenta æſtus & frigoris ad radices admittunt. Sic in paluſtribus, & luculentis. Fugendum quoq; frigidum, denſum, ſaluſumq; ſolum, quia incommodum conſtat, denſitas enim ſtrangulat ſua vehementi cohæſione. Caro inquit, Terrā caue carioſam tractes. Addit Plinius, Néve pluſtro, néve pecore impellas. Quid putamus hac appellatione ab eo tã opere reformidari, vt penè veſtigiiſ quoq; interdicit? Redeamus ad ligni cariē, & inueniemus illa, quæ in tantum 20 abhominatur vitia, arida, fiſtuloſa, ſcabra, caneſcētis, exefa, & pumicoſa. Plus dixit vna ſignificatione, quàm poſſit vlla copia ſermonis enarrari. Eſt enim interpretatione vitiorum quædam non atate (quæ nulla in ea intelligi poteſt) ſed natura ſua, anus terra, & ideo infœcunda ad omnia, atque imbecilla. Virgilius frigidam ex naſcentibus herbis exquirere docet.

at ſceleratum exquirere frigus

Difficile eſt, picea tantum, taxiq; nocentes,

Interdum aut hedera pandunt veſtigia nigra.

Improbantur à Varrone lapis, marmor, rudus, arena, ſabulo, argilla, rubrica, puluis, creta, glarea, carbunculus, id eſt quæ Sole perferuet, ita, vt radices ſa- 30 torum comburat. Palladius. Ne alba, & nuda ſit gleba, ne macer ſabulo ſine admitione terreni, ne creta ſola, ne arena ſquallentes, ne ieiuna glarea, ne auroſi pulueris lapidoſa macies, ne falſa, vel amara, ne vliginoſa terra, ne tophus arenosus, atq; ieiunus, ne vallis nimis opaca, & ſolida. Plinius. Terram amaram, ſiue macram ſi quis probare velit, demonſtrant eam atræ degeneresque herbæ: frigidam autem retorridè nata. Item vliginoſam triſtia, rubricam oculi, argillamque operi difficillimas, quæque raſtros, ac vomeres ingentibus glebis onerent: quanquam non quod operi, hoc & fruſtui ſit aduerſum. Anatolius ſalam terram fugiendam eſſe ab omnibus dicit: & hic veterum conſenſus. Quum enim in ſtercore ſalem fugiamus, & amurcā ex oliuiſ ſale non con- 40 ſperſis,

ſperſis, arboru
dulci, non ſalla
ad omnia in
immo vitate
fecidam terra

Qu
Sed ſi nob
Sciendum d
ſed malum co
10 currit duos le
bolum eſſet,
regionibus i
quæ coli, ſub
ſiccusne ſit.
ſit an grami
darit, vligo
arbores: aut
expediendus
necanda, filix
interimi, vt ſi
ſumitur. ex C
dari (vt aliqui
ſuper humida
rare qui talia
moſticia apt
humecto lo
diſtantibus
ſtantes inter
labis in area
30 colliculis fac
cies ſic. Foſſa
re facies, m
ex proximis
cortigabit
nitus infœ
& pratum

DIXIM
necel
40 ſubnectem

perferis, arborum radicibus affundere rerum experti præcipiant, & sterquilina dulci, non salsa aqua rigemus. Manifestum est quoddam salam terram improbem, ad omnia ineptam, præterquam ad palmæ fructus, quos optimos producit, immò vitare oportet falsi stercoreis vsum ad dulcis terræ misturam. Præterea foetidam terram fugere oportet, ut quæ omnibus inutilis existat.

Quomodo terra vitia emendari possint. CAP. XVI.

SE D si nobis fundus non erit eligendus, sed hæreditate contigerit, quid faciendum docebimus. Dicebant enim maiores nostri non malum agrum, sed malum colonum reperiri. Immò id innuentes in hieroglyphicis Cybeleio currui duos leones domitos adiungere hac consideratione, ut leo terræ symbolum esset, quum genus id animalium in longinquis, & à nobis remotissimis regionibus inueniatur: nullam enim dicunt esse terræ partem tam remotam, quæ coli, subigique non possit. Considerandus ergo est sylvestris & incultus, siccusne sit, an humidus, nemorosus stirpibus, an saxis confragosus, iuncône sit an gramine vestitus, aut filicibus, aliisve frutetis impeditus. Si humor redudat, vlgo ea exiccanda, nemorosi, frutetosiq; tractus, extirpandæ radicitus arbores: aut quæ succisæ fuerint, incendendæ, dein arandæ. Saxosus lapidibus expediendus est. Lunci & graminis perniciēs repastinatione frequenti internecanda, filix assidue extirpanda, feruntq; filicem sationibus, & stercoratione interim, ut subinde nascens succidatur, intra biennium; sic eius viuacitas absumitur, ex Columella. Plinio hæc displicent: ait enim. Terram terra emendari (ut aliqui præcipiunt) super tenuem pingui iniecta, aut gracili, bibulaque super humidam, ac præpinguem, deuentia operæ est. Quid enim potest sperare qui talia colit? Si ager ad cultum seu siccitate, vel aquarum nimietate & molestia aptus nequicquam sit: hoc pacto emendabimus. Vineam in prato, & humecto loco facies sic. Infodies ab oriẽte in occasum lineis directis & æquidistantibus foueas, quàm maximè id liceat profundas, latas pedes nouem, distantes inter se pedes quindecim, & quam exemeris ex fossa tellurem accumulabis in area interualli, ut accliuitate meridianum excipiat solem. Istiusmodi colliculis factis manu, vitis tutior & feracior. Contrà in colle sicco pratum facies sic. Fossam oblongam non decursoriam, sed stagnantem in parte superiore facies, margine ad libellâ collibrato, & coæquabili, in eâ deriuabis aquam ex proximis fontibus, & superfluens à latere continua parilitate substitutum corrigabit agrum. In campestri Veronensi saxis rotundis referto, nudo, & penitus infæcundo, crebra effecere irrigatione, ut cutis obduceretur cespiticea, & pratum excreuit latissimum.

De aqua villa eligenda. CAP. XVII.

DIXIMVS de aëre & terra, sequitur tractatio de aquis, non minus ceteris necessaria. Referemus prius quæ à maioribus relata sunt, mox nostra subnectemus. M. Varro in villa exa edificanda hoc potissimum querit, ut intra

septa villa habeat aquam, si non quamproximè. Primum quæ ibi sit nata. Secundum, quæ influat perennis. Si omnino aqua non est viua, cisternæ faciendæ sub rectis, & lacus sub dio: ex altero loco vt homines, ex altero vt pecus vti possit. Columella iubet maximè probatam haberi aquam, sine qua nemo nostrum vel prosperæ, vel aduersæ valetudinis vitam proroget. Quæ sit vel intra villam, vel extrinsecus inductus fons perennis. Si deerit fluens, putealis quaratur in vicino, quæ non sit haustus profundus, non amari, aut salis saporis. Si hæc quoque defecerint, vastæ cisternæ hominibus, piscinæ pecoribus instruantur, colligendæ aqua pluuiæ, quæ salubritati corporis est accommodatissima. Huic proxima fluens aqua è montibus oriunda, si per saxa præceps deuoluitur. Tertia putealis, vel collina, vel quæ non infima valle reperitur. Deterrima palustris, quæ pigro lapsu repit. Pestilens, quæ in palude consistit. Hic tandem humor quamuis nocentis naturæ, temporibus tamen hyemis, edomitus imbris mitescit, ex quo cælestis aqua maximè salubris intelligitur. Plinius ab Hippocrate, & aliis, stagnantes, pigrasque damnat, vtiliores quæ profluunt existimat, cursu enim procursuque ipso extenuari, atque proficere: eoque miratur cisternarum ab aliquibus maximè probari, rationem afferentibus, quod leuissima sit imbrum aqua, vt quæ subire potuerit, & pendere in aëre. ideoque & niues præferunt imbris, niuibisque etiam glaciem, velut ad infinitum coacta subtilitate. Leuiores enim hæc esse, & glaciem multo aqua leuiorem, quorum sententias refellit. In primis leuitas illa deprehendi aliter, quam sensu vix potest, nullo pene momento ponderis aquis inter se distantibus. Nec leuitatis in pluuia aqua, argumentum est subisse eam in cælum, quum etiam lapides subire appareat, cadensque inficiatur halitu terræ, quo fit, vt pluuia aquæ sordium inesse plurimum sentiat, citissimeque ideo calefiat aqua pluuia. Niuem quidem, glaciemque subtilissimum elementi eius videri miror, appposito grandinum argumento, è quibus pestilentissimum potum esse conuenit. Nec verò pauci inter ipsos è contrario ex gelu, ac niuibz insaluberrimos potus prædicant, quoniam exustum sit inde, quod tenuissimum fuit. Minui certè liquorem omnem congelatione deprehenditur, & rore nimio scabiem fieri, pruina vredinem, cognatis ex niuis causis. Pluias quidem aquas celerrimè putrescere conuenit, minimeque durare in navigatione. Epigenes autem aquam, quæ septies putrefacta, purgata sit, perhibet amplius non putrescere: nam cisternas Medici etiam confitentur inutiles, aluo duritias facientes, faucibusque etiam limi non aliis inesse plus, aut animalium, quæ faciunt tædium, confitendum habent. Nec statim amnium vtillimas esse, sicuti nec torrentium vllius, lacusque plurimos salubres maximè. Limus aquarum vitium est, si tamen idem amnis anguillis scateat, salubritatis indicium habetur, sicuti frigoris, tineas in fonte gigni. Aquam salubrem aëri quamsimillimam esse oportet, cuius sapor odorve nullus esse debet. Quidam statim iudicant de salubritate, frustrante diligencia,

gentia,

gentia, quando
fit, refrigerat
fictisq; in num
que sunt differ
stris: quarum
guoribus opti
nem è saxis stil
aquis, tardius
per angustias,
10 prima esset, ni
nitur. Fluuia
diffluit loca.
fluuiis. Palu
uis est, ob sta
quit edulia,
que obrinet
netrar, diffic
quæ è saxis se
spatia fertiliu
20 fluit è Pangæ
sexaginta sex.
pter in horar
uis, sed in aqu
aquarem cur
iam quod te
est igitur val
in nostrum,
solent in stab
cortis, ac sta
30 dem purgare
canalium du
docet. Primi
cat, sed sit p
limus in fide
Sed quia so
colarum sa
pulmonibu
noxas corp
vt vitiatu ca
40 pandus aër
nullo dolor

gentia, quando perrarum est, ut leuior sit aqua. Inter pares melior quæ cale-
 fit, refrigeraturque celerius: quin exhaustam vasis ne manus pendeant, depo-
 sitisq; in humum tepescere affirmant. Ex Rufo. Potabilium aquarum quin-
 que sunt differentia, pluuia vel cisternina, fontana, putealis, fluuiialis, & palu-
 stris: quarum pluuia leuissima, facillimeque mutabilis perhibetur: multis lan-
 guoribus optima, quod statim euadat. Fontanarum quæ fontes ad septentrio-
 nem è saxis stillantes scaturiunt à Sole auersi, duri, & tardi motus inuehunt
 aquas, tardius incalescunt, & refrigerantur: quæ verò ad orientem emanat,
 per angustias, vel puram terram dilabitur, calefcit, & frigescit celerrimè: o-
 10 ptima esset, nisi conductibus fieret deterior. Putealis frigida difficulter excer-
 nitur. Fluuiialis difficulter operatur, arefaciendo, præcipue quum per mala
 diffluit loca. Præstant quæ perennibus fontibus fluunt, & aliis non ammiscetur
 fluuiis. Palustris omnino mala, præter Niliacam, quia cœnosa, lutosa & gra-
 uis est, ob statum, moramque est tanquam mortua, & putrida. Quæ cito co-
 quit edulia, etiam in ventre alios cibos coquit. Quæ crassitudinem, pondus-
 que obrinet, & subsidet, & facile coit, calculosa est. Aqua quæ difficulter pe-
 netrat, difficulter coquibilis. Ex Athenæo hæc excerptimus. Homerus aquas,
 quæ è saxis scaturiunt, insalubres vocat. Fontanam, quæ per longa terrarum
 spatia fertilium deducitur, bonitate cæteras antecellere dixit Hesiodus. Quæ
 20 fluit è Pangæi fodinis, cotyla nonaginta sex drachmas hyeme pendet, æstate
 sexaginta sex. Spissat enim & cōtrahit magis illa frigus, quàm cæteras: quapro-
 pter in horarum indicibus quum fluit, horas non reddit certas, & pares æsti-
 uis, sed inæquales, exitu ob crassitiæ tardiore. Diophanes dicit. Præ omnibus
 aquarum curam habere oportet, non solum propter aquæ fructum, sed et-
 iam quod temperatissimum ærem faciat, siccitatibus obortis. Fortunatum
 est igitur valde, fontanam aquam habere, quæ si desit, pluuias colligantur
 in nostrum, totiusque familiæ vsum sufficientes, non velut quidam facere
 solent in stabulum, vbi pecus ouillum & reliqua animalia stercorebus locos
 cortis, ac stabulorum replent, sed in domibus in quibus etiam diligenter eas
 30 dem purgare, & assidue oportet. Puram verò aquam in puteos per ligneos
 canalium ductus conuehere. Palladius ex his aquæ salubritatem cognoscere
 docet. Primum ne à lacunis, aut palude ducatur, ne de metallis originem du-
 cat, sed sit perspicui coloris, neq; vllò aut sapore, aut odore vitietur, nullus illi
 limus insidat, frigus tepore suo mulceat, æstatis incendia frigore moderetur.
 Sed quia solet occultiore noxam tectior seruare natura, ipsam quoque in-
 colarum salubritate noscamus. Si fauces bibetium puræ sint, si saluo capite, in
 pulmonibus, ac thorace, aut nulla est, aut rara causatio: nam plerunque has
 noxas corporis ad inferiorem partem, quæ supra sunt, corrupta demittunt,
 ut vitiatò capite ad pulmones, vel stomachum morbi causa decurrat: tunc cul-
 40 pandus aer potius inuenitur. Deinde si venter, intestina, vel latera, vel renes
 nullo dolore, aut inflatione vexentur. Si vitia nulla vesicæ sunt. Hæc & his simi-

lia, si apud incolas pro maiori parte constare videris, de aquis aliquid ne suspiceris. Nos illam dicemus sapore optimam, quæ saporem habet nullum, & colore commodissimam, quæ omni sit colore penitus vacua, quæ lymphida, pellucida, & tenuis, quæ in candidum linteum infusa, non commaculavit, quæ feruefacta faciem non dimiserit, quæ mucosum alueum, quo perfluat, & præsertim saxa coinquinata non reddiderit. Ex optima aqua multæ commoditates exoriuntur. Indiam inquit Diodorus multa ex parte habere homines proceros, & validos, ingenioq; præditos acri, quod saluberrimas aquas bibant. Est animantibus aqua, veluti caloris pabulum, vitæq; alimentum, sic plantarum, cæterorumq; quibus mortales vtuntur. Vnde quæ in terris crescunt, & adolescunt omnia, si aquam ademeris, fore, vt futura sint nulla.

De hydrophantica. CAP. XVIII.

SED si regio aquis careat, oportet eam, vbi sit, inuestigare, vt puteos excavemus: nos hydrophanticam docebimus, sic enim Græci vocant artem aquam inuestigandi; eamq; ex Democriti scriptis colligemus. Campi, & planities, vt plurimum, aquis carent, & maiores magis minoribus, & si in eis reperiuntur, plerumque falsæ sunt. Naturalis causa est. Solent semper quod tenuissimum, ac lenissimum est attrahere, quare quum campos per totam diem Sol occupet, humorem ex ipsis emulgere, & in vaporem dissolvere: vnde sæpe cõtingit, vt aquis careant: nam si aliquid relinquitur, falsum reperitur, quemadmodum & in mari evenit. Ex montibus plerumq; aquosos esse, & imas ipsorum partes humidiores, quàm summas, & densas, & umbrosas magis humiditas esse, quàm nudas. Aquæ montanæ nõ falsæ, quum non per totam diem Sole exurantur, & oblique non rectè feriat, vnde montes, qui ad septentrionem declinant, aquosiores pronunciant ad Meridiem inclinatis, & eos, qui ad orientem, & occidentem minus quidam aquosos, quàm qui ad septentrionem vergunt, at plus quàm vergentes ad Meridiem. Et densos arboribus plus aquosos, quàm nudos, propterea quod arborum densitate adumbrentur. Imæ montium partes aquosæ sunt, ob id quod aquarum naturæ est ad infernam partem deferri, & quod quæ in altis sunt, ad humiles cõgerentur, & plures fontes reperiuntur, in quibus magni montes semper incumbunt, alti, ac densi, concauos & conualles locos habentes. In talibus enim imbres per annum collectos, & per terram excolatos ipsos fontes augent. Quasdam verò aquas circa has imas montium partes non apparere, verum vbi intra terram aliquatenus subductæ cursum perfecerint, tum demum in apertum prodire. Quædam verò in mare per terram in venis productæ ad multum loci spatium scaturiunt, qualis fons in Arado, & Heraclia Ponti. Quemadmodum enim in animatis corporibus totum corpus venis, & arteriis interstinctum est, sic etiam in terra aquas habentes, vel inter se implexas, vel rariore, quas sapissimè offendunt puteorum fossiores. Quapropter fontes maximè augeri circa solstitium hybernum, Sole quidem nõ limit

liter vrgente,
exortum conti
nascendum, ac
bis, cypero, gra
puri, quinquet
liloto, oxilapat
Plinius chama
niza, trifolium
marcidus appa
10 manentes, qu
mas & durabil
pumicosi gen
luculosi, nigra
do scrupabit
ricum, conge
& probè carpi
dum eius cum
speramus, con
quo inuersione
20 bitumensuran
ra auferatur, &
lanam aqua pl
tem cognosce
lachrymæ diff
paruerit, ade
bit, idem per
habita, ne di
vbi substat
primum Soli
30 quam rarefca
mo Solis sple
tudinem con
animaduert
sima erit, tu
tudine, hy
remitit, si
alia addit,
multum qu
aut vitæ, au
40 ante Solis o
niterram m

liter vrgente, imbris augeſcentibus: ſub æſtium verò ſolſtitium, & Canis exortum contrarium accidere. Sed Aquileges ex ſignis tùm ſoli, tùm terris naſcentium, aquas ſubterraneas, & latentes veſtigant, ex iuncis, butomo, rubis, cypero, gramine pingui, † arundine, malacocifſo, cucumere ſylueſtri, hip-
 puri, quinquefolio, & batrachio: vel heliotropio, calamintha, callitricho, me-
 liloto, oxilpatho, ſanguinali, ſolano, ſtratiore, chamæleuce (bechion vocat
 Plinius) chamæleone: & vbi plures herba denſa, & virides, agnus caſtus, co-
 niza, trifolium. Plinius his ad ſit potamogeton. Quin & vbi ipſarum aſpectus
 marcidus apparet, propius pauimento aquas indicant inualidas, & non per-
 manentes, quæ verò luxuriantis aſpectus & viuidioreſ, aquas ſubeſſe altiffi-
 mas & durabiles. Nunc ſoli genera dicamus, quæ aquas habent. Argilloſi, &
 pumicoſi generis, & ſquallente fluxu prædita omnino aquoſa. De glutinoſis,
 luſoſis, nigra terra, pingui, & calculoſa deſperandum. Sed veſtigatoꝝ hoc mo-
 do ſcrutabitur aquas ex Democrito. Habeat vaſculum plumbeum ſemiſphæ-
 ricum, congij capacitate, accipiatque lanæ floccos molles duos, aut tres lotos,
 & probè carptos, eoſque lino obliget; ipſum verò lini ſilum, intra vaſ ad fun-
 dum eiꝝ cum cera cōglutinet. Sed & oleo vaſ illinatur, & in loco, vbi aquam
 ſperamus, coniectura facta, puteus effodiatur altitudine trium cubitorum, in
 quo inuerſum vaſ ponatur, & circumpoſitis harundinum foliis, ruſus ad cu-
 20 biti meſuram terra aggeratur; id ipſum Sole occidente faciendum. mane ter-
 ra auferatur, & herbis amotis, vaſ ſubuertatur, & conſideret, ſi fuerint fontes
 lanæ aqua plenam reperiet, & vaſculum bullarum plenum. Aquæ qualita-
 tem cognoſceſ, ſi lanæ ipſam guſtaueris. Quod ſi multa erit humiditas, vt
 lachrymæ diſtillent, propè aquam ſperato, ſi autem humiditas ſimpliciter ap-
 paruerit, adeſt quidem aqua, ſed in alto: ſi nullum horum ſignorum appare-
 bit, idem periculum in alio, atque alio loco facere oportebit, conſideratione
 habita, ne diſparatos locos tentemus. Alio modo etiam cognoſcere docet,
 vbi ſub ſit aqua. In altiore loco progrediuntur, & priuſquam aër albeſcat,
 primum Solis radium obſeruant, & ſi quid nebuſoſum in ipſum adtrahi, ante-
 30 quam rareſcat, appareat, aquam expectare conuenit. Obſeruabis etiam in pri-
 mo Solis ſplendore culices ruſum in directum volantes, ſeq; ad trabis ſimili-
 tudinem contorquentes: nam hi aquam portendunt. In ſuper ex altiore loco
 animaduerſionem habere: æſtate in meridie, quando aër purus, & terra ſiccif-
 ſima erit, tunc in aquoſis locis vapor ruſum eleuatur, & paruæ nebulae ſimili-
 tudine, hyeme verò ſuffumigationem quandam & halitum eiꝝmodi locus
 remittit, ſimilem eiſ, qui ex fluminibus, ſtagnis, & puteis efferuntur. Plinius
 alia addit. Aquarum ſunt notæ iuncus, harundo, aut herba, de qua dictum eſt,
 multumque alicui loco peſtore incubans rana. Salix enim erratica, & alnus,
 aut vitex, aut hedera ſpontè proueniunt. Certior multò nebuſoſa exhalatio,
 40 ante Solis ortum longiuſ intuentibus, quod ex edito quidā ſpeculantur, pro-
 ni terram mento attingente. Eſt & peculiaris æſtimatio, peritis tantum nota,

quam feruentissimo aesta sequuntur, dieiq; horis ardentissimis, qualis ex quoque loco percussus splendeat. Nam si terra sicente humidior est ille, indubitata spes promittitur, sed tanta intentione oculorum opus est, ut indolescant, quod fugientes ad alia experimenta decurrunt. Loco in altitudine pedum quinque defosso, ollisq; e figlino opere crudis, aut peruncta pelui erea cooperto, lucernaq; ardente cōcamerata frondibus, de in terra. Si figlinum humidum ruptumve, aut in are sudor, vel lucerna sine defectu olei restincta, aut etiam vellus lanę madidū reperiatur, nō dubiē promittūt aquas. Quidā & igne prius excoquunt locum, tanto efficaciore vasorum argumēto. Terra ipsa promittit candicantibus maculis, aut tota glauci coloris. In nigra enim scatirigines non sunt perennes. Figulari creta semper adimitur spes. Aqua semper dulcis in argillosa terra, frigidior in topho: dulces enim leuesq; facit, & colando cōtinet sordes. Sabulum exiles limosasq; promittit. Glarea incertas venas, sed boni saporis. Sabulum masculum, & arena carbunculosa, certas stabilesq; & salubres. Rubra saxa optimas, & spei certissima. Radices montium saxosæ, & si-lex, hoc amplius rigentes. Hæc Plinius ex Vitruuio, & Palladius.

Quæ in aquarum electione fugiende. CAP. XIX.

RESTAT fugiendarum aquarum exponamus signa. Columella de terram palustrem dicit, quæ pigro lapsu repit. Pestilens, quæ in palude semper consistit. Plinius. Ante omnia damnantur amara, & quæ scrobem statim implent. Damnantur fontes, qui cœnum faciunt, quique malum colorem bibentibus: refert &, si vasa ære inficiunt, aut si legumina tardè percoquunt, si liquata leniter terram relinquunt, decoctaq; crassis obducunt vasa crustis. Est etiam nū vitium nō fœtida modo, verū omnino quicquā respicientis. Athenæus. Quæ gelidior, durior, & ad staterā grauior aqua est, ob eandē rationem deterior: nempe quia propter nimiam frigiditatem, & multam quam habet terrenā crassitiem, laboriosius à ventriculo conficitur. Aqua gelida, quoniā magis terrena durior est: nam quæ corpulētior, calefacta calidior, refrigerata frigidior est. Sed aqua si quid viscosi, mucidi, crudive in se admistū habet, bibentes guttulosos, & calculosos reddit. Extat Hippocratis sententia: aquam non depuratam, sed grauē, & indecenti sapore bibentes, estuosi, & temulenti fient, & cætera corporis membra, cubiti, spatula, facies, reddētur penitus extenuata, & gracilia, & vitio splenis male concreto sanguine, in morbos incident varios & pestilentes, astate profluuiū ventris, fluente bile, & dissolutis humoribus deficient, tum aqua intercure, præcordiū angustia, & laterum anxietatibus laborabunt. Iuniores atra bile insanient, senes humorum incendio flagrabunt, fœminæ agrè concipient, & perquā difficiles partus enitentur. Omnis deniq; ætas, & sexus morte immatura intempestiuē cadet, acta atq; absumpta morbis, & dies istorū erunt semper tristes, & coinquinati malis humoribus, atq; omni perturbationum genere vexati, & animo exagitari erunt in mœrore, & tristitia. Cœlestes aquas interest, quo tempore, qua hora, quo vento flante colle-

geris;

geris, quōve lo-
itate colligunt
pluit amara
& terrā quiden
est quod e rect
losophi in quib
dine nocuam.
briorem eum,
purissimis e lo
amarā ex loci
salinosē & len
quæ tela supe
& liuenti, qu
lentescat, qu

NARRA-
tes, addi-
ta. Neronis P
ues refrigerar
10 coctam villio
uento. Vitiola
sunt remedia.
aut ordeum c
dunt angustia
Diophane. In
ter in alia val
nō sit bona, n
sumatur: dei
decocta dulo
30 remedia. Su
subacta oleo
quas cistern
quietiam ar
aceto, ut di
rari. Pisces
rur: ob id i
rem. Quæ
translata, &
aridū locum
40 sit exauriri
tabilis reddi

geris, quòve loco asseruentur. Aquas post brumâ grauiorē putant, quæ per æstatē colliguntur minus dulces quàm quæ per hyemē. Primæ post Caniculam pluuiæ amaræ & pestilentes sunt: adultis enim terræ mistionibus inficiuntur, & terrâ quidem ob eam rem sapere amaritudinē, quòd solibus adusta sit. hinc est quòd è teētis delapsam, quàm è terra collectâ salubriorē putant. Pœni philosophi inquit pluuiâ per æstatem cum tonitru collapsam impurâ, & falsedine nocuam. Nocturnū imbrem præstare diurno Theophrastus dicit, & salubriorem eum, qui flante Aquilone ceciderit. Pluuiam aquam probant, quæ purissimis è locis euaporata sit: nam plerumq; senties fœrentem, atq; fortassis amarâ ex loci infectione, vnde primum is sudor euaporarit. Excoctæ Sole aquæ salinosæ & lentosæ fiunt. Stagnantium pessimam dicunt, quæ sanguisugas alar, quæ tela superinducta pigruerit, quæ fœtore nauseam cietit, quæ colore atro & liuenti, quæ spissitudinem in vase multam asseruet, quæ mucosa grauitate lentescat, quæ si manus ea laueris, tardè siccet.

Aquarum vitia quomodo emendentur. CAP. XX.

NARRAT Plinius: Nitrosas atq; Salmacidas, in desertis mare rubrū petētes, addita polēta, viiles intra duas horas faciunt, ipsaq; vescuntur polenta. Neronis Principis inuentum est, decoquere aquâ vitroq; demissam in niues refrigerare: ita voluptas frigoris cōtingit sine vitiiis niuis. Omnem vtiq; decoctam vtiliorē esse cōuenit, item calefactâ magis refrigerari subtilissimo inuento. Vitiosæ aquæ remediū est, si decoquatur ad dimidias partes. Paxami hæc sunt remedia. Aquarum amaritudinē corallio contuso iniecto emendabimus, aut ordeum cōsum, & linzeolo illigatum in aquas ponimus. Hirudines perdunt anguillæ, & cancri fluuiales aquis iniectis. Aqua nitrosa sic curanda ex Diophane. Infundatur in dolia, & sub diuū exponatur, donec resederit, & leniter in alia vasa diffundatur, relicta facie subsidente. Florētinus. Si verò & aqua nō sit bona, neq; potabilis, sed morbosâ, coquatur donec decima ipsius pars infumatur: deinde refrigeretur, atque ita innoxia erit. Sic enim & marina aqua decocta dulcis redditur. Ne cisterninæ aquæ putrescant, hæc sunt adinuenta remedia. Sunt qui putent vitreum vas plenum sale si bene obturaueris calce subacta oleo, ne quid aquæ in vas penetret, idque immiseris vt medias inter aquas cisternæ pendeat, fore vt aquæ illic nulla putrescant mora. Addunt aliqui etiam argentum vinū. Nonnulli putant, si vas nouum fictile acri plenum aceto, vt diximus, bene obturatum immiseris, mucosam ocys aquam instaurari. Pisces enim aquæ mucore, terræque vligine, ali, atque depasci arbitrantur: ob id in puteum, cisternamque pisciculis iniectis reddi aquam purgatorem. Quæ putrescere cœpit aqua, vehementer subagitata, iterum atq; iterum translata & cōmota fœtorem amitter. Quum incidisset, inquit Iosephus, in aridū locum Moyses, & nō adesset alia nisi puteus amaræ aquæ, & sordidæ, iussit exauriri, id quū fecisset miles excussione, exagitationeq; istiusmodi, potabilis reddita est. Marina aqua, inquit Solinus, argilla si percoletur, dulcescit:

& salem adimi compertum est, vbi tenui torrentis arena iterum, atque iterum coletur. Vas fictile bene oclclsum si habueris immersum mari implebitur dulci. Vbi turbulentam Nili fluminis aquam posuere. Si quid supra limbum, & marginem aquæ amygdalam perfricaueris, è vestigio clarescet.

Reliqua, quæ ad perfectum fundi solum eligendum valde conducunt. CAP. XXI.

ALIA quoque villæ sunt ad eligendum solum necessaria. Xenophon putat cultum agrum nō esse emendum, quod bene cultus ager magno veniret, ac minimi esset reditus, sic nec vllō modo similem præberet voluptatem, atq; ille, in quo spes sit, vt cultu melior effici possit, scilicet qui ob domini sui negligentiam, siue tenuitatem incultus esset. Varro dicebat. Alia in ipsa villa sunt, vt cœlum, solum, alia extra, sed valdè ad villam necessaria. Primum ne sit vicina regio infesta: multos enim agros colere non expedit, propter latrocinia vicinorum. Secundum, quæ vicinitatis inuectos habeat necessarios, vt quæ ibi nascuntur, ibi vendâr, & illinc inuectos opportunos ad ea, quæ in fundo opus sunt. Multi sunt habentes prædia, quibus frumentum, aut vinum, aliudve quid desit importandum: contra non pauci, quibus aliquid sit exportandum. Tercio eundem fundum fructuosiores faciunt vecturæ, si viæ sunt, qua plaustra agi faciliè possint, aut flumina propinqua, quæ nauigari possit, quibus vtrisque rebus euehi, atq; inuehi ad multa prædia scimus. Quarto refert ad fructus quemadmodum vicinus in confinio constitum agrum habeat: si enim ad limitem quercetum habet, non possis rectè secundum eam syluam ferere oleam. Sic iuglandes magnæ, crebræ finitimæ, fundi oram faciunt sterilem. Columella à Varrone, & aliis excipiens, aliqua addit, reliquis non minus intuenta, aquam, viam, vicinum. De aqua diximus. De via, multum conferre agris iter commodum. Primò quia domini præsentia assidua, qui libentius commeaturus sit, si viæ vexationem non reformidet; seruos quoque, qui sequuturi patrem familias sint, non agrè iter pedibus ingredi. Deinde ad vehenda, & exportanda utensilia, quæ res frugibus auget pretium, & minuit impensas inuectarum rerum. Vicini incommoditas non quidem certa, nam mors, aliæve causæ mutare solent, vnde sunt, qui Catonis sententiâ damnant. Sed is non errat: nam sicut sapientis est casus magno animo sustinere, ita demeritis est ipsum sibi malam fortunam facere, quod facit, qui malum vicinum suis nummis parat. Et prouerbio fertur, Aliquid mali propter vicinum malum; sed multi prætulere carere penatibus, & propter iniurias vicinorum, sedes suas profugerunt, Achæos dico, Hiberos, Alanos quoque, nec minus Siculos, Pelasgos, Aborigines, & Arcadas, & priuatos in regionibus quibusdam, vt Autolicum, Caccum, detestabiles vicinos fuisse memoria tradidit. Traditque idem Columella vicinum suum, à se non nominari, qui nec inuiolatum seminarium, nec pedamenti quicquam adnexum vineæ, nec pecudes pasci negligen-

Plautus in Mercatore.

gligentius sine illud adiecit, quæ idq; non ne maiorem, q

Ex
Pœni dicere quoniam quum Nec dubium q
10 eximie. Tanru mur quo poti colere non po pe censebant Xenophont ergo villa no astiuisque it Villamq; hab infesti, & vel

20
30
40
P R I V S
milias, tul ri. Cato iubet dere, adificar re. Vbi aras ad situm habeat Patrem fami M. Varro po nes laxa sint. Ad exortus a Solem. Sin co ponas, hyem dum etiam s scunt, & qu li consequi ciunt diffic uior afflare qui, quod p tur. Præter si quæ prop Nimbi repe

gligentius sinebat, ob id talem pestem vitandam cenſet. Ad cætera præcepta illud adiecit *μέτρον δέσσειν*, rebus omnibus adhibendum modum, menſuramque. idq; non ſolùm aliud acturis, ſed & agrum paraturis dictum intelligatur, ne maiorem, quàm ratio calculorum patiatur, emere velit. Virgilius.

— *laudato ingentiarura,*
Exiguum colito.

Pœni dicere ſolent imbecillioſiorem agrum, quàm agri colonum eſſe debere, quoniam quum ſit colluctandũ cum eo, ſi fundus præualeat, allidi dominum. Nec dubium quin minus reddat laxus ager non rectè cultus, quàm anguſtus eximiè. Tantum ergo obtinendum eſt, quantum eſt opus, vt emiſſe videamur quo potiremur, non quo ipſi oneremur. Non rectè eſt poſſidere velle, ſi colere non poſſis. Modum agri in primis ſeruandum antiqui putauere, quippe cenſebant, inquit Plinius, ſatius eſſe minus ſerere, & melius arare. Apud Xenophontem habetur: ad villam eundem exercitiij cauſa, redeundum equo: ergo villa non remota penitus ab vrbe: ſitq; via non difficilis, ſed hybernis, æſtiuisque itionibus, & ſubuectionibus apta, ſeu pedibus, ſeu reda ire lubet. Villamq; habere condecet, qua matutini radij oculis proficiſcentium non ſint infeſti, & veſpertina ſoles domi redeuntes non moleſtent.

De ruſticorum adificiorum ſitu. CAP. XXII.

20 **P**RIVS QUAM ad ruſticas domos conſtituendas descendamus, patrisfamilias, ruſtici, aliorumq; operæ pretium erit, de earum ſitu aliqua præſari. Cato iubet prima adoleſcentia patrem familiæ agrum ſtatim conſerere ſtudere, ædificare diu cogitare: quare conſerere cogitare non oportet, ſed facere. Vbi ætas acceſſit ad annos triginta ſex, tum ædificare oportet, ſi agrum coſitum habeat. tum ita ædificet, ne villa fundum querat, nè fundus villam. Patrem familiæ villam ruſticam benè ædificatam habere expedit, vt dicemus. M. Varro potiſſimum ſub radicibus montis ſylueſtris villam ponit, vbi paſtiones laxæ ſint, ita vt contra ventos, qui ſaluberrimi in agro ſtabunt, poſita ſit. Ad exortus æquinoctiales aptiſſima, quod æſtate habeat umbram, hyeme 30 Solem. Sin cogare ſecundum flumen ædificare, curandum ne aduerſum eum ponas, hyeme enim ſit vehementer frigida, & æſtate non ſalubris. Aduertendum etiam ſi qua erunt loca paluſtria, & propter eaſdem cauſas, & quod areſcunt, & quod in iis creſcunt animalia quædam minuta, quæ non poſſunt oculi conſequi, & per aëra intus in corpus per os, & nares perueniunt, atque efficiunt difficiles morbos. Nec in eaſ partes ſpectet villa, ex quibus ventus grauior afflare ſoleat, nè in conualle caua, & vt potiùs in ſublimi loco ædificet, qui, quod perſtatur, ſi quod eſt, quod aduerſarium inferatur, faciliùs diſcutitur. Præterea quod à Sole toto die illuſtretur, ſalubrior eſt, quod & beſtiolæ ſi quæ propè naſcuntur, & inferuntur, aut efflantur, aut aritudine cito pereunt. 40 Nimbi repentini, & fluuij, & torrentes, periculoſi illis, qui in humilibus, aut

tavis locis ædificia habent, & repentinæ prædonum manus, quod impronisos
 facilius opprimere possunt. Columella his sua addit commenta. Villæ domus
 in editiori situ superponatur, ut à tergo potius, quàm præ se flumen habeat, &
 ut ædificij frons auersa sit ab infestis eius regionis ventis, & amicissimis aduer-
 sa: quum pleriq; amnes estate vaporantes, hyeme frigidis nebulis caligent, quæ
 nisi vi maiore inspirantium ventorū summouentur, pecudibus, hominibusq;
 conferunt pestem. In salutaribus igitur locis ad orientem, vel ad Meridiem,
 gravibus ad septentrionem villa conuertitur, eademq; semper mare rectè
 conspicit, quum pulsatur, aut fluctu respergitur, nunquam ex ripa, sed pau-
 lum summa à littore. Nam præstat à mari longo potius intervallo, quàm
 breui refugisse, quia media sunt spatia grauioris halitus. Nec paludem vici-
 nam esse oportet ædificiis, nec iunctam militarem viam, quod illa caloribus
 noxium virus eructat, & infestis aculeis armata gignit animalia, quæ in nos
 densissimis examinibus inuolant, tum etiam natricum, serpentumq; pe-
 stes, hyberna destituta vlgine, cœno, & fermentata colluue venenatas e-
 mittit, ex quibus sæpè contrahuntur cæci morbi, quorum causas ne Medici
 quidem perspicere queunt; sed & anni toto tempore situs, atque humor in-
 strumentum rusticum supellectilemque, & inconditos, conditosque fru-
 ctus corrumpit. Hæc autem prætereuntium viatorum popularionibus, & as-
 siduis diuertentium hospitibus, infestat rem familiarem, propter quæ censeo ciui-
 modi vitare incommoda, villamque editiore situ condere, ut frons eius ad o-
 rientem æquinoctialem directæ sit: nam temperatum libramentum hyema-
 lium ventorum, & æstiuorum tenet, quantoq; fuerit ædificij solum pronius o-
 rienti, tanto & æstate liberius capere perflatus, & hyemis procellis minus in-
 festari, & matutino regelari ortu poterit, ut cœcreti rores liquecant, quoniam
 ferè pestilens habetur, quod & remotum, ac sinistrum Soli, & apricis flatibus.
 Palladius enim postulat in loco fieri aliquanto editiore, & sicciore, & propter
 iniuriam fundamentorum, & ut læto fruatur aspectu. Sed totius fabricæ tra-
 ctus vnus lateris longitudine, in quo frons erit, meridianam partem respiciat,
 in primo angulo excipiens ortum Solis hyberni, & paululum ab occidente a-
 uertatur hyemali. ita proueniet, ut per hyemem Sole illustretur, & calores
 eius æstate non sentiat. Didymus etiam necessarium autumat in altioribus
 locis ædificare. ad sanitatem enim, & speculationem, & regionis collustratio-
 nem hic locus aptissimus existit. Cæterum tota figura domus ad orientes ex-
 trueda est, itemque fores: venti enim ex orientis partibus spirantes, salu-
 berrimi sunt, & Solis calor citius irrumpens attenuat, & dissipat omnem aëris
 crassitudinem, ac caliginem. Nec verò humiles domos, aut arctas facere opor-
 tet, sed spatiosas, & amplas, & altas. Quidam ad Meridiem domum extruere
 consulant, utpote plurimum Solem diutissimè habentes, verum ipse ad ori-
 entem pronunciat, propterea quod Auster à Meridie spirans humidus & in-
 qualis morbosissimus existit. Sed mihi non videtur vbique locorum ædifican-
 dam

dam villam, ut
 bus & aura feri
 per Aquilole
 nes ventos alle
 raneis veniant,
 vallu fauces cel
 aut minus æstu

Deru

Q VONIA
 & discorde
 bra descriptere
 stica nō intelli
 mum describere
 indigere, aliis
 uos, ob id prin
 mox rusticam
 & rerum neces
 urbanam, alter
 liariter loquem
 10 rur, vt spectent
 occidentem æq
 noctialem, sed
 tem. Balnearia
 vesperū illustri
 hyeme plurim
 tate ædificiorū
 necessaria, cui
 mini fortuna o
 est sustinere, q
 30 quis casus incu
 lionereparetur
 & æstati, & hy
 ta, vt possit e
 uæ mansione
 Didymus. B
 etum verran
 & purum aëre
 eis in viciniā
 bent ad terra
 40 cōiecta in ipsa

dam villam, vt æquinoctium orientem Solem spectet; nam ista, quæ de solibus & aura feruntur, pro regionum sorte mutari in promptu est, vt non semper Aquilo lenis, nec Auster vbique insalubris. Perdoctè quidem Celsus omnes ventos assererat, qui à mari caderent, esse densiores, qui autem à mediterraneis veniant, nunquā non esse leniores. Et vitandas ventorum gratia primas vallium fauces censeo: nam illic venti nimium frigentes sunt, si per vmbra veniunt, aut minus æstuosi, vbi per constratum, & collustratū ab multo Sole applicent.

De rustica urbana patrisfamilias domo. CAP. XXIII.

QVONIAM antiquos agricolas in rusticæ domus constitutione varios, & discordes video, ac satis inperspicuè nō solum domum, sed eius membra describere: nec minus recentiores aliqui architecti falluntur, hi quia rustica nō intelligunt, illi non urbana: nos igitur ex sententia villicam urbanā domum describemus. Diximus villam hominibus, animalibus, & instrumentis indigere, alijsq; necessariis, & homines diuidi in patremfamilias, villicū, & seruos, ob id primo patrisfamilias domum construemus, siue rusticam urbanam, mox rusticam, in qua villicus & operarij se recipient, tertio instrumentorum, & rerum necessariarū, vt torcularia vini, & olei, aliorumque. Columella vnā urbanam, alteram rusticam, tertiam fructuariam vocat, nos de singulis peculiariter loquemur. Idem ait. Urbana domus in hyberna, & æstiuā sic digeratur, vt spectent hyemalis temporis cubicula brumalem orientem; cœnationes occidentem æquinoctialem. Rursus æstiuā cubicula spectent meridiem æquinoctialem, sed cœnationes eiusdem temporis prospectent hybernū orientem. Balnearia occidenti æstiuo aduertantur, vt sint post meridiem, & vsq; in vespertū illustria. Ambulationes Meridiano æquinoctiali subiectæ sint, vt & hyeme plurimū solis, & æstate minimū recipiant. Xenophon: Non tam varietate ædificiorū, atq; ornatu illustretur, quā vili supellectili ac habitantibus necessaria, cuius gratia facta est. Palladius. Edificium pro agri merito, & domini fortuna oportet institui, quod plerunque immodicè sumptum, difficilior est sustinere, quā condere. Ita igitur æstimanda est eius magnitudo, vt si aliquis casus incurrerit ex agro, in quo est, vnius anni, aut vt multū biennij pensione reparetur. Forma tamen eiusmodi vt ad habitationē breuiter collectas, & æstati, & hyemi præbeat mansiones. Quæ hyemi parantur, ita sint constitutæ, vt possit eas hyberni Solis totus propemodum cursus hilarare. Sed si æstiuæ mansiones sunt, orientem solstitialem, & partem septentrionis aspiciant. Didymus. Balnea facere oportet, vt non ad Boream, & septentrionem aspectum verrant, sed ad occasum hybernū, aut meridiem. Sint autem ampla, & purum aërem suscipientia. Etenim sterquilinijs, & cœno fœtentibus locis in vicinia non existentibus purus aër ingreditur. Fornaces in his esse debent ad terram formatæ, introspectantes, inclinatæ, deorsum tendentes, vt collecta in ipsas ligna intro procedant, neque exitum habeant, verū flamma

intus delitescens, multam caliditatem cellæ, ac vasis de se præbeat. Hæc antiquorum doctrina est. Sed ego vellem æconomi domum animi gratia cōstru-
ctam, rusticam verò emolumentum. Herilis altera æstiuæ, altera hyberna. Cubi-
cula hyemis spectent brumalem orientem, cœnatio occidentem æquinoctia-
lem, cubicula æstiuæ Meridiem, cœnatio hybernæ occidentem, ambulatio
ad meridianum æquinoctium exposita sit: & sic pro cœli, regionisque consti-
tutione alibi, atque alibi aliter habenda censeo, quoad frigida calidis, & vda
siccis contemperentur. Occupet tectum non feracem agri locum, sed alio-
quin dignissimum, inde omnis auræ, solis aspectusque commoditas, & volu-
ptas capiatur. Venientem hospitem honestissimis excipiet spatiis, spectabi-
tur, spectabitque urbem, oppida, mare, fusamque planitiem, colliū & montium
prospectum, horrorem delitias, piscationum, venationumque; illecebras in o-
culis expositas habeat. Tuis non desint ambulationes porticis, quibus ad gra-
tos per brumam soles senes confabulentur, & familia diem agat festum, æsta-
te fruatur umbra. Primaria ædis pars atrium est, proximè cœnacula, subinde
singulorum cubilia, postremo conclauia. In atrium cætera membra, velut in
forum publicum ædis confluant, ex quo non aditus modo, sed luminum et-
iam commoditas importetur, cuius spatium amplum, apertum, & dignum. Et
voluerunt alibi tecto opertum, alibi sub dio, alibi partim apertum, partim nu-
dum, alibi vno latere, alibi pluribus, alibi lateribus porticum adiungere. In eo
cōmoditatis gratia adhibeatur, ut frigenti regione acerbitas Boreæ, in æstuo-
sa plaga molesti soles excludantur, cœli gratissimus spiritus admittatur, & lu-
cis iucundissimæ copia vndique influat: patebitque in medio ipsius vestibuli,
& aditus non arduus, nō obscurus, non arctus. Porticum veteres ad Me-
ridiem ponendum censuere, quod æstate Sol sublimiore ambiens cyclo non
immittat radios, hyeme submittat. Æstiuis cœnaculis aquam in primis, & hor-
torum viridia exposcunt, hybernis teporem, & focum. In vtrisque amplitu-
do, hilaritas, & lautities opratur. Cœnaculis adiunctæ sint coquina, & cella
obsonaria, ubi reliquias cœnæ, vasa, & mantilia referantur. Coquina nō tam
longè semouenda, ut quæ calida conuiuiis exiguntur, inter portandum refri-
gescant, nec tam propè, ut patellarum, & cortinarum odor, & strepitus exau-
diatur. Conclauis puellæ & coniuges contineantur. Sed hæc pro rustica urba-
na domo sat sint. aliam reperiēs à Plinio nepote descriptam.

De rustici domo, seruorum, & animalium. C A P. XXIIII.

DIXIMVS de herili domo, nunc ad rusticam transeamus, quam nō lon-
gè ab herili esse oportet, ut quæ quisque agat, & quæ factu opus sit, in-
telligat. Huius munus erit fructus seruare, homines, & instrumenta. Varro
præcipit providendum ubi familia versetur, si fessi opere, vel frigore, vel ca-
lore, ubi commodissimè possint sese quieti recipere. Villici prope ianuam
cellam esse oportet, eumque scire, qui introeat, aut exeat noctu, quidve ferat, 40
præfer-

beat. Hæc anti-
bi gratia cōstru-
hyberna. Cubi-
em equinoctia-
tem, ambulatorio
nisque confida-
calidis, & vda-
locum, sed alio-
ditas, & volu-
tatis, spectabi-
liū & montium
illecebras in o-
s, quibus ad gra-
tū festum, alta-
macula, subinde
membra, velut in
ed luminum et-
m, & dignum. Et
tum, partim nu-
adiunxere. In eo
boreæ, in æstuo-
limitatur, & lu-
ipius vestibul-
vereres ad Me-
diens cyclo non
in primis, & hor-
trisque amplitu-
quina, & cella
Coquina nō tam
prærandum refri-
steptus exau-
pro rustica vrba-

XIII.

is, quam nō lon-
facto opus sit, in-
strumenta. Varro
el frigore, vel ca-
ci prope ianuam
tu, quid veferat, 40
præfer-

præsertim si hostiarius est nemo. In primis culina videnda, vt sit admota, quod
ibi hyeme antelucanis temporibus aliquot res conficiuntur, cibus paratur, &
capitur. Columella aliquanto distinctius tradit. In rustica parte, alta & ma-
gna culina ponetur, vt & contignatio careat incendij periculo, & in ea com-
modè familiares omni tempore anni morari queant. Optimè solutis seruis
cellæ Meridiem æquinoctialem spectantes fient, vinctis quavis saluberrimum
subterraneū ergastulum plurimis, sitq; id angustis illustratum fenestris, atq; à
terra sic æditis, ne manu contingi possint. Villico iuxta ianuam fiat habitatio,
vt introeuntium, exeuntiumq; conspectum habeat. Procuratori supra ianuam
ob easdem causas, vt is tamen villicum obseruet ex vicino. Bubulcis & pastori-
bus cellæ ponantur iuxta sua pecora, vt ad eorum curam sit opportunus ex-
cursus. Omnes tamen quamproximè alter ab altero debent habitare, ne villi-
ci diuersas partes circumeuntis sedulitas distendatur, & vt inter se diligentia,
& negligentia cuiusque testes sint. Hæc ita ordinauit, quia præmonuerat Ca-
to, villicum providere debere, vt suo quisque loco cubet, & vti iumenta pa-
bulum habeant. Descriptis hominum habitationibus, subnectemus & anima-
lium. Varro in villa faciunda iubet stabula, ita vt bubilia sint, vbi hyeme pos-
sint esse calidiora. Columella. Pecudibus fiant stabula, quæ neq; frigore, ne-
que calore infestentur: domitis iumentis duplicia bubilia sint, hyberna, atque
æstiuæ: cæteris autem pecoribus, quæ intra villam esse conuenit, ex parte tecta
loca, ex parte sub dio, parietibus altis circumsepta, vt illic per hyemem, hic per
æstatem sine violentia ferarum conquiescant. Sed omnia stabula sic ordinen-
tur, ne quis humor influere possit, & vt quisq; qui ibi conceptus fuerit, quàm
celerrimè dilabatur: vt nec fundamenta parietum corrumpantur, nec vngu-
læ pecudum. Lata bubilia esse oportebit pedes x, vel minimum i x. quæ men-
sura & ad procumbendum pecori, & iugario ad circumeundum laxa minist-
ria præbeat. Non altius ædita esse præsepia conuenit, quàm vt bos, aut iumen-
tum sine incommodo stans vesci possit. Palladius. Stabula equorum vel bouum
meridianas quidem plagas respiciant, non tamen egeant septentrionis lumi-
nibus, quæ per hyemem clausa nihil noceant, per æstatem patefacta refrige-
rent. Ipsa stabula propter vngulas animalium ab omni humore suspensa sint.
Boues nitidiores fient si focum proximè habeant, & ignis lumen intendant.
Octo pedes ad spatium standi singulis bouum paribus abundant, & in porre-
ctione xv. Planæ roboreæ supponantur stationibus equorum cum stramine,
vt iacentibus molle sit, stantibus durum. A quibus Vitruuius. Culina con-
iuncta habeat bubilia, quorum præsepia ad focum, & orientis cæli regionem
spectent, ideo quod boues lumen & ignem spectando horridi non fiunt. Item
agricolæ regionum imperiti, non putant oportere aliam regionem cæli boues
spectare, nisi ortum Solis. Bubiliū autem debent esse latitudines nec mino-
res pedum denu, nec maiores quindenum, longitudo vti singula iuga nec
minus occupent pedes septenos. Ouilia & caprilia ita magna sunt facienda, vt

singula pecora, atque, minus pedes quaternos, & semipedem, ne plus senos possint habere. Equilia maximè in villa, ubi loca calidissima fuerint, constituantur, dum ne ad focum spectent: quum enim iumenta proxime ignem stabulantur, horrida fiunt. Item non sunt inutilia praesepia, quæ collocantur extra culinam in aperto, contra orientem. Quum enim in hyeme anni sereno cælo in ea traducuntur, matutino boues ad Solem pabulum captantes fiunt nitidiores. Columbarium ita construere docet Palladius. Illud accipere potest sublimis vna turricula, in prætório constituta, laeuigatis, ac dealbatis parietibus, in quibus à quatuor partibus (sicut mos est) fenestellæ breuissimæ fient, ut columbas solas ad introitum, exitumque permittant. Nidi figurentur interiorius. Quintilij ita exactius docent. Locus, in quo columbarium construendum est, non habeat domos propinquas. Statuantur columnæ pro magnitudine extruendi operis, eaque circulariter. Deinde supra columnas capita imponantur, & supra columnatum capita aliæ columnæ lignæ ponantur, & supra columnas in circuitu duæ domunculae extruantur, altitudine cubitorum septem. Fiatque in parietibus ab occasu fenestra lucis gratia, ab ortu alia, in qua custos collocetur, qui columbas cohibeat, & vade ad pascua exire oportet. A meridie ianua construatur, per quam ingrediatur is, qui auium curam gerit. Sic ab reptilibus illas conseruabuntur, neque est possibile reptilia per columnas ascendere, quum sint diligenter oblitæ, & tectorio inducto explanata. Neque feles insidiari possunt, quum domus longè absint; nidi intus construendi à pavimento vsque ad fastigium. Apponantur singulis nidis asseres, ut per ipsos transitus fiat. Effodiatur in domo lauacrum, quo & bibere, & lauari possint, ne occasione præbenda aquæ, homo eas frequenter perturbet. Verrere domum, & stercurus euehere necessarium, & si quid intus refarciendum,

De rustica fructuaria domo, & de horreo. CAP. XXV.

Nunc de fructuaria domus parte loquemur, quæ in horrea, apothecæ, cellam oleariam, torculariam, vinariam, scenilia, paleariaque diuiditur. Dicemus primò de horreis, quæ & locorum, & situs diuersitate, varia fiunt. Nam sunt & locorum peculiaria quædam, quæ vim maximam conseruandi frumenta habent. In Cappadocia, loco quodam Petra vocato, vel quadragenos annos frumenta fecunda, & ad sementem percomoda durare proditum est à Theophrasto, sexagenos autem, & septuagenos ad usum cibarij seruari posse idonea. Locum autem istum cum alijs excelsum, tum flatibus & auris esse apertum, & ab exortu, & occasu, Meridieque aditum. Feruntque in Media, & reliquis excelsis tractibus condita diu perdurare valere. Sunt & alij qui granaria habent sub terris, ait Varro, uti speluncas, quas Syros vocant, ut in Cappadocia, & Thracia, alij, ut in Hispania citeriore, puteos, ut in agro Carthaginensi, & Oscensi. Horum solum paleis substernunt, & curant ne humor, aut aer tangere possit, nisi quum promittitur ad usum: quod enim spiritus non peruenit, ibi non

non oritur curio
miliu verò pl
dam videri hor
in sicca positio
ru) cuius solum
ri, non falsa ma
de quum exaru
amurcam mista
cantur, atque, exp
nis subulantur:
bent, & latebr
sitio illa pensu
Triticum con
ac septentrio
ret. Granari
pulia. Colum
tum, fœnum,
modicis fenest
gida, & minim
ferunt. Pliniu
habere vllas.
pendunt gran
à fundo. Alij
si regulis sub
refrumento
granaria sub
nit; ita enim
ta diu seruari
stiolas, quæ
stant, boni
nis desiderat
stabilis pos
debet esse
supra terra
à Boræa, &
humiditas
mè autem
ditare pro
ex qua col
40 nigros pul
pulis calid

non oritur curculio. Sic conditum triticum manet vel annos quinquaginta,
 milium verò plus annos centum. Nec me præterit, inquit Columella, quibus-
 dam videri horreum camera contextum sedem frumentis optimam, (idque
 in sicca positione villæ: nam quamuis granum robustissimum corrumpitur fi-
 tu) cuius solum terrenum, prius quam cõsternatur, perfossum, & amurca recen-
 ti, non falsa madefactum, velut signinum opus pauculis cõdensatur. Tum dein-
 de quum exaruit, simili modo pavimenta testacea, quæ pro aqua receperint
 amurcam mistam calci & arenæ, supersternuntur, & magna vi pauculis incul-
 cantur, atque expoliuntur, omnesque parietum atque solium iuncturæ testaceis pulvi-
 nis fibulantur: nam ferè quum his partibus ædificia rimas egerunt, caua præ-
 bent, & latebras subterraneis animalibus. Sed locis, quæ redundat vligine, po-
 sitio illa pensilis horrei probatur ab omnibus agricolarum magistris. Varro:
 Triticum condi oportet in granaria sublimia, quæ perflentur vento ab exortu,
 ac septentrionum regione, ad quæ nulla aura humida è propinquis locis aspi-
 ret. Granaria supra terram sublimia faciuntur in Hispania citeriore, & in A-
 pulia. Columella præcipit, ut siccæ res congerantur in tabulatis, ut frumen-
 tum, scenum, frondes, paleæ, cæteraque pabula. Sed granaria scalis adæquantur, &
 modicis fenestellis Aquilonibus inspirentur: nam ea cœli positio maximè fri-
 gida, & minimè humida est, quæ utraq; perennitatem conditis frumentis af-
 ferunt. Plinius. Horrea supernè impleri, nec ad flatum admittere, aut fenestras
 habere vllas. Alij ab exortu tantum æstiuo, aut septentrione. Alij contra sus-
 pendunt granaria ligneis columnis, & perflari undique malunt, atque etiam
 a fundo. Alij omnino pendente tabulato extenuari granum arbitrantur, &
 si tegulis subiaceant, subferuescere. Columella & Fauonium ventum confer-
 re frumento dicit, de quo quidem miratur, siccissimum alioqui. Vitruuius
 granaria sublimata, & ad septentrionem, aut Aquilonem spectantia dispo-
 nit; ita enim frumenta non poterunt cito concalescere, sed afflatu refrigera-
 ta diu seruari: nam & cætera regiones procreant curculiones, & reliquas be-
 stias, quæ frumentis solent nocere. Ideo granaria, quæ ad Solis cursum spe-
 ctant, bonitatem cito mutant. Palladius. Horreorum situs ipsam septentrio-
 nis desiderat partem, & superior, & longè ab omni humore, & latamine, &
 stabulis ponendus est, frigidus, ventosus, & siccus. Ab horreis tamen Auster
 debet esse auersus. Tarentinus Græcus: probè frumentum concludi in locis
 supra terram, qui lumen ab oriente habeant. Adspiretur locus item moderatè
 à Boræa, & Fauonio, & auertatur ab Austro, & eiusmodi ventis. Non habeat
 humiditatem, aut graueolentiam aliquam, aut halitum iniucundum; maxi-
 mè autem ab equorum, & bouum stabulis aliisque eiusmodi, atque omni cali-
 ditate procul absit. Alij alias situs condiciones addidere. Nunc de materie,
 ex qua construendum horreum differemus. Theophrastus parietes calcæ-
 40 uigatos putrefactionis initia præbere dixit, quia hæc calorem auget, & quum
 puluis calidus & siccus sit, & illimetum calcis calorem susceptum utique seruat:

nam & quum vniuersum, altumque acervatum est, putret: sic enim plus caloris exoritur. Hæc Theophrasti verba. Omnes admonent ex variis rebus, & amurca tectorium parietibus horrei inducere. Plinius ab eo. Granaria sine calce constructa, quum sit frumento infestissima. Varro. Parietes & solum tectorio marmorato loriciandi, sin minus ex argilla, misto acere & frumeto, & amurca, quod murem, & vermem nō patitur esse, & grana facit solidiora, & firmitiora. Columella. Parietes oblinuntur amurca, subacto luto, cui pro paleis admista sint arida oleastri, vel si ea nō sint, oleæ folia. Deinde quum prædictum tectorium inaruerit, rursus amurca respergitur, qua siccata frumentum inferitur. Ea res ab noxa curculionum, & similium animalium commodissimè videtur conditas fruges defendere, quæ nisi diligenter repositæ sint, celeriter ab iis consumuntur. Palladius. Solum omne bipedis sternatur, vel minoribus laterculis, quos suffuso testaceo pavimento debemus imprimere. Sed factis granariis amurca luto mista parietes linantur, cui arida oleastri, vel oleæ folia pro paleis adiciantur: quo tectorio siccato, rursus amurca respergatur: quæ ubi siccata fuerit, frumenta condentur. Hæc res curculionibus, & ceteris noxiis animalibus inimica est. Tarentinus aliqua addit. Illinantur parietes luto, uti pro paleis pili ammisti sint, deinde argilla alba intus, & foris obducantur. Post hæc cucumeris sylvestris radices & folia ad biduum aqua macerato, & cum aqua calcem arenariam subigito, indeque internas partes diligenter oblinito. Quidam etiam ad calcem pecorum urinam admiscunt, tanquam quæ animalia necet. Sed & testaceam calcem, quæ pavimento inducitur, lotio macerant. Quidam cinerem sarmentorum quercus eadem gratia frumento inspergunt, alij bouum sterces aridum. Alij absynthij, aut abrotoni arida virgulta imponunt, ampliusque folia semperuini arida. Præstat autem calcem arenariam amurca subigere; hæc enim bestiolas omnes corrumpit, & frumentum solidius, & densius facit. Quapropter alij amurcam ad dimidias decoctam parietibus aspergunt, atque ubi inaruit, fruges inferunt, ac deponunt. Varro. Eo modo construenda granaria sunt, ut non solum à lateribus per fenestras, sed etiam subtus à solo ventus regellare possit. Plinius etiam monet, ut à fundo perflectari possit. Tarentinus, ut per medium habeat densos & frequentes canales, per quos & calidus vapor expiret, & aura refrigerans inspiret. Columella lacubus distingui granaria perhibet, ut separatim quæque legumina ponantur. Palladius. Tunc diuisas cellas (si magnus sperabitur seminum modus) grano cuique tribuemus, & si terræ pauperies minora promittit, vel craticulis podiis erunt discernenda granaria, vel vimineis vasculis relictis. Tenuis colligemus. Columella non ventilanda frumenta censet: nam multos esse scribit opinantes, curculiones ventilatione arceri posse, si exesæ fruges ab eis fuerint, & quasi refrigerentur, quod falsissimum existimat: neque enim hoc facto expelluntur animalia, sed immiscuntur totis acernis: qui si mancant immoti, summis tantum partibus infestantur, quoniam infra mensuram palmi non nascitur cur-

tur curculio. lo-
periculo subit
erit, integro in-
dit. Nihil rame
in alterum locu
horreis inferat
menti diuturni
è longioribus
conspurgunt,
10 alius aliud affir-
synthium, ab
corianni folia
ca (ut Gracia
bus portò pr
da, & cribat
gulos frumen-
dem insperg
frumento sub
tegere, & rur
20 enim hoc mo-
munepersue

L OQUE
Lqua cult
Vatro villam
& quæ fenel
situm describ
proximam, l
30 teris odoris
truius ad se
nim aliapac
consuluma
certè fenel
noctialem
fenestram
debet sub
trum odore
bus qui ext
40 & ab omni

tur curculio, longēque præstat id solum, quod iam vitiatum est, quàm totum periculo subiicere: nam quum exiget vsus, facile est, eo sublato, quod vitiatum erit, integro inferiore vti. Quod idem à Plinio, & Palladio excipitur. Sed addit. Nihil tamen diu custodiendis frumentis commodius erit, quàm si ex arcis in alterum locum vicinum transfusa refrigerentur aliquantis diebus, atque ita horreis inferantur. Aliqua nunc addemus remedia, à maioribus tradita ad frumenti diuturnitatem. Plinius. Sunt qui rubetam ranam in limine horreipede è longioribus suspensam inuehere iubeant. Varro. Quidam ipsum triticum conspergunt, quum addant circiter in M modium quadrantal amurcæ. Item
 10 alius aliud affirmat, aut aspergit, vt chalcidicam, aut caricam cretam, aut absinthium, absinthiiue decoctum. Item huius generis alia. Palladius. Aliqui corianni folia frumentis miscent ad seruandum profutura. Herba coniza sicca (vt Græci affirmant) substrata frumentis, addit ætati. Tarentinus. Omnibus porro præstat terram perfrigeratam, argillosam, aut mali punicæ folia arida, & cribrata antea præparata habere, & quum frumentum deponitur, ad singulos frumenti medimnos, argillosæ terræ chœnicem, aut foliorum tantundem inspergere. Vtilissimum porro conizam semifrigefactam in pauimentum frumento substernere, & post diffusos decem medimnos rursus conizam integere, & rursus frumentum super ingerere, donec totum deponatur. Quod
 20 enim hoc modo depositum fuerit nō solum in multos annos à putredine immune perseverat, verum etiam idem pondus seruabit in paneficio.

De cella vinaria, torculari, & vasis subtorcularibus. CAP. XXVI.

LOQUEMVR de cella vinaria. Columella in plano cellas statuendas dicit, quæ custodiam recipient rerum humidarum, vt vini, olei, cæterarumque. Varro villam laudari ait, quæ vinariam cellam habeat, ad modum agri aptam, & quæ fenestras habeat, vt dolia aërem frigidiorē excipiant. Palladius eius situm describens, septentrioni oppositam esse debere, frigidam, vel obscuræ proximam, longē à balneis, stabulis, furno, sterquiliniis, cisternis, aquis, & cæteris odoris horrendi, ita instructam necessariis, vt non vincatur à fructu. Vitruuius ad septentrionem habere oportere luminaria fenestrarum, quum enim alia parte habuerint, qua Sol calefacere possit, vinum, quod erit in cella, confusum ab calore, efficietur imbecillum. Plinius. Latus cellæ vinariæ, aut certè fenestras obuerti ad Aquilonem oportere, vel vsque in exortum æquinoctialem. Florentinus. In regionibus calidis ad orientem, & septentrionem fenestram habeat, in frigidis ad Meridiem. Sed Columella. Cella procul esse debet sub mora à balneis, furno, & sterquilinio, reliquisque immunditiis, tetrum odorem spirantibus, nec minus à cisternis, aquisve salientibus, ex quibus qui extrahitur humor vinum corrumpit. Florentinus. Procul à torculari,
 30 & ab omni graueolentia remota, nihilq; prorsus fœtidum cellis vinariis con-

cludendum est, velut coriacea graecolentia, caseus, allium, oleum, ficus, vasa inutilia. Omnia enim huiusmodi humiditatem de vino attrahunt, & computrescunt, rursusq; ad vinum ipsum graecolentiam referunt. Submouenda est etiam à lacu, stabulo equorum, loco secessus, stabulo palearum, pistrino, balneo: si verò reperiantur circumstita arbores, excidantur. Radices enim in se circumplectentes eam corrumpunt, & odorem ad se adfricant, maximè fici, & punicæ. Plinius. Sterquilinia & arborum radices procul abesse, omniaque odoris evitandi, facillimo in vina transitu, ficos utique, & caprificos. Nunc eius constructionem aggrediamur. Varro inquit. Sit pavimento procliui in lacum, in quo, si contigerit, defluens vinum excipietur, ne pereat, quod sæpè, 16 vbi conditum vinum nouum, orca, vt in Hispania, feruore multum rupta, nec non & dolia in Italia. Palladius cellam vinariam ita dispositam esse iubet, vt basilicæ ipsius forma calcatorium loco habeat aliore constructum, ad quod inter duos lacus, qui ad excipienda vina hinc inde depressi sint, gradibus tribus ferè, aut quatuor ascèdatur. Ex his lacubus canales structi, vel tubi fictiles circa extremos parietes currant, & subiectis lateri suo doliis per vicinos meatus, manantia vina defundant. Si copia maior est, medium spatium cupis deputabitur, quas ne ambulacra prohibeant, basellis altioribus impositas, vel supra obruta dolia possumus collocare spatio inter se largiore distantes, vt (si res exigat) curantis transitus possit admitti. Quod si cupis locum suum deputabimus: 20 is locus ad calcatorii similitudinem podiis breuib, & testaceo pavimento solidetur, vt etiam si ignorata se cupa diffuderit, lacu subdito excipiantur non peritura vina, quæ fluxerint. Florentinus. Dolia locanda esse vt vicissim & se mutuo non contingant, pedali mensura in medio relicta, quo & hi, qui cellæ vinariæ curam gerunt, facilem habeant ad interiora dolia ingressum, & si vnum dolium acefcat, propinquum sibi non simul peruerat: nihil enim adeò velociter contagionem percipit, velut vinum, præsertim mustum. Cæterum dolia in ficcis locis locanda sunt, vt in terra sint duæ ipsorum partes, si regio infirmum & tenue, & nullius nutrimenti vinum ferat. Si verò potens, & crassum, dimidia ipsorum pars. Subiicienda vnicuique dolio arena crassa, & sicca: super hanc verò insternendus est iuncus vnguentarius mediocri copia: reliquum terra egesta explendum, quæ commode sit ad Solem exassata. Arena enim, & terra sicca omnem humorem in se ipsas attrahunt, tum ex terra, tum eum, qui in ipsis doliis consistit, ampliusque dulce vinum facit. At verò vim ipsius hoc modo coniectare licet. Si namque nouam sportulam arena expleueris, vinumque acefscens infuderis, percolabitur purum, & sine odore: si verò non sit arena, terra oblata vtendum prius insolata. Plinius etiam doliis interualla dari præcipit, ne inter se vitia serpent, contagione vini semper ocysissima. Nos autem cellam probamus subterraneam: hæc enim loca frigida sunt. Vina tandiu recta manebunt, quandiu frigida sunt. 40 Sint enim occlusa, ne ventis infestentur; nam qui à Subtolano, Meridie, & ab oc-

ab occasu ven
niculæ autem
næ hebescit: q
to. Motu frac
cursu immuni
soluiturque:
rem, fumum,
longè abigito
crius, & forti
cendum. qua
xra multitudi
operatij locu
spatium con
afferti possi
culatium v
ta superna,
delabens, v
vndiq; pluri
lauetur aqua
lo, ne compu
tes, multam
euadere que
ter lotum, &
mella, nec ob
pam decoqu

C E L L A
in lacu
nestras hab
humido. Ce
dius omnis
quod min
contingit
quia fum
meridian
quum pre
a Meridie
sed repore
tionem &
40 tia, per m

ab occafu veniunt, præfertim bruma & vere, profectò perturbantur. Ad Canicula autem sydus etiam à Borëa commouentur. Solis radio acefcit, Luna hebefcit: ob id eius latus, & lumina à Subfolano in Aquilonem obuerti-
 to. Motu fracefcit, elanguefcit que, ob id pofitio eius loco ftabili, & à curruum
 curfu immuni. Odoris rapax vinum eft, vt alibi diximus, & fermè eneruatur,
 foluitur que: ob id fordes, & malè odorata omnia, vlginem, craffum vapo-
 rem, fumum, hortifpiramenta, ex cepe, braffica, fico & caprifico, expurgato,
 longè abigito, penitus que excludito. Dolia quò capacia, eò vinum erit a-
 crius, & fortius. Dicto de cella vinaria, nunc de torculari, & subtorculari di-
 10 cendum. quam curam Florentinus affumpfifit describendi. Torcular itaque iu-
 xta multitudinem apportandorum fructuum a dificandum eft, quo habeant
 operarij locum, in quo commodè diuerfari queant, & vt ipfæ vix habeant
 fpacium commodi fitus, vt & tempore vrgente fructus maiore compendio
 afferri poffint, & ne operarij odore fuffocentur. Oportet autem totum tor-
 cularium vndiquaque leuiffimo tectorio oblitum effe, neque minus tabula-
 ta fuperna, vt nihil terreum, neque animalium vllum in ipfis generatorum
 delabens, vinum inquinet. Sit amplius torcular calidum, & lumen habeat
 vndiq; plurimum. At locus & vas subtorcularium fit ampli oris, & poft vsum
 lauetur aqua marina, & fpongia detergatur. Relinquatur autem fine opercu-
 20 lo, ne computrefcat, & quia mures aliquando in subtorcularium vas inciden-
 tes, multam graueolentiam inducunt, lignum latius imponendum, per quod
 euadere queat mus, fi cafu illabatur. Quando eo quis rurfus vfurus eft, simili-
 ter lotum, & deterfum fuffumiget. Cortinale, vbi defrutum fiat, iubet Colu-
 mella, nec obfcure, nec anguftum fit, vt fine incommodo minifter, qui fa-
 pam decoquet, verfari poffit.

De cella olearia, & torculari eius. CAP. XXVII.

CELLAM oleariam Varro ad modum agri aptam, & pauimento proclia-
 30 in lacu conftruendam, in quo fi contigerit defluat oleum, excipiat: fe-
 neftras habeat, vt aërem calidiorem recipiat loco plano, & potius arido, quàm
 humido. Columella, Torcularia, cella q; olearia calida effe debet, quia còmo-
 diùs omnis liquor vapore foluitur, ac frigorebus magis constringitur. Oleum,
 quod minus prouenit, fi cògelatur, fracefcit: fed vt calore naturali eft opus, qui
 contingit pofitione cœli, & declinatione, ita non eft opus ignibus, aut flâmis,
 quia fumo & fuligine fapor olei corrumpitur: propter quod torcular debet à
 meridiana parte illuftrari, neceffe, ne habeamus ignes, lucernam q; adhibere,
 quum premetur olea. Vitruuius. Olearia autem ita eft collocanda, vt habeat
 à Meridie, calidis que regionibus lumen. Non enim debet oleum congelari,
 fed tepore caloris extenuari. Magnitudines autem earum ad fructuum ra-
 tionem & numerum, & doliorum funt faciendæ, quæ quum funt culea-
 40 ria, per medium occupare debent pedes quaternos. Ipſum autem torcular,

si non coelestis torquetur, sed vectibus & prælo premitur, ne minus longum pedes quadraginta constituantur: ita enim erit vectiario spatium expeditum. Latitudo eius ne minus pedum senum denum; nam sic erit ad plenum opus facientibus libera versatio, & expedita. Sin autem duobus prælis loco opus fuerit, quatuor & viginti pedes latitudini dētur. A quibus Palladius. Olearis cella meridianis sit obiecta partibus, & contra frigus munita, ut illi per specularia debeat lumen admitti: ita & operas, quæ hyeme futurae sunt, nullus algor impedit, & oleum quum premetur, adiutum teporibus, frigore non valebit astringi. Traperis, & rotulis, & prælo nata est forma, quam consuetudo dictauit. Receptacula olei semper munda sint, ne nouos sapes, infecta veteri rancore corrumpant. At si quis maiori diligentia studet, subiectis hinc inde cuniculis pauimenta suspendat, & ignem suggerat fornace succensa: ita purus calor, olei cellam sine fuminidore vaporabit, quo saepe infectum colore corrumpitur, & sapore.

De oporothecis. CAP. XXVIII.

DIXIMVS de horreis, cella vinaria, oleariaque, nunc de oporothecis. Vocabant antiqui ὀπωρέων autumnales fructus, qui adseruabantur: erit ergo oporotheca pomorum reconditorium, ab ὀπώρεω, ut diximus, & ἡμεῖς repositio, quod & ὀπωροφυλάκιον, vel oporophylacem quoque dicunt. Varro oporothecas iubet loco arido, & frigido exedificare, ut ad Aquilonem fenestras habeat, atque ut ea persilentur curare, nec tamen sine foriculis, ne quum humorem amiserint, pertinaci vento vieta fiant. Ideoque in iis cameras marmorato, & parietes, pauimenta quoque laudabiliter faciunt, quo frigidior sit locus. A quo eadem Plinius. In vniuersum de pomis seruandis præcipitur. Pomaria in loco frigido, & sicco contabulari, septentrionalibus fenestris sereno die patere, Austros specularibus arcere. Aquilonis quoque afflatu poma deturpari rugis. Virruuius. Poma, quæ non in ea cœli parte ponuntur, quæ est auersa à Solis cursu, non diu seruantur. De quo etiam rationem affert. Nam semper calor quum excoquit, aëribus firmitate eripit, & vaporibus feruidis exugendo naturales virtutes, dissoluit eas, & feruore mollescentes efficit imbecillas, ut etiam in ferro animaduertimus, quod quamuis natura sit durum, in fornacibus ab ignis vapore percalefactum ita mollescit, ut in omne genus formæ facilliter fabricetur. Et idem quum molle & candens est, si refrigeretur tinctum frigida redurefcit, & restituitur in antiquam proprietatem. Licet etiam considerare hæc ita esse ex eo, quod æstate non solum in pestilentibus locis, sed etiam in salubribus, omnia corpora calore fiant imbecilla, & per hyemem etiam quæ sint pestilentissimæ regiones, efficiuntur salubres, ideo quod à refrigerationibus solidantur. Sed quo modo in oporothecis fructus asseruentur, indicabimus. Varro supra paleas positos seruari rectè putat, & satis comode in tabulatis, ut in opere marmoreo, vel substratis floccis. Plinius. Colligi mala post æqui-

æquinoctium
Cadiua separa
tes peruij sp
lido & calidissi
scunt omnia. N
Aristoteles tur
Talis fortasse
templo, ante cu
tegerimi pert
10 habetur.

DIXIM
sterque
quilinia, aut
villa nouum
cens, minus b
lud, cuius late
succum, que
20 pollunt) ve
succus in eo. C
quod noua pu
tera vehantur
panitumq; so
non affliccat
qua interiect
tereant, nec
ci quicquid o
cratibus regi
30 Palladius, St
more, & pr
abundans h
Sequitur ar
da est, ut ve
lice constr
bus vngula
carent, &
perbelle an
exportand
40 vicinitate f

æquinoctium autumnale, neque ante x y lunam, neque ante primam horam. Cadiua separari, stramentis, storeis, paleisve substerni, rara componi, vt limites peruij spiritum equalem accipiant. Nos autem tabulatum laudamus in gelido & calidissimo loco, omni excluso spiritu: aëris enim inconstantia putrescunt omnia. Nam, vt diximus, ex Aquilonis flatu poma rugis deturpantur: & Aristoteles turgescit viribus poma per integrum annum seruari promittit. Talis fortasse locus erat in Micalesia Boëriæ secundum mare vrbe, Cereris templo, ante cuius simulachri pedes, si autumnales fructus expositi essent, integerrimi per totum ferè anni spatium perdurabant, vt ex Græcis authoribus habetur.

De sterquiliniis, area, nubilario, fœnili, paleario & lignario. CAP. XXIX.

DIXIMVS quæ intra villam fieri debebant, nunc quæ extra, & primò de sterquiliniis. Varro inquit: Secundum villam duo habere oportet sterquilinia, aut vnum bifariam diuisum, alteram enim in partem ferri oportet de villa nouum fimum, ex altera veterem tolli in agrum: quod enim infertur recens, minus bonum, id quum flacuit, melius, nec non sterquilinium melius illud, cuius latera, & summum, virgis & fronde vindicantur ab Sole: non enim succum, quem quærit terra, Solem ante exugere oportet. Itaque periti (qui possunt) vt eò aqua influat, eo nomine faciunt. sic enim maximè retinetur succus in eo. Columella his aliqua addit. Sterquilinia quoque duo sint, vnum, quod noua purgamenta recipiat, & in annum conseruet, alterum, ex quo vetera vehantur, sed vtrumq; more piscinarum deuexu leni cliuo, & extructum, pauitumq; solum habeat, ne humorem transmittant. Plurimum enim refert non afficcato succo fimum vires continere, & assiduo macerari liquore, vt si qua interiecta sint stramentis, aut paleis, spinarum vel graminum semina intereant, nec in agrum exportata, segetes herbidas reddant. Ideoq; periti rustici quicquid ouilibus, stabulisq; conuersum progesserunt, superpositis virgeis cratibus tegunt, nec arescere ventis sinunt, aut Solis incurfu pariuntur exuri.

30 Palladius, Stercorum congestio locum suum tenere debet, qui abundet humore, & propter fœtoris horrenda à pratorij conuertatur aspectu. Humor abundans hoc præstabit stercore, vt si quai sunt spinarum semina putrescant. Sequitur area, & nubilarium. Columella ait. Area si competit ita constituenda est, vt vel à domino, vel certè à procuratore despici possit. Ea; optima è si lice constrata, quod & celeriter frumenta deteruntur, non cedente solo pulsi-
bus vngularum tribularumque, & eadem euentilata mundiora sunt, lapillisq; carent, & glebulis, quas per trituram ferè terrena remittit area. Palladius ita per belle aream construere docet. Area longè à villa esse non debet, & propter exportandi facilitatem, & vt fraus minor timeatur, domini vel procuratoris
40 vicinitate suspecta. Sit in loco sublimi, & vndecunque perflabili, longè tamen

ab hortis, vineis, & pometis: nam sicut radicibus virgultorū profunt latamēti & paleæ, ita insidentes frondibus eas perforant, atq; arere compellunt. Sit autem vel strata filice, vel saxo montis excisa, vel sub i. so tritura tempore vngulis pecorum, & aquæ admistione solidata: clausa deinde, & robustis munita cancellis, propter armenta, quæ quum teritur, inducimur. Sit circa hanc locus alter planus, & purus, in quem frumenta transfusa refrigerentur, & horreis inferantur, quæ res in eorum durabilitate proficiet. Didymus. Aream in alto loco construere oportet, quo promptè ventum susceperet. Præ omnibus cauendum ne secundum ventum domorum, aut hortorum constitatur: etenim venti tenuissima quæque ex paleis citra animaduersionem hominum oculis inferentes, pupillas perurūt, vt ex eo multi altero, alij vtroq; oculo sint priuati. Lædunt etiam paleæ fructus autumnales foris non lignosos, & maximè vires. Quemadmodum enim sterces, sic paleæ radicibus conferunt, ramulis verò & foliis nocētissime existunt. Neq; verò minus ipsa olera lædunt, adherentes enim folia perforant, & perforata statim comburuntur. Oportet aream assidua amurca conspergere, & madefacere, insuperq; cylindro lauigare. Sic enim formicæ non iniuriabuntur. Virgilius.

Area cum primis ingenti est aquanda cylindro,

Et vertenda manu, & creta solidanda tenaci:

Ne subeant herba, neu puluere victa fatiscat.

Tum varia illudunt pestes, sæpe exiguis mus

Sub terris posuitq; domos, atq; horrea fecit:

Aut oculis capti fodere cubilia talpæ:

Inuentusq; cauis bufo, & quæ plurima terra

Monstraferunt, populatq; ingentem farris acervum

Curculio, atque inopi metuens formica senecta.

Plinius. Aream ad messem præparare oportet, Catonis sententia amurca temperata, Virgilij operosius. Maiore ex parte æquant tantum, & fimo bubulo dilutiore illinunt. Id satis ad pulueris remedium videtur. Post aream nubilarium trademus. Varro. Edificium facere oportet, sub quod tectum totam fundi subiicere possis messem, quod vocant quidam nubilarium. Id secundum aream faciendū, vbi triturratur sis frumentū, magnitudine pro modo fundi, ex vna parte apertum, & id ab area, quo & in tritura prouere facile possis, & si nubilare cœperit, inde vt rursus celeriter reicere. Fenestras habere oportet ex ea parte, vnde commodissimè perflari possit. Columella. Areæ applicari debet nubilarium, maximeq; in Italia propter incōstantiam cœli, quo collata semitrita frumēta protegantur, si subitaneus imber incefferit: nam in transmarinis quibusdam regionibus, vbi æstas pluuia caret, superuacuum est. Palladius quoq; nubilarium describit. Fiat deinde vndecunq; proximum tectum, maximè in humidis regionibus, sub quo propter imbres subitos (si coegerit necessitas) raptim, vel munda, vel semitrita ponantur. Dicemus de fœnili, paleario, &

ligna-

ignatio ex Pall
in qua parte fia
à villa propter d

FACIEND
quibus coel
enim si intra cl
sed aduersus res
apiores. Vna, v
20 lobatas cū ven
hic perfundūt
te exteriore la
in aquam, ad
paleis, obcul
truius. Ch
boum opus
loco designe
cilus hyeme
etiam ad æsta

20 mari debent,
ne impetusa p
nimū duas fa
ram, in qua lu
solo impressi
te, aut imbre
madefaciatur
Columella p
numerus col
rum debent
30 vel hominu

De
R ELLI
Varr
quarant. l
etium mili
munitat
radices vi
cunda sepe
tis implica
40 nis, aut ter

lignatio ex Palladio. Fœni, palearum, ligni, cannarum repositiones nil refert in qua parte fiant, dum modo sicca sint, atq; perflabiles, & longe remoueantur à villa propter casum futripientis incendij.

De chorte, piscinis, & pistrino. CAP. XXX.

FACIENDVM etiam, inquit Varro, plaustris, ac cætero instrumēto omni, quibus cœlum pluuiū inimicum, in chorte, vt satis magna sint tecta. Hac enim si intra clausum in conseperto, & sub dio, furem modo non metuunt, sed aduersus tempestatē nocentem nō resistunt. Chortes infundo magno due aptiores. Vna, vt interius compluiū habeat lacū, vbi aqua saliat, qui intra stylobatas cū venit, sit semipiscina. Boues enim ex aruo æstate reducti hīc bibūt, hic perfundūtur, nec minus ē pabulo quū redierūt anseres, sues, porci. In chorte exteriore lacū esse oportet, vbi maceretur lupinum, item alia, quæ demissa in aquam, ad vsum aptiora fiant. Chors exterior crebrò operta stramentis, ac paleis, obencata pedibus pecudū, sit ministra fundo, ex ea quod euehatur. Vitruuius. Chortes, magnitudinesq; earū ad pecorum numerum, atq; quot iuga bouū opus fuerit ibi versari, ita finiantur. In chorte culina quā calidissimo loco designetur. Palladius. Chors ad Meridiē pateat, & obiecta sit soli, quo facilis hyeme aliquē teporem cōcipiat propter ea, quæ insunt animalia, quibus etiam ad æstatis temperandum calorē porticus furcis, asseribus, & fronde formari debent, quæ vel scandulis, vel (si copia suppetit) regulis, vel si facilius, & si ne impetusa placuerit, regentur caricibus, aut genistis. Columella piscinas minimū duas faciendas censet, alteram, quæ anseribus, ac pecoribus seruiat, alteram, in qua lupinum, vimina, & virgas maceremus. Palladius. Piscinæ duæ, vel solo impressæ, vel cæso lapide circa villā esse debebunt, quas facile est aut fonte, aut imbre suppleri, vt vna ex his vsui sit pecoribus, vel auibus aquaticis. Alia madefaciat virgas, & coria, & lupinos, & si qua rusticitas consuevit infundere. Columella postulat etiam furnum, & pistrinum circa villam, quantus futurus numerus colonorum postulauerit. Palladius. Si aquæ copia est, fusura balnearum debent pistrina suscipere, vt ibi formatis aquariis molis, sine animalium, vel hominum labore frumenta frangantur.

De septis, quæ villam tutandi causa fiunt. CAP. XXXI.

RELIQVVM est villā septis cingere, vt eā à furibus tutā reddamus, aut, vt Varro inquit, ne familia cū vicinis rixeretur, ac limites ex limitibus iudicem quarant. Earum tutelarū genera quatuor. Vnum naturale, alterū agreste, tertium militare, quartū fabrilē. Horum vnumquodq; species habet plures. Primum naturale sepiementū, quod obseri solet virgultis, aut spinis, quod habet radices viua sepi, ac viatoris prætereuntis lasciuī nō metuit facē ardentem. Secunda sepes ex agresti ligno, sed nō viuūt. Fit aut palis statutis crebris, ac virgultis implicatis, aut latis perforatis, & per ea foramina traiectis longioriis ferē bitinis, aut ternis, aut ex arboribus truncis demissis in terram, deinceps cōstitutis.

Tertium militare sepimentum est fossa, & terreus agger. Sed fossa ita idonea fiat, ut omnem aquam, quæ de cælo venit, recipere possit, aut fastigiū habeat, ut exeat è fundo. Aggeris, qui intrinsecus fit, iunctus fossæ, ita arduus sit, ut eum transcendere nō sit facile. Hoc genus sepi fieri solet secundū vias publicas, & secundum amnes. Aggeres qui faciunt sine fossa, vocant muros. Quartum fabrilè sepimentū est notissimum, maceria. Huius species quatuor, quod fit è lapide, quod è lateribus coctilibus, quod è lateribus crudis, quod ex terra & lapillis compositis in formis. Fines verò prædij sine septis, ne familiæ rixentur, serunt alij circum pinos, alij cupressos, alij vltimos, & ubi est campus nulla potior arbor seritur, quod maximè fructuosa, quod & sustinet sepem, ac collit aliquot corbularum vuarum, & frondem iucundissimam ministrat ouibus, ac bubus, ac virgas præbet sepibus, & foco, ac furno. Palladius diligentius docet. Munitionis multa sunt genera. Alij luto inter formas clauso, parietes figuratos ex lateribus imitantur. Quibus copia suppetit, macerias luto, & lapide excitant. Plerique sine luto congesta in ordinem saxa componunt. Nonnulli fossis præcingunt, quod vitandum est, quia horto subducit humores, nisi fortè locus palustris colatur. Alij spinarū plantas, & semina in munitione disponunt. Sed melius erit, rubi semina, & spinæ, quæ rubus caninus vocatur, matura colligere, & cum farina crui ex aqua macerata miscere, funes dehinc sparteos veteres hoc genere munitionis sic inducere, ut intra funes semina recepta seruantur usque ad verni temporis initia. Tunc ubi sepes futura est, duos sulcos, tribus à se pedibus separatos, sesquipedis altitudine faciemus, & per utrosque, funes cum seminibus obruemus leui terra. Ita trigesima die procedunt sentes, quos teneros adminiculis opus est adiuuare, quibus inter se sentes per spatia vacua relicta iungentur. Diophanes aliqua addit. Scrobem cubitali effodito altitudine, in eamque palos depangito, & funiculum per scrobem extendito, præcedente autem die eruum molitum in promptu habeto, & rubi semen, ac paliuri, & oxyacanthæ, omnia ad mellis crassitudinem macerata: postea verò extentum funiculum rubi & paliuri semine cōfricato, & oblinito, & locum cremore irrorato, ac modico tempore finito. Deinde terram ex scrobe egestam superiniicito, & post dies vigintiocto germina producent pedalis altitudinis, quæ transplantabis in scrobem pede non altiore, & intra duos menses cubitalem magnitudinem excedent. Hæc facienda sunt sub æquinoctiū vernum. Facile autem sepem parabis si funem rubi semine cōfricaueris, & in terram defoderis, & harundines crassas contusas plantaueris modica profunditate, ita ut obliquas imponas, & non rectas, stercore vñ cum terra aggesto. Quidam sepem hoc modo faciunt. Virgas rubi in segmenta cōscindunt, eaque in sepibus posita palmari altitudine obruunt, irrigantque, donec germen erumpat. Aliqui cum moris, hoc est fructibus rubi maturis funiculum per manus cōfricant, deinde stercore & terra obruunt, rigant donec germen fundat. De-
mocratius porrò tradit, inchoante vere usque ad quindecim dies sepem probè planta-

VI
plantari hoc m
putrefactum, r
to, inde in sero
citò, & perfect
ris spinarum ci

IO A



20
na, etsi sexu
amensissimo
longo itinere
tus defatiga
Noshuius p
eos in no
ramus. Pra
enarrari. Sy
re, earum p
30 præcedere
banum: na
Theophrast
dixit: siquid

plantari hoc modo. Funem nauticum in marinis operis detritum, & de cetero putrefactum, rubi semine, & aliis prædictis spinosis, admixto eruo conficatio, inde in scrobe defodito, & si fieri potest, singulis diebus irrigato, sic enim citò, & perfectè sepes nascetur. Plinius. Spinæ sepi causa ferunt, tomice moris spinarum circumlita.

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER SECVNDVS

SIVE

SYLVA CÆDVA.

TROEMIVM.



20

Ciò rigidos censores aliquos nō defore, qui nostram villulam visendi gratia hucusque peruenerint, qui domo egressi præcipitem hunc montem, horridasq; has sylvas videbunt, syluestrem, ac inurbanum me hominē existimabunt, cur nō eis floridos hortos, ac fructiferum potius pomarium exposuerim. Sed qui rationes nostras æquo animo expēdent, pleniori obsequio fortasse nobis indulgebunt. Semiramis Persarum Regina, etsi sexu mulier, præclaris verò facinoribus vir, altissimo & prærupto loco amœnissimos hortos conferendos curauit, ut qui hos visendos accederent, longo itinere per arduum, & decliue montis dorsum, valles, & salebrosos saltus defatigati, post hortos ingressi, elegantiores, & floridiores conspicerentur. Nos huius præclara imitatione, post sylvas, & horrida montium nemora, ubi eos in nostrum pomarium introducemus, vberiores, ac gratiores futuros speramus. Præterea priora fuisse syluestria satiniùs est, quàm ut debeat enarrari. Syluestres plantæ naturæ opè gignuntur, urbanæ humana vi, ac labore, earum prædomita feritate, in hortis mansuescunt, unde syluestres urbanas præcedere debent. Sed Hippon nullum putat discrimen inter syluestre, & urbanum: nam alterum ab altero sola cultura differre dixit, quod falsum putat Theophrastus: nam differentiam inter urbanum & syluestre naturalem esse dixit: siquidem alia sunt, quæ sine cultu viuere nequeunt, ceu illa, quæ coli so-

30

lita, alia cultū nullum admittunt, vt verè syluestria, immò cultu deteriora red-
dūtur, vt abies, pinaster, celastrus, & reliqua, quæ hoc libro claudemus, quæ in
sua naturali feritate semper manēt, nullōve ingenio cicurari possunt, sed spōte
in incultis, & immitibus locis nasci volunt, sicuti animalium plura genera, quæ
mirefcere, & mansuescere nullo artificio, nullōve ingenio possunt. Sylua igitur
apud antiquos duplex fuit, cædua vna, glandaria altera. Cæduam, de qua hic lo-
quimur, vocamus eam, in qua arbores generantur, quæ quum ad iustā magni-
tudinem creuerint, cæduntur, vt eius materies igni, vel ædificiis, pedamentis,
perticisve vinearum alijsve vsibus nobis cōmodum præstent, vt succisa rursus
ex stirpibus tenascantur. De glandaria posteriùs dicemus: nam Caro agricul-
tura primus, quæ stuosior, magisq; villæ necessariam dicit: cæduam septi-
mo loco, glandariam nono statuit. Nos arbores cæduas in resiniferas, & non
resiniferas diuidemus. resiniferarum alia conifera æterna coma pubentes, vt
cedrus magna, abies, cupressus, pinaster, & picea, vel decidua coma, vt larix: nō
conifera verò, terebinthus, iuniperus, lentiscus, betula. Quæ non resinifera,
cōtinuōq; virentes, aquifolium, alaternus, coluthea, taxus, buxus, sabina, lau-
rus, & tamarix: quibus decidunt folia, fraxinus, ornus, tilia, acer, carpinus, opu-
lus, platanus, populus, vlmus, alnus, & salix.

Sylua quid, sylvarumq; dij. CAP. I.

SYLVA dicitur quasi foliata: alij verò à silendo dicunt: Græcis ὕλη, id est
materia: nam sylua ad vsum habetur, vt ex ea materies cædatur. Soliti sunt
Latini, Festo Pompeio auctore, vti S, quum Græci aspiratione, vt quum hi
ἕλω, nos syluam infinitam arborum indiscriminatim nascentium multitudine
dicimus. Apud Poëtas pro incondita rerum cōgerie recipitur. Iuuenalis.

— *vultus gravis, horrida sicca*

Sylua coma.

Virgilius quoque herbarum multitudinem confusam syluam vocat,

— *primum aspera sylua*

Lappag, tribulig, absint.

Aphrodiseus febrium differentias, multitudinemq; febrium syluas dixit. 30
Statiùs sua carmina Syluas vocauit, quòd ibi varia, & multæ materiae explica-
rentur. Non paruifacienda est sylua, quum prima communis ciuitas fuerit, &
antequam epularum esset vsus, glandes, & syluestria poma nobis iucundissimo
cibo fuere. Aristoteles in Politicis syluarū custodes necessarios dicit, ne com-
pingendis nauibus vnquam deesset materia: nève quid ex his præterquam ad
opera publica succideretur, quæ syluæ consulares dicebantur. Nec de dignati
sunt dij syluas habitare. Virgilius:

— *habitarunt Dij quoque syluas.*

Plinius: Summum munus homini datū, arbores, syluæq; intelligebantur.
Hæc fuere numinum templa. Arborum genera numinibus suis dicata perpe-
tuo

V
tud seruatur,
Herculi popu-
numina, tanq-
num deum Pa-
ceteri Inuum-
cuparent, non
Pa
Et Aufon-
Na
Illithia sy-
Qua
N VNC
olefca
regiones, vel
res sunt, habet
vmbra diutius
& præcipue at-
bent ne humo-
20 vmbra, ac pro-
maxime ali ar-
qui ad Solem
ardentes soles
vniuersa sylua
fert, & sum-
tur, atq; profu-
ræq; sunt. A
pterea obliqu-
Has easdē dif-
30 flores enim,
tis exeam. Al-
solidior atq;
phus arbori-
constant, q-
quænturq;
Est & circa
monte nasc-
pè tangens
que cherio-
40 nes, apicis e-

rud' seruantur, vt Ioui esculus, Apollini laurus, Mineræ olea, Veneri myrtus, Herculi populus. Quin & Syluanos, Faunosq; & dearum genera syluis, ac sua numina, tanquam & cœlo tributa credimus. Vana antiquorum religio syluanum deum Pana Gorgonis filium existimauit, quem alij Syluanum vocant, cæteri Inuum. Hunc Arcades maximè venerabantur, vt *πῶν ἡς ὕλης κύριον* nuncuparent, non sylvarum modo, sed vniuersæ naturæ dominum. Virgilius.

Pan Deus Arcadia.

Et Ausonius.

Nec cultor nemorum reticere Mœnalide Pan.

Ilithia sylvarum dea fuit.

Quæ loca, quæve regiones syluis abundant, & quomodo in aquis nascantur. CAP. II.

NUNC vbi syluestres arbores libentius oriantur, viuant, & procerius adolefcant, explicare rentandum. Est omnibus in confesso montuosas regiones, vel mōtes ipsos syluosos esse: etenim collibus, planisq; locis frigidiores sunt, habentq;imenti copiā: nam receptos imbres ac nives ob arborum vmbra diutius conseruant, quæ postea liquefactæ locum humectiorē reddunt, & præcipuè auersi Solis cursui: nam vbi Solis radij ad terrā directi sunt, prohibent ne humorē radices fugere possint. At locis, vbi diuturniores, longiorēve vmbra, ac propterea frigidioribus, humores longiusculè adseruantur, quibus maximè ali arbores cōstat, & inter hæc loca, quæ ad septentrionē spectant. At qui ad Solem orientē positi sunt, & ad Meridiem, rari syluosi mōtes sunt: nam ardentes soles humorem exhauriunt. Theophrastus hæc habet. Vbiq; autem vniuersæ syluæ pars ad septentrionē spectans, ligna spissiora, pulchrioraq; profert, & summatim meliora, atq; omnino robustiora in Aquiloniis exeūt, augētur, atq; proficiunt, densæ in longitudinem potius, ideoq; enodes, recte proceræq; fiunt. Apricis autē in profunditatem, & crassitudinem distēduntur, propterea obliquiores, nodosiores, atq; in totū solidiores, spissioresq; assurgunt. Has easdē differentias habent quæ opacis afflatuq; per motis nascuntur, nodosiores enim, breuiiores, minusq; rectæ, quæ apricis, quàm quæ flatibus expositis exeant. Alibi verò. Omnis autem materies amplior, procerior, obedientior, solidior atque in totum melior, copiosior, quæ partibus aquiloniis exit, & ipsius arboris partes, quæ Aquilonem aspiciunt, spissiores adulescentioresque constant, quæ verò ab latere, aut in orbe persilantur, hæc vertuntur, contorquenturq; Aquilone, vt medulla earum contraria sit, nec in rectum porrecta. Est & circa hæc Virruuij sententia de materie loquentis, quæ in Apennino monte nascitur. Eius montis iugum se circumagens, & media curuatura propè tangens oras maris Adriatici pertingit circuitiōibus contra fretum. Itaque citior eius curuatura, quæ vergit ad Hetruriæ, Campania quæ regiones, apricis est potestatibus: namque impetus habet perpetuos à Solis cursu.

Vltetior autem, quæ est proclinata ad superum mare, septentrionali regioni subiecta, continetur vmbrosis & opacis perpetuitatibus. Itaque quæ in ea parte nascuntur arbores, humida potestate nutritæ, nō solum ipsæ augentur amplissimis magnitudinibus, sed earum quoq; venæ humoris copia repleta turgentes liquoribus abundantia, saturantur. Quum autem excisæ, & dolatæ vitalem potentiam admiserint, venarum vigorem permutantes siccescēdo propter raritatem fiunt inanes, & euanidæ; ideoq; in ædificiis non possunt habere diuturnitatem. Quæ autem ad Solis cursum spectantibus locis procreantur, non habentes interuenientium raritates, siccitatibus exuctæ solidantur, quia sol non modo ex terra lambendo, sed etiam ex arboribus educit humores. Itaque quæ sunt in apricis regionibus spissis venarum crebritatibus solidatæ, non habentes ex humore raritatem, quum in materiam perdolantur, reddunt magnas vtilitates ad vetustatem. Hucusque Vitruuius. Sed mihi firmiores quæ in montibus nascuntur videntur, utpote quæ validioribus ventis perflentur. Ingenita enim natura, tanquam aduersus hostes sese obfirmant. Quod testatur Seneca. Non est arbor solida, nec fortis, nisi quam frequens ventus incurSAT: ipsæ enim vexatione cōstringuntur, & radices altius figunt: fragiles verò, quæ aprica valle creuerint. Chiron Achilles hastam in Pelio monte, ut esset præstantior, excidit. Varro in montanis prolixiora, & firmiora nasci scripsit, propter frigus, & montanas sylvas aliis præstare. Apuleius montem syluosum in villa copiosum habere oportere dixit, sponte naturæ productum, qui si non contingat, non difficile est etiam montes syluosos plantare. Etenim syluestrium arborum semina sunt, quæ disseminata syluam producere possunt. Sed in siccis locis non valdè succedit. Nos ut sylua in palustri concresecat, ita curabimus. Agrum aratro versabimus, omnemq; cespitem radicis extirpabimus, post id ad exortum semina quæ sita spargemus: hac satiatione locus plantarum copia refertus reddetur, quibus maxima ex parte humor exuberans exhauritur, tunc & radicum accretione, caducorumq; foliorum, & furculorum pullulatione, in dies solum reddetur subleuati, & siccior. Arbores præterea, quæ spontè nullæque adhibita cura nascuntur, in humidioribus locis frequentius, vberiusque nascuntur. Quod Virgilius ostendit.

*Spontè sua veniunt, camposq; & flumina latè
Curua tenent.*

De humidis syluis & ad septentrionem vergentibus maximis copiosisque multa adsunt Poëtarum testimonia. Lucanus de Hyrcania.

Vidit ab Hyrcanis, Indog, à littore, syluis.

De Hybla Scythiæ prouincia Valerius Flaccus.

Densior haud vsquam, nec celsior extulit villas

Sylua trabes, fessaq; prius rediere sagitta,

Arboris ad summum quàm peruenere cacumen.

Est in septentrionali plaga Hercynia sylua, cuius miracula Plinius recenset: quæ

quæ omnia mir
maximè aquos
uios nasci sole

Descriptio

A NTEQV
dicenda
meo more ordin
respectandam.
dere debet, si An
10 & syluestre ob
eas, quæ cultum
deteriores redd
semina ferunt
Que mites fru
improbe dicat
phrasto auri h
tolluntur, alia
exerunt in herb
tim simplici cau
20 allargit, quem
mum) quod ab
tione rubus, &
dice proueniat,
ut summis fast
porro quædam
rent, sed minu
frutices aliqui
dum cultus ma
deantur, ut m
30 rudineq; prof
ces quoque n
bulsula itide
naturarum g
dinem sequi
ueto domes
suffrutices,

Z

40 N VNC
sto au

quæ omnia miracula excedunt. Theophrastus sylvestres esse arbores, quæ maximè aquosis gaudent, vt populus, salix, & omnia denique, quæ secus fluvios nasci solent: de quibus posterius loquemur.

De stirpium diuisione, & dicendorum ordine. CAP. III.

ANTE QVAM rusticæ rei tractationem aggrediamur, visum est, vt quæ dicenda sunt, suis locis digesta pertractentur, totius operis diuisionem meo more ordinatim quasi in tabellam expectam legentium oculis proponere spectandam. Naturale omnium stirpium discrimen, & quod omnia præcedere debet, si Aristoteli, Theophrasto, cæterisq; credendum est, vrbani erit & sylvestre: ob id de sylvestribus prius. Sylvestres, aut feras arbores, vocamus eas, quæ cultum horrent, quibus si adhibueris, non solum non mirescunt, sed deteriores reddunt: ope non gignuntur humana, sed sui cuiusque ingenij femina ferunt. Vrbana autem, quæ absque cultu viuere nequeunt. Plinius. Quæ mites fructu, vel aliqua dote umbrarumve officio humanius viuunt, non improbe dicantur urbana. Hæc cura mortalium eueniunt. Et hæc iterum Theophrasto auctore diuidemus. E stirpibus quas terra edit, quædam in arbores attolluntur, aliæ in frutices exiliunt, sunt quæ humiliori statu contentæ solum exeunt in herbam. Arborem appellat Theophrastus quicquid ab radice statim simplici caudice brachiatum ramis, surculosum, dissolutumq; contumax assurgit, quemadmodum olea, & ficus. Fruticem verò (seu maius dicere cretium) quod ab radice multiplici, ramosumq; sese profert: qua nobis appellatione rubus, & hederæ continetur. Herbam quod ab radice foliatum, sine caudice proueniat, sæpiusq; semen caule ferat, vt frumenta, & olera. His tribus veluti summis fastigijs omnes stirpes comprehenduntur. Ex herbarum genere porrò quædam fruticantur, quæ ramulis compluribus, surculisq; lignosis sca- tent, sed minutis constant folijs, has veluti fruticum rudimenta quædam, suffrutices aliqui appellare maluerunt. Græci *ῥαχιδες* vocant. Possunt tamè quædam cultus mangonio à sua natura desciscere, vt ad aliud genus permeare videantur, vt malua, quum senis septenisq; mensibus tanta crassitudine, longitudineq; proficiat, vt instar arboris grandescat, & ad vsus baculi veniat. Frutices quoque nonnulli vetustate in arbores degenerant, vt vitex & hederæ. Arbusculæ itidem quædam si dimittantur syluescere, in frutices transeunt. Hoc naturarum germanitas præstat, vt vna in alteram se faciliè vertat. Nos hunc ordinem sequèdo in Syluis sylvestres arbores describemus, in Pomario, & Oliueto domesticas, in Vineâ & Arbusto vitem, fruticem, in Horto, coronario suffrutices, in olitorio herbas, in Segete, & Pascuis herbacea.

*De syluestrium arborum genitura, natura, morbis, & physio-
gnomoniam. CAP. IIII.*

NUNC de syluestrium arborum genitura loquemur. Arbores, Theophrasto auctore, sponte, radice, semine, auulsione, ramo, surculo, & cæteris

generantur, ut latius in quarto libro dicetur. Quæ semine, radice, & sponte nascuntur, naturales maximè sunt, & ideo sylvestrium generi accommodantur: reliquæ hominum arti & electui destinata. De his dicetur, quum de urbanis loquemur. Est sylvestrium arborum natura urbana similis, breuioribus tamen foliis, ramis, radicibus, & tota forma: quippe scabriora, spissiora, duriora, contortiora tam ipsa fieri solent, quàm vniuersa natura, siciora enim, & tenuiora, atq; etiam spinosiora. Florent, sed parum durat florum proventus. Præueniunt germinatione urbanas, plus fructus præmonstrant, minus maturant. Fructus produciunt, quorum semen, siue os, pinguius, pulpa verò macilentior. Semina maxima crusta munita præferunt, sapore acri vehementi quæ. Fructus odoratiores. Sunt spinosa, horrida quæ, quod ex nimia siccitate provenit. Vita longæ, diutius quæ; perennant. Radices lignosas habent, longas, & procurrentes, etsi sint, qui dicant summæ cuti telluris inhaerere. Fructificatio fera. Sunt plerumque sterilia, & parum fructificat, propter spissitudinē, & virium bonitatem, & molis totius largā nutritionē in fecunda redditur. Euenit namque, ut huiusmodi arbores alimētum ad se nutriendas absument: quum enim fructificatio partem alimenti superuacua desideret (ex hac enim fructus exoritur, sicut in animalium genere semen effici solet) si se aliorum assidue pars illa conuertat, absumenturque, tolli generationem necesse est: haud enim natura utriusque parti satisfacere potest, quum alimentum, quantum suffecturum sit, capere nequeat. Omnes ferè, quæ magnitudine maiore se attollunt, minorem generant fructum, ut ficus indica: hæc enim & si mira quadam sit magnitudine, fructum exiguum admodum, eundem quæ fert paucum, ut quæ ad generandum totum absumat alimentum. Indoles, ex qua sylvestribus arboribus cælum & solum conuenientia distribuemus, ex his pendere videtur. Ne nimia frigoris acerbitate, & ventorum agitatione, oculi, & tenera pullulantium germinatorperent, obrigerent quæ, natura eas perpetua fronde vestiuit & decorauit. Et quia eas ventosis locis, & frigidissimis amandauerat, ne perpetuis gelu & niuibuscælodecidentibus earum comæ onerarentur, ne diutius insideret, & inhaerere possent, folia, pectinum modo dissecta, promissa, & capillamenti modo angusta, prætenuia quæ largita est. Et quia ventosis locis permansuræ, ne eadem ampla folia ventos concipientia eas deturbarent, aperta dedit, ut vndique venti peruij dilaberentur, & euaderent. Altis firmis quæ radicibus etiam obfirmavit, ut quantum ad æthera extollerentur, tantum radices ad ima terræ demergerentur, ne maxima turbinum procella, vel quando Boreas proteruo spiritu furit, radices euellerentur. Quia frigorū, & siccitatum in montibus incolæ futuræ erant, ne earum succus exiccaretur, absorberetur quæ flatibus, oleosum, pingue, piceum, & resinofum succum eis contriuit, ut diutius contra eos tutarentur: & ne ventus etiam nimis earum proceritati officeret, caudicem neruofum, rectum, firmum quæ; dedit, quod si cederet, non frangeretur, aut dum agitantur, commouentur quæ, deturbarentur ab eis.

VI
eis. Morbos syl-
quoque eas ma-
pientes, vel pa-
quum; flatus
pestis autem
bus algorem pr-
violenta affecti-
detractio, excep-
cacuminatione et
quidam cedro
cumine, coræ
ta, aut aliqua

Q VON
ratione
fuerint: nam
tineis prærod-
sunt, ut nō sol-
sed publicis re-
tus magno pro-
Vnde his mun-
nij cafores ma-
mum Sidonici
qui in monte
à maioribus
tione; adno-
sumus, aut pe-
teriem quide-
accipitur, qu-
30 quod turgere
Postea in ex-
autem post
pro valido
desierit, se-
post melle
rissimè ca-
tur, citissimè
tur. Potissimè
Quæ autē
40 rupta perda-

eis. Morbos sylvestribus arboribus accidere negant, quibus intereant, tamen quoque eas malè affici dicunt, perspicueque præcipuè quum germinare incipientes, vel paulò post germinationem, vel florentes, grandine vexantur, quumq; flatus frigidus, feruidusque his eisdem temporibus successerit: tempestiuis autem hyemibus, nec si excedant quicquā offendi, quin immo omnibus algorem prodesse volunt, quippe nisi alserint, deterius germinare. Sed violenta affectio sylvestres & urbanas interimere potest, ut corticis in orbem detractio, excepta adrachne, & subere, immò hanc iuari potius dicunt. Decacuminatio etiam quibusdam affert mortem, ut pino, abieti, piceæ, & palmæ: quidam cedro & cupresso referunt. Hæ nanque detracta coma, decisoque cacumine, totæ intereunt, nec quicquam germinant, sicut nec si adultæ aut totæ, aut aliqua pars fuerit.

Decadenda materie & conseruanda. CAP. V.

QUONIAM sylvarum institutæ sunt ad cadendam materiem, ideo de eius ratione tractandum. Multum enim refert si arbores tempestiuè casæ fuerint: nam firmiores, diuturniores, & æternæ sunt magis, neque à carie, & tineis prærodentur, & hac ratione ædificia in longius tempus permanitura sunt, ut nò solum nobis, liberisq; nostris, & reliquis successoribus, cõsulamus, sed publicis rebus, ut diutius perennent. Optimi materierum casores antiquitus magno pretio habiti sunt, quum magno Reip. vñ esse cognoscerentur. Vnde his munerè vacatio tributa fuit, auctore Callistrato iureconsulto. Sidonij casores maximè laudati sunt. Salomon ex ædificaturus Dei molem, ad Iro-mum Sidoniorum Regem literas misit, ut suorum casorum opera utiliceret, qui in monte Libano cedros, cupressos, & abietes caderent. Nos primùm quæ à maioribus nostris narrata reperimus, referemus, quæ summa diligentia rationeq; adnotarunt, mox sequemur & nostra, si quæ ipsi ex maioribus experti sumus, aut peritiorum artificum monitis adnotauerimus. Theophrastus materiem quidem rotundam tempestiuè cadi dicit, & omnem quæ decorticanda accipitur, quum germinare incipit: tunc enim cortex extricatu perfacilis est, quod turgere appellant, scilicet ratione humoris, qui sub eo cortice fieri solet. Postea inextricabilis redditur, materiesq; nigrescit, informisq; fit. Quadratam autem post turgorem, securis autem deformatatē aufert: deniq; omne, quod pro valido capi oporteat, tempestiuè caditur, non solum quum germinare desierit, sed etiam quum fructum percoxerit. Quæ aptæ obrui sunt, aliquando post messem, aliquando post vindemiam & arcturum caduntur. Robur ferissimè cadendum, scilicet hyeme post autumnum: quod si sub turgore cadatur, citissimè omnium ferè cõputrescit, seu cum cortice, seu sine cortice capiat. Potissimum quæ primo turgore, proxima quæ secundo, tertia quæ tertio. Quæ autè post fructuum maturitatē caduntur, quâvis nò turgida sint, incorrupta perdurant, præterquã quod sub cortice vermiculi quidam nascētes, caudi-

Theophr.
de hist.
plant. lib.
5. 6. 1.

Plin. lib.
16. c. 39.

temper summa inscribunt. A quo Plinius. Cædi tempestiuum quæ decortice-
centur, ut teretes, ad templa, ceteraq; vsus rotundi, quum germinant, alias cor-
tice inextricabili, & carie subnascante ei, materiaq; nigrescente. Tigna ex qui-
bus aufert securis corticem à bruma ad Fauonium, aut si præuenire cogamur,
Arcturi occasu, & ante eū Fidiculæ. Nouissima ratione solstitio. Cato de ma-
terie cædenda hæc habet. Materies pro ridica, vbi solstitiū fuerit ad brumam,
semper tempestiua est. Quæ materies semen habet, quum maturum semen
habet, tunc tempestiua est: quæ materies semen non habet, quum gluber, tunc
tempestiua est. Ea quæ semen viride & maturum habet, vti est semen de cu-
presso, & pino, quisuis anni temporibus legere possis. Item quisuis anni tem-
poribus matura est, & tempestiua, ibi dum sunt nuces bimæ, inde semen exci-
det, & anniculæ, vbi primū incipiunt hiascere, tum legi oportet, tum primū
per semen incipiunt maturæ esse, postea vsque ad eod sunt menses octo. Vitru-
uius hæc addit. Materies cædenda à primo autumno ad id tempus, quod erit
antequam flare incipiat Fauonius. Vere enim arbores omnes prægnantes sunt,
& vires omnes suas in frondes, & anniuersarios fructus effundunt: quum er-
go temporum necessitate inanes sint, ratione constat euanidas, & imbecilles
esse. Quod in mulieribus videre est, ut à conceptu vsque ad partum, neque sa-
næ, neque validæ iudicentur: nam in corpore præseminatio crescens ex cibo
detrahit alimentum in se, & quo firmior efficitur ad maturitatem partus, eò
minus patitur esse solidum. Adito foetu alimentum quod prius detrahebatur,
nunc inanibus, & patentibus venis in se recipit, solidefcit, & redit in pristinam
naturæ firmitatem. Eadem ratione arbores fructum maturantes, humorem
effundentes, raræ, & languentes fiunt: vbi fructum emisierint, succum in se re-
tinent, & quiescentes reficiuntur, & restituuntur. Mox hyemis vis compri-
mit, & consolidat eas: ergo si eo tempore cædantur, materies erit tempesti-
ua. Cassianus ex Varrone. Ianuario mense ligna ad ædificandum, & operas cæ-
di dixit, & si necessitas postularit, Iulio. Hesiodus post autumnum arbores se-
candas iubet.

*Tunc operum multo ante memor discinde securi
Syluam incorruptam, tunc germina desinit arbos
Fundere, datq; suas volitare per aera frondes.*

Nunc syderum ratio declaranda est. Infinitum referre aiunt ad materiæ se-
randam lunæ ætates, cum anni temporibus. Luna in syluis Diana vocitata est.
Deaq; nemorum habita, quod hæc arboribus succum inculcet. Rei agrestis do-
ctores materiem non nisi decrecente Luna secari debere dicunt: vnaq; sen-
tentia consenserunt omnes. Theophrastus duritiæ causa cædi post Lunæ occa-
sum præcipit, quasi duriora, & computrescere peruicaciora forent. Plinius. In-
ter omnes verò conuenit vtilissimè in coitu eius sterni, quem diem alij interlu-
nium, alij silentis Lunæ appellant. Sic certè Tiberius Cæsar concremato pon-
te naumachiario, larices ad restituendum cædi ex Rhetia præfinit. Quidam
dicunt.

V I
dicunt, ut in coi-
competant co-
ximè, cum sup-
materies in for-
lignorum Luna
Lunæ lumen lig-
siodus post dec-

Septi-

Inge-

Ad-

M-

Cato homi-
omnem, quan-
to Austro. Ca-
mestri Luna,
cidas abs terra
eximietur. On-
nisi siccam, ne-
dendo seruauit
id à pleniluniis
quintadecima
innocentius se-
uabitur. Huius-
mnis rerum hu-
radicis fibras a-
tur: Inde defi-
quæ quidem a-
iam frondes a-
verò crescent-
humoris conc-
exesa, in pulu-
perdocet: nar-
rant, porro h-
pitur. Nunc
ras si non sta-
portet, ut in-
viti per eā ex-
per torulum
tatem. Tum
40 optima in vsu
enim quum l-

dicunt, ut in coitu, & sub terra sit Luna, quod fieri non potest nisi noctu. At si competant coitus in nouissimum diem brumæ, illa æterna sit materies; proximè, cum supradictis syderibus. Quidam & Canis ortum addunt, & sic cælas materies in forū Augusti. Cassianus addit suis præceptionibus cædendorum lignorum Luna sub terris latente, & in coitu existente, addit quæ ratione: quia Lunæ lumen ligna molliora facit. Quod idem & Diophanes confirmat. Hesiodus post decimum septimum diem Lunæ.

*Septima post decimam Cereris terat hordea sacra,
Ingentemq; licet ferro discindere syluam,
Ac varias aptare trabes, quibus ardua tecta
Moliri, ac structam possis agitare carinam.*

Cato hominū summus in omni usu de lunaribus diebus hæc ait. Materiem omnem, quam effodies, Luna decrescente eximito, post meridiem sine vento Austro. Caueto ne per rorem trahas, aut doles. Idemque mox. Nisi intermestri Luna, atque dimidiata ne tangas materiem. Tunc ne effodias, aut præcidas abs terra: diebus quatuor proximis, quibus Luna plena fuerit, optimè eximitur. Omnino caueto nigram materiem doles, nève cædas, nève tangas nisi siccam, nève gelidam, nève rorulentam. Tiberius idem & in capillo tondendo seruauit interlunia. M. Varro aduersus defluuia præcepit obseruandum id à pleniluniis. Columella à vigesima vsque ad trigessimam dixit. Vegetius à quintadecima vsq; ad vigesimam quintam ad naues fabricandas. Hoc modo innocentius secatur nitidior, solidiorque materies, & immunis à carie conseruabitur. Huiusmodi rei Astronomi rationem dicunt, quòd in Lunæ motu omnis rerum humor commouetur: ergo humore Lunam versus ad vltimas radicis fibras aut retracto, aut destituto; cætera materies purgatiores relinquitur: Inde deficiente, exhaustam tunc dicunt arboris crassam illam pituitam, quæ quidem ad citam illam putredinem imbuendam prona erat. Constat etiam frondes arborum Luna decrescente preparatas non putrescere. Contra verò crescente Luna, ac eius plenilunio præcisa, inepta fabricis operibus per humoris conceptionem erit, & marcescet, ut eo ipsomet anno vermium labe exesa, in puluerem fatiscat, quod omnium Architectorum quotidiana opera perdocet: nam augesciente Luna, corpora ipsa implentur, humoreque exuberant, porro humidum ipsum sua natura parua temporis intercapedine corrumpitur. Nunc cædendi modum exponemus: nam multo fideliores putant futuras si non statim prosternantur. Modum Vitruuius docet. Cædi autem ita oportet, ut incidatur arboris crassitudo ad mediam medullam, & relinquatur, ut per eam exsiccescat stillando succus, ut qui inest in his inutilis liquor effluens per torulum, non patiat emori in eo saniem, nec corrumpi materiæ qualitatem. Tum autem quum sicca, & sine stillis erit arbor, deiciatur, & ita erit optima in usu. Hoc autem ita esse, licet animaduertere etiam de arbutis. Ea enim quum suo quaque tempore ad imum perforata castrantur, profundunt

de medullis quem habent in se superantē & vitiosum perforamina liquorem, & ita siccescendo recipiunt in se diuturnitatem. Qui autem non habent ex arboribus exitus humores, intra concrecentes putrescunt, & efficiunt inanes eas & vitiosas. Ergo si stantes, & viua siccescendo non senescunt, sine dubio quum eadem ad materiem deiiciuntur, cum ea ratione curata fuerint, habere poterūt magnas in ædificiis ad vetustatem utilitates. Eadem Plinius, & Palladius: & omnes iubent stantes arbores, vsq; ad medullam concidi, vt sanies & malus succus stillando effusus depleatur. Sunt insuper qui tradant, arborem facilius cædi, ac celerius inarescere, si manu prius palpetur, quàm securi feriat. Mirum profecto est, quod Anaxilaus, & Nicander Græci authores prodidere. Hic enim minimè algere cædentes, alligata ad arborem amphiscæna serpente. Ille verò arborem linteo, & asbestino lino circumuolutam surdis ictibus, qui non exaudiantur, scindi. Sed cæsa materies custodienda est, nec temere negligenda, diutius duratura. Eam conditam habere oportet loco, vbi graues soles, & acres ventorum afflatus non appellant, sed vmbra penitus cōtectam esse oportet. Veteres architecti huius gratia fimo maxime ouillo illinire obseruarunt: rationem assignat Theophrastus, quod obturatis egresibus, concreta pituita, immodicaque vis vaporum per medullam sensim instillat, atque respirat, quo fit, vt reliqua ligni siccitas siccando cōequalibus condensetur. Stantes autem cacumine inuerso commodius siccaridicunt. Idem defossam materiem multo densari arbitrantur. Cato iubet cæsam materiem amurca illiniri, quo à tinea & carie sit immunis. Præterea in succidenda sylua hoc duximus animaduersione dignum: nam materies si vel ignis gratia, vel aliorum operum cæditur, alia atque alia ratio erit. Eo modo sylua secetur, vt arboribus & reliquis radicibus consulatur, aliter pœnitenda iactura sequetur. Itaq; multi ante Fauonium, & ipsam germinationem cædi tempestiuum arbitrantur, alii post Brumam, quod ex loci natura prospiciendum est: nam in calidis regionibus minus innocuè fit. Quod si contra in frigidis, sequens vis hyemis stipites supernè exurit, adfertque non minimam, propter vniuersitatem, calamitatem futuris germinibus. Verum qui in iisdem locis faciunt, hoc etiam præcauent, ne in syluis ad Septentrionem, & ipsum Boream versus, sed tantum ad Meridiem, & apricis expositis: sed ne etiam in cæteris festinantiùs peragant, ne frigus intempestiuus nonnunquam adueniens nouella germinum propter festinatam cæssionem præcocia adurat. Quidam autem longè post germinationem propter corticis vsum secant. Qui stantibus adhuc plantis corticem eximunt, maximè verò roboribus, & quercubus, & vlmis, ligni quidem & corticis duplex lucrum captantes, quod quum sibi ipsis satagere cupiunt, sibi tamen præuident nequaquam. Enimuero hoc modo germinationem retardant, tum etiam caudices maiori lachrimarum vi exiccantur, vt infernè etiam tardius, minusq; vberim & prosperè regerminant.

De cedro magna. CAP. VI.

Acedro

A CEDRO
author
mum illum
te minima. Tā
rasq; sed om
æternitatis, & n
scat, nec cætiem
qua nulla tem
lam passis ali
10 culos abstulit
Nabuchodon
peruenisse, ab
Græcis
xæpædm vo
quali cedra
mandasse N
nus, cunctaq;
lignis gofer, q
antiquitatis,
10 Italis cedro. E
lio, angusto,
per summa va
fis, ratione sic
pestis caloris,
tū libro prim
cedri magnæ
magnæ cedri
flore, & in e
trāstulit, lib
30 Qu non fert,
pero ascripsi
dine. Deca cu
tri Negroni
monre se vi
boris facie
superna gl
scandendū
durioreq;
tinaciter ha
40 mētaros, ar
decidunt, re

A CEDRO incipimus quum nulla in historiis celebrior, & tot tantisq; authorum præconiis illustrior: imitabimurq; Salomonem sapientissimum illum loquitur à cedro, quæ in Libano, vsq; ad hyssopū, quæ exit ex pariete minima. Tā vastæ magnitudinis est arbor, vt non coniferas modo, resiniferasq;, sed omnes, quas terræ gignit, amplitudine superet. Erat apud antiquos æternitatis, & nobilitatis symbolum: æternitatis quod eius materies nō putrescat, nec catiem patiatur: & cedro digna loqui dicebantur illi, qui ea scribunt, quæ nulla temporis iniuria sit abolitura. Nobilitatis: legitur in Ezechiele aquilam passis alis minabundam ad Libanum applicuisse, cedriq; medullam & furculos abstulisse, & Babylona transtulisse, interpretatum est ab Adamantio Nabuchodonosora Babyloniæ Regem ad Libanum, id est Iudææ claritatem peruenisse, abstulisseq; medullam cedri, id est nobilitatem extirpasse.

Græcis *κέδρος*, Latinis cedrus. Sed magnā cedrū, de qua hic loquimur, Græci *κεδρελάτνη* vocant, composito nomine ex cedro, & abiete, quæ *ἐλάτη* iis dicitur, quasi cedrabies. Plinius à Græcis cedrelatē vocari dixit. Refert Moses Deum mandasse Noe, vt ante cataclysmi diem arcam conderet, qua humanum genus, cunctaq; animantia includerentur, vt ab imminente morte defenderet ex lignis gofer, quod cedrum interpretantur, tum Philo Iudæus in libello biblicæ antiquitatis, tū Talmudistæ omnes, quū arca eximie magnitudinis futura esset.

20 Italis *cedro*. Ex Theophrasto describemus. Inter sylvestres perpetuū viret folio, angusto, & in extremitate pungenti. Caudice procero, leui, & enodi. Radice per summa vaga. Mutilatione, seu decacuminatione posse interire refert in caussis, ratione siccitatis, rectitudinis ac radicis simplicitate: desuper enim incubens pestis caloris, frigorisve, facili ad ima vsq; trāsmittitur, quia recta. Dioscorides tū libro primo, tum quinto magnā cedrū iuniperi baccas ferre scripsit. Et etiā cedri magnæ baccarū meminit, in qua sædissimè hallucinatus est. Plinius de magnæ cedri generibus loquens ait. Quæ floret, fructū non fert: fructifera nō floret, & in ea antecedente fructus nouus occupat. Quæ verba è Theophrasto trāstulit, libro tertio, de iunipero loquēte: Iuniperi duo genera, quæ floret fructu nō fert, fructifera nō floret; cedro insulsè tribuēs, quæ Theophrastus iunipero ascripserat. Folio capillato, & pūgenti. Radice maxīma spatio & plenitudine. Decacuminatione perit, vel cacumine ignibus adusto. Nos relatione Petri Negroni, torius orbis peragratiōe insignis, ita describemus, quas in Libano monte se vidisse fatebatur: ferebatq; secū conos multos, quos habuimus. Arboris facies turbinata à summo, caudice excelssissimo, cuius pars ima scabra, superna glabra, à terra ramosa. Rami trāsuerſi hērent, vt arte infixi videātur ascendendū. Conos ad cōlū tendētes gerit, abiegnis similes, crassiores, maiores, durioresq;, quinque aut sex digitorū longitudine, colore ex cinereo fuluos, pertinaciter hārentes ramis, cōpacti li squamarū, seu cupressorū, congerie coagmētaros, atq; obrufos. Coni post duos annos hiantes paulatim, vētis, & pluuiis decidunt, relicto in ramo pediculo firmo, quo per mediū coni traducebantur.

Horum meminit Plinius libro sextodecimo, Quorum & hastula infixæ est. Semen abieti simile, dulce, vt pineæ, retinens oleosum quoddam odoratissimū.

Colum.

Theophrastus de cedro loquens. Quæ locis argentibus valent perdurare, hæc plus caloris sortiri, vt cedrum: super hac enim nec niuem posse durare autumant, ratione caloris. Et ex loci proprietate Syriam cedros ferre scripsit. Plinius scripsit in Creta, Africa, & Syria laudatissimam nasci. Cedrum natura æstuosius partibus dederat, at in Lyciis, Phrygiisq; montibus nascitur. Sed præcipue in monte Libano nascitur, teste contra Appionem Iosepho, toties sacris literis commemorata: Quasi cedrus exaltata sum in Libano. Vitruuius nasci scribit in Creta, Africa, & nonnullis Syriæ regionibus. Cedros insula in litto-
ribus Germaniæ est, quod cedri arbore referta sit, sic appellata.

Materies.

In Syriæ montibus eousq; crassescit latitudine cedrus, vt quatuor hominū vlnis cingi nequeat. Adde his pulchriores in hortis comperiri, ita quod in Cypro Reges tum ex imperitia, tum ex transuehendi difficultate nunquam materiem cæciderunt. Longitudo his, quæ ad vndecimem Demetrii Regis cæsa sunt, * passuum tredecim, quod Herodotus primum, mox Theophrastus, & cum secutus Plinius scripsit. Syri ad triremes vtuntur. Simulachra ex ea fieri solent: nam rimas non capit, & carnis æqualitate quodammodo constare videtur. Eius materies nata est humorem emittere, & in plenum omnes, quibus oleosus est humor: quamobrem deorum statuarum visæ sunt aliquando su-
dasse: ex hac enim condere consueuerunt. Plinius. Materiæ verò ipsi æternitas, itaq; & simulachra deorum ex ea factitauerunt. Cedrinus est Romæ in delubro Apollo Sosianus Seleucia aduectus. Cedrum æternum putant claro de omnibus materiis indicio in templo Dianæ Ephesiæ, vt pote cum tota Asia extruente, quadringentis annis peractum sit. Conuenit tectum eius esse è cedrinis trabibus. Memorabile & Vtica templum Apollinis, vbi Numidicarum cedrorū trabes durant ita, vt positæ fuerint prima vrbis eius origine, annis mille, centum, octoginta octo. Vitruuius, Ephesi in æde simulachrum Dianæ, & etiam lacunaria ex ea, & ibi, & in cæteris nobilibus phanis propter æternitatem sunt facta. Ex cedrinis etiam lignis domus Davidis Regis in Hierosolyma ciuitate erat, quæ illi Iramus Rex Tyri miserat. Templū illud Salomonis, quo nil vnquam in rerum natura mirabilius visum est, columnis & trabibus cedrinis stetit, vt libro Regum scribitur. Et dirutum iterum trabibus cedrinis reedificatum, permittente Cyro Persarū Rege. Arca fœderis, quam Deus Moyse iusserat ex ædificari, ex materie sittim compacta fuit: est autem sittim, vt interpretes voluerunt, electissimum cedri genus. Virgilius Laurenti regiam describens, in eius vestibulo auorum effigies, Latini Regis è cedro fuisse scribit.

**orgyiarū.
Plin. 130.
pedum.*

*Quin etiam veterum effigies ex ordine auorum
Antiqua ex cedro, Italusq; paterq; Sabinus
Vitisator, curuam seruans sub imagine falcem,
Saturnusq; senex, Ianiq; bifrontis imago,*

Vesti-

*Ve
Cedro sunt
quodam cal
mento vestru
Caliphus ad no*

*Ph
Da
A
V*

*10 Excedrola
functa corpor
quum vitam
ad picem fac
nec cariem
nulla attingit
infossi dura
Pythagorica
2*

*30 E T si de
plures si
phrafi verbis
esse. Plinius
cauit, minore
duas species
sed alteram
cedron voca
folio: nam q
sa, & nodis
30 habere fruct
est duarum
nozem cedri
acutum, spi
ce contortu
vllam sent
& esculem
nascatur al
mant, id est
sed qui gust
40 rusticis alla*

Vestibulo astabant.

Cedro sunt tubera, sicut sunt in carne glandia: in iis nec vena, nec pulpa, quodam callo carnis in se conuoluto. Sectilis quoque in laminas: cuius operimento vestitur alia materies. Clauum non tenet, ex Plinio. Apud Homerum Calipso ad nocturna lumina odoratam cedrum comburit. Ex quo Virgilius.

Proxima Circe araduntur littora terra,

Dives inaccessos ubi Solis filia lucos

Affiduo resonat cantu, tectisq; superbis

Vrit odoratam nocturna in lumina cedrum.

10 Ex cedro laudatissima resina, ut Plinius inquit, cuius pix cedria vocatur. De- *Resina.*
functa corpora incorrupta ævis seruat, viuientia corrumpit. Mira differentia, quum vitam auferat spirantibus, defunctis pro vita sit. Crassio rem resinam, & ad picem faciendâ cedrus fundit. Eo liquore peruncta materies nec tineam, nec cariem sentit. Ideo cedratos olim Numæ libros Hemina tradit, quod eos nulla attigisset tineæ, nec etiam vetustatem experti essent: miraculo quod tot infossi durauere annis; quippe DCCCXV. In quibus scripta erat philosophia Pythagorica. Virgilius eius nidore serpentes abigi cecinit:

Disce & odoratam stabulis accendere cedrum.

De minoribus cedris. CAP. VII.

20 **E**T si de coniferis primùm scribere proposuissem: quum cedri species plures sint, earq; baccifere, ne perirent, visum est ei subiungere. E Theophrasti verbis quisque conicere poterit maiores cedros à minoribus diuersas esse. Plinius maiores à minoribus distinxit. Galenus magnam cedrelarem vocauit, minorem fruticosam, & iunipero similem. Theophrastus minoris cedri *Genera.*
duas species ponit, Phœnyceâ alteram, Lyciam alteram. Idem simpliciter dicunt: sed alteram ab altera differre, ob foliorum acutorum differentiam, quam oxycedron vocant. A quo Plinius. Duo eius genera, Lycia, & Phœnicea. Differunt folio: nam quæ durum, acutum, spinosum habet, oxycedros vocatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Auicenna de genere pini esse dicit, 30 habere fructum similem cupressi fructui, sed eo minorem, & habere spinas. Et est duarum specierum, quarum vna longa, altera brevis. Theophrastus mi- *Descriptio.*
norem cedrum describens ait. Arbor iunipero non dissimilis, sed cedro folium acutum, spinosum, & durum, subsistens infra iuniperi magnitudinem. Caudice contorto, nodoso, & frequentibus alis. Materie æterna, ne cariem quidem ullam sentiente, corde referta, rubea, & odorata. Sed fructus odoratus, ruber, & esculentus, iunipero similis, durans annum: prius non decidens, quam subnascatur alius. Arcades fructus in eo ternos eodem haberi tempore confirmant, id est anniculos, qui nondum maturecant, & bimos, maturos quidem, sed qui gustu respuantur, trimos, qui mandi possint. Satyrus utramque sibi à *Theophr. paulo aliter.*
40 rusticis allatam sine flore, cupressi similem, scabriore tamen cortice. Radices

soluta, summa telluris cute hærent. Serotino fructu: nam quæ perpetuò virent, tardè fructificant. Est præterea fructus pinguis, & lentitua quadà gliscens, unde quamvis non magnus, confici tamen difficilè possit. Quoniam talis est. Plinius vltra prædicta, quæ retulimus verba, dicit fructum ferre myrti magnitudine, sapore dulcem. Phœniceam describemus, quæ nobis ab Istria affertur. Gaza Punicam vertit, quæ ab aculeorum ingenti asperitate, oxycedros omnibus dicta. Caudice cute potius, quàm cortice vestito Folio perpetuo, & state alacriori, acuto, fere trigono, ramis diffusis & contortis. Non florēt, nisi florem dicere maus foliola sena, quæ fructum circumsepunt. Fructu semper grauida, anniculo succedit nouus, qui singulares sunt baccae granula alba intrus copiosa cōtinentes. Dioscorides, & Plinius cedridem vocant. Edulis, vere viridis, mox fuluus, demum rubescens. Lycia altera à prouincia nomē habet, ab obtusis foliis retusa dicta, folio obtusiori & frequentiori, tamarisci similitudine. Caudex subrubet, vitigineo cortice obductus: in reliquis iuniperū refert. Folio quasi squamulis compactilibus coagmentato, digitorum attritu suauem odorē spirante. Bacca per initia viridis, mox flauescens, postremo ad rubrum declinans, gustu subamara, odorataque. Theophrastus saxosis locis, & frigidis nasci, & solum eiusmodi quærere dixit.

Celum, so-
lum.

De abiete. CAP. VIII.

Nomen.

Descriptio.

DE abiete, eadem conifera, resiniferaque scribemus, quæ nec longitudine, 20
amplitudineque magnæ cedro cedit. Macrobius inter felices arbores annu-
merauit. Græcis ἐλάτη, ab ἐλάω id est impello, & prolongo: nam in præ-
cellam proceritatem assurgit. Hac etiam ratione à Latinis abies dicta est, quòd
in cœlum abeat. Italis abete. Ελάτη etiam inuoluerum, calycemve fructus pal-
marum adhuc florentium significat, vt etiam appellari dixit Dioscorides. Un-
de in causa fuit, vt Plinius turpiter erraret: nam de vnguentis loquens, ait: Est
præterea arbor ad vnguenta pertinens, quam alij elatem, alij abietem, alij pak-
mam, alij spatham vocant. Nos descriptionem à Theophrasto diuisim tradi-
tam, & dissectam, in vnum corpus coaptabimus. Primò quæ in vniuersum,
mox quæ cuique generico nueniant, declarando. Surgit arbor recta, & magni-
tudine excelsa, totaque forma decora. Corpus, capæ instar multiplici cortice
tunicatur, assidue nanque tunica compacta, subditæ aliam gerunt, atque ex iis
rota constat. Rami plures, duri, vel ramorum omnium durissimi, spissi, cornu
sanè imitantes, colore flauo, tædæ similes, ordinati, vtrique miro ordine in-
uicem sibi respondentes, nodosi. Folio semper virenti, raro, ac pectinatim in-
secto, in extremitate pungenti. Flore croceo, specioso, paulò ante solstitium
se aperienti. Fructu autem post Vergiliarum occasum. Radice neruosa, singu-
lari, ad ima descendenti, multis hirsuta capillamentis. Arcades non in profun-
dum radices agere dicunt, vt radicibus flatu euertatur. At Idæi abietem altius
quàm subit, radice descendere volunt, verum radice simpliciore, ac meatu re-
ctiori.

ctiori.

ciori. Quum germinat, tergerminationem intermittit, ternaque germina
 edit, ideo *τελοπιος* appellatur. Fit prima germinatio Februario ineunte, quam-
 quam in Ida monte seriùs, ac ferè Idibus. Iterum germinat intermissis trigin-
 ta diebus, aut paulò pluribus: sic fit, vt dum prima cacumina propelluntur, se-
 cutis aperiat geniculato incremento, velut articulatim, vel sursum, vel in la-
 tera fundentibus furculis, idque fieri solet exitu Martij. Tertia germinatio
 Aprili mense, diebus scilicet quindecim intermissis, nec diutius senis, aut se-
 ptenis diebus durat: clariùs tunc cernuntur incrementa non in longitudi-
 nem, sed in corpus incrementa vertuntur. Arborum germinationes cum in
 10 plerisque, tum maximè in abiete conspiciuntur, quum genicula in versus re-
 ctos porrigantur, ramique ex æquo conditi procedant. Auctio, ac germina-
 tio reliquis incerta est, tum modo, tum germine, sed abieti certa, continua, at-
 que præpostera. Quum enim primùm scissum de caudice fuerit, rursusque
 de eo alterum finditur, idque assidue facitatur post quemque germinationis
 superuentum. Amentifera est, autumno enim postquam folia decidere, pecu-
 liare eius cõfestim gignitur, quasi grauida intumescat, vt germina pariat, duret-
 que per hyemem usque ad ver. Præciso caudice reuiuiscunt omnes, abies verò
 inarescit omnino anno eodem, etiã detòso cacumine. Euenit peculiare quid-
 dam abieti, quum enim præcisa, vel vento aliã re quapiam, afflicta fuerit cir-
 20 ca maiorem partè trunci, (habet enim aliqua ex parte lauem & enodem & æ-
 quale) vel perquã ingens quidpiam redundans paulo deterius adnascitur circa
 fastigium, quod quidã circumauctione, alij circumagnatione appellant, colo-
 re quidẽ nigrum, duritia verò præpollens, ex quo crateres conficiunt Arcades.
 Crassitudo talis, qualẽ arborem esse contingit, quò scilicet robustior, vegetior-
 que, eò crassior. Illud quoque peculiare hac eadem in re abieti accidit: quum enim
 ramis omnibus ablatis, cacumen decideris, mox emoritur, quum verò inferiora
 euerfa sunt, quod restat, viuít, & agnatio, quam modo dixi, circum id fieri as-
 solet, scilicet quia vegetius ac viridius est, attramen non renascitur. Si medul-
 la detracta sit, moriendum omnino est, Arcades aiunt, nec abies seruari po-
 30 test: causa est, quòd medulla pars humidissima, & vitalis præcipuè sit: cuius
 rei argumentum, quòd materies, quæ medulla viduata est, peruertitur, recur-
 uaturque iam cõfecta, usque dum penitus resiccet. Quapropter abietis materiem
 filo scindunt, nec quicquã medullæ relinquunt. Perit etiam decacuminatione,
 scilicet si arboris extremitas præcidatur, nõ absque ratione, quum sicca natura sit,
 meatuque cõdatur rectissimo, & vnica radice inhæreat. Vultus enim infestat,
 facitque vt & frigus, & ardor faciliùs subeat, præsertim quum vndique infertur, &
 ex proceritate, & meatuum rectitudine non pigre ad radices deueniat. Negata
 est eis à natura neporum procreatio, tam siccitate radices, quàm quod impetu
 suo toto sursum contendunt, atque etiã quia radice singulari nitantur, alteque de-
 40 scendant. Nusquã enim alimonie quicquã superfluit, nec verò dimotum alior-
 sum se vertit: itaque fit, vt nullum sit exurgendæ prolis initium. Ab vlcere ampliori

altioriꝫ non interit, quum tæda descenditur, immò ex infœcundis fœcunda, & ex pauciferis multiferæ redditur. Corticis circumablatio in germinatione abietis necat: quum enim cortice sit turgido, mense Februario, vel Martio, si quis detraxerit, statim moritur, hyeme diutius tolerat. Hyphear, & stelis in abiete nascuntur, & hæc differre inter se volunt, argumentumque adducunt, quodd non solum in congeneribus erumpat, verum in eadem arbore plura diuersis partibus exeant, vt hinc stelis, inde hyphear, nec modò formas, sed fructus dissimiles ferant. Et hæc validiora sunt, quæ in abiete nascuntur, quàm aliis: plus enim alimenti, & idem pinguius subministrant. In abiete quædam nascuntur, quæ augures lucinas vocant, aëre nanque eblandito atq; remisso, hæc erumpere potissimum solent, vbi intestinus humor collectus, & exterius quoq; occurrens concreuerint, atque in rotundum conglobati fuerint. Hæc Plinius ab eo transfert. Folia Abieti non decidunt, insecta, pectinum modo, pungentiaq; Floræ croci colore circa solstitium. Semen reddit post Vergiliarum occasum. Germinationem tripartito intermittit, ac germina terna edit, & ideo inter squamas corticum spargit, quod omnibus arboribus in germinatione euenit, quoniam prægnantium rumpitur cortex. Est autem prima earum incipiente vere, circiter quindecim diebus. Iterum germinat transeunte Geminis Sole: sic fit, vt prima cacumina impelli sequutis appareat, geniculato incremento. Tertia est ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus, clareq; tunc cernitur crescentium cacuminum articulatio. Rami statim ab radice modici, velut brachia lateribus inhaerent. In ea ramorum ordo, & subrepta diuisura, ramiq; in cœlum tendentes, non in latera proni. In longitudinem excrescit. Cortex multiplex tunicis. Radix singularis. Cortice in orbem detracto, necantur arbores, sed quædam tardius, quædam citius moriuntur. Refert & tempus anni. Abieti, si quis detraxerit Sole Tauri vel Geminis transeunte, quum germinat, statim moritur, eandem iniuriam hyeme passa diutius tolerat. Nec in vltimis ponendum, quando quibusq; satis vmbra aut nutritrix, aut nouerca est, abietis, quæcunq; attigerit, non dubie venenum est. Fert & cachryn: ita vocatur pilula, in medicina vrendi vim habens: gignitur postquam folia decidere, hyeme durans, continet nucleum pineis similem. Is crescit hyeme, aperitur vere pilula tota, cadit, quum folia cœperint crescere. Sed verbu *περίσκιπον* Gaza ter squamosum interpretatus est, quum prægnans cortex rumpitur, squamas spargere videtur, quum ter inchoatum opus, intermissumq; repetat, & puto *Πισκεῶν* legisse. Abietum quædam mascula, quædam fœmina est, Theophrasti autoritate. Mascula folio pungentiori, acutiori, & magis flexo, vnde arbor intuitu crispior videtur. Huius nucibus parui quidem nuclei insunt, materies versicolor, latior, durior, medulla refertior, atq; in totum aspectu deterior, nodosiorque. Fœmina folio pinnato, summo mucrone rigenti assurgit, vsq; eò densum, vt facile, quasi concameratum imbres arceat, nec tamen pluuiam transmittat, simileque potissimum cyathis Bœotorum.

Illarum

Genera

Marum nucibus
peribusq; facili
scitur in Creta
larum adhæren
siliquis ab simi
cedens ad purp
gnitudine cubi
tœmina etiam
pinnato densa
nicularum mo
mascula, prim

Gaudet a
exurgit, itaq
tis, quem nu
firudine car
quam obren
tuntur, sed a
optimas faci
liter validas a
illis robustio
circa Cylleu
posse durare
Tortuosaque
tum magnitu
ad eas, quæ C
quàm Parna
chriorq; ext
& firmiora
excelsio mon

tur. Est & p
que laudati
to, Macedo
boica: quo
les diligit a
pennini pa
habent So
dhrant. Q
solum aug
rantur, qu
ficcis diutur
cipitur. Ro

Marum nucibus nulli quidem nuclei insunt. Materies mollior, candidior, operibusq; facilior, & in totum procerior caudex. Est & aliud genus, quod nascitur in Creta super lapides, & testacea (*ispadurus*) carens radicibus, modo patellarum adhærens, folio carnosio, oblongo, crasso, frequenti, nec leguminum filiquis ab simili. Concauum intus, nec aliquid intra se continens, colore accedens ad purpuram, forma erecta, multicaulis, rami longi, recti, solutiq; magnitudine cubitali, vel maior. Plinius ab eo. Abies è cunctis amplissima est, & fœmina etiam prolixior, materie mollior, viliorq; arbore rotundior, folio pinnato densa, ut imbres non transmittat, atq; hilarior in totum. E ramis panicularum modo nucamenta, squamatim compacta dependent. Hæc abietis masculæ, primori parte nucleos habent, non item fœminæ.

Gaudet abies locis vmbrosis, in quibus longè pulchrior, quàm in apricis exurgit, itaq; in Arcadia circa Cranam, loco quodam concauo, & silente à ventis, quem nunquam solem attingere aiunt, abietes tum longitudine, tum crassitudine cæteris præstant, non tamen frequentes, neque pulchræ cernuntur, quamobrem ad lautiora operum, ut fores cæteraq; magnifica, hisce minus videntur, sed ad naviigia domosq; duntaxat, quippe trabes, & antennis ex his optimas faciunt, atq; etiam malos, præstantissima longitudine, sed non similiter validas atq; ex his, quæ Soli expositæ starent, sed ex breuitate densiores. 20 illis robustioresq;. Si in montibus nascitur, non in excelsum excurrit, sicut circa Cyllenum promontorium euenit. Mnestheus propter calorem abietem posse durare locis argentibus, neque super hanc niuem posse durare autumat. Tortuosaque provenire ob calorem medullæ asserit. In Latino agro abietes tum magnitudine, tum pulchritudine inter omnes Italicas præstant, tamen ad eas, quæ Corsica gignit, pro nullo certè habentur. Macedonica præstantior, quàm Parnasia, cæteraq; spectantur: nam suo loco manens, amplior, pulchriorq; extat. Hæc Theophrastus. Varro: In montanis quædam prolixiora, & firmiora nascuntur, propter frigus, ut abietes, & sappini. Plinius. Situs in excelsis montium, seu maria fugiant. Romæ infernas abies supernati præfertur. Est & per gentium quoq; regiones in iis differentia. Alpibus, Apenninoque laudatissima. In Gallia Iura ac monte Vogeso: In Corsica, Bithynia, Ponto, Macedonia. Deteriores Æneatica, & Arcadica. Pessima Parnasia, & Euboica: quoniam ramosa ibi, & contorta, putrescentesq; facile. Montes & vales diligit abies. Apuleius humidis gaudere ait. Vitruvius. Abietes, quas in Apennini parte, quæ ad Hetruriam vergit, infernates vocant, & quia perpetuos habent Soles, siccitatis exusta solidantur. In ædificiis ad vetustatem perdurant. Quæ Septentrionali regioni subiecta vmbrosis perpetuitatibus non solum augentur amplissimis magnitudinibus, sed earum venæ humore saturantur, quum exciduntur, siccescendo inanes fiunt & evanida: ideoq; in ædificiis diuturnitate carent, ideo supernates improbat. Quod à Plinio etiam excipitur. Robustiores aquiloniæ partes, & in totum deteriores ex humidis, o-

pacisq; spissiores ex apricis, & diuturnæ: ideo Romæ infernas abies supernati præfertur. Nos ex foliorum scissura & tenuitate, caudicis scabrositate, frigidis locis, algidis, & perpetuis niuib; ob sitis nascituram iudicamus.

Ratio.

E semine tantum, vt omnes conifera, nascitur. Cultum aspernatur, nā hominum diligentia degenerat. Crescit, quoad libero sole fruatur, neq; interim crassescit, neq; fruticat, at vbi in iustam magnitudinē excreuit, in profundum latumq; dilatur: sic ramorum exortus, & laterales germinationes sequuntur, vt ex Theophrasto habetur. Nos autem ei profundum solū destinamus, argumēto quod vnica, eaq; profunda ad ima descendēte radice firmeretur, vt firmius ventis exagitata inhærescat solo. Et quia in tantam crassitudinē, & materiem

Materies.

Abies expetita nauigiis, vt ex Theophrasto habemus: quum excelsa, proceraque sit, malos & antennas ex ea facere solent. Præterea quum multiplici tunica constet, qui remos dolant, singulatim æquabiliterq; auferre conantur: nam si ita auferatur, remus validus relinquetur, sin autem permutauerint, nec omnino pariter dempserint, infirmus reddetur, hoc enim modo ictus, illo demptio fit. Triremes, atque longa nauigia ex abiete leuitatis causa faciunt. Quercui conglutinari non valet; quā altera spissa altera rara sit. Affectus autē similis esse oportet, quæ societate conflari debeant, non contrarii, cū si ligno lapidem coniungere velis. Nauibus, propter flexum, humidior capiatur necesse est: alioqui ad conglutinationem quidem siccior apta est: naus enim compacta, & extra mare fidelior constat, & in mare protracta humore imbibito, se vndiq; protinus comprimit, atq; coniunctis rimis omnibus continuat, nisi penitus exaruerit. Tunc enim gluten aut omnino aspernatur, aut non aequè recipit. Tectis commodior est, iisque optima quæ vetustissima, modo immunis à carie sit. Neruosa est & rigida, ita vt vtrumque habeat è contrario nervos validos, mollem carnem, & raram, qua de causa leuis est. Habet nervos venasque omnium nobilissimas. Pondus sustinere validè potest: nil enim ponderi cedit, sed renititur, argumento quod nunquam rumpatur, sed potius quàm viribus, carie, aliisve deficiat. Materies nodosa, nodique reliquis omnibus ferè duriores, densissimi, solidissimi, patentes, colore, rædæ proximi, & maximè sui generis, & si lignum molle sit. Nodi recti, & ramis quodammodo infixi, quamobrem validissima est. Fissilis est, propter meatuum rectitudinem. Tradunt abietis, dum germinat, decorticatam materiem aquis inoffensam durare nimium posse. Patuit id apud Phneum Arcadiæ, cū obstrusis faucibus, campus in lacum redundauit: tum enim ductis pontibus ex abiete, quum amplius extumesceret aqua, aliis super aliis fabricatis, posteaquam extrusis obturamentis vnda erupit, discessitque, vniuersa materies incorrupta comperta est. Eius materies etiam quadripartita est: quadripartitam appellant, quibus in vtramq; partem medullæ bini venarum cursus naturæ contrarij pertendunt, atque per vtrumq; cursum adigunt, ictus

curfi-

V
curfibus cont
meat, ita eni
dripartita. Si
corticem det
mirationis pr
belicum in Va
sustinendum
est. Arboris ei
bat. Succis ab
tissimaque. N
dripartitos ve
brorum intel
mollior, qu
pars à terra
atque ita sap
tem robusti
cisque, spissi
præfertur. P
abietem circa
rumpi. Pond
uarum rep. g
eo, siue Cam
nibus pampin
dem & curib
solida est. Co
dam mellib
Vitruuius de
mumq; hum
rata, nō est
30 nere, sed dir
caloris, proc
cenditur, qu
ita vehemen
est proxim
liquida effi
nodos ram
duritiem d
rur, eiecto
vocat. Q
40 probare lic
Helenæ pro

curfibus contrarios inferentes, dum in vtramque partem medullæ securis re-
 meat, ita enim eueniat neceffe est naturæ venarum ratione, paucaq; sunt qua-
 dripartitæ. Si primo turgore cæditur, materies coloratior redditur: nam &
 corticem detrahunt: vere caduntur, tunc germinant. Plinius ab eo. Abies ad-
 mirationis præcipuæ viſa eſt in mari, quæ ex Ægypto Caij Principis iuſſu o-
 belifcum in Vaticano circo ſtatutum, quatuorq; truncos lapidis eiſdem ad-
 ſuſtinendum eum adduxit, qua naue nil admirabilius viſum in mari certum
 eſt. Arboris eiſ crasſitudo quatuor hominum vlnas complectentium imple-
 bat. Succifa abiete humor diu deſluit. Hæc omnium arborum altiffima, re-
 10 tiſſimaq; Nauium malis, antennisq; propter leuitatem præfertur. Qua-
 dripartitos venarum curſus, biſidosq; habet, vel omnino ſimplices. Ad fa-
 brorum inſtina opera medulla ſectilis. Optima quadripartitis materies, &
 mollior, quàm cæteræ. Intellectus in cortice protinus peritis. Abietis quæ
 pars à terra fuit, enodis eſt: hæc qua diximus ratione decorticatur fluuiata,
 atq; ita ſapinus vocatur: ſuperior pars nodofa, duriorq; fuſterna. In ipſis au-
 tem robuſtiores aquiloniæ partes, & in totum deteriores ex humidis, opa-
 cisq; ſpiſſiores ex apricis, & diuturnæ: ideo Romæ infernas abies ſupernati
 præfertur. Proximum medullæ habet quod Græci leuſon vocauere. Tradunt
 abietem circa germinationem decorticatam, qua dixi Luna, aquis non cor-
 20 rumpi. Pondus ſuſtinere validè poteſt. Fortiſſima ad tectum abies, eadem val-
 uarum repagulis, & ad quæcunq; libeat inſtina opera aptiſſima, ſiue Græ-
 co, ſiue Campano, ſiue Siculo fabricæ artis genere ſpectabilis, ramentorū cri-
 nibus pampinato ſemper orbe ſe voluens ad incitatos runcinarum raptus. Ea-
 dem & curribus maximè ſociabilis glutino, in tantum vt ſindatur ante, quàm
 ſolida eſt. Cortex in magno uſu agreſtium: vaſa, corbeſq; ac patentiora quæ-
 dam meſſibus conuehendis, vindemiisq; faciunt, atque prætexta tuguriorum.
 Vitruuius de abiete hæc habet. Abies aeris plurimum & ignis habet, mini-
 mumq; humoris, & terreni, leuioribus rerum naturæ poteſtatibus compa-
 rata, nō eſt ponderoſa. Itaq; rigore naturali contenta, non citò ſeſcitur ab o-
 30 nere, ſed directæ permanet in contignationibus. Sed ea, quod habet in ſe plus
 caloris, procreat, & alit termitem, ab eoq; vitiatur. Etiamq; ideo celeriter ac-
 cenditur, quod quæ in eſt in eo corpore raritas aeris, patens accipit ignem, &
 ita vehementem ex ſe mittit flammam. Ex ea antequam eſt exciſa, quæ pars
 eſt proxima terræ per radices excipiens ex proximitate humorem, enodis &
 liquida efficitur, quæ verò eſt ſuperior, vehementia caloris eductis in aëra per
 nodos ramis præciſa altè circiter pedes xx, & perdolata propter nodationis
 duritiem dicitur eſſe fuſterna. Ima autem quum exciſa quadriſtibus diſpara-
 rur, eiſecto torulo ex eadem arbore ad inſtina opera comparatur, & ſapinea
 vocatur. Quod extruendis nauibus apta ſit abies, etiam teſtimoniis Poëtarum
 40 probare licet. Ex abiete Idæa Paridem naues præparaſſe, quibus ad raptum
 Helenæ profectus eſt Eurpides tradit. Claudianus idem.

Apta fretis abies.

Eam, quæ Iason cum Græciæ heroibus in Colchidem vectus est, Ennius ex abiete structam fuisse asserit.

Vinam ne in nemore Pelio securibus

Casa cecidisset abiegna ad terram trabes:

Nève inde navis inchoanda exordium

Cœpisset, qua nunc nominatur nomine

Argo.

Ovidius.

Et casus abies visura marinos.

Homerus malum in naui ex abiete fuisse, qua Telemachus Pylum nauigavit, dixit,

Ἴσον δ' εἰλάπνον κοίλῃς ἐνθάδε μεσώδμῃς

ᾗσαν ἀείχευτες.

Hercules apud Apollonium Rhodium ad remum abietem euulsit. Hastæ ad præliandum etiam ex abiete fabricatæ sunt. Virgilius.

Cuius apertum

Aduersi longa transuerberat abiete pectus.

In abiete resina fit, cum lignis degustatis vulnus infertur, haud enim quæq; secretionē modo eodem agi mos est. Succus illius resinaceus, ut omnium coniferarum: nec ampliori altiori; vulnere interit, ut omnes, ex quibus resina colligitur. Abietis lachrimæ sponte cōcrefcunt. Sincere olet, & sapit. Hęc Theophrastus. Ab eo Plinius. Resina civitium. Succisæ humor diu defluit.

De Cupresso. C A P. IX.

DIXYMVS Græcus prodit Eteoclis fuisse filias, Charites dictas, siue Grætiæ, quæ dum tripudio dearum subsiliunt, extra choream deuolutæ, in puteum deturbantur; dolens earum vicem tellus, arbores frondosas puellis similes ad oblectamenta, & rei memoriam edidit. Sed Lactantius Placidus scribit: Cyparissus puer speciosus Telephi filius, dum venaretur, in amorem sui Apollinem compulit, à quo mirum in modum adamatus, in Chio insula, ut 30 scribit Probus, ceruum habuit pulcherrimum & mansuetissimum, quo ab Apolline donatus, quem enixè dilexit. Alij dicunt Nymphis sacrum. Per sylvas verò errans, & lassus sub arbore & in herba obdormiuit, strepitu autem à somno excitatus à se longè ceruum vidit, & syluestrem credens, iaculo imprudens traiecit, quod ubi agnouit, tanto affectus est dolore, ut nec Phœbi consolatione, nec Medicinæ viribus ab huiusmodi luctu ac planctu retrahi potuerit, ut cibo etiam, & potu abstineret. Sed illud tandem supremum munus à Deo petiit, ut omni tempore ei flere liceret. Itaq; Apollo eius misertus, in arborem sui nominis conuertit, ex qua lachrima deflueret. Sic Apollo apud Ovidium;

Tristisq;

40

— *Tristisq; Deus, lugebere nobis,
Lugebisq; alios, aderisq; dolentibus, inquit.*

Seruius autem à Syluano deo adamatum dicit, cuius ceruam inscius occidit, vt præ dolore postea puer contabuerit, verùm ab amatore deo in arborem sui nominis conuersus est, quam hic pro solatio portare dixit. Virgilius.

Et tenerum ab radice ferens Syluane cupressum.

Diti ob varias & multiplices causas cōsecrauit antiquitas, sed omnes ex ipsius arboris natura. nam eius generis arbor excisa, cū minimè rediuiua sit, humanæ conditionis sortem referre videtur: nam ex ea recisa, nil magis, quàm ex mortuo sperandum sit. Quanquam Herodorus solam pinum ex arboribus putet minimè repullulare, vocatq; eam *παρόλεθρον*, nimirum quòd recisam cupressum in Creta insula repullulare audierit, quod de pinu nusquam obseruatur. Et mortuorum animas ad inferos descendere dicunt, quorum deum Ditem arbitrantur, vnde eius arboris ramis sepulchris affixis, diis Manibus commendari defunctos dicant, atque arborem nullam hominem ad inferos sequi legas, præter cupressos. Horatius.

Neque harum, quas colis, arborum,

Te, præter inuisas cupressos,

Vlla breuem dominum sequetur.

Diti sacra est, inquit Plinius, ideo funebri signo ad fores posita. Apud multas gentes in cœmiteris feri cœpta. Valentiis vidimus in patibulo multas confitas. Alia etiam ratione portis affigebatur, quod pollutionis, aut incestari de alicuius mortis loci, aut funeris signum fuit, ne quisquam pontifex per ignorantiam domum ingrediens pollueretur. Feralis à Virgilio dicta.

Ingentem struxere pyram, cui frondibus atris

Intexunt latera, & ferales ante cupressos

Constituunt.

Petronius Arbitr.

Gaudent ferali circum tumultata cupressu.

30 Erat & vrendis funeribus apta. Virgilius.

Ergo instauramus Polydoro funus, & ingens

Aggeritur tumulo tellus, atraq; cupresso.

Sed M. Varro pyras cupresso circumdari dixit propter odorem vstrinæ grauem, ne ea offenderetur populi circumdantis corona, quæ tamdiu stabat respondens flatibus præfixa, quamdiu consumpto cadauere, collectisque cineribus, dicebat nouissimum verbum licet, id est ire licet. Sed alia ratione Asclepiades cupressum luctuosam dicit. Boream enim Celtarum Regem, quum filiam Cyparissam nomine haberet, & eam amisisset, arborem hanc in eius tumulo seuisse, à qua nomen inditum cyparisso, & mox à saturo illo luctuosam feralemq; haberi cœptam. Non immerito magno habitum ostento, quum arbor cupressus altitudine præexcelsa in Vespasiani auito agro sine vi vlla tēpe-

statis radicitus euulsa repente prociderit, ac sequenti die viridior eodem vestigio surrexerit, grande prosperumque, & summa claritas Vespasiano iuueni ab aruspibus promissa, ex Tacito. Fuit & mortis ostentum Imperatori Seutero, cui Æthiops scurra occurrens obuiam cum corona ex cupressō, quē quum ille ab eius oculis remoueri iussisset, paucis post diebus est vita functus. Cupressus inimica viti. Nam Varro scribens, qua cœli parte ridica figi debeant, ait: Si cupressos viuas pro ridicis inserunt, alternos ordines imponunt, neque eas crescere amplius quām ridicas, patiuntur, neque propter eas adserunt vites, quod inter se hæc inimica.

Nomen.

Didymus Græcus duplici nomine cupressos vocari solitas dixit, *κυπάρισσος*, & *ἡλεως*, hoc vltimū propter Charites Eteoclis filias, vt diximus. Charites, hoc est Gratia, appellantur ob delectationem. *κυπάρισσος*, ἀπὸ τοῦ κῦεν καὶ φῦεν πάριος τῆς πικρᾶδος, καὶ τῆς καρπῆς, id est à parilium ramorum partu, & fructuum, quod ex æquo ramos & fructus creent. Dicuntur etiam Festo Pompeio Cyparissæ ignes prodigiosi, qui noctu apparere solent cupressorū similitudine. A Poëtis etiam *κανοειδής* dicuntur, quod in conum hæc arbores attollantur. Latinis cupressus, cyparissus, & cypressus dicitur. Italis *cipresso*.

Descriptio.

Sic à Theophrasto describitur. Arbor longo, subrectoq; sustollitur caudice. Folio angusto, carnoso, & indeciduo. Semine perexiguo, & obscuro. Huius enim fructus, non id totū est, quod pilæ speciem gerit, sed quod in cono nascitur, prætenue, & exile: quasi laricis (*πικρᾶδης*) semini proximū, quod pilula debiscere diffatur, & euolat, neque facillimè colligitur, præterquā à peritis. Conis pendentibus exilit, vasaq; ipsa relinquit inania. Cresci morosa, quod ex densitate, & siccitate euenit. Materie macilenta: Fructum serò perficit. Constat ligno tam fructus, quā fructus ambientia. Radicibus summatenæ adhærentibus. Dempta coma, rescissoq; cacumine interit, nec ex ea quicquā, quasi esset ambusta, repullulat, quum natura sicca sit, & meatu condatur altissimo, vnicāq; radice in hæreat. Negata his omnibus sobolē radicibus pullulandi, tam radicis siccitate, quā quod sursum cōtendat, vt diximus. Plinius ab eo. In lōgitudine excrecit, vt vnistirpia. Folio carnoso. Floret post autumnū. Radice per summa cespitum. Trifera est, nam eius baccæ colliguntur mense Ianuario, & Martio, & Septembri, ternasq; earū gerit magnitudines. Natū morosa. Fructu supermacua, baccis torua, folio amara, odore violenta, ac ne vmbra quidē gratiosa, materie rara, vt penē fruticosi generis: metæ demum aspectu non repudiata. Nullum stillicidiū cupressi, vmbra minima, & in se conuoluta, ea etiā detracto cacumine, aut ignibus adusto interit. Sed mihi videtur Theophrasti verbum *πικρᾶδης* Theodorus non rectè vertisse laricem, quum laricem neque Theophrastus, neque Græci nouerint, sed potius *πικρᾶδης* legendum, quod furfures significat: nam nil propius furfuris faciem, quā semen illud demonstrat. Varro à Theophrasto mutuatus de cupressō hæc habet. Cupressi radices angustius diffunduntur. In crescendo tarda. Semina ad oriendū sunt adeò parua, vt sint ob-

scura.

scura: nō enim in his inus pri-
pressi procer-
cessit eates in
sus inuili. Qu-
ser, illius verba
ramen non ha-

Velut sylue

nam forma cu-
cupressi mas-
Plinius duo e-
mina appella-

Didymus. M-

Cupressi

Rhodus. In

mouerit quib-

Idæis, Leucis

periri affirma-

la est. Plinius

appeller, cred-

nat, sed in C-

que emicat. l-

collibus, & qu-

rima quod m-

pere fastidie-

diximus, sol-

cipiu conce-

tā per eius m-

in quib. æti-

Gaudet hun-

Nascitur

Plutarc-

pressis ab u-

tas dicitur

Cupressus

scuta: nō enim galbuli, qui nascuntur, tanquā pilæ paræ corticæ id semē, sed in his intus primigenia semina dedit natura. Spectatu quidem iucunda est cupressi proceritas, effigiesq; illa meras imitata. Sed quū fructu superuacua sit, cessit ea res in proverbium, *κυμαίνουσα νεότης*, de re speciosa quidem visu, sed prorsus inutili. Quare Phocion, quum Leosthenes Athenienses in bellum impulisset, illius verba dicebat cupressis esse similia, quæ quū speciosæ essent, fructum tamen non haberent. Dioscorides pilulas eius fructus vocat. Virgilius conos.

Aeria quercus, aut confiera cyparissi.

Veluti sylvestris cupressi Theophrastus meminit, quū Thuiam memorat: Genera.
nam forma cupresso similis, ceu sylvestris cupressus dicit. Præterea in genere cupressi mas omnino infœcundus est, fœmina pleræq; fructu viduæ cōstant. Plinius duo eorum genera nominat. Meta in fastigium conuoluta, quæ & fœmina appellatur, mas spargit extra se ramos, deputaturque, & accipit vitem. Didymus. Mas est sterilis.

Cupressum loca feruida habere magis dixit Theophrastus, vt Creta, Lycia, Calym.
Rhodus. In Creta circa agrum Idæum exuberat. Sed in Creta quocūque loco mouerit quispiā, hæc gignitur, protinusq; emicat. In Creta insula, in montibus Idæis, Leueisq; vocatis, super summa quibus nix nunquā deest, cupressum cōperiri affirmat: nam id genus syluæ plurimū & in montibus, & omnino in insula est. Plinius ab eo. Huic patria insula Creta, quanquā Cato Tarentinam eam appeller, credo quod primum eō venerit. Et in Aenaria insula succisa regerminat, sed in Creta, quocunque loco mouerit quispiam, hæc gignitur, protinusque emicat. Illa verō etiam non appellato solo ac sponte, maximeq; in Idæis collibus, & quos albos vocant, summisq; iugis, vnde niues nunquā absunt, plurima quod miremur alibi, non nisi in tempore proueniens, & nutritæ magnopere fastidians. Primum aduena, & difficillimè nascentiū fuit. Herodotus, vt diximus, solū in hac insula recisam repullulare dixit. Vnde quod Creta id præcipuū concessum, vt renascentes, quæ præsectæ fuerint, cupressos videāt, Creta per eiusmodi arborē significant. Cupresseta porrò Gnosiorū Plato celebrat, Satio.
in quib. æstiuo die à Megillo, & lociis de legibus cōmentatum tradit. Didymus: Gaudet humidis magis, & opacis, ac protectis locis. Virgilius Idæas vocat.

— *nec Idæis cyparissis.*

Nascitur propè Orontem fluuium, vt Iuuenalis, & Claudianus, ad Simoim,

Tollebant gemina capita inuiolata cupressus

Cespite vicino, quales non rupibus Idæ

Miratur Simois, quales non diuite ripa

Lambit Apollinei nemoris nutritor Orontes.

Plutarchus Ammoniam, Chiam, Cyrenaicam laudat. Halcyone mons cupressis abundat. Milesiæ cupressus à multis laudatur. Cyparissia Græciæ ciuitas dicitur à cypressis, ibi multis nascentibus, vt Homerus.

Cupressus nascitur femine & trūco. Marē ex fœmina puenire affirmat Theophrastus.

phraustus. In Creta nascitur etiam trunco, præsertim in montosis Tarra, ubi cædua est, & cæsa regerminat, modo ab terra, modo à parte media, modo summa, raro ab radicibus. Cato satis accuratè eius satione docuit. Quomodo cupresseta feri oporteat, Memius Percenius Nolanus ad hunc modum monstrauit. Semen cupressi Tarētina per ver legi oportet, maturum est ubi hordeum flauescit. semen ubi legeris, in Sole ponito, id purgato, id aridū condito, ubi aridum expositū fiet, per ver ferito in loco, ubi terra tenerrima erit, quam pullam vocat, ubi aqua propter fiet, eum locum stercoreato primum benè stercore caprino, aut ouillo, tum vortito bipalio, & terram cum stercore benè cōmisceto, depurgato ab herba graminibusque. Bene terram comminuito, areas facito pedes latas quaternos, subcauas facito, uti caua aqua continere possint, inter eas sulcos facito, qua herbas de areis purgare possis. Vbi area facta erunt, semen ferito crebrū, ita ut linum feri solet, eo cribro terram incernito, dimidiatum digitum terram altam succernito, id benè tabula, aut manibus, aut pedibus complanato. Si quando non pluet, uti terra sitiatur, aquam irrigato leuiter in areas. Si non habebis unde irriges, gerito inditoque leuiter. Quoties unquod opus erit, facito, uti aqua addas. Si herba nata erunt, facito, uti ab herbis purges quàm tenerrimis, & quoties opus erit per æstatem. ita, uti dictum est, fieri oportet, & ubi semen satum fiet, stramentis operiri oportet: ubi germen nasci cœperit, tum stramenta demi. Alibi alia addit, quæ hic omiserat, referre non pigebit. Semen cupressi ubi seres bipalio vortito, vere primo ferito, porcas pedes quinos latas facito, eò sterco minutum addito, & consarrito, glebasque; cōminuito. Porcam planam facito, paululū concuam. Tum semen ferito crebro tanquā linum, & eò terram cribro incernito altam digitū transuersum, eā terram tabula aut pedibus complanato, furcas circum offigito, eò perticas indito, eò sarmenta, aut crates ficarias imponito, quæ frigus arceant & Solem, uti subrus homo ambulare possit, facito, crebro runcato, simul ac herba inceperint nasci eximito: nam si herbam duram velles, cupressos simul euelles. Ab eo Plinius. De cupresso verbosus, sapiusque, quàm de omnibus aliis prodiderit Cato. E cupresso fœmina pilula collecta, quibus docui mensibus, sicantur Sole, ruptaque; emittunt semen formicis mirè expetitur, ampliato etiam miraculo tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. Seritur mense Aprili, area æquata cylindris, aut volgiolis, densum, terraque; cribris supercernitur, pollicis crassitudine, contra immane pondus attollere se nō valet, retorqueturque; sub terra, ob hoc parciatur vestigiis. Leuiter rigatur à Solis occasu in trinis diebus, ut æqualiter bibat, donec erupant. Differuntur post annū dodrantali filo, custodita temperie, ut viridi cœlo serantur, ac sine aura. Mirūque; dictu: periculū eo tantum die est si rorauerit quantulūcunquē; imbrē, aut si affluerit. De reliquo tuta sunt perpetua securitate, aquasque; postea odere. In satū omnino nō degenerat quoquomodo seratur. Aquam aspernatur, & simū, & circūfossurā amputationeque; & omnia remedia odit, quin etiā necatur. Nunc

verò

verò tonsilis fa-
nera. Trahitur
nes rerum renu-
asserēsve ampu-
Questuosissim-
ria appellabant
Septembris. S-
ad hyemem. V-
& sape eodem
scit, quantū ho-
te producti, q-
tur. Democri-
delectatione
Institutione
neralius dica-
diffisso libro
dant liquore
immisceri rec-
Simulach-
10 qualitate quo-
petua: itaque; in-
tuor atates re-
condere opera-
iam austrino,
Theophrastu
redines nasci
pli Dianæ Ep-
materiam on-
page quadrie-
30 in genere ma-
uis in arce è c-
no dicatur: C-
materie per
Gn. Corne-
posita per v-
Oiphei sim-
mulum en-
sopho, bene
ob rerum m-
40 Vitruuius, C-
rum mistion

verò tonsilis facta in densitate parietum coercitaque gracilitate perpetuò tenera. Trahitur etiam in picturas opere historiali, venatus, classesq; & imagines rerum tenui filo, breuiq; ac virente superueftiens. Immittitur in perticas, afferésve amputatione ramorum, qui xlii anno denariis singulis veneunt. Questuosissima in satura ratione sylua, vulgoq; dotem filiarum antiqui plantaria appellabant. Didymus. Cupressi semen colligitur quidem post calendas Septembris. Seritur postea in sulcos à nona Calendarum Nouembrium vsq; ad hyemem. Vnà autem cum cyparissorum satu hordeum rarum seminato, & saepe eodem anno cupressus plena longitudine augetur; tantum enim cre-
 10 scit, quantū hordeum ipsum: & transplantabis eam. Sed & stolones sua sponte producti, qui sunt ex iactis seminibus cupressi, eodem modo transferuntur. Democritus intra septem ac muros plantari debere cupressum tradit, vt ad delectationem, & sepimentum totius ædificii, ac quasi munimentū nascatur.

In sitionem non recipere, nec alterius sobolem educare inquiunt, & vt generalius dicam, quæ pingues, quæve picem, & resinam illachrimant: nam hæc
 15 diffisso libro hiant, quali de proprio lare saniem contrahunt, oleosumq; exudant liquorem, nitetq; circumquaq; pinguedo: quocirca cum aliis generibus immisceri recusat, perinde quoq; ac ipsum oleum.

In sitione.

Simulachra è cupresso sculpere solent, rimas enim non capit, & carnis æ-
 20 qualitate quodammodo constare videtur. Eius materies diuturna, siue perpetua: itaq; in Epheso cupressina materies, ex qua valux templi Dianæ, quatuor atates reservata duravit. Sola hæc nitorem etiam recipit, ideoq; ex hac condere opera lautiora cōsueuere. Aliquando ex hac statuæ exudat: cælo etiam austrino, humectoq; ita afficitur, quum in ea aliquid sit pinguedinis. Hæc Theophrastus. Sed Plinius. Aduersus cariem, vetustatemq; firmissima. Tere-
 25 dines nasci prohibet amaritudo. Rimam, fissuramq; non capit. Valuas templi Dianæ Ephesæ è cupresso esse, & iam quadringentis propè annis durare materiam omnem nouæ similem. Id quoq; notandum valuas in glutinis compage quadriennio fuisse. Cupressus in eas electa, quoniam præter cætera vno
 30 in genere materie nitore maxime valeat æternus. Nō ne simulachrum Veio-
 35 uis in arce è cupresso durat à condita vrbe quingentesimo quinquagesimo anno dicatū? Cur verò diis simulachra è cupresso fieri solerent, in causa erat tum materie perpetuitas, tum odoris suauitas, quæ thymiamatis loco esse videtur. Gn. Cornelio Lentulo, P. Licinio cōs. cupressæ simulachra Iunonis Reginæ posita per virgines viginti septem, quæ urbem lustrauerunt. Erat in Lebethris Orphei simulachrum ex cupresso, quod quum Alexandri temporibus sudore multum emisisset, pro prodigio habitum; responsum est ab Aristandro Philo-
 40 sopho, bene sperandum. Siquidem opus, quod tunc Alexander aggredere-
 45 tur, ob rerum magnitudinem maximum sudorem esset historiographis allaturū. Vitruuius, Quia cupressus habet humoris abundantiam, æqualemq; cætero-
 50 rum mitionem, propter humorem solet esse panda. Sed in vetustatem sine

Materies.

vitis conseruatur, quod is liquor, qui inest penitus in eius corpore, saporem habet amarum: quapropter non patitur cariem, neq; eius bestiolas, quæ sunt nocentes. Ideoq; ex eo genere quæ opera conficiuntur, permanet ad egregiâ diuturnitatem. Pythagorei, authore Laertio, cupressino ligno abstinebant, quod ex hac arbore louis sceptrum fabricatum esset. Columella tertium locû obtinere dicit cupressum pro stabiliendis vitibus pro ridicis. Varro etiam cupressis pro ridicis vititur. Ex cupresso Aristotele, Aristobolo, Vegetio, atq; Arriano in Syria fieri naues vulgatum, alterius materiei inopia.

Resina.

Resinam fundût cupressi acerrimam sapore, post terebinthinâ, & lentiscinam bonitate, liquidam. Fit quoq; ex cupresso oleum, vt habetur ex Plinio.

De Pinu. CAP. X.

DE pinu loquemur, quod & magnitudine conos omnes superet, & perpetuo vireat folio, & syluestris sit: nam per se in syluis nascitur, montibusq; horret transpositionem, cultum, & insitionem, quæ omnia domesticis familiarissima, vnde improprie mihi videtur inter vrbanas connumeratam à Theophrasto, Plinio, & Virgilio.

Fraxinus in syluis, pulcherrima pinus in hortis.

Nos item ne genera conturbemus, peruertamusq; è pomario, hic confereamus. Pinus, vt Græci fabulantur, puella fuit, olim perquàm illustis, quam vnicè Pan adamabat. Contrà hanc deperibat Boreas. Vtriq; adducta, potius puella Pani adhaesit: propterea zelotypia stimulatus riuâlis Boreas, Pityn in saxa propulsans neci dedit: cuius vicem tellus condolens, in sui nominis arborem commutauit, mutatoq; vitæ genere apud eos mansit. Pana virenti ramo coronat, lugetq; indignum facinus arbor collachrimans, quod Boreas eam immeritam proteruo spiritu impulerit. Huius fabulæ inuolucro Poëta miram arboris naturam innuunt: nam flet arbor, vbi Boream afflantem percipit. Cybele Deorum matri pinum dicauit antiquitas, vnde pini nuces à Martiali, Cybeles poma dicuntur.

Poma sumus Cybeles, procul hinc discede viator,

Necadat in miserum nostra ruina caput.

Cybele iccirco sacra propter Atym ab ea adamatum, atq; in hanc arborem transformatum. Fuit Atys speciosus puer, qui sacris magnæ matris præfuit, à suæ ciuitatis Rege perditè dilectus, qui quum ab eo sibi vim inferri intelligeret, in syluas ad Cybelem perfugit. Rex autem inuento quum vim inferre conaretur, dea stupratoris verenda abscidit, qui moriens, & facinus vlisci cupiens, puero eadem præscidit, quem quum sub pinu semianimem iacentem Cybeles antistites inuenissent, in templum deportarunt, & nixi sunt, verum frustra, reficere, mortuumq; sepelierunt. Pinum arborem, sub qua ille iacuerat, tutelæ suæ dea ascripsit: sed vt eius in perpetuum memoria remaneret, edixit deorum mater, vt singulis annis deflatur, suiq; cultores castrarentur.

Ouidius.

Ouidius.

Cel.

Alii Atym peruenisse mentasse. Iuuenalis.

Sem.

M.

Sed Arnobius natæ filius, ha-

10 vocant, vnde

simè Adeltis

ceret, filiam

ret, intra opp

les Atys nesci

rita cognom

quâdiu mat

propter puer

inter eos nō p

lia sibi defeca

10 scilla autem

guine nascitu

flore velarier

uisceret, non

des comas cre

E

C

A

Ida mons

buunt. D. A

30 quadam vel

eademq; nu

uius dicit, q

tomas fact

quid, & sy

Et P

Plinius a

40 rō Isthmia

buspinus a

Ovidius. — *mollesq; ministri*
Cedunt iactatis vilia membra comis.

Alii Atym, quum per mare Phrygium nauigaret, ad flumen Gallum vsque peruenisse memorant, cuius potu ad infaniam versus, filice testes sibi amputasse. Iuuenalis.

Semiuir obsceno facies reuerenda minori,
Mollia qui rupta secuit genitalia testa.

Sed Arnobius hanc fabulam aliter describit. Fuit Arys Nanae Sagarii amnis natae filius, hæc autem illum hircino lacte nutriuit. Phryges hircum atagum vocant, vnde Arys nomen. Hunc deorū mater ardēter adamauit, sed perditissimè Acedstis, quod Midas Rex sentiens, vt illū à nefanda coniūctione tutū faceret, filiam suam ei matrimonio destinauit, & ne quis nuptialia munia violaret, intra oppidū eos recludit, illudq; muris, turribusq; circummunivit. Cybeles Arys nesciens fatum, ciuitatē ingreditur, turribusq; spoliatur, vnde postea turrita cognominata. sciebat enim nō aliter inter mortales liberū quemquā esse, quādiu matrimonii fœdere vinctus esset. Acedstis verò amore & ira æstuans propter puerum à se alienatum, conuiuantibus furorem ingerit, vnde orta est inter eos nō parua rixa. Postremo, Arys sub pino arbore se proiciens, genitalia sibi defecat, quæ in Acedstin iaculatur, & cum sanguine vitam efflat; abscissa autem deūm mater veste inuoluit, & in terra recondit. Flos viola è sanguine nascitur, ex qua arbor redimitur, cœptumq; postea est, sacras pinos hoc flore velarier, ac coronarier. Acedstes enim Iouem deprecatus, vt Arys reuiuisceret, non obtinuit, tamen assecutus est ne putresceret, sed semper in virides comas cresceret, & minutissimis foliis. Ovidius in sua Metamorphosi.

Et succincta comas, hirsutaq; vertice pinus,
Grata Deum matri, siquidem Cybeleius Arys
Exiit hac hominem, truncosq; induruit illo.

Ida mons Phrygiæ pini refertissimus est: quamobrem matri magnæ attribuant. D. Ambrosius Naturæ imaginem pinum referre dixit, quippe semina quadam veluti annorum vice referat, neque nisi vi caloris admota excludat: eademq; nux flammæ speciem imitatur. Fraudī verò cōsecratam pinum Seruius dicit, quod eius poma per fraudem interimant. Panes, & Satyri è pino tomas factitatas gerunt, rationemque affert Pharnutus, quod montanum quid, & syluestre hæc habeat. Lucretius.

Cum Pan
Pinea semiferi capitis velamina quassans.

Et Propertius.

Et Arcadico pinus amata Deo.

Plinius auctor est apud Isthmos pinea corona coronari victores. Erant verò Isthmia in Melicertæ memoriæ instituta, & Pausaniæ adhuc temporibus pinus apud aram Melicertæ germinabat, quem puerum à Delphino dela-

rum, Sisyphus rei miraculo motus, in Isthmo sepelisse fertur, & certamen illud instituisse. Apud Sicyonios Æsculapius, eodem referente, cum sceptro, & nuce pinea in manu altera, sculptus est. Erat & antiquitus morris symbolum, quod excisa nunquam supputillulasceret, & apud Homerum βέλος ἐχέπευκός telum ex pinu, letale exponunt interpretes doctissimi. Alii ad solam referunt arboris acerbiteratem, & amaritudinem, quando quidem amaritudo morti affinis est, & viceversa mors pro amaritudine proferatur. Staphylus Poeta πύκης στροβίλος, id est, in morem piceæ dixit. Cræsus per caduceatorem Lampfacenis interminatus est eos, ut pinū exterere, nisi Miltiadem missum facerent; quumque Lampfaceni quærent, quid illud esset, quod Rex ut pinum diceret extritutum, à doctiore edocti sunt, arborem semel excisam nunquam supputillulascere: illi tale excidium veriti, Miltiadem è vinculis soluerunt.

Nomen.

Theophrasto, πύκη dicitur, quum omne, quod de πύκη tractat, pino adaptari possit. Theodorus etiam optime pinum vertit. Bellonius, quia viros etiam acutissimos πύκη, & πύκης dictionum affinitas fefellit, litem dirimere gestiens, πύκην piceam vocat, πίνυν, pinum; magisq; tenebras offundit. Idemque sentit Leoniceus. Sed hi mea quidem sententia Plinium sequuti facile lapsi sunt. Plinius πίνυν pinum vertit: nam πιννοκάρπας Græcè, Latine pinorū erucas vertit, ac toto suo volumine πίνυν nunc pinū, nunc piceam indifferenter vertit. At quomodo Dioscorides vocauerit, vix paucis ex suis verbis elici potest. Theophrasto pini nuces στροβίλοι dicuntur, sic Pindaro. Galenus κώνον commune facit pino, piceæ, & pinastro. Simeon Sethi κωνάκια vocat strobilos. Mnasi theus Atheniensis pinearum nucleos, & conos ὀσράκιδας vocat. Ab Hippocrate id totum κοκκῶλον dicitur, ex Athenæo. Ex hac Miletus vrbs Cariæ Pityusa dicebatur, cuius incolæ φθῆρες, vel φθεράων ὄρον, quod pinorū fructibus abundarint, quarum fructus, vel flores, ut multis placet, φθῆρες dicuntur. A pinu etiam Pityodes, & Pityusæ insulæ in mari Balearico dicuntur, & aliæ eiusdem appellationis in sinu Argolico. Lampfacus Helleponti vrbs Troianis temporibus Laumedontea, & Pityusa, & Homero Pitys dicebatur. Latini pinum vocant à pinnato foliorum cacumine, cuius lignosos fructus frequenti nucamento in turbinatam effigiem compactiles, conos & strobilos vocant. Itali pinno.

Descriptio

Ex Theophrasto hæc est excerpta descriptio. Pinus assurgit procero, & recto caudice, nodosoq; folio perpetuo, in extremitate pungenti. Medulla carnosa. Succo pingui, & resinaceo. Radice singulari, & prægrandi, & vnica descendente, parvæ autem complures ab illa exeunt, sed ex ea nulla soboles procreari potest. Pinum recte sollicitatam, quo transferetur, longiorē quàm octo cubita radicem habere quidam vidisse retulit, quanquam non totam refossam, sed abruptam. Auctu difficilis. Amentum profert. Hypear, & stelis in ea nascuntur. Quidam florere existimant, alii minimè, sed nucamentum proportionē præciduis grossis respondere. At Macedoniæ incolæ ne illas quidem florere arbitrantur. Eius germinatio intermissa, ter turgens, terve germina

edens,

VI
edens, ideo id germinatio
terminumq; re
re Ida senius, a
culo vsq; ad pro
cum quaq; emit
ma germinatio
ctis: fortè id di
plus in longitu
germinationes
10 lus rectos porri
liunt, conis adh
ceum sit. Dec
humore non
hæret. Vulu
quum vndiq;
deueniat. Co
pus, scilicet in
tio mense, si
cibus nunqua
10 radice simplici
profundo sibi
borum radices
manifestatur,
quum pinus vi
capillamentū
in vertice. Per
cidit, incenso
tulit. Fructu
nucleos lacur
30 lertia molles
sum, pinus au
bus, semē ve
est, habet fru
turū, ac deit
decerpitur.
rescat. Qu
detrahatur
versicolori
rum, vel Ger
40 riam hyeme
nocet. Quib

edens, ideo id genus arborum *πρωτον* dicunt, quod ter inchoatum opus, intermissumq; reperat. Prima germinatio Februario ineunte, quamquā in monte Ida seriū, ac ferē idibus. Secunda mense Martio, germinans ab extremo furculo vsq; ad proximum antecedentis, & quēdam sursum, quādam in latera circumquaq; emittunt, veluti geniculo facto furculo primi germinis, vt fieri prima germinatio solet. Tertia Aprili mense, diebus circiter quindecim interiectis: fortē id diebus sex, vel septem absoluitur: quo quum ventum sit, non amplius in longitudinem, sed crassitudinem incrementa vertuntur, & si omnium germinationes conspicuæ sint, in pino maximē videtur: nam germina in ver-
 10 sus rectos porriguntur. Ramiq; ex æquo conditi spectantur. Semina profiliunt, conis adhuc pendentibus, vasaq; ipsa relinquunt inania, etsi semen nuceum sit. Decacuminatione interit, quod non sine ratione accidit: quoniam humore non abundat, & meatu conditur rectissimo, & singulari radice inheret. Vulnus infestat, facitq; vt frigus & ardor facilius subeat, præsertim quum vndique inferatur, quum meatuum rectitudine non pigre ad radices deueniat. Cortex in orbem detractus in pino mors est: sed refert anni tempus, scilicet in germinatione. Quum enim cortex turgēt Februario, vel Martio mense, si quis ei detraxerit, morietur, hyeme diutius durat. Adultis radicibus nunquam regerminat. Pinus benigna omnibus esse putatur: quū enim
 20 radice simplici, altaq; nitatur, circa se non fugit, eaq; altē descendens, ē profundo sibi haurit alimentum, non defraudat superficiarias adsitæ arborum radices: vnde patitur myrtos, & lauros propē satas benē habere. ex quo manifestatur, maius incommodum radices afferre, * quā vmbra, quippe * *Gr. τὰς*
 quum pinus vmbra amplissimam reddat. Plinius ab eo. Pinus habet folium *αυδαν.* capillamenti modo prætenue, longumq; & mucrone aculeatum. Ramosa in vertice. Perpetuū viret. Larix vltis radicibus non repullulat, vt in Lesbo accidit, incenso nemore Pirrheo (quod Theophrastus de pinu, ipse de larice trās- tulit.) Fructus grandissimus, pineis nucibus, altissimiq; suspensus, intrus exiles nucleos lacunatis includit toris, vestitos alia ferruginis tunica, mira naturæ so-
 30 lertia molliter semina collocandi. Abies semen reddit post Vergiliarum occasum, pinus autem, & picea germinationem quindecim ferē præueniunt diebus, semē verò post Vergilias & ipsæ reddunt. In maxima admiratione tamen est; habet fructum maturefcentem, habet proximo anno ad maturitatē venturū, ac deinde tertio: nec vlla arborū auidius se promit. Quo mense ex ea nux decerpitur, eodem maturefcit alia, ac sic dispensatur, vt nullo nō mense maturefcat. Quæ se in arbore ipsa diuisere, Zamia vocantur, læduntq; cæteras, nisi detrahatur. Pinus nullo flore exhilaratur, natalēsve pomorū recursus annuos versicolori nuntio promittunt. Pino si quis detraxerit corticem, Sole Taurum, vel Geminos transeunte, quum germinat, statim moritur, eandem iniuri-
 40 am hyeme passa diutius tolerat. Quod si angusta decorticatio fuerit, non nocet. Quibusdam debilibus sterilitatem, non necem affert, vt si quis pino ca-

cumen auferat: sterilefcit enim, nec moritur. Necat umbra sua germina pinus. Eius stillicidia ponderosiffima: nec fastidienda hæc quoque fcientia, neque non in vltimis ponenda, quando quibûsve fatis umbra aut nutritrix, aut noverca est. Pinorum quidem umbræ quæcunque attingere non dubiè venenum est. Quod contra experientiam & Theophrastum est: nam videmus arbores sub pinulæ fructificare. Et Palladius: pinum prodesse creditur omnibus, quæ sub ea feruntur.

Genera.

Theophrastus pinorum alteram urbanam, alteram sylvestrem dicit. Nunc de urbana, postèrius de sylvestri. Plinius: urbani generis alteram Tarentinam digitis fragili putamine, aviumque furto in arbore. Apud nos duo observantur genera, sylvestris, & urbani. Urbanum duplex: duri, & mollis discrimine. Durum contumaci tegmine occluditur, ut nisi lapidis ictu frangatur, vesci non possis. Alterum fructus fert adeò molles, ut digitorum compressu aperiantur, vulgò *pigne mollesse*. Hoc genus Plinio Tarentinū dicitur, & con ramis affixi, Solis æstu dehiscentes, nucleos emittunt, qui ab avibus deuorantur.

Calum.

Frigida loca Theophrastus concupiscere scripsit, montibus latari. Mnestor calidam esse asserit, argumento quòd locis argentibus valeat perdurare, & sui caloris ratione nec niuem super eam durare posse. Etiam tam sensu, quàm ratione eius caliditas percipi potest, quod pinguis, acris, odorata, & quæ quæ sicca, spissa, & putredine immunis durat, & succum pinguem, acremque reddit. Calida quoque quod faciliè ignem concipiat. Gaudet enim pinus apricis, opacis, aut nullo modo aut prauè exurgit. Calida & humida est: argumentum vel ex generatione picis duci utiq; potest. tum etiam vbertati humoris locus Soli expositus conuenit, sic enim excoctio confici amplius possit. Tam loca frigida amat, ut feruidis provenire non posse nulli dubium sit. Plinius. Resinifera montes amant.

Solum.

In Latini agri montosis passim obuiam pinus ut retulit Theophrastus, & magnitudine, & pulchritudine omnes Italicas præstat. Apuleius in arenosis locis provenire dixit. Palladius locum gracilem amare, & sæpè maritimū scripsit. Inter montes & saxa vastior, & procerior inuenitur. Ventosis & humidis, arborum sunt incrementa latiora; sed siue montes conferere velis, seu spatia quæcunque, hæc huic generi deputabis, quæ alteri vtilia esse non possunt. Ob id M. Varro prædij finibus feri iubet, ne familiæ rixentur cum vicinis, ac limites ex litibus querant iudicem, ut eius vxor habebat in Sabinis. Nos sterilibus, & inutilibus locis passim serimus, sed profundis: ostendit vnica, proceræ, & recta radix se in profundum feri debere, quo si defraudetur, nec proceræ, nec lata videbitur vnquam.

Satio.

Id genus nō nisi seminio nasci, ut omnes conifera, prodidit Theophrastus: foliis non degenerans satum. Et alibi. Pinus conifera, & picea, tinea maxima (ut sic loquar) persistere in totum videntur. Didymus legi strobilos iubet iun-
no, antequam Etelæ spirare cœperint, & dehiscentes regimento exiliant, &

ab Octo-

Y
ab Octobri me-
ces pincas feri-
eleis septenis fe-
eiusdem. Palla-
& humidis Feb-
& frumenti m-
plusquam palm-
calcerur inuali-
fructum trans-
multa semina
relicto eo, qu-
trimam planu-
dulgent radi-
straturam al-
eius, quæ vn-
transferti. Fi-
ri. Vbi semel
quas fregit,
lis primò, ind-
transplantare
Palladius ex-
spectaueras in-
digere putaru-
plurimum cr-
Crebitramiti-
ciosior videat-
teda fiat, tam-
ci, & vbertat-
Non enim vl-
tur: radices e-
excessu, qu-
renequeant
nim auram
venarum o-
non ineptè
spirituum
dix abierit
purissimæ
peculiare c-
per alios m-
plus suppe-

ab Octobri mense vsque ad Ianuariū vt amygdalus suis feri nucleis. Cato, nucleas pineas feri, vt cupressi, & ad eundem modum tanquam allium. Plinius, nucleis septenis ferē in ollas perforatas additis. Tempore, à calēdis Martij ad Idus eiusdem. Palladius siccis regionibus mense Octobri, vel Nouembri, frigidis, & humidis Februario, & Martio. Exarabis ea loca diligenter, atque purgabis, & frumenti more semētem asperges, ac leui sarculo curabis operire: nec enim plusquam palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore, ne calcetur inualida. Proficiet, si nucleos aqua triduo macerabis. Dicunt pineum fructum translatione miscere: sed plantas hoc modo procurant, vt prius multa semina in caliculis, terra & fimo repletis obruant, quæ ubi processerint, relicto eo, quod solidius est, auferunt alia: ubi iustam cœperit incrementum, trimam plantam cum ipsis caliculis transferunt, quibus fractis in scrohe indulgent radicibus largitatem. Terræ tamen e quæ sterco admissent, facientes straturam alterno ordine, subinde crescentem. Seruandum est tamen, vt radix eius, quæ vna, & directâ est, vsq; ad summitatem suam possit integra & illasa transferri. Frigidis locis, & humectis possunt Februario mense pineta seminari. Vbi semel lata est pinus, transplantari non patitur, nam si quis fibrillas aliquas fregerit, exarescit, vnde qui agris, vel pomariis serere eam cupiunt, vasculis primo, inde scrobibus con fractis deponunt. Nos & si maxima diligentia 20 transplantare conati sumus, rarò concepit.

Palladius expertus est nouellas pini arbores putationē promouere, vt quæ *Cultus.* speraueras incrementa duplicentur. Omnes, neglectam viuere, nec cultu indigere putarunt; tamen quæ campis seruntur, & coluntur, in vastam amplitudinem crescunt, & conos maiores, vberiores, & sapidiores proferunt. Crebri rami interlucandi sunt, & vt melius arbor increseat, & vt ordinata, speciosior videatur. Pini morbus est, vt Idæi incolæ tradunt ex Theophrasto, vt *Morbi, & remedia.* tēda fiat, tam parte caudicis externa, quàm corde. Id quod ex abundantia succi, & vbertate largæ luxuriantis naturæ provenit: isque morbus naturalis est. Non enim vlllo morbo afflictata moritur, sed optimæ habitudinis causa moritur: radices enim crassescētes in tēdam abeunt ex succi copia, ac nutritionis excessu, quum alimentum, quia pinguedine obstructæ sunt viæ, transmittere nequeant, sicut animalia quædam, quæ supra modum crassescunt: quum enim auram attrahere nequeant, nec spirationis vsu frui possint, quoniam venarum oscula pinguedine sunt angustata, obductæque suffocantur. Idcirco non ineptè rustici de pino tradunt. Pinum obesitate strangulari: omnia namq; spirituum egent solutione & meatuum libertate. Alibi verò. Quum tota radix abierit in tēdam, pinum morituram. Ratio est, quia alimenti pars excocta purissimaque insidet, ex eo in sessu pinguedo fit: quod verò cæteris partibus peculiare est, sursum fertur ad earum alimentum non per pingues partes, sed 40 per alios meatus. Cum verò tota radix in tēdam conuersa est, tum non amplius suppeditare alimentum cæteris partibus potest, sed occupatis aditibus,

obsessisque viis, à pinguedine illa intercluso sic spiritu, vt amplius commeari non possit, arbor extinguitur. Aliis autem arboribus, quibus nulla pinguedo, aut si inest non multa, id non euenturum. Pinus detracta teda seruari potest, pinguedo enim huic pro morbo habetur, sed hac non nisi benè adulta sufferre potest, & hinc antequam putruerit, seruari ac viuere potest: nam non semper redificare consuevit, sed quum viger, & ætate adulta est. Nouella tedâ caret, quum alimentum ad germina, incrementa que altitudinis absomit, & quum dilatare cœperit, statim tedâ habitudo consequitur. Plinius ab eo. Aliæ verò obesitate, vt omnia, quæ resinam ferunt, nimia pinguedine in tedâ mutantur, & quum radices pinguescere cœpere, intereunt, vt animalia nimio adipe.

Coditura.

Nuces pineæ, Palladius ait, vsq; ad mensem Nouembris in arbore esse possunt, & maturiores legentur, prius tamen legenda sunt, quàm patefiant. Nuclei nisi purgati durare non possunt, tamen alij in vasis fictilibus nouis, & terra repletis, in testis suis missos asserunt custodiri.

Materies.

Pini materies expetita nauigiis, ex Theophrasto. Rotunda sunt, quoniam non putrescunt: & onerariis carinæ pineæ subiguntur, vt quum in terrâ extrahunt, resistere possint. Quercui conglutinari non potest, quia natura dissimilis: affectus autem similis ea esse oportet, quæ societate conflare debeant, non contrarij, ceu si ligno lapidem coniungere velis. Ponderis substantia valide potest, argumento, quod nunquam rumpatur. Sed priusquam viribus, carie, aliisve deficiat, quippe cum reliquæ omnes in inferiora flectantur, pinum re-niti affirmant. Pinus ferè omnium maximè viribus valer, & ad vsum ædificatorum spectabilis eadem potissimum est laxitatis, rectitudinisque meatuum causa. Hanc enim nec findi quidem vllo pacto posse affirmant, si glutine muniat. Excussores carbones pineos potius quarunt, quàm quernos, quâquam infirmiores sunt: ad flatum enim respondent commodius, quoniam minus marcescant, extinguanturque. Habet & quadrifidos venarum cursus, ideò ad opera vehementer probant, quadripartitâque appellant. Materies carnosa, nervisq; paucis, materiem spississimam præstat; & ægidem gignere solet meliorem quàm abies. Nodi plures, & reliquis omnibus duriores, densissimi, solidissimi, patentioresque, colore tedæ proximi, maximeq; sui generis. Dicunt pinum plusquam abietem comedi à teredine posse: nam pinum dulcedinis non nihil habere, eoq; magis, quò fuerit tedâ refertior. A quo Plinius. Pinus aduersus cariem, tineasq; firmissima, ad aquarum ductus in tubos cauatur. Obruta terris, plurimis durat annis: eadem si non immergatur, cito senescit, mirum in modum fortior, si humor extra quoq; supersit. Ex eadem malleos fieri. Sed Theodorus Theophrasti tetrazoos, & monozoos manifesto errore quadriuium, & biuium interpretatur. Virgilius nauigiis aptam cecinit.

— dat vile lignum
Nauigiis pinus.

Palla-

Palladius. Pi
comperi in Sa
qualiber anno
in litore, vt a
ctus allueret. A
simus, quam o
quæ à magnitu
pedum viginti
do duorum iu
10 Pinum ced
sura non ann
teda detracta
piofior confi
da enim pin
nirur modo
ipsis, vix vt
Terebinti
ceam, & ced
cipi debet: n
20 runt, præterq
dicem tantum
purissimâq;
opaca, horrid
tum copia, tu
colore candi
pam & boni
pinos discern
aiunt ex lida
dore gratio
30 habet feri. Q
rem, & crass
rem lidaam
lutius pluui
cisq; locis
asserunt. F
hipossit, fi
pletio non
bore coire,
tantum ter
40 dem detract
cipita dece

Palladius. Pinus nisi in siccitate non durans, cui contra celerem putredinem comperi in Sardinia hoc genere prouideri, vt excisa trabes eius, aut in piscina qualibet anno totomersa laterent, post operi futura, aut arenis obruerentur in littore, vt aggestionem, qua tecta essent, alternis aestibus reciprocans fluctus allueret. Attalus apud Strabonem tradit: Ida mons Phrygiæ pinis refertissimus, quam ob causam matri magnæ tribuunt. In eo enim fuit ingens pinus, quæ à magnitudine, & speciositate, pulchra nominata est. Ambitus eius fuit pedum viginti quatuor, altitudo à radice sexaginta & septem: tota eius altitudo duorum iugerum, & quindecim cubitorum spatium amplectebatur.

10 Pinum cadendam post germinationem affirmat Theophrastus. illius cæ- *Resina.*

sura non annua, sed post plus temporis fieri solet: ubi iam vulnerata arbore, teda detracta est, resinam hauriunt, sic enim in vulnus inuectum humor copiosior confluit; copiosissima, ponderosissima, & picosissima quæ ex pino, teda enim pinus referta est. Portatur vtribus liquida, dein sponte, quo nunc cer- nitur modo spissatur. Plinius. Pinus fert minimum resina, interdum & nucibus ipsis, vix vt ascribatur generi. Resina sicca in pinu fit, nec magnopere in usu.

Terebinthum & picem quidam apud Syros largiri affirmant, quidam & pi- *Pice.*

ceam, & cedrum, & palmam addunt, sed hoc, quia rarum, pro contingenti accipi debet: nam qui Macedoniam incolunt, ne pinum quidem picis gratia v-
20 runt, præterquam matrem. Sterilem enim marem nuncupant, scemine enim ra-
dicem tantum accipiunt. omnis enim pinus teda radice ingerit. Pix optima,
purissimaque; quam loca admodum aprica, & aquilonia præbent, contra, quam
opaca, horridior limumque; referens. Est præterea sterilitas quædam fertilitasque;
tum copiarum, tum bonitatis, quippe quum mediocri hyeme copiosa, & bona, &
colore candidior reddatur, asperam verò, pauca, atque deterior. Quæ quidem co-
piam & bonitatem picis definiunt: non larga fructificatio pinorum. Idæi qui
pinos discernunt, & aliam Idæam, aliam marinam cognominant, picem fieri
aiunt ex Idæa largiorem, nigriorem, dulciorem, in totumque; faciliorem, & o-
dore gratiorem, dum cruda sit, decoctam enim in minus contrahi, quoniam plus:

30 habet feri. Quamobrem tenuiorem hanc esse addunt. Ex marina autem flauio-
rem, & crassiorem, scilicet crudam, ita vt decocto minus auferat, sed tedacio-
rem Idæam tradunt: (vtque; simplicius loquar) tantundem tedæ plus picis & di-
lutius pluuiosa tempestate, quam sicca reddere volunt: & ex hybernis, opa-
cisque; locis plus, quam ex apricis, serenisque;. Hæc igitur ita Idæi, atque; Macedones,
asserunt. Replentur caua plagarum, videlicet in tantum, vt iterum pix extra-
hi possit, frugalis pini, anno proximo; mediocri secundo: vitiosa, tertio. re-
pletio non coitu ligni, sed incremento picis conficitur, lignum enim in hac ar-
bore coire, iterumque; vnum refici nequit. sed confectio quidem picis reddi possit.
tantum temporis solet: necesse autem ligni agnationem fieri quandam: si qui-

40 dem detracta teda deustaque;, effluuium euenire picis solitum est. Id igitur ac-
cipi ita decet. Idæi ubi arboris caudicem cortice dispoliarint, quod parte solari

binis aut ternis à terra cubitis facere consuevere, confluxum istuc fieri non sine teda vno cum plurimum anno affirmant. Idq; quum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleri, & tertio pari modo. Posthac ob eam paulatinam incisuram arborem extenuatam, putrefactamq; humi facile à flatu prosterni, tum eius cor extrahi: (hoc enim teda maxime refert) extrahi autem ex radice. Hanc enim in omnibus teda constare, vt diximus, sed hac in re probas quidem crebrius vulnus accipere, deteriores verò longiori tempore post: & parte aliqua reseruata, plus temporis resistere posse: tota verò detracta, minus, consentaneum prorsus est: ternas tamen detractiones eiusmodi maxime arbores tolerare posse videntur. Non simul fructificat, & tedificat pinus, sed protinus nouella fructificat, multò autem post facta, vetustior tedificat. Picem hunc in modum vrere consueuerunt. Quum locum æqualem præparauerint, & veluti area facta concursum habente, in medium, diligenter pauimentarint, truncos perfissos componunt, proximè sanè compositioni carbonum facientium, præterquam quòd sine fossa opus perficiunt, lignis erectis, & inter se coherentibus, ita vt altitudinem assidue pro multitudine capiant. Fieri autem aiunt, vt compositio sit circuitu centenorum octuagenorum cubitorum, altitudine verò quum plurimum sexagenorum, aut centenorum, & quinquagenorum ambabus, si teda pinguis sit. Quum igitur teda ita construxerint, & materiam pertexerint, aliqua terra ²⁹ superinfusa vndique, summa cum diligentia occultant, vt ignis nulla ex parte emicari possit. Pix enim peribit, si id acciderit. Succidunt autem per aditum relictum, dein eam quoque partem stipant materie, & obstruunt terra, reliquasque omnes obseruant, & quacunque fumum protrudi viderint, scalis scandentes, terram assidue infundunt, quò nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis verò per medium structus aceruum, picem fluentem in foveam ducit, cubitis circiter quindecim ab aceruo. pix effluens tactu frigida fit: vritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum. Sæpe enim posttridie ante Solis occasum exusta iam est, rogiusque cessit, id enim euenit, quum nihil reliquum est, quod amplius fluat. Totum autem tempus, quo teda vritur, ³⁰ vigilanter obseruant, ne quid ignis erumpat, sacrificant atq; concelebrant, precantes, vt pix sibi copiosa, bonaque fiat. Plinius ab eo. Pix non aliud est, quàm combustæ resinæ fluxus. Picis vitium adustio. Experimentum si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescant acore iucundo. Asia picem Idæam maxime probat, Græcia Piericam, Virgilius Naritiam. In Macedonia laricem masculam vrunt, scæminæ radices tantum (quod Theophrastus supra de pino retulit.) Pix optima ubiq; ex apricis, Aquilonis situ. ex opacis horridior, virusq; præferens, frigida hyeme deterior, ac minus copiosa, & decolor. Quidam arbitrantur in montosis, copia præstantiorem, ac colore, & dulciorem fieri, odorem quoq; gratiorem dum resina sit: decoctam autem minus ⁴⁰ picis reddere, quoniam in serum abeat, tenuioresq; esse ipsas arbores, quàm in planis,

planis, sed has, ab incisulargina, non cortice, pa coquitur na sum furnis vnd canali. hoc in S hominum defu picem fundit. E gulata brutia c re ab alia pice d mia illa sunt. dicina brutia, res: ob id mag

Diximus de pinaste Theophrastus nescio quapinalstrum ver prius pinus & Plinio author Diximus de um binum stat cant. Alii in m scæminam, & Theophrastus viridi, minime præbens, nigri terior propter ma folio tenui, u, aperienda: M da crudam, t dam pini ster i, ligno dur nascitur qui flagras, sed ciq; sed non Graci vocan gariot, ac me tis adigitur, q de xw colo

planis, sed has, & illas serenitate steriliores. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur, alia secundo, quædam tercio. Expletur autem plaga resina, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit. Pix liquida in Europa coquitur naualibus muniendis, multosq; ad alios vsus. Lignum eius concisum furnis vndiq; igni extrâ circumdato, feruet: primus sudor aqua modo fluit canali. hoc in Syria cedrium vocatur, cui tanta vis est, vt in Ægypto corpora hominum defunctorum eo perfusa seruentur. Sequens liquor crassior iam, picem fundit. Hæc rursus in cortinas æreas coniecta, aceto spissatur, & coagulata brutæ cognomen accepit, doliis duntaxat, vasisq; cæteris utilis, lento re ab alia pice differens. Item colore rutilante, & quod pinguior est. Eteda omnia illa sunt. Picis duo genera, spissum, liquidumq; spissarum vtilissima medicina brutia, quoniam pinguisima, & resinosisima vtrasque prabet vtilitates: ob id magis rutila, quàm cætera.

De Pinastro. CAP. XI.

DIXIMVS de vrbana, nunc de syluestri, siue de pinastro dicemus. Plinius, pinaster, ait, nil aliud est, quàm syluestris pinus.

Theophrastus *πύκνον ἀγρῆαιον* vocat, quasi syluestrem pinum dicas. Theodorus nescio qua ductus causa in Theophrasto vertendo *πύκνον* nunc pinum, nunc pinastrum vertit, Plinium sequutus. Dioscorides videtur *σπόβιλον* vocasse, quum prius pinus & piceæ, postea *σπόβιλα* meminere. Latini pinastrum vocant, Plinio auctore, vt diximus. Itali *pino soluaggio*.

Diximus è Theophrasto: pinorum alia vrbana, altera syluestris. Sylvestrium binum statuunt genus, quorum alteram Idæam, alteram maritimam vocant. Alii in marem, & fœminam diuidere solent. Macedones in marem, & fœminam, & sterilem diuidunt.

Theophrastus ita describit. Idæa recta, celsa, materie crassa, nuce oblonga, viridi, minimeq; dehiscenti, tanq; syluestriori, ramosa, tedacior, picem largius præbens, nigra, dulcem, tenuem, odore grauem, utiq; cruda, quoniam decocta deterior propter ferum, quod in ea continetur abundanter. Perpetuo viret. Maritima folio tenui, imbecilloq; cortice læui, molli: vtilis ad coria, nuce rotunda, breui, aperienda. Materie valida, robusta: Picem præbens flauentiolem, crassam quædam crudam, ita vt decoctio minus auferat. Macedones verò etiã genus quoddam pini sterile dicunt, & marem sic describunt. Caudice breuiori, folio duriori, ligno duro, circumacta medulla, fabrilis opere cõtorto, colore nigriori. Subnascitur quiddam colore rubidius tæda, odore grauissimo, neq; tædâ redolens, neq; flagrans, sed ab igne dissiliens. Fœmina procerior, folio pingui & molli, simpliciq; sed non videnti, ligno molli, ac omnino tractabili securibus. Gignit quod Græci vocant agida, id est, cor eius, quum sit minus tædacea, quàm mas, læuior, ac meatuum cursu probior, id est, quum grandium arborem nonnullis securis adigitur, quibus prostratis eadem partes, ambietesq; computruerunt. Græcè *εὐργον* colore vehementer abiecto & neruo prætenui, sicū vocant Idæi tedarii.

Plinius

Plinius ita describit. Pinaſter habet folium capillamenti modo pratenue, longumq; & mucrone aculeatum. Mira altitudine, à medio ramoſa: copioſiorē dat hæc reſinam. Alia in generibus iſſis, etiamnum in ſexu differentiæ. Maſ breuior, & durior, fœmina procerior, pinguioribus foliis, & ſimplicibus, atq; non rigentibus. Lignum maribus durum, & in fabrili opere obtortum, fœminæ mollius, publico diſcrimine in ſecuribus. Hæ in quocunq; genere deprehendunt marem, quippe reſpuuntur, & fragoſius ſidunt, ægrius reuelluntur. Ipſa materies retorrída, & nigrior maribus radix. Circa Idam, & in Troade: & alia differentia eſt montanæ maritimæque: nam in Macedonia, & Arcadia, circaq; Elin permutant nomina, nec conſtat authoribus, quod cuique generi attribuant. noſ iſta Romano diſcernamus iudicio. Pinaſtro è ſylueſtrium generè non decidunt folia. Nuceſ pinaſtri pytidet vocant. Tedam mareſ duntaxat ferunt, & eam, quam Græci Sycen vocant odoris grauiffimi. Theophrastus in montibus naſci dixit.

Celum.

De Picea. CAP. XII.

FABVLOSVM Plutarchus exiſtimat, quod Praxiteleſ aſſerit, inuentum Melicertæ corpus picea ſcaturiſſe à mari, eſſeq; Megariſ locum, qui Callidromos cognominatur, quò puerum fruticibus huius arboris onuſtum remeſſe viderint in mare, ſic vt communi populi iudicio picea Neptuni coronamentum exiſtinetur, etſi Libero patri, vt Lucanus putat, ſacra dicatur. Quapropter ob honores Melicerti contributos, Neptuno, & item Libero patri, veteres, nec ab re, conſecrarunt, quod vterq; humentiſ, fœcundiſ, fertilisq; principii dominuſ habeatur. Cæterum Neptuno priuatim nuncupatur, non vt Apollodorus exiſtimat, quod maritima arboſ ventis, aut mare latetur, eorumq; diſſantes ſpirituſ amet, ſed quod fabriciſ nauigiorum picea expetatur. Germanæ quin potiuſ ſororeſ habentur picea, pinuſ, ſtrobili: nanque materiam nauibuſ præbent, ſuamq; picem ac reſinam fundituſ oblinendam ſubminiſtrant, ſine quibuſ in mari parum fidelis compaginuſ eſſet commiſſura. Libero patri piceam fecere ſacram, quòd vina reddat ſuauiora, quippe vitem lociſ picea ſcatentibuſ, iucundiuſ ac gratiuſ vinuſ proferre produnt. Ex calore cauſari Theophrastuſ dicit, argillam calidam eſſe, & non niſi argilloſiſ piceam naſci. Dolia pice & reſina cerari, vina multiſ regionibuſ picari, non ad ſuauiſtatem modo conciliandam, ſed vt protinuſ nouitatē, aquoſumq; humoreſ vinuſ calore iutum exuat. In Iſthmo victoreſ picea coronabantur. Pliniuſ. Picea feraliſ arbor, & funebri iudicio ad foreſ poſita, ac rogiſ virent, iam in domoſ recepta, tonſili ſ facilitate. A picea, quæ *Padeſ* Gallicè vocatur, Septiuſ Metrodoruſ apud Pliniuſ, & M. Cato in libriſ originuſ Paduſ vocatuſ ſcribunt, quòd hæc arboſ plurima circa eiſ fontē adnaſcatur.

Nomen.

Vocat Theophrastuſ *πίτυν*, Pindaruſ *πίτυος* frondibuſ coronari victoreſ Iſthmioſ. optimè igitur Theodoruſ in Theophrasti verſione picem vertit. Latiniſ Picea, Plinio auctore. Itali *Pino ſelua* ggio.

Theophra-

Theophrastuſ
ri, miniuſq; alio
platano. Folio
tuo viret. Negat
fici proportionē
dentē obſtruſ
poſtq; folia deci
melcat, vt germ
noſ, magiſq;
re, quia paulò
ro ſuum fructuſ
fructuſ ambi
incenſo Pyrrh
ditur, demuti
to imbecillio
ari minime o
ſera, & craſſio
lut brachia late
tanta nataliū
rix ficiora, &
ſina. Lignuſ
pullulat, vt in
bieſ) totiſ pan
habet, propter
ta cōpreſſiora
dia annorum
verſicolori n
tia. Picea abi
Vergiliuſ &
num eſt. Pice
ſtio animaliu
verò detrunc
viuit: ſi verò
phraſtuſ pi
phraſtuſ, i
Tertiuſ eſt
deò molli
In mont
ſat. Naſcitur
& omneſ qu
ior. Pliniuſ

Theophrastus ita suam *πίτυν* describit. Caudice paruo, humiliori, gracilio-
 ri, minusq; alto, minusq; recto, quàm pinus assurgit. Cortice spissiori quàm
 platano. Folio pinguiori, pauciori, squalidiori, tenuiori q; sed capillato. Perpe-
 tuo viret. Negat aliqui florere, sed vice floris esse nucamenta, grossis præciduis
 fici proportionē respōdentia. Fir enim veluti foliorū conceptus inter antece-
 dentē obstruōnē, & sequentem exortum, medius. At ex proprietate autūni,
 postq; folia decidere, peculiaria eius confestim gignuntur, quasi grauida intum-
 mescat, vt germina pariat, duretq; per hyemē vsq; ad ver. Conos fert pino mi-
 nores, magisq; algētes, resinaq; perfusos. Germinatione præuenit abietis flo-
 10 ré, quia paulò ante solstitiū erumpit, diebus ferè quindecim post Virgilias. Se-
 ro suum fructum perficit, vt perpetuò virēs. Ligno autem tam fructus, quàm
 fructum ambientia constant. Aduitis radicibus repullulat, vt in Lesbo accidit,
 incenso Pyrrhēi montis nemore, quod piceis scatebat. Peculiare de picea pro-
 ditur, demutilatione nō interire, sed sterilefcere. Causa quòd principio altera-
 to imbecillioriq; reddito vires deficiunt, & fructus iccirco, vtpote vltimus cre-
 20 ari minimè omniū potest. Plinius ita suam piceam describit. Piceæ folia breui
 feta, & crassiora, durāq; ceu cupressis. Rami statim penè ab radice modici, ve-
 lur brachia lateribus inhærent. Perpetuò viret. Nec facile inuicē discernuntur:
 tanta nataliū mistura est. Sed picea minus alta, quàm larix est. folia, quàm la-
 30 rix ficiora, & tenuiora, ac magis algentia. totaq; humidior est, & perfusa re-
 sina. Lignum abieti simillimum. Latix vltis radicibus non repullulat, picea re-
 pullulat, vt in Lesbo accidit, incenso nemore Pyrrhæo. Piceæ verò (quàm a-
 bies) totis paniculis, minoribus, gracilioribusq;, minimos ac nigros nucleos
 habet, propter quod Græci phthiophoron eā appellant. In eadem nucamen-
 ta cōpressiora maribus sunt, ac minus resina roscida. Tristis est, nec sentit gau-
 dia annorum, nec vllō flore exhilaratur, natalēsve pomorum recursus annuos
 versicolori nuncio promittit. Folia insecta pectinum modo piceæ, & pungen-
 tia. Picea abietem præuenit germinatione xv diebus ferè. Semen verò post
 Vergilias & ipsa reddunt. Piceæ umbra quæcunq; attigere, non dubiè vene-
 30 num est. Picea detractō cacumine, aut ignibus adusto interit. Similis & depa-
 stio animalium. In piceis ramorum ordo. Decisis cacuminibus moritur, totis
 verò detruncatis durat, & si infra, quàm rami fuere, præcidatur, quod superest
 viuit: si verò cacumen tantum auferatur, tota moritur. Inter syluestria Theo-
 phrastus piceam refert, *πίτυν ἀγέλαν*, scilicet syluestrem nominans. Præterea
φθειρόφορος, id est, tineosa, & pediculosa dicitur. Plinius satiuæ pineæ meminit.
 Tertium è picea satiuæ sapinū, nucleorum verius cute, quàm putamine, a-
 deo molli, vt simul mandatur.

In montibus nasci pineā scribit Theophrastus, quæq; in planis nasci recu-
 sat. Nascitur in Arcadia parua, sed circa Elim agrū multa. In Ponto nō nascitur,
 40 & omnes quæ tādā inferunt. Cyprii hanc habent, videturq; pino præstan-
 tior. Plinius. Montes amat, atq; frigora. Virgilius in Georgicis:

N

Descriptio.

Genera.

Caelum.

præuenit, lon-
 fa: copiosiorē
 fferentia. Mas
 mplicibus, atq;
 tortum, fœmi-
 genere depre-
 us reuelluntur.
 in Troade: &
 ia, & Arcadia,
 cuique generi
 luestrum ge-
 mares duntax-
 mi. Theophra-

erit, inuentum
 cum, qui Calli-
 onustum reme-
 ptum coronat-
 dicatur. Qua-
 20 Libero patri,
 ndi, fertilisq;ue
 ncupatur, non
 te læteretur, eo-
 picea exspectatur.
 nanque mate-
 plinendam sub-
 et commissura.
 a, quippe vitem
 produnt. Ex ca-
 30 ni nisi argillosis
 spicari, non ad
 aquosumq; hu-
 coronabantur.
 acrogis virens,
 Gallicè vocatur,
 num Padum vo-
 dinalcatur.

pronari victores
 picem vertit. La-
 40

Theophra-

*Aut sceleratum exquirere frigus
Difficile est, picea tantum, taxiq; nocentes.*

Satio.

Solo semine prouenire tradidit Theophrastus.

Materies.

Cyprii omnia ex piceis conficiunt: sunt, qui ex picea triremibus leuitatis causa tornandum statuunt firmamentum. Domibus, & nauibus picea v-
sus, sed maxime ad nauale, sed putrere celeriter incipit. Malleos magnos ex
picea faciunt. Quibusdam enim operibus molliores expeti solent, vt argen-
teis carbones, qui ex picea confecti sunt. Tempus cadendi piceam, quum vya
eius florere incipit. Hæc Theophrastus. Plinius. In magno vsu agrestium, va-
sa, corbesq; ac patentiora quædam messibus conuehendis, vindemiisq; faci-
unt, atq; prætexta tuguriorum. Picea ad aquarum ductus in tubos cauantur:
obruta terris plurimis durat annis: eadem si non integratur senescit: mirum in
modum fortior, si humor quoq; extra super sit.

Resina.

Humor piceæ lachrimæ modo gignitur. In picea degustatis lignis vulnus
inferunt, & inde resinam hauriunt, sic enim humor copiosius confluit, haud
enim quamq; secretionem modo eodem agi mos est. Secundum bonitatis lo-
cum obtinet, leuior enim quàm quæ ex pinu. ex Theophrasto. At Plinius, Pi-
cea plurimum resinæ fundit, interueniente candida gemma, tam similis thu-
ri vt mixta visu discerni nequeat, & inde fraus seplasia.

Pice.

Picea picem euidentiore, paucam item, & amarā fundere dixit Theo-
phrastus. Plinius. Aperitur picea à parte solari, non plaga, sed vulnere ablatis
corticis, quum plurimum bipedali hiatu, vt à terra cubito cum minimum ab-
sit. Nec corpori ipsi parcitur, vt in cæteris, quoniam astula in fructu est, ve-
rùm hæc terræ proxima laudatur, altior amaritudinem affert. Postea humor
omnis è tota confluit in vlcus. Quum id manare desiit, simili modo ex alia
parte aperitur, ac deinde alia, postea tota arbor succiditur, & medulla eius
vritur.

De Sappino. CAP. XIII.

Sunt inter scriptores, qui sappinum abietis inferiorem partem vocitent:
sunt alii, qui sappinum arborem peculiarem, & ab aliis specie diuisam di-
cant, vt demonstrabimus. Vitruuius de abiete loquens: Superior pars perdo-
lata propter nodationis duritiem dicitur esse fusterna, ima autem quum exci-
sa quadrifluuiis disparatur, cincto torulo ex eadem arbore ad intestina opera
comparatur, & sappinea vocatur. Ab eo Plinius. Abietis pars, quæ à terra
fuit, enodis est, hæc qua diximus ratione fluuiata decorticatur, atque ita sap-
pinus vocatur: superior pars nodosa, duriorque fusterna. Ex his authoritati-
bus sappinum videtur abietis esse partem. Nunc videbimus arborem sui gene-
ris descriptam, ac piceæ speciem esse. Vitruuius libro primo ait. Namque non
omnibus locis arenæ fossitiæ, nec cementorum, nec abietis, nec sappinorum,
nec marmoris copia est, sed aliud alio loco nascitur. Inopia abietis, aut sappi-

norum

V
orum vitabitu
ce, & resiniferi
num, quoniam
que arboris in
feritate paulu
rum cate veriu
arbores inter se
nascuntur, ac fi
eas differre dici
ro quing; vel
piceis ardentib
bet. Vnde mil

D
conife
ter pinogene
rum, de ea ali
ret ex vrbani
Ex quibus ven
20 hyeme calue
Græcis ad
pinarelinam liq
incola. Et pa
oleosa, aliam
m dixit, num
dorus nunc
rix, & larex.
Plinius l

nu, & picea
30 teries præsta
& odore ac
re, nunq; du
etiam à per
crassior, l
xu, at pice
horridior
pullular, v
flore exhib
to, ac terna
40 arboribus

eorum vitabitur vrendo cupressō, populo, vlmo, pinu. Plinius de picea, larice, & resiniferis loquens ait. Inter hæc genera proprium quidem fecere sapinum, quoniam ex cognatione earum feritur, qualis dicta est in nucleis. Eiusque arboris imas partes tedas vocāt, quum sit illa arbor nil aliud, quàm picea, feritare paulum mitigata satū. Alibi. Tertium sapinium è picea satina, nucleorum cute verius, quàm putamine, adeò molli, vt simul mandatur. M. Varro arbores inter se differentes facit, ait enim: Quædam in montibus prolixiora nascuntur, ac firmiora propter frigus, vt abietes, ac sappini. Columella etiam eas differre dicit. Tum enim exceptis nucleis ipsas nuces pineas vacuas numero quinq; vel sex incendunt, & ardentes eodem demittunt. Alii nucibus sapineis ardentibus idem faciunt. M. Cato prælum sappino atra faciundum iubet. Vnde mihi videtur sapinum domesticam esse piceam.

De Larice. CAP. XIII.

DIXIMVS de coniferis, resiniferisq; quibus folia non decidunt, nunc de coniferis, & resiniferis perdifoliis, inter quas larix est. Theophrastus inter pini genera recenset. Ideo monebat ordo, vt post pini genera & resiniferarum, de ea aliquid scriberemus. Meminit eius Theophrastus quum dixit: Viret ex vrbani perpetuò olea, palma, laurus, myrtus, & pini genus quoddam. Ex quibus verbis datur intelligi non omnes pinus perpetuò virere, sed aliquas hyme caluescere, quod nulli inter pinuum genera conuenit, nisi larici.

Græcis *λάριξ* dicitur, vt ex Dioscoride colligitur, inquitente. A Gallia subalpina resina liquida conuehi solet, quam vernaculo nomine *laix* appellant incolæ. Et paulò post. Resinæ inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei coloris similitudine, vt *λάριξ*. Plinius quæ Theophrastus de *πινυ* dixit, nunc de larice, nunc de picea interpretatus est, ex quo anceps Theodorus nunc laricem, nunc piceam vertit, illiusq; erroris causa fuit. Latinis larix, & larex. Italis *larice*.

Plinius laricem ita pingit, cuius verba è Theophrasto mutuatus est de pinu, & picea loquente. Quinto generi situs idem, eadē facies: larix vocatur: materies præstantior longè, incorrupta vis, emori contumax, rubens præterea, & odore acrior. Plasculum huic erumpit liquoris, colore melleo, atq; lentiore, nunq̃ durescentis. Perpetuò viret, nec facile discernitur à cæteris in fronde, etiam à peritis, tanta nataliū mistura est, sed picea minus alta, quàm larix; illa crassior, leuiorq; cortice, folio villosior, pinguior & densior, meliorq; flexu, at picea rariora siccioraq; folia, & tenuiora, ac magis argentia, totaque horridior est, ac perfusa resina. Larix vltis radicibus non repullulat, picea repullulat, vt in Lesbo accidit incenso monte Pyrrhæo. Folio pungenti. Nullo flore exhilaratur, nec annorum gaudia sentit. Germinū incrementum tripartito, ac terna germina edit, ideo & inter squamas corticū spargit, quod omnibus arboribus in germinatione euenit, quoniam prægnantium rumpitur cortex.

Est autem prima eius germinatio incipiente vere, circa xv diebus. Iterum germinat, transeunte Geminis Sole: sic fit, vt prima cacumina impelli securis appareat, geniculato incremento. Tertia est eiusdem ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus, clareq; tunc cernitur excrescentium cacuminum articulatio. Larici humor diu defluit. Hæc omnium arborum cum abiete altissima, rectissimaq;. Conuenit his, pinoq;, vt quadripartitos venarum cursus, bifidosq; habeant, vel omnino simplices. Nos autem ita describimus. Foliis plurimis puber, sed delicatioribus, per exortus quosdam manipulatim, & penicilli in morem deciduis. Triplici excremento nota, manna nêpe, agarico, & resina: quæ Venetiis Larigna dicitur. Caudex crasso corticis callo cõstat, rimis profundis, & hiulcis liratis patetibus: rami ex cinereo albicant, forma in mucronatũ turbinẽ abut. Coni tam pertinaciter adhærent ramis, vt perpetuò nouelli cũ veteribus videantur: sed quũ folia exuit panduntur, & semẽ excidit. Rami graciles, ac flexiles, colore melino, odore iucundo. Coni vt cupressi pilule, sed paulò lãgiore, breui pediculo ramis annexi, sed è cõtrario positinã arborẽ versus iacẽt, squamis cõpacti, cõtinentesq; squamæ binos nucleos foliatos.

Cælum.

Plinius montes amare dixit. Vitruuius notam esse arborem municipibus, qui circa Padiripam, & maris Adriatici littora habitant. Dioscorides in Gallia Alpibus contermina gigni. Nos frigore oblectari scimus, & boreali cœlo, vbi maximè sæuit hyems. In Alpibus vidimus.

Materies.

Plinius. Amplissima arborum ad hoc æui existimatur Romæ visã, quam propter miraculũ Tiberius Cæsar in eodem ponte naumachiaro exposuerat, aduectam cum reliqua materie, durauit quæ ad Neronis principis amphitheatrum. Fuit autem trabs è larice longa pedes cxx, bipedali crassitudine æqualis. Quo intelligebatur vix credibilis reliqua altitudo fastigium ad cacumen æstimantibus. Fuit & memoria nostra in porticibus septorum à M. Agrippa relicta, æquẽ miraculi causa, quæ diribitorio superfuerat viginti pedibus breuior, sesquipedali crassitudine. Larix fœmina habet, quam Græci vocant ægida, mellei coloris. Inuenrum est pictorum tabellis immortale, nullisq; fiffile rimis hoc lignum. Proximum medullæ est, in abiete Græci leuson vocatiẽ. Inter omnes conuenit vtilissimè in Lunẽ coitu sterni, quem diem alii interlunium, alii silentis lunæ appellant. Sic certè Tiberius Cæsar concremato ponte naumachiaro, latices ad restituendam cædi ex Rheia præfiniuit. Materia rubet. Ponderus sustinere potest. etiam in transversum posita renititur, nec temerè rumpitur, priusquam carie, quàm viribus deficiat. In humore præcipua. Nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm lapis. Vitruuius ad hæc. Larix nõ solum ob succi vehementẽ amaritatem ab carie, aut tineæ non nocetur, sed etiã flammam ex igni non recipit, nec ipse potest per se ardere, nisi (vti saxum in fornace ad calcem coquendã) aliis lignis vratur, nec tamen tunc flammam recipit, nec carbonem remittit, sed longo spatio tardè comburitur, quod est minima ignis & aëris è principiis tempera-

tura.

tura. Humore
foraminum, qu
citò noceri. P
in nauibus, aut
modum sit inu
set circa Alpes,
castellum mun
munitione con
admoueri. Era
trabibus transu
dibus, & lapid
alia eos tela, p
pondus iacul
ad eam mun
Postquam fl
sublata effect
tem ea per se
Cæsar iussit ex
oppidani qu
laderentur, ru
sunt copiar, &
Sed ignari fan
quippe si ping
petentia non
vtuntur argen
las suffigas te
cendia retuli
Resina larici
Theophrast
lentore, nunc
quam vernac
quoris sumit

RELI
sunt,
& ex sylue
Græcis
men videtur
est. Latinis
quod frond

tura. Humore autem & terreno est materie spissè solidata, non habens spatia foraminum, qua possit ignis penetrare, reicitq; eius vim, nec patitur ab eo sibi citò noceri. Propter pondus ab aqua non substat, sed quum portatur, aut in nauibus, aut supra abiegnas rates collocatur. Ea autem materies, quemadmodum sit inuenta, est causa cognoscere. D. Cæsar quum exercitum habuisset circa Alpes, imperauissetque municipiis præstare commeatus, ibique esset castellum munitum, quod vocatur Larignum, tunc qui in eo fuerunt naturali munitione confisi noluerunt imperio parere. Itaque Imperator iussit copias ad moueri. Erat autem ante eius castelli portam turris ex hac materia alternis trabibus transuersis (vti pyra) inter se composita altè, vt posset de summo subdibus, & lapidibus accedentes repellere. Tunc verò quum animaduersum est, alia eos tela, præter fudes, non habere, neque posse longius à muro, propter pondus iaculari, imperatum est fasciculos ex virgis alligatos, & faces ardentes, ad eam munitionem accedentes mittere. Itaque celeriter milites cõgesserunt. Postquam flamma circa illam materiam virgas comprehendisset, ad cælum sublata effecit opinionem, vt videretur iam tota moles concidisse. Quum autem ea per se extincta esset, & requieta, turrisq; intacta apparuisset, admirans Cæsar iussit extra telorum missionem eos circumvallari. Itaque timore coacti oppidani quum se dedidissent, quæsitum vnde essent ea ligna, quæ ab igni non laderentur, tunc ei demonstrauerunt eas arbores, quarum in his locis maxime sunt copię, & ideo id castellum Larignum, item materies larigna est appellata. Sed ignari sanè est hominis putare resinofum lignum inustum flammis stare, quippe si pingui resina lapides perungantur, ardent. Continuaque videtur experientia non solum accolas his vti lignis in hypocaustis, sed eius carbonibus vtuntur argentarij, & ferrarij fabri. Palladius. Larix vtilissima, ex qua si tabulas suffigas tegulis in fronte, atq; extremitate tectorum, præsidium contra incendia retulisti: neq; enim flammam recipiunt, aut carbones creare possunt. Resina laricis sincerius olet, vt abietis, pini, & cupressi. ex Theodori versione Theophrastus. Plinius. Plusculum huic erumpit liquoris, melleo colore, atq; lentore, nunquam durefcntis. Succisa humor diu fluit. A Gallia subalpina, quam vernaculo nomine larica, hoc est larignum appellant incolæ, mellei liquoris similitudine, ex Dioscoride.

De terebintho. CAP. XV.

RELIQUVM videtur de resiniferis historiam tradere, quæ coniferae nomen sunt, & occurrunt omnium præstantissima resinâ fundenti terebinthus, & ex syluestribus arboribus. Palladius ex terebintho mel colligere apes dixit.

Græcis *τερεβινθος*, vel *περίεργος*, vt Democritus habet in Geponicis Græcis. Nomen videtur ex bacculis ciceri similibus desumpsisse, nam *πέλεκτος* Græcis cicer est. Latinis terebinthus. Itali *terebrinto*. Surrentini siliquam syluestre vocant,

quod frondes, & folia instar siliquæ proferat.

Genera.

Theophrasto mas sterilis, fœminę fœcundæ. Fœminarum alię fructum rubentem, magnitudine lentis edunt, qui concoqui non potest, alię viridem, pallidumve, demum rubentem, nouissimę cum vva maturefcentem, & nigrescentem, amplitudine fabæ, interim maiorem, & resinofum, surfurifumq; tactu. Est & altera Indica terebinthus, vel similis terebintho, cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia, fructus autem diuersus: nam & in Baetris terebinthum hanc esse, ferreq; nuces amygdalarū magnitudine, quoniam non magnas, sed visu similes, & suauitate amygdalis præstantiores, & ideo loci illius incolæ his potius vti. De his in nostro pomatio dicemus. Plinius ab eo. Ex his mascula, quæ est sine fructu. Fœminarū duo genera, alteri fructus ruber, lentis magnitudine, alteri pallidus. In Surrētino tractu plures sunt terebinthi species. Altera sterilis, altera vindemiis fructum ferens, & huius plures item species.

Descriptio.

Ex Theophrasto hæc habemus. Materies admodum lenta. Radicibus validis actisq; in profundum. fidelis ad vetustatem. Flos racemosus oliuæ modo, sed rubens. Folium numerosum ab eodē pediculo, figura lauræ, digesto in versus, vt sorbo, vnicū ad cacumen exit, & numerum parem conturbat: minus tamen angulata sunt, quàm sorbo, & similia per ambitū laurinis videntur, oleosaq; vt fructus. Ferr & nucamenta quædā caua ceu folliculos vlmis exemplo, in quibus animalia, quasi culices erumpūt, & resinofus lentor, qualis ē ligno, vnde fit resina. Fructus quandiu maturus nō est, in aqua ferē supernatat, niger subsidit. Perpetuo folio virescit. Vere cœpturo germinat. Messibus reddit semē. Viscus in ea nascitur. Dioscorides variis locis eā depingit. Terebinthus folia habet elaphobosci. Acinum sambuco similē, magnitudine rhois. Plinius ex Theophrasto. Fructus quum vere maturefcit, non grandior faba, odore iucundus, tactu resinofus circa Idā Troadis. Flos racemosus oliuæ modo, sed rubens, folia densa. Ferr & folliculos nutrientes quædam animalia, ceu culices; lentoremq; resinofum, qui ē cortice erumpunt. Vere cœpturo terebinthus germinat. Messibus reddit semen. Apud nos frondes erumpunt lentisci positu, colore, & odore, sed magnitudine satis maiore. Acinuli quàm lentisci maiores, coccinei, purpurantes, maturefcētes, veluti in cæruleum abeunt. Flore lentisci. Folliculi veluti cornua cartilaginei, vnde culices ex fuliginoso excremento euolant. Vultusculis infictis æstate in Tiburtinis collibus, vidimus resinam optimam resudare, quam lætabundi collegimus. Sed folium autumnō perdit, & nuda hyeme frigoribus exposita est, quod non paruum admirationem ingessit.

Celum.

Syluestris arbor, montes amat, ex Theophrasto. In Troade circa Idā, & Macedonia, brevis, & fruticosa contortaq;ue. Damasco Syriæ insignis, copiosa, decoro aspectu, vbi mons terebintho, nec alia sylua scatens. Plinius. Syria & terebinthum habet. Fruticosa circa Idam Troadis, sed in Macedonia brevis arbor hæc, atque fruticosa in Damasco Syriæ magna. Montes amat. Terebintho fertilis Arabia, authore Diodoro Siculo, & Oricos Epiri ciuitas, vt narrat Seruius.

Vnde Virgilius. *Oriciaterebintho lucet ebur.*

Dio-

Diophanes
cipit infirmitas
rili inferunt pro
gione. Sed opti

Dixit Theop
modum gignit
fura non annu
& caudice, & r
omnium est, f
Terebinthum
tulimus, ingen
bus profundit
efficitur, con
rebinthinam
ces ibi quide

UNIPER
Somnum
quæ sit e som
Scribit eni
bro quarto.

Hoc est. M
incorruptibi
bra, præferri
tes, vbi earu
Græcis ap
quod diuio
in bienniu
ginebra.

luniperu
quàm cedri
fructus bac
rans in ann
quam serius
aliū aliū s
& fructus al

Diophanes terebinthos suo hospitio cerasa non respuere dicit, ea enim recipit insitione. Tarentinus trunco pyros recipere dixit. Surrento fecundā sterili inferunt pro aucupiiis. Martio mense in trunco recipit aliquam eadem regione. Sed optimē etiam recipit pistacea, vt dicemus.

Dixit Theophrastus non nisi fructu, resina ve vtilem. Resina ei in lachrimę modum gignitur. Cādendam post germinationem affirmat, earumque cāsura non annua, sed post plus temporis fieri solet. Vulnerantq; vtraque parte, & caudice, & ramo, sed melior, copiosiorq; quę ex caudice defluit. Optimaq; omnium est, spissā nanq; & leuissima, & odore gratissima est, verū pauca.

10 Terebinthum etiam apud Syros picem largiri affirmant. Est enim mons, vt retulimus, ingens, terebinthis amplissimis totus repletus, ibique vrunt. Vulneribus profundis, vt etiam abies, & quę resinam, tedamq; ingerunt, fecundior efficitur, contra quā ceterę arbores. Plinius. Optimam, tenuissimamq; terebinthinam fundunt in Oriente. Sic & in Syria terebintho detrahunt cortices: ibi quidem & ē ramis, ac radicibus, quum resina damnetur ex his partibus.

De iunipero. CAP. XVI.

IUNIPERI tractationem aggrediemur. Eadem resinifera, & baccifera. Somnum afferre dicitur: ideo à Flacco lethęa dicitur propter obliuionem, quę fit ē somno, Argonauticon octauo.

20 Contraq; lethai quassare silentia rami.

Scribit enim Medeam draconem ad somnum incantantem Apollonius libro quarto.

Ἡ δ' ὅφιν ἀρκέσει νεὸν περικλὸν παλῶ
Βαπτίζ' ἐκ κικεύνοιο, ἀκέραια φάρμακ' αἰσθῆς.
Εἰσεκείλει κατ' ὀφθαλμῶν.

Hoc est. Medea iuniperi scisso ramo, serpentem portione Cycone tingens, incorruptibilia pharmaca cantibus inuocabat circa oculos. Iuniperi grauis umbra, præsertim cantantibus: vt Virgilius in Gallo testatur. Et Plinius. Serpentes, vbi earum squamę obtorpere, spinis iuniperi se scabunt.

30 Græcis ἀρκέσει, & ἀρκέσει dicitur. Latini iuniperum vocant, videturq; ita dici, quod iuniores, & nouellos fructus pariat. Sola enim ferē arborum sætus suos in biennium prorogat, qui nec maturefcit quidem nouo superueniente. Itali ginebro.

Iuniperum minoribus cedris Theophrastus assimilat, sed excelsior quidem, quam cedrus. Folium simplicius, ac mollius, materies spissior, cāsā putrescens; fructus baccarū myrti magnitudine, hilaris ac niger, acerbis, ingustabilis, durans in annū, prius non decidens, quā subnascatur alius. Germinat vere, quāquam serius fructificet. Plures fructus gestat, alium perfectū, alium imperfectū, alium subnascētē habet, vt aliis quoq; contingit: quoniā concoctio lenta, & fructus absolui difficile potest. Radices summa telluris cute dispersa hæret.

Auctu facilis, perpetua virens coma. Cortex spontè detrahatur: nam disrumpitur. In his enim natura ipsam rem, quæ commoda sit, videtur ostendere, quum corticem disgreget, & tanquam alienum reiiciat. Damnosum est omne alienum, sicut quod est aridum. Plinius. Spina pro folio est. Semen post Vergilias reddit. Non floret. Non amittit folia. Nos aliqua addemus. Iuniperi cortex membranaceus, qui sponte rumpatur: facies horrida. Martio germinare incipit quasi florum conceptum. Spina potius quàm folio, rosmarino simili, sed breviori, ceruleis baccis, vel rufescentibus nigris.

Genera.

Duo iuniperi genera cōstituit Theophrastus, vnum, quod florem edat, nec fructificet, alterum, quod protinus fructum, vt præcidua poma sic præmonstret, nec tamen floreat. Itaque penè fieri, vt sola hæc arbor fructum in biennium habeat. Dioscorides duorum generū dicit, nempe maius, & minus. Baccæ & iuglandem nucem, & Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ arcentides nuncupantur. Plinius iuniperos non florere dicit. Quidam eorum duo genera tradunt, alteram florere, nec ferre: quæ verò non floreat, ferre protinus baccis subnascentibus, quæ biennio hæreant. Sed id falsum, omnibus quæ his dura facies semper, sic & hominum multis fortuna sine flore est. Eius duo genera, altera maior, altera minor. Apud nos in proceram magnitudinem adolescunt, & aliæ humiliter fruticant. Genus est, cuius fructus cerâsi penè magnitudinem æquat.

Cælum.

In montium cacuminibus, & algentibus locis provenit: verum non in excelsum emicat, sicut circa Cyllene promontorium euenire tradit Theophrastus. Plinius. Vasta hæc in Hispania, maximæq; eius baccæ. Montes tamen amat. Sed calidis, & temperatis locis etiam libenter provenit. In insula Pontia, & in nostra Campania crebra.

Solum.

Qualicumque solo etiam natam vidimus. In arenoso soluto, facile sterili, in littoribus maris, non autem in vallibus, & aquosis.

Materies.

Materies fabricis conuenit, tam futuris sub dio, quàm terra obruendis, ex Theophrasto. Cariem vetustatemq; non sentire dixit Plinius. Et in Hispania Saguntia iunt templum Dianæ a Zacyntho aduectæ cum conditoribus, annis ducentis ante excidium Troiæ, vt author est Bochus, infraq; oppidum ipsum id haberi, cui pepercit religione inductus Annibal, iuniperi trabibus etiâ nunc durantibus. Medulla vbicunq; solidior, quàm cedrus. Varro robustum pedamentum, quod ridicas dicit, vitibus adhibendum ex iunipero dixit. Columella ab eo. Tertium etiam locum obtinet pedamentum teres: idque maxime probatur ex iunipero. Apud nos quia materia fulua, & odorata est, ex ea conficiuntur coclearia: si vestes reponantur in arcis ex iunipero factis odorem recipiunt, & à tineis vindicantur. Si iuniperino veru, carnes assentur infixæ, mirum in modum odor commendat eas.

Resina.

Humor in iunipero ad lachrimæ modum concrefcit, inquit Theophrastus. Fluit gummi ex iunipero ad nihil vtile, ait Plinius. Et alibi, Iunipero eadè virtus,

VI
tus, quæ cedri o-
retes dumigni
grassantia pelitis
iunipero gummi
ad illustrandas
perfricant, ne fi-

EST etiam l-
rum accusa-
niel: falso resti-
Græcè γυνή
tur, qui ad det-
Latini lentisc-
ritudinem de-
statu percipi-
Thuris ar-
lentiscino. Ca-

In-
Le-
Te-

A quo Plin-
tia, in qua Cic-
has habebit ne-
borum satu se-
florent, prim-
tio nouissima
primus fruct-
promittit. Si-
rum erroris d-
30 Stophane hab-
tiscum ter flo-
læ, aut bulbi-
thor. Nos au-
colore, & fi-
do nigrican-
Aprili men-
teretes, qui
Optima
Etruder-
40 dymus hui-
quos Ceph-

tus, quæ cedri oleo, quo peruncta materies, nec tineam, nec cariem sentit. Materies dum igni crematur, non iniucundum fumum spirat, odorisq; suauitate grassantia pestis contagia depellit. Eius resinam officinæ vernicem dicunt. Ex iunipero gummi, & oleo ex seminibus lini pressio fit vernix liquidus, cuius vsus ad illustrandas picturas. Gummi scriptoribus in vsu est multo. Eo tuso carthas perfricant, ne sint bibulæ.

Delentisco. CAP. XVII.

EST etiam lentiscus resinifera, bacciferaque. Arbor fuit, sub qua Iudæorum accusantium alter iuuenem Susannam adulterantem inuenisse Danieli falso testificatus est. Palladius ex lentisco apes mel conficere dixit.

Græcè *ῥῆγος* dicitur, quasi *ῥῆγος*, id est fissile, quod facile findatur, ut experimur, qui ad dentiscalpia, & ad dentiū nitillam alboremq; frequenter findunt. Latini lentiscū à Lenteo verbo, quasi lentus fio, propter eius virgultorū lentitudinem deducunt. Præterea lentorem quendam quilibet foliorum attritu percipit. Itali *lentisco*.

Thuris arborem Theophrastus lentisco similem prodidit, & fructu quoq; lentiscino. Cicero Aratum interpretatus, ter lentiscum florere prodidit.

Iam verò semper viridis, semperq; granata

Lentiscus, triplici solita grandescere foetu,

Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.

A quo Plinius. Est & alia manifestior ratio, mirabiliore natura providentia, in qua Ciceronis sententiam ipsius verbis subsignabimus. Ergo hæc aratio has habebit notas lentisci, primum fructum ostendentis, erit & tertia in bulborum satu scillæ, item in coronamentorum narcissi. Namque & hæc ter florent, primoque flore primam arationem ostendunt, medio secundam, tertio nouissimam. Didymus. Aiunt lentiscum ter fructum ferre, & si quidem primus fructus bonus fiat, primam seminationem probe fructum allaturam promittit. Similis significatio etiam aliorum existit. Sed causa tantorum virorum erroris dictio *ῥῆγος* fuit, quo nomine scilla dicta est ab antiquis, ut ex Aristophane habetur, deq; ea scriptum ab Arato, non de lentisco: non enim lentiscum ter florere, sed scillam ex Theophrasto habemus. Et genus vnum scillæ, aut bulbum eius omnem ab Hippocrate schœnum vocari. Galenus est author. Nos autem ita describimus. Lentiscus fruticat stolonibus, & caudice colore, & simili terebintho, sed botris ex fuluo purpurascens, maturescendo nigricantibus acinis. Flores similes racemosi, muscosi que, quos primo vere Aprilis mense promit. Vtriculi, folliculive oblongi nascuntur in ramis, incurui, teretes, quibus insunt culices.

Optimam lentisci resinam ex Chio insula Dioscorides provenire dixit.

Et rudetibus, & maritimis letius emicat, ut in conflagratis Vesuij saxis. Didymus humidis locis nasci scripsit. Plutarchus Charoneus in hortis Soclari, quos Cephisus amnis ambiebat, vidit.

- Satio.** Didymus à Calendis Ianuarij plantari dixit. Plinius. Quædam pœna emendantur, aut morsu excitantur, vt palma, & lentisci, falsis enim aquis aluntur.
- Insitio.** Plutarchus, vt diximus, se in hortis Socleri ex lentisco oleas pullulantes vidisse scripsit.
- Materies.** Dentiscalpia è virentibus furculis fiunt, quod vis eius dentibus cõferat, Dioscoride authore: emendatq; oris dolorem. Quod & Martialis annotauit.

Foditq; tonsis ora laxa lentiscis.

Hinc quibus dentiscalpium semper in ore est, prouerbium quadrat, *χενος οδοντος*, id est lentisci arbores, quod nimio studio corpus curent.

- Resina.** Consistit in lentisco lachrima, quam mastichen dicit Theophrastus. Lentiscus resinam gignit, quæ lentissima cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Optima in Chio, nire dulæ modo splendens, candore Tyrrenicæ ceræ similis. ex Dioscoride. Sed Galenus nigrâ ex Egypto prouenire dixit. Palladius oleû ex ea extrahere docet, vt docebimus in Oliueto.

De betula. CAP. XVIII.

PRIVS QVAM resiniferarum arborum tractationi finem imponamus, de betula subiungemus. Est autem resinifera, siue bituminosa, nostrisq; tractibus frequens.

- Nomen.** Theophrasto *σηυδα* est. Latinis betula, melius quàm betulla. Matthiolus betulam dici putat, quod bitumine scateat falso: nam betula à batuendo dicitur: batuere enim cedere est: sic batula, leui mutatione betula, quum olim ex ea fascium virgæ conficerentur. Pueris nota, & infesta. Apud nos vulgò dicta, *candolice*.

- Descriptio.** Folio caria est, ex Theophrasti descriptione, præterquâ quod paulo angustiori, cortice versicolore. Quid verò sit caria, ipse idem nono libro, decimo capite declarat. Thapsia, & caria, quam alij pyrum appellant. Sed Matthiolus capite De populo, quid sit caria ignorat. Addit Plinius. Betula arbor est Gallica, mirabili candore, atq; tenuitate, terribilis magistratuū virgis. Addimus nos. Trunco enodi est, & candidissimo. Folio pyri per ambitum serrato deciduo. Lulos fert, sicut corylus. Virgultorum eximia tenuitate.

- Celum.** Betula Theophrasti tempestate non nisi Pyrenicæ familiaris, Italia omni no ignota. Plinius Gallicam vocat, & frigidis gaudere dixit. Nobis in Surrentino tractu videre licuit, locis opacis & frigidis.

- Materies.** Materie læui, non nisi ad baculos utili, dixit Theophrastus. Plinius. Terribilis magistratuū virgis. Eadem circulis flexilis, item corbium sportulis. Leuissima: ideo scutis faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, clauditq; suum vulnus: & ob id contumacius transmittit ferrum. Ad cistas, quæq; flexili crate constant, habet candorem, vigoremq; & in sculpturis faciliat. Etiam ligaminibus apta. Nunc etiam vt olim Romanorum magistratuū fascibus minax, & hodie virgis pedagogorum sceptris pueros terret.

- Bitumen.** Bitumen ex ea Galli excoquunt. Nobis faces ad nocturna lumina parantur.

tur, quod bitumen quiddam

HACTEN ARBORES puberit coma. in suam sententiam apud eundem. aquifolium, quod

10 Nomen va sentem. Theophrasti, quædam verba. Theophrasti quam Itali olim enim

Theophrasti ambitu acul peruo viret, niter sinuato

20 flexibilibus, b cematin coa ticelæui, & h ueniat, na cto

Montes a montes ama

Apud no

Locis fri

fitum, frigi

Plinius d

30 cia arcer. Fl

factum in q

ipsum per

Catove &

turalia m

sæ carnes

pennis. C

microbe

fieri solet

tundunt,

40 ticum reli to, sicut lib

tur, quod bituminosa pinguedine redundat, tēdā modo conflagrat, & resinosum quiddam refudat.

De aquifolio. CAP. XIX.

HACTENVS de coniferis, resiniferisque: sequitur vt alias, & sylvestres arbores describamus cæduas. exordiumq; sumemus ab iis, quæ æterna pubent coma. Et primū de aquifolia. Macrobius infelices arbores vocat, & in suam sententiam adducit Veranium testem. Sic enim Tarquinius Priscus apud eundem, Quæ inferū deorum, auertentiumq; in tutela sunt, inter quas aquifolium, quod sterilis sit.

10 Nomen vagum est, & ad ilicis speciem, quam infra describemus, & ad præ-
sentem. Theophrasto *ἀγία* est. Falsū enim putauit Plinius esse Theophrasti
20 *ἀγία*, quum hæc sylvestris mespili species sit, vt suo loco dicemus. Plinij
verba. Theophrasto authore genus intelligi voluit cratagon, siue crategona,
quam Itali aquifolium vocant. Latinis aquifolium dicitur, quod aculeata sit.
Olim enim aquis pro acus dicebant. Nos *agrifoglio* vocamus.

Theophrastus perpetuo folio virere dixit. Plinius folio pungenti. Est enim
ambitu aculeatum. Vere cæpturo germinat. Nos autem ita describemus. Per-
petuo virescit, sed lætius hyeme. Spinis horrido folio in margine multilatero, le-
niter sinuato, lauri emulo, carnoso, & solido. Virgis viridi colore vestitis, lentis,
20 flexibilibus, baccis rubeis, rotundis, oxyacanthæ, rusci aut asparagi æmulis, ra-
cematim coaceruatis, nucleo intus simili, albo, crassōve, flore albo, odore, cor-
tice læui, & herbaceo, ad gluten aucupatorium apto, sed solo, quod ei nō con-
ueniat, nactō, infrugifera.

Montes amare, & in planis nasci recusare scribit Theophrastus. Plinius.
montes amat. In montibus perpetuo gelu obstitis nos nasci vidimus.

Apud nos mas, & femina est, quæ latiori folio prædita, & minus aculeato.

Locis frigidis acuminum genus non nascitur. Sed super hanc plantam in-
situm, frigidissimis locis perennat.

Plinius de aquifoliis hæc habet. Si quævis aquifolia in villa nata est, vene-
30 cia arceat. Flore eius aquam glaciari Pythagoras scribit. Item quæ iaculum ex ea
factum in quo quis animal missum, etiam si citra deciderit defectu mittentis,
ipsum per sese recubitu propius adlabi, tam præcipuam esse arbori naturam.
Catō vetes aquifolios fieri iubet. In laminas secatur, cuius operimento vesti-
tur alia materies. Nobis scopis nascitur, suspenditurq; circa funes, è quibus sal-
sæ carnes pendent. arceat enim mures suis aculeis. Fit ex ea viscus ligandis aniū
pennis. Corticem vere detrahunt, frondibusq; arborū inuoluentes, facto lu-
mi scrobe vliginosi locis maxime obruant, & ibi putrescere patiuntur, quod
fieri solet duodecim ferè diebus: tum marcidam eruant, & tantisper pila con-
tundunt, donec in viscum lentescat, demum in profluente, vt adhærentes cor-
ticum reliquiæ sordesq; fluitent, proluunt, & adiecto iuglandis olei momen-
to, fistilibus recondunt.

De alaterno. CAP. XX.

PV BESCIT & alaternus perpetua fronde, & è sylvestribus est, Theophrasti autoritate. Veranius inter infelices arbores, & nefastas alaternum connumerat.

Nomen.

A Theophrasto φιλύκη dicitur, à Dioscoride φιλυρέα. Latinis, vt Columella, & Plinio, alaternus. Neapolitanis *lanterno*.

Descriptio.

Hæc habet de sua philyra Theophrastus. E sylvestribus perpetuo viret. Ineunte vere germinat. Post Vergiliarum occasum fructificat. Obedientissima est, cadorq; ei celastri modo. Suus honos in alendo pecore: nam semper fronde abundat. In montibus nascitur, in planis nasci recusat. Columella de alaterno loquens ait: Caprinū pecus asperis locis, à sylvestribus optimè pascitur, arbutusculis, frutetisq; maximè gaudet, ea sunt arbutus, alaternus, cytisus agrestis, qui in altitudine non profiliunt. Plinius. Alaternus habet frondē inter ilicem & oliuam, infelix, damnataq; religione, quæ neq; feritur vnquā, neq; fructum fert. Nos autē alaternum nasci dicimus frutice potius quàm arbore, fronde perpetua, cuius honos est in alēdo pecore. Germinat ineunte vere, fructificatq; Vergiliarū occasu, bacculi rotunda, nigra, racematim coeunte, subdulci, qua turdi hyeme allekti retibus capiuntur. Etsi Plinius infrugiferā censeat. Celastri modo ei cador, etsi nobis celastus incognitus sit, Theophrasti tamē autoritate albus est, & alaterni lignum album est. Nascitur in asperis, & montibus, in planis nasci recusat. In montibus ciuitatis Equensis frequentissima, è mediis lapidibus surgens. Foliis est olea nigrioribus, & latioribus, Plinius dixit, inter ilicē & oliuā, quod in alaterno optimè videre est. E sua materie pilæ apud nos conficiuntur, quæ ligneo malleo in ludis longè traiciuntur, gravitate & firmitate insignes. Potest suspicari esse Dioscoridis philyram, nam quæ scribit omnia ferre è Theophrasto desumit: nam est ligustri magnitudine, foliis olea nigrioribus, fructu lentisci, subdulci, racematim coharēte: nascitur in asperis, & astringens est: nam stiptici est saporis.

De colytea. CAP. XXI.

COLYTEAM apponemus nobis frequentem, etsi Theophrastus raram inuentu dicit, & solum Idæ concessit: fronde enim perpetua est.

Nomen.

Græcis κολυτέα, Theodorus colyteam vertit.

Descriptio.

Colytea arbor circa Idam prouenit, alioquin rara inuētu, fruticosa, ramosa q;, & multis alis concava, folio vlmī, longiore, satis ad latifolia lauri folium accedente, sed ampliusculo, & rotundiore, supra viridi, infra cano, neruosoque, præterniuis netuulis, fibrisq; de medio callo in costarum speciem adductis, materie solida, cortice nō leui, sed quasi vitigine ovestitur. Radicibus per summa gracilibus, & solutis, ceterū fibratis, & mirum in modū flauis, sterilibus, & flore vidua, surculos tamē gemmasq; circa folia pingues, leues, cādidos, amēracea facie fundit: præcisa, vel ignibus adusta, ab imis rediuiua refurgit. Eadē est, quā Matthiolus pro Dioscoridis philyrea depinxit. notē à Theophrasto apposite ad amulim

amulim respō
surculi illi, qu
lentiscinos: e
rara, in syluis

FIt obuiat
nasci fingit
Ha
Ta

10 Et infern
Vnde Statius

Quod no
nius à taxo
tur. Vasa eti
est. Et Sexri
ea, cibū me

rem clausu
20 adferit, præ

notis floru
lationes eti
to de bello G
eius consili
se exanimat
denigrari,
mines ladi
nariis latife
dant suauic

30 Theoph
nius à Sexti

Theoph
Taxus pro
crebriorib
scitur, nig
vendente
rum scabr
ei graciles
quām faba
40 um, maxim

amiffum refpōdent, nec præcifiſius vnquam ab eo depic- tum eſt. Flore caret, ſed ſurculi illi, quos amentacea facie repræſentat Theophræſtus, fructus proferūt lentifcinos: & ſi Theophræſto in Ida ſterilis erat, apud nos latè ſæcunda; ſi ibi rara, in ſyluis noſtris frequentiffima montofiſ.

De Taxo. CAP. XXII.

FIT obuiam taxus, ſylueſtris, & perpetuæ frondis arbor. In inferni opacis naſci ſingunt Poëtæ. Seneca in Hercule furente.

Horrent opaca fronde nigrantis coma

Taxo imminente.

10 Et infernales futiæ ex hoc ligno faces gerere ſinguntur, authore Placido. Vnde Statius Thebaidos octauo.

Nec dum illum, aut trunca luſtrauerat obuia taxo

Eumenis.

Quod non aliam ob cauſam ita Poëtæ finxerunt, niſi quia latifera ſit. Plinius à taxo toxica appellata putat, quaſi toxica venena, quibus ſagittæ tinguntur. Vaſa etiam viatoria ex ea vinis in Gallia facta mortifera fuiſſe compertum eſt. Et Sextius dixit in Arcadia præſentis eſſe veneni, vt qui obdormiant ſub ea, cibumve capiant, moriātur. Repertumq; innoxium fieri, ſi in ipſam arborē clauus æreus adigatur. Quod Plutarchus in ſympoſiacis commentariis adſerit, præſertim id iis euenire, ſcilicet qui morentur ſub eius vmbra, quum nouis floribus turgens ſit: vniuerſo enim corpori frigiditatem facit, ſtrangulationes etiam, celeremq; mortem adfert. Cæſar commentariorum libro ſexto de bello Gallico, Catiuulcus omnibus precibus deſtutus Ambiorigē, qui eius conſilii author fuiſſet, taxo cuius magna in Gallia & Germania copia erat, ſe exanimauit. Dioſcorides ſcribit, auiculas, quæ in Italia taxi baccas deuorent, denigrari, & qui edant eas homines alui profluuiū corripi, & Narbonæ homines lædi, qui ſub ea cubent, & ſæpenumero necari. Theophræſtus veterinariis latifera, non item ruminantibus. Sunt ramen homines, qui baccas edant ſuaui cibo, & innocuas eſſe dicant.

30 Theophræſto μίμος, & μίμιος dicitur. Dioſcoridi σμίναξ, Paulo thynion. Plinius à Sextio milacem vocari dixit. Latinis taxus. Italis taſſo & naſſo.

Theophræſtus ſimplex genere eſſe dixit, Plinius maris & ſcæminę meminit. Taxus procera arbor, facillimēq; augeſcit, ſimilis abieti, ſed minus excelsa, aliſ crebrioribus, folio abietis, ſed pinguiori, mollioriq; ligno, quæ in Arcadia naſcitur, nigro, aut puniceo, quæ autē in Ida, ſtauo, & cedro ſimili, propter quod vendentes fraudantes, tanquam cedrum vendant. Cortex cedro perſimilis, tum ſcabritia, tum colore, quo detracto totum ſub eſſe cor cernitur. Radices ei graciles, per ſumma ceſpitum breues, rotundo fructu, & paulo ampliore, quàm faba, colore ruſſo, tactu molli. Folio æterno. Floret paulo ante ſolſtitium, maxime ſerotino germine, &, vt Archades volunt, omnibus ſerior, etſi

fructum nudum ferat. Hæc Theophrastus. Plinius ab eo. Similis abietis & piceæ, minus virens, gracilisq; & tristis, & dira, nullo succo. Ex omnibus sola baccifera, mas noxio fructu, latalis quippe baccis. Nicander, quia taxus similis abieti, *ἐλάτῃδα* vocat.

Galum.

In montibus nasci Theophrastus dixit. Circa Idam rara. In Macedonia, & Arcadia frequentior. Galenus eam probat, quæ in Oeta Æthiopiarum monte nascitur. Alii umbrosissimis locis provenire dicunt, ut nos sæpe vidimus. In Corsica plurima nascitur Diodoro auctore, ut ex illis mel collectum amarum sit. Virgilius.

Situa Cyrneas fugiant examina taxos.

Nam Corsica Græcè Cyar dicitur, unde Cynæus deducitur. Et alibi Virgilius.

Aquilonem & frigora taxi.

Materies.

Theophrastus, Materie soluta & tenera in operibus est, & præsertim in Arcadia. Ex ea conglutinamenta, siue subscudes scriniis, capsis, & subsellis parantur, atq; in totum similibus præstat. Apud nos ex ea arcus, & scorpiones parantur: ut antiquitus. Virgilius.

Ithyreos taxi torquentur in arcus.

Valet ad viperæ morsum. Claudius Cæsar, Tranquillo referente, vno edicto proposuit: nil æquè ad viperæ morsum facere, quàm taxi succum.

De buxo. CAP. XXIII.

ESYLVESTRIBVS etiam perpetuè viret buxus: myrti æmula ob frondium nitorem: è sylvis erepta in viridariis viret, parietum ambulachris plurimis formis conspicitur: nam topiario operi accommodatissima est, nec, ut myrtus, frigida hyeme aut gelu læditur. Cauebant antiqui ne buxum Veneri offerrent, ne palæstram veneream expiant. Buxentum in Italia oppidum à buxo dictum est, & à Græcis propriam significationem servat, nam illis *πύθος* vocatur.

Nomen.

Græcis *πύθος* dicitur, & quæ ex ea tabulæ ad scribendum fiebant, *πύθια* dictæ. unde & pyxides. Latinis buxus. Italis *bosso*.

Genera.

Plinius tria recenset genera, Gallicum, quod in metas emittitur, amplitudinemq; proceriorem. Oleastrum in omni usu damnatum, gravem præfert odorem. Tertium genus nostrate vocant, sylvestre, ut credo mitigatū satū, diffusius, & densitate parietum virens semper, ac tonsile.

Descriptio.

Theophrastus ita describit. Arbor proceritate non excellens, folio myrti, immortali virens coma. Paulò antesolstitium floret, germinæ omnium ferè ferotino, ferè fructificat, ut Arcades volunt, omnium tardissimè. Fructu omnibus animalibus inuiso. Auctu facillima. Plinius autem hoc modo. Buxus concavo folio. Plurima fert: nam & semen suum, & granum, quod carthægon vocant, & à Septentrione viscum, à Meridie hypæar. Interdum pariter res quaternas

quaternas habet
his & rigidis vi
tripodes corol
herbaceo.

Aquilonari
bus, & asperis
lis, & brevis, q
proceritate ca
buxum olens.

conatu recipit
feruidis proue
ro montibus
non spernent
In Olympo
milis natura
gilius.

Catullo b
ximus. Virgi

20

Id

Didym
Plinius

tio arboris, n
nisve colligat
fringerentur
experiment
positis in pl
plantatur, n
30 stolones em

emittant, &
eti aspero s
quoque pr

Materi
durissima
rimas enit
tura ei per
erodere va
ctatur: ea
40 ex ea sumpt
disfaciend

quaternas habet. Fructu omnibus animantibus inuiso. Addimus nos. Præden-
fis & rigidis virgultis, & ramis admodum foliosis, graueolentibus: Bacculae
tripodes coronula denticulata insigniuntur, myrto non absimiles. Flore
herbaceo.

Aquilonaribus regionibus vigere, & locis, scripsit Theophrastus, argenti-
bus, & asperis, ut in Cithara, ubi plurima. In Olympo Macedoniae graci-
lis, & brevis, qui etiam frigidus est. Maxima, pulcherrimaque crassamento, &
proceritate ceteris præstans in Cyrenea provenit, ideo meli in suaue est, &
buxum olens. In Media, & hortis Babylonis hospitari nequit, vix summo
conatu recipit: nam his & cultores hortorum vehementer laborant. Locis
feruidis provenire non posse nulli dubium est. Plinius Pyreneis, & Cytho-
ro montibus plurima, & Berecynthio tractu crassissima. In Corsica flore
non spernendo, quæ causa amaritudinis mellis. Nascitur in montibus.
In Olympo Macedoniae gracilior, sed brevis. Amat frigida, & aprica. Si-
milis naturæ Cythorus Paphlagoniæ regionis Asiæ mons est, de quo Vir-
gilius.

Et inuat undantem buxo spectare Cythorum.

Carullo buxifer. Berecynthius mons Phrygiæ buxo etiam abundat, ut di-
ximus. Virgilius *Æneidos* nono.

Buxusq; vocat Berecynthia Matris

Idea.

Didymus humidis locis etiam gaudere dixit.

Plinius eius docet sationem. Surculis etiam quibusnam sit articula-
tio arboris, non omittendum videtur. Nanque buxi tenuissimis quinis, se-
nisve colligatis depacti proveniunt. Quondam in observatione erat, ut de-
fringerentur ex imputata buxo, aliter vivere non crediti: detraxere hoc
experimenta. Didymus. Buxus plantatur auulsione, clavis, & ramis, de-
positis in plantario post Idus Novembris. Idem. A ramis, & taleis tantum
plantatur, nequaquam verò auulsione, propterea quod neque ex radicibus
stolones emittunt. Nos stolonibus plantamus, quum multos è caudicibus
emittant, & semine, & radicibus solis depositis: nam vivax est admodum,
et si aspero solo, & gracili gaudeat. In viri datis, ubi latissimum solum, optimè
quoque provenit.

Materies buxi, ut ex Theophrasto habetur, ex omni materie densissima,
durissimaque eademque gravissima. Simulachra ex eo sculpere quidam solent,
rimas enim non capit, & carnis æqualitate constare quodammodo viderur. Na-
tura ei perpetua, vermibus innoxia, quum eius materies amara, duraque sit, nec
erodere valeant: quia medullam parvam incertamque gerit, nec distincta spe-
ctatur: ea carere quidam putant, sed constat eam habere, argumento, quia
ex ea sumptuolarum valuarum cardines facere artifices solent, quos archite-
cti faciendos ex medulla præcipiant: quod item vel omnis medulla distrahi

possit, etiam durissimarum materierum, quas nonnulli corda appellant, argumento sanè accipi potest. Sunt qui non in medio, sed per totum lignum dispersam esse affirmant. Ad plaustrorum axes, & aratorum buras utilis. Quæ in Olympo, brevis, & frequentia nodorum incommoda. Ad malleos etiam, & terebellos valens. Ob suam spissitatem enodis habetur, aut paucissimis nodis. Plinius. Buxo materies honorata, raro crispanti, nec nisi radice; cætero lenis quies materiæ silentio quodam, & duritie, ac pallore commendabilis. In igne quoq; duricia, quæ ferro, nec flamma, nec carbone utili. Spississima ex omni materie, ideoq; & grauissima iudicatur buxus: gracilis natura, in aquis non fluitat: materie æternam putant. Tineam nasci prohibet buxus duritia sua. In laminas secatur, cuius operimento vestiatur alia materies. Terebris vaginas ex buxo faciunt. Nec adipem, nec carnem habet, nec medullam, minimumque etiam sanguinis. Facile corno conglutinetur. Arida omnia ligna facilius ferris cedunt, præter buxum, quæ pertinacius resistit, serrarumque dentes replet æqualitate inerti, qua de causa alterna inclinatione egerunt scobem. Sacrificæ Tuscorum tibiæ è buxo fiunt. Ennius buxum amaro corpore dicit.

Longeq; cupressi

Stant duris foliis, & amaro corpore buxum.

Turbo etiam puerilis fit è buxo. Persius satyra sexta.

Neu quis callidior buxum torquere flagello.

Præcipua pectinum dote commendatur. Martialis

Multifido buxus qua tibi dente datur.

Iuuenalis:

Sed caput intactum buxo.

Torno materies probatur, cui non omnis apta est, verum ea tantum, quæ prædura, atq; solida, & minime crispa, cuiusmodi buxi est, ut nulla alia torno utilior, præstantiorve. Virgilius

Aut torno rasile buxum.

Antiquitus veteres è buxo elementa formabant ad pueros literis imbuedos, & hæc tabula pyxion dicebatur. Herodoto deltion. Pictores etiam artes in buxo docebant. Liquidis medicamentis è buxo etiam pyxides fiunt, quod maximè Dioscorides probat. Quare quia frequentius ex ea materie fieri solitæ sunt, sic vocantur. Apud nos ex ea fiunt tibiæ multiforatiles, & pyxides, quibus nomen dedit. Commendantur tabellæ pictoriæ, cocleares, & scachi.

De Lauro. CAP. XXIII.

ET si Theophrastus laurum inter urbanas commemoret, & Plinius, quod umbra officio humanius viuat, nos inter sylvestres reponemus, quoniam eius fructus vescus non sit. Laurus triumphis propriè dicitur, vel gratissima dominibus, ianitrix Cæsarium, pontificumq; quæ sola & domos exornat, & ante limina excubat. Ipsa pacifera, ut quam prætendi etiam inter armatos hostes

quietis

quietis sit indicatur literis, & in gremio Iouis lit, idq; nos, quæ olea, sed quia ipsa affueris eo donatiam in argumentum ram tellurem in domos, fulminem ei habitum & purgatio, vnde oleam fas non aræve debeat detestationem rium principum metus. Hæc thoribus tractendit. Formæ ita, tanquam rem, se in suum rem edidit. Rem donauit, & vnde non incongruè dandi ab lapide vipote Sol, vnde guntur in futionem credicam. Colatur, neque 30 lauri folio a lauro infestis scipionem ruit. Obenibus maxbere dixeriderata, modius, dicatur. Lrapione le 40 ralle comfolia primo

quietis sit indicium. Romanis præcipuè lætitiæ, victoriarumq; nuncia addi-
 tur literis, & militum lanceis, pilisq; fascisque; imperatorum decorat. Ex his in
 gremio Iouis optimi maximi deponitur, quoties lætitiâ noua victoriâ attu-
 lit, idq; non, quia perpetuò viret, nec quia pacifera est, præferenda ei vtraque
 olea, sed quia spectatissima in monte Parnaso, ideoque etiam grata Apollini,
 affluetis eò dona mittere iam & Regibus Romanis, teste L. Bruto. Fortassis e-
 tiam in argumentum, quoniam ibi libertatem publicam is meruisset, laurife-
 ram tellurem illam osculatus ex respòso. Et quia manu satarum receprarumq;
 in domos, fulmine sola non icitur. Ob has causas equidem crediderim, hono-
 rem ei habitum in triumphis potius, quàm quia suffimentum sit cædis hostiũ,
 & purgatio, vt tradit Massurius. Adeoq; in profanis vsibus pollui laurum, &
 oleam fas non est, vt ne propiciandis quidem numinibus accèdi ex his altaria,
 aræve debeant. Laurus quidem manifesto abdicat ignes crepitu, & quadam
 detestatione, interaneorum etiam vitia, & neruorum ligno torquente. Tibe-
 rium principem tonante cœlo coronari ea solitum ferunt, contra fulminum
 metus. Hæc Plinius. Laurum comitatur hæc historia, à Graiis rei rusticæ au-
 thoribus tradita, quæ fabuloso verborum inuolucro non nihil etiam veri præ-
 tendit. Formosissimam Lanouï fluiui filiam Apollo deperibat, dans operam,
 vt ea, tanquam amasia potiretur, ab eo tamen capta, matrem precatur tellu-
 rem, se in suum reciperet gremium: subscribens votis tellus, confestim arbo-
 rem edidit. Re conspecta deterritus Apollo, arborem gentilis virginis nomine
 donauit, & vultu ramo sese coronauit, fuitq; diuinationis signum arbor. Idq;
 non incongruum, quippe puellam sapientiam appellent, facultasque oracula
 dandi ab sapientia profisciscitur, quòd plena sit ignis arbor, Apollo ignis ipse,
 vtpote Sol, vnde lemures & laruas odit, & si qua laurus astiterit, eminus abi-
 guntur in fugam fusi. Porro qui eam in vaticiniis cremant, prædictionis ra-
 tionem creduntur iniuisse. Apollinis simulachra lauro coronantur, ob rē me-
 dicam. Columba quoties ægrotare cœpit, lauri folio decerpto, sibi ipsa mede-
 tur, neque verò palumbes tantum, sed & graculæ, merulæque, & perdices
 lauri folio annum fastidium purgant. Coruus quoque occiso chamaeleonte,
 lauro infestum virus extinguit. Vnde apud Græcos frequēs adagium, laureum
 scipionem gestare, de his, qui in aliquas insidias lapsi, vitæ periculum euase-
 runt. Ob etiam vim igneâ Apollini dicarunt, & ob id, vt Eusebius ait, à dæmo-
 nibus maximè odio habetur. Quòd vsta sonet, quandam vim prædicendi ha-
 bere dixerunt. Empedocles qui animam igneam statuebat, lauri natura con-
 siderata, dicebat, si homini sit in arborem transmigrandum, in nullam com-
 modius, quàm in laurum subeundum. Est & alia ratio vt Apollini sacra arbor
 dicatur. Laurus capiti dormientium apposita vera videri somnia facit, vt in Se-
 rapione legimus. Id ipsum Antiphonem, Philocrum, & Artemonem asseue-
 rasse comperimus. Laurum tradunt secundam valetudinem adferre, proinde
 folia principibus à populo & caricæ die Ianuarii mensis donabantur, quippe

quum nec sacer morbus, nec malus genius negotium exhiberet, ubi laurus adfuisset. Quin & Esculapii caput laurea redimitum, non alia de causa dicunt, nisi quia ea arbor plurimorum sit remedium.

Veteres præterea laurum tutelæ faciarunt, quod in locis, ubicunq; vel sacra, vel affixa fuerit, incolumitatem præbeat, cuius rei non ignarus Ovidius:

Postibus augustis eadem fidissima custos,

Ante fores stabis, mediamq; tuere quercum.

Fuit & Romæ palatium, quod à lauri cognomento daphne fuit appellatum. Præterea Latinum commemorant Circæ filium, & locerum Æneæ, antequam illuc Æneæ aduentasset, arcem condidisse, inibiq; laurum inuenisse, (acropolim, id est, arcem nominant veteres, Regum tabernaculum, quod munitionis, securitatisq; gratia summis urbium cacuminibus sit extructum.) Laurentum Italiæ oppidum antè Lauinium & Lauinia dictum, auctore Seruio, sic dictum, quod quum Latinus Telegoni frater, & Circes filius, & Æneæ focer, post Lauinii fratris mortem, Lauinium amplificaret, in arce laurum reperit. Sic canente Virgilio.

Laurus erat tecti medio in penetralibus altis,

Sacra comam, multosq; metu seruata per annos:

Quam pater inuentam, primas cum conderet arces,

Ipse ferebatur Phœbo sacrasse Latinus,

Laurentisq; ab ea nomen posuisse colonis.

Erant Pythia certamina à Pythone serpente, quem Apollo interfecerat, dicta. Vnde Ovidius.

Nève operis famam posset delere vetustas,

Instituit sacros celebri certamine ludos,

Pythia perdomita serpentis nomine dictos.

Præmium Thessalonica laurus erat, ut Lucano placuit.

Vnde & Thessalia veniant ad Pythia laurus.

Pindarus & Callimachus, Græci Poëtæ, Ouidio longè antiquiores, Apollinem post deuictum draconem lauream induisse testantur: ratio quod Apollo Daphnem adamauit, quæ mutata in laurum fuit, ex Pausania in Phocensibus. Romæ ludi Apollinis fiebant, quos Romanus populus laureatus spectabat. Virgilius:

Phæbo sua semper apud me

Munera sunt lauri.

Ob hanc rem Eurotam fluuium, qui Spartam præterfluit, quod lauris ab utraque ripæ parte obsitus sit, Apollinis sacrum Poëtæ dixerunt. In Sileno.

Omnia que Phœbo quondam mediante beatus

Audiit Eurotas, insitq; ediscere lauros.

Parnassus mons, quod laurus in eo spectatissima proueniret, Apollini etiam sacer est. Lucanus.

Cardine

Templum,
lauri ramulis in
nis ratio hæc est
Alti quod ifulm
gationes idone
propter vim di
Ideo maxime il
ment. Rom
Cæsarem post
iusq; imagin
corona laur
caluus esset.
sent, ex laur

Scipionem
tera laurum t
20 quillam præte
apprehensam
suum reuolue
retum, ex quo
dem loco let
quæ in domo
intra vnum
spices futuro
postea comp
30 Adeo laurus
laureto Cæ
lii Cæsaris
cū lauro r
ex proxim
ronis ann
omnis ex
antiqua, &
quod con
cium hab
falces allig
40 lo in collo

VILLÆ LIBER SECVNDVS.

*Cardine Parnassus gemino petit æthera colle,
Mons Phœbo, Bromioq; sacer.*

Templum, quod primum Apollini erectum apud Delphos fuit, tantum è lauriramus in terram, in specus morem defixis, ex Pausania. Sed dedicationis ratio hæc est: Diodorus dicit, quòd ille primum hanc plantam inuenerit. Alii quòd fulmine non icipitur. Pharnurus, quòd facile incendatur, & ad purificationes idonea, ob id deo mundissimo & flagrantissimo dicatur. Lactantius propter vim diuina triplicem, præteritorum, præsentium, & futurorum. Ideo maximè illi Delphicam deuoueri, quòd hanc radices tres habere existiment. Romanorum principum corona è lauro fuit. Appianus inquit, lulium Cæsarem post ciuilia bella in urbem reuersum, multi ut Regem salutarunt, eiusq; imaginem lauro coronarunt. Scribit Dion post victorias obtinuisse, ut corona laurea ornari perpetuò sibi liceret, cuius rei causam afferebat, quòd caluus esset. A ludis & eorum victoriis, qui de hostibus victoriam adepti essent, ex lauro coronam cingebant. Ouidius.

*Tu ducibus latis cum læta triumphis
Vox canet.*

Scipionem de Carthaginensibus triumphantem altera manu sceptrum, altera laurum tenuisse scribunt Plutarchus, & Appianus. Suetonius refert aquilam præteruolantem gallinam albam, & lauri ramulum rostro ferentem apprehensam, in Liviæ gremium, post Augusti nuptias, quum Veientanum suum reuideret, dimisisse, quem quum pangi placuisset, postea ad natum laurum, ex quo deinde triumphaturi Cæsares, laureas decerperent, & alias eodem loco fererent. In aruspina laurus victoriam etiam præmonstrauit, ut ea, quæ in domo Alexandri Seueri iam infantuli nata iuxta persicum arborem, intra vnum annum persicum ipsam incremento mirabili superauit, unde aruspices futurum prædixere, ut puer is olim Persas euinceret: quod euentu est postea comprobatum, sub eo enim primum Persæ serui apud Romanos fuere. Adèd laurus triumphantium propria fuisse videbatur, ut obseruatum sit in laureto Cæsarem, sub cuiusq; obitu arborem ab ipso institutam elanguisse. Iulii Cæsaris eadem præmonstrauit, quum pridie Idus Martias aus regaliolus cū lauro ramulo Pompeianæ curiæ sese inferens, à varii generis volucris ex proximo nemore persequentibus ibidè discerpta est. Nouissimo verò Neronis anno, in quo Cæsarem progenies defecit, sylua illa Veientana radicitus omnis exaruit. Tali portento fuit Alexandro Seuero laurus alia ingens, & antiqua, quæ in palatio cuiusdam ciuitatis, à qua proficiscebatur ad bellum, quod contra Germanos parauerat, subito collapsa, mortis itidem eius indicium habuit. Contra non temere boni ominis laurus fuit, quæ circa Pompeii falces alligata fuit, quæ quū longo itinere exaruisset, in vico Galatiæ cū Lucullo in colloquium descendenti, reuirit, quod gloriâ rerū à Lucullo gestarū ad

Pompeium transcurram interpretatum est, & paulò post subsequutum. Fuit & laurea Poëtarum insigne, & hac ratione coronandos Poëtas antiquitas censuit, quòd hæc Apollini, qui Musis præficitur, sacra fuit. Hesiodus in sua Theogonia scribit, ad se iuxta Heliconem montem nouem Musas venisse, & ramum Heliconia laurus manducandum porrexisse, quem quum degustasset, repentè poëtica doctrina repletus sit. Est & lauro perennitas, & vita diuturnitas, quòd nil magis à Poëtis expetitur: aliorum enim scriptorum authoribus, non tam fama, quàm utilitas etiam quæsita: sola Poëtis gloria, & victuri nominis cupiditas insita est; ob id eleganter Ouidius, *Petit sacris nisi tantum fama Poëtis*. Diximus ex Hesiodo datum sibi laureum sceptrum à Musis, indicando laborem & scriptoris diligentiam: nam veluti sunt amara lauri folia, ita virtutis sudor amarus, & laboriosus. Frequens quoque fuit huius arboris vsus in deorum coronis, maiorque in sacrificiis, vt nulla communior, sanctiorque apud gentiles fuerit. Lauro, inquit Nicander, Thessalica Apollinis coma primum redimita. Æsculapium laurea corona vinciri solitum, scribit Plutarchus. In sacrificiis vsus fuit propter vim diuinandi, indicabatur enim euentus rei ratione crepitantis lauri: si enim abunde, & sonantius crepuisset, felix auspiciu aestimabatur: vt intellexit Tibullus illo versu,

Laurus ubi signa dedit, gaudent coloni:

E diuerso autem si tacita deflagrasset, inauspicatissimum rebatur, quod etiam 20 Propertius expressit.

Et tacet extincto laurus adacta foco.

Quamplurima sunt quoque authorum exempla, quæ omittimus. Pro sunt insuper non parum ad euitandam aeris contagionem, sylvarum vmbra & amenitates, potissimum verò fragrantium. Quum enim Romæ pestis sæuisset, Commodus Princeps Laurentum secessit, vt diximus, quòd hæc regio lauri crebris syluis opaca foret. Contra pestilentiam valet hæc arbor foribus affixa, authore Aristophane. Columella cubili gallinæ incubantis lauri ramulos subiicit, quòd credat aduersus tonitrua remedium fore. Quidam etiam doliis lauri folia imponunt, ne tonitrua peruertant. Idem refert rubiginem à fegetibus lauri folio abigi, transireque ex aruis in earum folia. 30

Nomen.
Genera.

Græcè *δαφν*, & *δαφν* dicitur, quasi duophne: frondes enim igni iniecta fragorem edunt salis strepitu. Latine laurus. Itali *lauro*, & *allor*. Quia urbana arbor est Theophrasto, ex ea multas differentias noscit, sensusque earum communior. In Heroo sinu laurus est, parte aquis extante lapidea, similis tamen virenti. Magnitudo frutici bipedalis. In mari quoque rubro viuere eam affirmant. Cato duas species commemorat, Cypriam, & Delphicam. Plinius tredecim genera recenset. Duo eius genera tradit Cato, Delphicam, & Cypriam, Pompeius Lenæus adiecit, quam mustaceam appellauit, quoniam mustaceis subiiceretur. Hanc esse folio maximo, 40

haccidoque; & albicante, Delphicam æquali colore, viridiorum, maximis baccis, atque

atque è viridi ru
ma. Cypriam
num in sequenti
amplissima & a
gant eandem e
que. Idem in a
carumque fert
triumphalem,
vt docebimus
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

atque è viridi rubentibus. Hac victores Delphis coronari, & triumphâtes Roma. Cypriam esse folio breui, nigro, & per margines imbricato, crispam. Tinum in sequenti dicemus. Accessit & regia, quæ cœpit & augusta appellari, amplissima & arbore, & folio, baccis gustatu quoque non asperis. Aliqui negant eandem esse, & suum genus regiam faciunt, longioribus foliis, latioribusque. Iidem in alio genere baccaliam appellant hanc, quæ vulgarissima est, baccarumque fertilissima. Sterilem verò earum (quod maxime miratur Plinius) triumphalem, eaque dicunt triumphantes uti, nisi id à Diuo Augusto cœperit, ut docebimus ex ea lauro, quæ ei missa è cœlo est, minima altitudine, folio crispato, ac breui, inuentu rara. Reliqua genera in sequenti dicemus. Aliam etiam Plinius laurum recenset. In tractu Ponti circa Heracleam portus est, Amycœ Bebycum rege interfecto clarus. Eius tumulus à supremo die lauro regitur, quam insanam vocant, quoniam si quid ex ea decerptum inferatur nauibus, iurgia fiant, donec abiiciatur.

Sed describamus laurum ex Theophrasto. Arbor læui, & tenui cortice vestitur. Caudice procero, nodis perquam paucis. Perpetuo virens folio. Succo scatens pingui. Radicibus non minoribus alni, obliquis, & inæqualibus, quæ sponte naturæ recto tramite non progrediantur. Germinat post Fauonium, carne in nucleo concepta. Fert vnam tam fecunda, quam sterilis, sed copiosius sterilis, quam marem aliqui vocant, quamquā non omnis, sed genus quoddam. Brevis est vitæ, quum materie soluta, proximaque putredini sit, infirmitateque facile perit, etsi non copiose fructificet. Sed & si citò perit, facile suo latere germinat. Etsi meatuum rectitudinem habeat, difficilis tamen est auditus, quod suæ siccitati, vel imbecillitati ascribendum est. Vitis eius odore læditur, quod ex germinatione liquet: quum enim germen propinquum lauro, retrorsum parte sua postrema flectitur, quasi odoris vehementia fugiens. Gelu non læditur, ut cætera, quamuis rara sit, quum resistat, perduretque sui caloris potentia. Plinius. Pingui succo scatet. Baccas fert. Non amittit folia. Primo Fauonio germinat. Floret post prunum vere. Suas vuas fert, maximeque sterilis, quæ non gignit aliud: ob id à quibusdam mas existimatur. Cortice tenui. Radices crassiores, & inæquales, recto meatu incedentes, superficie viuaciores. Senescit velociter, sed è radicibus repullulat. Addimus: flore flauescente, baccis maturis nigrescentibus.

Theophrastus. Latinus ager aquis totus abundat, & plana habent laurum: Calum. Circæum verò, quod vocant, excelsum quoddam promontorium tradunt frequentissimum arborum & lauro maiori ex parte scatens. In Propontide laurus in montibus, & multis locis habetur. Vmbra adamant quibus fructus siccissimi, nucleosi que sunt, quæque suapte natura soluta, sicca, & brevis stirpia sunt, ut laurus. Ex Plinio habetur lauro frigus inimicum. In Olympo copiosior nulla est. Circa Bosphorum Cimmericum in Penticapeo vrbe, omni modo laboravit Michridates Rex, & cæteri incolæ, sacrorum certè causa, laurum habere,

& non cōtigit, quum teporis arbores abundant ibi. Notatū antiquis nullū genus lauri in Corsica fuisse, quod nunc satū & ibi prouenit. Subit & in mōtosa.

Solum.
Satio.

Locis siccis & humidis prouenit, vt in agro Latino, dixerat Theophrastus. Seritur laurus semine ex Theophrasto, sed interdum præstat, interdum de-
generat magna ex parte, nec suum seruat colorem, adeo vt fructus è rubro ni-
ger eueniat, sicut in Antandro notatum est. Et hoc modo laurum ortā in pla-
rano dixit, quod tanquā ostentum interpretatur. Crebras deponere non plus
nouenis pedibus distantes præcipit; sic enim suam infirmitatem tuentur: nam
profectū desiderant, quo se à frigore æstive possint defendere. Nullus enim
radicum implexus, mutuus decursus, rixatūve improbus infestat, quum bre-
uiem agant radicem. Plinius. Lauri baccæ mense Ianuario Aquilonis afflatu sic-
cante leguntur, expandunturq; raræ, ne calefiant aceruo. Postea quidam simo
ad ferendum paratas, vrina madefaciunt. Alij in quallo pedibus in profluente
deculcāt, donec auferatur cutis, alioquin vlgo infestat, nec patitur nasci. In sul-
co repastinato palmi altitudine vicinæ ferè aceruatim ponuntur mense Mar-
tio. Hoc modo etiā seritur baccalis augusta & tinus. Natura & plantaria de-
monstrauit, multarū radicibus pullulāte sobole densa, & pariente matre, quas
enecet, eius quippe vmbra turba indigesta premitur, vt in lauris. Densiores feri
iusserunt, in pedibus tamē nouenis, & si vmbra enormis, magnaque. Palladius
Februario mense seminaria lauri facit, vel facta excolit. Didymus semine feri
laurū dixit. Diophanes baccas suadet legi circa Calendas Decembres, feri post
Idus Martias, viuiradices transferri mense Octobri, & deplantari. Boni genij
plantam laurum Romani vocant, & cōmodam ad vitiū sepes. Nasci & laurum
auulsiōne afflmat Theophrastus, si quis sublatiis surculis serat, sed quod auel-
litur, radicis, aut stipitis aliquid habeat oportet. Didymus auulsiōne quoque
plantari dixit. Virgilius etiam suadet, quod ab imis maxime plantigera sit.

Pullulat ab radice aliis densissima sylua

Vt cerasis, vlmisq; etiam Parnassia laurus.

Surculo autem feri posse Theophrastus inficiatur. Extrema verò eiusdem
sicca ex tenuitate, nec ad edurandum valida superextant, vnde pullulare ob
eandem causam nequeunt, præterquam si quid raro, contraque naturæ ritum
eueniat. Ob id auulsiōne non nisi difficile nascitur. Causa quoq; eius siccitas,
atq; raritas. Quod enim raro, laxoq; corpore cōstat, infirmius est, quàm vt hu-
morem, caloremve seruare diutius possit: (etsi contrā prius dixerat. Causa est
cōtrarietatis, quod in steril: Græciæ solo omnia diffillimè proueniebāt: apud
nos concipit, & pullulat.) Est quoq; historia Liuiæ Drusillæ, quæ postea Au-
gusta matrimonij nomen accepit: quum pacta esset illa Cæsari, gallinam con-
spiciui candoris sedenti aquila ex alto abiecit in gremium illa sum. Intrepideq;
miranti accessit miraculum, quoniam teneret rostro laureum ramū onustum
suis baccis. Conseruari alitem & sobolē iussere aruspices, ramumq; eum feri,
acrite custodiri. Quod factū est in villa Cæsarium, fluuio Tiberi impolita, iuxta
nonum

V
nonum lapide
nit. Ex ea trium
gessit, ac deinde
tenuerunt, sere
ratis triumphat
in Auertino voc
sum sagitte feri
Quintili in
inferitur ex Di
Pro ignariis
verò è lauro fa
ueris accipiū
ex eodē non
brū pertinac
nia valentib
sunt è quibus
perit, quonia
hedera præsta
cet Hesiodus

T
Columella
De

D
a cesser
nulli sui gene
baccalis & ti
viridaris fam
hyeme, quon
30 bacea, ex alba
cæruleum lu
Albosa est, n
ro, atq; ob
ctus eis ab
quæ in hac
Celastrus
ctus persic
diffimisq;
vostre plat
40 nobria fun
gæas, ligno

nonum lapidē Flaminia via, quæ ob id vocatur ad gallinas, mireq; sylua prouenit. Ex ea triumphans postea Cæsar, laurum in manu tenuit, coronamq; capite gessit, ac deinde Imperatores Cæsares cuncti. Traditusq; mos est ramos, quos tenuerunt, serendi: & durant syluæ nominibus suis discretæ, fortassis ideo mutatis triumphalibus. Durat & in vrbe nomen impositū loco, quādo Lauretum in Auētinovocatur, vbi sylua lauri fuit. Hæc Plinius. Ab occasu aquile ad occasum sagitte feri iubet. Eodē & propagine feruntur. Triumphalis talea tantum.

Quintilij in se ipsam inferi tradūt, & in forba, & in fraxinos. Laurus in malū inferitur ex Diophane. Recipiūt cerasa, & ingrata magnitudinis eas pducunt.

Pro ignariis ad ignem excitandum conceptraculum ex attragena. terebrum verò è lauro faciunt, non enim ex eodem quod agar, quodq; patiat, sed è diuersis accipiūt, & aliud efficiendi aliud patiendi vim obtinent. Ceterum vel ex eodē nonnunquā conficiunt, nec defunt, qui nil referre arbitrentur. Terebrū pertinacius esse debet, quæ de causa laureū faciunt, id enim pro sua acrimonia valentius resistit, & quia valida est. A Theophrasto hæc Plinius. Calida sunt è quibus ignaria faciunt, exploratum hoc vsus in castris pastorumque reperit, quoniam ad excutiendum ignem non semper lapidis occasio est. Sed nil hedera præstantius, quæ teratur lauro, laurumque terat. Aratri temonem docet Hesiodus ex lauro fieri debere.

Temonem ex vlmō viridi, seu confice lauro.

Columella pedamenta pro vineis ex lauro facit. Plinius vèstes laureos.

De aliis lauri speciebus, tino, lauro Alexandrina, & hippoglossa. CAP. XXV.

DIFFERENS Plinius de laurigenis, meminit tini, inquiens. Postea accessere generatim, hanc syluæ stem laurum aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem. Differt colore, est enim ei carulea bacca. Augusta, baccalis, & tinus simili modo ferūt. Planta hæc vulgò *tricino* dicitur, est enim viridatis familiaris. Pumila est planta, foliis inodora, admodum florida, etiam hyeme, quo tēpore maximè expetitur opere topiario. Flos in umbella corymbacea, ex albo purpureus, semine vt terebinthi, gigartis vuarum ex argento inceruleum luridis. Hyeme seminibus scater, quibus maximè vescuntur turdi. Alsiola est, multisq; locis hospitari nescia, nisi radices testa, lapide circumposito, atq; obruto muniuntur: & ita latè prouenit. Totus noster Surrentinus tractus eis abundat. Sunt qui Theophrasti putent, sed repugnant multa, quæ in hac absunt. Ego potius celastrum dicerem Theophrasti. Inquit enim. Celastrus è syluestribus perpetuo nitet virore. Omnium tardissimè suos fructus perficit, & quoq; ob hyemem fructum amittere proditur. Summis gelidissimiq; prouenit locis. Ligno candido. Vfus ad baculos. Quæ omnia huic nostræ plantæ congruunt. Viret perpetuò locis gelidissimis. Ex caudicibus manubria fiunt malleorum signorum ad trahendum per aëra lusorias pilas ligneas, ligno candido. Obri suos maturat fructus.

Taxa. Accedit in opere topiario taxa, excrefcente in medio folio paruulo, veluti
Hippoglossus. lacinia folij, ex Plinio. Dioscorides hanc vocat *ἰππόγλωσσον* (vel melius vt Gale-
 nus *ἰππόγλωσσον*) frutex folia habens rufci, tenui figura, & spinofam comam in
 summo, ceu linguas è folijs exeuntes habens, cuius coronā comis impositam,
 capitis dolorem imminuere dicunt. Hodie *Bislingua* dicitur, quod in eius fo-
 liis, veluti lingua promineat: ab aliis bonifacia, propter bonū, & multiplicem
Laurus Alexandrina. in medicina vsum. Hæc laurus Alexandrina est Theophrasti, quippe ita eam
 describit. Illa propria esse circa Idam fertur, laurus Alexandrina cognomi-
 nata, &c. Lauri proprietates, quod fructum super folia gignat, quemadmodum
 myrtus sylvestris, quippe fructum ambæ super dorsum folij gerunt. Et alibi. 10
 Laurus Alexandrina folium super folium gerit. Dioscorides, & Plinius hippo-
 glosson nominat. Alia est Dioscoridis, & Plinij Alexandrina laurus, & in Dio-
 scoridis errorem Plinius impegit, quippe Theophrastus solas ruscum, & Ale-
 xandrinam laurum fructus super folij dorsum ferre scripsit, quod etiam anim-
 aduertit doctissimus Fuchsius. Sed nimis ineptè a Matthiola carpitur, quum
 Fuchsius laurum Alexandrinam Theophrasti, non illam Dioscoridis scribat.
 Aliam lauri speciem, quam Dioscorides, & ab eo Plinius Alexandrinā vocant,
 ille sic describit. Laurus Alexandrina folio rufci maiore, molliore, candidio-
 reque, semine inter folia rubro, ciceris magnitudine, ramos spargit in terra
 dodrantes, interdum longiores, radice sylvestri simili, maiore, molliore, odo- 20
 rata, inuenitur in montosis. Plinius autem. Est & Alexandrina, quam alij hip-
 poglosson, alij Idæam, alij daphnitim, alij carpophyllon, alij hipelatem vocant:
 ramos spargit à radice dodrantes, topiarij accoronarij operis, folio acutiore,
 quàm myrti, molliore, ac candidiore, maiore semine inter folia rubro. Pluri-
 ma in Ida, & circa Heracleam Ponti, nec nisi in montosis.

De Sabina. CAP. XXVI.

SABINA etiam perpetua viret coma, ob id è sylvis in viridaria translata, &
 topiaria facta.

Nomen. Græcè *βαλάνος*, & *βάλανος*. Latine sabina, vel sauina. Plinius quia cupresso si-
 milis est, Creticam cupressum vocat. Itali *sabina*.

Genera. Altera sterilis, fructifera altera, quam bacciferam sabinam vocant.

Descriptio. Dioscorides. Prima cupressi folio similis, spinis horridior, grauiter olens,
 acris & feruens. Arbor coactæ breuitatis, quæ se magis in latitudinem fundit.
 Altera tamarici folio similis est. Plinius, Herba sabina duorum generum est,
 altera tamarici similis folio, altera cupresso. Apud nos crescit thamarisci folijs
 vulgò, sed rigidioribus & pungentioribus, terræ odorem halantibus, baccarum
 expertibus. In Surrentino tractu apricis, ventosis, petrosisque locis nascitur,
 baccifera, baccas fert oxicedri, quæ maturantes subpurpurascunt, resinosa o-
 dorataque. Planta, quàm superior minus foetet, folijs cupressi, minus aspera,
 pungentiorque. Frutex vtraque non herba, vt Plinius dicit.

Sabina

Sabina herba
 ce vini, aut è pan-

IN EST & MY-
 rice ramos te-
 riquissimam ver-
 ait. At Nicander
 ri scribit, quod a
 Scythæ ad sua va-
 aliis quoque gent-
 ramulis tamarici
 myrica coronā
 comprecatione
 in somnis Apo-
 ter infelices.

Græcis *μυρ-
 bryam sylvestri-
 bryam appella-
 falso textus bry-*

20 Dioscorides
 alterū in Agypto
 planè sterilem
 lignolum fructu-
 Myricem T-

deciduo. Dios-
 Egyptus Syri-
 parit galla pro-
 quum & infe-
 neg; feratur v-

30 semen quide-
 que. Flores t-
 semine deff-
 Hamus
 scripsit, Sy-
 re ait. Apu-

Tamarici
 becillum a-
 lem dicit. A-
 solū hoc val-

40 ne inueniri-

Sabina herba propagine feritur, & auulsione, quia semine caret. Tradunt fē- *Satia.*
 te vini, aut ē patietibus latere tuso, mirē ali. Ex Plinio.

De tamarice. CAP. XXVII.

IN EST & myricæ inter syluestres perpetuū folium. In Lesbo Apollo my-
 ricæ ramos tenet, vnde Myriceus cognominatus, vt Archeus meminit. An-
 tiquissimam verò plantam tamaricem, quæ & myrice dicitur, esse, Metrodorus
 ait. At Nicander tamaricem speciosum fructem; ideo *μαύμ*, id est vatem voca-
 ri scribit, quod ab eo vaticinia exquirantur. Quamobrem Magi apud Medos &
 Scythæ ad sua vaticinia tamaricis virgis utebantur, quod genus diuinationis ab
 aliis quoque gentibus obseruatum. Nam Herodotus sæpe in diuersis nationibus
 ramulis tamaricis vaticinia fieri testatur. Egyptij verò sacerdotes in Iouis pōpa
 myrica coronari, auctore Plinio. Cappadociæ Magi, quos Pyrethos vocant,
 comprecationes non sine myricæ virgis faciunt. Vilus enim in myricæ ramis
 in foenis Apollo decorus. Plinius inter steriles numerat: ob id Macrobius in-
 ter infelices.

Græcis *μυρίκην*, myricem & Italia, quam alij tamaricē vocant. Achaia autem *Nomen.*
 bryam syluestre, tamaricem vocat Lenæus. Corinthus, & quæ circa est regio,
 bryam appellat, vt ex Plinio habetur, quod *βρύων* id est muscosus sit flos: et si
 falso textus bryonā dicat. Palladi⁹ tamariscū vocat. Itali *tamarisco*, & *tamarigie*.

20 Dioscorides duo obseruauit genera, syluestre omnino sterile, fructiferum *Genera.*
 alterū in Ægypto. Plinius ab eo. Corinthus eius duo genera facit, syluestrem
 planē sterilem, alteram mitiorē, hæc in Ægypto Syriaq; etiā fert abundanter
 lignosum fructū, maiorem galla, asperū gustu, quo medici vtuntur vice gallæ.

Myricem Theophrastus inter syluestres frutices locat folio carnoſo, & in *Descriptio.*
 deciduo. Dioscorides fructum, quasi florem ferentem, compage muscosum.

Ægyptus Syriaq; alterum gignunt mitiorem syluestri, cetera similē. Fructum
 parit gallæ proximum. Eadem Plinius, vt diximus. Infeliciaq; eius ligna vocat,
 quum & infelicia sint Græciæ. Infelix existimata, damnataq; religione, quæ
 neq; seratur vnquam, neq; fructum ferat. Folio carnoſo. Fructum non fert, ne

30 semen quidem. Apud nos sub arboris magnitudine subsidet, ex li-
 que. Flores sunt tomentosos, pappososque, quasi sericeos floccos, qui vnā cum
 semine defluunt, ex albo puniceantes. Floret initio Maij, exili odore flore.

Hæmus tamarice scater, ex Theophrasto. Dioscorides nasci prope paludes *Cælum.*
 scripsit, Syria, & Ægypto. Idem ab eo Plinius. Apuleius humidis locis gaude-
 re ait. Apud nos riguis & marinis sponſe frutescit.

Tamaricis lignum Theophrastus in insula Tylo nasci, non, vt apud nos, im-
 becillum affirmat, sed validum, veluti ligneum. Plinius scilicet pis amerinis simi-
 lem dicit. Ad lienem præcipua est, adeoque mirabilem eius antipathiam contra
 solū hoc viscerum faciunt, vt affirmet, si ex ea alueis factis bibant fues, sine lie-

40 ne inueniri: & ideo homini quoque splenetico cibum, potumve dant in valis ex

ea factis. Grauis author in Medicina, virgam ex ea defractam, vt neq; ferrum; neq; terram attingeret, sedare ventris dolores asseuerauit impositam, ita vt tunica cinctuq; corpori apprimeretur. Columella autē. Dum suēs dulcedinem pabuli confectantur supra modum, & state splenis incremento laborant, cui succurritur, si fabricentur canales ex tamaricis trunco, repleanturq; aqua, & dein sicientibus admoueantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus intestinum tumorem compescit. Apud nos ex huius caudice ad splenem detornantur pocula, & doliola concinnantur.

De fraxino. CAP. XXVIII.

DIXIMVS de syluestribus æterna coma virētibz: nunc de iis, quibus comā decidit, & primum de fraxino. Finxit antiquitas hominū primum genus ē fraxino procreatū, quod Palefatus ad rem gestā reducens, Fraxinum hominē fuisse scribit, cuius liberi fraxini dicti sunt, & meliē fœmine à Melio viro. Eius folia iumentis mortifera, ceteris ruminantibus innocua Græci prodiderunt in Italia nec iumentis nocent. Sed hæc Plinius erranter fraxino tribuit, quæ Theophrastus de taxo prodiderat, vt diximus. Vocum affinitas *μελία*, & *μίλος* taxus, Plinio fraudi fuit, nō *μίλας*, vt Matthiolus dicit. Contra serpentes verò succo expresso ad potum, & imposita vlceribus opifera, ac nil æquē reperitur. Tanta vis est, vt ne matutinas quidē, occidentalēsve vmbas, quāuis sint longissimæ, serpens arboris eius attingat, ideo ipsam procul fugiunt. experti prodimus. Si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quā in fraxinum fugere serpentem. Mira naturæ benignitas, priusquā hæc prodeant, florere fraxinū, nec ante conditas folia dimittere. Hæc Plinius. Sed nunquam tam insigne mendacium dictū fuit, vt nunquam alibi libentius serpētes stabulētur, quam sub fraxinis, vt in nostris syluis sapissimē vidimus. Græci *μελίαν*, & *μυλέαν* vocant, & *τελοζον*, hoc est trinodē cognominant, quod ramos prægrādes, ordinatos, & numero pares habeat. Latini fraxinū vocant, quod in fragosis locis libenter nascatur. Cuius semē lingua auis dicitur, quod auīū linguas imitetur. Itali *frassino*. Duo fraxini genera docet Theophrastus, quorū alterū excelsum procerūque, ligno candido, crassiuenio, neruato, molliori, enodi, crispioriq; bubula dicta in Macedonia. Alterū humilius, minus auctile, scabrius, durius, flauius, fraxinū dictum. Sed Theophrasti *βουμελίαν*, Theodorus bubulā interpretatur. sed bumeliā dici puto grandē, quippe bu, intentionis nota est, quæ magnis rebus præponi solet, quasi magna fraxinus, vt Plutarchus in Sympliciæ docet, non bonem, sed magnitudinē intelligens. Rectius igitur Plinius. Græci duo eius genera fecere, longam, enodem, alteram breuem, duriorē, fuscioremq; laureis foliis. Bumeliā vocant in Macedonia, amplissimam, lentissimamque. Alij situ diuisere: campestem enim spissam, montanā crispam.

Descriptio. Sequitur Theophrastus. Folio laurilatifolia, acutiore, leniterq; per ambitū serrato, subsidenti, ramulū torum, seu folio singulari credas cōstare, quoniam ab pediculo vno folia simul iuncta cōponunt, & per ampla versus interualla,

tanquam

tanquam per gen
ternodia lator
gis angusta, col
ces crebra, sublin
dunt falso, eteni
lem amygdalæ. g
quædam adstrict
fructum emergu
sue inuolacra di
10 Aucto facilis. Se
nata & ipsa folio
Fraxinus laui
contra ceterarū
plana quoq; de
tur, plurima est
dixit. Descend
calidis nos vine
calculofo, sed pi
Fraxinos, qui
20 est ab Idibus Fel
matellure gaud
& auiū stoloni
quæ è mare auf
plantati debere
nus est, quæ ou
montolis, quib
uim instituere
rum. Igitur qu
pedum quoque
30 & fraxinum de
vixerit altera
Theophras
num. Macer
probanda. T
tinet fraxin
Plinius. Ma
ad plurima
lat, cortice a
taxo dixit, in
40 hacta nobilit
uor, torbo la

tanquam per genicula continentur, ordineq; pendunt, perinde vt in sorbo, inter nodia latiora, candida, coniugationesq; plures, & folia longiuscula, & magis angusta, coloris herbacei, cortex lauis, spissus, & tenuis, rubro colore, radices crebrae, sublimes, & crassae. Carere hanc fructu, & flore in Troadis Ida credunt falso, etenim fructum fert minusculum, in siliquis nucis modo qualem amygdalæ gustu subamarum. Fert & lauri modo fraxinus muscum, & alia quaedam adstrictiora gustu, circinataque, vt pilulæ platani. Hæc partim circa fructum emergunt, partim multo semota, & sic quæ plecta, siue plicamenta, siue inuolucra dicuntur. Radix numerosa, densa, alta. Perfectè parit, & excoquit.

0 Auctu facilis. Semē reddit æstate. Plinius ita vertit. Proceræ hæc & teres. Pennata & ipsa folio. Prima germinat, nouissima nudatur. Messibus reddit semen.

Fraxinus lauis, cauis, & madentibus gaudet. Scabra sitientibus & saxosis. contrà cæterarū arborum mos in planis, tum fructu, tum materie præstat. In plana quoq; descendit. In Nilo fraxinus, & quæ bumelia fraxinus cognominatur, plurima est. Hæc Theophrastus. Sed Plinius aquosis montibus gaudere dixit. Descendit in plana. Apuleius humidis locis gaudere dixit. In frigidis, & calidis nos viuere vidimus, sed optimè in temperatis, solo etiam gypsoso, & calculoso, sed pingui, & humido melius: in montibus planis, & conuallibus.

Fraxinos, quia festinantius germinant, disponi quoq; maturius cōuenit, hoc 30 est ab Idibus Februariis, plantis & ipsas nascētes. Alcius dimittatur, vt quæ summa tellure gaudeant. Hæc & similia quaternos pedes dimitti oportet. Possunt & aulsi stolones viuere, quo in genere cum perna sua euelluntur, partemq; aliquā de matre auferunt secum. Ex Plinio. Quintilij verò mense Martio fraxinum plantari debere dicunt. Columella de fraxino. Post vlmū, vel populum fraxinus est, quæ ouibus, & capris gratissima est, nec inutilis bubus: locis asperis & montosis, quibus minus lætatur vlmus, rectè feritur. itaque cui arbutum nouum instituere cordi erit, seminarium fraxinorum paretur ea ratione, vt vlmorum. Igitur qui arbutum cōstituere velit, ante annum scrobes faciat quatuor pedum quoquoersus, dein circa calendas Martias in eandem scrobē vlmum, 30 & fraxinum deponat, vt si vlmus defecerit, fraxinus locum obtineat, si vtraq; vixerit altera eximatur, & alio loco deponatur.

Theophrastus tradit fraxinum post vindemiam, & Arcturum cædi optimum. Materie humidissima, fabrisq; lectulorū utili. Malleis, & terebro nō improbanda. Tornatus ex ea nauibus rotundis: lentitiam enim firmitatemq; retinet fraxinus. Testudinē & auriculas ex eo fabricant, nam valida esse oportet. Plinius. Materie causa natura copiosissimā fraxinum genuit, quæ quidem est ad plurima utilis. Ea, quæ sit in Ida Troadis, tantum cedro similis, vt emēres fallat, cortice ablato (sed hæc ex Theophrasto excepit, quippe nō de fraxino, sed de taxo dixit, iterū nominis ambage falsus.) multū Homerij præconio, & Achillis 40 hasta nobilitata. obediētissimam opere, eadēq; hastis corylo melior, cornu lauior, sorbo lentior. Gallica verò etiā ad currus flexibilis: ad rotarū axes lentore

fraxinus utilis. Sic terebris vaginas ex fraxino utilissimas fieri proditum: ex eadem & malleos. Palladius, Fraxinus si siccetur rigescit, ante curuabilis: cathenis utilis habetur. Vitruuius. Fraxinus maximos habet humores, minimumq; aëris & ignis, terreni mistione temperata. Est in operibus lenta quum fabricatur, & sub pondere propter humoris abundantiam non habet rigorem, sed celeriter pandat, simul autem vetustate arida facta, aut in agro perfecta, qui inest ei liquor stanti, emoritur, fitque durior, & in commissuris, & in coagmentationibus ab lentitudine firmas recipit catenationes. Cato trapetum ex fraxinea materie facit. Apud nos fiunt circuli doliorum ingentes, & fiunt optimæ ridicæ pro vitibus sustinendis. Ad militaria instrumenta præcipua est: sui firmitate, & rectitudine maximè hastis accommodata. Poëtæ testantur.

Statius.

— en infandos belli potura cruores

Fraxinus.

Ovidius.

— & fraxinus utilis hastis.

Philostratus in Heroidibus Achilles hastam è fraxino fuisse autumat, scilicet longitudine, quæ nulli alij hasta: cuius lignum adeo rectum erat, adeoq; validum, ut minimè frangi posset. Fingunt Poëtæ Pelei, & Thetidis nuptias in Pelio monte Thessaliæ celebratas fuisse, ad quas dii deq; omnes inuiriti, singuli Peleo dona tulerunt, Chiron floridam fraxinum, in eo monte defectam, ex qua hasta fabricata est; hanc Minerua expoliuit, Vulcanus absoluit, Peleus primò portauit, post filius Achilles: acies ex adamante, quæ omnia penetraret. Fuit postea in Mineruæ templo suspensa: ut Pausanias in Laconicis refert.

De Orno. C A P. XXIX.

S V N T qui ornum & fraxinum idem putent, Alij verò diuersum genus, alij verò, ut Columella fraxinum urbanam, & ornum syluestrem putant.

Nomen. Latinis ornus dicitur, ut Virgilio, Columella, & Plinio, ceteris v. Itali orno.

Descriptio. Columella. Orni syluestres fraxini sunt, paulo latioribus tantum foliis, quàm cateræ fraxini. Arbor non tam procera, ut fraxinus, caudice tereti, lavi cortice, ramulis utrinque pinnatis, folio fraxini paulo profundioribus crenis per ambitum serrato, bacculis racematim coactis, ab adolescentia rubescens, secundum maturitatem expurpurea nigricantibus, sapore ex acido in amarum degenerante, mespilaceo quasi concretu, multo graciliore habitu, reliquo tota effigie fraxinum æmulante.

Culm. Plinius. Montes amant, descendunt etiam in plana orni. Columella. Si arbusta in asperis & siticulosis locis obserenda sunt, neque vlmus, neq; populus tam idonea sunt, quàm orni. Virgilius.

Nascuntur steriles saxosis montibus orni.

Iuuenalis:

Quam

Quantas iaculetur Monychus ornos.
 Recipit pyrum. Virgilius.

Ornusq; incanuit albo

Flore pyri.

Ad modum digitalis recipere vidimus pyrum, & malum.

Fiunt ex eis ridicæ ad vites: eis enim indissolubili cōubio copulatur, & arbustum suo fulcit adminiculo. Si pro hastis conficiendis seruatur, spissius plantentur. Rami ex inferiori parte frangantur, abradantur circumcirca, ne nodos efficiant, nam ibi rumpuntur.

De tilia. CAP. XXX.

SEQVITVR tilia, philyra Græcis dicta. Saturnum Philyram Oceani filiam adamasse Seruius scribit, quam nonnulli in florem commutatam aiunt, alii in arborem, cuius liber philyrinus vocetur, ex quo coronæ colligantur. Palladius apes ex sylvestri tilia mel colligere scripsit.

Hæc locis publicis plantatur, vbi rustici vicissim coeunt, vel ante sacras ædes, propter eius amplitudinem, foliorum laram umbram, iucundam opacitatem, & iucundam odoris florum gratiam. Ad chartarum & membranarum usum philyræ cortex, quæ tilia dicitur, vt plurimum selectus. Martianus Capella. Rarò verò libri philyræ cortice subnotari. Ephilyra fieri libros tenuissimos, atq; in vtramq; partem replicabiles, in Commodio Herodianus author est, & Vlpianus iureconsultus librorum appellatione contineri ait, siue in philyra, siue in tilea conscribantur, vt propterea philyræ vocatæ sint omnium arborum tuniculæ ad scribendum aptæ. Nomina coniuratorum in tabulis tiliaceis, eisdemq; duplicibus conscribi solita, Ioannes Xiphilinus author.

Græcis *φίλυρα*, siue *φίλυρα*, Latinis tilia. Italice *teglio*. Plinius vocum similitudine deceptus tribuit vires *τῆς φίλυρας*, Dioscoridis tileæ. Theodorus quoq; hallucinatur verrendo Theophrasto: nam tilia tribuit, quæ Theophrastus *φίλυρα*.

Duo habentur tilia genera à Theophrasto descripta, mas, & fœmina, quæ distant tum materie, tum totius corporis forma. Et ab eo Plinius. In tilia mas, & fœmina, differunt omni modo.

Mari materies senticosa, dura, nodosa, rufior, cortex crassior, ac detractus, statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Fœminæ materies candida, cortex candidior, flexibilior, ex quo cunæ fiunt, eo odoratior, florifera, fructiferaq; est. Flos calyculaceus, pediculo quisq; suo annexus, viridis quandiu calyculo includitur, dehiscens verò flauescit, floret pariter cum mitibus, & vrbaniis. Fructus oblongus, ad fœmæ magnitudinem, rotundus, similis acino hederæ: maiusculus, angulis quinis, ceu neruis quibusdam in acutum depressis extuberrat: partitionem hanc exiliior indigestam, & omnino confusio rem habet: maior si scabitur semina emittit pusilla, & pratenuia. Folium hederæ, nisi quod

in acutiorem angulum se rotundat; incurium, qua pediculo innectitur, & medio sui prodit in acutum, crispum per orbem, ac molliter serratum. Peculiare obrinet, foliis dulcibus, est ulentis pecori, sed fructu animalibus omnibus ingratibili. Paulò ante æquinoctium germinat. Perdifolia est, (etsi Theodorus in sua interpretatione, vocis ambiguitate deceptus perperam scripserit: æterna pubescere fronde) Amenifera est, æstiuo solstitio partes obuertit foliorum supernas, facileque in ea conspiciere est, quum ampliora, candidioraq; folia gerat; ergo, folia circumaguntur æstiuo solstitio, quum illo potissimum tempore folia decidant. Quum igitur foliorum agatur profluvium, aliquantisper affici necesse est, & quæ infirma, & quasi confecta sunt, exarscunt, ac decidunt, reliqua circumaguntur tantummodo. Omnibus id evenit, magis vel minus, conspectius in tilia & olea & ulmo est, quia summo coloris discrimine pars prona discrepat à supina. Cortice in orbem detracto tardius interit tilia, quippe ei detrahatur, ex quo funes, sed non vitalis, neq; princeps, sed summus, qui plerumq; subnascente alio decidit. A Theophrasto Plinius. Mari odorator cortex quàm fœminæ, ut Theophrastus tribuit. Inter corticē, & lignum tenues tunicae sunt multiplices membranae, quibus vincula tiliæ vocantur: tenuissima earum philyræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumq; honore. Proceritate perquam modica. Paulò ante æquinoctium germinat. Cortex tenuis, multiplex tunicis. Cortice in orbem detracto non offenditur tilia, alioquin corticem mittit, sed non vitalem, nec proximum corpori, verum eum, qui subnascente alio expellitur. Vertit tilia ad mille usus, petenda folia in ipsa die solstitii, & est confecti syderis signum. Plinius proceritatis modicæ dixit, quum arbor magna sit, quòd non nisi philyream putavit, & affinitas nominis erroris causa fuit.

Calum. Tiliam in locis feruidis provenire posse difficillimè putat Theophrastus. ratio ex calore petitur, quia ignis igni additur sine moderatione. Plinius montes & valles, & aquosos montes diligere dixit.

Inficis. Plinius omne pomorum adulterium gestire putat. Diversis modis vidit arborem insitam iuxta Tiburtes tiliam, omni genere pomorum onustam: alio ramo nucibus, alio baccis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis, malorumq; generibus, sed huic brevis vita fuit.

Materies. Tiliæ materies medullam exiguam continet, nec multo reliquo molliorem corpore. Ceditur autumnò. Ad navium longarum tabulata, ad arcas mensurarumq; structuram utilis est, habetq; corticem funibus percommodum. Est enim materies eius tota mollis, ut inter carnosas molliissima, calidissimaq; dicatur, quoniam aciem ferri maximè hebetat, tineturam eius vi sui caloris resoluens. Materies mollis, & omnium præcipuè. Terebrum etiam è tilia fieri solet. Obedientissima inter ceteras præcipuè est, & in totum præfacilis operibus præ sua mollietate. A Theophrasto Plinius. Eius materies leuissima, scutis faciendis aptissima, quorū plaga contrahit se protinus, clauditq; suū vulnus, &

ob

ob id contuma
besq; ac paten
prætexa rugu
& calidissima.
dus, Tilia in fo
Na

Cinesias Po
lebratissimi co
ille fuisse perh
fulciret. Quat
bulis fasciabat
incurvarerur
T

N Vnc
Operu

Græcis præ
vel aceris, ut
eius præstant

20 Aceris alii b
cōmuni gene
videlicet ut S

ris vocatur G
macul. rum d

nomen accep
tur. Græci si
montanū ver

pera. Tertiu
Hocaligenu

30 Theophr
tano in sin J
ta, mollis

missa, se
sua magni
tur, sublit

paucis, sub
volunt, in
gum, palin

40 le carpinu
rem corpor
materiem c

ob id contumacius transmittit ferrū. Cortex in magno vsu agrestiu, vasa, cor-
besq; ac patentiore quādam messibus conuehendis, vindemiisq; faciūt, atq;
prætexta tuguriorum. Teredinem non sentit. Mollissima tilia, eadem videtur
& calidissima. argumentum afferunt, quod citissimè ascias retundat. Palla-
dius. Tilia in sculpturis necessaria. Ouidius eius mollis materiæ meminit,

Nectilia molles.

Cinesias Poëta Græcus flagitiosissimus olim fuit, in quem Lisiæ oratoris ce-
lebratissimi conuiciorum & stomachi plena legitur oratio: tam enim gracilis
ille fuisse perhibetur, vt tiliaceis asseribus corpori circūdatis imbecillitatē suā
fulciret. Quare Aristophanes illum philyreum vocitabat. Tiliaceis etiam ta-
bulis fasciatur Antoninus Pius, authore Capitolino, quum longus esset, &
incuruaretur. Columella arculas tiliaceas laudauit. Virgilius læues dixit.

Nectilia læues, nec tornor asile buxum.

De Acere. CAP. XXXI.

NUNC de acere dicemus. Plinius. Acer eiusdem amplitudinis, ferè tiliæ,
operum elegantia & subtilitate cedro secunda.

Græcis præcipuè Theophrasto σπένδαμνος, aliud genus κληρόβορον. Latinis acer, *Nomen.*
vel aceris, vt Solinus, sic quibusdam dicta, quod acria artificū ingenia propter
eius præstantiam exerceat. Vel acer, ab acutie foliorum. Italis *acero.*

20 Aceris alii bina alii terna statuūt genera, inquit Theophrastus. Primū, quod *Genus.*
cōmuni generis nomine acer vocatur. Secundum carpinum, tertiū κληρόβορον,
videlicet vt Stagiritæ distinguere solent. Plinius ab eo, Album præcipui cado-
ris vocatur Gallicū in Traspadana Italia, trans alpes nascēs. Alterū genus crispum
macul. rum discursu, quæ quū excellentior fuit, à similitudine caudæ pauonū,
nomen accepit. In Istria, Rhætiaq; præcipuū. E viliori genere crassiueniū voca-
tur. Græci situ discernūt. Campestre γάεινον vocāt, candidum esse, nec crispum,
montanū verò crispus, duriusq; etiamnum è mascula crispus ad lautiora o-
pera. Tercium genus zygiam, rubentem, fissili ligno, cortice liuido, & scabro.
Hoc aliū genus propriè esse malunt, & Latine carpinum appellant.

30 Theophrastus ita describit. Materies ei candida, atque neruata, ampla pla-
tano in finiendo similis, venis longioribus fluctuans, sed gracilis, macilen-
ta, mollis. Omnia eius fissi in acutum compressa abscinduntur, nec ita se-
missi, sed summum potius præfissa, multineruia minus sunt, quàm pro
sua magnitudine esse debeant. Cortice paulò scabriori, quàm tilia vesti-
tur, subliuido, crasso, spissiorique picea, inflectique contumaci. Radicibus
paucis, sublimibus, crispisq; magna ex parte. Riguis potissimè nascitur, vt Idæi
volunt, inuentuque rara est. De flore nasci aiunt fructum, non valdè oblon-
gum, paliuro similem, verum oblongiorem assignant. At verò Olympi inco-
læ carpinum montanam esse volunt. Acerem in planis nasci, candidam, rari-
orem corpore, minus crispā, quam nonnulli Gallicā vo-
40 ar, non acerem, marisq; materiem crispiorē esse, atq; contortā, & in planis potius nasci, germinareq;

maturius. In monte nascentem flauam, gratè coloratam, crispam & solidam esse, qua ad opera lautiora vtuntur. Semen reddit æstate. Macedonia incolæ quidem nec illas florere arbitrantur. Facile capeffit incrementum. Summa solifacie gaudens. Ab eo Plinius. Germinat paulò ante æquinoctium. Mares prius florent. Flos coloris herbacei, messibus reddit semen.

Solum.

Riguis potissimum nasci tradidit Theophrastus. Plinius aquosis montibus gaudere dixit.

Materies.

Cæditur post vindemiam, & Arcturum. Spissa & crispamateries. Hæc pauca Theophrastus. Sed Plinius, Acer operum elegantia, & subtilitate cedro secunda. Pulcherrimum verò est bruscum, multoq; excellentius etiam mollescum, tuber vtrumq; arboris eius: sed bruscum intortius crispum, mollescum simplicius sparsum. & si magnitudinem mensarum caperet, haud dubiè præferretur cedro. Nunc intra pugillares, lectorumq; filicios, aut laminas raro vsu spectatur. Ebrusco fiunt & mensæ nigrescentes. Etiamnum in siccis natæ præferuntur aquaticis. In laminas secatur, quarum operimento vestiatur alia materies. Dat & suber sectile. Mediaq; pars arborum crispior, & quo propior radici, minoribus, magisq; flexilibus maculis. Hæc prima origo, luxurie arbore alia integri, & viliores ligno preciosiores cortice fieri, vt vna arbor sepius veniret. Excogitata sunt & ligni bractæ, nec satis. Sic lectis prætia quaruntur, sic acer decipit. Ex acere eximia mēsa fiūt, quæ ob id acernæ dictæ sunt. Horatius. 20

Hic ubi sublati puer aliè cinctus acernam

Gausape purpureo mensam perterfit.

Fiebat & olim ex acere sceptrum louis, vt testatur Laetius in Pythagoræ vita. Ouidius imparem coloribus vocat.

Acerq; coloribus impar.

De carpino. CAP. XXXII.

MONTANVM acerem Theophrastus carpinum esse inquit, ex aliorum traditione: campestem verò acerem Gallicam vocari, & esse alios, qui carpinum diuersum genus aceris dicant. Nos de eo separatim tractabimus. vel tertium aceris genus, vel carpini genus. Equidem admiramur horum doctorum tam crassam vel supinam distinctionem; nam ita carpinus ab acere distat, vt homo à leone, quum carpinus vltimum simulet, acer platanum.

Nomen.

Græcis *ζογία* est, quòd ex ea materie, vt Virruuius inquit, iuga in mentis comparentur, quæ apud eos *ζογία* dicuntur. Latini ex Columellæ, & Plinii auctoritate, carpinum dicunt. Itali *carpino*.

Descriptio.

Carpino, ex Theophrasti descriptione, materies flaua, crispâq; ampla, platanum in findendo similis, sed gracilior, & macilentior longior, atque mollior. Radices paucas sublimes, crispasve ferè magna ex parte habet. Auctus facillima. Ex Plinii verò, materie rubenti ligno, fidili, cortice liuido, & scabro. Apud nos vltimi effigie surgit, vt ei congener videatur, follicosa fobole teminis, simili

les

VI
les fauagines in
subalbicant, et
nem selediffu
dam pendet, in
rispecte circum
logitudine supe
tudine, in quib
Olympi mo
prius Theophr
Theophrasti
& crista, durifi
rant, quò facil
cis, iugisq; iu
ginus manu
& terreni mi
non est fragi
materiem ha

SVNT qui
Oppulo,
quod vocant
neq; idoneam
Oppulus à
Columella
dosam. Infra
mis brachiat
cematim dep
Semina vt al
Aspera, &
30 Qui arbu
scobes facti
in eadem
mus defec
xerit, alter
pedes disp
laborent.
ro retigeri
mabis, &
rum relinq
40 tabis hoc m

les fauagines in caudatis lupulorū floribus videre est. Caudice procero, cortice subalbicante, modice scabro. Ramos fundit copiosos, robustos, in latitudinem sese diffundentes, foliosos, vmbralesq;: ex iis per ætatem petioli quidam pendent, in quibus triquetra quædam folia subpallida & crassa, folliculari specie circumquaque racematim dependent, quorum medius apex cæteros longitudine superat, & inter hos pauca quædam capitula exeunt ciceris magnitudine, in quibus semen concluditur. Radicibus nititur firmis, crassisq;.

Olympi montis incolæ carpinum montanum potius esse volunt, dixitque Cælius. prius Theophrastus montes amare, & in plana descendere, ex Plinio.

10 Theophrastus post vindemiam, & Arcturum cadi dixit. Carpinus spissa, Materies. & crispa, durissimaq; est, hanc itaque prius quàm terebrum experiatur macerant, quò facilius mollescens perforari queat. Lectis, sumptuosioribus fabricis, iugisq; iumentorum apta. Plinius, Facibus nuptiarum familiarissima. Higinius manubria rusticis carpineæ optima dicit. Vitruuius. Est minima ignis, & terreni mistione, aëris autem & humoris summa continetur temperatura, non est fragilis, sed habet vtilissimam tractabilitatem. Palladius vtilissimam materiem habere dixit.

De Oppulo. CAP. XXXIII.

20 S V N T qui montanam oppulum Theophrasti acerem dicant. Dicemus de oppulo, quæ arbusto Gallico faciendo multum laudatur à Columella, quod vocant rumpotinum, quum maximè vitem alere videatur. At quia rarâ neq; idoneam frondem pecori præbet, à plerisq; repudiata est.

Oppulus à Varrone, & Columella dicitur. Ab Italis oppio.

Nomen.

Columella oppulum similem orno arborem dicit, humilem, & non frondosam. In fravlm proceritatem subsidet. Caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferè vitigineis, sed raris & angustioribus, baccis racematim dependentibus, prima pubertate viridibus, à maturitate puniceis. Semina vt alæ locustæ.

Descriptio.

Aspera, & sticulosa horret, ex Columella. Nos in frigidissimis vidimus.

Cælius.

30 Qui arbustum constituere velit, annum ante, quàm deponat arbores, scrobes faciat quatuor pedum quoquoersus. Dein circa Calendas Martias, in eandem scrobem, vlmum, & oppulum, vel fraxinum deponat, vt si vlmus defecerit, oppulus, vel fraxinus locum obtineant, si autem vtraque vixerit, altera eximatur, & alio loco deponatur. Arbustum inter quadragenos pedes disponas, vt & arbores & vites conualescant, & segetes vmbra minus laborent. Depositam arborem sæpius circumfodito, nec citra triennium ferro tetigeris. Completis sex & triginta mensibus, ad recipiendam vitem formabis, & superuacuos ramos amputabis, alterna brachia in modum scalarum relinquens, alternisq; annis. Sexto anno si iam firma videbitur, maritabis hoc modo. Ab ipso arboris crure pedale spatium intermittito, deinde

Satio.

fulcum in quatuor pedes longum, in tres altum, in dupondium & semissem latum, cum feceris, patiere minimè duobus mensibus eum tempestatibus verberari: tum demum circa Calend. Martias vitem de seminario, ne minorem quidem decem pedum sternito, & adminiculato, & reliqua, vt dicemus suo loco.

Materialis. Lignum album aceri simile. Fiunt ex ea patinæ incisoriarum menfarum, & olarum coclearia.

De Platano. CAP. XXXIIII.

AD aquaticas syluestres arbores descendemus. De platani præconio multa apud Plinium. Sed quis non miretur iure arborem umbræ gratia tantum ex alieno petitam orbe? Platanus hæc est, per mare Ionicum in Diomedis insulam eiusdem tumuli gratia primum inuecta, inde in Siciliam transgressa, atque inter primas donata Italiæ, & iam ad Morinos vsque peruecta, ad tributarium etiam pertinens solum, vt gentes vectigal & pro umbra pendant. Dionysius prior Siciliæ tyrannus Rhegium in urbem transtulit eas, domus suæ miraculum, vbi postea factum gymnasium: nec potuisse in amplitudinem adolescere, & alias fuisse in Italia, ac nominatim Hispania, apud authores inuenitur. Hoc actum circa captæ urbis ætatem, tantumque postea honoris increuit, vt mero infuso enutrentur. Comperit id maximè prodesse radicibus, docuimusque etiam arbores vina potare. Commendatio arboris eius non alia maior est, quam solem ætate arcere, hyeme admittere. Inde in Italiam quoque ac suburbana sua Claudio Principe Marcelli Eseruini libertus, sed qui se potentis causa Casaris libertis adoptasset, spado Thessalicus prædiues, vt meritò dici posset is quoque Dionysius, transtulit id genus. Durantque etiam in Italia portenta terrarum, præter illa scilicet, quæ ipsa excogitauit Italia. Sub eius umbra delectatum Xerxem Herodotus scribit diem integrum cum exercitu consumpsisse, atque vt capti amore solent, donasse muneribus, & quod ridiculo proximum est, tanquam pellici Melendonium quendam custodem reliquisse. Extat Themistoclis Athenarum Principis de platano præclara, quæ circumfertur sententia: nam postquam amplissimè patriam suam promeritus esset, quum sapius à ciuibus conuicio incessetur, dixisse, Quid negotium facestis iis, qui nobis fuere benefici? seque consimilem platano dicebat, ad quam decurrunt, quos imber insectatur, mox serenitate reddita, velletur ab eisdem. Alianus de animalium naturis scribit noctuas mira quadam & ingente solertia à ciconiis submoueri à nido longius, platani foliis ingestis, quorum contactu stuporem contrahunt noctuæ, ita vt oblacionis quidpiam inferre deinceps nequeant. Scribunt & hoc genus animalis à stabulis abigi, si in eis folia appendantur. Vespertilionis tactu ciconiarum oua sterilia redduntur, verum ad illatum maleficium hoc natura facere remedium: 40

edo.

redocnerunt: platur a torpore coquamis cralios. Ex Plinio. coronatur. Socper platanum iuentu, platanum Græcos volumprodiderunt, p

10 Græcis ma-
dam Platon di-
humeris præd-
lateq; patenti-
vius est Hom-
locus in subu-
præceps. Lat

Theophr-
tremulo, & d-
tur apud fone-

20 compressam
Radice prælo-
gari potest, m-
fuisse tradit-
tum progress-
tæ longitudo
ranum, & al-
nu dicant. D-
rum, lanug-
dunt, vsq; eo

30 tanus nouel-
Crete ad C-
Itemque in
E radice so-
in ambulat-
geli di font-
atque vni-
borum in-
magini fax-
miraculo,
40 dendum e-
comite, lar

redocuerunt: platanifolia suis in his ingerunt, ut aduolantes vespertilioes natura torpore comprehensa perniciem afferre nequeant. Iucunda eius umbra, quamuis crassa. Licet gramine credere non soli, haud alia latius operiente toros. Ex Plinio. Genialis dicta, utpote ad delicias nata. Vnde Genius eius foliis coronatur. Socrates non aliam ob causam à Milesiis reprehensus, quàm quòd per platanum iuraret, ex Maximo Tirio. Tradit Plinius Laodiceæ Xerxis aduentu, platanum in oleam mutatam, & eiusmodi ostentis Aristandri apud Græcos volumen scaterere. Peloponnesum platanifolii figura esse Geographi prodiderunt, propter eius recessus, & prominentias.

10 Græcis *πλατάνος*, & *πλατάνιστος* dicitur, à *πλάτος*, quod latum est. Vnde qui- *Nomen.* dam Platoni diuino Philosopho nomen inditum fuisse scribunt, quòd is latis humeris præditus esset. Platanistos etiam Græcis spatiosa loca vocant, longè lateq; patentia, à platani foliorum amplitudine. Hac tamen voce pro platano vsus est Homerus. Hippocrates saxum mari extans platamonem vocat. Vnde locus in suburbio Neapolitano vulgò platamone vocatur. Ingens saxum mari præceps. Latini platanus. Itali *piatano*.

Theophrastus ita describit. Folio amplo, pediculo longo, propendenti, *Descriptio.* tremulo, & deciduo. Sed in Creta insula ad Cortyniam platanum fuisse fertur apud fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua à Ioue compressam Europam indigenæ fabulantur. Semen manifestum pro lucit. 20 Radice prælonga, & si sedem nacta sit expeditam, subire quantumuis, & euegari potest, modò ne aliquid obster, & aquæ suppetant, qualis in Lycia Athenæ fuisse traditur, quæ iuxta aqueductû nouella adhuc in dodrantes ferè centum progressa est. Auctu facilis, ut aquaticæ omnes. Cortex dissumpitur. Vitæ longitudo à fabularum authoribus tradita patet. Sunt qui Delphicam platanum, & alteram in Caphyis Arcadiæ stantem, satas Agamemnonis manu dicant. Dioscorides, & Nicander meminere pilularum platani scabrarum, lanuginosarumque. Varro à Theophrasto, Plataniradices latius fundunt, usq; eò ut Theophrastus scribat Athenis in Lyceo, quum etiamnum pla- 30 tanus nouella esset, radices trium, & triginta cubitorum egisse. Itemque Cretæ ad Cortyniam dicitur platanus esse, quæ folia hyeme non amittat. Itemque in Cipro, ut Theophrastus ait, vna. Plinius. Cortice rimoso. E radice sobolescit. Est amplitudo, & magnitudo ingens. Memoratur quæ in ambulatione Academia Athenis fuerat cubitorum xxxvii: & quæ in Lycia gelidi fontis socia amœnitate, itineri apposita, domicilii modo caua, lxxx atque vnus pedum specu, numeroso vertice, & se vastis protegens ramis arborum instar, agros longis obtinens umbris, ac ne quid desit speluncæ im- 40 magini faxea intus crepidinis corona muscosos complexa pumices, tam digna miraculo, ut Licinius Mutianus ter col. & nuper prouinciæ eius legatus prodendum etiâ posteris putari, epularum intra eam se cum duodenicesimo comite, largè ipsa toros præbente fronde, ab omni afflatu securû, oprantè im-

brium per folia crepitus, latiore, quàm marmorum nitore, picturæ varietate, laquearium auro, cubuisse in eadem. Aliud exemplum Caii Principis, in Veliterno rure mirati vnus tabulata, laxisque ramorum trabibus scamna patula, & in ea epulati, quum ipse pars esset vmbrae xv conuiuarum, ac ministerii capace triclinio, quam cœnam appellauit ille nidum. Vinax admodum est. longitudo vitæ fama à fabularum authoribus tradita testimonio patet. Delphicam platanum, & alteram in Caphis Arcadiæ stantem Theophrasti adhuc ætate satas Agamemnonis manu prædicant. Cito germinat. Maxima ei radix à cedro est. Hæc Plinius. Iuxta Amymonæ fontem, & prope Lernam paludem, alia enata, Græcorum fabulis etiam memorabilis, quòd sub ea hydram serpentem educatam ferant, authore Pausania. Sed verè cortice crasso est platanus, & subalbicante, folio amplissimo, ticini modo diuiso, rubro pediculo, pilulis scabris, lanuginosisque, flosculo pallido, minuto. Fructus Dioscoridi σπυγελον, Plinio pilula dicitur. De arboris altitudine Horatius in odis:

Cur non sub alta vel platano?

Et Ouidius:

Nobilior pomis, platano conspectior alta.

Genera.

Plinius dum platani meminit, ait: Sunt & chamæplatani coactæ breuitatis, quoniam etiam arborum abortus inuenimus. Hoc quoque ergo in genere pumilionum infelicitas dicta erit. Fit autem, & serendigenere, & recidendi. Primus Cn. Matius ex equestri ordine, Diui Augusti amicus, inuenit nemora consilia intra hos lxxx annos. Platanus nullo sexu distinguitur, sed quasi vidua degens, vt omnis vel mas, vel femina dici possit: nil enim de earum sexu constat. Vnde ab authoribus vidua vocatur. Martialis,

Viduaq, platano.

Locus.

Platanum Theophrastus palustrem, & aquarum præuidam dicit. In Nilo prouenire, at in Adria negant, præterquã circa Diomedis delubrum, inq; vniuersa Italia esse raram affirmant, quamquam multi, magnique flumini utrobique diluunt, sed locus sanè recusare videtur. Dionysius tyrannus maior ambitiosus contendens in Rhegio conseuit in hortis eas, quæ nunc in gymnasio stant, nec vllam magnitudinem capere possunt. Contrà alia loca platanum habent plurimam. Aquas amare Ouidius ostendit.

*Quàm platanus riuo gaudet, quàm populus vnda,
Et quàm limosa canna palustris humo.*

In sacris literis, Quasi platanus exaltata sum iuxta aquas.

Nobis in Sarni fluuio videre contigit, & Romæ locis aquosis.

Satio.

Platanum seri semine demonstrat Theophrastus: nam & manifestum producit, eoq; gignitur, quod tum aliis, tum illo præcipuè indicio constat, etenim in tripode aneo platanus aliquando prouenisse narratur. Quod ex aliquo

aliquo latitante
tione facta, si se
dine aliqua sub
platano laurus
enim in partem
pullulat, viuitq;
etiam auulsi
quantem tran
ne nasci tradi
nouitatis auida
prehendit, & in
fuso maxime a
arbores vna p

Capacissim
corrumpit. V

Et

Palladius d

V

Diophanes
canus rhodac

Platani ma
postea suram
rotundis enat
deterrimus, c
mida. Vna ha
uitque, quod
putatis, trun
& cortex ite

ne decem cu
tur. Caulam
terra euulse
ramisq; occ
iam lignis d
mida sit, qu
Plinius qu
dolatis late
bitorum, c
alno. Inopi
40 & sale mac

aliquo latitante primordio exoriri putandum est, putredine, vel aliqua mutatione facta, si semen delapsum excipiat in arbore, comprehendaturq; putredine aliqua subiacente tenera. Si aliud in alio nasci, & adolescere potest. In platano laurus aliquando orta, quod tanquā ostensū interpretantur. Quum enim in partem arboris conuersam penē in terram putredine semē deciderit, pullulat, viuitq;e, subinde alimentum ex subiecta capiens arbore. Nascitur etiam auulsione, quam etiam si quis prae grandem, eamq;e cum arbore se exquantem transtulit, perdurare optimē potest. Didymus semine, & auulsione nasci tradidit. Plinius, Ex ea primum sata in Creta (vt est natura hominum nouitatis auida) regenerauere vitium. Apud nos taleis seritur, & optimē comprehendit, & in amplam magnitudinem auctam vidimus. Mero radicibus affuso maximē ali tradidit Plinius, compertumq;e prodesse, docuimusq;e etiam arbores vina potare.

Capacissima omnium insitione platanus, auctore Plinio, verū saporem *Insitio.* corrumpit. Virgilius malos recipere dixit.

Et steriles platani malos gessere valentes.

Palladius cerasos recipere.

Umbrantes platanos, & iniquam robore prunum

Compellit gemmis pingere membra suis.

20 Diophanes recipere ficum & malum, à qua rubicunda eueniunt mala. Africanus rhodacenum recipere, à qua etiam rubicunda rhodacena fieri.

Platani materies lentore non caret, sed maximē humida est. Indicium, quod Materies post æsuram, erecta materies multum humoris emittit. Tornatus nauibus rotundis etiam ex platano, lentitiam enim firmitatemq;e adesse oportet; sed deterrimus, celeriter enim putrescit. Dum comburitur fumosa est, quia humida. Vna hæc securim tolerat, & subuersa flatur ab radicibus reponi solet, viuitq;e, quod in Antandro euenit. Quū enim platanus procidisset, ramis amputatis, truncoq;e securi luxato, surrexit noctu, leuata onere, atque reuixit, & cortex iterum circumtexit: erat duobus lateribus circumdolata, longitudi-

30 ne decem cubitis maiori, crassitudine, vt quatuor viri non facile amplecterentur. Causam hanc esse putarunt, quod arbos prostrata parte altera, plurimum terræ euulserit, mox flatus noctu ingens aduersusq;e secutus, eam promouerit, ramisq;e occurrens, seque insinuans, erexerit. Non solum plagā tolerat, sed etiam lignis detractis caudici indomita manet, probeq;e germinat, quum humida sit, quod & facit pars magna earum arborum, quæ iuxta aquas assurgunt. Plinius quæ à Theophrasto accepit habet. Antandro etiam platanus circumdolatis lateribus, restibilis sponte, tacta, vitæq;e reddita, longitudine xv cubitorum, crassitudine quatuor vlnarum. Est lentitia platano, sed madida, sicut alno. Inopia cogit aliquando luminum causa oleum fieri è platani baccis, aqua

40 & sale maceratis.

De populo. CAP. XXXV.

POPVLVS arbutis notissima, necessariaque. Inter infelices, damnatasque religione recensetur à Plinio, quod neque seratur vnquam, neque fructum ferat. Apud aliquos feralis habit; nam Rhodij ludos funebres in honorem Tlepolemi à pueris impuberibus populo coronatis celebrari faciunt. Per eam quoque antiquitus tempus indicabatur, tum quod bicoloribus foliis prædita sit, præsertim alba, nam ex vna parte niuei, vel cerussati est, ex altera, porracei viridissimi coloris, ex quibus præcipuas temporis partes, quippe diem, ac noctem referre videtur, tum quod hoc quoque habet commune cum tempore, quod eius folia post solstitium circumaguntur, nec alio argumento certius intelligitur sydus confectum. Ideoque Probus Herculi dicatam dicit, quod Phyci tempus per Herculem interpretantur. Virgilius. *Populus Alcide gratissima.*

Idem in iuuentute fronde populnea velatam dicit *ἥβην*, id est Heben Herculis uxorem, siue iuuentutem. Salij ad Herculis aram sacra facientes populnea fronde coronabantur.

— *Herculea bicolor quum populus umbra*

Velauitq; comas, foliisq; innexa pependit.

Tum Salij ad cantus incensa altaria circum

Populeis adsunt enincti tempora ramis.

Alij ad fabulas referunt. Pausanias albam populum acheroidem vocat, (contra Aristoteles nigram) quod is nempe Hercules primum Acheronte Theoprotidos amne genitam ad Græcos transtulerit: Homerus verò acheroidam appellauit, propter Acherontem inferorum fluuium. Quum enim apud inferos Hercules descenderet, & labore defatigaretur, corona ex hac arbore contexta caput propter sudorem velasse dicitur. Vnde foliorum pars altera, quæ temporibus adhebat, sudore abluta exalbuit, pars verò exterior, propter fuliginem tetri fumi obscura facta est, qui colores in ea permanserint, ut bicolor postea fuerit. Alij volunt eum ab inferis redeuntem primum arborem istam contemplatum, atque se inde coronasse, conueniente plantæ colore albo huic euentui, quum è tenebris in lucem commearet. Inde quum ex inferis euassisset, & eos surculos in Acherontis ripam seuisset, seminum id latè propagatum.

Nomen.

Alba populus Græcis *λευκή* dicitur, nigra Homero *αἰχμηρός*, & *αἰχμηρίς*, sic enim Aristoteli dicta, ob dictam causam. Libyca Theophrasto, & *κερκίς*. Latinis populus. Neapolitani albam *allano* vocant iuxta Capuam, nigram verò *pioppo*.

Descriptio.

Theophrastus ita depingit. Arbor altissima, ingentiq; magnitudine exurgit, Candice procero, erectoq;. Cortex constat carne, & neruo. Foliorum figura mutatur, nam in iuuenta sunt circinata rotunditatis, in senecta angulosa. Habetque cum paucis hanc proprietatem, quod eius folium circumagatur æstiuo solstitio, hoc est supinas foliorum partes conuertat, eoque argumento rustici solstitium confectum intelligunt. Auctu quàm facilis, maturè germinat, & ante æquinoctium. Vtrum ferat fructum varia sententia est. Arcades sterilem

sterilem putant
vitiaces, & sterili

Theophrastus
læuiorq; nigra,
est Florem hab
niore, atq; omni
menti inopiâ ha
scabriorem hab
dant. Omnino

atq; simile quod
pleraq; videm
piliones vocan
minori. Hæc v
tius arboris m
re erecto, sed
stiorum scabr
neq; florent.
res fructifican
feruantur, alt

10 dia ad fontem qu
Cedrio nomen
tum magnitud
sed parte altera
re parte resupin
obrem nõ erect
ut pyrus sylue
appellatur, m
ba folio bicol
toni, folia in

30 Populorum
fiore candida
lia eius post
Alibibryon
vnguents
dixit. Sed m
longo, super
in pediculis
tus lanugin
spiritum. Alb
40 cauis, rufila
byca minus
stato, sinuat

sterilem putant. Ex radicibus facile germinant alba, nigraque populus: nam vituaces, & steriles sunt, quod nulli ex reliquis datum est.

Theophrastus tria genera recenset. Populus alba corpore erecto, excelsior, Genera
lauiorq; nigra, figura foliorum simili. Lignum, quum caeditur, albedini simile est. Florem habere non existimant. Et libro de causis: fronde latiore, cortice lauiore, atq; omnino succo latiore, quam nigra est, sed eadem in senecta obalimenti inopiā haud procul est à ratione, vt & frondem angustiorē, & corticem scabriorem habeat, & quicquid euenire iis solet, quæ non a quæ alimento abundant. Omnino fortasse mirum non est, quod in hac euenit, quum in proximum, atq; simile quodammodo transeat. Nam & in animalibus mutationes eiusmodi pleraq; videmus, alias in generatione, vt quum in cæteris, tum in iis, quos papilioes vocamus. Et oleagnum describens dicit esse flore populi albæ, verum minori. Hæc vetustate in nigram degenerat, tum fronde, tum tota specie: totius arboris mutatio sponte exoriri videtur. Nigra cum alba vniformis, corpore erecto, sed humiliori, scabriusque. Albæ figura foliorum similis, sed angustiorum scabriorumque. Cortice in totum strigosiori. Ligno vtiq; par candor, neq; florent. Arcades steriles putauere. At in Cræta & populi nigra complures fructificant, vna apud aditum speluncæ Idææ, qua munera deo dicata conseruantur, altera parua ab ea proxima stat, & vltcrius duodecim plurimum stadia ad fontē quendam Sauri dictū pleraq; sunt, & in monte proximo ab Ida, cui Cedrio nomen, nec non & circa Tiresiam. Alpina populo albæ non absimilis est, tum magnitudine, tum verò quod ramis albicantibus spargitur, folio hederæ, sed parte altera sine angulo, altera oblongo, inq; angulū exeunte acutū. Colore parte resupina, pronaq; ferè simili, pediculo prolixo, tenuiq; annexo. Quæ obrem non erecto sed inflexo, cortice asperiori, quam populus alba, scabriusq; vt pyrus syluestris. Plinius ab eo. Populi tria genera, alba, nigra, & quæ Libyca appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungisq; enascētib; laudatissima. Albæ folio bicolor, supernè candicans, inferiori parte viridi. Huic, nigreque, vt crotoni, folia in iuuenta circinata rotunditatis sunt: vetustiora in angulos exeunt.

30 Populorum foliis grandissima lanugo. Euolat candida (tradita folio numero fiore candida) vt iulus. Mirum quod populo albæ euenit: circūaguntur enim folia eius post solstitiū, nec alio argumēto certius intelligitur sydus confectum. Alibi bryon vocat vnam populi albæ. Et alibi vuarum populi albæ meminit in vnguentis vsus, & seminis populi nigre. Dioscorides semen populū proferre dixit. Sed nigra populus apud nos in arbutis frequentior. Folio rotundo, oblongo, supernè acuto, initio claro, mox atrouirente, pediculis oblongis. Vere in pediculis oblongis racematim nascitur vua, acinuli rotundi, piperis ritu, in tus lanuginem continet in pappo euanescentem. Radice vaga per summa cespitum. Alba fluiorū, rigoꝝumq; assecla. Folis supernè virentibus, subtus incavis, rufilaginīs ritu. lulos, siue foliorum exortum, salicis modo profert. Libyca minus frequens, minore, & breuiore folio, duriore, obtusiore, circumcirculato, sinuatoque. Cortice crasso, laui, primū viridi, mox cineritio.

Cœlum.

Populos in plana descendere Theophrastus inquit. Varro tepidiora amare scripsit. Plinius montes amare dixit. Diximus nos in senecta cortice scabro, crassoque esse, ob id quodcunque cœlum substat, tepidum, frigidumque.

Solum.

Populus rigua, & flumina sequitur. Ovidius.

Quam platanus riuo gaudet, quam populus vnda.

Et Virgilius.

Populus in fluminis.

Sed iuxta Nilum nulla populus, etsi fluminum amantissima. Cortice læui, ob id aquosa arbor. Radice per summa cespitem vaga, ob id leue solum quærit. Horret siccum, arenosum, & præcipue gypsum, in eoque languida, breuique durans. Læti in cauis, quam planis, & in iis melius, quam collibus germinat. Vulturius albas, Campania reliqua nigras, & Libycas alit.

Satio.

Plinius semine feri dixit. Populis eadem ratio semine, qua vltimos ferendi, transferendi quoque è seminariis easdem & syluis. Mutantur arbores & colore, fiuntque ex nigris candidæ, non semper prodigiosè, & maxime quæ ex semine nascuntur: vt populus alba in nigram transit. Recentiorum aliqui semine feri putant, quoniam populi semen perfectum est, colore subalbicant, prius quam frondes pullulent, feratur loco humido ac cœnoso, quumque enatum fuerit, transferatur. Sed hæc insana opinio videtur, quum populorum semen sit imperfectum, idque ex aspectu liquido videtur, alio modo natura eius fatum demonstrante. Diximus radices summa telluris cute spargi: ob id facillimè radicibus feri, & pullulare posse videmus. Theophrastus celerrimè & pulcherrimè nasci ex auulsione dixit, si locum idoneum, cultumque congruum adipiscatur, quemadmodum quæ lucos, & aquas desideret: si quis enim eam prægrandem, & arbori se ex æquantem transtulerit, perdurare optimè posse. Populos quia festinantius germinant, disponi quoque maturius cōuenit, hoc est ab idibus Februarij, plantis & ipsas nascentes. Plinius. Quintilij Octobri mense ferunt. Nasci quoque ex trunco idem protulit, cuius pars defixa feri non recusat, tam alba, quam nigra. Ex suis etiam ramulis nasci dixit, quia cortex nitidus, crassus, succosus. Sed modus ramo ferendi Neapoli frequentissimus est, quum singulis annis in complendo arbusto, vento tempestatibusque deturbatas restituumus. Ex nouella populo eligantur rami nitidissimi, læues, recti, non ramosi, ætate duorum vel trium annorum, prægnantes & germine turgentès, silente vel finiente Luna. Ramosos ideo reiicimus, ne quum emundetur ramuli ex crebris plagis, frigori & Soli sint obnoxij. Signetur pars, quæ Boreæ obiecta erat in arbore, vt in scrobibus feratur, vt in ipsa arbore steterant. Imum crus in vngula bouis formam reseceamus, immuni cortice, ne faucietur, repliceturque, ex ea enim parte radículas speramus. & pars illa, quæ scrobibus immergetur, acuta cultri acie vulneretur pluribus locis vsque ad lignum, vt inde facilius radícula eliciantur. Dein scrobes trium, vel quatuor pedum altitudine excauentur in plano, quatuor, vel quinque in cliuo, in ea-

rum me-

ram medio bipa-
tur, & eiusmodi
Boreæ, quam lig-
sius calcetur: ne
cipiatur, sic don-
Optimè feceris,
rerur truncus. S-
ne foramen hie
post triennium,
nantur, vt dice-
conuelli sperat
neo palinatu
superiniecta,
tempore plan-
populum cor-
iectorum, cōcip-
moria: prodid-
cister coratis i
Theophrast-
multum eru-
graque, ignis
tes, lenior tem-
tem. Ergo quæ
didæ, & in scul-
sima quæcun-
dis aptissima:
ob id contum-
laminas lecat
pulus vtraque
Dioscoridi-
in Padum am-
alij chrysoph-
Plinius rusti-
fulmine id-
nibus anni-
ætrum app-
primiq; vt
esse fallum
Clymenes
terio procr-
men habere

rum medio bipalio trium vel quatuor pedum profunditate foramen excauerur, & eiusmodi hiatu populeus ramus mergi debet, obuertasq; partem illam Boreæ, quam signaueras. Sic iniecta paulatim terra querno palo, vel graui spissius calcetur: ne laxitas inter excipiens foramen & hospitem truncum interceptiatur, sic donec foramen expleatur, mox foras scobs repleatur, calceturque. Optimè feceris, si prius quàm seueris, denis vel quindenis diebus aquis immeretur truncus. Si tamen ventus validus, & vehemens fuerit, vt ex concussione foramen hiet, denuò calcentur, immuni semper cortice, ne obtundatur: post triennium, vel quadriennium decacuminentur, & rami in tabulata disponantur, vt dicemus. Sunt qui truncos sine cacumine serant, sic minus à ventis conuelli sperantes. Plinius. Eiusdem rei causa populus alba feritur, bipedaneo pastinatu, talea sesquipedali, biduo siccata, palmipede interuallo, terra superiniecta, duorum cubitorum crassitudine. Eiusmodi talea ramiq; verno tempore plantantur, priusquam pullulent. Sunt qui dicant tam viuaci natura populum constare, vt scobs, & ramenta corticum, ramorumque in terrâ proiectorū, cōcipiant, & radicentur, & in syluam excrescant. Sed Dioscorides memorix prodidit, corticē nigræ, & albæ populi cōcisum in partes minimas, & sulcistercoratis insparsum, edules, innoxiosq; toto anno restibiles creare fungos.

Theophrastus. Populi materies, dum cæditur, albicat. Lignum dum vritur, mulum eructat fumum, vt humidum, & palustre. Vitruuius, Populus alba, nigraque, ignis & aeris satiata, atq; humoris temperata, parum terreni habentes, leniori temperatura comparata, egregiam habere videntur in vsu rigiditatem. Ergo quum non sint dura terreni mistione propter raritatem sunt candida, & in sculpturis commodam præstant tractabilitatem. Plinius, Frigidissima quæcunque aquatica, vt populus: lentissima autem, & ideo scutis faciendis aptissima: quorum plaga contrahit se protinus, clauditq; suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferrum. Contra omnia inferiora pandatur. In laminas secatur, quarum operimento vestiatur alia materies. Palladius. Populus vtraque in sculpturis necessaria.

Dioscorides refinam effundere aut lachrimam populos commemorat, quæ in Padum amnem defluat, dicunt coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysopho. Id attritu iucundum spirat odorem, & aurum colore imitatur. Plinius rustica transpadanas ex electro monilia gestare affirmat. Phaetontis fulmine icti forores Hetu mutatas in arbores populos, lachrymis electrū omnibus annis fundere iuxta Eridanum amnem, quem Padum vocamus: & electrum appellatum, quoniam Sol vocitatus sit Elector, plurimi Poëta dixere, primi q; vt arbitror, Æschylus, Philoxenus, Nicander, Eutipides, Satyrus. quod esse falsum Italiæ testimonio patet. Ouidius fabulatur Phaerontem Solis, & Clymenes filium, quum ipsi obiceretur ab Epapho illum nō de Sole, sed adulterio procreatum, ad parentem venientē petiisse, vt vnus diei sui currus regimen haberet: patrē, tametsi egrē, tandem illi concessisse itaq; conscenso curru,

solitam viam aberrauisse, cœpisseq; cœlum, & maximam orbis partem incendio conflagrari. quod videns Iuppiter, eum fulmine icit, qui in Eridanum lapsus est, quem sorores Heliades lugentes, deorum commiseratione, in populos versæ sunt, quarum lachrymis fit electrum.

Inde fluunt lachryma, stillatq; sole rigescunt

Deramis electra nonis, quæ lucidus amnis

Excipit, & nurbus mittit gestanda Latinis.

Sed Lucianus huius rei scrutandi gratia ad Padum se cōtulit, serioq; faterur, neq; populos ibi esse, neq; succinum ibi de fluere, nec deniq; reperiri. Scripsit Zoroaster, Electrum lapis, siue succinū omnia paleosa & leuia ad se ipsum trahit, præter ocymum.

De vlmō. CAP. XXXVI.

SEQVITVR vlmus syluestris arbor, & aquarū alumna. Plinius materie, vitiumq; amicitia vlmū prestare dixit. Cato vlmōs circū vias feri debere præcipit, vti frondē ouibus & bubus habeas, & materia, si qua opus erit parata sit. Varro in septis prædij ferit, ne familiæ rixetur cum vicinis, nā & substinet sepē, & colit aliquot corbular vuarū. Narrat Virgilius frondē bubus p̄bere iucundā.

Viminibus salices fecunda, & frondibus vlmī.

Nomen:
Genera.

Græcis *ελεία*. Latinis vlmus. Italis *olmo*.

Theophrastus duo vlmī genera constituit, alterum *ὀρεντέλεα* vocat, quod Theodorus montiulmum interpretatur, quasi montanam vlmum dicas: alterum, vlmum. Virgilius plura vlmī genera esse dicit,

Præterea genus haud vnum nec fortibus vlmis.

Nec salici.

Columella duo vlmī genera facit, gallicū, & vernaculū: illud atinia, hoc nostras dicitur. Plinius quatuor genera facit, duo Græcorū, quæ ex Theophrasto excepit. Græci duo eius genera fecere, montosam, & campestrē. Italia attineas vocat excellentissimas, alterum genus gallicas, tertium nostrates, quartum sylvestre.

Descriptio.

Theophrastus ita sua genera describit. Vlmus fruticosior est, montiulmus auctior. Folium indiuiduum, leniter circumferratum, oblongius quàm pyro, scabrum non læue. Præstat hæc arbor & amplitudine, & altitudine, sterilis putatur. Gummi in petiolis gignit, & animalia quædam culicea, & amenta peculiaria gerit. Autumno multa minuta, nigra, ceteris verò temporibus quid ferat, minus animaduersum est. In vlmō cradē gignuntur, quæ si asperis, aridis, ventosisque locis steterit, ita omnino fiat necesse est. Deniq; qui proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput conuenerit, hic senescens crassior redditur. Vuas affert, & folliculos quosdam. Folium infectum. Illud sanē peculiare, quod vlmō accidit: vertit enim partes supinas mox post solstitium estiuū, eoq; argumento rustici solstitium confectum intelligunt. Et in causis. Folia circumaguntur æstiuo solstitio, quod deo potissimum tempore folia decidant. quum igitur foliorum agatur profluuium, cuncta aliquo modo affici necesse est, & quæ infirma, &

quasi

quasi senio con-
modo. Semen
si qua ex imper-
vlni. Columell-
sem eius) sal-
sterilis videtur.
tribus. Est autē
diorē bubus pr-
neas vocat ex-
genus, gallicas
lo numero hor-
nunt, reliqua
semen nō fer-
quam, neque
brachiata na-
Lucos, ac
plana etiam
& in montol-
arborū gener-
modice humi-
neptouenire
semen in loca
mine faciend-
nouellā sobol-
paratum hab-
bipalio prim-
tempore in a-
& compluri-
habeat, iniū-
putrem terre
areas coope-
Vbi deinde
pemus, idē
vlnmō co-
quitur, car-
runt ipsi se-
quàm sol-
& quā ter-
altius agat-
tas in aliū
los fescup-

quasi senio confecta, exarescunt, & decidunt, reliqua circūaguntur tantummodo. Semen habet, sed latitat. Prorsus absurdū simul, & mirandum apparet, si qua ex imperfectis valeant generare, praesertim arborū naturas steriles, ceu vlmī. Columella, Atiniam vlmū Tremellius Scrophā nō ferre samarā (quod est semē eius) falso est opinatus. nam rariorē sine dubio creat, & iccirco plerisque sterilis videtur, seminibus inter frondē, quam prima germinatione edit, latentibus. Est autē vlmus longē latior, procerior, quā nostras, frondemq; iucundiorē bubus prabet. Plinius. Montosa amplior, campestris fruticosa, Italia attineas vocat excelssimas, & ex iis siccanas praefert, quae nō sint riguae. Alterum genus, gallicas. Tertium genus nostrates densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore. Attineae nō ferunt samara: omnesq; radicum plantis proueniunt, reliquae semine. Ex eo fluit gūmi, & culices ibi nascuntur. Vlmus atinia semen nō fert, infelix existimatur, damnataq; religione, quae neq; feratur vnuquam, neque ferat fructum. Folia ramulosa. Inter primas germinat. Ab radice brachiata nascitur. Corticis humor saluosus.

Lucos, aquasq; desiderat. Ex Theophrasto *operientia* gaudet montibus, in *Colum.* plana etiam descendit. Apuleius vlmū humectis locis gaudere ait. Plinius. Abit & in montosa vlmus. In Ida Troadis raram vlmū Theophrastus dixit, et si aliis arborū generibus fertilissima sit. Col. in nebulosa. Columella pingui solo, & *Solum.*

modice humido, variisq; soli generibus prouenire dixit. Theophrastus semi- *Salia.*
ne prouenire scripsit: nam illud iudiciū affertur, quum enim statibus delatum semen in loca proxima fuerit, nasci arborē aiunt. Columella vlmarium ex semine faciendū docet, ut in arbusto emortuas, aut senio, & tempestate afflictas nouellā sobolem substituere possis: quod faciliē eueniet, si vlmorū seminarium paratum habeas, quod & quale, & quomodo faciendū sit, ita praecipit. Igitur bipalio primō terrā pastinabimus, ac diligenter occatam, & resolutam vei no tempore in areas cōponemus. Samarā deinde quae iam rubicundi coloris erit, & complutibus insolata diebus iam erit, ut aliquē tamen succum, & lentorem habeat, iniiciemus areis, & eas totas seminibus spisse cōtegimus, atq; in cribro
30 putrem terrā duos alte digitos incernemus, & modicē rigabimus, stramētisq; areas cooperiemus, ne prodeuntia cacumina seminū ab auibus praeodantur. Vbi deinde proreperint plantae, stramēta colligemus, & manibus herbas carpemus, idq; leuiter, & curiosē faciendū est, ne adhuc tenerae, breuesq; radicle vlmorū conuellantur: atq; ipsas quidē areas ita anguste cōpositas habebimus, ut quirituri sunt, medias partes earū faciliē manu cōtingant: nā si latiores fuerint ipsis seminibus, quae proculcata erunt, noxā capient. Estate deinde prius quā sol orietur, aut ad vespērū, seminaria cōspergi potius, quā rigari debēt, & quū ternum pedū plantae fuerint, in aliud seminariū transferri, ac ne radices altius agant (quae res postmodū in eximendo magnū laborem affert, quū plantas in aliud seminarium transferre volumus) oportebit nō maximos scrobiculos
40 los squipede inter se distantes fodere. Deinde radices in nodum si breues, vel

in orbem coronæ similem, si longiores erunt, inflecti, & oblitæ fimo bubulo scrobiculis deponi, ac diligenter circumcalcari. Possunt etiā collectæ cum stirpibus plantæ eadem ratione disponi, quod in atinia vlmō fieri necesse est, quæ non feritur è samera. Sed hæc vlmus autumnī tempore melius, quàm vere disponitur, paulatimq; ramuli eius manu detorquentur, quoniā primo biennio ferri reformidat ictum, tertio demum anno acuta falce abraditur, atque vbi translationi iam idonea est, ex eo tempore autumnī, quo terra imbribus permaduerit, vsque in vernal tempus, antequam radix vlmī in eximēdo delibretur, rectè feritur. Igitur in resoluta terra ternū pedum quoquoersus faciendi scrobes; at in densa, sulci eiusdem altitudinis, qui arbores recipiant, præparandi, & deinde vlmī conferendæ, vt earum ramī ad orientem, & in occidentem dirigantur, quo plus solis mediæ arbores, quibus vitis applicata, & religata innititur, accipiant. Sed Plinius breuius docet. Vlmorū, priusquam folio vestiantur, samara colligēda est circa kal. Martias, quū flauescere incipit, deinde bīduo in umbra siccata, siccata densa in refracto, terra super minutatim cribrata crassitudine, quæ in cupressis. Pluuiæ si non adiuent, riganda. Deferendæ ex arcarum venis post annū in vlmāria, interuallo pedali in vnamquamq; partē. Maritas vlmōs autumnō ferere vtilius, quia carent semine, nam eę è plantis feruntur. In arbustū quinquennes sub vībe transferunt, aut (vt quibusdam placet) quæ vicenum pedū esse cœperunt, sulco qui nouenarius dicitur, altitudine pedū trium, pari latitudine, & eo amplius circa positas pedesterni vndiq; è solido adaggerantur. Et alibi. Hoc genus similiter natura monstrauit, auulsiq; arboribus stolones vixere. Quintilij docent Aprili mense semē vlmī colligi debere, & collectū statim ferere. Apud nos Aprili mense vlmī samara onerata videntur, illicoq; decidit, satumq; non prouenit: nam dum contemplatur, videtur sine spe futurę prolis. Theophrastus, Quæ semē ferunt, tā ex radicibus, quàm ex ipsis prodire nimirum possunt: nam eas quæ steriles esse arbitrantur, generare affirmant, vt vlmū. argumētumq; capiunt, nō solum quod pleraq; procul suis radicibus erumpāt, verum etiā quod in Phineo Arcadiæ quū aqua obstructis faucibus extumuit, demū erupisse, & vbi in loco inundato vlmī steterant, anno secundo solo resiccato iterum vlmōs surrexisse affirmant. Vlmus celerimè & pulcherrimè prouenit ex auulsione, quæ si quis prægrandem, eamq; cum arbore se exæquantem transtulit, perdurare optimè potest. Plinius. Quæ carent semine, plantis ferere vtilius, vt vlmus. E radicibus est genuinus vlmorū satus, nam à radicibus suis longè repullulat. Virgilius.

Pullulat ab radice aliis densissima sylua,

Vt cerasis, vlmisq;.

Caro exactius plantas ponere docet. Vlmōs quum seres, benè cum radicibus eximito, cum terra sua quā plurima, circumligato vti ferre possis, in alueo aut corbula ferri iubeto. Caueto autem ne quum ventus fiet aut imber, effodias. In scrobe quum pones, summam terram subdito, postea operito terra, & calcato

calcato pedibus
da est, & si ad
non solum tole
da sit, & probè

Post vider
vlmus: ob id vl
valua quog; sta
eos ligna perm
inter se coarcta

10 adueretur: na
ruina vtiq; eod

paetas statuunt

namq; a statis

rent. Ratio,

vibus rotund

dines, & auri

lis etiam ad f

diocriter. Mal

tura humidior

20 tit. Ad sum

surgunt, quæ

phrastus. Cato

eximito, post

suum maturum

cellatio. Orbe

mea facito. Et

ritia vlmō, sed

samentisq; po

tum sic, vt ca

30 tu firma: Len

cata, fidelior

Cato vides

tum Cymb

amputatur

vt protinus

quæ antè v

xino dicim

tilis habetur

40 Virgilius

calcato pedibus. Frigus non admittit, vt syluestris sterilisq;: nam densa & valida est, & si admiserit statim expellit, transmittitq; nec vsquā retinet. Plagam non solum tolerat, sed lignis detractis caudici, indomita manet, vt quæ humida sit, & probè germinet.

Post vindemiam & arcturum cæditur. Rigorem quoq; fortissimè seruat *Materies.* vlmus: ob id vlmeos cardines valuis adiungunt, nam si ipsi firmi permaneant, valua quoq; stare intoræ possint, alioquin torqueantur necesse est. Faciunt eos ligna permutâtes, quod radicem versus, quodq; in cacumine fuit: sic enim inter se coarctata vtrumq; impletum alterius prohibet, quum suapte natura aduerfetur: nam si alterum per naturam eodem tendat, quò momentum est, ruina utiq; eodem sequi facillè possit. Valuas non statim apponunt, sed compactas statuunt. Nonnulli anno tertio confecere, lautioris operis desiderio: namq; a statis calore exiccatæ dehiscunt, hyemis verò humore oppletæ cohererent. Ratio, quòd rara, carnosaq; facillè attrahant humorem. Tornatus navibus rotundis ex vlmo, lentitiam enim, firmitatemq; adesse oportet. Testudines, & auriculas ex vlmo etiam fabricant, valida enim hæc esse oportet. Vtilis etiam ad fores, præla, & torcularia, quin & ad carpentarium opus, sed mediocriter. Malleus & terebra ex vlmo optimè fiunt. Lentore non caret, sed natura humidior, indicium quòd post casuram erecta materies humorem emittit. Ad summum quæ in montibus nascuntur coloratæ valde, candidæq; asurgunt, quæ plano rariores corpore, pallidiores, deterioresque. Hæc Theophrastus. Cato, Vlmeâ materiem omnem quum effodies, Luna decrecente eximito, post meridiem, sine vento Austro. Tum erit tempestiua, quū semen suum maturum erit. Vento Austro caueto ne quam materiem tractes, nisi necessario. Orbem in torculari ex vlmo facito, intrinsecus cuppam materia vlmea facito. Et vetes vlmeos. Plinius ab eo eadem, & à Theophrasto. Est lentitia vlmo, sed sicciior. Rigorem fortissimè seruat vlmus, ob id cardinibus, asfamentisq; portarum vtilissima, quoniam minimè torquetur, permutanda tantum sic, vt cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Vlmus in perflatu firma: Lenta, sed facile pandatur, flexilis tamen, stansq; à circumcisa siccata, fidelior. Terebris vaginas ex vlmo vtilissimas fieri, & eadem malleos. Cato vetes vlmeos fieri iubet. Factum hoc populi Rom. quiritibus ostentum Cymbricis bellis Nuceria in luco lunonis, vlmo postquā etiam cacumē amputatum erat, quoniam in aram ipsam procumbebat, restituta sponte, ita vt protinus floreret. A quo deinde tempore maiestas populi Ro. resurrexit, quæ antè vastata cladibus fuerat. Vitruvius eadem de vlmo habet, quæ de fraxino dicimus. Palladius. Vlmus si ficcetur, rigescit, ante curuabilis, carenis vtilis habetur. Hesiodus temonem ex vlmo in aratro facit.

Temonem ex vlmo viridi, seu confice lauro.

40 Virgilius ab Hesiodo describens aratrum etiam vlmum ad temonem cedit.

Continuo in syluis magna vi flexa domatur

In burim, & curui formam accipit vlmus aratri.

Infusio. Virgilius cerasum in vlmum inferi posse dicit, & quercum.
———— Glandesq; suos fregere sub vlmis.

De Alno. CAP. XXXVII.

SYLVESTRIS est arbor, & apud rigua nascens alnus. Sunt Poëta, qui fabulatur Phaëthontis sorores nō in populos, sed alnos mutatas. Virgilius.
Tum Phaethontiadæ musco circumdat amara
Corticis, atq; solo proceras erigit alnos.

Nomen. Græcis *αλνός*, Latinis alnus, quod amne alatur, Itali *alno*, anno *oni* 70. Neapolitani *altano*.

Descriptio. Theophrasti alnus sterilis, & vni gena est. Recto caudice, ligno medullaque molli, adeo ut graciles virgæ concuenter, folio pyri, sed ampliore, ac nervosiore, cortice squaroso, rufescente intus, qua de causa coria tingit. Radice summa, nec quā laurus maiore, tenui, ac per summum cespitem. Folio auellanae simillimo, sed arctiori. Quædam fructifera, quædam sterilis, utraq; tamen florescit. Germinat post Fauonium. Autumno reddit semen. Auctu facilissima. Plinius alnum nullum fructum ferre prodidit, scopis tantum nascentem, quare infelicem existimari, damnatamque religione. Folio crassissimo, cuius umbrapinguis, sed pascens sara. In ea tuber nascitur ut in acere, tanto deterius, quanto ab acere distat, sectile, sicut cedro: nec aliarum tubera in pretio. Et nigra quoque meminit. Sed putat Matthiolum Theophrastum sibi contrarium, quum dixerit sterilem esse, & autumno fructum proferre, quū non legerit caput quintum tertii libri historiarum, quandam esse fructiferam, & quandam sterilem, ut dicemus. Apud nos fructifera est. Flos paulum rubescit, semē exiguum in compactilicillo, colore in nigrum flavo, qui nucis magnitudinē æquat, & mori figuram. Profert & iulium autumno, qui mox aperitur vere, ut in nostris villis observauimus. Cortex rufescit ex fusco, cuius potissimum vsus ad insectoria.

Colum. Vdos locos, riguasq; crepidines sequitur vlmus. Theophrastus haud alibi, quā in aquaticis nasci tradidit. In aquis occultatur radix, & aliquid caudicis, reliquum corpus extrā patescit. Sed si quis arctius inquirere velit, contrariam & quasi ancipitem vitam agere inueniet. Virgilius.

Fluminibus salices, crassiq; paludibus alni.

Vitruuius perpetuū in fluuiis generari. Plinius non nisi aquosis alnos provenire dixit. Aristoteles inter miracula in Creta insula alnos non esse steriles dixit. Theophrastus etiam in plana descendere.

Satio. Depactis virgis, & truncis natam vidimus.

Materies. Vitruuius. Alnus quæ proxima fluminum ripis procreatur, & minime materies utilis videtur, habet in se egregias rationes: etenim aëre est, & igni plurimo temperata, non multum terreno, humore paulo. Itaque quia non nimis

habet

VI
habet in corporum palationibus quorū, permixta structura, & si tempus durare, maxime id conferta sub fundamēta mutant, contrariis excubent, ni ad aquarum nis. Eadem si mor quoque extitit & in ea terra, si humidus gilio ad naua

EST & salis in villa notior editus, m cum ei in astin frumento, aut genista, populaculeis rubi. A quibus sterilitasq; impossibilia, inter totum aufertur falcem in macogitationes populus tubetes salces fructū imaginari commemo gignere dicuntur medietatis descendis organa, tam per caput 40 umbram sub

habet in corpore humoris in palustribus locis infra fundamenta ædificio-
rum palationibus crebro fixa recipiens in se, quod minus habet in corpore li-
quoris, permanet immortalis ad æternitatem, & substat immania pondera
structuræ, & sine vitiis conseruat. Ita quæ non potest extra terram paulum
tempus durare, ea in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Est autem
maximè id considerare Rauennæ, quod ibi omnia opera & publica, & priua-
ta sub fundamentis eius generis habeant palos. Plinius. Licet alni sepibus
muniant, contraque erumpentiam æmii, impetus riparum muro in tutela
ruris excubent, in aqua saturæ, casæque densius in numero hæde profunt. Al-
ni ad aquarum ductus in tubos cauantur, obruta terra, plurimis durant an-
nis. Eadem si non integantur, cito senescunt, mirum in modum fortiores, si hu-
mor quoque extra super sit. In palustribus æterna, onerisque quantilibet patiens.
Est & in ea lentitudo, sed madida. Palladius. Alnus fabrica inutilis, sed necessa-
ria, si humidus locus ad accipienda fundamenta palandus est. Materies à Vir-
gilio ad naualia commendatur:

Tunc alnos primum fluij sensere cauatas.

De Salice. CAP. XXXVII.

EST & salix ex prædictarum genere syluestris, & aquarum alumna, &
in villa non solum utilis sed necessaria. Nullius quippe, inquit Plinius, tur-
rior reditus, minorisve impendii, aut tempestatis securior. Tertiumque lo-
cum ei in æstimatione ruris Cato tribuit, prioremque quam oliuetis, quamque
frumento, aut pratis, non quia desint alia vincula, siquidem optima præbent
genista, populi, ulmi, sanguinei frutices, betula, arundo fissa, vitis, recisique
aculeis rubi. Alligat & intorta corylus, sed salici præcipua dos. Erat salix anti-
quitus sterilitatis, & castitatis symbolum, siue quod folia huius arboris contrita, &
pota, intemperantiam libidinis efficaciter frenent, & sapius sumpta vsu in
totum auferant: ob id lasciuissimo quem fingunt hortorum deo salignam
falcem in manu donauit antiquitas, scilicet ut Veneris pruritum, & impudicas
cogitationes castitatis falce resecandas admoneremur. In sacris literis, ubi Dei
populus iubetur tabernaculorum festa celebrare, quippe in tentoriis habitan-
tes salicis frondes manibus prætendebant, nimirum per salicem continentiam
imaginamur. Salix porro sterilis est, quippe Maro inter infelices plantas
commemorat, ubi Seruius semen salicis esum infœcunditatem mulieribus
gignere dicit, quippe apud Plinium prius legerat, semen salicis mulieri steri-
litaris medicamentum esse. Iudæi captiui tracti, ubi propter flumina Babylo-
nis descendissent, captiuitatemque suam deplorarent, in salicibus suspenderunt
sua organa, ubi Euthymius per salices otia interpretatur, quod ignauam vi-
tam per captiuitatem traherent, tum obeius sterilitatem inutilem, tum ob
40 umbram sub qua desides ociari soliti sunt.

Nomen.

Græci *ῥῖαν* vocant, Latini *falicem*. Verrius ita dictam putat, quod ea celeriter crescat, ut salire videatur, quam opinionem Festus Pompeius irridet, damnatq; nimis seuera & grammaticali censura, quod eam arborem potius, quam virgulti genus appellarit. Itali *salce*.

Genera.

Virgilius plura *falicis* genera putat. ob id in Georgicis,
Præterea genus haud unum nec fortibus ulmis,
Nec salici.

Columella tria genera facit, Græcæ, Gallicæ, & Sabinæ; quam plurimi vocant *amerinam*, Varro Græcam *falicem* nominat. Plinius plura genera dicit. Nam quædam & in proceritatem magnam emittunt iugis vinearum perticas, pariuntq; baltheo corticis vincula: & alia virgas sequacis ad vincturas lenticia. Alia prætenues viminibus texendis spectabili subtilitate. Rursus alia firmiores, corbibus ac plurimæ agricolarum supellectili, candidiores ablato cortice, leuiq; tractatu vilioribus vasis, quam ut è corio fiant; atq; etiam supinarum in delicias cathedrarum aptissimæ. In Asia tria genera obseruant. Nigram, virliorem viminibus: candidam agricolarum vltibus: tertiam, quæ breuissima est, *helicem* vocant. Apud nos quoq; multi totidem generibus nomina imponunt. *Vimineam* vocant, eandem purpuream. Alteram *vitellinam* à colore, quæ sit tenuior, tertiam *Gallicam*, quæ tenuissima.

Descriptio.

Theophrastus ita describit. *Salix breui, & contorto caudice confurgit, auctu perquam facili, brevisque vita est, quod apud aquas assurgat. Mature germinat, quia sterilis, lucosaque sit. Celeriter fructum amittit, antequam in plenum crassetur percoquaturq; , dimittere asseuerant, quamobrem Homerum haud improbe frugiperdæ hanc appellasse inquit. Et alibi de *falice* ambigitur utrum semen habeat. Sicca levis est. Plinius ab eo. *Salix longis foliis pullulat. Circumaguntur enim post solstitium. Nec alio argumento certius intelligitur sydus confectum. Ocyssimè autem amittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat: ob id dicta Homero frugiperda, secutaq; aras scelere suo interpretata est hanc sententiam, quando semen *falicis* mulieri sterilitatis medicamentum esse constet. Vnà tantum proditur ad maturitatem perferre solita in Creta insula, ipso descensu Iouis speluncæ, toruum, ligneumque, magnitudine ciceris. Citò crescit, moriturq; . A Virgilio flexibilis describitur, & folio *glauco* coloris, vnde & oculi ab eiusmodi colore *glauco* dicuntur: *Amaraque*.**

Lenta salix

Et glauca canentia fronde salicta.

Florentem cythiisum, & salices carpetis amaras.

Porphyrius in his, quæ circa Homericæ philosophatur, *falicem* ob id *ὠλεσι-
 γεινον* vocari tradit, quod semen prius, quam mature scat, in arenam abeat, vel hac potius de causa dictum putat, quod semen illud ex vino propinatum sterilitatem faciat, *seminali* omni vi protinus labefactata. Apud nos tamen sur-
 git

trunco, ab
 bilibus, foliis
 matim compa
 densitate cresci

Præmadida
 velit, commun
 corporis in aqu
 frequens. Hac
 viliginosus opti
 tum humidol

Flu

Didymus
 Salix ex au
 cum arbore
 rumque capi
 uenire etiam
 stituere ita ex
 veteres) in du
 generis vimin

leis ponuntur
 diarii orbiculi
 ad solidum de
 ruuntur. Rigi
 cancem recte
 ea: quinam pe
 tionis, alter
 est eorum pri
 siccas conuen
 pluuii dies in

crebrius, at n
 ta sunt, aliter
 salices inter
 uatis & def
 lus deinde
 fit. Alibi id
 fodere. Pl
 des & fern
 uallo esse
 ut sic se in
 est, quo te
 li. Hæc est

at, quò dea cele-
mpius irridet,
arborem potius,

git trunco, ab eius extremo, veluti à capite prodeuntibus ramis, lentis, flexi-
bilibus, foliis subtus incauis, supernè virentibus, flore, seu nucamento squa-
matim compactili, lanuginoso propendente. Citissimè ramorum constipata
densitate crescit vt mirè adultà in arborem præmaturo incremento conspicias.

Præmadida ac palustris omnino spectatur salix, & si quis arctius inquirere
velit, communem & quasi ancipitem vitam agere inueniet. Radix & aliquid
corporis in aqua manet, reliquum verò extra patefcit. In lacu Orchomenio
frequens. Hæc Theophrastus: sed Columella, salicem, dicit, riguus ager, vel
vliginosus optimè recipit, non incommodè alit planus, & pinguis. Varro sali-
etum humido loco facit. Virgilius flumina sequi dixit.

Colum.
Solum.

Fluminibus salices, crassiq; paludibus alni.

Didymus cænosa, & aquosa terra gaudere, aère humido & frigido dixit.

Salix ex auulsione celeriter nascitur, quæ etiam si quis prægrandem eamq;
cum arbore se exquantem transulerit, perdurare optimè potest: argumen-
tumque capiunt, quòd procul radicibus suis erumpat. Summis ramulis pro-
uenire etiam potest, quod aquarum præauida fit. Sed Columella salictum cõ-
stituire ita exactissimè docet. Debet bipalio conuerti (ita enim præcipiunt
veteres) in duos pedes & semissem salicto destinatum solum: nec refert cuius
generis vimen seras, dum sit lentissimum. Salices vel cacuminibus, vel ta-
leis ponuntur. Perticæ cacuminum modicæ plenitudinis, quæ tamen dipon-
diarii orbiculi crassitudinem non excedant, optimè panguntur, eo usq; dum
ad solidum demittantur: taleq; sesquipedales terreno immersæ, paululum ob-
runtur. Riguus locus spatia laxiora desiderat, eaq; senum pedum per quin-
cuncem rectè faciunt, siccanens spissiora sic, vt sit facilis accessus colentibus
ea: quinum pedum interordinia esse abunde est, vt tamen in ipsa linea consi-
tionis, alterna vacuis intermissis bipedaneis spatiis consistant semina. Satio
est eorum prius, quàm germinant, dum silent virgæ, quas arboribus detrahi
siccas conueniet: nam roscidas si recideris, parum prosperè proueniunt, ideo
pluuji dies in exputanda salice vitantur. Fodienda sunt primo triennio salicta
crebrius, at nouella vineta, quum deinde conualuerint, tribus fossuris conten-
ta sunt, aliter culta celeriter deficiunt: nam quâuis adhibeatur cura, plurimæ
salices intereunt, quarum in loco ex propinquo mergis propagari debent, cur-
uatis & defossis cacuminibus, quibus restituatur quicquid intercidit: Annicu-
lus deinde mergus decidatur à stirpe, vt suis radicibus tanquam vitis ali pos-
sit. Alibi id Februario mense fieri debere docet, vel facta deputare, runcare, &
fodere. Plinius ab eo. Salicum satio fit loco madido, tamen refosso duos pe-
des & semipedè, talea sesquipedali, vel pertica, quæ utilior, quo plenior. Inter-
uallo esse debet pedes seni, trimæ pedibus binis à terra putatione coercentur,
vt sic se in latitudinem fundant, ac sine scalis tondèantur. Salix enim sæcundior
est, quo terræ proprior. Has quoq; omnibus annis cõfodi iubet, mense Apri-
li. Hæc est viminalium cultura. Perticalis & virga & talea, feritur fossura eadè.

Perticæ ex ea cædi iustum est quarto ferè anno. Ex autem senescentium propagatione farciunt locum, pertica immersa, & post annum recisa. Ocyssimè salix amittit semen. Sed in hoc quoq; prouidens Natura, facillè nascenti, & depaucto surculo, incuriosius semen dedit. Varro inter Fauonium, & æquinoctium vernum salicta serit, cædit verò inter æquinoctium vernum, & Vergiliarum exortum. Democritus eas plantat Februario mense ex claua, & taleis.

Institio.

Palladius in institutione malum recipere dixit, & castaneam.

Stipitibus gaudet nomen mutare salignis,

Et gratum nymphis spargere flore nemus.

Flumineam salicem fecundant ardua membra

Castanea, & mulio pasta liquore vigent.

10

Infirmi.

Quædam securim ita tolerant, tam stantes, quàm à statu prostratæ, vt resurgant, viuant, germinentq; vt salici in Philippis euenerat. Fuit quidem detruncata, sed non circumdolata. Aruspex tum quidem persuasit, vt sacrificarent, custodirentq; arborem, vtpote factam ostento fausto.

Materies.

Humida, inquit Theophrastus, quæ palustria, viridia, fumosa sunt dum vruntur. Ad scuta, cistellas, canistra, & eiusmodi reliqua valet. Lenta salix, qua de causa scuta ex ea facere solent. Icta enim protinus plagam contrahit: sed salix leuior, rariorq;, ob id ea magis vtuntur. Plinius ab eo. Lentissima salix, & ideo scutis faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, clauditque suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferrum. Lentissima salix, ideoq; vtilissima ad cistellas, quæq; flexibili crate constat, habet & candorem, rigoremque, & in sculpturis facilitatem. Palladius. Salix in sculpturis necessaria. Vitruuius ea de salice dicit, quæ superius de populo alba diximus. Plinius. Nec in fruticum, nec in veprium, cauliumve, nec in herbarum, aut alio vilo, quàm suo genere numerentur iure scirpi fragiles, palustrésve, ad tegulum, tegetesq;, è quibus detractò cortice, candelæ luminibus, & funetibus feruiunt. Firmior quibusdam in locis earum rigor: namq; iis velificant non in Pado tantum nautici, verum & in mari piscator Africus, præpo-

stero more vela intra malos suspendens. Et mapalia sua

Mauri tegunt, proximeq; æstimanti hoc videantur esse, quo inferiore Nili parte papy-

xi sunt vsu.

IOAN.

IOA

P

S



præterea legere
liceret colligere
Cato locauit
vescuntur,
20 imponemus
generis voca
illi Græcorum
communi or
inter felices
gus. Nos de
alice aquif
Græcorum
pomiferis
tibus, lot

30
40 E GLA
erit.
ex esculo p

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLAE

LIBER TERTIVS

SIVE

SYLVA GLANDARIA.

PRO OE MIVM.



10 **D**IXIMVS iam de cædis arboribus: proximum est vt narrem glandiferas quoq; , quæ primæ victum mortali-
bus subministrarunt , nutrices inopis ac feræ sortis. Glandes opes esse nunc quoq; multarum gentium, etiam pace gaudentium constat. Nec non & inopia frugum ex arefactis molitur farina, spissaturq; in panis v-
sum. Quin & hodie, per Hispanias secundis mensis glâs inferitur. Dulcior eadem in cinere tosta. Cautum est præterea lege xii tabularum, vt glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere. Glandariam syluam nono, & ultimo loco in villæ censu vetus Cato locauit. Dicemusq; vnâ de pomiferis syluestribus, quibus ferè & alites vescuntur, quod vbi absoluerimus, de syluestribus arboribus tractatui finem
20 imponemus. Plinius Latinum sermonem glandiferas omnes arbores vnius generis vocabulo amplecti omnino posse negat, quod nullum inuenit, quod illi Græcorum generi responderet, quod *δρυς* dicitur. Sed Theodorus pro communi omnium genere robur capi satis aptè licere falsus est. A Macrobio inter felices arbores glandiferæ annumerantur, vt quercus, ilex, esculus, fagus. Nos de glandiferis primùm, iisq; æterna coma pubentibus, ilice, altera ilice aquifolia, subere, & phellodri: mox de caluescentibus, quercu, robore, Græcorum fago, cerro, esculo, haliphæo, farno, & Latinorum fago. Inde de pomiferis semper virentibus, filiqua, arbuto, secundò de frondem remittentibus, loto, calabrice, & reliquis syluestribus.

De Illice. CAP. I.

30 **E**GLANDIFERIS igitur prima æterna virens casarie, quæ occurrit, ilex
40 erit. Plinius scribit ciuicam coronam ilignam primò fuisse, postea magis ex esculo placuisse. Ioui sacra. Traditur ab Eliano, quod leo ilicis foliis calca-

tis, illicò torpore teneatur : confirmatur id etiam à Zoroastre in geoponicis Græcis. Palladius ex minori ilice apes mel conficere scripsit. Arbor frequentè igitur fulmine. Persius id innuit.

— *At sese non clamat Iuppiter ipse?*

Ignovisse putas : quia cum tonat, ocyus illex

Sulphure discutitur sacro, quàm tuq; domusq;?

In eos protulit, qui quum in honestam vitam ducant, sibi ipsis ignotum putant, quoniam Iuppiter in ilicem, non in eos fulmen iaculatur. Arbor ipsa infausti ominis antiquitus semper habita. Virgilius.

Ante sinistra caua monuisset ab ilice cornix.

Seneca in Thieste.

Nullaq; latos solet

Præbere ramos arbor, aut ferro coli,

Sed taxo, & cupressu, & nigra ilice

Obscura nutat sylva.

Imposuit & oppido illex nomen Præneste Italię, non longè ab vrbe, & *πρίων*, id est, ab ilicibus, ut Seruius notat. Illex quum caua, id est, vitiosa est, vitium agrorum demonstrat. Est & futuræ vbertatis prænuncia anni. Si illex multum fructum ferat, tradit Didymus, fructuosum annum futurum portendit. Cassianus ex Arato refert, ilices & quercus multum fructum ferentes, diuturniorem hyemem fore significare. Arati versus sunt,

Induit immodicis cum semet floribus illex :

(Indiga nam succi ligno natura rigenti est)

Et cum flore nouo, cum brachia glande grauantur.

Vrentis cæli subnutrimenta latenter

Sponte operata docet.

Nomen. Græcis *πρίων*, fortasse quia propter duritiem serra secanda foret, vel à folio circumferrato. Latinis illex, Italis *elce, elice*. Neapolitanis *licina*. Sunt qui hanc *ελειν* Theophrasti dicant.

Genus. Est illex Columellæ gemina, minor apibus quæ sita, prolixa ab omnibus improbata mellificio. Estq; eadem aculeata, & aculeis vacans. Nam de fronde bobus ministrâda loquens, ait. Ligna melior est quærnea, sed eius generis, quæ spinas non habet : nam id quoq;, ut iuniperus, respuitur à pecore, propter aculeos. Plinius. Ilcis duo genera. Ex iis in Italia folio non multum ab oleis distant, similes à quibusdam Græcis dictæ, in prouinciis aquifoliæ. Masculas ilices glandes ferre negant.

Descriptio. Describimus Italiæ notissimam, & fortasse Theophrasto ignoram. Arbor spectatæ proceritatis, & quærneæ elegantia. Cortice in rufum nigricatè. Folia sunt lateribus sinuata, ac per ambitum denticulis aspera, perpetuò virentia, externè candicantia, scabraq;, internè læuia, nigricantiaq; in virore. Ob id Poëtæ nigram appellant. Virgilius:

Ilce

Et Horatius.

Nidola est, v

Glandes prof
stilleidia ponde
Columella co
re, & in montol

Didymus an

16 Materies eiu

nus protulit. V

Hetrulcis, reli

originem mul

iam Tiburto

Fuisse eum tra

te illicum bell

caudicis, x arb

cit. Pons Rom

10 stractus esset :

situs, ut trabes

ret, religiolum

sit, ut postea il

lios facit. Mate

ilicis similes, q

mina ex ilice fi

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Ilice sub nigra pallentes ruminat herbas.

Et Horatius. *Duris ut ilex tonsa bipennibus,
Nigra feraci frondis in Alcido.*

Nidosa est, ut quoque Lucanus annuit:

— nodosa impellitur ilex.

Glandes profert quernis minores, ex reliquis minus præstat. Plinius ilicis stillicidia ponderosissima dicit.

Columella conuenienter nemora ilicibus vestiri dixit, Plinius valles diligere, & in montosa subire.

10 Didymus ante Calendas Martias plantari præcipit.

Satie.

Materies eius densa est, & robusta, in atrum rufescens. Diutius viuere Plinius protulit. Vetusior autem vrbe in Vaticano ilex, in qua titulus æreis literis Hetruscis, religione arborem iam tunc dignâ fuisse significat. Tiburtes quoque originem multo ante urbem Romam habent, apud eos extant ilices tres, etiam Tiburto conditore eorum vetustiores, apud quas inauguratus traditur. Fuisse eum tradunt filium Amphiarai, qui apud Thebas obierit, vna ætate, ante Iliacum bellum. Vicina luco est ilex, & ipsa nobilis x x x v pedum ambitu caudicis, x arbores mittens singulas magnitudinis visendæ, syluamque sola facit. Pons Romæ olim supra Tyberim Sublicius dictus est, quod ilicis materie 20 structus esset: nam sine ferro, sine clauo, sine futuris, contignatione ita dispositus, ut trabes per bella eximerentur, ac postea reponerentur. Quod, ut sic fieret, religiosum fuit, posteaquam Horatio Coclite defendente, ægrè reuulsus sit, ut postea ilicis materie confici solitus sit. Cato vectes iligneos, & aquifolios facit. Materies se frangit, & dissilit sponte sua; ob id Pericles Bæotios dixit ilicis similes, quod ipsi se intestinis discordiis conficerent. Virgilius apum examina ex ilice fieri dixit.

Materia.

*— nec non & apes examina condunt,
Corticibusque canis, vitiosaque ilicis aluo.*

De ilice aquifolia. CAP. II.

30 **A**LTERA est aquifolia ilex coccifera; quam nouisse videtur Theophrastus, quamque à pecoribus respui Columella propter aculeos dicit.

Hæc Theophrasto *ωρίνος* dicitur. Plinius milacem à Græcis dici, & ab oleis folio non multum distare, in prouinciis aquifolias vocari scribit. Sed Plinius errare videtur: nam milax alia erit, ut in sequentibus videbimus. Latinis ilex aquifolia.

Nomen.

Theophrastus alteram sterilem, alteram fructiferam, ambas tamen floriferas dicit.

Genera.

Ilex arbor Theophrasto assurgit roboris magnitudine, si solum adipiscatur idoneum, sed folio minori, aculeatoque, cortice etiâ lauiori. Radice multiplici, 40 ut syluestrium altissima. Glanduloso fructu, sed glans ipsa pusilla est: veterem fructum nouus præuenit, nam serò maturescit, quamobrem bifera à non-

Descriptio.

nullis existimata est. Fert præter glandem granum quoddam puniceum, hyphear, & viscum: quapropter quaternos parit fructus, binos peculiares, binos alienos, à septentrione viscum, à Meridie hyphear. Fructum nonnulli acylon vocant. Perpetua frondet coma. Germinat vere, omniū tardissimè suos perficit fructus. Arcades semen anno perficere dicunt, simul enim fructum antecedentem maturat, & nouum demonstrat: quamobrem ex his euenit, vt asiduè fructum habeat. Si corticem circumcideris, interit, sed hyeme tardius, vt pote robustissima. Plinius ab eo. Ilicis glans vtriusque breuior, & gracilior, quam Homerus acylon appellat, eoq; nomine à glande distinguit. Ligna suem angustam, nitidam, strigolam, & ponderosam facit. Tentantur ea sues, nisi paulatim detur. Et hanc nouissimam cadere. Nullo flore exhilaratur. Folio breui pediculo dependenti. Annifera est, nouusq; fructus in his cum annotino pendet. Si decorticetur interit, sed si hyeme acciderit, diutius durat. Sed omnes roborum dotes ilex solo prouocat cocco. Granum hoc, primoque ceu scapum fruticis parua aquifolia ilicis, cuscium vocant. Pensionem alteram tributi pauperibus Hispania donat. Est autè genus ex eo in Attica ferè, & Asia nascens, celerrimè in vermiculum se mutans, quod ideo scolecion vocant, improbantque. Color paludamento imperatorum dicatus. Dioscorides furculosum fruticem coccum afferre dixit, quo insectores vtuntur. Est apud nos ilex magna, folio aculeato, prægrandi, quam describit Theophrastus, sed coccum ferre non vidimus. In montosis verò Hispania, & sterilibus locis paruas ilices conspeximus, exiguis, densis, crispisq; foliis, angulosis, rigidisque spinulis armatis, horridiore aspectu. Flore muscoso, herbaceo, quem Martio ostendit. Coccum ferunt, non semen, aut fructum, sed excrementum nobile, & visendum, intus sanguineo & miniato cruore scatens, admirandum solertis naturæ opus.

Cælum. Montibus latari, & in planis non nasci scripsit Theophrastus. Dioscorides optimum in Galatia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia, vltimum ex omnibus Hispanicum. Plinius ab eo. Coccum Galatiæ rubens granum, aut circa Emeritam Lusitaniæ in maxima laude est. Gignitur & in Galatia, Africa, Pisdia, Cilicia, pessimum in Sardinia.

Materia. Ilex medullam magnam, & perspicuam habet, corno duriorem, spissiorēque, qua valuarum sumptuosarum cardines facere solent artifices, faciendosque architecti præcipiunt medulla, quam cor nonnulli vocitant. Honos ilici ad axes plaustrorum, & iuga lyrarum, psalteriorumque. In ignariis terebrum ex ilice fieri solet, quod pati pertinacius esse debet. A quo Plinius. Secatur in laminas prætenues ilex, colore quoque non ingrata, sed maximè fida iis, quæ teruntur, vt rotarum axibus, ad quos duritia utilis. Terebris vaginas utilissimas fieri tradunt, ex eadem malleos. Hyginus. Manubria rusticis iligna. Tota offea est ilex, eadem & sine medulla.

Desu-

VBER etia
S (textus lapsu
bus glandiferari
Græcis gemos
ipsum corticem
& altipedus. Lat
Arbor suber,
signis, parum ra
ro, vti in picea di
longiore, crassi
ret, ne deterio
tracto, omnis
no, quam inte
nius ab eo. Sub
ctu præcrassus,
tus. Vtus eius a
dorum obturan
rem eas nō infa
tice in orbem d
tur: crasse scens
germine. Ex ei
Arbor suber
nasci ait syluis.
vidimus, & qu
Lignum, ex
factitara sunt,
ferax est, fabri
nec candent a
cortice esse. v
nius. In suber
obnoxium,
dematur cor
liquis tardis
ilex, pro ea
Lacedæmon
phellodri tri
pariter habet
raritate hum
quod in aqu

De subere. CAP. III.

SUBER etiam glandifera arbor, & perpetuæ frondis, & si Theophrastus (textus lapsu ut spero) deciduæ dicat. Pausanias in Arcadicis, vnum ex tribus glandiferarum arborum generibus dixit.

Græcis *φαιδός* est. Iones, reliquique & Hermefinax elogus Poëta *φαιδός* & *Νομῆν*. Nomen. ipsum corticem nominant. Vocant & *Κόρυς* à cortice, quasi aquis immerfabilis, & altipedus. Latinis suber. Italis *suvero*.

Arbor suber, ut à Theophrasto describitur, est admodum procera, auctu insignis, parum ramigera, ligno robusto, cortice præcrasso, & in senectute aspero, ut in picea dirumpi solito, verum prægrandioribus segmentis, folio fraxini longiore, crassiori que, deciduo, glande aquifolia. Corticem detrahare oportet, ne deterior fiat arbor, qui triennio post subnascitur. Cortice in orbem detracto, omnis arbor interit, excepto subere, quæ sic etiam iuuatur, tam externo, quam interno carni propinquo. Tardissimo ferè omnium germine. Plinius ab eo. Suberi minima arbor. Glans pessima & rara, cortex tantum in fructu præcrassus, atque renascens, atque etiam in denos pedes vndique explanatus. Vtus eius anchoralibus maximè nauium, piscantium que tragulis, & cadorem obturamentis: præterea in hyberno scæminarum calcatu. Quamobrem eas non infacere Græci corticis arborem appellant. Cortice carnosio. Cortice in orbem detracto necantur arbores, excepto subere, quod sic etiam iuuatur: crassescens enim præstringit, & strangulat. Folio indeciduo. Tardissimo germine. Ex eius glande fungosam suam carnem fieri.

Arbor suber Pyrrheni familiaris ex Theophrasto. Pausanias in Arcadicis nasci ait syluis. Plinius nec in Italia, nec in Gallia nasci ait. Nos in Campania vidimus, & qua itur Romam via, in syluis copiosissimam.

Lignum, ex Theophrasto, rigidum est. Simulachra diis ex subere primum factitata sunt, sed successit in eius locum palma. Columella. Si regio suberis ferax est, fabricanda apibus aluearia ex eius corticibus, quia nec hyeme rigent, nec candent æstate. Pausanias scribit in Arcadicis suberem tam exucco, & leui cortice esse, ut ex eo anchorarum in mari indices, & fundarum faciant. Plinius. In subere tempestiuè casu euenit, ut neque pandatur, neque vieatur, aliàs obnoxium, etiam ut torqueat sese, findat que. In aquis non fluitat lignum, si dematur cortex. Tardissimè verustatem, cariem que sentit, aut saltem ex reliquis tardissimè. Sunt qui scæminam ilicem vocent, atque ubi non nascitur illex, pro ea subere vtantur, in carpentariis præcipuè fabricis, ut circa Elin, & Lacedæmonem. Sed falsò hæc verba Plinius suberi tradit, quæ Theophrastus phellodri tribuerat, ut inferius videbimus. Vitruuius de eius materie. Suber pariter habet mixtionem humoris, & ignis, & terreni, aeris plurimum, peruiam raritate humores penitus recipiendo, celeriter mucescit. Ex suberis natura, quod in aqua non sedit, sed aliis alligatur, ne submergi possit, tractum est

vulgare adagium, ut apud Pindarum, *ὡς φέμος*, id est tanquam suber, de his, qui dissimulare, aut mergi aduersis fortunæ procellis nesciunt.

De suberiquercu. CAP. IIII.

DIXIMVS de subere, dicturi de quercu, dicemus nunc de suberiquercu, quæ ex utraque componitur arbore: nam ut nomen, sic ab utroque parente imaginem refert.

Nomen. Theophrastus *φειμόςπυ* appellat, ex nomine *φέμος* id est suber, & *δρύς* quercus, quasi Latine suberiquercum dicas. Arcadibus etiam similax dicitur eodem authore. Itali etiam Græcos imitari, *Cerrefovaro* vocant.

Descriptio. Itaphellodris à Theophrasto describitur. Arbor ilici similis, folio non aculeato, molli, profundo, differentiis pluribus distincto. Materie soluta, tenera, mediæ naturæ inter robur, & ilicem. Sunt qui aliud negent esse quam ilicem fœminam, ut ilex ubi desit, utantur hac in carpentariis præcipuè fabricis, quod Lacedæmone faciunt, & Elide. Diores agrestem eam appellant. Lignum eius quam ilicis candidius, & fuluius, quam roboris. Materie quoque durior, sed quam ilicis solutior in opere. Foliū ambobus simile, sed iligno maius, & quercu minus. Speciosior medulla, quam ilicis. Fructus minimis glandibus æqualis, acylon vocant, quemadmodum & roboris. Plinius ab eo. Sunt qui fœminam ilicem vocent, atque ubi non nascitur ilex, pro ea subere utantur in carpentariis præcipuè fabricis, & circa Elim, & Lacedæmonem.

De quercu. CAP. V.

SEQVNTVR glandifera, quæ caluitium patiuntur. Plutarchus Chero-neus inter arbores sylvestres quercum fructu bellissimā, & fertilissimam dicit. Arborum prima nata dicitur: unde Arcades cum hac cognatione quandam habere dicti sunt, quoniam omnium primi ex terra homines fuisse perhibentur, immò ante lunam & astra. Statius.

Arcades hinc veteres astris, lunaq; priores,

Agmina fida datis: nemorum vos stirpe rigenti

Fama satos.

Pelagus vir magnus ac sapiens, primus Arcadas glandium cibum docuit, à quo & ipsa regio Pelagis dicta est: prius enim herbis ac stirpium frondibus vescabantur, ideoque *βελαιοφάγοι* dicti. auctore Pausania in Arcadicis. Plinius, Ciuica corona iligna primo fuit, postea magis placuit ex esculo Ioui sacra. Variatumque & cum quercu est, ac data ubique quæ fuerat, custodito tamen honore glandis. Plutarchus in Coriolano, Propterea Ioui sacram quercum dixerunt, quod ex ea ciuica corona, quæ ei dabatur qui ciuem seruasset, contexeretur. Sed cur ciuicas coronas ex quercu fieri sit institutum à veteribus, plures imaginari possunt causæ. Alij honorem hunc Arcadibus attribuunt, quod eos oracula solita sint ob vetustatis honorem glandifagos appellare. Alij quod quercus

quercus facilem
in cuius torula
de coronaretur.
dant plantam o
mis antiquorū
das, quas longū
bolum fuit. Mo
significate: viri
bur verò quercu
10 fas venas habea
diuturnitatem
fuerit: eius en
etiam quercus
lis mucrone si
tur, obsecrati
tus de puero q
ambiguo: nam
nirur. Socrates
hac ratione, qu
10 mare, qui an
xta Dodonam
bat. Virgilius

Palladius ex
stirpibus pond
giorem hyeme
Græcis *δρύς*
ceperat, Mac
& *μύρτι*. Non
30 dictum genus
quædam adn
lia. Antiquit
mitus, & Sa
rone, qui po
Theoph
dulcissiman
ipſis verò at
in orbem co
bet, & incor
40 lo superius i
dulciormol

am suber, de his,
nt.

de suberiquercu,
ic ab viroque pa-

ber, & *spūs quer-*
ax dicitur eodem

lis, folio nō acu-

tie soluta, tenera,

esse quā licem

pūe fabricis, quod

ant. Lignum eius

noque durior, sed

no maius, & quer-

glandibus & qua-

o. Sunt qui fœmi-

re vtantur in car-

utarchus Chero-

, & fertilissimam

cognationē quan-

mines fuisse perhi-

am cibum docuit, à

irpium frondibus

Arcadicis. Plinius,

ulo Ioui sacra. Va-

st odito tamen ho-

am quercum dix-

ervasset, contexe-

à veteribus, plures

tribuunt, quod eos

pellare. Alij quod

quercus

quercus facilem & expeditum cibū militibus afferat. Alij quòd Ioui sacra sit, in cuius tutela sunt ciuitates: vnde congruebat, vt qui ciuem seruasset, ea fronde coronaretur, quæ ciuitatum omnium tutelari deo dicata esset. Sunt qui tradant plantam omnium primam genitam, & populorum altricem fuisse. In nummis antiquorū multipliciter inscripta apparet, ad has proprietates designandas, quas longū esset recensere. Fortitudinis, & diurnitatis, antiquitus symbolum fuit. Mos enim fuit veteribus fortitudinē, validasq; vires per quercum significare: viri enim viribus præstantes, robusti à robore nuncupantur. robur verò quercus dicebatur à robo, colore rufo, quòd ea materia plurimas rufas venas habeat. Quercus etiā ea quidem est vis, vt in seros vsq; annos suam diurnitatem proroget, præcipuè si defossa, vel aquis macerata aliquantisper fuerit: eius enim materia incorrupta in ædificiis diu perennat. Significabant etiam quercus glande obscenitatem, ob eam scilicet, quam cum pudendi virilis mucrone similitudinem habet, & ob id Arcades, qui *παρὰ νοφάροι* dicebantur, obscenitate incessabantur. Extat Cynici dictum de hac re, qui interrogatus de puero quodam lasciuo quisnam esset, respondit, Tegeates; ludens ex ambiguo: nam Tegea ciuitas est Arcadiæ, & tegos interdum pro lupanari ponitur. Socrates in deorum sui temporis contumeliam per quercum deiebat, hac ratione, quòd deum vnum, qui mundum, cælumque regeret, esse existimaret, qui ante foret, quā quercus crearetur, & nasceretur. Fuit & iuxta Dodonam quernum nemus, in quo vocalis quercus responsa de dubiis dabat. Virgilius,

— atq; habite Graiū oracula quercus.

Palladius ex glandiferis roboribus etiam apes mel conficere scripsit. Plinius fillicidia ponderosa habere. Cassianus, Multum fructū ferentes quercus longiorem hyemem prænunciant, dixit.

Græcis *δρὺς* est, sed Theophrasto *ἡμελὶς*, id est placita dicitur, vt ab Idæis acceperat, Macedones verò eam *ἐπὶ τοῦ δρῶν*, quasi veram quercum dixerunt. Sic & *μῦδρον*. Nomen *δρὺς* videtur inditum à *δρῶν*, quasi erumpo, & impello, quòd dictum genus celsius & procerius in altum excurrat, vel quòd excrementitia quædam adnataque proferat, vt fungos, muscum, vellera, agaricum, & similia. Antiquitus saronos dicebatur, à qua Saronicus sinus, querno nemore redimitus, & Saron in Arcadia nemus trans Ladonem fluuiū, et si Pausanias à Saronē, qui post Anthipum regnavit, dictam vult. Latinis quercus. Italica *quercia*.

Theophrastus quercum ab hemeri non distinguit, inquiens. Quæ glandem dulcissimam fert alij quercum, alij hemerim vocant. Plinius aliter diuidit. In ipsis verò arboribus, quæ maximam glandem fert, hemeris vocatur, breuior, & in orbem comosa, alasq; ramorum crebro cauata. Fortius lignum quercus habet, & incorruptius, ramosa & ipsa, procerior tamē, & crassior caudice. Et paulo superius in marem, & fœminā quercum distinxerat, sed in querna glāde: alia dulcior molliorque fœminæ, maris spissior. Quæ ex Theophrasto præuè inter-

pretatus est: nam quam Theophrastus hemerim, nos quercū quam ipse syluestrem quercum vocat, nos robur, de quo in sequenti. est quercus hemeris, sed nobilior hemeris fagus est, hanc nos mitiorem quercum, & dulcissimam dicimus. Nunc de hemeri quercu, mox syluestri, tandem de fago dicemus.

Descriptio.

Ita suam hemerim Theophrastus describit. Neq; recta, neq; lauis, neq; procerca est, comatur in orbem, contorqueturq; in alas, crebro ramorum sinu cauata, materies valida, sed infirmior, quàm fago (scilicet Græcorum.) Dulcissima ei glans post fagū. Fert gallas ad coria vtilis. Fronde decidua, sed in agro Thurio, vbi Sybaris perspicua, quercū fuisse traditur perpetua fronde, nec vnā cum aliis germinantem, sed post ortum Caniculæ. Radice in profundū acta. Grandior atate, fecundior redditur. Causa est, quòd viribus detractis alimēti quoque nimia vbertas detrahitur, atq; ita reliquum pabulū percoqui, dispensariq; facile potest. A quo Plinius. Maximam glandem fert hemeris, breuior, & in orbem comosa, alasq; ramorum crebro cauata. Fortius lignum quercus habet, & incorruptius. Ramosa & ipsa, procerior tamen, & crassior caudice. In Thurino agro, vbi Sybaris fuit, ex ipsa vrbe prospiciobatur quercus vna, nunquam folia dimittens, nec ante mediam æstatem germinans. Idq; mirum est, Græcis authoribus proditū, apud nos postea fileri. Inferiori sui parte fertilior. Radix carnosa, copiosaque, eamq; in profundū agit. A Vergiliarū occasu glandiferæ semen reddunt. Diuturnioris vitæ. Iuxta vrbe autem quercus in lliumulo tunc satæ dicuntur, quū cæpit llium vocari. In Ponto circa Heracleā aræ sunt Iouis Stratij cognomine, ibiq; quercus duæ ab Hercule satæ. Sed Varro à Theophrasto habet. Item Sybari, qui nunc Thurij dicuntur, quercus simili esse natura, quæ est in oppidi conspectu. Quercus deorsum (de vallibus loquitur) fertiliores, quod Plinius de infera arboris parte protulit. Ipse Italiam querno folio assimilauit: multo proceritate amplior, quàm latitudine in læua se flectens cacumine. Par fuerat vt terra omnium terrarum alumna, eadem & parens, numine deorum electa, quæ cælum ipsam clarius faceret, sparsa congregaret imperia, ritusq; molliret, & tot populorum discordes ferasque linguas sermonis commercio contraheret ad colloquia, & humanitatem homini daret, breuiterq; vna cunctarum gentiū in toto orbe patria fieret, arboris frondem omnium pulcherrimam, & nobilissimam æmularetur.

Cæsum:

Apuleius humidis locis gaudere ait. Nasci quercus in rubro mari glandiferas tradunt, nasci quoque in alto propiores terræ. Theophrastus prodidit, super lapides atq; testas fictiles sine radicibus, sed patellarum modo adhaerescences, folio carnoso, crasso, atq; oblongo, miricæ simili, accedentis ad purpuram coloris. Forma ei flexuosa, atq; in latitudinem diffusior, ramis breuibibus, contortis, spissis, magnitudo arboris tota paulo sesquipede amplior. Hac mulieribus lanæ tinguntur. Ramis earum annexæ pendent conchæ quædam, & cauti-
bus parte ima, vbi millepedes, & aliæ generis eiusdem bestiolæ, quodq; polypi speciem gerit, populantur. Alteram quercū in mari nascentem refert glandiferam,

V
feram, cuius fructus
fragis & vrinanti
mari quercus e
cant marinos eff
cipue lacus, vt Pl
tate nascendi, su
radicum in insulas
ramorum arma
fluctibus agere
10
nauale, aduersus
Dumofos, gl
in plana descen
ptura quercus
Seritur sem
Epyro nascunt
Octobri men
docuit.

Pla

Fra

Ch

In confition
olea tam pertin
tur. Quercus
cilat radices no
la. Hinc ortu
ritatem sele ad
cet: nam q
iuxta se posita
plicatis, ferita
30
tata agrius co
Quercus
pere dixit.

Catinas n
abieti, aut p
corpore si
& aliquate
miscantur
bitur, & rin
40
liter querc
rum, clauis

quam ipse sylue-
reus hemeris, sed
dulcissimam dici-
o dicemus.

glauis, neq; pro-
amorum sinu ca-
rum.) Dulcissima
sed in agro Thu-
nde, nec vñ cum
indūcta. Gran-

dis alimēti quo-
qui, dispensariq;
tis, brevior, & in-
num quercus ha-
affior caudice. In
quercus vna, nun-
Idq; mirum est,
sui parte fertiliori
larū occasu glan-
quercus in litu-

ica Heracleā ara
fata. Sed Varro à
quercus simili esse
allibus loquitur)
e Italiam querno
ine in lava se fle-
na, eadem & pa-
et, sparsa congre-
ferasque linguas
atem homini da-
et, arboris fron-

to mari glandife-
stus prodidit, su-
modo adheſcen-
tis ad purpuram
tis breuib; con-
ion. Hac mulieri-
uadam, & cauti-
a, quodq; polypi
em refert glandi-
teram,

feram, cuius fructus sit cōmodus. Item alias magnitudine insignes: sed ea nau-
fragis & vrinantibus comperta sunt. Scribit Athenæus in Lulitania profundo
mari quercus esse glandiferas, vnde thunni vescantur, ob id thunnos qui di-
cant marinos esse porcos, minimè discedunt à vero. Cauchis, circa duos præ-
cipuè lacus, vt Plinius est author, littora ipsa obtinent quercus, maxima auidi-
tate nascendi, suffloſæque fluctibus, aut propulſæ flatibus, vastas complexu
radicum insulas secum auferunt, atq; ita libratae stantes nauigant ingentium
ramorum armamentis, sæpe territis Romanis classibus, quum velut industria
fluctibus agerentur in proras stantium noctu, in opesq; remedij illæ, prælum
nauale, aduersus arbores inirent.

Dumofos, glateofosq; montes glandē postulareretulit Columella. Plinius ^{Solum.}
in plana descendere dixit. Horatius querceta Gargani pluris facit, & sacra scri-
ptura quercus Basan. Glandifera & Arcadia.

Seritur semine quercus, & deterior euadit. Itaq; quum pleriq; ex iis, quæ in ^{Satio.}
Epyro nascuntur, seuissent, nullo pacto prouenire similis potuit. The. Cassianus
Octobri mense omne semen spargi posse admonuit. Virgilius plantis serere
docuit.

*Plantis & dura corylinaſcuntur, & ingens
Fraxinus, Herculeaq; arbor umbroſa corona,
Chaoniq; patris glandes.*

In consuetudine animaduertendum, quod ab aliis adnotatum est. Quercus &
olea tam pertinaci odio dissident, vt altera in alterius scrobe depacta moria-
tur. Quercus verò & iuxta nucem iuglandem. Ex Plinio. Quercus etiam ex-
cisa radices noxias oliueto relinquit, quarū virus enecat oleam. Ex Columel-
la. Hinc ortum symbolum, vt quum iracundiam, & inexorabilem animi aspe-
ritatem sese ad lenitatem dedisse significandum sit, quercus cum olea compli-
cetur: nam quum quercus insignis sit asperitate, atque adeo inimica oleæ, vt
iuxta se positam extinguat, & olea pacis, & lenitatis indicium, iis simul com-
plicatis, feritatem mansuetudine delinitam ostendimus. Apud nos transplan-
tata ægius concipit.

Quercus pyros ferre Plinius est author. Sed M. Varro quercum non reci- ^{Inſitio.}
pere dixit. Inferitur & in vltimum. Virgilius.

— glandemq; ſues fregere ſub ulmis.

Carinas naualibus quernas ſubiici pcepit Theophrastus, maximè triremibus: ^{Materia.}
abieti, aut pino ferruminari non poteſt quercus inſociabili natura, q̃ hæc ſpiſſa
corpore ſit, illa textu raro. Palladius durabile ait, ſi terrenis operibus obruatur,
& aliquatenus palis. Et de pauimētis loquens ait. Axes quernæ cū aſculeis non
miſceantur: nam quercus humore concepto, quū ſe cœperit ſiccare, torque-
bitur, & rimas in pauimēto faciet. Sed ſi quercu ſupperēte aſculus deſit, ſubti-
liter quercus ſiccetur, & trāſuerſus, atq; directus duplex ponatur ordo tabula-
rum, clauis frequentibus fixus. Lucina deæ ſimulachrū ē quercu factū prodidit

Eusebius. Vitruuius. Quercus terrenis principiorum sotietatibus abundans, parumq; habens humoris, & aëris, & ignis, quum in terrenis operibus obruitur, infinitam habet eternitatem, ex eo, quod quum tangitur humore, non habens foraminum raritates, propter spissitatem non potest in corpore recipere liquorem, sed fugiens ab humore resistit, & torquetur, & efficit in quibus est operibus, ea rimosa. Hesiodus de materia aratri.

— *dura dentalia quercu.*

Nec pretereundum duco Alexandri Macedonis inuentum seruandæ niuis, in scrobes, vbi ea sit, coniectis è quercu ramis.

De robore. CAP. VI.

DIXIMVS de quercu, nunc de robore, quasi de miti ad sylvestrem. Sunt enim qui robur & quercum nil differre putent, nos tamen authorum testimonio, & experientia quercum domesticam, robur sylvestrem arborem esse demonstrabimus. Columella inter eas differentiam facit. Vacerra, genus clattrorum fabricatur ex robore, quercu, vel subere. Et de pedamentis vinearum loquens: Quercus, suber, ac si qua sunt similia robora. Plinius. Probarissimos fungos quercus producit, robur, cupressus, & pinus noxios. Glandè propriè fert robur, quercus, esculus & ilex. Robur montes, & valles amat, quercus in plana descendit. In quercu glans optima, & grandissima, in robore parua, & suibus caro ex roboris glande fungosa. Alibi. Vulgò robur, quercum que nasci videmus. Hæc demonstrant quercu à robore differre. Refert Pampphilus quod serpens moritur quercinis foliis iniectis. Fimeta palo roboris adacto fieri iubet Plinius, ita forte ne innascantur his serpentes.

Nomen.

Theophrastus ἀρκυρὰν ὀξύς vocat. Latini robur, antiqui authores, Festo Pompeio autore, roborenum pro robore dicebant, ratione, quod plures rufi coloris venas habeat. Alij à robore, seu à diurnitate dictum malunt. Vulgò *rounce*, *quercia*, *seluaggia*.

Descriptio.

Ita describente Theophrasto. Cortice crasso, carnoso, & scabro, & maximè in senecta. Materie carnosa. Ramos habet incòditos. Medullam nigram præfertim quod nigrum cognominant. Lignum duru, quamobrem flexum non recipit. Folio toto ambitu sinuoso. Radicibus multis longisque, quippe si locum habeant expeditum, subire quantumvis facillè possunt, carnosiss, & altis. Alij florere putant, alij negant, sed muscum floris loco edi autumant. Fructificant post Vergiliarum occasum. Germinatione terna partui iunt corticemq; intersquamas spargunt, ac deinde rumpunt, ob id trisepri, aut trislippi vocata, hoc est intermillaria, vel triquamia. Germinationis tempore omnis galla quoque nascitur tam nigra, quam candida, magna ex parte noctu vniuersa. Inque diem aucta excepta resinacea, si ab æstu occupetur, inarescit, augerique amplius nequit, aliàs amplitudine maiore grandesceret, qua de causa eorum aliqua non minores fabis euadunt: nigra si pluribus diebus vi-

ret,

VI
ret, mali amplitu
etum alia gigni
gram, quin & a
difficile. Id tamen
verò perficitur, d
dammodo armu
tos ostendit. Fe
rens lanaceam, t
Flagrat enim pro
rum quidem in
tum tactu, tum
lo, concauoq;
quosdam vmb
Partem media
gra, & putrica
quamquam ra
pressam arg; ol
didam, aquosa
ueniensq; ad in
20 Robur, tot pra
radices erump
eriam muscu ta
ferax hæc arbor
mella apesq; fe
humor celo ca
bur folia toto
nationem inte
corticum spar
am prægnanti
30 circiter x v die
cacumina im
dem ad soliti
nitur excre
bus carnosiss
detertrima e
fructum plu
veluti mora
fructus inest
similes, intu
40 & sine oleo n
pillo, verno

ret, mali amplitudinem capessit. Robur omnium copiosissimè, præter fructum alia gignit: nempe gallam paruulam, atque alteram resinofam, & nigram, quin & aliud specie veluti morum, sed durum, & fractu admodum difficile. Id tamen rarum. Ad hæc aliud effigiem colis repræsentans. Quum verò perficitur, durum quid parte emicâre, & perforatum, & tauri caput quodammodo æmulans profert, quòd præruptum, nuclei oleæ speciem intrus ostendit. Fert & quod quidem pilum appellant. Id pilula est comam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernam luminibus vtuntur. Flagrat enim probè, vt galla nigra. Fert & alteram comigeram pilulam, ceterum quidem inutilem, verno autem tempore succo melligeno inficientem, tum tactu, tum gustatu. Inq; ramorum alis pilulam aliam gignit sine pediculo, concauoq; sessilem, peculiarem certè, versicoloremq;ue. Nam eminentes quosdam umbilicos candicantes, vel passim variantes nigris maculis habent. Partem mediam grani tinctura infectam, splendidamq; ostendit, aperta, nigra, & putricans cernitur. Lapillum quoq; puniceum magna ex parte gignit, quamquam raro. Item aliam eo ratiorem pilulam è foliis conuolutam, compressam atq; oblongam. Super foliis verò tergo adherentem pilulam fert candidam, aquosam, dum tenera est. hæc enim muscas interdum intus continet, veniensq; ad incrementum iustum, in modum lenis paruulæ gallæ indurescit.

Robur, tot præter fructum producit. Fungos omitto, qui è radicibus, & iuxta radices erumpunt, communes enim eos cum cæteris habent arboribus: quineriam muscū taceo, quippe quum in aliis quoque proueniat, sed nihilominus ferax hæc arbos habetur rerum plurimarum. Sin autem, authore Hesiodo, mella apesq; ferat, magis quoq; illud confirmatur. Ergo nascitur hic melleus humor cælo cadens, nec aliis magis insidens frondibus. A quo Plinius. Robur folia toto ambitu sinuata habet, emicantia etiam ex caudice ipso. Germinationem intermitit tripartito, ac terna germina edit, ideo & inter squamas corticum spargit, quòd omnibus arboribus in germinatione euenit, quoniam prægnantium rumpitur cortex. Est autem prima earum incipiente verè, circiter xv diebus. Iterū germinant, trāseunte Geminos sole. Sic fit vt prima cacumina impelli sequutis appareat, geniculato incremento. Tertia est earū, dem ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus: clareq; & tunc cernitur excrecentium cacuminum articulatio. Cortice crasso, scabroq; radicibus carnosus, eisq; in profundum actis, maximis, spatiosisq; Tota ossæa. Gallæ deterrima ex robore: signum eius quòd cauernæ translucent. Robur præter fructum plurima & alia gignit: namq; fert & gallæ vtrumq; genus, & quædam veluti mora, ni distarent arida duritia, plerunq; tauri caput imitantia, quibus fructus inest nucleis oliuæ similis. Nascuntur in eo & pilulæ, nucibus non ab similes, intus habentes flocculos molles, lucernarum luminibus aptos: nam & sine oleo flagrant, sicuti galla nigra. Fert & aliam inutilem pilulam cum capillo, verno tamen tempore melligeni succi. Gignunt & alæ ramorum eius

pilulas corpori non pediculo adhaerentes, candicantes ymbilicis. Cetera nigra varietate dispersa. Media cocci colorem habent. Apertis amara inanitas est. Aliquando & pumices gignit, nec non & de foliis conuolutas pilulas, & in folio rubente aquosos nucleos candicantes, & translucidos, quamdiu molles sunt, in quibus & culices nascuntur, indurescunt in modum gallæ. Ferunt robora & cachryn, ita vocatur pilula in medicina vředi vim habens. Gignitur postquam decidere folia, hyeme durans. Continet nucleum pineis similem. Is crescit hyeme, aperitur vere pilula tota, cadit quum folia cœperint crescere. Tam multifera sunt, & tot res pręter glandem pariunt robora. Sed & boletos, suillosq; , gulę nouissima irritamenta, quę circa radices gignuntur. Robora ferunt & viscum, & mella, vt author est Hesiodus. Constantq; rores melleos de cœlo, vt diximus, cadentes, non aliis magis insidere frondibus. Galliarum glandiferę maximę arbores agaricum ferunt. Est autem fungus candidus, odoratus, antidotis efficax, in summis arboribus nascens, nocte relucens. Signum hoc eius, quo in tenebris decerpitur. Virgilius ad mel alludit in Pollione.

Et dura quercus sudabunt rosida mella.

Sed nos quam robur vocamus, in syluis passim spectatur, folio latebrarum anfractibus sinuosissimo, paruo, duroq; , glande exigua, aspera, & ingustabili, materie durissima.

Solum. Solum profundum quarit, quia radice omnium altissima insidet; durum, 20 & montanum, vel montano proximum, sed solum, humectum, & sabulosum respuit.

Cœlum. Circæum, quod vocant excelsum, promontorium tradit frequentissimum roborum Theophrastus. Montes & valles diligere dixit Plinius. Locis frigidis, septentrioni obiectis, & apricis passim ubiq; vidimus.

Satio. De robore diuersam sententiam esse scribit Theophrastus: quidam enim ex semine tantum eam produci statuunt, alii ex radice quoq; , sed lentę, nonnulli etiam ipso caudice detruncato. Auulsione & radice, nihil ex his, quę ab imis plantigera non sunt, exoriri posse arbitrantur.

Insitio. Robur insitionum omnium capacissimam dixit Plinius, verum corrumpit saporem. Nos castaneam recipere vidimus. 30

Materies. Robur durum simul, & ponderosum est. Antequam terebrent madefaciunt, quod scilicet mollius reddant. Natura perpetua, æternaq; , sed defossum, atq; in aquis demersum: putredine quippe immune hoc omnino videtur: ob id fluuiis, lacubusq; : naues hac etiam materie condunt, sed mari putrescit, quāquam reliquę magis durare valeant, quod quidem & ratio vult, utpote quum sale macerata, conditaq; sint. In opere difficillima, quod crispā sit, nodosa, circumuolutionibus perplexa. Medulla spissa eius, quod atrum cognominat. Ponderi nil cedit, vt reliquę terrenę, sed renititur: argumentum quod nunquam rumpitur, sed prius quā viribus carie, aliisve deficiunt. Tam nauibus, 40 quā domibus commodum, nec non & in terra obrutum durat. Carbores de robore

V I
et robore nouell
optimos spississ
nimia, vt diut
hisce ad decoctio
terrestiores. Ta
stius casum, neq
sarum edurat, to
videlicet hyeme
ferē cōputrescit
10 et mo turgore, pro
maturitatē cad
quam quod sub
scribunt, quib
stiaū putant ve
Robori tanta
quidem ada
sub pōdere inc
naciū resistit, s
clinatione eger
ciabile glutino
que pandatur,
tustatemq; tar
pirur. Apud nos
mē conficimur
dulcibus aquis
conditumque
humida, non f

30 D Vo sunt
prum, q
habet, de qua
nec aliud disse
pias in Arcad
Græcis qu
patro referet
nim q Græci
stagnara, qu
Masculin
haliphlaro, q
lapidescunt. E
Vrbana f

ē robore nouello & annofo damnant, media ætas in pretio est. Carbones optimos spiffiffimæ materies faciunt, vt aria, robur, arbutus: solidiffimos enim ita, vt diuturniores, efficioresq; ſint, qua de cauſa in metallis argenteis hiſce ad decoctionem primam vtuntur, ſed deterrimi inter eos roboris, quod terreſtiores. Tardiſſimè cæditur, hyeme ineunte, ante quàm turgēt: tempeſtine cæſum, neque cariem ſentit, ſed prædurum ad cornus ſimilitudinem ſpiſſatum edurat, totum enim cordis ſpecimen præfert. Seriffimè ergò cæditur, videlicet hyeme poſt autumnū: quod ſi ſub turgore cædatur, citiffimè omniū ferè cōputreſcit, ſeu cū cortice, ſeu ſine cortice capiatur, potiſſimū, quæ primo turgore, proxima quæ ſecūdo, tertia quæ tertio. Quæ autē poſt fructuum maturitatē cæduntur, quāuis non turgida ſint, incorrupta perdurant, præterquam quod ſub cortice vermiculi quidam naſcentes, caudicem per ſummam inſcribunt, quibus ſignis pro ſigillis nonnulli vtuntur. Non deſunt, qui tempeſtiū putant vere, quum amentum, id eſt, cachryn ſuam gerit. A quo Plinius. Robor tanta duriſſia eſt, vt rerebrari niſi madefactum non queat, & ne ſic quidem ad actus auelli clauus. Robori exalburnato nigricans color. Robur ſub pōdere incuruatur, ceditq; ponderi. Viride ſerris cedit, aridum enim pertinacius reſiſtit, ſerratūq; dētes replet æqualitate inerti, qua de cauſa alterna inclinatione egerunt ſcobem. Glutinum abdicat, & inter ſe, & cum aliis inſociabile glutino. Vere cæſum teredinem ſentit, bruma autem neq; vicatur, neque pāndatur, alias obnoxium, etiam vt torqueat ſeſe, ſindatq; Cariem vetuſtatemq; tardiſſimè ſentit, deſoſſum diuturnius, ſed marina aqua corrumpitur. Apud nos robur quia neruoſum, & denſum eſt, pro columnis validiſſimè conſtituimus. Supra terram in conſtans, contorqueus ſeſe, & rimofum ſit, dulcibus aquis demerſum nulla marcoris tabe cōſicitur, ſed mari maceratum, conditumque putret, quaſi dulcibus gaudeat, & ſaſas horreat aquas: niſi ſal humida, non ſicca à corruptionis vitio vindicet.

De Fago. CAP. VII.

Dvo ſunt glandiferi fagi genera, vnum à Græcis, alterum à Latinis deſcriptum, quæ eſt glandiferis annumeretur, fructū nil glandibus ſimilem habet, de qua poſterius dicemus, nunc de Græcorum fago quercui ſimillima; nec aliud differt, niſi quod rotundam, & dulciſſimam glandem affert. Paulſanias in Arcadicis inter diuerſa quercuum genera fagum annumerat.

Græcis φάγος dicitur, vt M. Varro libro de gente Romana exiſtimauit, Soſipatros referente. Sernius δὲ φάγην, quod eſt comedere, dici voluit, loco enim φ Græci, priſci Latini ſponebant. Latinis fagus, Neapolitanis *quercia caſtagnara*, quod caſtanearum ſaporem æmuletur.

Maſculini & ſcæminini generis meminit Theophraſtus. Peculiare fago, & *haliphlaro*, quod ambabus in genere dicto virili glades parte poſtrema vtrinque lapideſcunt. Eſt & ſylueſtris, & vrbana, eſt & quæ glandem amaram ferat.

Vrbana fagus ligno leuiore conſtat. Peculiare, quod in genere virili

Deſcriptio.

glandes postrema parte lapidescunt utrinque; aliis in putamine, aliis in carne ipsa, ideoque detractis lapillis, concaua perinde atque in animalibus relinquuntur. Materie robustissima, putredinique nulli obnoxia, sed nec ipsa recta, quamquam minus torta, quam quercus, caudice verò crassissimo constat, ut tota quoque brevis species reddatur. Nam eius etiam corpus in orbem comosum, minimeque erectum est. Glanderotunda. Germinat paulò ante æquinoctium. Autumna facilissima. Sylvestris dulcissimum fert glandem, ligno plus scabro. Apud nos in triuiis, & syluis cuique obuia, nec ab aliis, nisi rotunda, & dulcissima glade cognoscitur, cruda, tosta, elixaque satis commodè editur, ut castaneæ videantur. Urbana in cultis provenit, sylvestris montibus nascens.

Colum.

De Cerro. CAP. VIII.

IDÆI, & Macedones, ut Theophrastus refert, cerrum roboris speciem faciunt. Plinius è glandiferis propriè dixit.

Nomen.

Græcis ἀγίλωψ, ut & Latinis agilops, & cerrus Plinio. Italis cerro.

Descriptio.

Cerrus agilops rectissima, excelssissima, lauissimaque, ligno per longitudinem robustissimo. Panum sola fert, longitudine cubitali, branchiarum similitudine, canum, muscosum, ceu villum linthei prolixum. Nascitur è cortice non furculo, unde glans, nec ex gemma, sed à supernorum nodorum latere. Cerrus ἀστερ, ut Macedones putant, aut sterilis, aut adeò improba glande, ut nullum animal, præter suillum genus ea vescatur, quòd ingustabilis sit, ac ne suis quidem, si pabulum aliud nanciscantur, eaque caput tentat mandentium. Hæc Theophrastus. A quo Plinius. Cerrus propriè fert glandem, sed cristam, & horridam, echinato calyce ceu castaneæ. Excelssissima agilops, sola è glandiferis fert panos arentes, muscoso villo canos, non in cortice modo, verum & è ramis dependentes cubitali magnitudine, odoratos inter vnguenta. Cerreæ glandem proximam quernæ tradit Nigidius, nec ex alia solidiorem carnem, sed duram. Apud nos cerrus procera admodum exurgit, recta, minusque ramosa. Calyce glandis echinato, carne intus amarissima, quæ à suis gustata, respuitur, nec nisi in caritate annonæ caducam depascuntur. Abdicata quoque fabricis, ut quæ flexu, fractuque inauspicata, in terris autem recipitur. Est altera species cuius glandes prægrandes habent calyces echinatos, ambitu spinis prædito sibi incumbentibus, magnitudinem ferè echini marini æmulatur.

Solum.

Nunquam in cultis, aut rarerè nasci scripsit Theophrastus. Incultis amica. Plinius. Apud nos quibuscunque locis obuia, & vulgaris.

Materies.

Cerri materies elaborata ædibus construendis inauspicata, quòd facillimè rupta fathiscat, eaque fultæ domus facillè ruinam sentiunt, casumque citò minantur, ob id rudi & indolata ad intestinum opus, & utensilia vtuntur. Damnata etiam in carbone, quoniam exiliat, & scintillas ei aculetur: arariorum tantum officinis compendio, quia flatu desinente protinus emoritur, parumque absumptus, tardè recidit in fauillam. Ab eo Plinius. Minus utilis ædificiis; at quæ

quæ carbone de
ne, arariorum
nus emoritur
nubria rusticis
millionem hum
mores penitus

MACRO
ignap
us. Eius structu
volunt, quòd
tum submin

Theophr
ter: glandifer
us ab esu dict
Neapoli vulg

Proximè a
ædificiis verò
scit. In glandu

quòd leuior,
untur. Maced

phra. Gland
fieri ex esculo

vitis obnox
ficinis comp
quitur, ceter

nus probata
dices in prof

30 re eminet, ta

Gallam
nem ducti
maximè vi

Nullum
40 Incultis

quæ carbone dotata, vitis obnoxia est. Quamobrem solido vtuntur carbone, arariorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu, protinus emoriens sæpius recoquitur. Cætero plurimis scintillis. Hyginus manubria rusticis cerrea. Celerrime marcescēs. Vitruuius, Cerrus pariter habet mistionem humoris, & ignis, & terreni, aëris plurimum, peruia raritate humores penitus recipiendo celeriter marcescit.

De Esculo. CAP. IX.

MACROBIUS inter felices arbores esculum adducit. Ciuica coronatigna primò fuit, postea magis placuit ex esculo, Ioui sacra: dixit Plinius. Eius fructu primæ ætatis homines vesciebantur, & ab esca nomen traxisse volunt, quòd ante cerealem frugem, & vsum frumenti, mortalibus arboris fructum subministrabat. Et ob id Ioui sacram dicebant. Ouidius,

Et qua deciderant patula Iouis arbore glandes.

Theophrastus *παισφυλλον* vocat, Theodorus latifoliam vertit, quoniam inter glandiferas arbores folii latitudine præster. Latini esculum vocant. Seruius ab esu dictam vult, etsi obrinuerit vltus, vt per æ diphthongum scriberetur, Neapoli vulgò *eschia*.

Proximè ab ægilope latifolia rectissima, excelsissimaq; post haliphlæum, ædificiis verò deterrima. Carbone inutulis, quin & maximè post illam putrescit. In glandium censu tertia latifolia. Galla eius haud absimilis quernæ, nisi quòd leuior, sed ad rem nullam utilis. Fert & alteram nigram, qua lanæ inficiuntur. Macedones esculum amaram glandem ferre inquit. Plinius ab Theophrasto. Glandem propriè fert, post quercum optimam. Fungosam carnem fieri ex esculo tradit Nigidius. Minus utilis est ædificiis, at quæ carbone dotata, vitis obnoxia est, quamobrem solido vtuntur carbone, arariorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu, protinus emoriens sæpius recoquitur, cætero plurimis scintillis. Galla similis quernæ sed leuior, multoq; minus probata. Fert & nigram: duo enim genera sunt, hæc tingendis vtior. Radices in profundum agit: Si Virgilio quidem credimus, esculus quantū corpore eminet, tantum radice descendit. Autumno reddit semen. Virgilius,

Esculus in primis, quæ quantum vertice ad auras

Æthereas, tantum radice in tartara tendit.

Ergo non hyemes illam, non flabra, neq; imbres

Connellunt: immota manet, multosq; per annos

Multa virum voluens durando sæcula vincit.

Gallam habet esculus cæteris longiorem, lineis quibusdam per longitudinem ductis. Cadit Octobris medietate. Suum carnem grauem facit. Omnium maximè viuens putrescit, & concauatur.

Nullum terræ delectum habet, sed in quacunq; feri posse, dixit Plinius.

Incultis amica.

Solum.

Calum.

Satio.

Plinius nasci è balano dixit, sed non nisi esculi: serobe dodrantali, interual-
lis duorum pedum seritur leuiter quater anno. Nimis morosa nasci. Virg.

Pars autem postio surgunt de semine, vt alta

Castanea, nemorumq; Ioui quæ maxima frondet

Æsculus, atq; habita Grauis oracula quercus.

Materies.

Æsculus casura triennio serior, nimis morosa nasci. Hoc pedamentum mi-
nimè putrescit, latumq; maximè fructat. Humoris impatiens. Hæc Plinius.
Sed Vitruuius. Æsculus verò quod est omnibus principiis temperata, habet in æ-
dificiis magnas utilitates, sed ea quum in humore collocatur, recipiens penitus
per foramina liquorem, eiecto aëre & igni, operatione humida potestatis vi-
tiatur. Palladius in fundamentis sine vitio durare dixit.

De Haliphlæo. CAP. X.

INTER quinaroboris genera haliphlæum annumerant Idæi, auctore
Theophrasto.

Nomen.

Cui ἀλφλοῖος, & εὐφλοῖος dicitur, ἀλφλοῖος ab ἀλῆς & φλοῖος, quasi crassicorti-
cem dicas. Theodorus falsicorticem vertit. & εὐφλοῖος quasi recticorticem.
Latinis, vt Plinio, haliphlæos dicitur.

Genera.

Duo videtur habere genera ex Theophrasto, quum dicat, quòd ambo, id
est, fagus, & falsicortex in genere virili glandes postrema parte vtrinque lapide-
scunt, aliis in putamine, aliis in carne ipsa, ideoq; detractis lapillis, concava per-
inde, atq; in animalibus relinquuntur.

Descriptio.

Theophrastus ita describit. Crassissimus huic caudex, & plerumq; cauus,
aut fistulosus magna ex parte cernitur. Ædificiis damnatur, breui putrescit,
quod ex arboris natura euenit, concava inanisq; redditur. Sunt qui corde hæc
volunt carere. Fulmine frequenter icitur, quamuis altitudine non excellat, a-
deò neq; ad sacrificia vti fas erat apud Æoles. Panum etiam producit, sed ni-
gricans, pusillum que, ideo in glandium censu quartum ei gradum tribuunt.
In genere virili postrema parte lapidescit, vt diximus. Materies ædificiis inuti-
lis, nec non carboni. Item ad axes, & ad eiusmodi similia utilis est. A quo Pl-
nius. Pessima & carboni, & materię haliphlæos, cui crassissimus cortex, atq;
caudex, & plerumque cauus fungosusque, nec alia putrescit ex hoc genere,
quum viuic. quin & fulmine sæpissime icitur, quamuis altitudine non excel-
lat, ideo ligno eius nec ad sacrificia vti fas habetur. Eidem raro glans, & quum
tulit amara, quam præter sues nullum attingat animal, ac ne ea quidem, si
aliud pabulum habeant. Sed postrema verba; Glans rara, & quum tulit ama-
ra, quam præter sues nullum animal attingat, & ne ea quidem si aliud pabu-
lum habeant, non recte Plinius haliphlæo ascribit, quæ Theophrastus aspri-
di, id est, Macedonica cerro tribuerat.

Materies.

Cæditur eo tempore, quo robur, id est, hyeme post autumnum, ex Theo-
phrasto.

De

EST & aliud glandiferæ arboris genus, farnum vocant, cuius Latini non meminere, quod sciam.

Latini farnus, Itali *farno*, Neapolitani *fargna*.

Nomen.

Arbor brevis, & in orbem comosa, ramorum alis crebro caua, glandem maximam, & dulcissimam affert, omnium glandiferarum præcocißimam. Initio Octobris cadit. Suum carnem pinguem, & leuem reddit. quum ipsa cadere desit, aliæ incipiunt. Folio maiori, quàm quercus, sed cacumine retusiori, nec tam profundioribus crenis cauo. Trunco aspero, & hiulco. Glandes multas, & simul congestas affert. Scinditur in laminas ad tectorum & tuguriorum operimenta. Altera eius species serior est, nam quum aliæ cessant, ipsa parere incipit. Vocant *verdesca*. Glans mediocriter magna, & dulcis.

Descriptio.

De Latinorum fago, siue Theophrasti oxy.

INTER glandiferas arbores Latinorum fagus annumeratur, & si eius fructus parum, aut nil glandi similis sit, ut inter cognatas potius, quàm eiusdè generis arbores connumeretur. Plinius. Sylvarum certè distinguebatur insignibus, Fagutali Ioui etiam nunc, ubi lucus fageus fuit. Plutarchus in Symposio ait. Vipera fagi ramulo tacta, confestim obstupescit. Macrobius inter felices arbores fagum annumerat.

Theophrasto *ὄζυον*, vel *ὄζυν* dicitur. Lydis *μύρι*. Theodorus scissimam vertit, quasi in laminas sectilem. Latini fagum vocant. Itali *fagio*.

Scissima nullas penitus differentias habet, sed genere simplex. Plinius cædendam notauit, & rufam, & pro generum differentia folia longiora, breuioraq;.

Genera.

Surgit arbor recta, læuis, & enodis, proceritate crassitudineque ferè par abieti, & in cæteris non absimilis. Materie colorata, robusta, neruosa, cortice læui. Folio crasso bifido, longiore quàm pyro, per extrema aculeato. Fructus glandea effigie, læuis, includitur caliculo echinato quidem, sed placido, & blando, nec ut castanea hispido, similis tamen illi dulcedine & succo. Radices nec multas, nec altas agit, sed summotenus sparsas. Nascitur in montibus candida materie, quæ ad multa perutilis est, quippe ad carpentaria, lectos, subellia, mensas, & nauigia. Campestris nigra, ad hæc minus expetita. Fructus utrique similis. Macedones sylæstrem scissimam non florere existimant. Plinius de sua fago hæc habet. Fagi glans nucleis similis, triangula cute includitur. Folium tenue, ac leuissimum, populo simile, celerrime fluuescens, & media parte plerumq; gignens supernè paruulam baccâ viridem, cacumine aculeatam. Fagi glans muribus gratissima est, & ideo animalis eius vnâ prouentus, glîres quoq; saginat. Expetitur & turdis. Arborum fertilitas omnium ferè alternat, sed maxime fagi. Glans fagea suam hilarem facit, carnem coquibilem ac leuem, & vtilem stomacho. Glans dulcissima omnium fagi, ut qua

Descriptio.

obfessos etiam homines durasse in oppido Chio, tradat Cornelius Alexander. Apud nos visenda magnitudinis exurgit arbor, fronde alni, glande triquetra, pusilla, acuminata, vnde *εξυα* Theophrasto nominata videtur. Flore ex pluribus foliolis conglobato, herbacei coloris, longiusculo. Ligno quàm robur minus robusto, compactoque, cuius nucleus pro esca, & oleoso condimento à pauperibus expetitur.

Locus.

Lydi in suo monte Olympo copiosum habent, Strabone & Eustathio auctoribus. Prouenire in agro Latino solitam auctor est Theophrastus, tanta longitudine, ut nauibus Hetruscis pro carina satisfaceret. Plinius in plana descendere ait. Nos in frigidissimis montibus, & conuallibus in Surrentino tractu altissima fageta vidimus.

Materies.

Humidissimam esse tradit Theophrastus, quam obrem è duabus iis lectuli qui fierent, incuruatur cedentes ponderi. Minoribus nauibus commendatur ad carinas, ite ad testudinè plaustrorum, ve tabulorumq; vilem fabrica. Cædenda materies post messem, & exitu vindemiari. In aquis durat incorrupta, madefactaq; firmior redditur. Plinius. Scadula è fago, & cortex in magno usu agrestiu, vasa corbesq; ac patentiora quedam mellibus conuehendis, vindemiisq; faciunt, atq; prætexta tuguriorum. Scribit in recenti ad duces explorator, indicens literas à succo. Nec non in quodam usu sacroru religiofus est fagi cortex. Pectines quoq; transuersi in pulpa apud antiquos factitabantur, inde & vasis honos. In pretio habitata est ad sacrificum guttum: Marcus Curius iuravit, se ex præda nihil attigisse præter guttum faginum, quo sacrificaret. Lignum in longitudine fluctuatur, at quæ pars fuerit ab radice validius fident. Non improbat & fagus in aqua, hæc quidem in his, quæ defodiuntur, principalis. Facilis & fagus quamquam fragilis, & tenera. Eadem scetilibus laminis in tenui flexilis, capsisq; ac scriniis sola utilis. Vitruuius de fago eadem dicit, quæ de cerro, & subere supra retulimus. Fagus in sicco utilis, in humore corrumpitur ex Palladio. Claudianus de usu in nauibus.

Sic qui vecturus longinqua per æquora merces

Obiectare parat, fagos metitur, & alnos.

Pocula etiam è fago antiquitus fiebant, ut & temporibus nostris. Virgilius,

Pocula ponam

Fagina, calatum diuini opus Alcimedontis.

De Siliqua. CAP. XIII.

IAM ad alteram syluæ partem deuentum est, scilicet pomiferam. Nemora conuenientissimum esse, tradit Columella, uestiantur quercu, fago, cerris, ilicibus, oleastris, tamaricibus, corylis, pomiferisq; syluestribus, ut sunt albæ spinæ, græcæ siliquæ, iuniperus, lotos, pinus, cornus, arbutus, prunus, paliurus, atq; achrades pyri. Vinum ex ea fieri docet Plinius. Nos ab iis incipiemus, quæ æterna cæsarie decorantur.

Nomen.

Græcis *κεραυία* est, *κερα* enim cornu dicitur, *κεραίων* cornicula, quod siliqua

quæ seu vaginæ cornu formam incurvam arcus instar præferant. Galenus *κεραυνίαν* arbore, *κεραυνόν* fructū dicit, & post eū Paulus. Hippocrates *δρύνειος*, recētiōres Græci *εὐλοκίαν*. Theophrastus hanc siliquam, vt Iones, *κεραυνίαν* nominat, & *συκὴν αἰγυπίαν*, sed errāter, nulla enim in Ægypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum Rhodumque. Varro siliculam vocat. Columella siliquam græcam, & addidit græcam, vt à fœno græco distingueret, nam absolute siliqua dicitur. Plinius siliquam, & syriacam. Arabes caraba. Ob id Itali ex his nominibus desectunt eorum vernacula nomina, alij enim *carobole*, *Caietæ seleccole*, à siliculis.

Descriptio.

- 10 Theophrastus ita suam Ægyptiam ficum describit. Caudice maxima ex parte suum fructum producit, ramis enim paucum fert. Foliis semper comantibus, flore candido, & grauissimè olente, leniter radice sublimi, atque omnino plantigera imis partibus, superius tamen subarescens. Fructum anniculum simul, & nouum habet, altero nanque detracto post Canis ortum, protinus alterum gigni patescit: gignitur enim vix modo indiscretus, atque vniformis, auctus circa Arcturum & æquinoctium floret, dehinc hyeme exacta durat vsque ad Canis ortum. Ab eo Plinius. Similis his siliqua, quam Iones *cerauniam* vocant, trunco & ipsa fertilis, sed poma siliquæ. Ob id quidam Ægyptiam ficum dixere, errore manifesto. Non enim in Ægypto nascitur, sed in Syria, Ioniaque, & circa Cnidum, atque in Rhodo, semper comantibus foliis, flore candido cum vehementia odoris, plantigera imis partibus, & ideo superficie flauescens, succum auferente sobole. Pomo antecedentis anni circa Canis ortum detracto, statim alterum parit, postea florem per Arcturum hyeme fœtus enutrit. Alibi verò de vulgari nostra siliqua loquens, oblitus eorum quæ scripserat: Alia siliquis gignuntur ipsis dulcibus, semenque cõplexis amarum, quum in pluribus semina placeant, in siliqua dammentur. In siliquis quod manditur, quid nisi lignum est? Non omittenda seminis earum proprietate: nam neque corpus, nec lignum, nec cartilago dici potest, neque aliud nomen inueniat. Haud procul à castaneis abesse videantur & prædulces siliquæ, nisi quod in iis cortex ipse manditur. Digitorum hominis longitudo illis & interim falcata, pollicari latitudine. Strabo de arboribus India loquens ex Aristoboli autoritate, dicit arborem esse non magnam, neque magnas siliquas habentem, vt faba, denorum digitorum longitudine, mellis plenas, quas qui ederint, non facile euadant. Arbor apud nos procera exurgit, ramis in latitudinem potius, quàm in longitudinem diffusis, corticis colore albo fusco, folio fraxini duriore, rariore, ac magis circinato. Frondes enim pari intervallo exoriuntur, ternæ aut quaternæ, quæ in cacumine est, parem numerum conturbat, pediculo palmari longitudine, flore surculoso, floret astate vsque ad hyemem, vel appetente vere: fructificat astate, vel autumno ex trunco à radicibus paulò distanti: truncus siliquis totus operitur, sic & maiores rami, minores parum, aut nihil. Radice sublimi, vt vento sapius deturbetur.

Celum. Palladius loca maritima, calida, sicca, & cāpestria amare dixit, tamē, vt ipse ex-
pertus est, in locis calidis fœcundior fiet, si adiuuetur humore. Caietę maximē
pubet, & in Surrētino tractu. In frigidissimis nō viuit, in frigidis vsq; ad florem.

Solum. Siccum solum amare nobis videtur, & callosum.

Satio. Columella ab idibus Februarij vsq; in æquinoctiū vernum rectē feri putat.
Plinius: siliquas Græcas per autumnum ante brumam. Palladius, Februario &
Nouembri femine, & plātis, & si adiuuetur humore, potest & taleis poni. Scro-
bem desiderat largiorem. Beritius vt oleæ plantat, humidis tamen locis à no-
na Calendarum Ianuarij die, vsque ad quartam Calendarum Februarij.

Institio. Palladius inseri posse mense Februario credit in pruno, vel amygdalo, & o-
mnes fructus recipere posse. In versibus.

Assuescunt siliquæ viridi mollescere succo,

Et gremio pascunt cetera poma suo.

Nos supra terebinthum inseruimus, & optimē apprehendit, & profecit.

Coditura. Siliquæ seruantur diutissime: si extendantur in cratibus, ex Palladio.

De Arbuto. CAP. XIII.

PV BET etiam in syluis æterna fronde arbutus. Virgilius in syluis nasci re-
statur:

— cum iam glandes, atque arbuta sacra

Deficerent sylua.

In Ecloga. *Dant arbuta sylua.*

Est & arbor hœdis fronde expetita, vt idem.

Dulce satis humor, depulsis arbutus herbis.

Fructu etiam delectantur merula, turdi, alia q; aues, vbi fructus hyeme ma-
turi sunt, & alij defunt, vnde visco, retibus, alijsve decipulis capiuntur.

Nomen. A Theophrasto κόμαρος dicitur arbutus, & νηλέα, & fruct⁹ οἶναρος. Immo sunt,
qui diuersum esse dicant apud Theophrastū vnedomem & arbutum. Inquit in
primo. Defluo cortice sunt vnedom, & arbutus. Plinius id considerans ait. Duo-
bus nominibus vocant Græci, comaron & memecylon, ex quo apparet toti-
dem esse genera & apud nos: alio nomine arbutus vocatur. Et alibi. Arbutus, 30
siue vnedom. Dioscoridi arbos κόμαρος, fructus verò μαιάνθος dicitur. Galenus
verò & Paulus fructum epimelidis vnedomem vocant, non arbuti, quasi me-
spili, nam Dioscoridis ἄμυελος; mespili genus dicitur. Is nanq; sexto simplicium
plantarum, ἄμυελος; inquit, acerbæ planta est, vt dicere possis, sylvestris malus:
appellatur autem à multis in Italia οἶνεδον, cuius fructus acerbus. Vnde vnedom
fructus epimelidis, memecylon arbuti. Inde secundo de alimentis, comaron
vocat, cuius fructus memecylon. Plinius quatuor nominibus vocat, comaron,
arbutum, vnedomem, & memecylon. Virgilius arbutū pro fructu neutro ge-
nere dicit, arborem fœminino. Horatius fructum fœminino. Virgilius.

— dant arbuta sylua,

Et vos rana viridis tegit arbutus umbra.

Horatius.

Horatius.

Pamphilus a
cant, alij om
neris, omnino p
pimelides, vt M
tia, flore cādidi
nia commista. I
tani sorbo pels
ita describit
cem tenuem t
mense Iulio. F
similes baccis
vertice, quē d
rir in pedicul
anno integro
contingat. Fo
stero affidue g
non potest. Di
fructus pruni
uet, aut ruber

Ven
Gla
Plinius. Al
ni, quod solum
ctus anno ma
in honorem, v
est, quinquag
dius fructus r

30
Apud nos
teris arborib
rantibus, ali
Mas sit ar
Frigoti re
ladius amar
Æschylides
ne nucleos, g
Palladius
autē Februar

Horatius. *Impanētutum per nemus arbutos*

Quarunt latentes.

Pamphilus apomelida pyri genus arbitratur, quod amamelida quidam vocant, alij omomelida, frequentem in Ionia, & biferam, fructu pyri, sed sui generis, omnino prædulci, & sine nucleis, ac prælato pyris. Hipomelides, siue epimelides, ut Martialis asserit, poma fert sorbo similia, mediocri arbore nascentia, flore cædidulo: sapor ex acri dulcis, ita ut fructui insit dulcedo cum acrimonia commista. Latini arbutum, & vnedonem vocant. Itali *corbezolo*, Neapolitani *sorbo pelofo*.

10 Ita describit Theophrastus. Arbor magnitudine non nimium præstat, corticem tenuem tamarici similem habet, folium inter ilicem, & laurum. Floret mense Iulio. Flores singulari appendice parte postrema racematim coherent, similes baccis longioribus myrti, non foliati, sed concavi, seu ovum pertuso vertice, quæ deflorescit, parte, qua sunt annexi, perforantur, & quod deflorescit in pediculum relabendo, verticilli instar circa fusum tenue apparet. Fructus anno integro maturefcit, ut simul hunc haberi, atque alterum flore sponderi contingat. Folia inferiora dimittit, cacumine perpetuò viret, ramisq; præposito assiduè gignit. Quia fructus humidus, ideo frigoris excessu concoqui non potest. Dioscorides. Arbor cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio, cuius
20 fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo. Maturus autem flavet, aut rubescit, in esu acetosus. Virgilius hyeme suos fructus maturare dixit.

Venit hyems, teritur Sicyonia bacca trapeis,

Glande sues lati redeunt, dant arbuta sylva.

Plinius. Aliud corpus est terrestribus fragis, aliud congenerie eorum vnedoni, quod solum pomum simile fructui terræ gignitur. Arbor ipsa fruticosa. Fructus anno maturefcit, pariterq; floret subnascens, & prior coquitur. Pomum inhonotum, ut cui nomen ex argumento sit vnum tantum edendi. Iuba author est, quinquagenum cubitorum altitudine in Arabia esse. Cortex ei cadit. Ouidius fructus ruboris meminit.

30 ————— *pomoq; onerata rubenti*

Arbutus.

Apud nos hyeme fructu superbit, coccineo aspectu micanti, numerofo, cæteris arboribus tunc suis privatis, acetosis conflato partibus, ac guttur exasperantibus, alioquin alio tempore respueretur: flore luteolo.

Mas sit an femina sterilis inter authores non convenit, inquit Plinius.

Frigori resistere posse dixit Theophrastus. In Arabia Plinius nasci dixit. Palladius amare loca tepida, aprica, maritima, & statum rigidum reformidare. Æschyllides in Ceo insula provenire fructus, quos vocant amamalidas, sine nucleo, grati saporis. Sed terram qualemcunque non respuere.

40 Palladius ex Martiale mense Decembri ferri nucleis in vasculis positis. Mense autem Febuario hypomelidis plâta, sed pollicis magnitudine robusta transfertur

Descriptio.

Genera.

Celum.

Solum.

breuissimo scrobe, soluta terra, plurimo stercore. Sed munienda est, quia cito arefcit, si radices eius ventus afflauerit. Apud nos in syluis nascuntur, hominum artem & opera aspernantur, solo naturæ genio contentæ, quas si colueris deteriores euadunt, & interdum moriuntur. Arbutus, ex Propertio, laborem omnem veretur.

Aspice quos summittat humus formosa colores,

Et veniant hedera sponte sua melius:

Surgat & in solis formosus arbutus antris.

Institio.

Inferi non posse dixit Palladius. Sed in versibus de nuce idem sic scribit.

Arbuteas frondes vastæ nucis occupat umbra,

Pomaq; sub duplici cortice tuta refert.

Inferitur verò ex foetu nucis arbutus horrida.

Materies.

Idem confirmauit Diophanes iniquiens: Nux in arbutum solum inferitur. Carbones optimos spississimæ materies faciunt, ut arbutus, ita ut diuturniores, efficacioresque sint. Qua de causa in metallis argenteis hisce ad decorationem primam vtuntur.

Conditum.

Poma eius aut in picatis, & munitis vrceolis, aut scobe populi, aut in ollis inter vuas vinaceis obruta seruabuntur. Ex Palladio.

De Loto arbore. CAP. XV.

QUONIAM & in syluis lotus arbor, Columella autoritate pubet, nos & de ea inter syluestres bacciferas arbores conscribemus. A Macrobio inter felices arbores numerata est. Ferunt nympham sui nominis in hanc arborem conuersam, quam Priapus fugientem comprimere conquisisset, nomen dedisse. Ouidius.

Haud procul à stagno Tyrios imitata colores,

In spem baccarum florebat aquatica lotos,

Lotus in hanc nymphe fugiens obscena Priapi,

Contulerat versos seruatò nomine vultus.

Loti arboris fructus Homerus, princeps vatū, suis carminibus nobilitauit, quum missis exploratoribus, qui incolas eius terræ discerent, reditu illorū destitueretur Vlysses, maluerunt enim apud Lotophagos remanere, ut mellitum arboris fructum comederent, quàm in patriam redire, ut penitus reditus obliuiscerentur.

Nomen.

Græcis λωτός δένδρον, lotus arbor, nam & herbae sunt hoc nomine complures. Græcorum vulgus anacacabeam arborem, & anacacabon fructum dicit, author est Aëtius. Latinis verò faba græca dicitur, & ob id ita dici putauerim, quod fructus tuberculo fabæ similis sit, & sui dulcedine in cibis placeat. Seruius fabam Syriacam dici autumat à nymphe sui nominis in hanc arbore versa, ut diximus. Padi incolæ fabam græcam vocant. Afri celtim, Neapolitani melosiocco, Zafaracchio.

Suam

Suam lotum
aut paulò infra
tudo fabæ pom
Nascitur in ram
Lotophagos in
runt, quæ eo sub
est, qui in alre
narratur, vt ex
dru pauerit. No
dice firmo, ac fi
liculari, & cuti
quod ex eo cor
re statim acor
A quo Plinius
gnit, quam vo
breuem trada
do fructui fab
Nascitur denle
vinomen etia
patræ. Ferunt
teriore nucleo
illi, simile mul
contulas cum
mus, vltro citr
ca, quam Rom
tura, loton ap
caudice, latill
Nulli opacita
tex iucundio
jo aut plures, v
dā vrbibus. P
ccccxix,
vetustiores
circiter an
capillata di
rūm altera
mis, æqua
vique Cæsa
vrbis a de co
rum xuo, a
ille arboris

Suam lotum ita depingit Theophrastus. Lotus pyri magnitudine surgit, aut paulò infra. Incisuræ in folio crebriores, alioquin ilicis viderentur. Amplitudo fabæ pomò, color croci, sed ante maturitatem alius, atq; alius sicut in uvis. Nascitur in ramis densum myrti modo, inter sese aduersum. Manditur inter Lotophagos innocua dulcedine suauitateque, nec ventris sentire morbos ferunt, qui eo subinde vescantur: iucundius, meliusq; quod sine interiori nucleo est, qui in altero genere osseus videtur. Tanta verò fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli Carthaginem petentis in com meatuum defectu pauperit. Non desunt qui fruticosam, ramosamq; arborem esse dicant, caudice firmo, ac fideli, fructu qui nuce obducitur, foris minimè carnosò, sed pelliculari, & cuticulaceo, nec cibo tam dulci, quàm gustu aliàs iucundo. Vinum quod ex eo conficitur, ultra binos, ternosve dies negant durare, à quo tempore statim acorem contrahit: suauioreni itaq; fructu apud Lotophagos haberi. A quo Plinius. Eadem Africa, quæ vergit ad nos, insignem arborem lotongignit, quam vocant celtin. Magnitudo quæ pyro, quanquam Nepos Cornelius breuem tradat. Incisuræ folio crebriores, alioquin ilicis viderentur. Magnitudo fructui fabæ, color croci, sed ante maturitatem alius, atq; alius, sicut in uvis. Nascitur densus in ramis myrti modo, non ut in Italia cerasi: tam dulci cibi, ut nomen etiam genti terræq; dederit, nimis hospitali aduenarum obliuione patriæ. Ferunt ventris non sentire morbos, qui eum mandunt. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere osseus videtur. Vinum quod exprimitur illi, simile mulso, quod ultra denos dies negat durare idem Nepos, baccasque contusas cum alica ad cibos doliis condi. Quin & exercitus pastos eo accepimus, ultro citroq; com meatantes per Africam. Alibi verò. Lotos siue faba Græca, quam Romæ à suauitate fructus syluestris quidem, sed cerasorum penè natura, loton appellant. Præcipuè domibus expetitur ramorum petulantia, breui caudice, latissima expatiantiu vmbra, & in vicinas domos sæpè transilientium. Nulli opacitas breuior, nec aufert Solè hyeme, decidentibus foliis. Nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandius. Nulli rami longiores, validioresq; aut plures, ut dixisse totidem arbores liceat. Viuax arbor, & æquæua quibusdā vrbibus. Romæ verò lotos in Lucinæ area, anno qui fuit sine magistratibus ccc lxxix, vrbis æde condita, incertum ipsa quanto vetustior. Esse quidem vetustiore non est dubium, quum ab eo luco Lucina nominetur. Hæc nunc circiter annum ccc cl habet. Antiquior illa est, sed incerta eius ætas, quæ capillata dicitur, quoniam Vestalium virginum capillus ad eam defertur. Verum altera lotos in Vulcanali, quod Romulus constituit ex victoria de decumis, æquæua vrbis intelligitur, ut author est Massurius. Radices eius in forum vsque Cæsaris per stationes municipiorum penetrant. Durauit, ut fertur, ab vrbis æde condita (incertum quantum ipsa fuerit vetustior) longissimo arborum æuo, ad Neronis incendia, adhuc iuuenis viridisque, victura, nisi princeps ille arboris mortem accelerasset. Sunt, qui breuem tradant arborem, ut Poly-

buius, qui & vidisse se testatur, spinis asperam, folio virenti, quale rhamno, tantum profundiore latioreq; fructu, candida myrti per initia, processu puniceo, magnitudine oliua, sed rotundo. Eum cibo familia tundi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditū, eundem nucleum herilibus mensis eximi. Saporē fici, & fanticobalani inesse pomo, sed præstantiori odore. Vinum & acetum inde fieri. Dioscoridi lotus magnitudine iustæ arboris adolefcit, fructu maiore, quàm piperis, dulci, graueolente, qui edendo fit, & vtilis stomacho.

Genera. Genera eius plura, dicit Theophrastus, fructibus inter se discreta produntur. Vnum est genus sine interiori nucleo, & vinum eo exprimitur. Plinius. Differentia plures, eaq; maximè fructibus sunt. Melior sine interiori nucleo, qui in altero genere ossis videtur. Vinum quoq; exprimitur illi.

Calum. In Africa celtis plurima, optimaq; gignitur. Est in insula Lotophagia Phari-de vocata larga copia, cæterum non minor in continenti, sed longè latior est, plurima enim hæc omnino in Africa. Plinius à Theophrasto. Africa parte, qua vergit ad nos, loton gignit, & ipsam Italiæ familiarem. Præcipue circa Syrtis, atq; Nasamonas.

Materia. Materia Cyrenaica præfertur, nam tractum Lotophagorum feruidiorem confirmat. Radici nigritia maior, quàm ligno, sed minus spissa, & ad pauciora cōmodior, quippe quum tantū ad pugiones, & glutinamenta vsui sit. Lignum tibiis, & aliis plerisque expetitur. Spissitate & gravitate, & coloris nigredine, post buxū & ebenum ei primatus indubie datur. Simulachra ex ea sculpere solent, rimas enim non capit, & carnis æqualitate quodāmodo constare videtur. Natura perpetua. Medullā habere loton, quā multi carere putant, constat argumēto, quòd ea valuarū sumptuosarū cardines facit arte solēt artifices. Propter nimia spissitatē enodis est, aut paucissimis nodis. Ab eo Plinius. Ligno collos niger, ad tibiatarū cantus expetitur. E radice cultellis capulos, breuesq; alios vsus excogitat. Post ebenū, & buxū durissima, & siccissima. Cariē & vetustatē non sentit. Cortice pelles tingūt, radice lanas. Tota ossæ est, & sine medulla.

De azadarat Arabum. CAP. XVI.

SÆPE monachorum claustris, & templorum vestibulo visitur hæc arbor, 3
sea Cisalpinæ Galliæ nemora abundare vidimus, lenem & perpulchram
vmbra parit, & flores odoratos.

Nomen. Auicenna eam appellat azadarat. Hispani ex florum, foliorumq; speciositate arborem paradisi vocant. Apud nos innominata viuunt. Sunt qui albam zipham velint.

Descriptio. Arbor spatiosa surgit, folio fraxini, cortice subuiridi, albis pūctulis cōsperso, rami fragiles, baccas profert oleæ, vel cerasi magnitudine, vt ex eis globulos faciant, quibus mulieres & monachi suas numerent preces, fructus loti arboris instar, flore suaueolente racematim congesto, stellato, purpureoq;.

Calum. Cælum calidum, vel temperatum diligit, rigidum horret.

Seritur semine, quatuor digitis in terra conditur; rigetur sapius, & nasci-

pur initio veris.
dicibus pullulat
vt solum cacu
Poma multa
ne non finditur

DICEMUS
historia, v
nem, & affinitat
distat intervall
cus vrbana dica
syluestrib' ma
tamē neq; cap
Sed si vñ ex
haberēt, tanq
us, Prodigio h
mutantur. Ca
tū mirabili nat
& eius rei cau
perulantia fib
mine taurum
Visitur sapiu
Varrone non
cupata, quib
adhibebant o
peruallit, vt p
ipsa cum ane
tentia, quum
conuiuiumq
30 post iocos q
menibus p
que cadunt
lunoni, qua

Bubula
quāt, ex P
noxius. ex
Gra
40 lia, vel vt
placet. Alii

tur initio vetis. A bimatu transplantetur. Seritur etiam sobole, ex iis, quæ radicibus pullulant. Seritur etiam trunco, dummodo omnis terra abscondatur, ut solum cacumen super sit, veris initio, etsi agrè concipiat.

Poma multa recipit in infusione, odorataq; reddit, ut pyra, sed in oculatione non finditur lignum, quia fragile, & fissura ultra quàm velles descendit.

De Caprifico. CAP. XVII.

DICEMVS de ficu in pomario, hic de caprifico, etsi in aliarum arborum historia, ubi de sativa, eodè capite & de sylvestri dixerimus ob cognationem, & affinitatem quandã, quæ erat inter utrâq;: at ficus, & caprificus longo distât intervallo, euidentissimamq; & summã differentiam habent, ut sativa ficus urbana dicatur, caprificus sylvestris. Theophrastus dux erit. Et si multa ex sylvestribus mansuescât cultu, & alia ex urbanis transcât in sylvestres neglectu, tamè neq; caprificus, neq; oleaster, & pyrafter, ficus, olea, pyrus fieri possunt. Sed si vnq; ex caprifico ficus, aut ex ficu caprificus fieret, aruspices pro ostento haberet, tanq; prodigia, & præter Naturæ normã accidere arbitrantur. Plinius, Prodigio sunt fici ex caprifico, & contra, graui ostento, quum in deteriora mutantur. Caprificus tauros quamlibet feroces collo eorû circumdata in tantû mirabili natura compescit, ut immobiles præstet. Plutarchus de fico refert, & eius rei causam affert, ut videbimus. Vnde Egyptii quum hominem à priori petulantia sibi modestius consulentem ostendere vellent, pro istiusmodi homine taurum caprifico collum, caput, & armos vestientem proponebant. Visitur sæpissimè caprifici ramus Iunonis simulacro suspensus, cuius causam ex Varrone non reticebimus, quod non æ apud Romanos erant Caprotinæ nuncupatæ, quibus matronæ sub ficu Iunoni sacra faciebant, & ex caprifico virgã adhibebant ob memoriam seruatæ pudicitia. Philotis enim ancilla senatui persuasit, ut pro matronis, & virginibus, quas hostes dari sibi obsides petebat, ipsa cum ancillis aliis habitu matronali cultis submitteretur, cuius laudata sententia, quum omnes hæ secum potiones meracas in læritiæ signû attulissent, conuiuium quæ simulassent, hostes lætabundi, comestatione & potu grauidi post iocos quicquid se dederunt. Hic Philotis signum dedit ex caprifico, quæ de mœnibus propendebat. Romani exciti impetum in dormientes faciunt, eosque cædunt, potitiqu; victoria sacrum instituere, ut ancilla matronis æquatæ, Iunoni, quam à caprifico Caprotinam appellauère, sacrificarèt. Ad id Ouidius.

Porrige & ancilla, qua pœnas luce pependit

Lusa marit ali gallica veste manus.

Bubulas etiã carnes additi caules caprifici magno lignorû compendio conquiunt, ex Plinio. Contra autè chamæleon circa caprificos ferus, alioquin innoxius, ex eodè. Tanta est differens erga diuersa animalia vnus plantæ virtus.

Græci vocant *εαυειον*, ut Pausanias ait in Messeniis, quòd in Erino Thesstia, vel ut alii volunt Achaia, municipio primùm apparuerit, ut Phocioni placet. Alii, ut Phauorinus, fici speciem ab Erino vrbe Dorica. Tzezes Lyco-

phronis interpres ficum fatuam vocat, nonnulli *ὀλῶσις*. Messenii *τράγον*, quod d' Apollo Aristomeni, & Theocli nati de salute consultantibus significauit, *τράγος* πίνῃσι νέδης ἐλικορρόον ὕδωρ, ἐκείν μιν ὁρμαί. Est Neda fluuius, cuius fontes in monte Lyceo visuntur, in Arcadiam fluens; eo oraculo tragus arbor caprificus, non hircus intelligitur, quæ in Neda ripa enata, in fluuium de flexa excreuit, vt foliis humorem quodammodo haurire videretur: hanc autē Theocles conspiciens, caprificū, capri nomine intelligere voluisse Apollinē, è Neda bibentē coniecit: quū itaq; iam Messeniis impenderet fatale malū, reliquos celauit, Aristomenē ad caprificū perduxit, & rē omnem aperuit, & sic interpretatus est oraculū: Ipse Nedes dum hircus bibat alta fluēta, nec vltā, Messenen seruo: Propē enim instant tristia fata. Hæc Pausanias in Messeniis. Latini caprificum à carpando dictam volunt, quod muros, ac parietes carpat. Martialis,

Marmora Messaba findit caprificus.

Plinius. Caprificus vocatur è syluestri genere ficus nunquam maturescens. *Italisco seluaggio.*

Genera.

A colore, & fructificatione generum discrimen sumit caprificus, nempe alba, & nigra. Theophrastus tradit caprificos potissimū laudari nigras, ob rationē, quod permulta hæ grana contineant. Eadē Plinius. Caprificorū laudantur maximē nigra, & in petrosis, quum frumenta plurima habeant. Aliud discrimen quod alia bifera, alia trifera est. Plinius, In Cea insula caprifici trifera sunt, primo særu sequens euocatur, sequenti tertius: hoc fici caprificantur. Athenæus scribit Theophrastum secundo libro plantarum notare, caprificum esse biferam, alii triferam sicut in Cea.

Descriptio.

E Theophrasto decerpitur descriptio. Viuacior fico, longeq; validior, spissior, fructu sæcundior existit. Eadem etiā nodosior. Earū lac minime coit, aut prauē. Etsi ex syluestribus, sæcunda tamen. Celerius germinare incipit, vt inculta. quia germinat ineunte vere. Neglecta nō putatur, non pastinatur, non ablaqueatur: idē non exhalat foras calor pastinatione & ablaqueatione, sed intus cohibetur, qui author est germinationis; & si putatione superioribus partibus allata fuerint plagæ, earum vulnere laborat arbor, friget contrahiturq;. Præterea in agrestibus remanent incolumes ramusculi pusilli, quos cultura auferre iubet, qui exiguitate eorum facile mutationem patiuntur, & ab ambiente aëre ad germinationum principia citantur. Accedit etiam siccitas: nam vbi humoris minus, operæ minus est. Plinius autem. Caprificus lactis minus habet, surculo quoq; eius lac coagulatur in caseum. Exceptum id, coctumq; in duritiā, suauitatem carnibus affert. Tristis est, quum non sentiat annorum gaudia, quia nullo flore exhilaratur.

Solum.

Theophrastus nemoribus gaudere dixit, & laudari ex locis ortas saxosis, ob rationem, quod permulta hæ grana contineant, & vbi plurimus sit puluis, ibi plurimæ, validissimæq; caprificus exeunt.

Satio.

E ficario grano sato prouenire tradidit Theophrastus.

Syluestris,

Syluestris, seu fera ficus, vt testatum reliquit Africanus, mansuescet, si rufis *Ars.*
& vino & oleo maceratis ramis, eo septem diebus irroraueris imbre.

Caprificus nullis ferè vitis obnoxia, vermiculationem nō patitur, lac enim *Infr. tem.*
eius acerbius est omnino. Neque radicationem, syderationem, vel scabiem,
neque radices vermiculantur, quādam nec suos grossos amittunt, etiam si fi-
co inferantur. Plinius etiam tradit, eam omnibus morbis immunem esse,
quos recensuit Theophrastus.

De malo sylvestri. CAP. XVIII.

N Vnc sylvestre malum attingemus, habet enim multa, quæ sine reli-
quorum confusione dici non poterant, ideo hīc digestissimus.

Græcis *ἀγριον* generale nomen est malorum in syluis degentium, quæ *Nomen.*
citra sationem & cultum proueniunt. Theocritus *ἰπριμανίδας*, id est montana
mala vocauit. Cato syluatica mala. Latinis malū sylvestre. Italis *melo seluaggio.*

Syluestria, vt plurimum nomine vacare Theophrastus dixit, quum perpau- *Genera.*
ci sint, qui eorum naturam experiantur. Nos & si inter se magnitudine, odo-
re, colore, & facie differant, inutile existimamus per genera recensere, no-
men tamen vnum syluestribus omnibus accommodabimus.

Theophrastus syluestria mala sui generis mitioribus odoratiora esse scri- *Descriptio.*
psit, ipsorumq; malorum tam agrestium, quā satiuorum, quæ sunt acerbis-
sima, suauissimè olere. Cuius rei suo de causis libro rationē affert. Atqui quum
odor coctura quadam cōtrahatur, quæ maximè cocta fuerint, ea melius ole-
re putandum est. Verū odoris ratio in coctione minus absoluta, quā saporis
versatur, argumento, quod mala, pyraque plus reddunt odoris, si in ple-
num cocta non sint: plus tamen sapiunt, quum perfectam assequantur con-
coctionem, quod in primis succorum mutationibus deprehendi non fuerit
difficile: nam quum flatilis quādam sit odoris conditio, excoctus iam succus
pauciorē halitum ac auram potest expirare, tum ergo minus odoris eiecta-
bitur, quum concoctu crassior exultat, dulcedinem verò sensui gratam vsur-
pabit. Sylvestre genus itaque priori concoctione contentum, vehementem
concepit odorem. Urbanum quod perfectiorem adipiscatur cocturam, ali-
mentoque saturetur, succos in dulcedinem vertit, sed odoris ignauiam ac he-
berudinem colligit. Porro non parum refert in odoribus, si siccitas, si alimen-
ti parsimonia, dissolutio commoda præcesserit, quandoquidem quæ siccaneis
erumpunt, pauciore contenta nutrimento; item quæ placido perflantur spiri-
tu, proculdubio nascuntur odoratiora: etenim humor sese largius immiscens,
odorem obrundit, & eius heberat acrimoniam, ideo quæ dilutis & opacis tra-
ctibus degunt, in odora percipiuntur. Cæterum genus syluestrium aridius cer-
nitur, ieiunior donatum habitu, nec silens à flatu, sed magis, atque magis au-
ræ patens, hinc feruentior natura, quæ prosperat, tenuiorq; succus, halitui faci-
le cedens, quum nec succum urbani modo carni permistum gerat: quæ qui-

dem omnia iuuant ad odorem efficiendum. Præterea syluestria mala maturius germinant mitibus, cuius spe in libro de causis affert rationem, quòd foris calor non exhalatur, sed intus cohibetur, non enim pastinantur, neque ablaqueantur, calor enim est germinationis author. Adde quòd vulneribus non laborant, non enim deputantur rami, aut decerpuntur fructus: de muni quòd incultis arboribus, & agrestibus ramusculi sint incolumes, in quibus propter exiguitatem, & facillè cidentur principia genitalia ab aëre ambiente, & facillè submouent materiam suam. Dioscorides hæc adstringentis esse succi dixit. Plinius, Sunt & mala parua, grati saporis, at enim acutiora odore syluestria. Id peculiare improbitatis & acerbis conuitium, & vis tanta, ut acie gladij perstringat. Præterea ipse Plinius syluestres malos etiam biferas esse dixit. Nos ita describemus. Poma affert multò vrbani minora, improba, & acerba, colore quum maturuerint luteo, succo aspero. A pharmacopœis expetuntur ad succos eliciendos.

De sorbo torminali. CAP. XIX.

PV BET etiam in syluis sorbi genus syluestre torminale dictum, fructusq; affert feris, admodum à satiuo nostro diuersum.

Nomen.

Plinius torminale vocat, remedio tantum probabile, quòd torminibus medeatur, ob id ad vsum medicum magis, quàm ad escam hominum natum. Neapolitani *ardicagna* vocant.

Descriptio.

Plinius ita describit. Minimo pomo, assidue duo prouentu, arbore à sorbo dissimili, foliis penè platani. Nos ita describimus. Surgit arbor non differens à nostrate sorbo magnitudine, & perceritate, cortice leui, materie valida, folio vitigineo siue platani, leui & neruoso, baccis oblongis, exiguis, sorbis similibus, in umbellâ coeuntibus, ex longis pediculis dependentibus, colore in nigro rufescentibus, sapore acido, & austero. Floret cū cæteris sorbis. Fructus maturat Nouēbri.

Locus.

Nascitur frigidis in locis, nemoribus, syluisque, prope Capuam vidimus.

Satio.

Seritur sobole, & semine.

Insitio.

Tubera optime recipit, inter alia & fructificat.

De Calabrice. CAP. XX.

NVNC æquum est nostræ calabricis meminisse, à Columella inter bacciferas connumeratæ, tum quod nostro pomatio, ob varios, quos recipit diuersorum arborum furculos, multiplicem præstat vtilitatem, tum quod suorum nominum varietate non minimam inter doctos parit ambiguitatē, quum à diuersis, & ab eisdem diuersè etiam nominetur.

Nomen.

Græcis *ὄξυδάκτυλος*, & *ὄξυδάκτυλον* dicitur, ab *ὄξυ* id est acuta, & *δάκτυλον* id est spina, quasi acutam spinam dicas. Columella albam spinam vocat. Nemora conuenienter vestiuntur pomiferis syluestribus, ut spina alba. Plinius spinam vocauit, siue syluestrem spinam, & calabricem: quū dixit, Tuberes inferi possunt in calabricem, ea est spina syluestris. sed ignorat esse Dioscoridis *ὄξυδάκτυλον*: nam quæ

quæ huic Dioscorides tribuit, ipse paliuro refert. Dicitur ab eo & spina appendix. Spina est appendix appellata, quoniâ bacca puniceo colore in ea appendices vocantur. Hæ crudæ per se, & aridæ in vino decoctæ aluum citam, ac tormina compescunt. Et spina nuptialis, vt coniicio. In eisdem sircus (id est montuosos, & frigidos) comitatur & spina nuptiarum facibus auspicatissima, quoniam inde fecerint pastores, qui rapuerunt Sabinas, vt auctor est Massurius. Ouidius in Fastis: quodd maleficiorum esset amuletum.

Ius pro concubitu nostro, tibi cardinis esto,

Hoc pretium posite virginittis habe.

Sic fatus spinam, qua tristes pellere posset

A foribus noxas (hæc erat alba) dedit.

Virgaq; lanalis de spina sumitur alba,

Qua lumen thalamis parua fenestra dabat.

Palladius spinam vocauit, quâ myxa in spinis inferi posse dixit, & quâ spinarum forbum recipere posse scripsit. Vocauit & calabricem, quâ tubera ab ea recipi iusserit. Hermolaus crespinum, Ruellius berberim, nos calabrice vocamus.

Theophrastus eius meminit. Arbor medica aculeos habet qualis acuta spina. Fructificat post Vergiliarum occasum. Dioscorides. Arbor est pyrastro similis, spinosa valdè & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum, radicem multifidam, altè descendente. Crebris diuisuris diffusa folia (vt capite de mespilo habet, quam nos aroniâ, huc *azaroli* vocamus) quæ apij effigiem imitatur. Nos autem dicimus *azacolo* vocato tam similis folio, & fructu, vt idem existimemus, non nisi feritate ab ea distans. Baccis racemopendulis, sine succo, flore albo, odorato. Ab occasu Vergiliarum fructifera. Fructus tora hyeme durans, myrto similis, sed cum nucleo intus, pendens longissimis pediculis. Rustici nostri ad sepimenta ruris ea vtuntur, ad quæ nulla aëne diuturnitate, spinarum hirsutie, firmitateq; magis valeat.

Solum arenosum, & solum quærit. Ex montibus in plana descendere dicit Theophrastus.

Seritur sobole ex his, quæ sponte in syluis nascuntur, & seminibus ex arbore deciduis, & post biennium transplantatis.

Plinius. Neq; omnia insita misceri fas est, sicut nec spinas inferi, quando fulgura expiari non queunt facillè, quorq; genera insita fuerunt, tot fulgura vno ictu pronunciantur. Alibi. Tuberes melius inferuntur in pruno syluestri, & malo coroneo, & in calabrice, ea est spina syluestris. Quæcunq; optimè & myxas recipit, vtiliter & sorbos. Palladius recipere ait forbū, & pyrum. De sorbo.

Hæc arbor spina duos mucronibus artus

Exiit, ac libris mitibus arma tegit.

De pomo, *Et steriles spinos, & inertem foetibus ornum*

Dotat, & ignotum cogit amare decus.

Sic etiâ myxa docet recipere Aprili mense, tuberes Septembri, malū Februatio:

nos cotoneum, mespilum, malum, & cerasum nō infelici successu inferuimus. Immo si sæpius suo furculo inferatur, tuberes proferre.

De Persea. CAP. XXI.

DE persea dicemus, & si peregrina arbor, & peregrinari nescia; ob nomen quod cum persico commune habet, de quo in pomario dicturi, multam doctis peperit ambiguitatem: ut quæ dicenda sunt, distincta videantur, de ea hic aliquid tractabimus. Plutarchus libro de Iside, & Osiride habet perseam Isidi fuisse sacram, quodd pomum eius cordis figuram, folium verò linguæ præ se ferret. Vnde Ægyptij quum pomū pingebant vno tantum folio adhærescente, significabant linguam cordi coniunctam. Arborem & Harpocrati dicarunt, quasi sermonem, qui fructus est intelligentiæ, sedem in corde, non in lingua habere deceat. Scribit Diodorus Siculus perseam in Æthiopia primum natam, mox à Persis deijcta Æthiopia, ad se delatam, apud quos erat venenata, & cum cruciati primum genita. Postea verò pœnarum causa à regibus in Ægyptum translata, terra hospitali mitigata. Ferunt autè Persas hanc arborem apud selathalem habentes, in Ægyptum transmississe, plurimos ab eo perituros credentes, quæ contrario euentu ab his in cibos recepta.

Nomen. Theophrasto *περσέα*, & *περσιον* dicitur, nomen est à vernaculo solo, nō quodd à Persæo Memphi fata sit, ut Plinius refert. Latinis persea, Italis incognita.

Descriptio. Arbor persea dicta, ex Theophrasto, magna, aspectu grato, folio, flore, & ramo, totaq; figura potissimum pyro vicina: nisi quodd huic caluescit coma, illi verò perpetua. Fructum semper parit, quippe nouus anniculum occupat. Maturitas Etesiarum afflatu: alio tempore crudiuscula decerpitur & reponitur. Magnitudo longioris pyri, amygdalæ putamine clauditur, & corio coloris herbidi. Nucem intus habet, ut prunum, sed minorem multo mollioremque. Suauitas carnis prædulcis, & innocua etiam largiorem mandentibus, concoctu & deiectu facilem, radice prægrandi, longitudine, latitudine, & copia. Alibi. Quædam igitur ne germinare quidem possunt locis quibusdam, quædam germinare quidem, sed fructum nullum parere queunt, ceu persea Ægyptia in Rhodo: & si per loca ita procedas, fructificare quidem eam comperies, sed paucissimè, nec alibi, quàm in Ægypto largè, suauiterque fructum progenerat. Alibi. Persica in Ægypto, & locis proximis fructificat, quamquam in Rhodo vsque ad florem duntaxat perueniat. Plinius ab eo. Ægyptus & persicam arborem sui generis habet, similem pyro folia retinentem. Fertilitas assidua ei, subnascente crastino fructu. Maturitas Etesiarum afflatu. Pomum longius pyro, inclusum amygdalæ putamine, & corio, colore herbido, sed ubi nux illi, huic pomum, differens breuitate, ac mollitie, & quamuis blandiatur prædulcis suauitas, innocuum. Sed Columella hallucinatus putat nostram vulgare persicum è Persia aduectum, & primò venenosum, nunc deinde mutata regione innocuum:

*Stipantur calathi & pomis, qua barbara Persis
Miserat (ut fama est) patriis armata venenis.
At nunc expositi paruo discrimine leti,
Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.*

Plinius eum redarguens ait. Persicæ arbores serò, & cū difficultate transire, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto earum fuerat hospitium. Falsum est, venenata cum cruciatu in Persis gigni, & pœnarum causa à regibus translata in Ægyptum, & terra mitigata. Id enim de perseæ diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, myxis rubentibus similis, nec extra orientem nasci voluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex Perside propter supplicia translata, sed à Perseo Memphi satam. Et ob id Alexandrum illa coronari victores ibi instituisse in honorem atati sui. Semper autem folia habet, & poma subnascentibus aliis. Galenus in Alexandria perseam se vidisse testatur, magnis arboribus cõparandam, cuius, ut tradunt, pomum in Perside tam præsentis est veneni, ut vespentes interimat. In Ægyptum verò translata, & peregrinata, poma ferre cibis idonea, turbinata pyri facie. Strabo, Persicus in Æthiopia, & Ægypto solum nascitur, arbor magna, fructu dulci, & grandi. Dioscorides. Perseæ arbor est in Ægypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vilem. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, 10 translatamq; in Ægyptum, mutata natura in cibum receptam.

Theophrastus de eius materie. Materies bonitate, firmitudine, nigritia quoque nil differens à loto. Simulacra ex ea factitauere, mensas, & reliqua eiusmodi. Plinius. Materies bonitate, firmitudine, nigritia quoque nil differens à loto. Simulacra ex ea factitauere, non eadem gratia quam fidei materie, ut ex arbore, quam balanum appellauimus, 10 magna ex parte contorta.

IOAN. BAPTISTAE
PORTÆ NEAPOLITANI
VILLAE
LIBER QVARTVS

SIVE
INSITIO ET CVLTVS.

PROOEMIUM.



HACTENVS de syluis, vbi quicquid, natura duce, genera-
batur, affatim prosequuti sumus, nunc autem quæ satio-
nis, cultus mangonio, humanæ vè gignantur ope, operæ
pretium est enarrare. Sed mirari vos nollem, quum in
superioribus libris nostrum potiarium ingredi per se pe-
sponderim, nunc in eius limine ianuam (vt ita dicam)
ob oculos clausèrim. Decentius nobis visum est ante po-
marij vestibulum fructiferas & nouas arbores percupi-
da videndi ingenia aliquantisper molestè morari, dum in vniuersum aliqua
paucis perstringendo loqueremur, quàm in singulorum priuatim capitibus
importuna inuasiōe eadem sæpius iterata præceptione legentium animos
vexare, nusquam alioquin opportuniorem locum nacturi in vniuersa agrico-
lationis historia. Nec sunt quæ hoc libro clausimus contemnenda, sed sanè
digna, admirabilia, & agriculturæ patrium nobilissima, scilicet de insitione, vt
arbores syluestri habitu exuta à sua natura desciscere, earumque domita feri-
tate in hortis nobiscum mansuescere cogantur, vt non solùm meliores fru-
ctus, nobilioresque, sed novos, ac prioribus sæculis non visos producant. Sed
iam negotium ipsum auspicemur.

Quot sint plantarum generationes. CAP. I.

DVO sunt in vniuersum agriculturæ munera, serere, & colere, sed quum
non habeat quis, quod colat, nisi prius seuerit, ideo prius satione, demum
cultum edocebimus. Plantarum sationes multifariae sunt, quas demonstrare
tentabimus: nam non omnes omnibus competunt, sed vnicuique natura suam
instituit peculiarem generationem. Aliæ enim tam miti humanoque ingenio
sunt, vt omnibus modis satæ nascantur, aliæ tam fero, agrestique, vt paucis,
vel vix vno contentæ. Hæc planta, illa trunco, alia ytraque natura fruitur, ita
vt si

IO
vt si qua vni co-
scendo remore
xima temporis.
Circa hoc opus
hibenda. Opti-
rantius nobilio-
tia nauant ope-
rum generatio-
plantas exorti
minuatim con-
Didymus semi-
te, semine, rad-
icis Theophr-
ne, aut succu-
mus, addente
ri reddatur sa-
electus sunt.
semine, & rad-
arletur, vel in
serimus aui-
mis sunt radice-
rimus enim pa-
culos vero vel
bus omnibus
te nascuntur.

PLANTA
Pneficio
minuta, cum

Theop
annua, her-
que planta

49 Quorum

ut si quæ uni conuenit, alteri tribues, & degeneres fructus habeas, & in crescendo remoreris; idemque esset ac cum natura luctari, & tandem cum maxima temporis, laboris, & impensarum iactura voti compos nunquam fies. Circa hoc opus, & labor, huic insistendum, huic animaduersio & cura est adhibenda. Optimi enim est agricolæ non solum plantas procreare, sed properrantius nobiliores fructus producere, præsertim qui huic studio utilitatis gratia nauant operam. Sed quid Græci, Latini que maiores nostri de variis plantarum generationibus, & modis senserint, indicemus. Theophrastus in historiis plantas exoriri spõte, semine, radice, auulsione, ramo, surculo, trunco, aut ligno minutatim conciso tradit. Et in Causis etiam lachrymis herbas nasci posse ait. Didymus semine, auulsione, talea, & ramo dixit. Virgilius in Georgicis sponte, semine, radice, auulsione, surculo, trunco, & propagine. Plinius etiam dictis Theophrasti excipiens, semine, plantæ radice, aut propagine, aut auulsione, aut surculo. Omnium diuisio manca est, nos ex omnibus vnā conflabimus, addentes ea, quæ recens ætas adinuenerit, ita ut apertè suis cuique arbori reddatur sationis modus. Plantarum generationes alia naturæ, alia artis, vel electus sunt. Arborea, quas naturæ debemus, tribus modis nascuntur, sponte, semine, & radice, reliquas hominum artificiosa industria debemus. Sed quas ars ferit, vel integra est planta, vel à matrice plantæ recisa pars. Integra parte
 20 ferimus auulsione, & propagine. Quæ plantarum partibus prorogantur primis, sunt radice, trunco, ramo, & surculo, secundariis verò folio, & lachryma. Serimus enim partium partes, & caulium incisiones, & truncorum cortices. Surculos verò vel in terram, vel in coniectum arboris truncum inferimus. De quibus omnibus suis capitibus singulatim cōscribemus, & primo de iis, quæ sponte nascuntur.

Sponte nascentium generationes. CAP. II.

PLANTARVM spontaneas generationes aggrediemur, quæ naturæ beneficium attributæ sunt: sine enim origine seminis pleræque plantæ tum
 30 minuta, tum maiores sponte conerescunt. Virgilius in Georgicis.

*Namq; alia nullis hominum cogentibus, ipsæ
 Sponte sua veniunt, camposq; & flumina late
 Curuarent, ut molle siler, lentaq; genista,
 Populus, & glan. canentia fronde salicta.*

Theophrastus ea facile exire existimauit, quæ minora sunt, & maximè quæ annua, herbaceæque; natura consistunt, & sterilia potius sponte creari, quæ neque planta, neque semine gigni existimantur. Virgilius etiam ab eo.

*Sponte sua quæ se tollunt in luminis auras,
 Infœcunda quidem, sed læta & fortia surgunt,
 Quippe solo natura subest.*

40 Quorum rationes, quum nobis occultissimæ sint, nō parum admirationis,

ac disquirendæ occasionis ingerunt. Quis enim non miretur, quum terra, quæ in antiquorum ædificiorum eruitur fundamentis, non centenū modo, sed millenū annorum, aëri exponitur, illico herbas producere? Præterea steriles herbas, semine carentes omnino, soli faciem & parietū continuo vestientes, quis seuit vnquam, vt variis in locis nascantur? Varias è natura interpretibus rationes Theophrastus refert, quas & nos referre nō pigebit. Semina, quæ spontè nascuntur, vel sensum nostrum latent, vel aperta sunt: quod ad ea, quæ nostrum sensum latent, Anaxagoras aërem semini principia habere dixit, quibus vnà cum imbre delatis gigni omnia asseueravit. Diogenes ex aqua putrescente, misturamq; cum terra capessente plantas nasci existimauit. Cleodemus ex iisdem non solum plantas, sed animalia constare putauit. Semina verò quorundam aperta sunt, vt quum amnis exundauerit, aut alueo egressus fuerit: vt in Abderensi agro tum fit, vt pars, quæ vacua remansit, syluecat. Imbres hoc idem faciunt, quum semina secum pleraq; deferant: & peculiarē syluam exortant prodiderunt, piceo imbre compluto: agrum Libycum quoq; causa quadam eiusmodi edidisse laserpitium ferunt. Amnium ergo colluiones, aquarumque eruptiones, tum arborum, tum minorum stirpium semina inuehunt, sed has herbas non esse inter spontaneas connumerandas censemus, sed furtiuo seminio suam ab aliis plantis originem habere. Imbres enim putredinem quandam aquæ, terræque committunt, nam & ipsa terræ Ægyptiæ mistura materiam quandam gignere videtur. Nonnusquam, modo subegeris mouerisq; solū, familiaria protinus illius terræ emergunt, vt in Creta iolula cupressi. In semina defactis segetibus, si submouentur, tribulum emergere aiunt. Igitur hæc quidem mutationem consequuntur telluris, siue seminibus præiacentibus, siue ipsa terra modo quodam affecta, præparataq; ad gignendū, humoribus simul interclusis, quorum vis magna est, siue proprietate aliqua in cælo, terræve consistente. Itaque quantū in vniuersum exprimi liceat generationes eiusmodi fieri necesse est, terra sufferuefacta, coactaq; humore admisto, commutatoq; ex solis ardore, quemadmodū & animalia generari videmus. Plinius quæ ab eo excepit habet. Nec terræ tantū natura circa has refert, aut perpetua cæli, verū & quadam temporaria vis. Imbres aliqua plerunq; semina afferunt, & certo fluunt genere, aliquando etiam incognito, quod accidit Cyrenaicæ regioni, quum primum ibi laserpitium natum est. A Theophrasto Varro. Semen, quod est principium oriendi, duplex est, vnum quod later nostrum sensum, alterū, quod apertū. Latet si sunt semina in aëre, vt ait Physicus Anaxagoras, & si aqua, qua influit in agrum inferre solet, vt scribit Theophrastus.

Quod omnia semine generentur. CAP. III.

GENERATIO, quæ semine sit omnium plantarum semē producentium communis est, illudq; à natura eis tributū est, vt sui cuiusq; ingenij semina ferat ad earum speciem propagandam, perpetuandamque, nam id & sensu

expe-

V
experitur, &
stus, nil vnquan
sima sunt, siue
non regenerare
ra, tanta cura, d
tutior gremio
brana, putamin
& intus ligno se
pugnaculis sit
malum iniuria
mo est, qui dice
semine poneb
Saturnum su
na iterum in t
debere docuit
repullulascere

A
Ip
A
Te
Demonstra
semen sub terr
arborem fruge
Pa
Ca
E
Sed aliqu
semina feri de
veteri semine
30 generare, qu

C
Sed v
Sinalos
colis credi
ius doctrin
maiori ad
mine sata d
mitibus om
40 ti fructus ex

experimur, & rationi quoq; est congruum. Natura enim, inquit Theophrastus, nil vnquam frustra facere solita est, & maximè in iis, quæ prima, & potissima sunt, finem inspicat, semen autem primum est, & potissimum; si igitur non regeneraret, frustra sit necesse est; idq; propterea providens rerum natura, tanta cura, diligentiaque cauit, vt ea in pomorum abstrusiore parte, tantum tutiore gremio abderet, & præcipuè arborum: nam non solum callo, & membrana, putamine, crusta, osse, sed etiam trigemina natura, carne, deinde ligno, & intus ligno semen munivit, vt quod pluribus erat obnoxium, pluribus propugnaculis sit custoditum, non solum aduersus cœli molestias, sed etiam animalium iniurias sit defensum. Ex semine primum arborum ortum fuisse, nemo est, qui dicere vereatur. totius arboris potentiam Demetrius Phalereus in semine ponebat, sine quo & arbores interirent, & animalia. Fingunt Poëtæ Saturnum suos filios deuorasse, ea ratione, interpretatur Varro, quod semina iterum in terram reciderent, ex qua orta sunt. Natura primum semine feri debere docuit, ostenditq; quum semē ex arboribus decidens, terra exceptum repullulasceret. Vnde Lucretius,

At specimen sationis, & institutionis origo,

Ipsa fuit rerum primum Natura creatrix.

Arboribus, quoniam bacca, glandesq; caduca,

Tempestiua dabant pullorum examina subter.

Demonstrarunt id etiam animalia, ab auibus enim & plerisque animalibus semen sub terra, tanquam in horreis ad annonam repositum pullulauit, & in arborem frugēve excreuit. Quæ semine nascuntur Virgilius expressit.

Pars autem posito surgunt de semine; vt alta

Castanea, nemorumq; Ioui quæ maxima frondet

Esculus, atq; habitæ Graiis oracula quercus.

Sed aliqua est in satione seminum diligentia, nam aliquorum simul plura femina feri debent, vt latius, & felicius assurgat planta, aliqua nouo, aliqua ex veteri semine: nam plerumq; accidit ex veteri semine sata in aliam stirpem degenerare, quorum exempla suis locis dabuntur.

Contra Theophrastum, non omnia semine nata degenerare.

CAPVT IIII.

SE d vetus est agricolarum opinio, omnia ex semine orta degenerare & malos fructus producere, eaq; sic inualuit, vt etiam à recentioribus agricolis creditum sit. Sed non possum satis mirari maximum Theophrastum, cuius doctrinam sequimur, & admiramur, nec possumus tam admirari, quin etiam maiori admiratione non indigeat, id tam pertinaciter affirmare, omnino semine sata degenerare, deterioraq; fieri. quod etsi in aliquibus verum sit, in omnibus omnino affirmare tanti philosophi indignum videtur, quum permulti fructus extiterint semine orti, & optimi. non tamen inficior institutione me-

liores fieri posse. Nec puto aliam rationem induxisse tam excellentem virum hæc asserere, nisi quod sterili Græciæ solo sic nascerentur. Virgilius,

*Nam quæ seminibus iactis sese tulit arbor
Tarda venit, seris factura nepotibus umbram.
Pomaq; degenerant, succos oblita priores,
Et turpes ausibus prædam fert vna racemos.*

Palladius dicit, Quæ seruntur, nasci quidem necesse est suam originem refouente natura, cuius æternitati nulla tarditas potest asserre fastidium, sed homini longa ab his expectatio superest, & à generis nobilitate decedunt. Pyri femina fata, & serò venire, & seminis nobilitate degenerare, Florétinus, Plantæ à semine omnibus plantis sunt deteriores. Sed stirpes semine satas diuersas in species mutari ex mille repetitis Theophrasti locis colligimus. Sed ut ea, quæ scribimus clarius intelligatur, primum meo more omnia, quasi in tabella depicta oculis spectanda proponam. Stirpium semina terræ commissa quum nascuntur, vel omnia mutantur, vel partim mutantur, partim non mutantur. Mutantur omnia semine fata cæli, regionisq; mutatione, scilicet cælo inuidente, solo repugnante. Quod si à solo nonnunquam impetratur, ut alienas aduenasque alat plantas, cælum nullo modo quit flecti: si verò cæli clementia fauet, solo reluctante, quæ nascentur, aut inuita parient, aut fructuum, arborumque mutatio eueniet. Et aliquando aut ex deteriori in melius mutatur, aut ex syluestri in vrbani, ut punica in Ægypto acida tum semine, tum planta, in Cilicia in dulcem quodammodo, & vinolentam conuertitur. Et circa Solos iuxta amnem Pinarum omnes sine nucleo surgunt. Aliquando verò ex meliori in deterius, ut fructifera in steriles mutantur. Palma ex Babylone, & Syria translata in Græciam sterilefcit, ac prorsus germinis infœcunda redditur. Sic persica in Ægypto largè, suauiterq; fructum progenerat, in Rhodo, aliisq; locis procedens fructificare paucissimè comperitur. Sic etiam fici in Ægypto, & omnibus eius tractibus bonæ frugis non sunt. Et Cypriæ brassicæ semen ad nos aduectum si seratur, solum primo anno cauliculos teneros profert, postmodum degenerat in nostrates, clareq; hæc mutatio omnibus manifesta est. Diximus de translatis seminibus, nunc verò de iis, quæ loco in quo orta sunt, fata, in arbores exeunt, quæ sui similem ferant, & hæc partim mutantur, partim non mutantur. Arbores quæ non mutantur, sed sui generis amantissimæ sunt, illæ sunt, quas robustissimas vocamus, diutiusque naturæ contumacia permanent, ut palma, pinus, picea, abies, & reliquæ, quum in deterius mutatio accidere non possit: ferocitas enim vltimum est. Nec probè putatur eas posse degenerare, quæ solo semine nasci possunt. Ex quo Plinius. Ex his quibuldam natura non degenerandi quoquomodo ferantur, ut cupressis, lauris, & palmis. Possunt etiam & regiones aliquæ arboris naturam susceptam seruire, aliæ statò tempore, aliæ semper. Omnes fructus quum loca idonea nacti sunt, melius seruire sua genera possunt,

sunt, præcipuè si arbores vigent, fructumque laudatum præstare suapte natura possunt. Ob id apud nos multas arbores eodem seminio natas, eadem semina semper reddidisse vidimus, nec aliam ob causam, quia solum tam fecundum, colles tam aprici, cœlum ita clemens, ut merito maiores nostri & felicè, & beatam Campaniâ vocitarint. Persica suo osse serimus, eademque proueniunt, nam & ferotina, & præcocia, duracina & nucipersica, uti deposuimus, sic & suis radicibus nata surgunt, ut è proximis cāp. videre licet, qui ad explenda Neapolitana pomaria quotannis innumeras myriadas mittunt. Arantia suo semine sata eisdem fructus reddidisse vidimus, dulces, acidos, & eiusdem formæ, & magnitudinis, ut continuè in Stabiarum plantariis videre licet. Nec laurus, & myrtus apud nos sata degenerant, ut ex iis, quæ virent in nostra villa vidimus: natæ sunt ex seminibus, quæ ex eisdemmet arboribus ceciderant, quanquam & Plinius in Campania eiusmodi genera baccis feri confirmet. Pini, & cupressi semina, quæ ex fathiscentibus conis cadunt, eiusdem generis creant arbores. Sic & nos quæ fistilibus vasculis serimus, & duros fructus, & tarentinos producant, ut eorum sata semina. Quercus ex deciduibus glandibus semetipsa ferit. Idemque de ficario grano dicimus, quod non caprificum, sed ficum tantum producit. Et M. Varro transmarinas ficus, Chias, Chalcidicas, & Lydias, & Aphricanas, cæterasque in Italiâ semine perlatas tradit. Palladius se expertum refert, sorbos suomet semine natos optimos fructus præbuisse, multasque arbores ex pomis sponte progenitas, & in crescendo, & in ferendo extitisse felices. Pamphilus Græcus testatur omne genus suo semine satum suum genus producere, præter oleam, quæ oleastrum producit. Columella feraciores arbores ex semine satas esse, quam quæ plantis, utpote ramo producantur. Vnde nō possum non mirari summum philosophum, eiusque alumnum Theophrastum, cuius doctrinam admiror, hæc tam pertinaciter defendere. Quæ verò mutantur, vel naturæ, vel artis opera mutantur. Dicemus primò, quæ naturæ opera mutantur, ut arbores, & herbæ, & hæc vel in congeneres, vel longè diuersas. Arbores quæ in congeneres, & deteriores mutantur, numerosa est earum ubique gentium multitudo, omnibusque perspicua. Immo Theophrastus omnia semine sata deteriora nasci scripsit. Is namque in historiis. Ex grano ficario nullum penitus genus, sed caprificum tantum erumpi, ac colore discrepans, & ex nigra ficu candidam, & ex candida nigram gigni. Ex vite nobili ignobilè, & sæpè diuersam exire: nonnō in urbanum quoddam, nec fructum quippe persiciens, ut ex oleæ nucleo oleastrum nasci, & ex acinis glaucis mali punici vilia exire, & ex enucleatis dura, & plerumque acida, & ex pyro pyrastrum, & ex malo dulcitur deterius, tum acidum, ex struthis cotonea, amygdalâ tum sapore, tum mollitie degenerare, quercum deteriorem exire. Itaque quæ plerique ex ea, quæ in Epyro nasceretur, seuissent, similè prouenire non potuissent. In Antandro colore laurum, & myrtum degenerare, ex fructu nigro rubrum fieri, & ex semina cupressi mare puenire affirmat. Palmam,

pinum coniferam, tineosam maximè nasci. Euenit quoq; fructuum mutatio, non solum in congenerem, sed in speciem longè diuersam, quod admirabile est profectò: nam multo maius est speciem amittere, quàm in specie similitudinem. Tuberum semina si serantur, in calabricem degenerant, & armeniaca, & præcocii fructus, qui nobis *almarges* dicuntur, si serantur in prunum degenerant, sic nuciperfica in persica, & similia passim euenire videntur ab omnibus, qui seminariis curam inpendunt, sed id non semper, sed quum pluiæ inceserint, cuius causam veteres omnes tum Græcos, tum Latinos, ne dicam Theophrastum latuisse video, idq; ex insitione euenit. Apud nos tubera in calabricem, siue oxyacantham dixeris, inferuntur, quum raro, vel nunquã apud nos semine fata videantur, sic armeniaca, præcocia in prunum, & dulces amygdalæ, in amaras inferuntur. Semina fructus fata subditi trunci aliquando naturam referunt. Mutantur non solum arbores, sed herbae, & si frequentius arbores, cuius ratio est, quòd vegetiorum arborum semina imbecilliora sunt, quòd antequam hient, multa est eis opus mora, interpollationeq; in nascendo, ob id duro contumaciq; tegumento natura sepsit, largioremq; alimenti copiã attrahunt, ob id facilius mutantur. Contrà annigenarum semina cito prodeunt, ob id nuda, aut non multum amicta, amictumq; illud prætenue, paruumque alimentum attrahunt, sic non primo satum sed tertio anno degenerant. Affectus is mutationis plantis, & animalibus est communis, sed tertio anno mutantur, omnia enim ex momento alterantur, & sua natura migrant. Contrarium in plantis, quia quum plantantur, eò imbecilliores sunt, quo magis semine feruntur. Herbae etiam altera in alteram mutantur, primò quæ mutuas inter se accessiones, & vicissitudines habent, formarumque affinitatem, postremò quæ in longè diuersas. Sisymbrium in mentam mutatur. Nos è semine mentæ sato, forma mentam, odore nepitam æmulantem habuimus, ut omnibus mirum videretur. Transeunt etiam herbae semine satae in longè diuersas species, nam videmus triticum, & linum loliascere. Semen vetus tantum valet in quibusdam rebus, ut naturam commutet: nam ex semine brassicae veteris sato nasci aiunt rapam, & contrà ex raporum, brassicam: ex M. Varrone. Mutatur etiam aliqua spontè, & de specie in speciem transmigrant, ut candida populus in nigram commeat, tum fronde, tum tota specie. Quæ verò semina arte mutantur, non ad hanc pertinent speculationem, sit enim agriculturæ opere, plâras corroborando, aut debilitando. Debilitamus ablatione, & deprauatione: ablatione, quum putamus, aut abscindimus radicis partes: deprauatione, quum affigimus trunco clauum, aut ficum scarificamus. Corroboramus quum adaquamus, aut stercoramus, aut ridicas apponimus. Triticum fit ex tipha paratu quodam, & arte, sicut etiam ea, quæ præmacerata fructus dulciores afferunt. Sed de his latius in singulorum historiis loquimur.

Generationis modus ex radice. CAP. V.

Gene.

V
GENERAT
opere. Qu
sola radice sine
dicem generati
ta. Est autem ra
quasi viam rad
ne radicibus ser
tantum arborib
iuxta truncum,
o puniceam prun
è longinquo so
abiet, pino, la
Virgilius alias
Pa
Vi
Pa
Ha
Syl
Has omnes
no dant, quod ide
Ne
Ho
Na
Cre
A quo Plini
lolante lobole
ba indigesta p
ces, quæ sine
res fiant, qu
30 provenire sc
ex radicibus
noctium fer
radices olea
mensuram
fruticibus
proveniunt
gramen, &
fimo, terra
dit: quos al
40 disponunt.
rimus, & si

GENERATIONIS modus à radice duplex, vel sponte naturæ, vel artis opere. Quæ radice natura feruntur, vel integra planta radix feritur, vel sola radix sine stipite, quod idem in herbis demonstrabimus. Est autem per radicem generatio maximè naturalis, & ob id sylvestrium generi accommodata. Est autem radice ferere, quum viuiradix planta feritur: diciturq; viuiradix, quasi viuam radicem habens, ad differentiam ramorum, paxillorumq;, qui sine radicibus feruntur. Viuiradices plantæ non ex omnibus, sed ex prolificis tantum arboribus sumuntur. sunt autem plantigeræ arbores, quæ non solum iuxta truncum, sed è longinquo proliferant. Theophrastus enumerat pyrum, 10 punicam, prunum, & vlmum. Pyrus verò, & punica non solum è proximo, sed è longinquo sobolescent, utpote, quæ proluxa radice subeant. Contra verò abieti, pino, larici, palmæ, cedro, & cupresso negata est nepotum procreatio. Virgilius alias arbores pullulantes nominat.

*Pullulat ab radice aliis densissima sylua,
Vt cerasis, vlmisq;, etiam Parnassia laurus
Parua sub ingenti matris se subiicit umbra.
Hos Natura modos primum dedit, his genus omne
Sylvarum, fruticumq;, viret, nemorumq;, sacrorum.*

Has omnes è radicibus extirpandas esse iubent agricolæ, quum matres la-
20 dant, quod idem quoq; præcipit Poëta.

*Nec non & sterilis, quæ stirpibus exit ab imis,
Hoc faciet, vacuos si sit digesta per agros:
Nunc alta frondes, & rami matris opacant,
Crescentiq;, adimunt fatus, vruntq;, ferentem.*

A quo Plinius. Natura & plantaria demonstrauit, multarum radicibus pullulante sobole densa, & pariente matre, quas enecet. Eius quippe umbra turba indigesta premitur, ut in lauris, punicis, platanis, cerasis, prunis. At radices, quæ sine stipitibus panguntur, in multas partes diuidemus, ut ex vna plures fiant, quod in olea optime prouenit. Theophrastus oleam radice optime 30 prouenire scripsit, quod Columella nos docuit. Quidam melius existimant ex radicibus sylvestrium olearum hortulos excolere, sed post vernum æquinoctium feri debent. Ex eo Palladius. Scio plerofq;, quod facilius atq; vtilius, radices olearum, quæ in syluis plerumq; sunt, aut in locis desertis, in cubitalem mensuram recisas folere disponere, & admistione stercoreis adiuuare. In fruticibus quoque Theophrastus tradidit, & herbis. Quæ radice geniculata proueniunt, è singulis geniculis germen sursum, & radix subtrus erumpit, ut gramen, & arundinum quoddam genus, si quis in obliquum colos præcisas fimo, terræq; abscondat. Columella etiam arundines bulbis optimè feri tradit: quos alii bulbos, alii colos vocant: vnde arundinibus radicem consecram 40 disponunt. Nos in Sicilia & Brutiis præcisas arundinum colos sacchariferarum ferimus, & sic earum segetes instituimus. Rosa enim ex ocellis radicis feritur.

In herbis verò, quæ tenui & diluto cortice integuntur, quemadmodum rapæ, raphani, betæ, ari, integram radicem serimus: partes verò bulborum, qui radices suolatere promunt, non solum hortensium, sed syluestrium, vt cepæ, gethyi, allii, scillæ, aliorumq; Dioscorides heleni agnatas propagines, aut liliorum, aut ari modo feri scripsit: asparagi radices, mentæ, armoraciæ, napunculi, cæterorumq; Diximus generationes, quæ naturæ sunt, nunc quæ artis, vel electus: & primò dicemus eas, quæ naturales sunt, postmodum quæ arte impetrantur in propagatione. Auulsio ocyssima generatio est, auulsioq; facilis, similesq; fructus affert, vt mater vnde auellitur. Auulsio est plantarum ablatio cum radicis parte, vt sationi sit idonea. Plinius ait, Et aliud genus simile natura monstrauit, auulsioq; arboribus stolones vixere. Quo in genere, & cum parui sunt auelluntur, partemq; aliquam è matris quoq; corpore auferunt secum, fimbriato corpore. Plantæ, quæ auelluntur, stolones dicuntur, Græcis *Μόχοι* quasi vituli plantarum; Latinis stolo, quasi stolidi fruticatio ex arborum radicibus. nomenq; à Stalone viro traxit, qui, M. Varrone referente, propter diligentiam culturæ, Stolonū confirmauit agnomen, quod nullus in eius fundo reperiri poterat stolo, quod effodiebat circum arbores, è radicibus, quæ nascerentur è solo, quos stolones appellabant. Plinius item, Stolonum cognomen Liciniæ genti; ita enim appellatur in ipsis arboribus fruticatio inutilis, vnde & pampinatio inuenta primo Stoloni dedit nomen. Didymus ab his, Stolones appellari ait, qui arboribus vniti, & agnati sunt, ex ipsisq; auelluntur vnà cum conspicua radicis parte. Differt à stolone verò viuiradix: stolo enim est qui nascitur circa stipites & auellitur cum radice, & corporis parte, & sic feritur. Viuiradix verò est, quæ integra ex arboribus longinquo extrahitur. vnde auulsionem non admittunt, ait Theophrastus, nisi quæ fruticosæ sunt: nam arbores, quæ vnistipites sunt, carent eo, quod auellere possis. Est & auulsio duplex, plantarum & herbarū. Laurum auulsione nasci difficile putat Theophrastus: sed si auellitur, radicis, & stipitis aliquid habere oportet, fieri tamen potest, vt absq; eo tam punica, quàm malus verna exoriatur. Plinius, Hoc modo plantantur punica, coryli, mali, sorbi, mespili, fraxini, fici, in primisq; vites. 30 Cotoneum ira satum degenerat. Sabina auulsione etiam feritur. Didymus. Malum, cerasus, ziziphon, nux parua, chamedaphne, myrtus, & mespilum. Virgilius in Georgicis.

Hinc plantas tenero abscondens de corpore matrum

Deposuit sulcis.

Herbæ autem quoq; auulsione nascuntur, vt ruta, & brassica, vt Theophrastus tradit. Semper enim aliquid radicis accipitur.

Plantatio ex radice per propagationem. CAP. VI.

SEQUITUR propagatio auulsionem, altera per integram plantam satio: nam vbi natura in minime fruticosis arboribus viuiradicem fieri negat, 40
ars,

ars, quò ramus radicem submittat, propagationem adinuenit, quò aliò
 transferri possit. Propago Festo Pompeio auctore à propagando dicta. Ru-
 stici enim vetulam vitem per inflexos arcus supprimunt, vt ex vna plures e-
 mergant. Dicta est propagatio, quòd porrò pangatur, id est, longè figatur.
 Huiusmodi arborum generationis modi Græci scriptores non meminerunt.
 Plinius naturam propagines docuisse scribit. Rubi namq; curuati gracilitate, &
 simul proceritate nimia defigunt rursus in terram capita, iterumque nascun-
 tur ex sese, repleturi omnia, ni resistat cultura, prorsus vt possint videri ho-
 mines terræ causa geniti. Ita pessima, atq; execranda res propaginem docuit,
 10 atque radicem acquiri viridem. Eadem autem natura est ederis. Propagatio
 duplex, arborum, & herbarum. Arborum duo sunt modi, alter ramo ab ar-
 bore in scrobem depresso, alter ramo in arboris cacumen manente, sed vel
 per vasa fistilia, vel qualos traiecto, terraq; compacto. Arborum propagatio,
 qua ramus deprimitur, quadruplex est: hanc Columella in vitibus docet, in
 aliquibus nos vt possumus. Prima quum virga à matre edita sulco committi-
 tur, altera quum ipsa mater prostermitur, atque in plures palos per suas vir-
 gas diuiditur, tertia quum mater in duas vel tres partes scinditur, si diuersis
 locis diducenda est, quarta quum breuis virga depressa obruitur, ac post tri-
 ennium amputatur. Propagationis modos Cato docuit, Propagatio pomo-
 20 rum, cæterarumq; arborum. Arboribus abs terra pulli qui nascuntur, eos
 in terram depimito, extollitoque priorem partem, vt radicem capiant, in-
 de biennio post effodito, seritoq; Ficum, oleam, malum punicum, cotoneum,
 aliaq; mala omnia, laurum, myrtum, nuces prænestinas, platanum. Mala stru-
 thea, laurum cypriam, delphicam, prunum, myrtum coniugulum, & myrtum
 album, & nigrum, & nuces auellanas. De ramis, quæ diligentius propagari vo-
 les, in aullas, aut in qualos pertusos propagari oportet, & cum his in scrobem
 deferri oportet. In arboribus, vbi radices capiant, calicem, aut qualum per-
 tundito perfundum, ramum, quem radicem capere voles, scarificato, traici-
 toq; Eū qualum, aut calicem terra impleto, calcatoq; bene, in arborem re-
 30 linquito: vbi ita fuerit, & radices egerit, ramum sub qualo præcidito; qua-
 lum incidito ex vna parte perpetuum: si verò calix erit, conuassato, cum eo
 qualo, aut calice in scrobem ponito. Eodem modo vitem facito, eam anno post
 recidito, seritoq; cum qualo. Hoc modo quodq; genus volueris propagabis.
 Plinius è Catone transcribens sic ornate loquitur. Propagationum duo gene-
 ra. Ramo ab arbore depresso in scrobem quatuor pedum quoquò, & post bi-
 ennium amputato flexu, plantaq; translata post trimatum: quas si longius ferre
 libeat, in qualis statim, aut vasis fistilibus defodere propagines aptissimum,
 vt in iis transferantur. Alterum genus luxuriosius, radices in ipsa arbore sol-
 licitando, traiectis per vasa fistilia vel qualos ramis, terraque circumpactis,
 40 atque hoc blandimento impetratis radicibus inter poma ipsa & cacumina (in
 summa enim cacumina hoc modo petuntur audaci ingenio) arborem aliam

longè à tellure faciendi, eodem, quo supra biennii spatium, abscissa propagine, & cum qualis illis fata. Sabina herba propagine feritur, & rhododendron. Sic salices & castaneæ. In herbarum propaginibus Theophrastus caulem rosæ, & lilii prosterni iubet, & sic rosæ & lilium nascuntur. Palladius confirmat. Virgilius de propagine ita canit:

*Sylvarumq; alia pressos propaginis arcus
Expectant, & vina sua plantaria terra.
Sed truncis oleæ, melius propagine vites.*

Arborum satio per truncos. CAP. VII.

DIXIMVS integras arbores ferendi modos, & per radicem, nunc ad alteram generationis partem traducamus stylum, scilicet quomodo trunco, ramo, & furculo nascantur: nam arboris partes maximæ, & primæ quatuor sunt, radix, truncus, ramus, & furculus; & primum videamus, quæ arbores trunco nasci possunt. Truncus, ex Theophrasto, est in quæ defertur alimèrum, simplexq; supra terrâ assurgit. in arboribus caudicè appellare solemus, in herbis caulem. Sed feruntur arbores trunco, itè herbæ caule, vel integro, vel in partes confecto. Integro trunco Theophrastus oleam nasci scripsit. ratioque huius generationis est, quod prægrandes rami oleæ, oleastri, & myrti, succolenti sunt, scilicet pinguedine & densitate, proinde exiccato difficiles: suorum enim corporum spissitas, & præsentis vitæ sedes est & futuræ auspicia, non tamen sine naturali calore, nil enim densitas illa facit, si comes est siccitatis, & inepta ad nepotum procreationem. Virgilius in olea talem ferendi modum sic expressit.

*Sed truncis oleæ, melius propagine vites
Respondent, solido Paphiæ de robore myrtus.*

Theophrastus etiam palmæ huiusmodi satum vitalem esse ait, quippe qui si eius truncus inuersus pangatur vdo solo, & germina supernè cieri, & infernè copiosas radices comparari, quod nos in populis, salicibus, sambucis, aliisq; quotidie videmus. Nec solum integro trunco oleam nasci Theophrastus scripsit, sed etiam ligno. Quid verò per lignum intellexit, nisi truncum per longitudinem scissum, & in partes confectum? Talem ferendi modum per lignum mirè etiam Virgilius expressit.

*Quin & caudicibus scissis (mirabile dictu)
Truditur è sicco radix oleagina ligno.*

Sed quum lignum feritur, monet Theophrastus subtus scindendum, ac iniecto lapide ferendū. Sic oleæ, fici, reliquorūq; satio fieri debet. Sed non solum trunci partes, sed partiū partes serendas docet Græci, scilicet cortices. Dioscorides namq; corticē albæ populi & nigræ cōcisum, & stercoreatis sulcis inditū, edules fungos dare. Quod etiā Tarentinus Græcus affirmavit. In herbis verò caulis est trunci loco. Ideo herbam conciso caule nasci operæ pretium est dicamus.

Theo.

Theophrastus liliorum, & rosarum caules concisos, & germen citare, & radicari posse scribit. Sic arundines præfissa stirpe enasci, germinarique. De rosa, M. Varro, Plinius, aliique referunt.

De satione per truncos, & de talea, & claua. CAP. VIII.

SEQVITVR vt per ramos ferendi modos doceamus. Rami dicuntur, qui in caudice fissi multiplices sparguntur, & vt caudex radice, sic rami caudice fulciuntur. Multis modis ramos ferere maioribus nostris mos fuit. Nam aut integrum ramum, aut eius partes, sic & diuersa nomina indiderunt, nam recisum in plures partes ramum nunc clauam, nunc taleam vocitarunt. Τάλαα vox Græca est, sed Latini in suum vsum conuerterunt, vt taleare pro incidere rustica vsurpet simplicitas. Nonius scissiones lignorum, vel præsegmina taleas vocat. M. Varro, Intertaleare, rusticorum voce, diuidere est, vel ex vtraque parte æquabiliter præcidere, & excidere. Alibi verò ramum ex vtraque parte æquabiliter præcisum, clauulam & taleam appellat, facitq; circiter pedalem. Sed inter authores rami, taleæ, & clauæ nomina confunduntur. Varro clauam & taleam idem esse putauit, vt diximus. Palladius videtur inter ramū & clauam, & taleam differentiam fecisse: nam de citriis loquens ait. Ramus non amplius sesquipede debet immergi, ne putrescat: claua sit manubrij crassitudine, longitudine cubitali, omnisq; obruatur: sed talea gracilior & breuior esse potest, quæ etiam mergetur, sed palmis duobus super sit. Didymus ramum & taleam maximè differre putat. Hanc sationis inuentionem Plinius casui ascribit. Inquit enim, Casus ingenio suo excogitauit, ac defractus ferere ramos docuit, quum pali defixi radices cepissent. Taleæ nobis non paruam commoditatem præstant, nam vbi arbores semine careant, natura nos docet, vt iis vtamur, vel si cupiditas nos stimulet citius arborum nascendarum. Varro, quia ex semine fici, aut oleæ ad crescendum tardæ sunt, surculos, & taleas in seminariis expedit obruere, ait. Præterea quæ taleis feruntur, sapidiores fructus afferunt, & ex vilibus optimos, sed cito pereunt, cōtra verò in arboribus, quæ ex semine prodeunt. Nos ferendi modum à Catone, seminum verò qualitatem à Theophrasto desumemus. Ramos ab arboribus vegetæ ætatis non prouectioris petendos censet. Quæ verò iuuenili ætate sunt, & pleno corpore constant, & melius germinant. Sint nitidi læuissimique: quod enim læue & nitidum, incolume inoffensumq; constat, contrà scabrum, obsitumq; nodis præsertim cæcis, euandisq; incolumitate orbatū est. Ad hæc læuitas, & rectitudo ad succi sorbitionem facilem meatum expeditumq; præstat, vt incrementa celeriter sequantur. Rectè etiam animaduersum, vt ex simili solo, vel saltem non deteriori semina petenda: nam imbecilli cuiq; mutatio molestiam affert, imbecille enim amissis natalibus suis. Præterea cum loci mutatione, ne situm mutet, sed quam cœli partem respexere apud parentes, in eam iterum vergant, vt nil naturæ, morisq; immutetur. Taleam à ramis abscindunt, ne vires ad excitan-

dum germen euanescent. Partem ab inferiori arboris parte petendam, ut pote robustiorem, exceptis vite, & fico, & quicquid humidum est. Quum ponuntur, erectæ ponendæ sunt, nec multum terra extent, lenta enim incrementa capit planta, quum pars, quæ supra terram, maior subterranea fuerit. Cæsura sit prope terram: nam celerius redeunt, quàm quæ altius fuerint obruncatæ. Postremo plagas obreges, ne sol, nève imber eò se induat, ob id alij oblinunt luto, alij imponunt scillam plagæ, ac scilla fictile. Scilla seruat pristinum arboris vigorem, seruatur ea à luto, à fictili lutum. Triplex in satione differentia, siue scrobibus, siue seminariis, siue sulcis seras. Cato hoc modo docet. Taleas quas in scrobe saturus eris, tripedaneas decidito, diligenterque tractato, ne liber laboret, quum dolabis, aut secabis, quas in seminario saturus eris, pedales facito, easque sic inserito. Locus bipalis subactus fiet, beneque glutus fiet. Quum taleam demittes, pede tantum opprimito, si parum descendit, malleo, aut mæcola adigito, cauetoque ne librum scindas, quum adiges. Palo prius locum si feceris, quo taleam demittas, & si ita seueris, utilis fiet talea, meliusque uiuet. Taleæ ubi trimæ sunt, tum denique tibi curæ sint, ubi liber sese vertet. Si in scrobibus, aut in sulcis seres, ternas taleas ponito, easque diuaticato supra terram, ne plus quatuor digitis transuersis emineant, gemma, vel oculo seruato. Plinius de taleis hæc habet. Seruandum in eo ante omnia, ut taleæ ex feracibus fiant arboribus, ne curuæ, ne scabræ, aut bifurcæ, nève tenuiores quàm ut manum impleant, ne minores pedalibus, ut illibato cortice, atque ut sectura inferior ponatur semper, & quod erit ab radice; accumuleturque germinatio terra, donec robur planta capiat. Sed animaduertendum erectam taleam dici, cuius pars ima terram spectat, summa cælum, inuersam verò, quæ cacumine infosso deorsum spectat, cælum cæsura. Columella oleæ rectam taleam deponere iubet, nam inuersa sterilitatem minatur. Plinius, ut secuta semper inferior ponatur, & quod erit ab radice. Theophrastus de ficu, olea, & myrto loquens, Ficus à ramo seritur vastiore, qui debet exacutus percuti malleo, quoad supra terram exiguum relinquitur, ac deinde arena superiniecta operiatur, easque plantas meliores effici volunt, quandiu nouellæ extant. Oleam verò & myrtum quæ trunco, præcisâque; seruntur, deorsum versus sectura inuersa ferere oportet, nec palmo minora præcidere, corticemque; minimè detrahare. Seruntur autem ex his rami, quibus germinantibus terram semper assidue accumulandam, quoad satis corroborentur. Quod contrarium sentit Theophrastus de inuersa talea, puto ex Theodori interpretatione errorem contigisse, quod inuersam taleam non rectè interpretatus fuerit, quum rectam dicere deberet: repugnat enim experientiæ, & rautorum virorum autoritatibus. Sed apud nos citria inuersa talea seruntur. Multa taleis seruntur, ait Plinius, in primisque; ficus, omnibusque aliis modis nascens, præterquam talea, optimè quidem si vastiore ramo, pali modo exacuto adigatur altè, exiguo super terram relicto capite, eoque ipso arena cooperto. Ramo seruntur & punica palis laxato prius

meatu,

V
meatu. Item m
ne minus brach
seritur. Mor
plantatit am
polum albam,
plantata melior
& cistum, qu
nepotum exor

Q
Theophrast
dix dimittitur
rilargius asse

Quom

I Au ad sur
I alias cerun
tur, ut inferius
inflectendi fa
lus, & est quo
10 notinum, tron
surculos absili
& robis depad
lo feritur. Hic
vitaque cacu
postmodum q
li ex omnibus
do, qui non sa
re inere valer
lix sambucus
30 arbore demp
amittunt. Fi
germinare p
ad edurand
Contra tan
inquit, præ
mala Theo
rientia con
Virgilius sur

meatu. Item myrtus. Omnium horum longitudine trium pedum, crassitudine minus brachiali, cortice diligenter seruato, trunco exacuto. Myrtus & taleis feritur. Morus & talea tantum. Mespilus & taleis. Didymus talea, & ramis plantati ait amygdalam, pyrum, morum, citrium, malum, oleam, corinea, populum albam, & nigram, hederam, ziziphum, myrtum, castaneam, & transplantata meliora reddi. A ramis & talea tantum plantari vitem, salicem, buxum, & cistum, quum auulsione nasci prohibeantur: propterea quod à radicibus nepotum exortia sunt. Virgilius de taleis hæc cecinit.

— hic stirpes obruit arua

Quadrifidasq; fudes, & acuto robore vallos.

Theophrastus ait. Si quis in Græcia palmæ ramos supernè recisos ferat, radix dimittitur, & germen non solum crebro nasci, verum etiam subtus radicalargius asserunt. Itemq; è ramis malum & pyrum rarè nasci.

Quomodo surculo plantentur, sine cacumine, & de virga. CAP. IX.

IAM ad surculi sationem ventum est, qui à matre detractus terræ gremio ad alias iterum arbores procreandas figitur. Hic in terram, & in truncum figitur, vt inferius demonstrabimus, quum de insitione agemus. Græcis *κατάσας*, ab inflectendi facilitate, vel *ἀκρόμυον* à fastigio, & mansionem dicitur. Latinis surculus, & est quod ex ramis simplex, & indiuiduum oritur, quale est germen annotinum, frondesq; gerit. Plinius de eius inuentione. Ex eodem inuentum est surculos abscessos ferere. Hoc primum sepi causa factum, sambucis, cotoneo, & rubis depactis, mox & cultura, vt populis, alnis, salici, quæ vel inuerso surculo feritur. Hic generationis modus & plantis, & herbis communis est: nam vtræque cacumine scisso facillè germinant. Dicamus nunc de plantis, dicturi postmodum de suffruticibus, & herbis. Theophrastus ait. Non omnes surculi ex omnibus arboribus dempti, & defixi germinare possunt, sed ij tantummodo, qui non solum moderatum humidum, caloremque habent, sed vtrunque retinere valent & seruare, vt ficus, vitis, & inter steriles & aquarum præuidas salix sambucus, & vtræque populus: sed natura siccis penitus negatum est. Nam ex arbore dempti quamprimum diffiantur, euaporanturque, innatumque calorem amittunt. Ficus enim & vitis quum summa habeant tenera, humectaque, facillè germinare possunt, sic & salix: at contra oleæ extrema, quia sicca ex tenuitate, ad edurandum inualida sunt, sic de pyro, & amygdala, lauroque asserere licet. Contra tamen sentit in historiis, nam ficum omnibus modis exurgere posse inquit, præterquam ramo & surculo, quod vel textus Græci corruptione, vel mala Theodori interpretatione contingere potest, aliter & sibi ipsi, & experientia contradiceret. Exoritur item paxillo tam punica, quam malus verna. Virgilius surculum cacumen appellat.

Nulradicis egent alia, summumq; putator

Hæc dedit at terre referens mandare cacumen.

dam, virore
um ponitur,
tementa capit
Cesura sit pro
cata. Postre
inunt luto, alij
arboris vigo
ntia, siue scro
Taleas quas
to, ne liber la
edales facio,
siet. Quum
alio, aut ma
brius locum si
usq; viuet. Ta
Si in scrobi
a terrâ, ne plus
Plinius deta
us fiant arbo
vt manum im
20 inferior po
tio terra, do
m dici, cuius
umine infol
am deponere
r inferior po
yro loquens,
quoad supra
iatur, easque
verò & myr
erfa ferere o
ere. Seruntur
è accumulân
eophrastus de
pille, quod in
icere deberet
bus. Sed apud
us, imprimisq;
mè quidem si
terram relicto
40 is laxato prius
meatu.

Nos in Surrentino tractu quum in vineis vites propagamus, simul cum vitibus, ficus, mori, mali vernæ furculos apponimus, optimeque proueniunt. Virgis oleam exoriri posse etiam tradit Theophrastus: nam si extrema ramorum ob insitam siccitatem sata nequeunt germinare, contra id nobis natura negatum remedium, est adinuentum ab agricolis. Surgit etiā punica ex virga. Cæterum inter sicca, simplicia & nepotum exortia sola palma præter ex semine ortum alios proueniendi modos sortitur. Inter cæteros ex tenerimis virgis Babylonij viuiradices efficiunt, adultasq; transferunt, quod ex soli vbertate, & nascendi facilitate prouenit: tenerimæ enim virgæ petuntur, quia tales humidissimæ sunt. Columella cacumina ficorum, pyrorumve, & malorum depangere monet. Palladius cerasum virgula nasci scripsit: nam pro adminiculis per vineam positam, in arborem prosiluisse confirmat: sic & punicam: curandumque ne inuersa ponatur. Sed diximus de arboribus, nunc verò ad suffrutices, & herbas transeamus. Theophrastus docuit idem fieri in suffruticibus, vt in ruta, viola (leucoium intelligo) serpillio, helenio, & in coronariis, vt abrotano: hæ enim radices è germinibus suis emittunt, non secus ac hederæ. Proximum inter olera ocimum est: hoc enim seri pro parte superiore optimè potest, quanquam lignosum sit. Abrotanum lignosum est, verum spissitate acoreque suo seruari aliquantulum temporis potest, modo hederæ: nam hæ defixa quoque nimirum erumpere valet. Plinius mentam inuerso ramo seri scripsit. Nos & mentam, & marum cacuminibus continuò serimus.

Quod folij etiam satio fieri possit. CAP. X.

QUIA sequuntur folia furculos, (nam furculos folia ferre diximus) declarabimus nunc an folijs satio fieri possit. Admirabile est naturæ opus arbores etiam posse natales suos folijs exercere. Plinius demiratur Trogum scripsisse palmarum folia apud Babylonios seri, atq; in arborem prouenire. Theophrastus admirabile quodammodo videri posse inquit, si quid è folijs radicem dimittat, qualem circa Opuntem herbam quandam enarrarunt. A quo excipiens Plinius. Item circa Opuntem opuntia est herba, etiam homini dulcis. Mirumque è folio eius radicem fieri, ac sic etiam nasci. Item Theophrastus laserpitij ortum describens, ait. Radix cubitalis, aut paulo maior, in medio extuberat in caput supra terram, vnde lac erumpit, dein caulis assurgit, ex quo maggydaris, & quod folium dicitur, exeunt; folium id semen est, quod quum Auster ingenuè post Caniculam flauerit, discutitur, atq; ita laserpitium nascitur, eodemque anno radix consummatur, & caulis. Ab eo Plinius. Alij tradunt laserpitij radicem fuisse maiorem cubitali, tuberq; in ea super terram, hoc inciso profluere solitum succum ceu lactis, supernato caule, quem maggydarim vocarunt: folia aurei coloris pro semine fuisse, cadentia à Canis ortu, Austro flante. Et ex his laserpitium nasci solitum annuo spatio, & radice, & caule consummantibus sese. Sed huiusmodi admiratio cessare debet, quum apud nos ficus

ex occidentali India allata hoc modo nascatur, cuius folium si pangatur, illicò radicitur, atq; in magnam arborem excrescit, vt nò solum si terræ figatur germinet, sed si in solum ceciderit, illicò radículas emittat. Sed nequeo non mirari Marthiolum, quò apud Theophrastum, & Plinium legisset de opuntia herba, lapsus, credidisse hanc vulgarem Indicam ficum esse opuntem, quum paulò supra nostra tempora ex occidentalibus Indiis allata esset, eiusque apud antiquos nullam prius memoriam extitisse.

De satione per lachrymam. CAP. XI.

SED quid mirabilius? ex gummi fieri posse generationem, ac in eo genitale seminium vigere posse? Theophrastus in historiis inquit, Peculiaris maxima generatio, quæ ex lachryma fit, quippe lilium ita exortum videtur, quum id quod defluerit sole exaruerit. Lachrymā quoq; equapij, vim eandem sortiri volunt, etenim lachrymam id quoq; emittit, cuius rationem libro de causis assignat. Sed peculiaris maximè generatio, quam lachrymæ præbent, vt equapij, liliorum, & aliorum quorundam, nec ratio abest, nam caulibus gummi planè respondent: nil etenim aliud, quàm quod illorum fecundum principium coactum esse oportet. non enim sine calore, humoreq; generatio talis consequitur. Cur autem non omnes succi, lachrymæque generandi vim obtineant, causam ad superiores, prioresque rationes reduci par est, id est quod neque caules, neq; radices vim eiusmodi sortiuntur. Equapij lachryma myrrhæ similis constat, quam obrem quum quidam hic nasci myrrham audiissent, equapium apud se provenire putarunt. Seritur equapium etiam lachryma sua, vt lilium & alia quædam. Lachryma ex eo myrrhæ similis effluit, quidam in totum myrrham id esse affirmarunt. Facit & lachryma lilij cæcū quoddam confluium, quod etiam ferunt. Dioscorides, Smyrnion vocant semine tam myrrham æmulante proximè, vt myrrha sata, alterum quoque nascatur. Ab eo Plinius. Sed præcipuè olusatrum miræ naturæ est, hipposelinon Græci vocant (Theophrastum intelligit) alij smyrneum (Dioscoridem) è lachryma caudicis sui nascitur, aitque Theophrastus myrrha sata natum.

De intervallis plantarum. CAP. XII.

POST QUAM plantarum generationes affatim demonstrauimus, instat nunc ratio quonam modo feri debeant, quum de eate nò pauca antiquorum præcepta extent, ac priusquàm loca arboribus repleamus, quin cuncti ordine metari docebimus, & eo prius quomodo mediæ cuiusque arboris intercapedines destinandæ sint doceamus oportet, quod in re arboraria necessarium iudicamus, quum variabilis, & diuersissima sit: facit enim diuersitas plantarum, vt ad iustam magnitudinem adlescere non possint, & altera alterius umbra prematur, & semper mutua alimenti rapina necentur, nec ramos, nec fructus spatij carentia proferre possint. Nil fœdus est agricolis, inquit Plinius, quàm gestæ rei pœnitentia, multò iam vt præstet laxitate delinquere, quàm

adultas interlucare iusto plus, & in senectam præcipitare, aut (plerunque ipsi
 qui posuere coarguentibus imperitiam suam) totas excidere. Has intercapedi-
 nes arborū Pompeius antras vocat. Columella id iam monuit, Arbores pari-
 bus interuallis serito, vt quū creuerint, spatium habeant, quo ramos extēdant,
 nam si spissè posueris, neq; infra quicquā serere poteris, nec ipsæ fructuosæ e-
 runt, nisi eas interraferis. Sed exequamur doctrinam. Theophrastus, cuiusque
 arboris in quacunq; terra vicinia docet plantarū interualla, tum plantarū, tum
 loci natura distribuenda. Nos prius secundum stirpiū naturam, postmodum
 locorum exequemur: nam in interuallis non tam locorum naturam quærere
 oportet, quā ipsarū arborum mutuū respectū, arborūque naturas, 10
 quæ scilicet umbras ament, vel fugiant, vel quæ longo, vel breui sint radica-
 tu, quæ umbræ opacæq; sint, & umbris carentes, quæ mutuo coniugio deuin-
 ciantur, vel similitate dissideant, quæ eodem, vel diuerso tempore concipiant,
 & pariant, & tandem quæ stillicidio infestent. Primò considerandū quæ um-
 bras ament, quæve solem requirant, alteræ enim breui interuallo serēdæ sunt,
 alteræ amplo, vt quæ solē requirunt, apertiores sint, quæ umbris gaudent, mu-
 tua opacitate consequantur illas. Quorum fructus nucleosi, & ficciores sunt,
 opacitatis amatrices sunt, vt punica, & myrti, quarum fructus si plusculū So-
 lis excipiant, asperi fiunt. Item cui texturæ laxitas, & radicum breuitas, vt lau-
 rus, vnde propter suam imbecillitatem præsidio opus habet aduersum estum 20
 & gelu. Præterea quibus radices longiores, quia plus capiunt loci, maioribus
 interuallis disponantur, quibus verò breuioribus, modicis limitibus separentur:
 radicum enim propinquitas, mutuū offensis infesta erit. Pinus omnibus inno-
 xia esse putatur, idque manifesta causa, quum radice singulari altaque sit, pa-
 titur enim myrtos, & lauros propè fatas bene se habere: vnde apparet plus in-
 commodare radices, quā umbras, pinus exemplo, quū ei umbra tanta sit, vt
 nocere queat, nec noceat. Amygdalū in vineis aliqui serunt, tāquam innocen-
 tissimā, quia modico eget nutrimento, nec ferotina est, nec multum opacans.
 Sed falsa est eorū opinio, quippe valida est, comitemq; habet radicum multi-
 tudinē, & prolixitatem, nec quia serō parit, radicum noxam aufert. Sed punica 30
 & malus veras habent innocentia conditiones, quum numerosis radicibus
 non nitantur, nec hauriant viciniae succum, & quum cito senescant, non diu
 infestant. Vnde punicas, myrtos, & lauros crebras serere, nō plusquam noue-
 nis pedibus distates præcipit, malos distantes paulo plus, pyros amplius, & pru-
 nos, amygdalas, & ficos multò amplius. Accedit umbrarū consideratio, ampla
 enim umbra, ampla quærit interualla, vt ficus, & olea, vnde molestæ sunt tam
 viti, quā cæteris. Plinius ait. Interualla diiudicabunt ramorū amplitudinis
 ratio, locorumque, & umbræ cuiusque arboris, quoniam has quoq; obseruari
 oportet. Breues sunt, quamuis magnarū arborum, quod in orbē ramos circi-
 nent, vti in malis, pyrisque. Exdem enormes cerasis, lauris. Cupressi umbra 40
 minima, & in se conuoluta, ficorum levis, quamuis sparsa: ideoq; inter vineas
 feri

feri non veran
 nec dubito si e
 arbitror. Iuc
 haud alia leui
 Vitis sibi suffic
 dem graui prot
 longi. Non fals
 do quibusq; sat
 rumque, & pic
 10 gladium graui
 mina & pinus.
 gent. Vlmor
 incōmodum
 diffunduntur
 quercus, illici
 suadet, ne al
 da est consi
 citia cōiunct
 gium radicum
 20 mos subire, qu
 vnde oliua ter
 arboris vicini
 fructumq; in
 ribus, ac mut
 mum loca, vt
 planis consen
 plurimū in
 res qualq; al
 aduersus ve
 30 firmæ sunt,
 titudine, a
 quā veni

E loc
 quod ex d
 dam olea
 septuagin
 duro, at qu
 in Boetica
 40 rat si solut
 conferimur

feri non verantur: vlmorum leuis. Attico hæc quoque videtur è grauiſſimis, nec dubito ſi emittantur in ramos: conſtrictæ quidem vلمي noxiam eſſe non arbitror. Iucunda & platani, quamquã cralla: licet graminĩ credere, non ſoli, haud alia leuius operiente toros. Populo nulla ludentibus foliis. Pinguis alno. Vitis ſibi ſufficit mobili folio, iactatuq; crebro, ſolem vmbra temperans, eodem graui protegens in imbre. Omnium ferè leuis vmbra, quorum pediculi longi. Non faſtidienda hæc quoq; ſcientia, atq; nõ in vltimis ponenda, quando quibuſq; ſatis vmbra aut nutrix, aut nouerca eſt. Iuglandium quidem, pinorumq; & picearum, & abietis quæcunq; attingere nõ dubie venenum eſt. Iu-
 10 gladium grauis & noxia, etiã capiti humano, omnibuſq; iuxta ſatis. Necat germina & pinus, ſed ventis vtraq; reſiſtit, quoniã & protecta vinearum ratione e-
 gent. Vlmorum nutriens quæcunq; opacat, alai paſcens ſata. Eſt & ſtillicidij in-
 comòdum. Stillicidij breuiſ diffiniſio eſt. Omnium quæ proiectu frondis ita
 diffunduntur, vt per ipſas nõ defluant imbres, ſtilla ſæua eſt. Stillicidia pinus,
 quercus, ilicis pòderoſiſſima, nulla cupreſſi. Palladius cydonia largiùs ponẽda
 ſuadet, ne alteram quatiente vento ſtillicidium tangat alterius. Nec ſpernen-
 da eſt conſideratio plantarum, ſcilicet quæ vicinia laedunt, quæ ſe mutuo ami-
 citiæ cõiunctu aſſociant, vt oleæ, & myrti. Androtione authore tanquã coniu-
 gium radicum fieri, & mutuas amplexationes, ac myrteas virgas inter oleæ ra-
 20 mos ſubire, quibus à Solis violentia caueatur opacatione, neq; tentetur ventis,
 vnde oliua tenerior fit: exucta nanq; à vëtò & ſole fit durior. Sic oleæ à cuiuſq;
 arboris vicinia abſtinendum. Præterea quæ non eodem tempore germinant,
 fructumq; inchoant, faciliùs aſſociantur, alternantibus enim per vicẽ tempo-
 ribus, ac mutuo cedentibus nil penitus ſibi auferunt. Conſideranda ſunt de-
 mum loca, vt aptè ſpacia deſignentur, in montanis enim propinquioreſ, quàm
 planis conſerantur, montibus enim radices, comæq; minus augeſcunt. Plinius
 plurimũ intereſſe dicit in hac queſtione, terra, in qua ſeremus, in quantũ arbo-
 res quaſq; alar: ventofis locis etiã crebrioreſ ſeri conducit, nam crebritate ſeſe
 aduerſus ventos faciliẽ tuentur: quæ ſolæ ſunt aduerſus ventos deſerræ, & in-
 30 firmæ ſunt, turba enim valebunt, vt ſi nõ magnitudine, atq; robore, ſaltẽ mul-
 titudine, ac cohorte ſe defendant. Nulla enim re magis arbores infeſtantur,
 quàm ventis. Quod & Virgilius in Bucolicis demonſtrauit,

Arboribus venti, nobis Amaryllidis ira.

E locorum etiam natura largiùs, vel breuius interualla metiri debent, quod ex diuerſis ſcriptoribus in olea fiet manifeſtum. M. Cato genus quod-
 dam oleæ in viginti quinque, aut triginta pedes conſerit. In Africa Mago
 ſeptuaginta quinque pedes interuallo dedit vndique etiam in macro ſolo, ac
 duro, atque ventofò, quum minimum quadraginta quinque. Non alia maior
 in Bœtica arbor, nec cui maiora interualla largiri debeant. Palladius conſide-
 40 rat ſi ſolum macrum, vel frumentarium fuerit: nam ſi ager, quem oliuero
 conſerimus, frumentarius fuerit, quadragenis inter ſe pedibus diſtent: ſi

verò macer, vicens quinis. Sic salices in riguis spatia largiora desiderant, sic caneis arctiora.

De ordine quincunciali. CAP. XIII.

IAM superius plantis intervalla destinavimus, sequitur ut vulgatā, & à paucis intellectam quincuncialem rationem tradamus, circa quam non segnis optimi agricolæ cura, & studiū esse debet, tum propter delectationem, quam ipsa metata & ordinata arborū dispositio pariet, tum etiā utilitatem, ne dicam necessitatem. Plinius pulchritudinē esse ait sitam in partium cōmensuratione adinvicem ad totū omnium. Nam quid profectō aspectu gratius isto, nempe quocunq; modo intueare in ordinē se porrigente versu? Quintilianus de orationis ornatu differit ab arboribus similitudine capta. Quid, inquit, illo quincunce speciosius, qui in quācunq; partē spectaueris, rectus est? Cicero in Catoe maiore scribit, Quū Lisander Lacedemonius ad Cyrū venisset, & ei Cyrus consēptū quendam agrum diligenter consitum ostendisset, fertur Lisandrū admiratū proceritates arborū, & directos in quincuncē ordines, dixisse, mirari se nō modo diligentia, sed etiam solertia eius, à quo illa essent dimensa, & descripta. Si de utilitate nos loqui velimus, est & in ipso multiplex, siue ad plātārū incrementum, siue diuturnitatem, & multitudinem prospexerimus. Varro, Pleraq; non solū fructuosiorē agrum faciunt, ut quum in ordinem fuerint consita arbusta, atq; oliueta, sed etiam vendibiliorē, ut quæ adiciant ad fundi pretium. Nemo enim eadem utilitate nō quod est formosius, emere mauult pluris, quàm si est fructuosius turpe. De formæ cultura hoc dico, quæ specie fiant, venustiora sequi, ut maiore quoq; cum fructu sint, ut qui habent arbusta, si sata sunt in quincuncem propter ordines atq; intervalla modica, plus fructus inde auferant. Itaq; maiores nostri ex aruo equè magno male cōsito, & minus multum, & minus bonū faciebant vinū, quod quæ suo quoq; loco sunt posita, & minus loci occupant, & minus officit aliud aliq; ab Sole, ac Luna, & vento. Hoc licet cōiectura videre ex aliquot rebus, ut nuces integras, quas vno modio cōprehenderis, quod putamina suo loco quæq; habet natura composita, easdem si frigeris, sesquimodio concipere possis. Præterea quæ arbores in ordine sata sunt, eas æquabiliter ex omnibus partibus Sol ac Luna coquunt, quo fit, ut vna, & oleæ plures nascantur, & celerius coquantur, quas res duas sequuntur altera illa duo, ut plus reddant musti, & olei, & pretij pluris. Columella ait. Arbores disponere vtile est, ne imbecilla à valentiore prematur, quia nec viribus, nec magnitudine par est, impariq; spatium temporis adolescit. Plinius, In disponendis arboribus, arbutisq; ac vineis quincuncialis ordinum ratio vulgata, & necessaria, non per flatu modo utilis, verum & aspectu grata, quocunq; modo intueare in ordinē se porrigente versu. Virgilius mira carminum elegantia depinxit in Georgicis.


Nec secius omnis in vnguem

Arboribus positis secto via limite quadret.

Et sæpe

*Vt saepe ingenti bello, cum longa cohorteis
 Explicuit legio, & campo stetit agmen aperto,
 Directaq; acies, ac late fluctuat omnis
 Ære venienti tellus, nec dum horrida miscent
 Prælia, sed dubius mediis Marserrat in armis;
 Omnia sint paribus numeris dimensa viarum,
 Non animum modo uti pascat prospectus inanem,
 Sed quia non aliter vires dabit omnibus æquas
 Terra, nec in vacuum poterunt se extendere rami.*

10 Sed antiquis cur dictus sit quincuncialis ordo, declaratur. Litera X apud
 eos decussis dicebatur. Antiqui enim, ut nos quoq; huiusmodi figura dena-
 rium numerum significabant. Erat decussis decem asses vncie, quod si X litera
 per medium seces, relinquitur V, quæ figura denarii dimidium, id est, quinarium
 numerum demonstrat, unde etiam Latini eam figuram quincuncem vocave-
 runt. Constat autem decussis ex duabus quincuncibus appositè collatis. Quin-
 cunx enim ex quinque & vncia nomen compositum, unde arbores in ordine
 quincunciali digestæ putantur, quando secundi ordinis arbores paribus inter-
 uallis sic disponuntur, ut quincuncialem figuram seruare adinuicem videantur.
 20 a distet à b decem pedibus, sic b c, & d e, primus hic erit ordo. Secundus ve-
 rò f g h i, quæ itidem decem pedibus distent, & sit finis in medio, a & b, g in me-
 dio b c collocetur, sic h, & i. Sit tertius ordo l m n o p, qui primo directe opo-
 nitur, & l æquidistat ab f, & m ab f g. Sic n o p, ita ut g in centri exagono
 videatur, æquidistans ab b c h n m f: cuius subiecta hæc erit figura.



Hic erit verus quincuncialis ordo. Videmus hunc à natura in omnibus suis
 rebus obseruari ob creaturarum rerum commoditatem. Sic frondes in pinu, myr-
 40 to, erica, cæterisq; dispositæ sunt, & rami in multis arboribus, ut lumine Solis,
 ventis, aëreq; fruerentur, ne altera alteri subdita hac commoditate defraudare-

B b. 3.

cur, æqualeq; à stipite rami, & frondes alimentum absq; vicinię noxa haurirēt. Sed ex his, quæ adhuc videre contigit arbusta, & viridaria, nunquam me hoc ordine vidisse memini, ob magnam, quam affert secum hic ordo difficultatē. Apud nos ordo vſitatus est in quadratum dispositus. Sed videamus nunc modum disponendi à Columella edoctum. Hæc in quincuncem vinearum metatio expeditissima ratione conficitur, quippe linea per totidem pedes, quot destinaueris interordiniorum spatiis purpura vel quolibet aliquo conspicuo colore vſitur, eaq; sic denotata per repaſtinatum intenditur, & iuxta purpurā calamus deſigitur, atq; ita paribus spatiis ordines diriguntur, quod deinde, quū est factum, fossor inſequitur, scrobemq; alternis omiſſis per ordinem spatiis, à calamo ad proximum calamum fodit. Sed neq; à Columella planè ratio data est: nam vſitatissimum apud nos docet. Ego verò sic inſtituere ordines ſoleo. Sit primus ordo ſpatorum dimenſus *a b c d e*. Capiatur deinde linea & à puncto *a*, ſpatio verò *a b*, ſignetur ſemicirculus. Inde appoſita in puncto *b*, ſpatio *b a*, alius ſignetur, vbi ſe ſecabunt erit *f*. eodem modo ex *d e* ſignabis *i*, ac inter *i* & *f*, protracta linea, ſignabis *g h* æqualibus spatiis. Eodemque modo alii inferiores ordines deſcribuntur. Sed ordines disponendi ſunt, vel ſecundum ſolis rationem vel ventorum, quod in vniuſcuiusq; particulari hiſtoria deſcribetur.

De ſcrobibus faciendis. C A P. XIII.

VBI interualla conſtitueris, ac ordines duxeris, inſequitur fossor, vt ſcrobēs aperiat, qui priuſquam ſeras longo tempore ante effodiēdi ſunt. De quibus antiquorū præcepta audiamus. Theophrastus. Quia tellus vda & peruia eſſe debet, tum vt erumpētibus radicibus cedat, tum vt admittat madorē, & aërem, effodiuntur ſcrobēs anno ante, quàm eo arbores adigantur, vt ſoles & hyemes patiantur, incipiendumq; ab æſtuo ſolſtitio ad Arcturū, tunc enim terra ab omni officio vacat. Idem ſentit Columella. Ante annum, quàm diſponere voles ſcrobēs fodito, ita ſole pluuiāq; macerabuntur, & quod poſueris cito cōprehender. Sed ſi quo anno ſcrobēs feceris, etiam ſemina ponere voles, minimum ante duos meſes fodito ſcrobēs, poſtea ſtramentis eos cōpleto, & incendito. Plinius. Præfodere ſcrobēs ante (ſi fieri poſſit) tanto donec ceſpite pingui obducātur. Mago ante annum iubet, vt ſolem, pluuiasq; combibant, aut ſi id conditio largita non ſit, ignes in medio fieri ante meſes duos, nec niſi poſt imbres in his feri. Didymus. Quædam tamen maximè ante plantationem ſcrobēs ſibi effodi poſtulant, quò à ſole, & ventis, & imbribus terra friabilior reddatur, & plantę radicem agere facilius queāt. Si verò plantare feſtinemus, duobus meſibus antea, aut minimū vno ſarmenta, & arundinem, & quę facile cōburuntur in ſcrobibus ad multos dies cōburemus. Theophrastus ſcrobēs non pari altitudine faciendas cenſet, quū aliæ plantæ in profundum radices agant, aliæ verò ſuperficiariæ ſerpant. Oleis ergo & ficibus, quibus radices minus profundę, minus item profundis ſcrobēs. Lapides inde ſupponunt, quibus hyema-

hyemales aque
ciunt, eademq;
de eximunt, vt
vnde tellus ex
& ſeſe aëri duc
tius ſemper deſ
nullam alius de
conſilium impr
videtur: nam ſi
nanciſcantur, m
alta adharere.
tiores erunt, v
ſummus pater
nusq; æſtatis
locis terra qu

Q
Sp
A
Im
Ha
Q
V
Ha

Plinius ſcro
eubitorum in
ſura, ore com
angulis. Eade
mipede debe
nus altos, qu
30 quofus ſit, in
titudine qua
vitiſibus. Si
tur. Nobis
tantur eæ,
milia quare
nos effecer

hyemales aque receptæ siccis temporibus refundi queant, vel sarmenta subiciunt, eademq; ratione fictilia, neq; sine aqua, aut paxillum adigunt, quæ deinde eximunt, ut cauerna facta sit futuræ aque lacuna. Exigitur enim exhalatio, unde tellus excipiat humiditatē, ita ut imbres sese applicare queant, sol subire, & sese aer induere, ex quibus alimēta, incrementaq; perficiuntur. Scrobes altius semper defodiendi sunt iis, quæ telluri summæ adhaerent: radicem autem nullam altius descendere ternis semipedibus quidam volunt: namq; illorum consilium improbant, qui altius serunt. Sed haud rectè id affirmasse in plerisq; videtur: nam si solum altum, aut regionem commodam, aut etiam terrā facilem nanciscantur, multò longiorem radicem impellunt, quæ scilicet apta sit stirpe alta adherere. Columella. Quò latiores, patentioresq; scrobes feceris, eò latiores erunt, ubiioresq; fructus. Scrobs clibano similis esse debet, imus quàm summus patentior, ut laxius radices euagentur, ac minus frigoris hyeme, minusq; æstatis vapores per angustum os terræ admittant. Tum etiam cliuosis locis terra quæ in eum congesta est, pluuiis non abluatur. Virgilius,

*Quod superest, quacunq; premes virgulta per agros,
Sparge simo pingui, & multa memor occule terra.*

*Aut lapidem bibulum, aut squallentes infode conchas,
Inter enim labentur aqua, tenuisq; subibit*

Halitus, atq; animos tollent sata: iamq; reperti

Qui saxo super, atq; ingentis pondere testa

Virgerent, hoc effusos munimen ad imbres.

Hoc, ubi hinc sita findit canis æstifer arua.

Plinius scrobium altitudinem ita terminat. In argilloso, aut duro solo trium cubitorum in quaq; partem. In prunis palmo amplius, & ubiq; caminata fossura, ore compressiore sunt. Nigra verò terra duo cubita & palmum quadratis angulis. Eadem mensura Græci authores consentiunt, non altiores quino semipede debere esse, nec latiores duobus pedibus, nusquā verò sesquipede minus altos, quoniam in humido solo ad vicina aque perueniat. Cato, Si locus aquosus sit, inquit, latos pedes ternos in faucibus, imosq; palmum & pedem, altitudine quatuor pedum, eos lapide consterni, aut si non sit, perticis salignis viridibus. Sineq; ea sint, sarmentis, ita ut in altitudinem semipedem trahantur. Nobis adiciendum videtur ex prædicta arborum natura, ut altius demittantur ea, quæ summa tellure gaudent, tanquam fraxinus, & olea. Hæc & similia quaternos pedes oportet dimitti. Cæteris sat est, si altitudinis pedes ternos effecerint. Virgilius scrobium profunditatem ita terminat,

Forstian & scrobibus, quæ sint fastigia quæras.

Ausim vel tenui vitem committere sulco.

Alius & penitus terra defigitur arbor.

Æsculus in primis, quæ quantum vertice ad auras

Æthereas: tantum radices ad tartara tendit.

Plinius, Aliqui lapides rotundos subici malunt, qui & cōtineant humorem, & transmittant; non item planos facere, & à terreno arcere radicē existimantes. Glarea subtrata intervtranq; sententiā fuerit. Xenophon in suo OEconomico: scrobē neq; altiorē quatuor pedibus & semipede, neq; breuiorē duobus, & semipede fodi oportet, sed in arida altius fodies, quippe in vliginosa si altius aliquanto penetraveris, aqua manabit, quā ferere prohibet. Sequitur Theophrastus. Solo effosso oportet impleri aqua triduo antequam pangantur, & quum scrobs aqua saturata fuerit, indere, vt facilius sit terra ad accipiendū radices subeūtes. Si salsum verò & arenosum solū fuerit, lapidē circūponi ad stipitē depositam, tū terram aggerere, vt ipsa discutiat saluginē. Iuuat & arenam affundere, & calculos ab amne, vel faucibus torrētis petitos, nā & saluginē discludūt, & ex se ipsis dulces adiungūt qualitates. A quo solo verò, & scatebroso duplici fossa experiri, altera trāuersa, vt in eā accipiantur aqua, altera directa, quā lapidibus terre admistis, cōpleas tam p̄fundē, vt quū circa arborē foditur, non offendant marra: fossa namq; obliqua excipit, altera deducit, sabulum & terra exiccant. Quod si fors obtulerit, vt lapides ibi insint, non erunt eximendi, nam si lapides queruntur ob vtilitatem, cur abiiciendi? Ergo quamcūq; lapidis natus fueris speciem, siue grandiores lapides, siue minores, sabulū, vel inutilem terrā non auferre oportet, sed simul omnia cōfundere. Profundiores scrobes effodiendos, in quibus glarea, aut arenā illam subternas: nā si lapis continua planitie fuerit, nocet plātis, si rotundus, minutusq; refrigeratione permulcet radices, aquam excipit, & radicibus locum sibi appetētibus expeditā viam facit. Omnino & tenui solo lapides non eximendi, quippe & stiūs calores temperat simul, & hyberna frigora: Tandē quid cuiq; terrē cōueniat, consulendū.

De tempore sationis plantarum. CAP. XV.

STATVM tempus, quo arbores seri debeant, nemo vnquā p̄scribere poterit, quū rerum series vbiq; varia sit. Ob id maiores nostri, qui de Agricultura nobis p̄cepta tradidere, varii admodum & dissidētes inter se sunt, quod regionibus tantū, quas incolebant, tradidisse videantur. Differunt enim loca vel aëris qualitate, vel frigore, & calore, vel situ, quē omnia in plantarū sationibus summopere sunt animaduertenda ob ipsam germinationē, quā in his citius, illis verò serius contingere solet. Est enim lex vbiq; terrarū plantis omnibus ferē communis, vt earum satio fiat, dum adhuc silent, & hac ratione festinantius p̄coces arbores, serius verò serotinas seramus. Nos tempore sationis lunarem rationē addemus. Sed primum Theophrasti in Agricultura principis audiamus decreta. Ipse namq; vernam probat sationē dum agitur & quinoctiū, quo tēpore turgent arbores ad germinationem. Tunc enim cōsitiones peragendē, quum terra citatur ad motum parturitionis ob animalium similitudinem: frustra enim est coitus, nisi in matricem immittatur semen, tempore, quo turget. Tunc turget solum, quum madet & calet: id quē fit duabus celi tempestatibus; vere & autumnō. sed melius vere seritur: Tunc enim solum est

est madens, ac calens à sole, & aer temperatus, & roscidus, vt non solum gignantur, sed viuant. Sunt tamen qui autumnum vere præstantiorem esse asserant, quod tunc plus calet tellus, & plantas melius radicare. Valida enim oportet esse ptincipia, vnde ducantur generatio, & vita. Et si vere germinatio felix, quia terra pragnans est, tamen verna satio intempestiua: nam terram ex hybernifrigoris reliquiis etiamnum rigere aiunt, atq; aptas ad germinationis officium radices frigere, prauèque germinare: & ideo autumno potius arbores feri, modo natura arboris ferat. Quædam enim ferre nequeunt, vt pyrus, & malus, & cætera arbores, quarum natura lignosa, & tenuis sit, quæ sunt pereminèti frigori sunt obnoxia. Iam autumnali tempestate, omnia pragnantia sunt interno succo, & vere parere possunt. At vere statim possunt concipere, & præmaturè fœtus, sed cæcos edere. Vtrique ergo non est idem pristinum pariendi tempus. In autumnalibus fieri potest apparatus ad perfectionem propter temporis tractum, in vernis verò breue temporis interuallū suis excludit angustiis pleniorè fœturā. Veris autem conditiones autumnī anteponendæ sunt: nam etsi autūno sata præsto sint vere, vt quod tunc cōceperint, vere edāt, idē nihil osecius accidit in iis, quæ vere pangūtur: nam idē impetus æquē intus est, & aeris tum genitalis conditio, & dies calidi, & longi ad germē eliciendum promptiores sunt, & vere nihilo segnius radicare possunt propter plantarum propensionē naturālē, & humi turgorē, tum aerē ad educandū iuuantem. Solis enim vis sub terra opus facit, & radices vegetiores reddit, quæ nō plus demittuntur, quàm quantum subire eius radii queant, aut minus bonæ sunt, si sint porrectiores. Quæ verò seruntur arbores autumnō, iis hyemis superuētū plurimum incommodari solet, vt oleis vsu venit, quæ frigore deglubuntur, & sicui succus crassior fit. Sed fortasse quispiam eximat arbores, quæ hybernā sationem tolerare valeant. Sed potiorem esse vernā arborū sationem ex legibus naturæ patet, tum quòd tempus est proprium ad arborum robur, tum quòd à cunctis pro cōfesso habetur, & longè magis cōmune. Quorundā locorum est satio, quæ sub Cane fit, quòd tunc arbores rectè valeant; & vbi frequentiores imbres à stiui, vt in Æthiopia, aut aliusmodi aqua, vt in Ægypto Nilus, ibi conditiones aeris sequendæ sunt, vnde ante aquas illas, aut post, sementes faciendæ, quia aeris temperies eo viget anni tempore, & id tempus præfertur verno. Fortasse meliore consilio fiet, si secundum naturam locorum sationes accommodentur, vt vbi aeris mediocris habitudo, vere serantur ibi: vbi verò sint riguæ rigationes, aut aquæ pluuiæ, aut palustres, à state sub canicula id opus fiat, vt in agro Laconico: in aestuosa verò regione ponantur autūno. Consulendum est autem bonæ radicū valetudini. Sed quia Aquilonibus flantibus terrā compingi, aut exugi videtur, sub Austro verò laxius mader, calet quæ, ob id plantam sicciorē, humidiorē fieri: ob id Austro flante melius pangitur, & non solum radices celerius comprehendunt, verū etiam germinati maturius expeditur, fauentibus cælo, & terra. A Borea verò vtrique fit iniuria, &

arbori, quia riger, & terræ, quia compingitur, ergo neq; arbor diffundi ad radicem emissionem, neq; terra laxari ad eam admissionem potest. Florētinus verò, Australe tempus sationi accommodatius destinatur, præcipuè siccis, vt per totam hyemem rigentur plantæ, vnde illicò post Pleiadû occasum obeundum id munus vsq; ad hyemale solstitium. Id tempus cuncti, qui de agricultura scripserunt, vnanimiter prædicant. At Quintilius. Vere plantanda sunt, quæ autûno neglexisti. Ego experientia didici in maritima regione vineas autumno plantandas, sic etiam autumnales fructus, tum duri, tum mollis corticis eodẽ tempore plantaui felici successu, ex quo reliqui agricolæ nostrâ doctrinâ sequuti, non vere, vt prius soliti fuerant, sed autûno ferunt. Vnde rationem afferre oportere pretium duxi. Natura simul duo contraria operari non potest, sed circum vnum occupatam, alterum negligere necesse est: nã aliquando infernas arborum partes, id est, radices, aliquando verò supernas alit. conspicuum est vere alere arborum partes summas, quum florem, & germina promunt, contra autem autumno eas relinquit, vnde arbores folia abiciunt, tunc radices aluntur, vnde id tempus ad plantationem accommodatum, in quo natura circa radices occupata est. Cato autem, Caueto ne cum ventus fiet, aut imber, effodias, aut seras: nam id maximè cauendum est. Columella tradit arbores, aut radicata semina autumno deponi debere circa idus Octobris: taleas, & ramos vere, antequam arbores germinare incipiant. Plinius. Non à septentrionibus, aut ab ea parte cœli vsq; ad exortum brumalem, vento flante, effodiantur arbores, aut certè non aduersa iis ventis radices præbeantur. Virgilius,

Nec tibi iam prudens quisquam persuadeat auctor,

Tellurem Boreâ rigidam spirante mouere.

Rura gelutum claudit hyems, nec semine iactat.

Concretam patitur radicem affigere terre.

Optima vinetis satio, quum vererubenti

Candida venit auis, longis inuisa celubris:

Prima vel autumnus sub frigora: quum rapidus Sol

Nondum hyemem contingit equis: iam præterit æstas.

Ver adeo frondi nemorum, ver utile syluis,

Vere tument terra, & genitalia semina poscunt.

Postremò addendâ esse lunare rationem duximus, & esse plâtationis veluti decretoriâ quandam, quæ vbicunq; & quomodocunq; seueris eadem semper erit. Hesiodus octauâ diem à Luna felicè esse ad plantarum positionem dicit. Diophanes, Luna crescente ferendû esse semper, nihil omnino illa decrescere. Alii à quarta ipsius die vsq; ad octauâ decimâ ferere commodû esse arbitrantur. Cæteri solis tribus diebus à natiuitate ipsius plâtare permittunt. Alii à decima vsq; ad vigesimâ ferere summo opere deuitat, ne ipsius lunæ cum plantis defodiatur. Exactâ igitur prædictarû obseruationû doctrina erit, vt Luna super terrâ existente satio fiat. Plinius humidis locis interlunio ferit, vel circa interlunium quadratiduo.

Varia

Theo
ram pet
rio, quam ob
ratione, quia
transferamus
iores: confiter
plantis, sed in
mitem transfo
bus in frigido

Columell
liore in plan
phrastus po
nullæ habere
Sed quam co
mutationes

Columell
venis, quib
to non omi
lata in iuden
solibus find
borum tem
res crassior
crassa, quæ
grolibro, &
minorem
annum in
flexa, nul
habemus
gema sup
scera pen
rà pullula
40 vt media
pore fibra

Varia de satione præcepta, CAP. XVI.

THEOPHRASTVS in translatione spectare iubet, ut ex simililoco plantam peras, aut saltem deteriore: nam si æquè bona sit, nulla fiet mutatio, quam obrem pristinum vitæ tenorem seruabit: læditur enim planta mutatione, quia amissis naralibus debilis efficitur. Didymus consulit plantas ut transferamus ex deterioribus in meliores, aut similes, aut certè nō multò peiores: consternit, & perturbat commutatio in deteriora: id quæ non solum in plantis, sed in hominibus esse obseruatum. Plinius. Ante omnia igitur in similem transferri terram, aut meliorem oportet, nec è tepidis, aut præcoci-
 10 bus in frigidis, aut serotinis sitis, & neq; ex his in illos. Virgilius.

Ante locum similem exquirunt, ubi prima paretur

Arboribus seges, ex quo mox digesta serantur,

Mutata ignorent subito ne semina matrem.

Columella monet curam adhibendam, ut ab superiore, & sicciore, & exiliore in planiorem, humidiorẽ, & pinguiorem agrum transferatur. Theophrastus positum quoq; obseruandum ex æquo censet, quem arbores nonnullæ haberent, aut in Aquilonem versæ, aut in occidentem, aut in Meridiẽ. Sed quam cœli inspexere partem, in eam item vergant, ut minus sentiantur mutationes naturæ, vel consuetudinis. Virgilius idem memorat,

Quin etiam cœli regionem in cortice signant,

Ut quo quaq; modo steterit, qua parte calores

Austrinos tulerit, qua terga obuerterit axi,

Restituant. Adeo in teneris consuescere multum est.

Columella. Priusq; transferas, rubrica, vel alia qualibet re signato, ut iisdẽ ventis, quibus ante steterunt, constituas eas. Plinius id floccifacit, inquit, Cato non omisisset, si attineret meridianam cœli partẽ signare in cortice, ut translata in iisdem & assuetis statuerentur horis, ne aquiloniæ meridianis oppositæ solibus finderetur, & algerent meridianæ aquilonibus. Transferendarum arborum tempus alii ab ætate, alii verò à crassitudine demonstrauerunt. Arbo-
 30 res crassiores digitis quinq; Cato quærit. Columella semina legit non minus crassa, quàm manubrium est bidentis, recta, læuia, procera, sine vlcibus, integro libro, ea bene & celeriter comprehendent. Plinius ab ætate. Arborem nō minorem bima nec maiorem trima quidem transferri præcipiunt. Alii quum annum impleat. Theophrastus. Seritur planta recta, meliori successu, quàm flexa, nulla radicularũ parte detracta, stultum est enim amittere radices, quas habemus, ut acquiramus nouas. Contra autem Xenophon. Semen iacens ut gēma supinũ locabis in scrobe, sanè modo isto plus oculi, ac radices in terrẽ vitæra penetrabũt, ex quo plāta firmitus radicabitur, & tandẽ germina super terrā pullulabunt. Plinius. Radices inflexas poni melius. Arbore ipsam ita locari,
 40 ut media sit totius scrobis, necessariũ. Theophrastus. Plantas si fieri possit corpore fibrato capi oportet, & fibratas in recto dimittendũ, & quidã etiã fibra-

ras ipsas sternendas præcipiunt. Plinius. Et hoc proderit, quamplurimum terræ, in qua vixerint, radicibus coherere, ac rotas cespitem circūligari. Quum ob id Cato in corbibus transferri iubeat. Radicū magnā adhibendam curam, ut exemptæ appareant, non auulsæ. Theophrastus. Si verò planta fibrata nō fuerit, ex parte potius inferiore, quā superiore assumes, & ad palmi magnitudinē, aut plus paulō sternendū, lignum subtus scindendū, & lapide iniecto seredum, ut olæ, fici, & reliquarum. Recte fit si planta sata non multum extet, propterea quod lenta capit incrementa, quod si plus est illud, quod supra terrā, quā quum subter, malè cum planta agitur: quippe quū minus sit id, quod succum ministrat, maius cui ministratur, facile laborabit inedia, & peius eueniet, ut ficus, & alia, quæ raræ sunt habitudinis. Sic plāta vno eodemq; impetu vberius germinat, ut iis arboribus euenit, quæ cæduntur, si prope terrā sit cæsura, quod est in vitib⁹, oleis, & aliis manifestum, quæ sunt insigni magnitudine. Alii plagas obtegunt, ne sol, neue imber eò se induat. Oblinunt ali luto, alii imposita scilla plagæ, scillæ luto, luto autem fictili. Seruat enim scilla pristinam arboris vigorem, seruatur ea à luto, à fictili lutum. Plinius. Pleriq; id demum cauent, ut plaga deputati cacuminis Meridiem spectet, ignari fissuris nimii vaporis opponi. Id quidē in horā diei quintam, vel octauā spectare maluerim. Cato, Arborea crassiores digitis quinq; quæ erunt, eas præcisas serito, oblinitoq; fimo summas & foliis alligato. Theophrastus, Post sationē ne repleantur illico scrobes, ne in superiora loca citentur fibræ, atq; ab imo destituantur, nam si compleantur, succus ab ima radice ad stipitem, qui supra est, euocatur beneficio foliis, & aeris. Cato, In scrobe quum pones, summā terram subdito, postea operito terram radicibus fimi, deinde calcato pedibus benè, deinde fistucis, vestibusq; calcato quamoptimè poteris. Xenophon. Vbi in scrobem arborem deposueris, superiniicias demum terram benè calcatam, alioquin periculum imminet, ne aqua vsq; ad imum penetrando patefaciat, & sol per æstus exiccado radices adurat. Plinius. Protul dubio vtilissimè quidem summam terram contentus est subdi. Terram circa radices fistucato spissandam, quod Cato primum in ea re esse censet. Plagam quoq; à trunco oblini fimo, & foliis præligari præcipiens. Theophrastus. Si iuxta scillam seratur planta ocyus crescit & à vermibus non infestatur, simul omne scillis appositum facillè germinat, & celerius augetur, causa sui odoris, feruorisq;.

De infitionis necessitate, utilitate, voluptate, & laudibus.

CAPVT XVII.

IAM ad alteram sationis partem deuentum est, scilicet infitionem. Nam etsi ibi surculus terra utebatur, ei que ipsa alimentum suppeditabat, hic vititur trunco ab eo que alimentum ministratur: & ex utrisq; naturæ concordia vnum conflat. Theophrastus esse infitionem quandam, ac alio modo generationem dicit, & non sationem, sed appositionem quandam dici iure optimo

optimoposse.
& omnem huius
fitionem edoc
mam partem,
cture nil soler
magnum oble
Va

Ch

Videmus
neratas, vt me
omni genere
ficus, pyxis, p
teria, connu
visā monstri
uiana, epime
genus notare
tromela, mel

nuciperica, a
naturam refe
amygdala, & p
adopante. S
tur, immo eo
cum, altera m
tinuo præ oc
hæc in totum
longè aliter
illud possum

50 Natura esse
mus) suan
cisse videret
dire, sed lo
ctum, ars
contentas
to in horti
doq; sapon

40 Vidimus
fœtus fouet

optimoposse. Saturno surculorum insitionem, pomorumq; educationem, & omnem huiusmodi fertiliū tribuunt disciplinam, ex Macrobio. Nos insitionem docebimus, rem sanè admirabilem, ac totius agriculturæ nobilissimam partem, voluptuosam, vtilem, & necessariam. Cicero in libro de senectute nil solertius insitione in agricultura inuenire potuit. Ouidius dicit tam magnum oblectamentum de insitione capi, vt contra amorem sit remedium.

Venerit insitio, fac ramum ramus adoptet,

Stetq; peregrinis arbor aperta comis.

Cultus & in primis succos emendat acerbos,

Fissaq; adoptinas accipit arbor opes.

Videmus tam mirabili inuentione arbores variis, diuersisque fructibus orneratas, vt memoret Plinius iuxta Tiburtes tot modis insitam arborem tiliam, omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio baccis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis malorumq; generibus vidisse. Hinc nata sunt arborū adulteria, connubia, & adoptiones, vt noua fructuū genera prioribus seculis haud visa monstrificis hominum ingeniis excogitata videantur. Hinc antiquis miluiana, epimelides, hippomelides, hamamelides, & omomelides, vt non aliud genus notare videantur, nisi in quo facta sit insitio. Sic melimela, myrapia, citromela, melocotonea, nucipruna, malina pruna, & amygdalina, & apud nos nucipersica, amygdolopersica, soboles mediam inter vtrunq; progenitorem naturam referens, medio inter iuglandem, & persicum malum sapore, sic & amygdala, & persico vtriusque parentis ingenium referente, & effigiem simul adoptante. Sed quid mirabilius, si eodem ramo diuersi generis poma videantur, immo eodem in pomo duo dimidiati fructus videantur, vt pars vna persicum, altera nucipersicum æmuletur? Sic alba & nigra vua, ficus, & mala continuo præ oculis habentur. Et si ex animalibus genere diuersis nascatur proles, hæc in totum sterilis erit, vt ex equo & asina. in plantarum verò commistione longè aliter euenit, nam si ex diuersis genere plantis nouum genus exoriatur, illud possumus insitione in infinitum propagare. Sed videamus necessitatem. Natura effecerat vt omnis arbor se ipsam ferens ex deciduo semine (vt diximus) sua natura descisceret, syluesceret, vt in aliud quodammodo genus descisse videretur: ars autem insitionis mangonio nō solum in suam naturam redire, sed longè præstantissimam produci effecit, & contra hunc naturæ defectum, ars id remedium excogitauit. Videmus syluestres arbores sua ruditate contentas insitionis cōnubio genuina feritate domita, ac pristino habitu exuto in hortis mansuescere, & humanius viuere, edoceriq; mitioribus succis, blandoq; sapore in cibis voluptatem hominibus afferre. Papinius.

Hinc fauit natura locis, hinc victa colenti

Cessit, & ignotos dulcis mansuescit in usus.

Vidimus steriles arbores sua vmbra terrā opacantes adoptione tali alienos, fœtus fouere, enutrire, ac diligentis nutricis officio fungi. Columella,

— aut aliena stirpe granata,

Mitis adoptatis curnetur frugibus arbos.

Idemq; notat, quod arbor insita fructuosior est, quàm quæ insita non est, id est quàm quæ cum ramis, aut plantis ponitur. O mira insitionis potestas! Arborem nò solum alieno germine proficisci, sed suomet surculo in semetipsam comprehensam, multo nobiliorem, vberioremq; fieri. Exemplum est apud Plinium, doctrinaverò apud Florentinum. Corellius eques, Aceste genitus inseruit castaneam suomet ipsam surculo in Neapolitano agro, sic facta est castanea, quæ ab eo nomen accepit inter laudatas. Pòst hæres eiusdem libertus, corellianam iterum inseruit. hæc est inter eas differentia, illa copiosior, hæc corelliana melior. Et si sylvestris arbor fecunda euadit insitione, vrbana in nobilius genus commeat vt delicatiore succo, speciosiori forma, colore, & magnitudine fructus producat. Præterea quod magni refert, omnis seminis quod feritur, vel ramis, vel alio quouis modo, lōga est expectatio ad fructuum productionem, insitio verò eodem in aliquibus quo inseritur anno producit. Florentinus ait, Arbores quæ inseruntur meliores sunt, non solum ad fructuum pulchritudinem, & bonitatem, sed & vbertatem, & celerem ipsorum fructuum prouentum. Virgilius,

Et saepe alterius ramos impune videmus

Vertere in alterius, mutatamq; insita mala

Ferre pyrum, & prunis lapidosa rubescere corna, &c.

Inseritur verò ex fœtu nucis arbutus horrida,

Et steriles platani malos gessere valentes,

Castanea fagos, ornusq; incanuit albo

Flore pyri, glandemq; sues fiegere sub vlmis.

Plinius. Pars hæc vitæ iam pridem prouenit ad culmen, expertis cuncta hominibus. Quippe quum Virgilius insitam nucibus arbutū, malis platanum, cerasis vlmum dicat, nec quicquam amplius excogitari potest: nullum certè pomum nouum diu iam inuenitur. Sed quam dicunt insitam cerasis vlmum Virgilius non habet, sed vlmis quercum: locus corrigendus venit. Est & alia utilitas insitionis, vt si fructus laboret vitio saporis, odoris, formæ, vel magnitudinis, breui tempore emendari potest defectus.

Quid insitio, & contra Theophrastum surculum à subiecto trunco aliquid haurire. CAP. XVIII.

SED videamus quid sit insitio. Insitio nil aliud est, quàm surculū ex arbore accipere, & in aliā reponere, vt simul vniantur, & cogamus inuito trunco surculum quem imponimus generare. Propertius id videtur innuere,

Institor hic soluit pomosa vota corona,

Cum pyrus inuiso stipite mala tulit.

Et Virgilius. *Miraturq; nouas frondes, & non sua poma.*

Insitio.

Inſitionem autem, Plinius inquit, caſus magiſter alius, quàm natura docuit, & penè numeroſior ad hunc modum. Agricola ſedulus caſam ſepis munimento cingens, quo minus putreſcerent ſudes, limen ſubdidit ex edera. At illa viuaci morſu apprehenſa, ſuam ex alieno fecere vitam, adparuit quæ truncum eſſe pro terra. Theophraſtus de inſitione loquens ait. Quæ inferuntur, perinde vt terra ſubdito trunco vtuntur. Et furculus qui inferitur, vel inoculatur, truncum ſubditum loco telluris vſurpat. Videtur magnus magiſter velle innuere, quòd quemadmodum planta à terra non niſi alimentum fugit, ita furculus à ſubiecto trunco alimentum ſubripit. Et quia tum ipſius, tum aliorum quorundam vera hæc & indubitata opinio eſt, & videtur aliquomodo eſſe vera, nos ad hanc falſitatem demonſtrandam aliquantum longius cogimur euagari, præcipuè quum ex hac ſpeculatione quomodo rara, noua, & inuiſa in hac arte fieri poſſint, ex naturæ officina principia nanciſcemur. Dicimus ergo furculum à ſubiecto trunco ſubripere colorem, ſaporem, odorem, magnitudinem, ac germinandi vim, & ſi non illicò, aut ſatis euidenter, temporis tamen proceſſu clarè viſitur. Præterea vitia, ac defectus quorundam fructuum hoc pacto emendari, quod authoritate, ratione, & experientia demonſtrabimus. Et primo, quòd colorem à ſubiecto trunco mutuetur. Florentinus citri poma moro inſita rubra fieri ſcripſit, id quæ etiam à Diophane comprobatur. Tarentinus, & Diophanes; pyra moro etiam inſita rubra euadere. Plinius de malis rubore infectis loquens, ait eſſe mala, quibus ſanguineus color origine, ex mori inſitu tracta. Diophanes mala in platanum inſita rubra quoque fieri. In Veſuuij monte amineæ vites in hellanicas dictas inſitæ, vinum ad nigrum vergens, ac reliquis coloratius producent. Beritius vero & Diophanes ſcripſerunt, morum à quo omnia mala rubra fiunt, in albam populum inſitam, albos fructus efficere. Concipit etiam à ſubiecto trunco odorem. Diophanes memorat; mala in cotoneum inſita fieri pulcherrima, & melimela dici. Plinius ab Appio id factum, ac odore eſſe cotoneorum. Nobis experientia compertum eſt, vvas in apianas vites inſitas, eſu moſchum olere, ſic & eius vinum. Item quæ pyra in cotoneum inſita odoratiora fieri, & coloratiora. Sic etiam pyra myrapia, vulgò nobis *moſcatelle* dicta in cotoneum inſita, odoratiora & nobiliora euadere. Haurit etiam & ſaporè à ſubiecto trunco furculus. Plinius ceraſia quæ vocantur laurea à ſubiecto trunco, cui innitebantur, nō ingratam amaritudinē hauſiſſe ſcribit, & capaciſſimā eſſe inſitorum omniū platanum, & robur, verū vtramque ſapores corrumpere. Et M. Varrò innuens eſſe ad fructus ſaporè neceſſariam trunci qualitatē, ait. Si in pyrū ſyluaticam inſerueris pyrū, quamuis bonam, non fore pyrum tam iucundū, quàm ſi in eam, quæ ſylueſtris non ſit. Vites, quæ vulgò hellanica dicuntur, Veſuuij in monte in amineas, quas vulgò Græcas dicimus, inſitæ vinū producent, ſapore multum Græcum vinum amulantes. Apud nos perſicus in amaram amygdalam inſita, poma producit, cuius ſapor amareſcit. Quòd etiam truncatione

magnitudo variet, quotidie experientia videtur. Præcocia vulgò nobis, *almargos* dicta, quia eius fructus est paruus, vt maiorem adipiscatur magnitudinem, in genus pruni illud inferimus, omnium maximum, nobis *coglio pecoro* dictum, Plinio asininum à vilitate. Mespilum super cydoniam inferimus, & fructus natus est cæteris maior. Contra verò persica, quia breuissimæ vitæ sunt, citòque senescunt, nos vt huic malo remedium afferamus, iuxta Florentini præceptum in prunum inferimus, sic erimus voti compotes: nam arbor diutius viuit, sed fructus magnitudine degenerat, quippe minor euadit. Mali medices genus illud vulgò *limoncello picciolo* dictum, exiguo est corpore inter acruminum genera: vt maiorem ergo adipiscatur magnitudinē in citrum inferimus, vel limonem, & maius euadit, eoque magis augetur, quo insitio reiterabitur, quod & germinationis tempus etiam à subiecta arbore adipiscatur. Didymus malum in citriū inferit, vt continuæ fecunditatis sit. Tarentinus vt vitis vuas vere producat, nigram vitem in cerasum inseri iubet, nam eo tempore vuas producit, quo cerasus suum fructum. Eadem ratione Florentinus rosam in mali corticem inferit, vt rosas ferius malorum tempore producat. Et nos persicum in amygdalam inferimus, vt tempestiuos producat fructus. Quod etiam aliquid à subiecta matrice impartiat, monstrat Tarentinus vitē in myrtum insitam vuam producere, quæ inum fundum myrti baccas habebit. Florentinus oleam in vitem insitam, & vuarum botros, & oliuas producere, fructumque gustando, & vuæ acinum, & oleæ baccam simul gustabit. Palladius persici palmam per foramen salicis inductam poma sine ossibus producere. Quod idem de ceraso proditur. Plinius in Batica pruna malina & amygdalina nasci, quibus intus in ligno nucleus amygdalæ est, nec esse aliud pomum ingeniosius geminatum. Substinet enim truncus in insitione nutricis vicem, & sicut infans lactis qualitate nutritur, sic surculus impositus, & sicut cum infans Æthiopis nutricis lacte alitur, eius sudor pessimè æthiopis viroso odore olet, sic surculus semper subiectæ nutricis succum sapit.

De inoculatione. CAP. XIX.

NUNC ad inferendi modos deueniamus. Erant apud maiores nostros varij multiplicesque modi, nec nostra ætas in nouis peruestigandis minus solers visa est. Insitio fit vel in cortice, vel in trunco. ab ea, quæ in cortice fit, incipiemus, & primum ab inoculatione, quippe quum & antiquior, & simplicior sit. Dicitur Græcis *ὀφθαλμοποιός* ab oculis vt videbimus. Latinis inoculatio, nobis verò hic modus, quia vsus aboleuit, penitus incognitus. Eius inuentionem Plinius naturæ tribuit, semine raptim auium fame deuorato, solidoque & alui tepore madido, cum fecundo simi medicamine abiecto in mollibus arborum lecticis, & ventis sæpe translato in aliquas corticum rimas. Vnde vidimus cerasum in salice, platanum in lauro, laurum in ceraso, & baccas simul discolors. Tradunt & modicam condentem semina in thesauros cauernarum, eiusdem

V
eiisdē rei prab
in arbore ocul
ex alia. In sic
sinum in nodo
oculationē non
simam inoculatio
runtur tantum
que apponem

Na
Et
Fi
In

Hic est secu
do. Quæ ino
relictis vber
cundæ arbor
conuenit, cir
gum imprim
ligate exacte
20 quam necesse
terius sedem
crassitudine p
pagem promi
Quum forcul
arboris patet
nam tenetur
ditæ sunt pri
apæ, quibus
facile murtu
30 ætate facile
& mollis co
tio, sed etia
generat, f
alimentig
facile aug
maxime i
mile simi

EMPL
40 Empla

eiusdē rei præbere causas. Hinc nata inoculatio furoriæ simili fistula, aperiendi in arbore oculum cortice exciso, semēq; includendi eadem fistula sublatum ex alia. In ficis autem & malis hæc fuit inoculatio antiqua. Vergiliana quærit finum in nodo gemmæ expulsi corticis, gemmamq; ex alia arbore includit. Inoculationē non recipiunt sicæ, aut humoris exigui arbores. Omnium fertilissima inoculatio, postea emplastratio, sed vtraq; infirmissima, & quæ cortice nituntur tantum, vel leui aura ocyssimè deplantantur. Virgilij doctrinam quæque apponemus.

*Nam qua se medio tridunt de cortice gemma,
Et tennes rumpunt tunicas, angustus in ipso
Fit nodo sinus, huc aliena ex arbore germen
Includunt, vdoq; docent inolescere libro.*

Hic est secundus Theophrasti modus, Didymi verò tertius, docetq; hoc modo. Quæ inoculatur arbor, nodis, & agnascenti sobole, comaq; debet liberari, relictis vberioribus, nitidissimisq; ramis, qui huic insitioni destinantur. Secundæ arboris ex anniculo germine nitidum oculum, cum gemmam asciscere conuenit, circumraso acie scalpri diligenter cortice, & caudici in alterius vestigium imprimere. Purum corticem erugatum, nec vlla sui parte cicatricosum ligare exactè docet, & lignum integrum, & inuiolatum seruari, hoc enim perquam necessarium fuerit. Feliciter cedit, si recepta hoc hospitio gemma in alterius sedem incidat, nam ita dubio procul comprehendit. Caterum cortices crassitudine pares esse debent, & ubi coaluerunt, amputandū quod supra compagem prominet, ne eò lociferatur alimentum, & à coalitu succus auocetur. Quum surculi tria monstrabunt foliola, vincula sunt soluenda. Theophrastus arboris partes ad inoculationem eligit. Rami nouelli, tenerrimiq; inoculandi: nam teneritudo, & ætas fauerit ad coalescendum. nouellæ enim arbores præditæ sunt principiis maximè viuendi, germinadique, & præcipuè inoculationi aptæ, quibus lentus inest humor, præterea & quæ cortice simili, teneroq; sunt, facile mutuū obsequium præstant. Quam obrem quæ natura similia sunt, & 30 ætate faciliè coeunt, optimeq; inoculantur: viscida enim humiditas tenax est, & mollis cortex obsequiosus opus non refragatur. Inoculatio nō solum aptatio, sed etiam satio iure dici potest, & tam id quod germinat, quàm illud quod generat, fecundus humor est, quem oculus habens oculo aptè se coniungit, alimentiq; obtinens facultatem, germinationem propriā reddit. Omnia enim faciliè auferunt, quæ præparatā alimenti copiam secum afferunt, sed omnium maximè inoculationes, hæc namq; purissimo alimento fulciuntur. Præterea simile simili faciliè coit, oculus enim oculo generis societate coniungitur.

De emplastratione. CAP. XX.

EMPLASTRATIO inoculationi filia, & ferè eadē videri potest. Plinius, 40 Emplastratio & ipsa ex inoculatione nata videri potest. Hoc genus nō præ-

dem repertum volunt, qui nouis moribus fauent. Sed id etiam apud veteres Græcos inuenitur, & apud Catonem. Emplastrationis nomen videtur inditū, quia quum cortex inditur, & gemma immittitur, labia luto muniunt, ac emplastrant. Nobis vulgò à *scutillo* dicitur, ab exempta scutula, inferēdo furculo scuti formā referente. Cato ita docet, Quod genus aut ficū, aut oleam esse voles, inde librū scalp pro eximito, alterum librū cum gemma de ea fico, quod genus esse voles, eximito, apponitoq; in eum locū vnde execaveris in alterū genus, facitoq; vti cōueniat. Librum longum facito digitos tres semis, latū digitos tres, ad eundem modū oblinito, integito, vti cetera. Plinius ab eodem eadē recitat. Didymus vltra quā dixerat in inoculatione, hæc habet de emplastratione. Citer quoq; gemmā, vel oculum in pullulatione altera caudicis parte insitionem hanc moliri nil vetat, & sape nō detracta ab anniculo furculo gēma, per se relicto in furculo insigni oculo inseritur, à tergo gemmæ corticē delibrans, & lignū instar scriptorij calami scalpens cum ligno, quod remansit, in vestigiū imprimitur, & sic generosiores arbores cōparabuntur. Sinistra furculorū latera, quæ inoculationis beneficio coaluerint, suos partus liberaliter fœnerantur. Sed elegatissimè & aptissimè à Columella designatur, Hoc genus insicionis quū sit subtilissimū, non omni generi arborū idoneum est. Sed ferè recipiunt talē insitionē, quæ humidum, succosūq; & validū librum habent, sicut ficus: nam & latis plurimū mittit, & corticē robustum habet, optimè igitur inseritur caprifici ramus. Ex arbore, de qua inferere voles, nouellos & nitidos ramos eligito. In iisdem obseruato gemmā, quæ bene apparebit, certamq; spem germinis habebit. Eam duobus digitis quadratis circumsignato, vt gemma media sit, & ita acuto scalpello circūcidito, delibratoq; diligēter, ne gemmā lēdas. Postea item alterius arboris, quā emplastraturus es, nitidissimū ramum eligito, & eiusdem spatij corticē circūcidito, & materiā delibrato, deinde in eam partem, quam nudaueris, præparatū emplastrum aptato, ita vt alteri delibratæ parti cōueniat. Vbi ita hæc feceris, circa gemmā benè alligato, cauetoq; ne lædas ipsum germen. Deinde cōmissuras, & vincula luto oblinito, spatio relicto, vt gemma libera vinculo nō vrgeatur. Arboris autē insitæ sobolē, & ramos superiores præcidito, ne quid sit, quo possit succus euocari, aut ne cui magis, quàm insito feruiat. Post xxi diem soluto emplastrū, & hoc genere etiā inseritur olea. Palladius hæc omnia à Columella exceperit, & quū noui nil sit in eo, rescribere recusauimus. Sed eiusmodi emplastrandi modū cum sua vetustate nostra aras abolenit, faciliorem, cōmodioremq; naçta. Ibi enim exemptā scutulam delibratē inferendæ arboris parti æquabiliter vndiq; coherere oportebat, quod sine maxima diligentia fieri nequit, nostro hoc emplastrandī modo huiusmodi labor leuabimur. Ibi coma, & arboris soboles præcidetur, & quū id æstu maximè fieri accideret, aut arborē exarescere, aut pluribus annis infirmari necesse erat, & si insita scutula non comprehendebat, vt sapissimè accidere solet, fructibus & arbore ipsa priuabantur: nos æstate celebramus, quū arbores oneratas fructibus

atibus

M
fructibus videm
bus decipiamu
fructibus vid
speri, sicco die
proximo vere
sum cultro cor
cultri acie, circ
descendat casu
so è ligno leua
sum cultro ce
linea descend
sed lignū ne fi
portu cerabsc
illa arboris,
ligabis, & cin
quatuor gen
Infra vigin
scens reuert
tionis locum

20
S r & p
anularis,
ad digitale,
anuli, ita & c
erit modus.
nimio corte
firudine, du
capite vltiq;
ligno illas
30 graciliori p
constituat
gā, cui par
ralis hic cō
findas, si t
illico, ne
furculū i
ligno illa
imminea
gnū, & ad
40 nunq in v
leni filo ci

Arboribus videmus, vbi fructuum electionē considerare possumus, quā ab omni-
bus decipiamur in dandis, recipiēdisq; furculis. Æstate quum arbores onustas
fructibus videmus, quum succo turgent, facile deglubitur cortex: mane, vel ve-
speri, sicco die vel temperato furculum ex arbore eligimus illius anni, scilicet ē
proximo vere natū, detruncatis vngue frondibus, supra gemmam per trāuer-
sum cultro corticem incidimus digiti latitudine, & hinc inde ē lateribus acuta
cultri acie circumcidimus oculum duum digitorum lōgitudine, vt cuspidatū
descendat cāsura in modū scuti: gemma sit in medio, inde pollice ē latere pres-
so ē ligno leuamus: inde arboris ramo, in quem inferere velimus, per trāuer-
sum cultro cædatur cortex, vnius digiti latitudine, ē cuius medio alia aperiatur
linea descendens per longum duorum digitorum longitudine, instar lineæ T,
sed lignū ne signes. vtraq; ex parte corticē deglubes, & gemmam inter excisos
corticē abscondes, coaptabis deniq; superiorē trāuersū in lineā scutuli cum
illa arboris, & corticibus illis cooperies, inde cannabinis fasciis supra gemmam
ligabis, & circumcirca, vt ea libera in medio remaneat. Eidemq; arbori tres, vel
quatuor gemmas coaptabis, vt si vna non comprehendit, altera non deficiat.
Infra viginti dies visere ne parcas: si iam comprehendit, vincula soluito, ne cre-
scens tener truncus, vel cortex ab illis secetur. Sequenti vere supra emplastra-
tionis locum abscondas.

De nouo annularis insitionis modo. CAP. XXI.

EST & peculiaris apud nos inferēdi modus, diciturq; vulgò *ad digitale*, vel
annularis, veteribus incognitus, nec pridem nostra ætate repertus. Dicitur
ad digitale, quia quemadmodū matronarum digitis imponuntur digitalia, &
anuli, ita & cortex suo ligno exutus, in delibratū ramum infigitur. Præsens hic
erit modus. Martio mense, quū germinatione turgēt arbores, labatq; humore
nimio cortex, ex arbore, à qua fructus exoptas, nouellū germen, pollicari cras-
situdine, duorū pedum longitudine, leue & nitidum, acuta falce præcidito, & à
capite vsq; ad imū crus corticē sensim, ac diligenter manibus intorquebis, vt à
ligno illa sis gēmis delibretur. quū videbis faciliē à ligno, vt serpens, senecta exui,
graciliori parte circumcidito anulū trium digitorum longitudine, vt in medio
constituatur gēma. Deinde ex ea arbore, cui hæc insitio destinabitur, eliges vir-
gā, cui par cum tua virga sit magnitudo, & loco leui, & enodi, vbi maximē digi-
talis hic cōgruere videbitur, detruncabis, & si virga crassa erit, in quatuor partes
findas, si tenuis, in tres, ac vnguibus à cāsura paulatim cortice denudabis eā, &
illico, ne diuturniore mora humor ille desiccetur, anulū à tua virga tolles, & in
furculū iam cortice spoliatū indes, leui manus libramēto deprimendo, quousq;
ligno illū excipienti vndequeq; cohæreat, & anuli corticis fracturæ periculum
immineat, & virgæ cortici figatur. Sed ne laxitas, vel humor inter excipiens li-
gnū, & aduenā corticē interfuit, sed optimē in suo lare se recipiat, ibi aer subiens
nanq; in vnitatē coire pateretur, cortices sub^o depressi manus sublenamēto ac
leui filo circa caput religetur. Hoc modo castaneæ, oleæ, pyra, mala, medica, iu-

glandes optimè inferuntur. Sed ficus mense Maio. Sunt qui Iunio, & Iulio mensibus ex noua virga inferant non infelici successu. Optat post insectionem illustrari Sole: nam pluuiis coalitus relaxatur, & putrescit.

*De insectionis modo, quo resecta arbor inter librum & materiam
furculum admittit. CAP. XXII.*

Nunc de insectione agemus, quæ resecta arbore fit. Sed ratio duplex est, secto per mediū trunco, vel integro. Primum de ea, quæ integro trunco intra corticem, & lignum furculos recipit, quia prior fuit. Timebant, inquit Plinius, prisca truncum findere, mox inforare ausi medio, ipsiq; medulla calamum imprimebāt, vnum inferentes, neq; enim plures capiebat medulla. Subtilior postea ratio vel senos adiicit, mortalitati eorum ex numero succurrere persuasa. Exiis, quæ Cato cōmentatus est, facile apparet illa arate inter lignū & corticem, nec alio modo inferere solitos. Hæc vera dicitur insectionis. Theophrastus ἐμφυτέα vocat, videturq; significare immisionem furculi in præcisum ramum. Latini peculiari voce insectionem vocant, Itali *incalamare* dicunt, quasi incalamare, quoniam furculum, quem adigunt, calamum antiqui appellabant. Vel si mauis, quia furculus cuspidatur ad modum calamī. Alij graphium vocant, quum graphium & calamum ad idem vñū veniant, & Didymus ad graphij scriptorij modum efformandum furculum iubet. Id de genere insectionis. Hæc verò insectionis duas habet species, ἐμφυλισμὸν & ἐγκυλισμὸν, quarum eadem ratio, sed differunt trunci scissione. Nos hanc ἐμφυλισμὸν, quasi infoliationē dicimus, quia quum inferimus cortices solum aperimus, ac foliorum, vt existimo, tenuitatem imitamur. Nostrates vulgò *tra corio & pelle* dicunt, eodemq; modo, quo antiqui, vtimur. Ideo eorum verbis vtimur, quum præcise & eleganter demonstrant. Huiusmodi neque Theophrastus neque Virgilius meminerunt. Sed videamus primò ecquid doceat Cato antiquitate venerandus. Oleas, ficus, pyra, mala, hoc modo inferito. Quem ramum in siturus eris, præcidito, inclinatio aliquantū, vt aqua defluat. Quum præcides caueto ne librum conuellas. Sumito tibi furculum durum, eum præacuito, salicem Græcam discindito, argillam, vel cretam coaddito, arenæ paululum, & finum bubulum. Hæc vnà bene condensato, quam maximè vñ lutum fiat: dein capito tibi scissam salicem, eaq; præcisam stirpem circumligato, ne liber frangatur, vbi id feceris, furculum aridum præacutum inter librum, & stipitem arcito primores digitos duos. Postea capito tibi furculū, quod genus inferere voles, eum primorē præacuito obliquū primores digitos duos, furculū aridum, quem arcitueras eximito, eoq; arcito, furculū, quem inferere voles, librum ad librū versus facito, arcito vsq; adeo, quo præacueris. Idem alterū furculū, tertium, quartum facito. Quot genera voles tot indito. Salicem græcā amplius circumligato, luto densato, stirpē oblinito digitos crassos tres. Insuper lingua bubula obregito, si pluat, ne aqua in librū permeet, eam linguā in super librum alligato, ne cadat, postea

V
postea strame
docet, additq;
ro ea parte, qu
ladas, quum d
cuneum tenuē
tostas, sed co
culos, quos in
cuneus dimiss
ladas. Vbi fur
foramina, qu
ea autem fine
arbore exten
batur. Pallad
ipsi paruis ac
inaitas non
ter vincula &
trunci cortex
generibus vt
gnum inseri

10

A
tur. Pr
modum verè
pellam in stip
scissura. The
ticemve line
incommodè
vt arefiat &
& alligant,
30 imber, aut
culum cuspi
Etiaq; con
locum per
germen pr
nes rigati i
sit. atq; ali
tim in stille
humorem
40 vitibus vt
abscindito,
postea

10

20

in 20

30

D d 3

diligenter leuato, & medium truncum acuto scalpello permodicè findito, ita ut fissura digitorum trium sit in ea. Deinde cuneū, quo diducatur, inferito, & furculos ex vtraq; parte derafos demittito, sic ut librum seminis libro arboris æqualem facias. Quum furculos diligenter aptaueris, cuneum eximito, & arborem, ut supra dixi, alligato. Deinde circa arborem terram adaggerato vsq; ad ipsum insitū, ea res à vento, & calore maximè tuebitur. Florentinus verò. Quæ tenui sunt cortice, pauciori humore cōrentæ, & foris exuccæ, tanquam humor relicto cortice in interiorem medullam se recipiat, quales citrea malus, vitis, & aliæ complures intelliguntur, fisco ligni medio, furculi infiguntur. Palladius transcribit ab his. Virgilius hanc insitionem versibus ita celebrat.

Aut rursum enodes trunci refecantur: & alte

Finditur in solidum cuneis via: deinde feraces

Planta immituntur: nec longum tempus, & ingens

Exiit ad cælum ramis felicibus arbor.

Plinius vtilia præcepta addit, quæ prætermittenda non duximus. Ante omnia gemmantes nitere conueniet, nihil vsq; à vlcerosum esse, aut retorridū. Spei fauet medulla calami commissura, si in matre ligni, corticisq; iūgatur. Id enim satius, quàm foris cortici æquari. Calami exacutio medullam ne nudet, tenui tamē fistula detegat, ut fastigatio leui descendat cuneo, tribus non amplior digitis, quod facillimè coniungit tinctum aqua radentibus. Ne exacuatur in vento, nec cortex à ligno decedat alterutri. Calamus ad corticem vsq; suum deprimatur, ne luxetur, dū deprimatur, ne cortex replicetur in rugas, idē lachrymantes calamos inferi nō oportet, non hercule magis, quàm aridos, quia illo modo laborat humore nimio cortex, hoc vitali defectu nō humescit, neq; concorporatur. Id etiā religionis seruant, ut luna crescente calamus vtraq; deprimatur manu. Et alioquin in hoc opere duæ simul man⁹ minus nituntur necessario temperamento. Validius enim demissi, tardius ferunt, fortius durant. contrarium ex diuerso. Ne hiscat nimium rima, laxeq; capiat, aut ne parum: & exprimat, aut compressum neget. Hoc maximè præcauendum, ut præualidè accipientis trunco in media fissura relinquatur. Quidam vestigio fissuræ falce in truncis facto, falice præligant marginem ipsum, postea cuneos figunt, continente vinculo libertatem dehiscendi. Cerasi dempto libro finduntur. Dempto libro habent veluti lanuginem, quæ si comprehendit, insitum putrefacit.

Ad insitionem maximè viles, & necessaria præceptiones.

CAPVT XXIII.

NE docendi ordinem inturbarem, viles & necessarias quasdam maiorum nostrorum, & recentiorum præceptiones prætereundas duximus, huc enarrandas. Surculi qualitates monstrat Columella. Surculos ad insitionē sumpturus videto, ut sit arbor tenera & ferax, nodisq; crebris, & quū primum germina tumbunt, de ramulis anniculis, qui solis ortum spectabunt, & integri erunt, eos legito, crassitudine digiti minimi. Surculi sint bifurci, vel trifur-

ci. Eadem Palladius à Columella habet. Plinius aliqua addit. Virgilius ex cacumine inferi verat. Certumq; est ab humeris arborum orientem æstium spectantibus furculos petendos, & è feracibus, & è germine nouello, nisi veruste arbori inferantur. li enim robustiores esse debet. Præterea vt pregnantēs, hoc est, germinatione turgētes, & qui parere illo sperauerint anno. Bimi vtiq; nec tenuiores digito minimo. Variè quoq; & nō iisdem in partibus subest omnibus succus. Vitibus, ficisq; media ficiora, & è summa parte conceptus, ideo illinc furculi petuntur. Oleis circa medias succus, inde & furculi, cacumina sitiunt. Florentinus. Surculi, qui inferuntur, sint nitidi, fertiles, nodosi, ex arboris parte, quæ ad Aquilonē spectat, acutis falcibus decisi, de nouo nati, læues, frequentibus gēmis pregnantēs, bifurci, vel trifurci, ab imo crure simplices, crassitudine digiti minoris, bimi. Anniculi enim promptè excurrunt, sed sunt infœcundi. Theophrastus narrat vrbānam arborem multū fructificare, si feris arboribus inferueris, nā plus alimonie subditus truncus suppeditat, vnde satis prius oleastris inferunt oleas: coeūt enim validius, ac radix plus trahens alimēti, fœcundiorē arborem reddit: contra autem si syluestre mīti inferueris, etsi differentia quædā erit, bonæ frugis arbor nunquā erit. Contra hæc M. Varro. Si in pyrum syluaticā inferueris pyrum quāuis bonam, non fore pyrum tam iucundum, quā si in eam, quæ syluestris non sit; etsi videtur Theophrasti sententiæ repugnare, tamen omnes optimè quidem dixerunt: nā alter de germinatione, & fœcunditate arboris dixit, quæ subditum syluestre truncum habebit, alter verò de succi fructus iucunditate. nam quæ vrbānā arborem subiectā habet, ob dulcem succum, quo alitur, iucundiores fructus præbebit. Plinius. Facillimè coalescunt, quibus eadem corticis natura, quæq; pariter florentia eiusdem horē germinationē, succorūq; societate habent. Lenta enim res est, quoties humidis repugnant sicca, mollibus corticum duri. Reliqua observatio, ne fissura in nodo fiat, repudiat quippe aduenā in hospitalis duritia, vt in parte nitidissima, ne longior multo tribus digitis, ne obliqua, ne translucens. Inferuntur autem & inuersi, quum id agitur, vt minor altitudo in latitudinem se fundat. Inferere aptissimum quamproximum terræ, si patiat̃ odorū, trūciq; ratio. Eminere calami sex digitorum longitudine non amplius debent. Quod si longius afferantur pomorum calami, rapo infixos, optimè custodire succum, arbitrantur; seruariq; inter duos imbrices iuxta riuos, vel piscinas, vtrinque terra obstructos. Florentinus. Si furculi longinquis tractibus deferantur, infixi luto, in vase diligenter oblito ne ventum sentiant, asportantur. Sed modum inuersum furculum ferendū à Plinio appositum, ne arbor in altū excreseat, nos falsum reperimus, quippe in vite, & pruno experti, ad reliquarum altitudinem peruenerunt. Tutior mihi videtur hic modus, vt bimos, vel trimos furculos, & annosos detractos supra inferamus: tunc enim in latitudinem se diffundunt, & hoc modo cerasa, & ficus pumilas fecimus. Refert Palladius à quodam diligenti agricola audiuisse: Omne infitum sine

dubio comprehendere, si depositis furculis viscum non temperatum in ipsa plagâ pariter mergamus, quasi glutino quodam succos materiæ vtriusq; mixturum. Plantas *exarodas*, hoc est, oleolæ naturæ insitiones nullo modo admittere posse, neq; enim conum aut cupressum, vel pinum, & omnino piceas peregrinæ quippiam vel pati, vel alere, referunt agricolæ. Cuius rei argumento est, si plantam quamlibet oleo inunxeris, demoritur protinus. Commemoratas verò arbores præpingues esse, ac oleosas, indicio esse potest, quòd subinde defudatur pix, resinaq; proinde aliis permisceri nequeunt, sicut nec oleum ipsum. Apud rei agriculturæ studiosos sæpe agitur quaestio, utrum sit melius plâtas in seminariis serere, postmodum inferere, ac inde in pomarium transferre, quàm apud maiores legatur transplantatam arborem mitiorem reddi; an in sylvis inferere ac postea in pomarium transplantare: sanè rationes probabiles vtrinq; adducuntur, nobis autem experientia demonstravit, melius in pomario sylvestres plantas serere, ac ubi optimè comprehenderint, inferere, quàm insitas transferre: nam quum has transferimus, in coalitis loca sæpè infirmari videmus, & multoties exarescere. Præterea si velimus insitas arbores eo anno quo inserimus fructus afferre, hic erit modus. Veterem furculum inseras, præsertim qui floribus & gemmis tumeat, & qui sequenti anno fructus laturus sit, ut in sua arbore concipiat foetus, hic verò pariat, quos in sua arbore laturus erat.

Ratio temporum in insitione. CAP. XXV.

PRÆCEPIT M. Varro tempus potissimum esse observandum in insitione, ob id maiorum decreta huc afferemus: fuit enim non pauca eorum sedulitas in illius observatione. Arborum ergo aliæ vno, eodemq; tempore inferuntur, aliæ peculiari natura contentæ contra cæterarum morem statum sibi tempus usurpant. Dicamus primo de communioribus. In his enim observari debet anni tempus, & siderum. In anni cõsideratione, non solum annus considerari debet, sed arborum natura, & locorum, ac insitionum genera, scilicet inoculatio, & insitio: nam vnum tempus vni, alteri alterum constituemus. Loquemur primo de inoculationis tempore, ac Theophrasti placita omnium principis primum apponemus. Eadem sationis, & insitionum tempora: nam quum ferre non nisi turgida valeant, ergo germinationum temporibus insitiones fieri debent. Germinatio fit per ver, per ortum Caniculæ, & per autumnum: his ergo temporibus inoculari potest. Sunt qui vernum tempus probent, dum æquinoctium agitur, arboribus adhuc foetu gravidis: nam vnâ cum partu, germinationeq; cortex quoq; adnascitur, & obteggit. Alii præferunt, quæ ex oriente Acturo, tunc enim inoculata potius radicari, maiorèq; in modum coire posse affirmant. Vere vniuersum erumpere, utpote ex robustiori principio, sed quia aqua inoculationi officit: putrefacit enim, & admixta facile destruit, ratione infirmitatis ex hoc sub Caniculæ ortum tutissimè agi videtur.

videtur. Præterea oportet eligere tempora, tum pro locorum conditione, tum pro arborum natura: nam quum altera vdo solo, altera sicco melius degat, vtri tandem commodius sit ver, vel autumnus, considerandum. Ver ergo siccescentibus melius accommodatur, quum minus succi habeant, sed quæ pingua, limosaq; sunt, autumnum desiderant, humor enim verno tempore largior est, quàm qui ad conseruandum sufficiat. Quandiu lachrimatio durer, tempus id tricenis diebus à quibusdam statuitur. M. Varro quæ ex Theophrasto sationis, & insitionis tempora desumpserat, scripsit. Tempus idoneum, quod scribit Theophrastus vere, & autumnno, & Caniculæ exortu, neque omnibus locis, ac generibus idem: in sicco, & macro loco, & argilloso, quò minus habeat humoris, vernum tempus est idoneum: in terra bona ac pingui, autumno, quòd vere multus humor. quam sationem quidam metiuntur, ferè diebus triginta. Cato per ver insitiones fieri debere pyrorum, & malorum, etiam per solstitium dies quinquaginta, & per vindemiam, sed olearum, & ficorum per ver. Plinius Catonis verba interpretatur, Cato inferi iubet mala & pyra per ver, & post solstitium diebus quinquaginta post vindemiam, oleas autem & ficus per ver tantum. Ver tempus insitionis, incitantibus se gemmis. Didymus in oculationem ante æstatis solstitium tempestiue celebrari prodidit, quamuis ipse circiter vernum æquinoctium, quum germinatione turgent arbores, & gemmis grauidæ gestiant, à die tranquillo, etiam quum cælum silebat, in oculationem etiam spei fauentem auspicatus sit. Florentinus tradit insurculationem ad æquinoctium autumnus vsque celebrari optimè posse, in cortice vsq; ad brumam, & post Fauonii flatus, qui septima Februarii die spirare incipit vsq; ad solstitium. Sunt qui optimam in truncis prædicent post Canis ortum, rursumq; æstate post restinctos caniculæ feruores. Surculi aquilonio statu ruente non sunt inferendi, Austro spirante potius. Columella dicit vtraq; genera insitionis verni temporis esse, tertium quo ipsas gēmas cum exiguuo cortice in partē sui delibratam recipit, quam vocant agriculæ in oculatione æstiuo tempore vsurpari. Palladius. Calidis & apricis locis Februario mense nē, optimè celebratur insitiones duæ, in oculatione reseruatur æstati. Sed ad syderū obseruationes veniamus. Cato Luna sitiente, ficos, oleas, mala, pyra, vires inferi debere post meridiem sine vento Austro. Plinius hæc in teptatur, Luna sitiente, hoc est sicca, post meridiem, ac sine vento Austro. Sed crescente Luna inferi debere. Alibi verò. In Lunæ coitu inferuntur arbores, quam diem alii interlunium, alii silentis Lunæ appellant. Sic Columella. Omnes arbores simul atq; gemmas agere cœperint, Luna crescente inferito, oliuam autem circa æquinoctium vernum, vsq; ad Idus Aprilis. Sic enim Palladius. Sed hi omnes crescente Luna inferendas arbores iubent, nos verò contrariū obseruauimus in regionibus nostris: quippe si crescente Luna arbores inferamus, lignū non fructus affert, si verò deficiēte, fructus vberes affert, arbor verò semper parua. Quapropter qui dant operā venalibus plantis, crescente Luna in-

runt, ut breui tempore conspicuam arboris intercapedine efficiant. Ob id prout Florentinum furculos adhuc oclusos finiente Luna, vel silente vellendos, decem, aut paulò plures dies ante insitionem iubere, operto sic in vase, ne qua expiret aura. Sed edocenda ratio cur statim eruti non sint inferendi, quippe si feruens adhuc, turgensq; furculus in capacem rimā immittatur, necessum est quippiā eius emarcescere, ante quā in vnum coalescat corpus, fungo fam laxitatem inter excipiens lignum, & hospitem furculum intercedere, in cuius rimas hiantes subiens aer, prorsus in vnitate coire non patitur. Quod si dies aliquot vase prius claudantur, facesset omnis iniuriæ suspicio, neq; vinculorum laxans molities infestabit, neq; inspirans aer officiet, sed breui tempore comprehendent. Zoroastres verò Ioue existente in Leone annum esse commodum vult inoculationi, quum aestas veri similis eueniat. Reliquæ siderum obseruationes, quum Luna Saturnum intrueatur, sed ipsa in Tauro, Saturnumq; aspiciat sextili, vel trino, ac in bono aspectu fuerit Iouis & Veneris. Saturnum enim sationi dicant, quum Lunæ vis terrea sit. Arborum verò peculiaris natura peculiare sibi vendicat tempus. Plinius. Punica & ficus quamquam sicca sint, recrastinare minimè vtile. Pyrum vel florentem inferere licet, & in Maiū quoq; mensē protendere insitionem. Cerasus sola post brumam inferitur. Cato inferi iubet mala ac pyra per ver, & post solstitium diebus 1. post vindemiam. Columella oleam circa æquinoctium vernum vsq; ad Idus Aprilis, & reliqua 29 quæ suis in historiis recensentur.

De insitione per terebrationem. CAP. XXVI.

NVNC terebratione quomodo inferi possit edocebimus. Modum appositum primum Cato in vitibus, à quo ceteri agriculturæ scriptores exceperunt, aliqua addendo. Nos modum ad alias arbores traducemus. Inquit Cato. Vitem quam inferes, terebra pertundito, eò duos furculos vitigineos quod genus esse voles, insertos obliquos arcito ad medullam, facitoq; ut medulla medullam contingant, arcitoq; ea, qua terebraueris, alterum ex altera parte. Eos furculos facito sint longi pedes binos, eos in terram demittito, replicatoq; ad vitis caput, vitiq; vinculis alligato, medios in terram defigito, terraq; operito. 30 Hæc omnia luto depsto oblinito, alligato, integitoque ad eundem modum tanquam oleas. Columella modum corrigit, & commodiorem reddit. Detractum viti quam recentissimum sarmentum eligitur, & leuiter circumraffum, ut cortex tantum detrahatur, aptatur foramini, atque ita luto circūlinatur resecta vitis, ut torus truncus alieni generis viti seruiat. Sed aliud est sarmentum, quo priores vitem perforabant, aliud quod ipse vsus nunc magis aptum comperit: nam antiqua terebra, quam solum veteres agricoltæ nouerant, scobes faciebat, perurebatque eam partem quam perforauerat, deusta perrarò reuirescebat, vel cum priore coalescebat, in eaq; nec in fitos furculos comprehendebat, tum etiam scobs nunquam sic eximebatur, ut non in hare- 40

et foramini, e
applicari. Nos
menti, longè
nec foramen in
plaga levis relin
tingat, nulla in
us vitisq; verb
& certior insiti
certè coniungi
rare vitem, ex
& per forame
trerecitur,
catur. Neq;
etum, & car
ne, neq; con

NVNC m
arbores
enim. Si vitis
& inter selem
etiam suis cor
ferendi nape
habere luncu
mo prafio,
parte, qua fil
furus est, co
inferet, cacu
hendit, vnde
lior ad omni
quum antie
feri, & illa
legem san
bro, & fr
rotem hu
fit omne
gères fatig
quod gent
dum quat
eam conti

ret foramini, ea portò interuentu suo prohibebat corpus furculi corpori vitis applicari. Nosterebram, quam gallicam dicimus, ad hanc infitionem commenti, longè habiliorem, vtilioremq; comperimus: nam ea excavat truncū, nec foramen inurit, quippe non scobem, sed ramenta facit, quibus exemptis, plaga levis relinquitur, quæ facilius omni tempore sedentem furculum contingat, nulla interueniente lanugine, quam excitabat antiqua terebra. Plinius vtriusq; verba refert. Palladius Columellæ. Alia est Columellæ tutior, & certior infitio, quoniam etsi proximo vere non comprehendit, sequente certè coniungi cogitur. Primum ex vicino fructuosissimam oportet considerare vitem, ex qua (velut traducem inhaerentem matri) palmitem attrahas, & per foramen transmittas, quum increuerit, coniungi cogitur, & mox à matre reciditur, atq; ita superficies infitæ vitis vsq; ad receptum furculum obtruncatur. Neq; vitis in qua fit infitio interim ociosa manet, sed similiter fert fructum, & sarmentum coalitum simul auget, vitæ nihil offensa ex terebratione, neq; compressa ex coarctatione. Quod etiam à Didymo transcribitur.

Quomodo omnis arbor omni arbori inferi possit.

CAP. XXVII.

Nunc modum demonstrabimus, quo insociabiles quomodocunque arbores natura copulentur. A Catone primum edoctum in vitibus. Ait enim. Si vitis vitem contingat, vitis vtriusq; latus alterum præradito oblique, & inter sese medullam cum medulla libro colligato. Ab eo edoctus M. Varro etiam suis commentariis apposuit: Est altera species ex arbore in arborem inferendi nuper animaduersa in arboribus propinquis. Ex arbore à qua quis vult habere furculum, in eam, quam inferere vult, ramulum traducit, & in eius ramo præciso, ac diffisso implicat: tam ramuli locus, qui contingit ex vtraque parte, qua fissuram intrat, falce extenuatur, ita vt ex vna parte, qua cælum visurus est, corticem cum cortice ex æquatum habeat. eius autem ramuli, quem inferet, cacumen vt directum sit ad cælum currat, postero anno quum comprehendit, vnde prognatū est, ab altera arbore præciditur. Sed diligentior, & vtilior ad omnes arbores, & cum omni verborū copia traditur à Columella. Sed quum antiqui negauerint posse omne genus furculorū in omnem arborem inferi, & illam quasi finitionem, qua nos paulò ante vsumus, veluti quandam legem sanxerint, eos tantum furculos posse coalescere, qui sint cortice, & libro, & fructu consimiles iis arboribus, quibus inferuntur; existimauimus errorem huius opinionis discutiendū, tradendamq; posteris rationem, qua possit omne genus furculi omni generi arboris inferi. Sed ne longiori exordio legētes fatigemus, vnum quasi exemplum subiiciemus, qua similitudine quisq; quod genus volet, omni arbori poterit inferere. Scrobem quoque uersus pedum quatuor ab arbore oliuæ tam longè fodito, vt extremi rami oleæ possint eam contingere, in scrobē deinde sici arbusculam deponito, diligentiaq; adhi-

beto, vt robusta, & nitida fiat. Post triennium, aut quinquennium, quum iam satis amplum incrementum ceperit, ramum oliuæ, qui videbitur nitidissimus, deflece, & ad crus arboris ficulneæ religa, atq; ita amputatis cæteris ramulis, ea tantum cacumina, quæ inferere voles, relinquito, tum arborem fici detruncato, plagamq; leuato, & mediam cuneo findito. Cacumina deinde oliuæ, sicuti matri inhaerent, vtraque parte abradito, & ita fissuræ fici aptato, cuneumque eximito, & diligenter ramulos colligato, ne qua vi reuellantur. Sic interposito triennio coalescet ficus cum olea, & tum demum quarto anno, quum bene coierint, veluti propagines, ramulos oliuæ à matre refecabis. Hoc modo omne genus in omnem arborem inseritur. Sed Columella ¹⁰ mira verborum iactantia, à se modum adinuentum tradit, quum iam pridem Cato, & post eum M. Varro edocuerit, vt non modus sed tantum verba sint diuersa. Admiror Plinium multæ lectionis virum, qui non se apud Græcos, neq; Latinos legisse scribit hunc inserendi modum, sed à Columella excogitatum affirmat, haud sibi certè satis compertum. Est hæc ratio apud nos vtitissima, & maximè utilis, vulgò *a porgere*, vel *passa iuuauæ* dicta, etsi ea inter cõgeneres abores vtamur, scilicet in prunis perficis, malisq; & castaneis. adeo validum intra duos menses incrementum capiunt, vt fructificet furculus, & longè subiecti trunci magnitudinem superet, si nouella fuerit planta, vt vix sustineri queat. Ideo animaduertendum est, vt quum iam rectè cepisse cognoscas, quod erit, ²⁰ quãdo pars, quæ supra truncum eminet, superat matris ramulum, tunc à matre abscindas. Inter verò diuersi generis arbores, diutius coalescere patiaris. Quod si vicinæ inserendæ arboris non datur opportunitas, & habebimus fictilia vasculis arbusculis plantata, ex quibus fructus exposcimus, tunc præciso arboris trunco, vel fisso, prædicto modo furculum inseremus, vel adraso cortice, atq; itidem adraso furculo, vinculis strictè alligabimus, ne possint dimoueri, inde bimestri, vel trimestri spatio elapso, à matre recidatur, & vas vltra in aliam arborem transferas, sic vasculo nobili aliqua arbore plantato, totum pomarium, ne dicam villam optimè poteris inferere.

De alio insitionis modo, quo & fructus simul misceri possint. ³⁰

CAPVT XXVIII.

INSITIONIS, seu mistionis modos trademus, longè cæteris faciliores, admirabilioresq; , quibus nulla certiore via adoptati fructus ex adoptatæ formæ, colorem, saporem, ac deniq; vniuersam eius naturam recipient. Hinc noua adulterii ingenia, hinc nouos fructus hominibus visendos prioribus seculis inuisos præbeamus. Hinc qui nouis fructibus inueniendis, aut simul miscendis, vitis corrigendis, emendandisq; nauant operam, principia colligere poterunt, vt voti cõpotes fiant. Cato, vt præcedenti capite diximus, quum vites inferere doceret, vtriusq; vitis adrasa flagella vniebat, vt quum coaluissent, à matre abscinderet, vt adoptati generis vites generaret. Didymus. Accipienda sunt duo diuersi generis sarmenta, eaq; findenda per medium, atq; ita alterum alteri adiunge- ⁴⁰

re oportet, vt oculi coincidant, & sese mutuo coniungant, vt duo oculi quasi vnus fiat, inde validè constringere sarmenta cum papyro oportet, & scilla integere, aut glutinosissima terra, atq; ita plantare, interiectis diebus tribus, aut quinq; irrigare, quousq; germen producat. Palladius ab vtroq; excepit, atq; in vnum diuersa dictorum scriptorum experimenta redegit hoc modo. Vt vitis botryones & albos afferre possit & nigros, vt Græci produnt. Si vicinè sunt vites alba & nigra quum putantur, sarmenta vtriusq; inter se diuisa siciunges, vt medios vtriusque generis oculos æquâdo reddere possis vnitati: tunc papyro ligabis stricto, & molli, atq; humida terra curabis adlinire, & interiectis ternis diebus adquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Nos verò duo sarmenta iuxta se vicina à parentibus non decisa, vsq; ad medullam erasa quinum digitorum lōgitudine simul adiunximus, vt duo dimidiati oculi vnus videretur: inde vlmea teniola ita alligacimus, vt è duobus oculis germen vnum exire cogeretur, qui vnas eo modo, quem diximus, præbuit. Fructus hic veluti hermaphroditus ex duabus naturis coniunctus nascitur. Quod sensisse videtur Ouidius in Metamorphoseos quarto.

— nam mixta duorum

Corpora iunguntur, faciesq; inducitur illis

Vna, velut si quis conducit cortice ramos,

Crescendo iungi, pariterq; adolescere cernat:

Sic ubi complexu coierunt membra tenaci,

Nec duo sunt, nec forma duplex, nec femina dici

Nec puer ut possit, neutrumq; & vtrumq; videtur.

Ficus vt fructum producat vna parte album, altera rubrum. Duorum furculorum, albæ videlicet & nigræ ficus, oculos accipito, eos per medium secato, atq; simul composito, vt medietas oculi vnus ita medietati alterius æqualiter conueniat, vt vnitas ex his facta videatur, hunc oculum ex vtroq; cōpositum delibratæ ficus cortici accommodetur, vt diximus in emplastratione, & aptè deligetur, & comprehendet. Sed multas arbores sic emplastrare ne tædeat, vt earum aliqua comprehendat, & fructus hoc modo, quem diximus, afferet. Et huiuscemodi inferendi ratione in malis, pyris, reliquisq; similibus vti poteris. Sic Neapoli mala, quæ ex vna parte persicum ex alia nucipersicum ostendunt, producta fuisse non dubito, vt nunc pomum in diuersas partes diuisum videatur, vt vnaquæque suum saporem, odorem, colorem, laxitatem, & formam refferat, nunc vno, eodemq; ramo persicum vel nucipersicum demonstret. Nec dissimili modo flores etiam dimidiatos producemus, vt pars alba, altera rubra, vel alterius coloris sit, vt dicemus in horto coronario. Palladius nouum insitionis genus à quodam Hispano se edoctum prædicat, monstratq; vt persica poma sine ossibus nascantur, id quod in aliis experiri posse nil vetat. Salicis ramum brachij crassitudine, solidum longum cubitis duobus, aut amplius terebrari iussit in medio, & plantam persici in eodem loco, in quo consistit, spolia-

tam ramis omnibus solo capite relicto per ipsum saligni manubrij foramē induci, tunc eundem salicis ramum terræ capite utroque demerso in arcus similitudinem debere curuari, foramen luto, musco, vinculis stringi, anno deinde exempto, vbi infra medullam salicis caput plantæ sic cohaerit, vt vnitas sit ex duobus mista corporibus, plantam subterincidi, atque transferri, & aggerari terram, quæ arcum salicis cum perfici cacumine possit operire: hinc perfici potius sine ossibus nasci. Sed hoc locis humidis conuenire, vel riguis, & salices aquationibus adiuuandas, vt & naturalis ligni vigeat, quæ delectatur humore, & superfluentem copiam succi germinibus ministrer alienis. Nec diuersa via nuciperficum productum fuisse existimo, quod ab utroque parente nomen usurpauit, vt suum, parentisque ingenium referat. Malum est, quod foris æmula facie persicum pomum mentitur, sed succum, leuitatem & colorem iuglandis refert, saporemque medium inter iuglandem, & persicum, nomenque ab utroque parente contraxit nuciperficum, prioribus seculis inuisum, iucundo sapore, innocentique gustu. Sic etiam amygdaloperficum, quod ab amygdalo & persico nomen assumptum: foris persicum mentitur, intus dulcem amygdalam & forma & gustu repræsentat, nostris pomariis frequens. Nec diuersa via Plinio inuenta nucipruna: Peculiaris, inquit, impudentia nucibus insectorum, quæ faciem parentis, succum verò adoptionis exhibeant, ab utroque nucipruna dicta. Et in Betica etiam malina, malis insita, & amygdalina, amygdalis insita, quibus in ligno intus nucleus amygdalæ erat, nec vquam pomum ingeniosius fuit geminatum. Tarentinus nigram vitem in cerasum inferi iubet, vt vvas vere habeamus: nam eo tempore vvas habebimus, quo cerasus proprium fert fructum. Sic Pamphilus, & Florentinus. Est & noua inferendi ratio, nobis cognita in senectute, oculum oculo imponendo, qua prægnantes afferent fructus, scilicet vt in aluo alterum gestent. Sic citrium in citrio, cucumeres in melonibus conspeximus.

An herbis, & suffruticibus insitio possit reperiri.

C A P. XXIX.

VIDEAMVS num & in herbis insitio possit inueniri, vt si quando necesse fuerit, odorem, saporem, colorē, vel germinandi tempus è subiecto trunco haurire possimus. Nos antiquorum dictis, aliqua à nobis explorata addemus, vt ingeniosis noua semper inueniendi ansam præbeamus. Columella vt hyberno tempore cucumeres habeamus, hoc modo fieri posse docet. Idque apud Dulum Mendesium Ægyptiæ gentis fieri posse legit. Hic enim præcipit aprico & stercoroso loco alternis ordinibus ferulas, alternis rubos in hortis cõsitas habere, deinde eas confecto æquinoctio paulum infra terram secare, & ligneo stylo laxatis vel rubi vel ferulæ medullis stercus immittere, atque ita semina cucumeris inferere, quæ scilicet suo incremento coeant rubis, & ferulis: nam ita non sua, sed quasi materna radice aluntur, & sic insitam stirpem frigoribus

ibus quoque
Est inter herbas
mine et alius
dius commentu
duca folia carp
punctis semina
iterum duca pr
ri posset, si per
lorum odore in

HACTENUS
initio di
perniciosa. C
cundum natura
sumus citra ar
cultura: mun
homo velfere
ro in Catone
tionesque profe
stercorandi: M
cultura, & indus
suecunt. Quo
aera duos leon

Ha
Se
Sed terra
euadit, & per
nem; prater
do, vitia que
30 ducuntur. L

Et Virg

Sed cul
dum agello
dia accu
num rusticu
40 gones, vom

ribus quoque cucumeris præbere fructum. A quo Plinius, sed obscure admodum. Est inter herbas genus inferendi, præcis germinibus caulibus, & in medullam semine ex aliis addito. Hoc & in cucumere sylvestri. Similem huic modum Palladius commentus est, ut lactuca feminibus multis condita nascatur. Auulsa lactucæ folia carpunt, quæ radicibus iuncta sunt, & in eisdem gradibus furculo punctis semina deponunt nasturtij, ocimi, erucæ, ac fimo adlinunt: sic obruta iterum lactuca prædictorum seminum caulibus ambietur. Sed verior insitio videri posset, si per medium fissis radicibus sylvestris intubi, radices florum caryophyllorum odore indas, & implices, ita ut uniantur: & cæruleo flore nascantur.

De cultu, & primum deputatione. CAP. XXX.

HACTENUS seruimus, nunc colimus. Est enim altera pars libri, quam ab initio diuiseramus. Terræ cultus utilis, & necessarius, contra negligentia perniciosus. Cultus magis refert, quam fertilitas agri. Solum enim utcumque fecundum natura, incuria sterilescit, ac infertile, & dumos degenerat: non enim possumus citra arationem, & fossionem, ceterasque artis sedulitates, tot, tantisque agriculturæ munus frui. Placuit enim Deo opt. max. ut non sine sudore sui vultus homo vesceretur pane suo. At infecundum cultu vber, nitidumque euadit. Cicero in Catone maiore, Quid ergo irrigationes? quid agri fossiones? repastinationesque; proferam, quibus fit multo terra fecundior? Quid de utilitate loquar stercoreandi? M. Varro ait, nullam terram adeo immitere esse, quæ non possit cultu, & industria domari: non aliter ac leones inter animalia ferocissimi mansuescunt. Quod Græci Poetæ innuere volentes, Cybeles terræ deæ currum per aëra duos leones ab ea mansuefactos trahere fingunt. Vnde Lucretius:

Hanc veteres Grauium docti cecinere Poeta.

Sedibus in curru biungos agitare leones.

Sed terra quæ natura facilis existit, cultura longè fertilior, fecundiorque euadit, & per culturam multum acquirit, ut alimenti copiam, & pinguedinem; præterea rerum impedimenta exterminantur, noxias herbas expurgando, vitiaque ipsius perdomando, vnde generosiores, & vberiores fructus pro-

30 ducuntur. Lucretius,

Inde aliam, atque aliam culturam dulcis agelli

Teniabant, fructusque feros mansuescere terra

Cernebant indulgendo, blandeq; colendo.

Et Virgilius ab eo in Georgicis.

— fructusque feros mollire colendo.

Sed culturæ exemplum à Plinio afferamus. C. Furius quum in paruo admodum agello largiores fructus, quam ex amplissimis vicinis colligeret, inuidia accusatus, cum fruges alienas pelliceret veneficiis, die dicta, instrumentum rusticum omne in forum attulit, ferramenta egregie facta, graues ligones, vomeres ponderosos, dixitque: Quirites, veneficia mea hæc sunt,

foramē in
arcus simi
anno deinde
vnitas sit ex
& aggerati
perlici po
& salices a
humore, &
uerfa via nu
omen vsur

10 foris amula
m iuglandis
nq; ab utroq;
undo sapore,
dalo & persi
nygdalam &
rta via Plinio
rum, quæ fa
uciprunda di
gdalis instra
20 ingeniosius
ut, ut vnas ve
oprium fert
o, nobis co
fferent fru
meres in me

ando necesse
30 die eto trun
lorata adde
Columella ut
ocet. Idq; a
m præcipita
in hortis co
m secare, &
e, atq; ita se
bis, & ferulis
irpem frigo
40 ribus

lucubrationes meas, vigiliasq; & sudores non possum in forum adducere, & vobis ostendere: fuit omnium sententiis absolutus. Nos cultum alium communem, alium singularem dicimus. Dicemus iam communem, dicturi particularem in vniuscuiusq; plantæ historia. Theophrastus necessarias vocat amputationes, purgationes, decacuminationes, stercorations, fossiones, aliasq; curas, quæ arboribus adhibentur. Plinius remedia vocat. Ex his quædam sunt communia omnium, quædam propria quorundam. Communia, ablaqueatio, accumulatio, afflari radices, aut cooperiri, riguis dare potum, vel auferre, fimi succo reficere, putatione leuare onere, & cætera. Sunt & aliquæ arbores, quæ cultum aspernantur, vt aquam, fimum, & circumfossurâ, amputationemque, & omnia remedia odio habent, quin etiam iis necantur, sed ipsa amputatio est, quæ omnes præcedere debet. Quippe quum primû arboribus post fructuum decerpitionem adhibeatur, & Theophrastus de hac primû differendum iubeat, quàm de reliquis agriculturæ officiis, hæc enim consequi, velut deinceps videbitur. Putatione arbores lætiores, & vberiores fiunt, & facie decora, & vitæ diuturnitate præstant: nam quæ onere languidæ premuntur, circumcisis iis, quæ pondere premebant, non iniucundo remedio leuantur, & quæ aliena umbra laborabant, cælum aperiendo respirant. Præterea superflua, & nimis improbè profilitentia amputando, ad ea, quæ relicta sunt, pabulum confluit, vt ad fructificandum natura libere impetum suum faciat. Tanti arborum putationem antiqui fecerunt, vt deam, quæ putationi præesset finxerint, quam Putam vocarunt, Arnobio auctore. Sed videamus quid sit putatio. Putatio est infructifera à fertilibus rescare: auferuntur enim ab arboribus non necessaria, obstantia, fructum sobolemq; impediencia, & quod vile, & absque vitio est, relinquitur. M. Varro, & F. Pompeius putum pro puro dicebant. Hinc Callicranides malos, & nil frugi homines è republica amputandos dicebant, vt improbis hominibus careat, cōducit enim publicæ vtilitati facinorosorum hominum purgatio. Sed putationem ipsam Theophrastus in duas species diuidit. alia eruditio, alia verò putatio. Putationem in alias species ab agricolis distingui prohibet, sed alia ferro, alia manu, alia aduncis quibusdā detrahenda, ne propter siccitatem, & tenuitatem ramulorum laborent vlceribus. Hic enim præarida, & tenella detrahi tantummodo iuuat. Nouellæ arbores, quoad conualescant radices, ferro tentandæ non sunt, nam si priusquam radix firmitatem adepta sit, ferro laceffitur, lædetur stipes, vt pote imbecillis: vbi verò suæ constitutionis specimen iam dederint, putationis curam adhibendam, vt in vitibus flagella adimantur superflua, pulchriora, & maximè idonea relinquantur, sic nulla offensa sequetur, & plus alimenti adea, quæ relinquantur traducetur. Sed plantarum eruditio, siue institutio est tanquam arborum figuratio, & formatio ad altitudinem, latitudinem, & humilitatem. Arbores enim, quæ in enormem excelsum excrescunt, agricolarum cura coercendæ sunt, propterea quod de facultate fructificandi remittunt, fatigato alimento itin-

ris pro-

ris prolixitate, & interea intercepto ab alijs partibus. Sed consulendum germinum & ramorum frequentia, sic vberius fœtificant, & commodius coluntur. excipiendo eas quæ natura sua in proceritatem exultant, vt palma, cupressus, pinus. Adultis arboribus putatio adhibetur, & quum omnium arborum putatio intersit, potissimum ea vitis opus habet, ad hoc natura urgente, quippe quum exuberat in fructu, & germinatione, vt adimendum sit ei, quod videtur manifesto superfluum, quod latius in eius tractatione exequendum erit. Arida arborum partes perpetuò demetendæ sunt, quia iis ablatis rami vuneribus non læduntur, & hærentia nutritionem impediunt. Purgantur arborum rami, qui fructum afferre nequeunt, quiq; importuno situ sese immiscuerunt legitimæ germinationi; oportet enim germina foras erumpere, vnde loca inutilibus occupata euertere operæ pretium est, etiam quæ conferta sunt, quæq; medijs erumpunt, quum legitimo loco non prodeant: omnem enim tum solem, tum spiritum auferunt. Nec solem arboribus adimendū, nec ventilationem prohibendam censemus. Sed post attonisionis præcepta, tempora eiusmodi cultus edoceamus ab eodem præceptore. Id post Pleiades factitandum esse iubet, nam quum molesta sit putatio propter plagas, conuenit tunc temporis fieri, quum arbores validissimæ sunt, tunc enim suis operibus defunctæ, & cura illa fructificandi, germinandiq; se ipsa fruitur tota, sibi soli cauens. Quæ tardiores sunt, lectis fructibus tondentur. sola ficus post germinationem putatur. Nec eadem quantitas omnibus recisæ partis, habitioribus enim plus demetendum: vt myrti, oleæ, punicæ luxuria ferro compescenda, ideo quòd quanto pauciora relinquuntur illis, tantò plura dabunt, quia natura sua stipata germinatione frequentantur. Sed malo, & pyro, minus recidi debet, & aut ferro leuissimè, aut manu superflua detrahenda ratione siccitatis, & corticis tenuitatis, eo enim laeso, facile patiuntur. Arborem annosam totam decidunt: germinare nanque denuò incipit, sed truncum deinde colere, tanquam denuò satum oportet. Leontius Græcus, Post collectos fructus statim magnas, & paruas arbores purgare conuenit. Omne vitiosum, & superfluum acutissimis falcibus amputandum, & nouellis non amplius vno ramulo relinquendum. Auferendæ enim truncorū propagines, vt rectus & lauis surgat. In vertice tres, aut quatuor nouellos ramos habeat illæsos inter se distantes. sic formanda est planta, dum tenera existit. Plinius. Interlucatio arboribus prodest, sed omnium annorum trucidatio inutilissima. Vitis tantum tonsuram annuam quatit, alternam verò myrtus, punice, oleæ, quia celerrimè frutrescunt. Ceteræ rarius frondentur, nulla autumnò. Ac ne raduntur quidem, nisi vere putatione. Plagæ ad vitalia sunt omnia quæcunque non superuacua. Plurimæ amputari sibi volunt onerosa ac superflua, sicut nos ungues, & capillum. Reciduntur veteres totæ, ac rursus à stolone aliquo resurgunt, sed non omnes, nec nisi quarum naturam pati diximus. Sublucatio, propinqua putationi est. F. Pompeius, Sublucare est arborum ramos supputare, & in densi-

rate superfluos per intervalla deputare, quasi sub lucem immittere. Eo enim significatu est interlucatio. Collucare dicitur, quum rami sacræ sylvæ luminis officientes, vel arbores ipsæ succiduntur, ut lucus luce impleatur. Virgilius doctè monet,

*At dum prima novis adolescit frondibus atas,
Parcendum teneris, & dum se latus ad auras
Palmas aget laxis per purum immissus habenis,
Ipsa acies falcis nondum tentanda, sed uncis
Carpente manibus frondes, interq; legenda.
Inde ubi iam validis amplexa stirpibus ulmos
Exierint, tunc stringe comas, tunc brachia tonde:
(Ante reformidant ferrum) tunc denique dura
Exerce imperia, & ramos compesce fluentes.*

Nos autem in putatione his utimur. Quum feritur plantula, ramuli omnes abscinduntur, relicto eo, qui in medio est. Si arbor perfecta fuerit, abscinditur iuxta ramos truncus. Si insita fuerit, ceditur vnus, alter relinquitur, qui rectior, ac vigore præstantior fuerit, nisi punica, vel auellana, vel huiusmodi fuerit, quæ multiplici trunco diffusa relinquitur, suæ exilitatis causa. Tertio deinde anno quum rectè apprehenderit, putatio adhibeatur. Interim tamen si in crure ramuli aliqui creuerint, decidantur, solum ij, qui circa caput sunt, relinquantur. 20
Primo à crure incipiendum, & si ibi stolones adhæserint, præcidantur, nam si relinques, matrem necabunt. Si verò truncus annosus fuerit, hunc recide, illos foue: nam rectè germinabunt, & latius consurgent. Ramus si tener fuerit, cultro vno ictu refecetur, si vetus, serra, leueturq; plaga sectura inuersa, ne aquam, quæ truncum putrefacere posset, contineat. Quæ nascuntur per truncum, aut ramos, abradantur, ut crescens cortex vulnus integat, ne cicatrix appareat. Truncus solus à terra erectus formandus ad altitudinem, ad quam consideratur, lato solo altior, sicco breuior, atq; secundum arboris naturam: nam sunt quæ in altum excrecant, & quæ humiliter subrepant. In capite relinquendi sunt tres, vel quatuor rami, ut crescentes dilatentur debitis locis, & inter se 30
distantes. Sed si truncus nouæ plantæ, vel nitens trunci ramus non rectè abeat, pali figendi sunt circa crus, & vinculis alligandi, ut illud quod sponte facere nequit vi faciat. Sic tandem truncus in ramos, rami in virgas, & virgæ in furculos diuidantur, & ubi vento aut casu, naturæve perit ramus, facito ut crescens locum repleat. Rami soli relinquendi, qui ad trunci substantiam, & soli sufficiunt, reliqui, qui importunis nascuntur locis, recidendi.

De fossione. C A P. XXXI.

POST putationem fodimus. Cicero in Catone, Quid agri fossiones, repa-
stationesq; proferam, quibus sit multo terra fecundior? Fossio est ter-
ræ inuersio, atq; comminutio. Sed fossio duplex, vna, quæ adultis, altera, quæ 40
nouellis

novellis arboribus
stercus adicien-
tibus vulnere a-
natur eius loco
omnibus arbori-
limentum. Præ-
ei; permistus
sunt; solum c-
& vliginosum,
non debet, si-
cum humecta-
ntas. Nam c-
& castaneæ,
quod lignis
atq; degener-
miliori statu-
nam melius.
Martio men-
tibus arborib-
radices perur-

FOSSIONE
atio fossio
dicè dolabra
ut solistepori
calzare. Hin-
fossis, quæ ci-
phrastus nou-
bores omne-
diore fiant.
ficiari sunt
impeditur
re effundit
minuta se-
quavis in-
dæ, ne agri
fructuarij
sic ead. m-
enim prod-
tibus locis
ablaqueant

nouellis arboribus exhibeatur. Monet nos Theophrastus, post amputationem
 stercore adiciendum, vel alium cultum continuò adhibendum, vt languescen-
 tibus vulnere arboribus, alimenti instauratione mediceantur, & aliquid repo-
 natur eius loco, quod ablatum est, maleficiumq; resarciatur. Fossionemque
 omnibus arboribus prodesse scribit: nam tollit quæ impediunt, & auferunt a-
 limentum. Præterea terra vt madescat, efficit, terræ enim agitatione subit aër,
 eiq; permixtus humorem, & alimentum facit, quapropter strigosum, siticulo-
 samq; solum crebro subigendum retur, vt aëre perfletur. sic etiam palustre,
 & vliginosum, quoniam aqua diducitur, absumiturq; à sole. quod mirum vide-
 10 rinon debet, si contrarium effectum faciat, nam desiccat quod vdim est, sic-
 cum humectat. Alia accedunt quoq; iuuamenta, arboris robur, & fructus bo-
 nitas. Nam coria & testæ, quæ sunt extrema fructus munimenta, vt amygdali,
 & castaneæ, mitiora tenuioraque fiunt, & fructus interdum augescunt, quia
 quod lignis demitur, additur pulpa: corno excepta, quæ fossione ægrescit,
 atq; degenerat, quum plus alimenti acquirat, quàm ei opus sit. Sed eis, quæ hu-
 miliori statu contentæ, vt sunt suffrutices & herbæ, sarculatio adhibenda est:
 nam melius conualescunt. Tempus autem fossionis non idem vbique. Aliis
 Martio mense, vt vberem & venustū pariant fructum. Aliis hyeme, vt sitien-
 tibus arboribus cibum & potum præbeant. Æstate nunquam, ne solis ardor
 20 radices perurat, sed pingue solum sese rueri possit.

De ablaqueatione. CAP. XXXII.

FOSSIONEM sequitur ablaqueatio, tanquā species genus. Est enim ablaque-
 atio fossionis species. Ablaqueatio, Palladio auctore, est circa arboris ra-
 dicē dolabra terrā diligenter aperire, & purgatis omnibus, velut lacus efficere,
 vt solis teporibus, & imbribus, puocentur. Itali excaudicare appellant, nos *dis-*
calzare. Hinc satis apparet, nō à laqueis vt pleriq; putant, sed à lacubus, hoc est
 fossis, quæ circa arboris radicem aperiuntur, hoc nomē esse deductum. Theo-
 phrastus nouellis, & adultis arboribus conuenire dicit. Dum nouellæ sunt ar-
 bores omnes ablaqueantur, refecanturq; radices post cōsitionem, vt profun-
 30 diiores fiant, & plus capiant incrementi, præcipuè illæ, quæ suapte natura super-
 ficiariæ sunt, vt inuitæ cohibeantur. Quod studiū vitibus, & oleis potissimum
 impenditur. Depactis verò & stabilitis, quotannis auferenda sunt, quæ teme-
 re effunduntur, quo fiant plures, & fortiores, quæ inferiores sunt. Hæ nanq; &
 minutæ superiores illas interimunt, nec ipsæ quidem sibi satis cōsulant, quum
 quauis in tempe frigiditatis æstus veladantur. Si quæ fibræ sicca sunt, auferen-
 dæ, ne agnatae offendant, & vermiculos creent: nec radices recidendæ, vt in-
 fructuarij rami, & quæ bonæ frugis significationem non dabant, quum non
 sit eadem cum radicibus ratio. Quippe præstat intactas relinquere: vnde quaq;
 enim prodeat radix, modo valida sit, pabulū suggerere poterit. Plinius, Feruen-
 40 tibus locis accumulans æstate radices, operiuntq; ne solis ardor exurat. Aliubi
 ablaqueant, perflatusq; admittunt. Idē hyeme cumulis à gelu vindicant: con-

tra illi hyeme aperiunt, humoremq; sitientibus querunt. Vbicunq; circumfo-
diendi arbores ratio, in circuitu pedes in orbē ternos, neq; id in pratis, quando
amore solis humorisq; in summa tellure oberrant. Ablaqueandi tempus Co-
lumella autumnale præfinit in vitibus, & ante idus Decembris lacusculos illos
& quādos, quod nos in aliis arboribus obseruare poterimus. Sunt arbores, quā-
minus, vel plus hanc curam de siderant, quam nos in singularum historiis de-
scribemus.

De stercoreatione. CAP. XXXIII.

POST ablaqueationis leges stercoreationis ineamus rationē, rem sanē im-
mundissimam, sed vtilissimam agriculturæ, aruis, pratis & arboribus. Et si
nostra tempestate quamplurimi vilissimi agricolæ pertractare vereantur, olim
tamen ea regias manus fœdauit. Iam apud Homerum, inquit Plinius, regius
senex agrum ita suis manibus latificans reperitur. Augeas in Græcia Rex ex-
cogitasse dicitur. In Italia verò Hercules diuulgasse, quæ Regi suo Stercutio
Fauni filio ob hoc inuentum immortalitatem tribuit. Ex Augustino in libro de
ciuitate Dei: alij Stercen, & Stercutium Picī patrem vocarunt, deumq; agricul-
turæ dixerunt. Macrobius verò Saturnum Stercutiū Romanos vocasse, quod
primus stercore agros fœcundandi rationē inuenerit. Seruius verò Pilumnū,
Pilumni fratrem stercoreationē inuenisse scribit. Sed vtilitatem stercoreationis
describamus. Hippocrates rerum naturæ cōsultissimus inquit, Terra fimo sa-
triata, calorē satis subministrat, & frigus, geluq; propellit, quod alioquin arbo-
ribus nocens futurū erat, languescentibusq; illis subuenitur. Duplicem narrat
Theophrastus vtilitatē, nempe ad faciendum solutam terram, & ad excalefa-
ciendū, ex quibus manifestē fertilitas exoritur. Præterea quum fructus emol-
lire, vel adimere acinorum lignum, vel dulcem ex amaro efficere volumus, vti-
mur eo. Quintilij, Bonam terram sterco meliorem facit, vitiosam verò emen-
dat. Sed fimo rum differentias prosequamur, vt potissimum ille fimo eliga-
tur, qui cuiq; plantæ conueniat. Theophrastus stercoreis qualitates ita determi-
nat. Hominis sterco vt Chartodras ait, omnium optimum est, secundum suil-
lum, tertium capratum, quartum ouium, quintū bouum, sextum iumentorum.
Stipularius fimo diuersus, diuersoq; modo additur. Quidā enim illo debilior,
quidam efficacior est, sed id omnibus in confesso est, fimo haud mordaci calo-
re præditum esse oportere, sed tenui, faciliq; ob id ruminantium præcipuē
capi. Ex Quintiliis habetur, Optimum sterco est auium, præter aquaticarum,
& anserum propter humiditatem, et si aliis immistum nō aspernendum. Præ-
stat omnibus columbinum, quia calidum. Secundo loco à columbario est hu-
manum, illi simile, sed perdit herbas. Tertia laus asinino, natura feruentissimo,
& plantis conuenienti. Quarto loco caprinum, acerrimum existens. Ei conse-
quens ouillum, quod pinguius sit. Post hæc bubulum. Suillum præstantius
est his, sed ineptum propter nimiam caliditatem, nam perurit sara. Vilissi-
mum omnium equorum mulorumq; sed acrioribus vtiliter admiscetur.

M. Var-

M. Varro è Cassii opinione, volucrum esse optimum ait, præter palustrium, ac nantium. De hisce præstare columbinum, quod sit calidissimum, ac fermentare possit terram. Ex sua autem opinione præstare ex auariis turdorum ac merularum, quod sit non solum ad agrum utile, sed etiam ad cibum ita bubus, & suis, ut fiant pingues. Sic secundum columbinum, Cassius scribit esse hominis. Tertium caprinum, & ouillum, & asininum, minimè bonum equinum. Columella, Tria stercoreum genera præcipua, quod ex auibus, quod ex hominibus, quod ex pecudibus confit. Animum primum habetur, quod ex columbariis egeritur. Deinde quod gallina, cetera q; volucres, edunt, excepta tamen palustribus, aut nantibus, ut anatis & anseris: nam id noxium quoque est. Maxime tamen columbinum probamus. Secundum quod homines faciunt, si & aliis villæ purgamentis immisceatur, quoniam per se natura est feruentioris, & ideo terram perurit. Tertium locum pecudum sterco obtineat, atq; in eo quoq; discrimen est. Nam optimum existimatur, quod asinus facit, quoniam id animal lentissime mandit, ideoque facilius concoquit. Post hæc, ouillum, & ab hoc caprinum, & mox ceterorum iumentorum, armentorumq;. Deterrimum ex omnibus suillum habetur. Plinius nil noui, nisi quod ex M. Varrone, & Columella excipit. Idem quoque Palladius. Nunc sterco quod cuiq; conueniat differendum. Theophrastus, Fimiratione in eunda est ex cuiusq; arboris natura, non enim ut eadem aqua omnibus confert, ita & sterco idem, sed disponendum, ut de solo supra diximus, variaturq; etiam per ætatem differentias, unde nouellis plantis leuissimum simum apponunt, quare à ruminantibus petendum, est enim eorum leuissimum, debilis enim planta leuissimum simum poscit. Vites quarto quoq; anno stercoantur, aut ferius, læduntur enim si frequentius, nec ullum erit in aquis præsidium, ut in genere arborum, sed nibiloscius vruntur, ob id dictum est stercorationem magis facere pro humidis locis, sicci enim agri simili periculo obnoxii sunt, nisi leuentur æstus imbrium beneficio. Nec tamen continuanda est sterco ratio arboribus, vreret enim eas: etsi continua sterco ratio minimè noceat aruis: quippe quum in aruolatè spargitur simus, facile absumitur: in agro verò arboribus confito subit ad radices, atq; ibi vis aliquandiu perstat, ac calore aucto exuruntur. Segetes verò simo affatim saturatæ, nisi pluuiarum copia diluantur, pereunt, quare tempestatibus pluuiosis crebrior sterco ratio utilior, & eandem ob causam in tenuibus terris, & æstuosis locis parcius agendum. Absurdum fortasse videbitur hac ratione: valentissimum quodq; plurimum confert validissimo, plantarum genus validissimum est, ergo validum sterco ei aptum. Sed sterco sicciora vrunt: arborum natura sicca est: quocirca ne ole-ribus quidem adhibetur absq; humore, atq; etiam quia multum appetunt humidi, quum natura humida sint, ideo quotidiana egent rigatione. Varro columbinum sterco fermentare posse terram scribit: equinum minimè bonum, sed in segetes, in prata enim vel optimum, ut ceterarum veterinarum, quæ or-

deo pascuntur, quod multam facit herbam. Columella columbinum terram fermentare reperit. Aptior surculis hominum vrina, quam sex mēsis passus fueris veterascere, si vitibus, aut pomorum arboribus adhibeas: nullo alio magis fructus exuberat, nec solum ea res maiorem facit prouentum, sed etiam saporem, & odorem vini, pomorūq; reddit meliorem. Potest & verus amurca, quæ salem non habet, permista huic commodè frugiferas arbores, & præcipuè oleas rigare: nam per se quoq; adhibita multū iuuat. Sed vsus vtriusq; maximè per hyemem est, & adhuc vere ante astuos vapores, dum etiam vites, & arbores ablaqueatæ sunt. Palladius, Stercus asinorum maximè hortis conuenire, sterlus quod anno requieuit, segetibus vtile esse, nec herbas creare, si ventustius sit, minus prodesse. Pratis recentia stercorea proficere ad vber herbarū. Plinius sequitur Varronem. Nunc stercorationis modum, & quantitatem indicemus. Theophrastus de vtendiratione ambigit, nec eandem esse: nam alii arboribus apponunt admista terra. Alii effossam terram inter eandem, & inferiorem in medio simum indunt, super quem etiam reponunt exemptaterram, eoq; consilio faciunt, vt neq; à sole dissipentur genitales partes simi raptæ in vapores, si supra terram esset, neq; diluatur imbribus, neq; abeat. In superficie verò sparsum à sole dilui, ab aqua elui. Id tamen omnes affirmant, stercore non vehementi, sed miti vtendum, vt eorum, quæ ruminant. Plinius, Gaudent simo plantæ. Sed cauendum ne in feruore solis admoveatur, ne immaturum, ne validius, quàm opus sit. Vrit vineas suillum, nisi quinquennio interposito, præterquam si riguis diluatur, & è coriariorum sordibus, nisi admista aqua. Item largius. Iustum existimant in denos pedes quadratos tres modios. Id quidem sola natura decernet. Columbino ac suillo plagis quoq; arborum medetur. Quintili verò, Non acruatim, sed densius stercoreandum. Terra non stercoreata riget, nimium stercoreata comburitur. Oportet eum, qui plantas stercoreat, non statim ad radices sterlus iniicere, sed puram terram immittere sufficientem, & tenuè, dein sterlus, postea rursus id ipsum terra occultare, ita non comburentur plantæ. Stercus columbinum non præparatur, sed quale est sinentes, vnà cum semine in aruum iacitur rarius. Humanum sterlus in Arabia hoc modo præparant: primo exiccant, postea aqua macerant, rursusq; siccant, & id aptissimum vitibus existimant. Sed præstat obominationem aliorum stercoreum mistura eius odorem mitigare. Illud præ omnibus obseruari oportet, ne annuo stercore vtantur agricola, quia nullius utilitatis est, immò etiam affert detrimenta: nam plurimas bestiolas & serpentes gignit. Triennale, & quatuor annorum valdè bonum est: nam longiori tempore quicquid fœtidum erat, euaporat, & quod durum erat, emollitum est. M. Varro columbinum vt semen aspergi in agro oportere, non vt de pecore acruatim poni docet. Virgilius,

*Quod superest: quacunq; premes virgulia, per agros
Sparge simo pingui, & multa memor occulte terra.*

Columella

V
Columella h
quia per se nar
nos oportet, la
stercoretur, ma
dice facere. Ne
rè desideret, alt
ror quod per se
dem habet. Sed
omnino cenlet
le la pratis debere
Idus Septembri
Luna hinc e
rio mense tan
tempore face
Lunaq; decre
obseruatione
Columella; Pa
modè frugifer
multum iuuat
astuos vapores
profuit cineris
præbet, & si ha
compitisq; con
decidere, & pe
sæpenuero sa
atq; ita nò solū
ficiebat. Iam
pedicissimam
& inaruerit id
rationis exhib
florè rubrico
riter ipsum p
diores gleba
soluantur. P
vicem sterc
ta respuerin
stercus, tum
nerem furn
nū, quod est
affundit, im
stipula post

Columella humanum stercus aliis villæ purgamentis immisceatur monet, quia per se naturæ est feruentioris, & iccirco terrâ perurit. Nec ignorare colonos oportet, sicuti refrigerare agrum, qui non stercoreatur: ita peruri, si nimium stercoretur, magisque conducere agricolæ frequenter id potius, quam immodice facere. Nec dubium quin aquosus ager maiorem eius copiam, siccus minorem desideret, alter quoddam assiduis humoribus rigens, hoc adhibito regelatur, alter quod per se tepens siccitatibus, hoc assumpto largiore torretur. Plinius eadem habet. Sed stercoreationis tempus doceamus. Post purgationem stercoreandum omnino censet Theophrastus, ut se recreari pabulo possint arbores. Columella la pratis debere iniici mense Februario, Luna crescente, lupinis exili loco circa Idus Septembris. Plinius. Fimū miscere terræ plurimū refert, Fauonio flante, ac Luna siccante. Id plerique prauè intelligunt à Fauonii ortu faciendum, ac Februario mense tantum, quum id pleraque lata aliis postulent mensibus: quocumque tempore facere libeat, curandum, ut ab occasu æquinoctiali flante vento fiat, Lunaque decrecente, ac sicca. Mirum in modum augetur vbertas, effectusque eius obseruatione tali. Nunc res annumerabimus, quæ etiam vires stercorei præbent. Columella; Potest & vetus amurca, quæ salem non habet, permixta huic commode frugiferas arbores, & præcipuè oleas rigare. Nam per se quoque adhibita multum iuuat. Sed vsus vtriusque maximè per hyemem est, & adhuc vere ante æstiuos vapores, dum etiam vites, & arbores ablaqueatæ sunt. Quin etiam satis profuit cineris vsus & fauile. Frutex verò lupini succisus optimi stercoreis vim præbet, & si hæc omnia defuerint, licet quamlibet frondem, licet è vepribus, compitisque congesta colligere, licet filicem sine iniuria vicini etiam cum officio decidere, & permiscere cum purgamentis cortis. M. Columella eius patruus sæpenumero sabulosis locis cretâ ingerebat, cretosis, ac nimium densis sabulum, atque ita non solum segetes lætas excitabat, verum etiam pulcherrimas vineas efficiebat. Iam si deficiatur omnibus rebus agricola, lupini certè præsidium expeditissimum non deest, quod quum exili loco, circa Idus Septembris sparserit, & inaruerit, idque tempestiuè vomere, vel ligone succiderit, vim optimæ stercoreationis exhibebit. Succidi autem lupinum sabulosis locis oportet, quum secundum florē rubricosis quum tertium egerit. Illic dum tenerum est conuertitur, ut celeriter ipsum putrescat, permisceaturque gracili solo: hic iam robustius, quod solidiores glebas diutius substineat, & suspendat, ut eque solibus æstiuis vaporatæ resoluantur. Palladius, Maris purgamenta si aquis dulcibus eluatur, mixta reliquis vicem stercoreis exhibebunt, & limus, quæscaturiens aqua, vel fluminis incrementa respuerint. Quintilius, Quidam magnam, & altam fossam efficiunt, eoque omne stercus, tum præstantius tum deterius imū defundunt, ac putrefaciunt, sed & cinerem furnorum, & cænum, & omnium animalium stercorea, præ omnibus humanum, quod est magis vtile, & omnes plântas, & præcipuè vites, & humanam vrinam affundunt, immo etiam coriariorum recrementa, ac sordes superiiciunt. Multi etiam stipulam post messem euellam pecori substernunt, quo concalcata, & per vrinam

computrefacta stercus fiat, & cum prædictis omnibus in fossam demergunt. Et si cœnosa aliqua immundities, siue etiam ex paleis, spinis, aut lignis, aut farmentis fuerit, etiam his adiiciunt, sed & algam e mari, etiam cum adhaerentibus sordibus eiectam, aqua dulci diligenter elotam immiscent, & post omnium prædictorum in fossam misturam, aquam dulcem superingerunt, qua vna omnia putrescant. Postea verò sarculis eo vsq; mouent, donec totum commistum, & vnitum stercus succulentum fiat, valde enim prodest imbres, riuos ex viis ad sterquilinum deriuare: hæc enim aqua limosa existens stercus iam mistum augebit, & ultra putrefactione addita, melius reddet. Varro, Si in sterquilinum robusta aliqua materia sit depacta, negant serpentem nasci. Columella, Omnia in prædictum locum concauum congerenda, & assiduo humore satianda sunt, vt herbarum semina culmis, cæterisq; rebus immista putrescant. Æstiuis deinde mensibus non aliter, ac si repastines totum sterquilinum rastro permisceri oportet, quò facilius putrescat, & sit aruis idoneum. Hæc eadem Plinius, & Palladius.

De irrigatione. CAP. XXXIII.

DIXIMVS de cibo, nunc de potu plantarum, quia post stercorationem irrigatio administratur. Inter ea, quæ cultui maximè necessaria sunt, aqua esse nemo est, qui ignoret. M. Varro in sui de Agricultura operis limine lympham precatur, quoniã sine aqua omnis arida, & misera agricultura est. Hanc necessitatem veteres Poëta suis figmentis ostendere, Herculem cum Acheloo sub tauri forma decertasse fingentes, & huius alterum cornu effregisse, quod postea vuarum, & omnium malorum, ac fructuum refertum Ætolis dederit. Cuius veritatem Diodorus Siculus ita deregit. Hercules in gratiã Chelidoniorum Acheloum amnem in alium cursum direxit, vt longè plures agros ex fluminis irrigatione feraces reddiderit. Veteres etiam Acheloum primitus aquam vocabant, Seruio referente. Ambrosius in Hexamero. Aqua nutrit omnium virgultorum, & diuersos singulis vsus ministrat, vel e terra scaturiens, vel nubibus effusa descendat. Quippe radices alit, dat omnibus vires, radicem impinguat, caudicem prouehit, ramos diffundit, folia virefcere facit, fructum alit, semina pomum augere facit. Lucretius,

Et nisi tempestas indulget tempore fausto

Imbribus, & tabes nimborum arbuta focillant,

Crescere non possint fruges, arbuta, animantes.

Sed aquarum utilitates, & diuersitates tractemus. Est irrigatio naturalis vna, ab arte altera. Naturalis est, quæ ex cœlestibus, & terrestribus aquis fit, sunt enim cœlestes aquæ pluuiæ, & harum imitabundi rores, terrestres verò fluentia, riui, & priuatim Ægypto stagnantes aquæ. Quæ ab arte fiunt, irrigationes sunt, quæ ductiles, & aspersiles sunt, quum videlicet pluuiæ defunt, suppleantur arte irrigationis. In cœlestibus aquis consideranda sunt quantitas, quali-

quali-

V
qualitas, aut tri
parvum diei, &
minatione cœle
dulcis, aut mix
frigiditas. Sed
phrasidoe tri
tem. Imbrium
ter, quod vbi a
aquilonia plu
enim vt planta
ipla melius co
siccat, neq; di
ficere sinunt.
Imbres maxi
na pluuiæ di
sole illico non
germinatione
rum ordo pos
accedit, sed no
10 consummato
cadunt, marce
florescentibus
& quæ non ca
conueniunt, q
bus idem tem
ratio tempest
plantarum ali
& aluminosa
uata natura
30 Ei enim est fl
terra nasci
res quoq; vi
quas extrah
maritima
rum ad rob
marinas. S
viuunt, sed
exiccat eni
rum oleib
40 & brassica
quit: salas

qualitas, austrina, vel borealis, tempus, vel anni, vt hyemis, & æstatis, & eius partium diei, & noctis, vel plantarum respectu, si ante vel post, vel in ipsa germinatione contigerit. In terrestribus considerandus est sapor, siue salus, siue dulcis, aut mixtus, puritas, vel impuritas, caliditas Solis, ignis, vel Austri, vel frigiditas. Sed quæ ab arte, secundum tempus, & modum. Sed hæc ex Theophrasti doctrinæ placitis eliciemus, ipsumq; audiamus à quantitate exordientem. Imbrium vberitatem arboribus prodesse, vel hinc etiam considerari oportet, quod vbi affluentes fuerint, arbores hilariores, & meliores se habent. Sed aquiloniæ pluuiæ austrinis commodiores sunt plātis, quia frigidiores, faciunt enim vt plantæ amplius oblato sibi humore potiantur, cum fructus & plantæ ipsæ melius consent ac valeant omnes. Item superuacuum detrahunt atq; assiccant, neq; diu id insidens humefacere patiuntur, neq; æstu solis concoctū assicere sinunt. Austrinis verò humescunt plantæ, & imbecilliores redduntur. Imbres maximè tempestiuæ sunt hyberni ob causam antè expositas. Nocturna pluuiæ diurnis præstant, quia humore diutius frui permittuntur, quum à sole illico non absumantur. Proxima verò bonitate eæ sunt aquæ, quæ ante germinationem eueniunt, his enim germinatio lætius agitur. Tertius pluuiarum ordo postq; flores lapsi sunt, quia fructuū consummationi iam pabulum accedit, sed non illicò, sed vbi fructus paulò robustiores facti sunt: nam si non consummato fructu inceserint, aut cadunt nimio humore obruti, aut si non cadunt, marcore corripuntur. Intempestiuæ eæ sunt pluuiæ, & pessimæ, quæ florecentibus ingruūt: pereunt enim, aut labuntur, vel rubigine marcescunt, & quæ non cadunt, degenerant, præter pauca. Sed feris fructibus seræ pluuiæ conueniunt, quum plus alimenti concoctionis desiderent, & quum nō omnibus idem tempus perfectionis. Non igitur omnibus plantis eadem pluuiarum ratio tempestiua est. Terrestres aquæ haud exiguum sibi partem vendicant ad plantarum alimenta & incrementa, quarum differentiæ multæ. Nitrosæ autē, & aluminosæ, neq; plantas alere, neq; gignere possunt, exceptis quibusdā priuatæ naturæ plantis, quibus quoq; priuata deberi alimenta par est, sicut mare.

30 Ei enim est sua genialis facultas, vt suas sibi plantas peculiares gignat, quæ in terra nasci nequeant. Et locis iis quibus reciprocatur mare fructuosissimas arbores quoq; videre licet, nisi quispiam dixerit, ex interiori terræ sinu dulces aquas extrahere mare ipsum, quum circumfunditur, nihil nocere. Sunt & quæ mari vicinæ nascuntur, salugine quodammodo vtentes, tum ad alimentum, tum ad robur, videturq; hoc quasi medium genus inter terrestres plantas, & marinas. Salsugo etiam plantis alimentum præbere potest, quæ in mari non viuunt, sed terrenis ipsis, minus tamen, ac minus bonum, quàm aqua dulcis, exiccat enim, atq; incrementum prohibet. Confert autem tum arboribus, tum oletibus, sed his minus, quia minus arboribus robusta sunt, vt palmæ, & brassicæ. Sed Androsthenes in Thilo Erythrei maris insula scriptum reliquit: salas rigationes plus conferre, quàm pluuiæ aquas arboribus, her-

bisq; & agricolas post pluuias inducere riuos eiusmodi in sata. Sed id consuetudini tribuendum iudico, quæ naturam superat. Solæ supersunt potabiles aquæ, & inter eas frigida optimæ sunt, frigus enim concoctionis est author, quia introrsum ad radices calorem soluit, & obsidet, & excalefactas exuētās; radices refrigerat: argumento, olera, radices, & fructus frigidarum aquarum irrigatione dulcescere. Et si supra commendabantur boreales aquæ & nocturnæ, & frigidi status probabantur, par ratio & in irrigationibus. Eadem ratione aquæ flatūsve calidi diffundunt, humefaciunt, & insitum calorem debilitant. Sed quæ potui idoneæ sunt, si salis admisceantur, vel si peregrinis aliis qualitatibus huiusmodi vitientur, non alunt, sed lædunt. Sed aquarum mistio tunc vilis est, quum alia cruda, & contumax existit, & alteri molli placida, & quæ iniectione limo turbida, & fimosa est, miscetur: sic tenues crassioribus congruent, vt putealis tenuitas admisceatur lutulentis scatebris, & fluuiialis crassities pluuiali. Sed id admirabile quoque est, si qua potabilis aqua ad plantarum alimentum inutilis sit aut non perfecte hoc fungatur officio, vt in aquis, quæ ad Pyram sunt, perspicitur: quod ex duabus causis euenire potest: aut enim à raritate, quod inuerti simile non videtur, aer quippe rarissimus, alere tamen posse putatur: aut quod saporem aliquem noxium habeant, qui gustatu hominem latet, quod deprehenditur experimento in prædicta aqua, qui nanque homines ea lauantur, fiunt scabiosi, & plantæ quoq; proximum quendam accipiunt habitum. Nec rectè putabit aliquis ab ea nimium confieri nutrimentum, adeo vt concoctrix virtus plantarum superetur, atq; virtute obtusa consequatur tabes. Estate verò fluentibus aquis vtendum non absque ratione, siccis enim temporibus plantæ humore opus habet, ad fructuum educationem. Sunt verò qui penitus tunc rigationem abdicent. Sed consuetudinis habenda ratio, quia illa est iam altera natura, proinde nec intermittenda si plantæ rigari solita sunt, nec rigare si non sint solita: vt rous modo, vt robig; minus rectè fieri potest. Arbores siccis locis degentes, quia succo egent, nil aliud querunt, quam quod opus necessario habent, sed irrigatione fructus deteriores redduntur, quemadmodum quæ non consueuerunt rigari, si rigentur. Sed si occiperis, perseverandum: nam & alimentum substituitur. Aliæ magis simum, quam aquam diligunt, aliæ minus, vt cupressus, quæ nullo pacto simum, neq; aquam concupiscit, sed etiā emori dicitur, si copiosè nouella adaquetur. Punica & vitis aquam diligunt. Ficus quum rigatur, magis germine viget, sed fructum deterioremparit. Omnis cultura pro natura cuiusq; propria imponenda. Plinius ex Theophrasto hæc traduxit. Circa Vergilias quidem plueret, inimicissimū viti & oleæ: quoniam tunc coitus est earum. Hyeme imbres expetēdi euident causa est: quoniam arbores factu exinanitas, & foliorum quoque amissione languidas, naturale est auide esurire. Cibum autem earum imber. Nec per solstitia imbres vitibus conducunt. Tempestinæque hybernæ primū imbribus, deinde germinationem antecedentibus.

tribus. Tertium
factu. Quæ
& serotina
boribus diuersi
propter idem
sicut in pyris.
quidē omnia
quilonē & ultra
(sunt enim ple
urnis. Magis
dicina raphan
uitati, & feru
lissimæ ex iis
gno, & qua
puē tamen i
aqua sole. Pl
dicant, & st
neri, præsert
pitu sparsum
causas repete
que, nihil in p
mitioni refer
lucens, seu iu
exhaurit, ita
crascescant, q
ferentiam en
pabulum pec

De morbi

30 Iam libe
rimaque
remedia de
diuersis m
ne sua pro
veluti mi
ab aggritue
nisi aduicis
nit, vt eis ta
richtentur
40 vt semper n

tibus. Tertium tempus est, quum educant poma, nec prorinus, sed iam valido fetu. Quæ fructus suos diutius continent, longioresq; desiderant cibos, his & serotina aqua vtiles, vt viti, oleæ, punicis. Hæ iam pluuia generis cuiusq; arboribus diuerso modo desiderantur, aliis alio tempore maturantibus. Quapropter iisdem imbribus quædam lædi videas, alia iuari, vt in eodem genere, sicut in pyris. Alio die hyberna quærun pluias, alio verò præcocia, vt pariter quidē omnia desiderent. Hybernū tempus est ante germinationem, quæ Aquilonē Austro viliorem facit. Ratio eadem mediterranea maritimis præfert (sunt enim plerūq; frigidiora) & montuosa planis, & nocturnos imbres diurnis. Magis fruuntur aquis sata non statim auferente eas sole. Peculiaris medicina raphano, betæ, rutæ, cunilæ in salis aquis, quæ & alioqui plurimum suauitatis, & fertilitatis conferunt. Cæteris dulcium aquarum rigua profunt. Vtilissima ex iis, quæ frigidissima, & quæ potu suauissima. Minus vtilis è stagna, & quas elices inducunt, quoniam herbarum semina inuehunt, præcipue tamen imbres alunt. Hora rigandi, matutina atq; vespera, ne inferuescat aqua sole. Pluias coruscante fulgetro demissas frugum altrices agricolæ prædicant, & stultum prorsus dicunt quemquam harum rerum admiratione teneri, præsertim videntes in his affectionibus aquam rem mollem aspero crepitu sparsū ignem eiaculari. Sed Plutarchus ex intimo Philosophiæ pœnū causas repetens inquit, Irrumpentes in tonitru aquas feraces esse fecundasque, nihil in præsentiarum adduci potest euidentius, cuius causam ignis permissioni refert acceptam. Quippe purus ignis ac pernix ruit in fulgetrum illucens, sæuiunt procellæ, inibiq; ventus obuersans frigus domat & humorem exhaurit, ita vt germinantibus suauitatem quandam adferat, qua maturius crassescant, quandoquidem & temperaturam, proprietatem, & succorum differentiam emergentibus satis talia conciliant, non aliter, quàm rores dulcius pabulum pecori subministrant.

De morbis & corruptionibus plantarum, & primo de iis, qui secundum naturam, & sponte eueniunt. CAP. XXXV.

30 **I**AM libro finem imponeremus, nisi cultus pars altera, & præcipua, maximaque superesset, scilicet quæ morbos, & corruptiones demonstrat, & remedia docet. Affliguntur enim plantæ omnes veluti animalia, non vno, sed diuersis morbis, & communibus, & peculiaribus: vnde expedit agricolam, ne suæ prolis enector habeatur, erga plantas quas seuit, inseuit, & coluit, veluti misericors paterfamilias erga suos liberos, medici officio fungi, & ab ægitudinibus eas liberare. Nihil enim procreasse, & coluisse profuerit, nisi adultis, & morbo languentibus subueniat: nec indigentem esse conuenit, vt eis tardè opem ferat, ne quum morbi inualuerint, longa tæbe de vita periclitentur, seroq; eis medicina paretur. Sed ad morbos transeamus, ex quibus, 40 vt semper nobis moris fuerit, tabellā proponemus, quo magis quicquid dicturi

sumus, elucescat. Morbi vel syluestrium vel mitium arborum sunt. Dicamus primò de syluestribus, quia pauci vel nulli sunt. Theophrastus ait esse qui syluestribus morbos accidere negent, sed malè affici dicant, quum antequam germinant, vel sub ipsa germinatione, grando, aut flatus prægelidus, aut feruidus innasit: vincuntur enim ab intemperie. Contra hyems tempestiua tam agrestibus, quàm satiuis prodest: nam constipando, & condensando interna fouet principia, vnde proba germinatio prouenit. Plinius ab eo, Infestantur nanq; arbores & morbis. quid enim quod genitur caret his malis? Et syluestrium quidem perniciosos esse negant, vexariq; tantum grandine in germinatione, aut flore. Aduri quoq; feruore, aut flatu frigidiore præpostero die, quoniam sua frigora etiam profunt. Nobis quoq; quod arboribus idem hominibus accidere videre licet. Rustici enim nō ita frequenter, nec leuiori quauis de causā, velut vrbani languescunt. Sed vrbani morbi, & interitus plures sunt, eosq; diuidendo dicimus: Morborū principia partim intus esse, partim extrinsecus. Nos primū de intrinsecis loquemur morbis, proximè de reliquis. Interni morbi principium est, si alimenti copia, vel inopia, aut qualitatē plus, minūve acceperit. Est genus arborum, cui interitus spontè, & secundū naturam euenit, non villo pacto afflictato, & nimia bona habitudine, quum piceæ radices succi copia in tedam abeunt, quæ vt quædam animalia pinguedine suffocantur: quum enim transpiratione vt non possint, nec alimentum transmittere, quum sint venarum oscula pinguedine angustata, & obducta, moriuntur. Est & præter prædictam alia corruptio, quæ euenit propter nimiam ferturam. Fœcundum omne dicimus naturā legibus brevis æui, quum enim omnis humor largius fructificando absuitur, inanitione exarescit: vt oleæ nouellæ nimia pereunt fertilitate, quum succus, qui matribus debetur, exhauritur in sobolē. Sed corruptio hæc videtur, nec naturalis, nec extrinseca, violentaq;: sed arboribus accidere quod nimia fœcunditate exsuctæ moriantur. Adiungitur & alia causā, quod aëris, cœliq; blanditiis plus quàm modicum sit ad generationem citentur. Sed nil referre arbitramur, dicamus naturalem esse, aut præter naturam, aut mediam inter naturalem, & non naturalem. Plinius ab eo. Aliquæ verò & obesitate, vt omnia, quæ resinam ferunt, nimia pinguedine in tedam mutantur, & quum radices quoque pinguescere cœpere intereunt, vt animalia nimio adipe.

Extrinseci morbi qui fuerint naturales, & de publicis morbis, syderatione, mortificatione, & vermiculatione. CAP. XXXVI.

DIXIMVS de intrinsecis, nunc de extrinsecis. Morbi igitur extrinsecus aduenientes sunt, aut secundum naturam, aut præter naturam, & violenti: nam qui algore, ardore, aut aëris ratione, etsi extrinsecus, eueniant, non præter naturam censendi sunt. Morbus enim partim præter naturam est, & est discessus quidam, atq; perturbatio rei, quæ secundum naturā fit: partim quod

quod solitus est, & sæpe accidit, secundum naturam esse dicimus. Morbi igitur extrinsecus euenientes, alij sunt violenti maximè, & præter naturam, ceu vulnera, de quibus posterius dicturi sumus: alij minus violenti, & extrinseci, vt aëris excessus: minime verò omnium corruptiones sunt, quas morbus attulerit. Sunt enim istæ maximè diurnæ, quam obrem nec præter naturam esse apparent, æquè vt in animalibus. Quorum morborum, alij sunt publici, & omnibus communes, vel pluribus, alij sunt peculiare per genera. Dicemus primo de communibus, vt sunt syderatio, mortificatio, & vermiculatio: & primo de syderatione Theophrasti diuini doctrinam sequendo, tum quod distinctiùs, & lucidiùs, tum quod omnibus melius de iis scripserit. Syderantur nouellæ plantæ magis, quàm vetulæ, & surculi præcipuè suæ plantæ imbecillitate, quod accidit, quum siccata tellure, humorem attrahere nequeant, propterea sub Cane multa syderantur, vetulæ validius resistunt, vtpote robustiores, & quia plus è longinquo trahunt. Præterea vetulæ suo pte succo sunt pinguiore, & nouellarum præueniunt sæturam, ipsaq; tempora squallida, proinde non fallit spes, sed quantum spondent in flore, tantum fructu præstant. Tandem quia imbecillæ sunt, mutationes sufferre nequeunt. Præterea humescunt sub Cane arbores, & eo tempore germinatio germinum accedit. Est & alia causa syderationis, quæ fit vulnere, quum ea quoq; ratione infirmiora reddantur. Plinius.

20 Syderatio tota cælo constat. Proprium syderationis est ab ortu Canis siccitatum vapor, quum insit, ac nouellæ arbores moriuntur, præcipuè vites, & ficus. Est & morbus *σπικελισμός* syderatio dictus, translatus nomen ab effectu simili, quia reperitur in animalibus, est verò quum in radicibus ex vulnere, & vlcere propter putrefactionem calor extinguitur, quasi mortificatio. Sed non in omnibus verum est: nam cicer hoc morbo perit, nec propter vulnus: elota enim falsedine interit. Idcirco in aliis etiam sine vulnere videtur. Alij sunt, qui mortificationem, & syderationem idem esse dicant. Possunt aliæ causæ esse, scilicet alimenti excessus, & defectus, vel succi cruditas, vel ab aëre. Quippe frigore superueniente post aditos fructus ex imbecillitate tenui humoris arbores intereunt: nam quum crassior pars in fructum abierit, reliqua serosa tenuis petitur à frigore, vnde ex imbecillitate perit. Sequitur etiam interdum ob alimenti defectum, quotiens radices minus commodè reguntur, ita altæ, vt extantes videantur, vritur enim succus, aut incrassatur. Combustus non alit. Crassus si aleret, ad alédas partes non adit, vnde morbus, & interitus. Huic proximum quum squallens siccitate, humore quæ carent, quem transmittant. Erunt suppetitæ solum semper mouere. Sic enim recenter reponitur, vnde subinde aliquid afferatur succi, id, quod æstate potissimum iuuat, propter siccitatem, erit quæ munimentum aduersus hyemem, ne calor exhalat, qui excessum humoris ex hyemalibus imbribus digerat per arboris partes, alioquin exalbescent arbores, sicut & sata, & intereunt, quum vegetari nequeant: nisi enim calor adsit, humoris copiam coquere nequit, nec alitur planta. Vnde ieiunio

laborare necesse est. Interdum non perit, sed tantū ægrotat, vt fructificare nequeat. Quod enim pabulum non excoquit, neq; euincit, fructificare non potest. Sed exitialis arborū lues, vermiculatio est: cuius causa duplex. Infiectum vulnus, & sitis; ex vulnere enim fit sanies, ex sanie vermes progignuntur. Sic & in reliquis rebus euenit. Ex siti prouenit idem: nam quū debiti humoris defectus euenit, fit dimotio quædā ex natura, dimotionē mutatio & alteratio sequitur, ex mutatione verò gigni vermiculos videmus. In arefactis idē accidit, vbi calor redditur efficacior. Mali huic vitio maximè obnoxia sunt, in locis feruidis, breui enim fit radicū exiccatio. Isq; morbus omnibus penè euenit. Sed malos pluribus infestari vermibus videmus, atq; ideo citius intereunt, sic ficū & pyrum. 10 Minus vermiculationē patiuntur, quæ acerbo & acri succo prædita sunt, tum quia minus putrēt, tum quia acerbitas animalium partum prohibet, sicut in lauro, quæ cito putrescit, at propter acrimoniæ vestigia non æquè vermiculatur. Caprificus nō sicut ficus putrescit, quia eius lac acerbior est: acidæ punicæ minus, quàm dulces putrescunt, quia dulcis succus imbecillior est, ob id mutationem facilius recipit, putrescitque, & omnium maximè mali verne, succi & totius naturæ imbecillitate. Omnia quæ lentisco infesta mandantur terræ, minus vermiculos sentiunt, odoris, calorisve causa. Plinius. Arborū communis morbus vermiculatio est, sed vermiculantur magis, minusve quædā, omnes tamē ferē. Idq; aues caui corticis sono experiuntur. Maximè autē arborum hoc sentiunt 20 pyri, mali, fici. Minusq; quæ amaræ, & odoratæ sunt. Contra hunc perniciosissimum morbum, qui si in arboribus diutius immoratus fuerit, mortē infert, rei agrestis scriptores nō segnes fuerunt: nam plura remedia ab eis descripta sunt. Alij radices ante plantationē felle taurino oblinunt, quod post etiā frequētius faciunt, idq; maximè in punica & pyro. Nonnulli suillū sterces vel caninū vrina hominis, vel asini diluunt, & ablaqueatis radicibus affundunt. Democritus lemniam rubricā cum aqua terebat, & eo postea radices illinebat. Alij lupino cum oleo trito radices etiā oblinebant. Alij hominis vrinā desumunt, & ex tertia aceti parte miscent, & vbi sunt vermes infundunt. Multi scillæ bulbū cum lupinis in aqua per multos dies macerant, & cum spongia vermium plagas abundanter inspergunt, quā si per aliquot annos arboris truncū inunxeris, à vermibus nō corrumpetur. Plures cinerem amurcæ cōmiscent, vel bouis vrinam cum tertia aceti parte infundunt, vel viuam calcem in aqua decocti lupini. Alij bitumen, vel oleum vermium latebris indunt. Alij amurcā, vel veterem vrinam. Aliud est quoq; remedium. Clauo greco fodiendus, atq; vellicandus cortex, donec mucrone bestiola deprehendatur: plagam postea fimo bubulo oblinunt.

De peculiaribus arborum morbis. CAP. XXXVII.

IAM diximus de vniuersalibus morbis, nunc de quarundam specierum morbis peculiaribus. Ficus glabrationem patitur. Si enim imbres nimij fuere, radix deglobitur, quod vitium ollam appellant. Morbus hic radicibus paulò 40
super-

superius accidit, isq; ex humoris nimietate accidere solet. Plinius. Cæterum si rores cadunt, siue imbres nimij fuere, alio modo ficus laborat radicibus madidis. Viri hirculatio, vel articulatio accidit ex eadem causa, & quæcunq; nimia germinum luxuria fructificare nequeunt eodem pertinent: hæc pabulum excoquere nequeunt, sed vis tota ad germina conuertitur. Fitq; morbus ille, aut multatis germinibus iniuria ventorū, aut imperitia culturæ concisis aut in supinum excisis: vniuersi enim succi impetus ad germinandum excurrit, ac fructus expectandus non est. Vnde pampinatione vrendum præcipiunt per totam æstatē, sarmenta etiam, & propagines summittunt, item radículas tollunt, quæ trunco hærent superiore. Adde ablaqueationes, & suffossiones, vt radices nudentur, & noui cæli haustu castigentur, præcauendo ne quid pedamentum offendar. Hæc omnia alimentum diminuunt, & vires augent. Plinius. Vitibus morbus peculiaris articulatio tribus de causis. Vna, vi tempestatum germinibus ablatis. Altera, vt norauit Theophrastus, in supinū excisis. Tertia, culturæ imperitia laxis: omnes enim earum iniuriæ in articulis sentiuntur. Ficus quoq; scabiescit humore nimio. Remedium erit quum germinare incipit, putetur, ne sua opacitate succum percrassescat. Alia ratione fieri posse scabiem dicunt, ac Vergiliarum ortu initium capere ex minoribus pluuiis, quæ vbi infederint, hærent, & feruent, (nam si imber largior fuerit, sordes eluit) atque etiam fortasse subeunt, vnumq; sunt intus cum naturali succo. Et accidit vt grossi, & caprificus decidant, nec tamen eis scabies vbique accidit, sed hi morbi ratione locorum euenire videntur, quemadmodum & animalibus. Nam apud aliquos scabies nullo modo infestat, vt nec circa Æneam. Plinius. Scabies communis omnium, est impetigo, & quæ adnasci solent cochleæ, peculiaris ficorum vitia, nec vbique. Sunt enim quædam ægitudines & locorum. Scabies gignitur rotibus lentis post Vergilias: nam si rariores fuere, perfundunt arborem, nō scalpunt scabiem. Olea lichenas patitur, vitis rorationem, siue acinorum defluxionē, Chelidemo auctore. Fructus enim præ tenuis, fluxusq; creatur. Remedium erit, quū nimia alimenti vbertas detrahitur, vt amygdalas & punica castigare solemus: vel quū arbor firmior, & robustior redditur. Rorationis gemina causa est, aut quod flores rorem excipiant, aut quod exuperantia fuerit. Quod si ita sit, aerē dixerim in profluvio floris humidiorē veluti ærugine procreare, vbi verò plus æquo inualet, alimentū auertit. Hac vtraq; de causa acini partim labuntur, partim ita manent, vt non attingant à natura debitam magnitudinem. Vites quum alferre, ægrotant: oculi namq; primò putatis hebetantur. Rursusq; ex nimio calore idem euenit, etenim eorum quoq; temperamentum poscunt, sicut etiam alimentū omnino. Cuius causam affert. Accidit oculorum hebetatio, quum acriter frigent, proximum illi est, quod agrestibus euenit, si quum germina sua festinantius inchoant, gelatio consequuta est hac quoq; ratione flos perit intempestiuus. Flatus enim gelidos adhuc imbecilli occursans perfundit. Plinius. Vites ægrotant etiam quum alferre. laxis vredine

attonfarum oculis ex calore hoc euenit intempestiuo, quoniam omnia modo constant, certoq; temperamento fiunt. Olea clauum patitur, quidam fungum appellant, alij ollam, hoc est Solis exustio. Plinius ad verbum. Olea etiam clauum patitur, siue fungum placet dici, vel patellam, hæc est Solis exustio. Nocere tradit Carø & muscum rubrum. Ficus cradationem patitur, quum rami inarescunt, marcescuntq; crados enim ramos ficulnos quidam appellant, unde & morbo nomen.

De peculiaribus fructuum morbis. CAP. XXXVIII.

HACTENVS de morbis arborum, nunc de iis, quibus infestatur fructus. Fructibus, vt vuis, crambus euenit. Animal est arugini simile, nascitur quum tempore humido residente humore sol acrior conlequetur. Idem foliis etiam contingit. Sunt ex eadem causa nascetes & erucæ, dirum animal, eroduntque frondem, alia florem, oliuarum quoque, vt in Mileto, ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc animal tempore humido, & lento. Malo, fico, oleæ accidit vermiculatio fructuum, sed duarum priorum fructus vermiculis semper vastantur, pereuntque. Oleæ non semper, sed solum quum sub cute fuerint: nam si nucleum subierint, iuuat, quia alimentum quod fuerat ossi distribuendum abit in pulpam. Prohibent illos flatus & pluuia, quæ fiunt sub Arcturo: faciunt enim vt frigore fugentur hostes. Egrotant ficus, & reliqui fructus. causa duplex, aut arbor ipsa, eiusque dispositio. quod amygdalo frequens est, quoties in gummi spissescit succus. aut ab æris qualitatibus. Plinius. Nam vermiculationem poma ipsa per se quibusdā annis sentiunt mala, pyra, mespila, punica. In oliua ancipiti euentu quando subeunt nati fructum adimunt, augent si in ipso nucleo fuere, erodentes eum. Gigni illos prohibent pluuia, quæ fiunt post Arcturum. Eadem si austrina fuere generant, in drupis quoque, quæ maturescentes, tunc sunt præcipue caducæ. Id riguis magis euenit, etiam si non deciderint, fastidiendis. Oleæ quoque peculiare malum arachnium. causa, humiditas ex aëre, qua corrumpitur fructus. Germinatur anniculis ramis, quum imbres sequuti sunt, qua germinatione amittitur fructus, quia pabulum eò fluit, quandoquidem fructus imbecilli sunt: humore nanque aggregato profilit germen. Pessimum est oleis, vitibus, aliisque fructibus, si dum florent impluerit, defluunt flores & fructus, causa imbecillitatis. Plinius. Pessimum est inter omnia quum deflorescentem vitem, & oleam percussit imber, quoniam simul defluit fructus. Vermes nec specie omnes eadem constant, differentia tamen præcipua in eis est in sua quæque nasci arbore, in alias translatos non viuere, nec ab re, alitur enim vnum quodque iis, quibus constat. Sed vermis est nomine cerastes, qui peculiarem habet naturam, quod in duabus & nascitur & alitur arboribus, nasci enim in olea, in fico parere aiunt. Vnde habet ficus suos vermiculos, & illos quos enutrit alienos, omnes tamē in cerastem abeunt, sonumq; edunt, quasi stridoris. Plinius, Vermium,

Vermium, qui in ficis existunt, alij nascuntur ex ipsis, alios parit qui vocatur ce-
tastes: omnes tamen in cerastem figurantur, sonumq; edunt paruuli stridoris.

*Extrinseci morbi minus violenti, & interitus ab aeris excessu frigidus,
& calido. CAP. XXXIX.*

MORBI verò & corruptiones extrinsecus euenientes, qui sunt minus
violenti, vt aeris excessus, iam subeunt, vt nostra ab initio indicauit par-
titio. Causæ duæ sunt, frigoris & caloris excessus, sed calor parcius corruptio-
nes affert, cæterisq; potius, quàm arboribus, nisi squallor accesserit, & æstus
longo temporis tractu, & etiam sub Cane: & non nisi nonellæ syderata per-
eunt, quia imbecillæ sunt, sed frigore multè pereunt, multifariisq; modis. Alias
enim frigoris vehementia gelat, alias prægelidus flatus adurit. Nonnunquam
siue silente vento, siue spirante paruo, impuro tamen aëre, ac turbulento, se-
quitur arborum gelatio, siue serenum, siue turbatum fuerit cælum. Circa Arca-
diam, Eubœamq; sereno cælo à ventis gelantur. In Thessalia, caliginoso cælo
& immoto spiritu. Creati verò huiusmodi flatus solent quum montes niuib.
occupati fuerint, ab iis enim frigus vrens fluit, interdum aër penetrans idem fa-
cit. Vniuersalis causa ea fuerit potissima, exigui frigoris naturalem calorem:
qua re simul humor educitur, atq; expirat. Sed quæ terra teguntur, eius obicis
beneficio frigoris iniuriam non sentiunt, seruanturque. Quæ verò supra ter-
ram sunt, quasi præsidio nudata intereunt. Interdum pars trunci, quum sit ter-
ræ propior, obnoxia est etiam maleficio. & sæpe tanta est frigoris vastitas, vt ne
radices quidem à vi illibata sint, quin intereant. Omnino tamen ab summo in-
cipit gelatio, & mox ad ima defluit. Quamobrem coloni apud quos id euenit,
vites operiunt, & ficorum incrementa attonfione reprimunt, vt in Ponto, &
Media, aditumq; ita frigori negant: nam quum à vertice noxa incipiat, eo ope-
to seruabuntur. acerrima enim est vltio illa, nec minor quàm quæ à Solis pro-
uenit vehementia, immo qui diuturna mora discoxerit. Frigus enim humorē,
caloremq; educit. Causis locis, fluminibus appositis, & à vento silentibus, fre-
quentius euenit, nec ab re, quum ea loca nebulas foueant, frigidus aër diutius
hæret, quocirca multa fit impressio: ac vbi nō regnat flatus, plurimum hac in-
iuria laborant, vt in Macedonia, Thessalia, & ad Philippos. Quippe in eos sinus
receptus aër non habet, qua se illa liberet obsessio, quamobrem gelu vitatur,
agrumq; totum congelascere facit. Ad cliuos verò neq; aquæ, neque aëris illa
concretio fieri potest propter motum. Sed admiratione dignum cur arbores
validiores à gelu patiantur, debiliores minus. Olea & ficus vruntur gelu, quia
debiles sunt, radices oleæ non admodum profundas habent, fici raras. Sed mi-
randum profecto cotinum plus accipere detrimenti, quàm oleam, punicam,
verò, quæ sit imbecilla contra frigora, gelu non laborare. Nam & si gelationes
frigidi flatus inter se differunt, imbecillioribus magis incumbere gelationis
nocumentum deberet, nisi sit, quod densioribus pertinacius nocumenta in-

hæreant, raræ transmittant. Mali, & si imbecilles, non cōgelascunt, vt in Thes-
 salia extitit: arboris enim, raritas, vt frigus aliqua parte nō arceatur, sed transeat,
 facit. Quod quū diu nō manet, nec totū contendit, efficax esse nō potest. Por-
 rō alterutrum opus est, aut vt nō admittat vim frigoris vt quæ dēsa sunt & solida,
 aut si admiserint, amittant extra se. Solida sunt pyrus, & adhuc magis agrestes,
 sterilesq; arbores, vt vlinus, & ostrya. Causa hinc cognoscenda. Ventorū impe-
 tus, ritu fluminis delatus, eā vrit partē, in quam incubuerit, quemadmodū & in
 lue: quare sæpe loca, p̄xima euadunt sine vlla impressione, & aliquādo adeo vis
 illa rapidē fertur, vt in eodem interdū pampino quasdā gelet gēmas, quasdam
 nō item: sæpe autē niue contacta vite tota (quod locis frigidis fit) si summa ex-
 titerint capita palmitū, exuruntur, nec ibi sistitur perniciēs, sed ad radices vsq;
 peruadit. In Ponto flatus cōgelant, quū cœlo sereno, ac sudo in squamarū mo-
 dū perferuntur, quæ maiuscula sunt, dumq; ferūtur, patent, delapsa nō durant.
 Quare cōstat, quod aliqua in aëre gelatio more pruinæ cōsistit. Quū aer igitur
 cōcrescens flatu percitus occurrit, squamasq; illas deducit, gelatus ratione cō-
 sequitur. In locis natura frigidis flatus quidā indigenē sunt, vt in Pōto & Thra-
 cia. Tepidioribus verō, vt in Eubœa aduenē sunt. Sed terrę gelicidiū damnosum
 est, p̄sertim si nudatis terra trūcis ad radices peruenerit. Sed maximē si aqua sit
 restagnās, obsidet enim plus aqua, quippe ad radices subiens iam imbecilliores
 factas diuturna oppugnatione nocuentū infert, & si solum agitatū fuerit, 20
 vehementius officit. Soli enim laxatio, vt liberius penetraret, facit: prohibetur
 autē stercoreatione. Stercus enim calidū est, & iuuat. Quod si contingat, vt vix
 demissa sit, atq; tum frigus, tum pruina superuenerit, atq; gelauerit, soluitur ge-
 lu, quia terra niuib; p̄afermentata est. Sed maius nocuentū arboribus ad-
 fert gelu à terra quàm ab aqua, nam gelu terra circumstans, radices magis tan-
 git; damnosius verō vtrumq; tum à terra, tum ab aqua, cū remittit & rursus
 cōgelatur: nam ex tot mutationibus arbores malē se habent, earumq; vires re-
 soluuntur, quod perpetuo gelu nō euenit: calor enim introrsum incubanstue-
 rit, atq; seruat, modo ne multū excedat. Omnibus damnosior glacies illa est,
 quæ terram inuadit suapte natura tenuē, solutam, siticulosamq; quæ ad eas 30
 incōmoditates aptior est: nō potest enim calor prohibere, quin ad radices irre-
 pat. Euenit aliquando summos ramulos gelascere, aliquando radicibus illæsis.
 Ratio est, quia terrā cum munimēto habet, calorq; aufugiens hostē se abdit in
 ima. Nec semper superiora aduruntur. Sed tentantur tantū, sed intus nō labo-
 rant, nō igitur auferendæ partes illæ: nā sæpe superueniente germinandi tem-
 pore, germē effundūt: nam quæ arida videbātur, quū postea humefacta sunt, ad
 pristinas redeunt functiones: ob id olea aliquando arefacta visa est, dein resti-
 tuta est. Idem aliis euenisse tradunt, sed maximē arboribus euenit, quorū folia
 crassiuscula sunt, gracilia verō faciliē abolentur, ceu myrti, cuius rami graciles.
 Laurus quāuis rara resistit sui caloris potentia: punica & ficus raræ, humidæq; 40
 minus calidæ sunt. Sed arborum, quæ gelauerint, germinatio valida, citaq; est.
 Radix enim roborata collectione anniculi alimēti, quod adhuc retinet, alimē-
 tumq;

rumq; primū, quod distributū non fuerat, ad germinationē, & fructificationē
 celeriter veniunt. Sed cur nix nō congelat, & pruina quæ minor est quantitate
 cōgelat, ratio est. Nix nō diutius insidet, quippe liquefcēs delabitur, pruina ve-
 rō sessilis est, & exurit. Deinde nix ante germinationē cadit, pruina p̄ximēnatis
 germinibus, vel quū turgent, quo tempore germē humescit, rarefcitq;. Est et-
 iā pruina niue tenuior, vimq; incidendi maiore continet, p̄inde noualia pruina
 meliorescere existimāt, quia glebæ diffunduntur, ea subeunte mordenteque,
 quia cōstantior est. Tenuior niue est, nā nix ē nube constat, & velut spuma est,
 spiritū in se continens, pruina verō ex tenuiore aëre constat, humoreq;. Nunc
 10 aēr crassus, an tenuis ad gelu paratior sit, quærendum, an vterque. Primō si aēr
 nunquā gelatur, nisi quū serenus est, sanē gelatio non erit affectus crassi aëris,
 nam serenus aēr tenuior est: nec fit gelatio, nisi subeat, quod incidat. Præterea
 facilius refrigescit tenuis, ob id aqua prius calefacta refrigeratur & gelatur ci-
 tius, quia ex calore tenuior facta est: cōprobat idem historia locorū, nam quæ
 serena & subdualia sunt, plus & sæpius gelaſcunt, vt ad Craniū in Corintho, &
 ad Olympū, quamuis vicina sint, tamē circa Craniū rigida serenitates fiunt, ita
 vt à plantis, & hominibus percipi possit. Alibi longiori intervallo idē animad-
 nerimus. Et loca, quæ sub aëre crassiore nō rigescēbant, postea mutata condi-
 tione, scilicet aere attenuato gelaſcūt, vi in campis Larissæis, vbi stagna fuerant
 20 olim, ac p̄pterea crassior aer, atq; inde tepor. Ea stagna vbi emissā, frigidior fa-
 ctæ regio, frequentius infestata est gelationibus, tunc enim læta erunt oliueta,
 post nulla extitere. Et de vitibus idem contigit. His rationibus tenuis aēr gela-
 tionibus magis obnoxius videtur. Aliis crassus videtur: nā crassus aēr immo-
 bilior est, immobilitas occasio est gelandi. Item Styges in palustribus locis gi-
 gnuntur, corporaq; molestant, etiā si cōrecta fuerint. Præterea montana loca,
 minus gelant, quia ibi mobilior aer est. Ad Cithrum Thessaliæ, quia caua loca
 sunt, & rigua, maximē gelantur. Apud Philippos resiccatis nunc paludibus, &
 reducto agro ad arui speciem nō gelatur, antea verō quū esset lacunofus, gela-
 batur. Sic apud Crenides fuisse dicitur. Thraces locū eum habitabāt: ager enim
 30 primū arboribus scatebat, aquisq; permadebat, & nunc magis quā antea
 locus hic congelatur, aquarū copia resiccata. Ex vtraq; causa igitur p̄uenire vi-
 sum, & forsā ex vtraq; p̄uenit. Sed differt locus à loco quod plus crassetur, aut
 attenuetur. Aquosus igitur, crassusq;, vel prætenuis nō æque efficax est, præ-
 tenuis enim minimē stabilis est, gelatio autem non fit repente. Adhæc quali-
 ratem quandam illis, quæ sequuntur, totiq; statui celi, & quicquid extrinsecus
 veniat, inesse oportet. Nam si mutationes, remissionesq; crebris inter se vici-
 bus alternantur, nulla fiet gelatio, sed qui tenuior, celerius afficitur, qui verō
 crassior frigefactus frigidior redditur, sicut & calidior: caliditas enim & frigi-
 ditas diutius continentur in solidioribus. Quamobrem sicubi non dilutus, sed
 40 crassus, & siccus fuerit, facilius congelascit non absq; ratione. Plinius. Nec in-
 firmiſſimæ arbores solū gelu periclitantur, sed maximæ, vexa isq; ita cacumi-
 na prima inarescunt, quoniā præstrictus gelu non potuit eō peruenire humor.

Pruinæ perniciosior natura, quoniam lapsa perfidet gelatque, ac ne aura quidem vlla deperditur, quia non fit nisi immoto aëre, & sereno. Quædam temporum causæ, aut locorum, non propriè dicuntur morbi, quoniam protinus necant, sicut tabes quum inuasit arborem, aut vredo, aut flatus aliquis regionis proprius, vt est in Apulia Atabolus, in Eubœa Olympias. Hic enim si flauerit circa Brumâ, frigore exurit arefaciens, vt nullis postea solibus recreari possint. Hoc genere conualles, & apposita fluminibus laborant, præcipueq; vitis, olea, ficus. Flora apud Ouidium in Fastis de his loquitur,

Elorebant olea, venti nocuere proterui,

Florebant segetes, grandine lasa seges.

In spe vitis erat, cœlum nigrescit ab Austris,

Et subita frondes decutiuntur aqua.

Sed contra cœli iniurias nil audet humana potestas, quum nulla vi, nulla arte, etiam si præciamus, auertere possimus. Auerti carmine grandines Cato credidit, eius verba non adduximus, quum vana & ridicula semper putauerimus. Contra vredines palcarum acervos, & euillas herbas fruticesque, ac sarmenta, quum imminere pertimescebant, per campos vrebant, & fumo medebantur. Diximus quæ frigido cœli excessu veniunt, nunc quæ calido. Pereunt minus æstu plantæ, quàm frigore, sed tamen pereunt nimio æstu, idque ratione imbecillitatis: Et quæ nouellæ sunt, faciliùs sentiunt, præcipue, quæ non plus anno viuunt. Vereres autem eo non æque moriuntur, nempe ob radicum robur, ac magnitudinem, à quibus denuò vitæ queunt renouare principia, sed iacturam tantummodo fructuum, aut ad summum germinum facere possunt. Omnino calor excedens minus noxius, quàm gelu. Quæcunque igitur vitam tuentur, eadem suis excessibus interimunt.

Quæ extrinsecus apposita necant, sterqus, aqua, oleum.

C A P. XL.

DE violentis affectionibus dicendum, quæ extrinsecus eueniunt, ab opere vel fortuito per additionem, vel ablationem, & primùm ea cōmoda narremus, quæ fiunt incommoda. Nam ager ex nimia pinguedine sterile scit, & alter macie immodica, etiam aër, qui maximè necessarius, si excedat, nocet, & aquæ copia, vel inopia officit. Aqua non fluens necat, si excederit arboris magnitudinem, quum imbres percubuerint, aut loca inundationibus concreuerint. Quod circa Pheneum euenit. At si excursum habeat aqua, etiam si multa sit, modo abeat, non interimit: nam iuuat motus, vt præterfluat. Quædam apponuntur extrinsecus, quæ interimunt, vt fabarum cortices, non solum radicibus, sed germinibus apposite, & quicquid eiusmodi. Enimvero fabarum putamina, nō omnibus, sed nouellis imbecillioribus apposita, diutina siccitate alimentum partim trahendo, partim arcendo auferunt. Arbores alimento destitute intereunt. Etiam sunt quædam ex eorū numero quæ conueniunt, quæ etiā nocere possunt.

possunt, si inmodica fuerint, aut vehementiora, aut minus tempestiua. Vt si sterminus plus a quo aggrefferis, vel si aërem, ceu facē pellium: hæc si minus temperata, vel domita fuerint, interimunt, vel si minus conuenientia. Diximus enim supra eandem fimi naturam non omnibus communiter commodam, sicut aquam, immò nec aqua omnibus commoda est, vel si nimia, vel non opportuna: nam radices inebrians putrefacit, & præsertim nouellas, & eas plantas quæ minime aquarum auidæ sunt, vt cupressus. Interimit etiã putatio, fossio ve, si intempestiue adhibita fuerint. Sic etiam in rebus conuenientibus, & vtilibus latet perniciēs. Oleum, pix, seuum apposita necant; præsertim nouellas. Causa est caliditas, & tenuitas: tenuitate subeunt, caliditate vrunt. Argumento quod cortex durefcit, ac deglubitur. Is enim laborans, alimenti prohibet comēatū. Aliud indicium etiã, quod qui ferum agrum ad culturam edomant, vbi excisis arboribus radicū reliquæ peruitaciores sunt, pice oblinunt, aut oleo, aut adipe: ita penitus exiccantur. Pix autem plus potest. Plinius. Pix, oleum, adeps, inimica præcipue nouellis.

Quæ iuxta sata perniciem, vel mortem afferunt. CAP. XLI.

ALIA sunt, quæ vel agnascuntur, vel miscuntur. Quæ agnascuntur, vel stipiti, vel radici. Præterea sunt vel communes, vel propriæ pestes. Omnes plantæ agnatæ quæ nocent, alimenti rapina sunt exitiales, aut maxime perniciose, eoq; magis quod validiores, & magis numerosæ: tales sunt syluestres, nam & radices suas in alias immittunt, ac multi alimenti cupida sunt, sic proscindunt socias, amplexuq; strangulant. Edera irreptit, amplectitur, strangulat: sic halimus falsugine, & pabuli desiderio necat. Sed edera halimo perniciosior est, quod plus falsuginis habeat. Viscum innascendo perimere potest, & omnia, quæ aliam plantam pro sede capiant. Amplexu strangulat orobanchæ eruum, & limodorum fœnumgræcum, statim radici adnascens. Alia sunt, quæ congenerantur cum seminibus quibusdam, vt cum tritico, & ordeo lolium, & auena, & cum lentibus aparine. Omnia hæc circo interimunt, quia alimenti materiam exhauriunt duplicem, internam euocando, & externam ab aëre interceptando. Plinius. Necant inuicem inter sese vmbra, vel densitate, atq; alimenti rapina. Necat & hedera vinciens, nec viscum prodest, & cytisus, nec auro, quod alimon vocant Græci. Quorundam natura non necat quidem, sed lædit odore, aut succi mistura, vt raphanus & laurus vitem. Odit & vitis caulem & olus omne, odit & corylum, ni procul absint, tristis atq; ægra.

De violentissimis corruptionibus extrinsecis, quæ partium ablatione eueniunt. CAP. XLII.

PARTIUM ablationes violentæ etiam arboribus mortem inferunt. Earq; sunt, vel vulnere, vel partium ablatione, vel detruncatione, & primum de vulneribus. Arbores sunt, quæ si vulnus accipiant altius, intereunt, suæ imbecillitatis, & siccitatis causa. Palma vulnerata quoq; in cerebro interit, vis enim

vitalis, & germinatrix in eo sita est. Vnde quum id siccum, & vulneratum est, aëris intrusū, alieniq; calor corrumpitur, eoq; corrupto perniciēs ad ima descendit. Sunt & arbores, quæ non solum inflatum vulnus, sed caudicis partiū exemptionem tolerant, vt quæ humidæ sunt, & probè germinant, vt vlcus, platanus, & quæ iuxta aquas viuunt. Pinus etiam tedam amittit sine vitæ dispendio, quum sit in pingui viuaticas. Sed hæc tolerare non possunt, nisi arbores, quæ insigni præditæ sunt magnitudine, vt in locum excisæ partium tantundem sufficere valeant. Pinus quum iuuentula est, non habet tedam, nam ea per ætatē accedit, & adultæ sine vitæ maleficio adimitur. Sunt arbores, quæ non solum plagam ferre possunt, sed vulneratæ meliores, fertilioresq; fiunt, vt vitis, ficus, punica, olea, amygdala, & malus, quæ etiam caudicis fissionem tolerant. Cæteræ stipitis fissuram non substinent. Nam quarum partes dissitæ facillè coire possunt, & in hiatum aliæ succedere, conualescere possunt, alimentū enim quantum abundè sit, capiunt, nec à calore resiccantur, vel frigore leduntur. Hinc illud sine damno in mitibus euenit, ficu, olea, & amygdalo, quia celeriter coeunt labia in vulnere, vnde haud facile finduntur, quia tenaci compage cōstant. Talis est ficorum succus & olea pinguis, aptus ad vñionem, glutinat enim lentore suo. Vitis eiusdem generis est: nam etsi hiat insigni raritate, ablataq; medulla, obducere tamen cicatricem potest, & celerius hærundo, quæ etiam sponte coit. De pyro idem alii referunt. Plinius. Intereunt pleraq; & fissa stirpe, exceptis vite, malo, fico, punica. Quædam vel ab vlcere tantū Ficus hanc iniuriam spernit, & omnia quæ resinam gignunt. Quin si depascantur arbores magnum accipiunt quoq; detrimentum, nempe vulnus affert discerptionem, & adustionem. Peculiare quiddam in palma, & picea est. Nam mutilatio non exitium, sed sterilitatem affert: ratio est, ex offensione principii finem lædi. Nouella vitis dimutilatione perit, etsi quid renellum, & imbecillū relictum sit. Amygdala etiam ex hoc amara efficitur, & punica durior, & alia quædā mutantur. Plinius. Similem & depastio animalium. Oleam quidem, etiam si lambat capra, sterilefcere, author est Varro. Quædā hac iniuria moriuntur. Aliqua deteriora tantum fiunt, vt amygdala: ex dulcibus enim transfigurantur in amaras. Aliqua etiā vtiliora, vt apud Chios pyrus, quam phocida appellant. Caprarum morsus nouellis omnibus satis exitialis est, hinc & nomen sortitæ. Quippe F. Pompeio dictæ quoddam virgultū carpant. A M. Varrone omni-carpe capræ, non solum vulnere, sed dētium veneno plantis pestiferæ. Ob quā iniuriam præsertim circa vites, & oleas antiquitus institutum, vt Libero patri vitis repertori hircus immolaretur, vt damni lueret pœnas. Ouidius in Fastis,

Quem spectans aliquis dentes in vite prementem,

Talia non tacita dicta dolore dedit.

Rode caper vitem, tamen hinc, cum stabis ad aram,

In tua quod spargi cornua possit, erit.

Verba fides sequitur, noxa tibi deditus hostis

Spargitur affuso cornua Bacche mero.

Contra an
oleam, quam
semel ad nec
gi possit. Plini
conuersa And
Et
A

Corticis cir

Primò quia pr
bor omnia ext
ad arcèdum ea
interit arbor
rimentum in
vitalis maxin
idq; fieri, qui
faciundo, sed
aliquatenus d
trahatur, exar
more. Excepta

terò, quàm in
minoribus ma
que enim plus
nanculo fo
frigeant vel s
germinauit. F
anni tempus.
gido sunt men
tius tolerant,
aliquam deco

intereunt, rol
cari penitus d
orbè detract
prestringit,
pus. Alioqu
ximū corpe
mosus corte
quarū cicat
mētior frig
ra & quercu
taurū vel ger
me passè diu

Contra antiquitus Minervæ ex caprino genere non sacrificabatur, propter oleam, quam reperit, quare Athenis in arcem non ducebatur, præterquam semel ad necessarium sacrificium, ne olea ibi primùm nata ab hoc animali tangi possit. Plinius huic deæ capram immolari scribit. Dryope in loron arborem conuersa Andremonem maritum, & sororem apud Ovidium deprecatur,

*Et si qua est pietas, ab acuta vulnere falcis,
A pecoris morsu frondes defendite nostras.*

Corticis circumablatio communis omnium, aut plurimarum est interitus.

Primò quia principalis maximè pars est. Secundo quia cortice nocumenta arbor omnia extrinsecus excipit, eoq; amisso amittit vitæ principia & tutamentū ad arcendum ea, quæ sunt arbori non naturalia. Item medullæ parte ablata non interit arbor, sed si dematur tota, omnino intereundū Arcades inquit. Experimentum in pinu, & abiete. Ratio est, quia medulla pars est humidissima, & vitalis maximè. Argumento quia ligna, quæ medullâ continent, torquentur, idq; fieri, quia medulla exiccatur, iccirco haud integras statuunt abietes operi faciundo, sed scissas per longū, & medullas auferunt. Itaq; si medulla & cortex aliquatenus detraharur, nil absurdum arbores posse durare, sed si penitus detraharur, exarescat arbor necesse est, ceu destituta virali principio, nativoq; humore. Excepta adrachne, seu verius subere: hæc iuuari cortice detracto, tam exterò, quàm interno dicunt. Ceraso, viti, & tiliæ detrahitur, ex quo funes, & ex minoribus malq; sed si intereūt, id fit celerius, tardiùsve, magis, minùsve. Aliquæ enim plus tēporis permanent, sicut ficus, tilia, robur. His itaq; mederi conantur luto fouentes, & harundinibus, & id genus stramentis illigantes, ne frigeant vel subarescant. Apud Heracliam trachiana ficus restituta est, & re-germinauit. Frigoribus & caloribus nimis consecutis intereunt. Refert etiam anni tempus. Quippe in germinatione pini, & abietis, quum etiam cortice turgido sunt mense Februario & Martio, si quis detraxerit moriūtur. Hyeme diutius tolerant, & magis quæ robustissimæ sunt, vt ilex, robur. Latitudinē quoq; aliquam decorticatio habeat oportet: nam si angustā feceris, non mirū si non intereunt, robustissimæ quanquam sint, qui etiā si quantū libet auferatur, necari penitus dicant. Quod de infirmioribus intelligi potest. Plinius. Cortice in orbē detracto necantur, excepto subere, quod sic etiā iuuatur, crassescēs enim præstringit, & strāgulat. Nec adrachne offenditur, si nō simul incidatur & corpus. Alioquin & cerasus, & tilia, & vitis corticē mittunt, sed nō vitalē, nec proximū corpori, verū eū, qui subnascente alio expellitur. Quarundā natura rimosus cortex, vt platanis. Tiliæ renascitur paulo minus quàm totus. Ergo his, quarū cicatricē trahit, medetur luto, fumoq; & aliquādo profunt, si non vehemētiōr frigoriū vel caloriū vis sequuta est. Quēdā tardius ita moriūtur, vt robora & quercus. Refert & tēpus anni. Abieti enim & pino si quis detraxerit, sole taurū vel geminos trāseunte cū germināt, statim moriūtur, eandē iniuriā hyeme passē diutius tolerāt. Similiter ilex, robur, & quercus. Quod si angusta decor-

ficatio fuerit, nil nocet supradictis. Infirmiores quidem, & in solo gracili, vel ab vna tantum parte detractus interimit. Nos ad corticis circumablationem remedium admodum vtile adinuenimus: contuso vltimi cortice, atque obducto, inde fasciis & stramentis alligato, ne pluuiis dilabatur, & à caloribus tueatur. Decacuminatione pinus, picea, abies, & palma intereunt, quidam cedrum & cupressum adnumerant. Hæc, detracta coma, scissoque cacumine intereunt, nec quicquam germinant: sicut neque si adusta, aut tota, aut in parte aliqua fuerint: reliqua omnia & præcisa germinant, & nonnulla meliora redduntur. (Decacuminationis autem est summitatis ablatio.) Illud autem non sine ratione euenit, scilicet naturæ siccitate, caudicis rectitudine & radice simplicitate: nam vulnus illud aditum præbet caloribus, & frigoribus: & quia rectio circularis vndique infertur, de super incumbens pestis, facile ad ima usque succedit, propter facilem transmissionem. Neque etiam hæc à caudice pullulant, quia sicce natura sunt, & alimentum non submittunt, sed sursum mittunt, singularique radice constant atque descendenti, unde alimentum in proceritatem absumitur, ob meatuum insignem rectitudinem, nec quicquam superfluit, nec aliorum se vertit, proinde non prodigunt in stolones. Plinius. Similem & decacuminationem habent cupressi, piceæ, cedri. Eæ enim detracto cacumine, aut ignibus adusto intereunt.

IOAN. BAPTISTÆ PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER QUINTVS

SIVE

POMARIVM.

PROOEMIUM.



Am è syluis egressi, earum post tergum horrido aspectu relicto, proximum est, ut pomarium ingrediamur, cuius lata facies tristitiam, quæ animo inhaerarat, amouebit. Pomorum enim, quæ magnitudine, colore, odore, sapore & pulchritudine inter se de principatu certant, admiratione & voluptate non parum animus noster capitur. Itaque decet, quandoquidem in syluis satis superque, neque extra rem prioribus libris expansiati

giati sumus, v
nium prauale
extrema manu
pio arborum n
dentes verò ali
bis afferunt &
lo humano cul
tro proveniunt
hominibus did
dolabram, vel
vmbraarum off
munis procre
rer naturam,
lianur, sunt
tate content
mangonio po
git libi obrem
desciscant, &
quæ instituta
10 vtraque altera
tur. Nos pom
cludemus. Pri
Malorum aut
postmodum e
iuxta pomoru
dunt, ut sunt
gula ossa, ut p
beres, myrti
& nuces lugl

30
40
Non a
quid
rium locu
Nec verò s
sunt, sed e
sticæ autho
inquiens, I
in hoc signi
40 cens, Poma

riati sumus, vt ad hortos nunc conuertamur, in quibus ars & humanum ingenium praualeat. Vt decens ordo ac series seruetur, atque arborum materia extrema manus imponeretur, alterum nostræ diuisionis fastigiū, vt à principio arborum naturam distribuamus. Illæ suos caducos fructus, feris, pendentes verò alitibus largiebantur, hæ verò mitioribus succis voluptatem cibis afferunt & necessario alimento delicias immiscere docent: ibi fructus nullo humano cultu aut labore gignuntur, sed ex suo cuiusq; arboris semine vltro proueniunt, hic quæ blandos saporis odoresque adoptione, & connubio hominibus didicerunt afferre, enascuntur: ibi materies vel cæsa ad securim, ad dolabram, vel senio prostrata ad ignem nascebatur, hic arbores fructu, vel umbrarum officio, vel alia dote humanius viuunt: ibi postremo quæ naturæ munis procreantur, hic quæ ars & solers industria parat conspiciuntur. Est inter naturam, & artem bellum assiduum, & irreuocabile: arma, quibus præliantur, sunt desidia, & labor. Natura rerum parens res rudes, ac sua rusticitate contentas producit, ars etiam arborum adulteria excogitauit, & cultus mangonio perfecit, vt illæ in nobiliorem formam transeant; ac naturam cogit sibi obtemperare: quantum ars ingenio & diligentia, vt res à sua natura desciscant, & in aliud perfectius genus transmigrent, laborat, tantum natura, quæ instituta diligentia destituitur, ad pristinam sortem deficere contendit: vtraque alteram superare nititur, ac nunc vincere, nunc vinci continue videtur. Nos poma omnia, quæ vsus, aut voluptas cecurauit, in hoc Pomario includemus. Primum de arboribus mala ferentibus, deinde de nucibus dicturi. Malorum autem prius eas, quæ comantur æterna fronde, nempe medicas, postmodum eas, quæ deciduam frondem habent persequemur, illas autem iuxta pomorum distinctas species diuidemus, eorum enim alia semina claudunt, vt sunt cydonia, mala, pyra, sorba: alia grana, vt ficus, mora: alia singula ossa, vt persica, pruna; palmæ, cerasa, ziziphæ; alia plura, vt mespila, tuberes, myrtibacæ & vua spina. Post hæc nuces commemorabimus, punicam, & nuces luglandem, Heracleoticam, Thasiam, & Euboicam, & Pistacia.

Quid sit Pomarium, quid pomum, & de Pomona dea.

C A P. I.

NON à ratione alienum videtur, vt de Pomario in hoc libro scripturi, quid Pomarium quidve pomum sit ostendamus. Vocant Latini pomarium locum pomiferis arboribus consitum. Cicero ait in libro de senectute: Nec verò segetibus solum, & pratis, & vineis, & arbutis res rusticæ lætæ sunt, sed etiam hortis, & pomariis. In quam significationem omnes rei rusticæ authores hoc vocabulum accipiunt. Palladius pometum etiam dixit, inquit, Longe tamen ab hortis vineis, atque pometis. Plinius non solum in hoc significato, sed pro loco etiam, in quo poma reponuntur accepit, dicens, Pomaria in loco sicco, & frigido contabulari: in quibus sint fenestræ se-

ptentrionales, quæ serenis diebus pateſcant. Necte nominis ſimilitudo Pomærii decipiat; nam diuerſam rem notat: Varrone enim teſte pomæriū quæſi poſt murum dictum eſt, à veteribus enim mærum pro muro dicebatur. Eſt autem locus circa ciuitatis murum, quem antiqui in condendis vr̄bibus inaugurato conſecrabant, neq; patiebantur aliquod in conſinio ædificium fieri: vt notatur à Gellio. Pomiferas arbores dicimus, quæſi poma ferentes. Poma etiā dicta eſſe poſſunt, M. Varrone teſte, quod potu indigeant, nam in poma, quæ inſita erunt, ſiccitatibus aquam addi quotidie oportet. Sed qui fructus pro pomis, malis, & nucibus accipiendi ſunt, declaremus. Vlpiano & Priſco labolenio iureconſultis placet glandis nomine arborum omnium fructus contineri, à Græcis accipientibus, qui arborum ſpecies omnes ἀκρόδρυα vocant, & δρυὶς, id eſt glande, & δρύκαστρα. Democritus verò Græcus diſcrimina inter Græca nomina aſſignat, inter δρύκας, & ἀκρόδρυα, nam δρύκας dicitur, quicquid herbaceo fructu viret, lignoſum nil exterius habēs, vt duracina, pyra, mala, & damafce-na, ἀκρόδρυα verò dicuntur, quæ putamen exterius, lignoſum q; fructum habent: vt malum punicum, caſtanea, piſtacia, & nuceſ. Athenæus Atticos, alios q; ſcriptores nuceſ fructus omnes lignoſo cortice cōtentos appellare dixit. Macrobius Saturnaliorum libro ait, eſſe Agriculturæ ſcriptores, qui nuceſ & mala ſic diuidant, vt nucem dicant omne pomum, quod foris duro regatur, & intus habeat, quod eſui eſt; malum verò quod foris habeat, quod eſt eſui, & durum intus includat. Sed hæc nomina tam Græcis quàm Latinis authoribus ſæpius confunduntur. Pleriq; tamē Latinorum ſcriptoribus placitum vido pomum nomen generale eſſe ad mala, & nuceſ, quo ſignificatu nos accipimus: nam noſtro hoc libro pomorum ſpecies omnes vr̄banorum ſingulatim complectemur, ac ſi pomarii parietibus, & vallo includeremus. Pomorum inuentio Libero patri tribuitur, quod Theocritus cecinit,

Arg. ſinu medio Bacchus ſua poma recondit.

Huic iudicio ſubſcribit Neoptolemus Parianus in Dionyſiadē, qui inuenta à Baccho mala, vt reliquos mollis calli fructus commemorat: vt apud Athenæum videre eſt. Fuit & Pomona pomorum dea apud Romanos à pomis dicta, vt Mellona à mellē. Pomonam Verumnus adamauit. Vnde Ouidius,

*Rege ſub hoc Pomona fuit: quæ nulla Latinæ
Inter Hamadryadas coluit ſolertior hortos.
Nec fuit arborei ſtudioſior altera ſætuſ;
Vnde tenet nomen. Non ſyluas illa, nec amnes:
Rus amat, & ramos felicia poma ferentes.
Nec iaculo gravis eſt, ſed adunca dextera ſalce:
Qua modo luxuriam premit, & ſpatiantia paſſim
Brachia compeſcit: fiſſo modo cortice, lignum
Inſerit, & ſuccos alieno preſtat alumno.*

Nec

VILLÆ LIBER QUINTVS.

*Nec sentire sitim patitur, bibulag, recuruas
Radix fibras labentibus irrigat undis.*

De Pomarii positione, & solo. CAP. II.

NON est parui momenti tum ad plantarum perennitatem, tum ad fructificationem, & fructuum bonitatem, ut pomaria congruo loco ponantur, ut eam cœli partem spectent, quam debent. Et si principio, cum de villæ situ dictum est, de hoc in vniuersum multa diximus, de singulis arboribus seorsum suis capitibus secundum earum naturam dicturi; liceat tamen nobis de huiusmodi situ hic aliqua præfari. Loca etsi inter se minimo distant intervallo, situs tamen diuersitate multum differunt, ut magis, minusque solibus, vel flatibus incommoventur. Flatibus non solum tractus quidam, sed etiam tota regio sæpius infestatur, ut arbores ægrè fructum ferre possint, neque in locis à ventorum flatu remotis quicquam boni potest provenire: debet igitur locus commodi flatus compos esse. Loco cui Austri blandiantur, in flore, arbores fathiscunt; in frigido si spiraret Aquilo, omnia perirentur. ædificissima loca egrè recipiunt arbores, præsertim serotinas: nam sæpius præuenientibus autumnum flatibus, cum ad maturitatem usque stare in suis arboribus non possint fructus, cum ipsis arboribus deturbantur. In conuallibus & lacunosis locis fructus deteriores nasci, Antyllus scribit, ex Ioanne Stobæo. Lacus enim non aërem solum sed fructus inficit. Quid igitur faciendum? Eligendus situs est, qui noxios flatus oblique recipiat, in feruidis, calidisque ad Aquilonem vergat, cum eius flatu poma odoratio-
ra scripserit Democritus fieri. Sed omnium scriptorum præceptis, pomarium ad montis radicem constitui debere (ut vniuersa villa) eiusque planities ad meridiem expariari liquet, & ob id Varroni tota Italia pomarium visa est. Pomaria (Florentino auctore) intra domesticam habitationem, si fieri possit, locanda sunt: quod si non detur, ex propinquo quærendus locus, ut non solum oculis spectantium intra ædes iucunditas hauriatur, verum etiam, ut ambiens aer ex plantarum fragrantia infectus, salubrem habitationem, ac totam possessionem reddat. Sed nunc videamus quale pomario solum statuamus, & prius magni magistri super huiusmodi decretam audiamus verba. Is nanque libro de causis hæc ait, Pingue solum frumentis aptius, arboribus vero tenue, itaque illæ in tenui solo radices magnas, robustasque agunt, quibus alimentum ex imis valeant haurire, quod etsi in solo pingui facere possunt, tamen alimenti copiam adeò largam trahunt; ut optimè germinare, magnitudinemque accipere amplissimam possint; sed fructum parere nequeant, quoniam non coquunt quantum satis sit: quod in tenuiori non euenit, sed modicè tam ad germinationem, quàm ad fructificandum hauritur. Atque ita arbores, utpote robustiores, quàm ut oblata copia vinci possint, plane coquunt fructumque gignunt. Ad summam quod solum humectumque

fit, nec frigore torpeat, hoc radicibus aditum facile præstat, alimentumq; laudatissimum subministrat. Pingue enim solum plantis incommodum est, exiccat supra modum, & hac de causa eas offendit. Verum vt simplicius asseram solum, quod mediam obtinet confusione contrariorum, id est soluti & spissif, sicci & humidi, levis & ponderosi, atque etiam superiora modicè inferioribus respondentia in his ipsis fortitur, hoc optimum omnibus ferè arboribus, & frugibus est: id enim ad aëris habitum propius quodammodo, quam cætera videtur accedere. Ceterum inter hæc ipsa, quod ad alteram partem vergit, melius est: quod & simpliciter quidam optimum asserunt, vt quod solutum, leue atq; humectum est, id enim alimentum in se continet, & radicibus meatum facile præbet: hætenus Theophrastus. Columella de pomarii solo statuens ait. Terra, quæ vitibus apta est, eadem quoque utilis est arboribus. Quam verò ipse pro vitibus laudat, videre est in Vineâ nostra. Berytius autem. Optimum solum nigræ terræ est, & ab omnibus præ aliis laudatum: proximum est terra fulua, & quæ flumine rigatur, item dulcis, & calida: eæ enim ad vires, ac arbores, & ad sata optimæ sunt, sed laudatur & profunda, maximè si friabilis & tractabilis ad arborum fertilitatem. Sequitur Columella. Prius quàm pomarium constituas, quàm magnum habere voles circum munito maceria, aut fossâ, ita vt non solum pecori, sed ne homini quidem transitus sit, nisi per ostium, dum adolecant semina: nam si sæpius cacumina manu hominis tractata, aut à pecore prærosa fuerint, prius quàm adolecant, in perpetuum corrumpuntur. Sed quomodo in ordinem redigantur, ac plantentur, præcedenti libro docuimus, cū & Varro in pomariis ea discriminanda in cōserundo censet, quæ sunt fructuosa propter voluptatem. Præterea in recentibus pomariis satis seminibus in ordinemq; arbusculis positis, primis annis, antequam radices longius procedere possint, alii conferunt hortos, alii quid aliud, neq; cum conualuerunt arbores, idem faciunt, ne violent radices.

De pomiferarum arborum remediis. CAP. III.

APud antiquos Agriculturæ scriptores, tum ad morbos arborum pomiferarum quosdam, tum ad optimam fertificationem remedia nonnulla describuntur. Nos ne alibi requirantur, quæ hic deficiunt, nostriq; Pomarii arbores, vt fecundiores floridioresq; sint, apponere non pigebit. Scribit Paxamus, Vnicuiq; arbori propriâ quædam cura seorsum conuenit, eam verò, quæ omnibus simul generatim congruit arboribus, non relinquam. Si ablaqueatis quibuscunque arboribus radices simul & truncos vetere vrina humana, vel pecorum lotio perfuderis, vegetæ & vberes adolecent. Sunt qui radices bubulo felle linunt, quod, vt volunt, à vitis satam arborem vindicabit. Didymus asserit omnem arborem iuvari fabarum aut aliorum leguminum paleis aut aceribus frumenti circumpositis. Tradunt succum herbæ, quæ rusticis polypremnos appellatur, caudicibus illi arbores à noxa defendere &

& largiorem edere fructum. Vt verò arbor sterilis fructum ferat, Zoroastris extat experimentum. Subcinctus, & crine in nodum obtorto, arreptaque bipennicum indignatione ad arborem accedito, eam excisurus. Obuiam autem veniente tibi quopiam, eiusque excisionem deprecante, & tanquam futuri fructus fideiussore, videaris persuasus esse & eius causa arbori parcere: & de cætero abunde fructum dabit. En Græcæ vanitatis exemplum. Africanus autem ait: portulacam, & tithymalum probe contusa, & mixta truncis oblinito. Omnes autem arbores copiosiores fructum ferent, si ipsarum radices columbino simo obleueris. Ne flores, aut folia abiciant arbores, ex Quintiliorum placitis hæc deprompsimus. Circumfossis radicibus palearum fabacearum aqua temperatarum, magnæ quidem arbori octo congiorum mensuram, parua verò non minus quam duos congios circumiice, sic de cætero curabuntur. Ne verò fructum perdant, Sorionis hæc extant experimenta. Lolium quod in frumento reperitur, euulsam simul cum radicibus plurimum è terra, quando iam pinguescere incipit, & in coronæ figuram formatum, si trunco arboris circumdetur, fructum producet arbor, perficiet, eumque non abiiciet. Si cancer, hoc est *πύρρος*, trunco circumligetur, vel si truncum plumbo amplexus fueris veluti corona, fructum plantæ non abiicient. Item si radicem circumfoderis & perforaueris, cuneumque ex corno immiseris, & terram aggesseris. Quidam nudatis radicibus crassissimas ex ipsis, & maximas diffidunt, & in fissuram duri lapidis silicis videlicet fragmentum immittunt, deinde obligant, & terra accumulata rursus obruunt. Continet etiam fructus lapis perforatus sponte naturæ, repertus & in arboris ramum iniectus. Polium herba suspensa fructum etiam continet. Democritus asseuerat, neque arboribus, neque satis quibuslibet noceri posse à quibuscunque bestiis, si fluuiatiles cancos, vel marinos quos Græci *πύρροις* nominant, non minus quam decem fictili vasculo in aqua missos tegas, & sub dio statuas, ut decem diebus sole macerentur, postea quæcunque illæsa volueris esse aqua diebus alternis perfundas, dum solidius quæ operatus fueris adolescant. Florentinus demonstrat, quomodo arbores à vermibus non

30 lædantur. Rubricam Lemniam, & origanum cum aqua terito, inde radices illinito, & scyllam in circuitu plantato. Si pineos paxillos in ambitu arborum defixeris, vermes corrumpentur. Omni arbori sterco suillum vino dilutū iniectum ipsam à vermibus illasam conseruat, ut ex Didymo colligi poterit. Si arboris radices taurino felle obleueris, arbor neque cito senescet neque vermes producet. Arbores à vermibus non infestabuntur, si denudatis radicibus columbinum simum circumcirca induxeris. Plinius scribit. Pomiferis quæ germinant, nec fructum ferunt, filia radice inditur lapis, fertilesque fiunt: cæteris arboribus ægris, facem vini, ac lupinum circa radices earum feri.

Aqua, quæ lupini decocti circumfusa, pomis prodest.

ET si Astrologiam agricolis vtilem superioribus libris in arborum plantatione, ac seminum iactu indicauerimus: nunc non minus in futura abundantia, vel fructuum inopia prognosticis pernecessariam iudicamus, cum quicquid in terris nascatur statis eueniat cœlorum cursibus, vt non temere Theophrastus scripserit, annum fructificare non tellurem. Nos primum prognostica, quæ è cœlis, inde quæ ex aere, demum, quæ è plantis ipsis eueniunt, conscribemus, quæque cognitu facilissima fuerint etiam ignaris agricolis: relinquemus ea, quæ peritis mathematicis cognoscuntur. Diophanes Græcus ait, ¹⁰ Caniculæ ortum fieri illucescente vigesima die Iulij mensis, obseruandumque esse cum eius exortus fiat, in qua cœli domo Luna reperiatur, nam (præter alia significata) si in Libra fuerit, fructuum arborum foris lignosum putamen habentium abundantia erit. Si verò in Geminis, omnis fructus vbertas maxima. Zoroastes verò ait obseruandum esse primum tonitru singulis annis, quod post Canis ortum contingit, in qua scilicet Zodiaci domo reperiatur Luna. Nam si in Libra, fructuum omnium corruptionem. In Capricorno abundantia. Idem- ²⁰ tidem in Aquario nunciabit. Præterea considerandum esse studiosè præcipit, qua signiferi circuli statione Iouis stella peragretur. Nam si in ariete steterit, campestria magis fructum ferent: in Tauro, erit lignosorum fructuum feracitas. Idem in Geminis. In Cancro verò asperi loci magis fructiferi. In virgine supplicandum esse pro fructibus. in Sagittario & præcoces, & serotini fructus optimi erūt, medijs verò vitiosi, omnesque arbores fertiles. In Capricorno campestria fructifera erunt, lignosi fructus abundabunt, supplicandumque erit ne glacie, & ventis lædantur fructus. In Aquario venti commodi erunt lignoso fructui. In piscibus vitiosi venti nuces exurent. Plinius ex veterum placitis hæc profert. Aquilam in Italia exoriri ad x i i calend. Ianuarij. Nec patitur natura ratio quicquam in satis ante eum diem spei esse certæ. Si verò interlunium incidat, omnes hybernos fructus, & præcoces lædi necesse est. Tria namque tempora prisca fructibus metuebant, propter quod instituerunt ferias, ³⁰ diesque festos: Rubigalia, Floralia, Vinalia. Idem Floralia tertio calend. Maij instituerunt ex oraculo Sibillæ, vt omnia bene deflorescerent. Hunc diem Varro determinat, sole Tauri partem quartamdecimam obtinente. Ergo si in hoc quatrimum incidit plenilunium, fruges, & omnia, quæ florebunt, lædi necesse erit. Reliqua nil ad fructus attinent, iccirco omisimus suis in locis dicenda. Nunc ad ea prognostica accedemus, quæ non è stellis sed ex aeris habitudine cognosci possunt, & si hæc ex illis proueniant, quia nobis euidentiora, facilius dignosci possunt. E decenti arborum germinatione facile fieri potest fructuum prognosticon. Prima enim germinatio videtur esse quasi compendium futuri prouentus, cuius vbertas, aut inopia in aeris clementia, aut sæuitia representatur. Felix arborum germinatio (inquit Theophrastus)

(tus) ex oppo-
realium imbr-
enim scribis
subtraham el-
succos optim-
copia largitur
expandat, nec
tur, & quasi in-
fiet, nisi frigus
austrius verò
becilliores re-
germinatione
qui post de-
ctibus præst-
aut defuât
tur: omnium
omnia namq-
decidit rubig-
verò quæ ser-
fiderat, seræ p-
præstant diut-
protinus illa d-
reprodest, vt
potest, calore
repor, alieno
superuenient
nim fit mi se-
possit, & in-
eget sed alita-
S
Nec min-
nam nō mi-
Aquilonijs
exortius,
sunt, nisi g-
contra ten-
gidi spirent
laborant, n-
mit, ex quo
tus vni noxi

flus) ex opportuna hyeme cōtingit: hyems illa commoda intelligitur, quæ borealium imbrium, niuium, ac frigorū sine gelu vbertate pollebit. Exhaustæ enim fœtibus arbores tantundem reponendum alimenti quærunt, quantum subtractum est ex præterita fœtificatione, sed seruato opus est, atque cocto, vt succos optimè ad partus, & ad germinationem vertant. Alimentum imbrium copia largitur: hyems verò cohibet, vt seruet & concoquat, per totam arborē expandat, necesse est: sed non prius id expedit, quàm ipsum alimentum coquatur, & quasi in vtero gestetur temporis spatio, quantum satis sit, quod nunquā fieri, nisi frigus vehemētius adiuuerit. ob id aquilonios imbres accedere iuuat; austrinis verò humescūt arbores, & laxatis partibus euocant succos, vnde imbecilliores redduntur. Tempestiui omniū imbres hybernū notantur, mox qui germinationē antecedunt, nam latius germen agitur: tertium obtinent locū, qui post deflorescentiam acciderint, pabulū namq; consummationemq; fructibus præstant, hi verò, qui post quā fructus conualuerunt sequuntur fructus aut defluat faciūt, aut infirmiores deterioresq; præ nimia humiditate reddantur: omnium pessimi, & ex toto inopportuni, qui circa floris exortū eueniunt. omnia namq; imbecilliora redduntur, & omnia aut certe plurima pereunt aut decidūt rubigine aut nimio humore; & quæ resistunt, deterius florent. Plantis verò quæ sero suos maturāt fructus, maioriq; alimento, cōcoctioneq; frui desiderāt, seræ pluuiæ opportuna sunt, vt viti, punicæ, & oleæ. Nocturni imbres præstant diurnis: fit enim vt plantæ humore potiri amplius possint cum sol nō protinus illū consumat: & tutius sic quoq; agitur. Niuis multitudo magno opere prodest, vt sensim colliquescens dilabatur, ita & terra fermentari optime potest, calore circū ocluso, atq; coercito. At si hyems sera est, intēpestius ille tepor, alieno natus tempore, diurnus esse nō potest, vindictia inde frigora superuenientia, arbores festina germinatione occupatas corrumpunt, nondū enim firmi fœtus, ac solidi mitē aerem, & indulgentē exoptant, quo adolescere possint, & inter sua initia infirmissimi sunt. Quod autē imbecillū est, nutricis eget sedulitate. Rectè igitur Vertūnus bene precatur Pomonæ apud Ouidiū.

Sic tibi nec vernum nascentia frigus aduret

Poma, nec excutiant rapidi florentia venti.

Nec minus quàm hyemis considerāda sunt flatuū iniuriæ, & incommoda, nam nō minus hæc illis arbores infestant, vnde flatuū ratio consideranda est. Aquilonij (ex Theophrasto) flatus austrinis præstāt, pelagici terrenis & occidui exortiuus, quia frigidiores sunt, ex toto enim frigidi flatus cōmodiores calidis sunt, nisi germina aut flores prouenire inceperint: nā tunc adurunt. Venti quī contra temporū qualitātē subueniunt optimi sunt, vt hyeme calidi, a state frigidi spirent. Si flatus aut calidus, aut frigidus nimis spiret, vehemētius syluestres laborant, nā per germinibus editis, enīmero vterq; partū labefacit, & interimit, ex quo seræ hyemes syluestribus infestissimæ sunt. Sed vnus, idemq; ventus vni noxijs, alteri utilis est, quibusdā Fauonius, multis Aquilo, alijs Ausfer,

qui plerumque omnibus infestissimus existit, & præcipuè florentibus arboribus, ut natum sit adagium: Immisi floribus Austrum, id est, mihi ipsi mali causam dedi. Quod Virgilius in Bucolicis expressit,

Eheu quid volui misero mihi? Floribus Austrum

Perditus immisi.

Superest ex floribus, & germinibus diuinatio. Arbores enim alterutro luxuriantes scilicet fructu aut germine, altero minus fecundas esse oportet. Cuius causam Theophrastus reddit. Quia natura utriq; parti minime satisfacere valet, sed necesse est absumere alteram, ut alteram faciat. Pars enim, quæ absumitur in frondes, & ramos, intercipitur fructibus. Sed priuata ficus, & vitis alba natura est: nam cum germinibus luxuriant, largioris fructus prouentum promittunt. In cæteris quod satis fructuum præstiturum sit, id neque excedere, neque deficere in germinando oportet. Optima arborum deflorescentia, optimam fructuum copiam prænunciabit, oportet enim flores, quos fructus sequuntur, antea bene cecidisse. Vnde Ouidius in fastis,

Si bene floruerint segetes, erit area diues.

Si bene floruerit vinea, Bacchus erit.

Si bene floruerint olea, nitidissimus annus.

Poma quoque euentum temporis huius habent.

Sed Plinij verba afferam, quæ super huiusmodi re à Theophrasto mutuatus est. Tempestiua frigora plurimum arborum firmitati cõferunt, & sic optimè germinant: alioqui si blandiantur Austri, defatiscunt, ac magis etiam in flore. Nam si, cum defloruere, protinus sequantur imbres, in totum poma deperunt. Illa sunt noxia frigora, quæ septentrionibus aut præposteris horis fiunt. Hyemem quidem Aquiloniam esse omnibus satis vtilissimam. Imbres verò tunc expetendi euident causa est, quoniam arbores sætu exinanitas, & foliorum quoque amissione languidas naturale est auide esurire. Cibus autem earum imber. Quare tepidam esse hyemem, ut absumpto partu arborum, sequatur protinus conceptus, id est germinatio, ac deinde alia florescendi exinanitio, inutilissimum experimentis creditur. Quinimo si plures ita continuentur anni, etiam ipsæ moriuntur arbores, quando nemini dubia pœna est infame laborantium. Ergo qui dixit hyemes serenas optandas non pro arboribus vota facit. Vota arborum niues diutinas sedere. Causa non solum, quia animam terræ, euanescentem exhalatione includunt, & comprimunt, retroque agunt in radices, verum quod & liquorem sensim præbent, purum præterea leuissimumque, quando nix aquarum cœlestium spuma est. Ergo humor ex his non vniuersus ingurgitans diluensque, sed quomodo sicutur distillans velut ex vbere alit omnia, quæ non inundat. In maiore parte orbis cum præcoces excurrere germinationes euocatę indulgentia cœli secutis frigoribus exuruntur. Quæ de causâ ferotina hyemes noxiæ syluestribus quoque, quæ magis etiam dolent vrgente vmbra sua, nec adiuuante medicina, quoniam vestire te-

neras

meras intorto
nis primum in
pus est cum ed
diutius contin
viti, olea, puni
siderantur, ali
dam la di vide
quarum pluvia
omitemus &
10 specie nascens

F R V G I F
nisi à fœ
chritudine, &
paucis prioru
horti, nullæ a
hoc genere an
verè hortoru
20 Sed ad Po
recide ait, Jun
aurea mala cu
tis ferebat, qui
boribus mala
vasto corpore
tus est. Arber
rem edidisse
rem fingit h
Iouis filium,
30

Sed fab
funditur h
star fuisse n
vicino tra
verò aliqua
40 malicentia

meras in ortu stramento in syluestribus nō est. Ergo tempestiua aqua hyber-
nis primum imbribus, deinde germinationem antecedentibus. Tertium tem-
pus est cum educat poma, nec protinus, sed iam valido fœtu. Quæ fructus suos
diutius continent, longioresq; desiderant cibos, his & ferotina aqua viles, vt
viti, olea, punicis. Hæ iam pluvia generis cuiusq; arboribus diuerso modo de-
siderantur, aliis alio tempore maturatibus. Quapropter iisdem imbribus que-
dam lædi videas, alia iuari, & in eodem genere sicut in pyris. Alio die hyberna
quarūt pluuias, alio verò præcocia, vt pariter quidem omnia desiderent. Non
omitemus & Beritij prognosticon ex scylla. Inquit enim. Scylla flos virgæ
specie nascens, & non cito marcescens, fertilitatē fructuum & anni portendit.

De malo medica, sine citrio, eiusq; generibus.

CAP. V.

FRUGIFERAS nostri Pomatij arbores enarraturus, vnde nam exordiar,
nisi à felici arbore illa, quæ Medica dicta est? quæ tum sua dote, tum pul-
chritudine, & tot generum fecunditate nobilis, tum etiam, quia à nullo, vel
paucis priorum memorata sit, totoq; hoc nostro Neapolitano tractu nulli sint
horti, nullæ adium fenestra cum testaceis vasis, vel pensilibus hortulis, qui
hoc genere arboris refert non sint. Integrum librum de se scribi meretur, vt
verè hortorum decus, ac adium illecebra dici possit.

20 Sed ad Poetarū fabulas transeamus. Higinus in suo astronomico, ex Phe-
recide ait, Iunonem cum duceret Iuppiter vxorem, terram inuenisse ferentem
aurea mala cum ramis, eaq; Iunonem admiratam petiisse à terra, vt in suis hor-
tis fereret, qui erant vsque ad Atlantem montem, cuius filia cum sapius de ar-
boribus mala decerperent, Iuno dicitur serpentem ibi custodem apposuisse
vasto corpore, qui ab Hercule interfectus à Iunone inter duas Arctos colloca-
tus est. Athenæus etiam ex Asclepiadis rerum Egyptiarum libro scribit, tellu-
rem edidisse nunciato Iouis & Iunonis coniugio malum illud. Ouidius Atlan-
tem fingit hos hortos mœnibus cinxisse, cum ei Themis prædixisset futurum
Iouis filium, qui ab eis poma diriperet.

30 *Tempus Atla veniet, tua quo stoliabitur auro
Arbor, & hunc præda titulum Ioue natus habebit.
Id metuens solidis pomaria clauserat Atlas
Montibus, & vasto dederat seruanda draconi,
Arcebatq; suis externos fructibus omnes.*

Sed fabulæ inuolucrum Plinius aperit his verbis: Ibi Hesperidum horti. Af-
funditur huic æstuarium, è mari flexuoso meatu, in quo draconis custodia in-
star fuisse nunc interpretantur. Amplectitur intra se insulam, quam solam è
vicino tractu aliquanto excelsiore, non tamen æstus maris inundat. Solinus
verò aliquanto clarius. Nam de hortis Hesperidum, & peruigili dracone ne fa-
40 malicentia vulneretur fides, ratio hæc est, Flexuoso meatu æstuarium è mari

fertur, adeo sinuosis lateribus tortuosum, ut visentibus procul lapsus angueos fracta vertigine mentiat. itaque quod hortos appellauere circumdat, vnde pomorum custodem interpretantes struxerunt iter ad mendacium fabulandi. Sed hæc insula sinuata finibus aluei recurrentis & in quibusdam æquoris spiris, vel spatiis sita præter arbores oleastri similes, & aram sacram Herculi aliud nihil præfert, quod propaget memoriam vetustatis. Alij autem Herculem ab Euristeo Argiuorum rege ad dicta mala auferenda missum & monitum dicunt, non posse Hesperidum mala colligere, ni Atlantis ope iuuaretur, ipsumque ideo ad Atlantem peruenisse, cælumque pro eo tulisse, atque ita mala interfecto dracone in Græciam detulisse. Ex quo Aratus in Engonasin ex Festi Anieni translatione.

*Nam dura immodici memorant sub lege tyranni,
Amphitryoniaden prima uo in flore iuuenta,
Qua cadunt medijs longe secreta diei
Hesperidum venisse locos, atque aurea mala
Inscia, quæ leni semper custodia somni
Seruabat, carpis se manu postquam ille nouerca
Insaturate odiis serpens victoris ab ictu
Spirarumq; sinus, & fortia vincula laxans,
Occubuit.*

Sed M. Varro in suis libris de agricultura aliter interpretatur. Aurea enim mala secundum antiquam consuetudinem capras, & oues intellexit. Græci enim vna, & eadem voce oues, & pomum significant, hoc est *πῦλον*, & has Hercules in Græciam ex Africa asportauit. Nonnulli aurea mala Veneri consecrata afferunt, non nisi ob eorum pulchritudinem.

*Vires mali
medicæ.*

Sed de eius dotibus scribere aggrediamur. Malum hoc igitur maxime salutare est, & aduersus exitiale medicamentum præsentaneum remedium est. De quo genere Theophrastus, Pomum si inter vestes ponatur in offensas conseruat. Vtile etiam si quis lethale venenum hauserit: vel ad oris suauitatem spiritum: quippe si quis interna pomi in iure, aut aliquo humore concocta in os expresserit, digesseritque, suauem halitum reddet. Ex quo Plinius. Comendandi halitus gratia Parthorum proceres eius grana esculentis incoquant. Et vestiariis quoque interiecta à tinearum offensis maxime vindicat, nec alia arbor laudatur in Medis. Refert Athenæus ab Ægyptiorum magistratibus maleficos quosdam damnatos, ut feris exponerentur, antequam in locum descendissent in quo supplicia pendere solebant, in itinere cauponam quandam obuiam eorum sortis miserat, quæ ipsa edebat citria dedisse eis, qui ea recepta deuorauerunt, nec multo postea à bestiis, & aspidibus demorsum illa se reperti sunt. Præfectus rogans militem, si quid piæ edissent, aut bibissent, retulit, citrium ex integra simplicitate donatum. Postridie iubet vni præberi, alteri denegari, qui comederat demorsus nihil incommodi passus est, alter illato ictu confestim interit, factoque frequenter periculo,

culo, tandem
si quis is verbi
Chium, qui in
nè, qui duodeci
ta Ponticorum
dicamentum por

Fe
(P
A
An

Nicander
Aus quia hoc
mine iuniorum
poma quæ d
Lacedæmoni
nis ut rem dici.

10 est citria ab ali
na ab acido fa
regem in suis
inter meum no
suis cedrum, &
& à latinis citri
dunaxat ab o
Plinius nomi
xit. A Palladi
Cloatij, & O
& citrium di
tum diuisib

Duplex e
speciem. Ex
quod pomum
ram affabr
nem intuer
Nos add
refert ad ne
bus spinis, v
40 mū non est
cōditus, arc

culo, tandem inuentum est exitiali medicamēto præsenti esse remedio. Quod si quis iis verbis fidem non habeat, consulat fidelē, veracemq; Theopompum Chium, qui magnam expendit pecuniam ad exactā historiam huius disquisitionē, qui duodequadragesimo suarū historiarum volumine, Clearcū Heracleotā Pontityrannū narrat multos veneno necasse, populūq; gratā huius medicamenti portionē non ignorasse. Celebratū est & à Poeta Georgicorū libro,

Media fert tristeis succos, tardumq; saporem

Felicitis mali: quo non præsentiū vllum,

(Pocula si quando sena infecere nouerca,

Miscueruntq; herbas, & non innoxia verba)

Auxilium veni; ac membris agit atra venena.

— animas & olentia Medi

Ora fouent illo, & senibus medicantur anhelis.

Nicanter in alexipharmacis *μηδον*, id est, Medum malum vocat. Theophrastus quia hoc pomum non nisi apud Persas & Medos nasci voluit, patrio nomine *μηλέα περσική*, & *μηλέα μηδική* vocauit. Pamphilus verò (Athenæo authore) poma quædam Hesperidū vocari tradit, quæ diis etiā apponi cōsueuissent apud Lacedæmonios. Bonum odorem habere hæc & esui apta non esse, & à Romanis *κίτειον* dici. Aristocrates, *μηλέα έσπερική*, & etiam *περσική* dici. Diphilus author est citria ab aliquibus, *κοκκωμηλέα* vocari solita. Aristophanes grammaticus, *όξύκλα* ab acido sapore vocitari, & *άδρυα περσική*. Emilianus ait Iubam Mauritanie regem in suis de Libya commentationibus scribere, pomum hoc apud eos *μηλον έσπερικόν* nominari, inibiq; ab auri similitudine *χρύσα μηλέα* dici. Phantias Eresius cedrum, & malum citrium appellari. Dioscorides *μηδική μηλέα*, & *κεδρομηλέα* & à latinis citria dici. Galenus malum medicum amplius vocari negat, citrium duntaxat ab omnibus dici. E Latinis verò M. Varro Libycam citrum dici ait. Plinius nomine sumpto à regione illi contermina Assyrium malum vocari dixit. A Palladio dicitur Citrus, Citrius, & Citreum. Macrobius ex autoritate Cloatij, & Oppij eandem esse probat citream malum, & persicam. Cedrum, & citrium dicitur ob diuinam odoris fragrantiam, quasi cithyon, odoramentum diuislibandum. Itali *Cedro*.

Duplex est genus: alterum, quod ouatam, alterum quod rotundam refert speciem. Ex ouatis primum de Citrio dicemus. Est inter citria genus vnum, quod pomum affert, vt maris, & fœminæ genitalia, aliæve corporis membra tam affabrè ficta ostendat, vt admirabilem simul, & iucundissimam inspectionem intuentibus præ se ferat; quod genus & planta & pomo ab aliis differt.

Nos adductā à Theophrasto delineationem afferemus, nam vt Athenæus refert ad nostram citrum referri potest. Folium eius Adrachnes intercurrentibus spinis, vt in pyro, & oxyacantha, sed læuibus, infestis, mucroneq; validis. Pomū non estur, sed ipsum & arboris foliū odore pollent, qui trāsit in vestes vnà cōditus, at cerq; animalū noxas. Arbor ipsa omnibus annis tepotibus fœcunda,

& superfoetans, aliis decidentibus, aliis subnascentibus, aliis maturefcentibus. Flores soli qui velut erectam in medio colum gerunt fecundi creduntur, qui verò ea carent infructiferi habentur. Perpetuo floret, & ob peculiarem quam fortitur potentiā percoquit. Sed Athenæus alia apponit, quæ in græcis latinisq; libris desideratur, nos apponemus, ut ea suis locis reddi possint. Habet folium ferè simile lauro, adrachne, & nuciuglandi. Dioscorides autem pomi formam innuit ovatam, utrinque acutam, rugis caperatam, colorem auris, suavem odorem alioqui grauem, semen pyri. Plinij verò de Theophrasti sententia verba sunt. Folium eius est vnedonis intercurrentibus spinis. Pomum ipsum aliàs non manditur, odore præcellit foliorum quoque, qui transit in vestes vnà conditus, arceatq; animalium noxia, arbor ipsa omnibus horis pomifera est, aliis cadentibus, aliis maturefcentibus, aliis verò subnascentibus. Tentauere gentes transferre ad sese, propter remedij præstantiā fictilibus in vasis, dato per cauernas radicibus spiramento: qualiter omnia transiura longius: sed nisi apud Medos, & in Perside nasci noluit. Alibi verò de eodè fructu sic ait, Citreis odor acerrimus, sapor asperimus. Nos autem sic describimus. Fragili assurgit termite, prona terrā petit, ni fixis hastis incubet. Folium oblongum, circumdentatum, perforatumque. Flores nitidi postremo limbo purpurascētes, modici odoris. Frondis perpetuum decus, nitida viriditate hilarique, oculos maxime alliciens. Fructus nullis inferiores, odore fragranti, & plusquàm iucundo, duplici colore distincti: virides primum, demum aurimicantes colore. Semen potius ipsius pyri, quàm eius seminis speciem representat. Apud nos operi topiario accommodatissima, cum eius rami flexiles, sequaces sint, in testudines fornicatur, leni umbra ambulacra, & hortorum attegias opacans, duciturq; in omnes formas, turre, tentoria, nauigia, cæteraque quæuis simulachra vestiendo eleganter mentitur.

Cælum.
Loca.

Plinius citria in calidis provenire scripsit. Palladius calidis locis, sed irriguis, & maritimis maxime, quibus humor exundet gaudere ait. Sed si quis hoc genus, ut in regione frigida nutriatur, extorquet, loco vel parietibus munito, vel in meridianā partem verso disponat hanc arborem. Sed hybernis mensibus etiam stramine vel et agresti. Vbi aestas refulserit, aeri arbor nuda, & secuta reddatur. Afferit Martialis apud Assyrios pomis hanc arborem non carere, quod ipse in Sardinia, & in territorio Neapolitano in fundis suis cōperit, (quibus solum, & cælum tepidum est, & humor exundans) per gradus quosdā poma sibi semper succedere, cum maturis se acerba substituant, acerborum verò atatem florentia consequantur, orbem quandam cōtinuæ fecunditatis sibi ministrante natura. Florentinus. Hæc arborum sola iuuatur Austro, & Aquilone læditur. Plantetur loco contra Septentrionem parietibus munito, vel in meridianam partem verso. Cæterum hybernis mensibus tegetibus, aut sportulis recta veler. Ea stirps ut suapte natura tenerior, si paucā glaciem experiatur, cōtabescit: quare diuites, & qui dant operā genio,

extor-

extorquent su
parietem con
ces apertos fol
rectas arbor
Theophrasti
ram rarioris na

Apud nos
ra verò atena
Homines, qui
cupiscunt, se
ptimi sunt. T
ticipi posueru
mæ, ut lucoru

na videatur, q
item mons, &
untur, ut non a
Palladius agen
pina Gallia cit
Seminem feru
gentissimè cul
tur & fictilibu
dius Martio m
cinerem misc
In his arcis pa
mine verso iu
si beneficio
runcetur. P
maiora, &
bem trium,
scras semina
ris vegetior
sit opus, idq;
At si tran
Theophrasti
autumno vsq;

extorquent sub fornices concameratos ad solem spectantes, & inibi propter parietem conferunt & copioso rigant humore. At ubi æstas affuisset, fornices apertos sole sinunt illustrari, & eius tepore foueri; appetente verò hyeme reiectas arbores stramine velant.

Theophrastus tribuit ei molle, vñdum, nec valde tenue solum. Palladius ter-
ram rarioris naturæ. Pontanus in suis Hesperidum hortis, Solum.

— *Putres gleba, quæq; aquor a rastris*
Molle sonent, fluidum facile admissura liquorem.
Nec mihi displiceat salebrosi glareæ ruris,
Quæq; solo tenui gracileis imitatur arenas,
Si modo sæpe fimo spargas, si pronior unda
Diluât ipsa super, latusq; instillet & imber.

Apud nos, etsi solo quocunq; proueniant, lætiora tamen pingui, infirmiora verò arenaceo, & argilloso, & debili, ut croceas frondes producant, sicuti homines, qui morbis torquentur. Potius valles, & plana loca, quàm colles concupiscunt, sed loci in maris prospectu, quicq; abundant humore exudant, optimi sunt. Tale erat Mauritania littus, ubi Hesperidum auriferos hortos antiqui posuerunt, talis est etiam Pausilypus mons noster in afflatu oræ maritimæ, ut lucorum amenitate, & pomorum perenni fœtura neutiquam in quili-
na videatur, quæ magnitudine, & odore cæteris præponi possit. Surrentinus item mons, & Amalphæa littora, ubi fœcunda latissimaque citreæta conspiciuntur, ut non amplius à nobis Hesperidum horti desiderari possint. Hic etiam Palladius agens citriorum cultum primus ipse Italiæ demonstrauit. Sed Cisalpina Gallia citriis caret, ob contrariam cœli solisq; qualitatem.

Semine feruntur. Theophrastus, Semen detractum vere sulcis feritur diligenti-
gentissimè cultis, rigatur quarto, aut quinto die, adulta transfertur vere, feri-
tur & scitibus valis dato radicibus spiramento per cauernas, ut palma. Palladius Martio mense seminum debere fieri docet. Terram in duos pedes fodies, cinerem miscebis, breues areas facies, ut utrinque per canales aqua discurrat. In his arcis palmarem scrobem manibus aperies, & tria grana deorsum acumine verso iuncta constitues, & obruta quotidie rigabis. Citius procedent, si beneficio aquæ repentinis utaris. Natis germinibus semper proxima herba runcetur. Potest hinc tria planta transferri. Nos serenda grana grauiora, maiora, & illa selegimus, & ex perfectioribus pomis. Poteris si libet scrobem trium, vel duorum pedum altitudine excauare, & pingui iniecta terra tria-
feras semina, ubi enata fuerint plantulæ, tollito infirmiores, ut quam reliqueris vegetior fiat, atq; iniecta humo plantæ incrementa sequare, ne transferre sit opus, idq; in aliis plantis facere poteris.

At si transponenda sint plantæ, siue è seminatio, siue densius satæ fuerint, Theophrastus vernum tempus præfigit. Florentinus verò serendas esse ab
autumno usq; ad vernum æquinoctium. Palladius, In spatio non desiderat in-
K k 3

terualla maiora, nec aliis arboribus annecti debet. Scrobium altitudinem ferendiq; modum elegantissime noster Pontanus describit,

Sed tamen & scrobibus modus hic erit, ut neq; in altum

Desideat nimis, ut quantum radice profunda

Haferat, hoc paulo iaceat plus, eaq; lacuna

Hauriat ut solitos imbres, madidumq; fluentum.

Plinius plantam propagine nasci dixit. Quod si cui cordi fuerit, ita fieri posse docebimus, præsertim cum perpetua fruticatio ab imo crure pullulet, & circa, ut sapissimè hoc modo apud nos citræta restituantur. Vbi flagellum videris felici matre natum, circa crus arboris, ramum incuruato, terra cooperito, & optimè calcato: post secundum, vel tertium annum, vbi radices rectè emisisse conieceris, recidito à matre, & transplantato. Sunt qui curuaturam, quæ sub terra cooperitur, per longitudinem findant, & lapidem indunt, exinde enim maximam radicum copiam nascituram promittunt. Si verò vis fictilibus vasculis propagare, traiecto per vasis fundum ramulo, pulla terra repleto, calcato, arboriq; adalligato, ne ventis agitur, aquam continuo instillato, vbi hoc blandimento radices fecisse existimabis, præcidito ab arbore.

Palladius docet ramum non amplius sesquipede immergi debere, ne putrescat. Anatolius, Rami duo extrema in scrobiculo pangi debere, & obrui; sursum à fornicato flexu tumescentem germina præbere.

Idem, ramum qui flecti recuset, in caput reponendum iubet, quod verò crassius fuerit, sursum emineat, & cucumeris cinis iniiciatur. Palladius claua feri commodius posse, quæ sit manubrii crassitudine, longitudine cubitali ex utraque parte leuigata, nodis, & aculeis recisis, sed integra summitate gemmarum, per quas spes futuri germinis intumescat. Diligentiores & fimo bubulo adlinunt utrinq; quod summum est, vel marina alga vestiunt, vel argilla subacta parvis utriusq; extrema cooperiunt, atq; ita in pastinato solo deponunt. Sed calidissimis regionibus per Autumnum ponuntur clauæ. Frigidissimis Iulio, & Augusto positas & quotidianis rigationibus animatas ipse vsq; ad poma, & magna incrementa produxit. Pontanus post ipsarum plantarum putationem,

Tum fragmenta lege, & ramos secerne valentis,

Obliquosq; insige solo, tamen ut capite extent.

Stipitis aut truncum, gladioq; & fulce dolatum

Infode, & in tenui nudatum contege sulco.

Continuo ingentem vicino ex amne paludem

Elice, diluamq; comas immerge salubri.

Nos autem qui temperatis degimus regionibus Martio, & Aprili deponimus, Maio nanque deglubuntur clauæ, & iam intumescens oculi emittunt germina. Luna crescente eliguntur rami nitidi, crassitudine manubrii vel pollicis, longitudine bipedali, atque in terram defiguntur ne maior semipede

V
pede exret, ten
iuxta nodum re
si alteri non ad
num infirmior
trique euellant
Talea, Pallad
ut claua mergat
tempore, quo
Arbor ipsa su

nam si glaciem
tra damna cong
eme stramentu
re plantentur
ventis eas def
eorum calore
ferantur, qua
bent. Florenti
naturali quada
combusta vites

tra verò arboru
deintempesta
more expleri. C
gaudet & corio
poribus. Pallad
accidit plantæ
Planta forman
culis à teneris
ne flantibus fra
obnoxia. Rat

De infirion
frigidis, non f
dam volunt, &
vel fictili vase
runt. Quod

Ait Floren
erit, quæ bene
comore vitis

pede extet, tenuior pars, quæ in terram defigitur, non obliquè sed rotundè iuxta nodum recidatur, ex quo radices sperantur. Rami defodiuntur bini, vt si alteri non adoleſcent, alteri non deſint, ſi ſimul bini enati fuerint, poſt annum infirmiores eruantur dextra, ſiniſtraq; manu alteros deprimente, ne vtrique euellantur.

Talea, Palladio authore, & gracilior, & breuior eſſe poteſt, quæ ſimiliter, vt claua mergatur, ſed palmis duobus ſuperſit, claua omnis obruitur, eodem tempore, quo claua.

Arbori ipſa ſua natura tenella frigoriſus, & caloribus maximè obnoxia eſt: *Cultura.*

10 nam ſi glaciem experiatur, ſiderata contabefcit, ſi calorem, exareſcit. Sed contra damna congelantis & incaleſcentis cœli hæc ſunt adinuenta remedia. Hyeme ſtramentis, & cratibus tegatur, vel lauri, & cupreſſi à ſeptentrionali parte plantentur, quæ cum hyeme perpetua vireant coma à ſeptentrionalibus ventis eas defendant; vel viuam calcem, & ſimum cruri arboris obiciant, vt eorum calore foueatur. Palladius citrium iuuari credit, ſi cucurbitæ proximè ſerantur, quarum vites etiam combuſtæ vtilem citri arboribus cinerem præbent. Florentinus etiam iuuari putat cicum ſitæ cucurbitæ flagellis, quippe quæ naturali quadam vi inſiſtente à frigori inſiſtenti illud vindicant. Cucurbitarum combuſtæ vites citri radicibus cinerem præbent vtiliter inſpergendum. Contra verò æſtios calores poſt ver plantæ irrigandæ ſunt ſole occidente, vel nocte intempeſta, maximè enim tunc arbor imbre inſpergi auct, & abundè humore expleri. Gaudet & ſimo ſaturari ex ſuillo, humanoq; ſtercore, ac lotio, gaudet & coriorum præſegminibus, ac ſoleis, ac tabo corruptis catulorū corporibus. Palladius, Niſi quæ arida ſunt, rariffimè debemus abſcindere. Sed ſi acciderit plantam in frondem luxuriare, ferro eſt eius luxuries compeſcenda. Planta formanda eſt, vt in conū aſſurgat, vel ſi topiatio operi deſtinatur, vinctulis à teneris obedire diſcat. Id tamen præmoneo, ne id Euro, vel Aquilone flantibus fiat, inde plagas cera conteges, ne caloribus, vel frigoriſus ſint obnoxia. Rami pondere grauati, ne in terram procidant palis ſunt fulciendi.

De inſitione hæc Palladius habet. Inſeritur menſe Aprili locis calidis, Maio *Inſitio.*
30 frigidis, non ſub cortice, ſed ſiſſo trunco circa radices. Inſeritur & pyro, vt quidam volunt, & moro, ſed inſiti ſurculi qualo deſuper omnino muniendi ſunt, vel ſi ſtili vaſculo. Sed Auguſto irriguis locis etiam citri arborem pleriq; inſerunt. Quod etiam libro de carminibus ad Paſi, hylum non tacet,

Nec non & Citrii patiuntur mutua rami

Pignora, quæ granido cortice morus alit.

Pomaq; paſturi blando redolentia ſucco

Armatæ mutant ſpicula nota pyris.

Ait Florentinus, Quin etiam ſcitu dignum ſuccurrit, quod arbor citri ſterilis

40 erit, quæ beneficio inoculationis coaluerit: eadè non ſub cortice ſed ſiſſo truncò more vitis inſeri debet. Præterea ſi rubra citri poma naſci voles, ſurculum

moro inferito, & malum rubrum dabit, & vice versa, & utraque arbor fructum feret. Inferitur & punica malo. Diophanes, Citria malus cum tenui libro vestiatur, ait, vix subter cutem recipit inoculationem, nam post coalitum emarcebit, quod sapius probauit, quod si fructum pariat, in cedromela degenerabit. Didymus in Georgicis suis rectè inferi in malum punicam tradidit: Et si malum inferatur in citrium, semper fructum ferre. Auicenna citrum in cidoneam inferi posse dixit, & in salicem insitam fructus semine carituros emitte, & in punicam mala producere rubicunda. Apud nos admodum digitalis citri inferuntur. Caditur cortex in circulum, & duorum digitorum longitudine exiit virga, inde alteri virgæ eiusdem crassitudinis nudatæ, ut extremitas partium oræ coeant, imponitur (ut superius docuimus.) Inferitur inter lignum & corticem, & cum omnes citrorum species similes sint & cortice, & germine, inuicem dant, recipiuntq; furculos, & mutuo fœdere immutant fructus. Pontanus noster alium insitionis modum tradit, quo multi videntur.

*Sunt qui diuersos ramos, sed cortice raso
Coniungant, stringantq; simul, quo glutine misto
Increſcant aque, ac fixo mox stipite iunctos
Inſigant pariter. Tum vulnus rite coronent,
Et fallax opus admotatueantur ab arte,
Quoramo ex vno, atq; vno de palmitē fructus
Non vni veniant, ſit honosq; & gloria ruri,
Gaudeat in ſolito natura adiuta fauore.*

Ars.

Palladius ut maiora poma proueniant, continua fossione exhilarari iubet. Florentinus autem, Vbi fructus increſcens degrauat, multa detrabi poma cōueniet, & pauca relinqui, sic altilia vegetiore proficient incremento, & in maiorem peruenient crassitudinem. pubescens autem malum fictili claudatur, nam per incrementa formam vasis accipiet, & vasis magnitudinem æquabit, ut ad eius magnitudinem pomum peruenire contendat, sed fiat foramen in vase per quod aer inspiret. Pomum id non mandi solitum Theophrasti ætatē, nec Athenæi aorum memoria, ut idem Athenæus author est, cum ut pretiosum quiddam inter vestes tantum deponi solet, nec Plinii tempore. Vnde Palladius medullas eius acres in dulces mutare docuit. eius verba hæc sunt. Feruntur acres medullas mutare dulcibus, si per triduum aqua mulsæ semina ponenda macerentur, vel ouillo lacte quod præstat. Aliqui mense Februario truncum obliquo foramine ab imo terebrant, ita ut altera parte non exeat, & ex hoc humorem fluere permittunt, donec poma formentur, tunc foramen luto replent, sic quod est medium fieri dulce confirmant. Pontanus suis Hesperidum hortis docet idem,

*Quo non ars penetrat? Palmes cadatur, & ipse
Crassior; in palmumq; cauetur, & vndiq; labris*

In girum

40 Sivero
dem Pontan

*In girum ductis, nec pollice crassius, illuc
Infer mella liquata, & grandi contege saxo,
Quod solem auertat. Postquam arida suxerit arbor
Inclusum humorem, & sitiens noua pocula gliscit,
Mella cano immersans flauentibus imbue riuis
Rursus, & euacuam Thymbræo nectare cellam
Distende, ac latices humano è corpore fusos
Mollibus irrorat radicibus. Interea ne
Neglige frondosas toto de stipite gemmas
Vellere, mos opius ni quā liquor implet, & ipsa
Labrātrahunt dulcem mulsī de fronte liquorem.
Illas tu gemmas, illaq; & germina serua,
Et blandire manu, & ventorum auerte procellas,
Arce hyemes, funde Hyblaos & largiter amneis.*

Et paulò post.

*Sunt qui lecta manu, solerti & semina cura
Contingunt mulsā, Siculo aut madefacta liquore,
Postquam autem traxere ipsum ad præcordia rorem,
Sedaruntq; sitim medicato nectare, terra
Infodiunt, & culta rigant, ea denique fructu
Iam referunt tenerum, quem quondam hausere saporem,
Quemq; & arundineo duxere è palmitē succum.*

Africanus scriptum reliquit modum, quo vel humanam, vel alterius animalis induet imaginem. Si gypso, vel luto siccescente hanc obduces, & mucronis acie bipartita, videlicet in anterius, & posterius dissecueris, ut & iterum aptè possint coniungi, post in figulina torrebis: cumq; pomum ad dimidium peculiaris incrementi peruenerit, iis formulis claude, diligenterq; vinctulis adstringe, ne obuoluti pomi peractu fictiles typi diuellantur. pomum siue pyrum, siue punicum malum aut citrium fuerit; breui has exprimet animalium effigies, quorum & habitum, & imaginem mentiri placet. Quod idem ex Florentino supra docuimus. Sed quomodo citria fructu perenni, ac prouentus onere semper grauentur, totoque anno sua arbore insideant, docet suis carminibus Pontanus,

*Neue autem toto fructus tibi desit in anno,
Carpe manu partem, & plenis baccharē canistris,
Quæ reliqua est grandis finito gaudere uolemis,
Confestim, quæ parte dolet viduata, recentem se
Induit in florem, atq; implet spe diuiter amos.
Sic etenim alterno dutescet sylua metallo.*

Si verò arbor una diuersa poma diuerforumq; saporum afferat, noster idem Pontanus docet eleganter:

Qui diuersa quidem parua sed semina in vna
 Condat, & educens collo breniore stolones
 Subducitq; arcetq; manu, ac sub vincula cogat
 Crescentes, hi tandem vno se stipite miscant,
 Atque vno obducant se cortice: neue flagella
 Dilabi finito, neu summa cacumina ventus
 Diuellat, cera linito, aut diducat adulta,
 Vngue dum proprio corpus iunguntur in vnum,
 Atque operit lentum sub eodem cortice gluren.
 Postquam alta steterit radice in fossa, & opimura
 Raptarit stirpes succum, mirabere poma
 Plenaq; gratiaq; non vno tamen vna sapore.

Visitur Surrentinis in hortis genus citrii, quod ex artis mangonio produ-
 ctum existimo, quodque acris medullæ loco aliud citrium affert, eodem pedi-
 culo, quo continens, cortice, & integro citrio, quo nil mirabilius videri potest.

Condi-
 tura.

Palladius de eorum conditura hæc habet, Citreum & in arbore potest per
 totum annum propemodum custodiri. Melius si vasculis quibuscumq; clau-
 datur. Si velis poma legere, atque seruare, nocte luna latente debebis cum
 ramis foliatis carperè, & secreta disponere. Alii singula vasis singulis claudunt,
 vel gypso adlinunt, & opaco loco ordinata constituunt. Plerique in cedri sco-
 be, vel in straminibus minutis, vel in paleis tecta seruât. Sotio iuber pomum
 citri subacto gypso studiosè perlini, vt toto anni curriculo inoffensa integri-
 tate incolume ab omni vitio seruetur: eaq; non putrescere promittit, quæ in a-
 ceruis hordei fuerint obruta. Sed mirum proditur calido pane citriis superpo-
 sito celerius putredinem concipere.

De limonibus malis. C. A. P. VII

EX hac tribu alia & citriorum species, quæ ouatam etiam habet formam;
 sed ab eius odore, sapore, & qualitate maxime recedit, cuius Latini, Græ-
 ciq; authores non meminerunt.

Nomen.

Recentiori Latio mala limonia dicuntur. Neapolitani *Limoncelli* dicunt, 30
 à limone velut inflexo nomine.

Genera.

Huius duplex genus, maius, & minus.

Forma.

Maius, quod vulgò *Limoncello* appellatur, oblongo formatur ductu, ac
 protenso corpore citrium imitatur, & interdum magnitudine. Cortice con-
 stat non adeo crasso vt citrium, sed vberiori, & acriori succo. Colore ex viridi
 in luteum languescente. Fronde citrii, sed breuiori. Flore mali aurei, sed odo-
 re inferiori, floretq; cum eo. Sed id genus cultus, & institutionis mangonium in-
 tantas digessit species, vt enumerare quis non facile queat. Aliud enim corti-
 cem, aliud medullam tam dulcem cōiunet, vt simul mandantur, aliud tam du-
 ro regitur cortice, vt gestatum toleret, & longius asportari patiatur, aliud se- 40

mine:

roine caret, spadonium, aliud per longitudinem striatum, visendæ speciei, vulgò canaliculatum dicitur. Sunt quæ orbicularem formam referat, sunt etiam, quæ ab orbiculari forma recedant. Minus Neapolitani *Limoncello picciolo* vocant, inter cætera huius generis acrium mala nobilius existit, citriorum malorum decus. Fronde nigra cuspidata, & minoris quàm arboris mali aurei. Succo cæteris acriori. Perpetua coma vulnificis infestisq; aculeis hispidatur. Flore semper nouo, semper fortu auctum. Huius multa quoque sunt genera. Est inter ea genus vnum quod maius ferè æquat, agricolæ in sitionis arte effectum prædicant. Aliud est sine semine, est & aliud nuper nobis adinuentum, ut caro & cortex dum simul vorantur, os & fauces iucundissimo cinnamomi odore repleant: vulgò *Limoncello incannellato* dicitur.

Cælum siue algens, siue æstuans planta non perfert, postulatq; assidue irrigari æstate, hyeme tegenda est, ac manipulis stipanda, subtus fimo obruenda, ne vis illam Boreæ aut cœli adurat, nec nuda hyemi credenda, cum cæteris plantis tenerior sit, & iniuriis magis exposita, ideo locis natura, vel industria ab iis tutis seruatur: ut sub præruptis Paussilipi collibus, & Surrenti, ubi semper lata, perenni fronde, ac fructibus onerata conspicitur.

Cultus idem qui superior, sed in minori specie maior cura adhibenda est. Vnde ob dictas causas fictilibus vasis in fenestris asseruatur, coliturq;: nam dum præ oculis habetur, quotidiano cultu non defraudatur.

Inseritur minoris magnitudinis genus citrium, ut odoratus, coloratus, & maius fiat, & iterata insitione augebitur semper. Inoculatione proficit, sed quia spinæ impedimento sunt, quominus à furculis deglubantur gemmæ, ideo vel aliquot mensibus prius deradantur, vel illi seligantur, qui spinis careant.

De malo aurea. CAP. VII.

IAM ad alias malorum medicorum species deuentum est, scilicet, quæ orbis formam retinent, ex iis principatum sibi vendicat aureum malum, ut potè apud nos vulgarius, & magis obuium.

Ab aureo colore, quo rutilat, cum maturuerit, multi sunt, qui putant malum aureum dici, atq; de eo intellexisse aiunt Virgilium, cum dixit, *Aurea mala decem misi, cras altera mittam.*

Vulgus narantium vocat. Hermolaus rantium putat ab æris colore, quasi randium vocari, hoc est fuluum. Quamquàm & à Neratio fortasse inuentore neratium dici potuit. Vel arantium quasi arianum à gente, est enim Aria, ut inquit Hellanicus, Persica quædã regio. Vel malum arantium ab Arantia oppido Achææ, quod & pomis fertile scribunt fuisse. Accedit quod Herculem mala Hesperidum Arantium primum tulisse credunt, authore Pausania. at scholiastes Nicandri super versu illo in Alexipharmacis,

καρδελινός, μὴ δὲ οὐτὴ καὶ ἐμπερίβοντα σινίτην. id est

Cardamifolium, Medum, ardensq; Sinapi.

Ait, *μῆδόν τε, μῆλον ὅτι τὸ μῆδόν τε τὸ νεαλόν*, id est, malum medium, quod nea-
zion vocant. Neapolitani *Citrangulo* dicunt, nimirum à citro deflexo nomi-
ne, quasi citraginem dicas.

Forma.

Apuleius negat eandem esse malum medicam, & citrum; cum citrus exigua
sit arbor, malus medica verò ingens, ac pterocero stipite & cortice, & foliis lau-
ro similis sit, citro verò dissimilis, cum folia multo maiora quàm laurus, eadēq;
diuersi coloris. Hanc Virgilius descripsisse videtur, cum cecinit,

Ipsa ingens arbor, faciemq; similima lauro:

Et si non alium late iactaret odorem,

Laurus erat: folia haud ullis labentia ventis;

Flos apprime tenax.

Arboris cortex fusca viriditatis. Folium nigrum, minus inter cætera odo-
ratum. Flos albus, medio auro interlitus, odoratissimè inter id genus acria
mala latè spirat, auidissimè ab vnguentariis quæritur ad varia odoramenta
paranda, elicitur ex iis aqua, quæ non solum cæteras odore antecellit, sed ad
multa valet medicamenta. Mala sunt rotunda triplici colore distincta, viri-
di primum frondes referentia, demum rutilant, matura fuluo nitent me-
tallo, aucta semper fœtu.

Genera.

Huius triplex genus, vnum dulce, alterum acre, tertium ab utroque com-
mixtum: ut mediū saporis sit inter acrem, & dulcem. Inter ea alia mala, quæ
succosa sunt, alia, quæ minus succi habent. Color dulcis albicanti auro similis,
vel paleæ. Acris rubicundior. Est & genus aliud, quod foris maris & fœminæ
pudenda indicat. Nam cum cætera arbores casu pomū aliquod producant, est
ramen genus, quod poma omnia huiusmodi ferat. Est & genus aliud, quod &
si foris humana genitalia effingit, duplicem habet intus spicarum ordinem,
alterum in altero contentum, ut nihil speciosius videri possit. Est & genus ali-
ud cuius spicæ aliæ dulcem, aliæ acrem referunt saporem in eodem malo. Ho-
rum omnium generum Neapolitana pomaria plena sunt.

*Culmibus
solum.*

Frigidiores cœli tractus, quàm cætera, hæc arbor sustinet, cum magis robu-
sta, & rustica, minus commodam humum, ac negligentiam cultus patitur.

Satis.

Seritur semine, idemq; malum restituet dulce, vel acre, maius, vel minus.
post decimum, vel duodecimum annum. At ubi aquarum copia suppetit, ci-
trius adolescit, ut in Stabiarum seminariis videre licet, ubi optima humus, & a-
qua abundat, ubi plantaria filiarum dotes appellant, non solum huius generis,
sed cæterorum malorum medicorum. Seritur & claua, sed tardè adolescit, &
continuis rigationibus adiuuatur ob ieiunam corticis ariditatem.

Cultus.

Potest & quocunque suæ ætatis tempore transplantari, quod nulli ferè ar-
bori contingit, imò iuuenescit, & sic videtur quodammodo perennitatem sorti-
ri. Sed saram oportet primo, vel secundo anno rigationibus adiuuari: quod a-
xundinibus excauatis, vel fistilibus tubis fiet comedè, vsq; ad radices defixis, 40

ut maximis in Canis ardoribus illæ refrigerari possint. Sed hyeme in gelicidlis obturentur, ne frigus penetret fibras.

Inseritur Maio mense inter corticem & lignum, sumatur furculus ex arbo-
re, quæ pomum producat, quod minora semina intus contineat: ea enim sunt
optima, non autem te decipiant ex, quæ maius pomum producant: nam id ex
foli vbertate, & arboris iuuenta potest prouenire. Sit furculus ex parte, quæ ad
Aquilonem vergit, ut cum in meridianam trunci partē in seueris, vel ab Aquilone
turam, meliorem nactus locum, latius germinet. Inseritur etiam aptè
per infoliationem. Inseritur hæc arbor in citrum, & optime coalescet. Sed sit
infusio sub terra, vel si super terram fuerit, adulta planta transferatur, & terra
obruatur, nam cum citrus fragilis, & tenella sit, & parua arbor: si infusio-
nis co-
alitus supra terram fuerit, male sustinet ventorum concussionem. Sunt qui
eam inferant in aquifolium, & ilicem, eisq; arboribus infusa frigidis in locis
viuit, seq; magis contra variantis cœli iniurias tuetur.

Extat apud nos, ut diximus, genus vnum mali aurei, quod malum affert, cuius
dimidia pars dulcis, altera verò acris. Casus fecit commistionem. Erant
rami duo, quorū vnus infusus dulcia ferebat mala, alter acria: cum transplan-
tandæ arboris daretur occasio, ac per medium secaretur, ut mos est in plantan-
dis huiusmodi arboribus iam verustis, incidit sectio in infusio-
nis locum, cumq;
germina proferret, ex vtriusque cortice acris, & dulcis vnum prosiluit germē,
quod huiusmodi mala protulit: itaque arte id effici poterit, si huiusmodi ma-
la producere cordi fuerit.

De Limone. CAP. VIII.

NON longe à prædicti mali forma recedit mali medici species, quam Nea-
poli vulgus Limonem vocat. Arbor surgit ramosa, contorta, formaque
limonium malum iam dictum imitatur, magnitudine verò, & folij colore, la-
titudineq; aureum malum. Fructus in iuuenta in longum produci, in senecta
verò in orbem contrahi videtur. Spicæ intus malorum limoniorum formam
imitantur. Umbilicus foris protenditur, non intus, ut in aureo malo, & totum
genus acuminatis fastigijs hispidatur, perpetuaque fronde comante. Fructus
magnitudo malum aureum superat. Et si aliqua ex arbore poma decusseris,
hæres fraterni lactis latius augebitur. Succo repletur admodum acris, & ingra-
to. Foris herbaceo viret colore, in vltima maturitate croceo. Cute non adeo
crassa, ut malum aureum, vel citrium. Id genus igni admotum, sensimq; reco-
ctum rorem instillat foris, quo Neapolitanæ puellæ ora lauant, & nitorem
inducunt.

De Poncerio. CAP. IX.

EST & aliud acrium citriorum genus, orbiculata facie, quod poncerium
dicunt, ducto nomine à pomis cercis, vel citriis. Folio maioris limonij.
Flores mali citrij. Duplex genus, aliud paruo, aliud prægrandi turgens volemo,

ut melonis magnitudinem superet, ut vix illa quis possit circumplecti, cortice crasso pollicem æquante, puluillis & torulis rugolis papillatim extuberante, & dulci, ut cum carne simul mandari possit. Ferunt id littora Surrētina, & Amalphæa, quamuis minori copia, quàm supradicta genera. Nostri legitimum vocant. Aliud genus est parua contentum forma, nostri spurium, vel nostrate dicunt, acriori sapore. Est præterea aliud genus, quod mala fert inspidiora, & à pharmacopolis propter condituram desideratur.

De pomo Adami. CAP. X.

POSTREMUM genus à priori tam parum differt, ut sint, qui ab eo nil differre putent, sed non ad iam antedicti magnitudinem crescit, limonem verò æquat, cortice non admodum crasso, pallido, è latiore basi in rotundiorum conum turbinatur, vertice obtuso, & quasi umbone depresso, & in aquali, fissuris quibusdam apparentibus, proinde ac si dentibus demorsum esset: succosa ei, & acida medulla, sed est etiam dulci. nostrate vulgus *Pomo di Adamo* appellat, in quo morsum nostri protoplasti conspici dicit, atque ob suam pulchritudinem ex terrestri paradiso delapsum. Nobis pro deliciis potius habetur, quàm vsui sit.

De malo cotoneo. CAP. XI.

DIXIMVS de pomiferis arboribus æterna coma pubescentibus, nunc ad eas, quibus decidua est, & primum ad malorum cotoneorum historiam descendamus, quam nō iniuria cæteris præferimus, cum Glaucides Athenæo referente, omnibus præferri velit, quæ, ut Columella ait, non solum voluptatem, sed etiam salubritatem afferunt. Plutarchus in præceptis cōnubialibus ex Solonis iussu scripsit, sponsam non prius cum sponso concumbere, quàm malum cotoneum degustasset, innuens primam gratiam, quæ ab ore, voceque sponsæ demanat, bene compositam, aptam, & suauem esse oportere. Et idem in problematis author est, primos complexus nil triste, aut iniucundum habere debere. Ex quo Plinius. Omnia iam & virorum saluatoriis cubilibus inclusa, simulachris noctium conscis imposta. Phylarchus, Athenæi auctoritate, prodidit cotonea mala suo præstanti odore letalium venenorum vires retundere, & vehemētiam eorum hebetare. Addit Pharicum præsens alioqui venenum in patina positum adhuc illa vel eorum salgamam olente, ignauum fatiscere, languidumq; à peculiari natura viribus exhaustis desciscere, illosque incolumes & illæsos remansisse, quibus illud venefici propinauerant, compertumque tandem hoc eorum relatu, qui venenum vendentes ita se habereprehenderunt. Mirum est, quod multi referunt, si mulier prægnans cydonia mala esitauerit, illam industrium infantem, atq; ingeniosum esse parituram.

Nomina.

Theophrasto σπρίσιος μηλέα, & κιδώνιος μηλέα dicitur. Hermon ex Athenæo, codymala nominari asserit, & si Polemon floris speciem esse voluerit. Philemon

mon in rebus
struthia dicitur ap
car. è Latinis Ca
Cydonia Pliniu
ia oppido.

Aut

Macrobis e

Ipsa

Columella s

10 Theophrastu

theum, satium

ne satum hoc u

minus vilia: c

noris magnit

noris esse mag

ctus facilius, ex

niorum genera

rum genera. Cl

candidiora, no

10 nis suis honor.

proiètu, præco

cere Miluianū,

uestria, à struth

Primum in sylu

theis odorauit

riuum genus in

& Musteum. C

to, à Theophr

pressa mali eff

10 Musteum, qu

lanugine cane

nari: magnam

apud Græcos

orbiculato:

genere sic Pl

Est & Neapo

rium genus st

ris, colore au

codymala e

40 Species à turbi

Theophrast

mon in rebus rusticis *σπουδιόμυλλα* vocat, Nicander Thyaticus mala cydonia struthia dicit appellari, sed ex sententia Athenæi errat. Pollux æstiuæ mala vocat. è Latinis Cato primus mala cotonea vocauit, & struthia, itemq; M. Varro. Cydonia Plinius ex insula Creta aduecta narrat. Q. Serenus ex Cydone Cre-
ta oppido.

Aut quæ primum Cydon Crateis misit ab oris.

Macrobius ex Cloatio cottonium dici. Virgilius cana mala vocat,

Ipse ego cana legam tenera lanugine mala.

Columella struthia, & cydonea. Palladius cydonia habet. Itali *Cotogna*.

- 10 Theophrastus videtur duo cydoniorum genera facere, cotoneum, & struthium, satium struthium, sylvestre & peius cotoneum, quod ex illius semine satum hoc nascitur. Dioscorides struthia vocat, quæ magna quidē sunt, sed minus vilia: cotonea sunt parua, rotunda & odorata. Alcmon ait struthiū minoris magnitudinis esse, quàm codymalū, vt recitat Athenæus, & struthiū minoris esse magnitudinis, & minus succi habere, & minus austerū esse, & concoctu facilius, ex hybernis verò cydonium magis austerum. Columella tria cydoniorum genera facit, struthia, chrysomeliana, & mustea. Plinius ait, Plura eorum genera. Chrysomela, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Quæ candidiora, nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitani-
20 nis suus honor. Minora ex eodem genere struthia, odoratius vibrant, serotino prouentu, præcoci verò mustea. Struthieis autem cotonea insita suum genus fecere Miluianū, quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parua sylvestria, à struthieis odoratissima, in sepibus nascētia. Nos ita diuidemus ex his. Primum in sylvestre, & satium. Sylvestre est parū, incisuris crispatur, à struthieis odoratissimum, quod in sepibus nascitur: apud nos *Cotogno seluaggio*. Satium genus in tria diuidemus cum Columella; Chrysomelianū, Struthium, & Musteam. Chrysomelianum incisuris distinctum, colore ad aurum inclinato, à Theophrasto, & Dioscoride arbitror cotoneū appellari. Hoc genus à compressa mali effigie, sessilis rotunditatis malum, Neapoli *Melo cotogno* vocant.
30 Musteam, quod primum prouenit, magis dulce, minus odoratum, minori quæ lanugine canescens: à Theophrasto, & Dioscoride videtur struthium nominari: magnum enim est. Hermon, ex Athenæo codymala nominari ait. *κώδυμα* apud Græcos etsi papaueris caput significat, pro capite tamen ponitur, & pro orbiculato: nam videtur hoc genus humani capitis instar tumescere. De eo genere sic Plinius. Candidiora nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitanis suus honor. Neapolim ex Vesuuio trilibria veniunt. Tertium genus struthium, quod minoris quidem magnitudinis, sed odoris maioris, colore aureo, medio habitu. Ideo Alcmon minoris magnitudinis, quàm codymalum esse dicit. Minus ex eodem genere odoratius spirat. Hic viraque
40 species à turbinata pyri figura *Pero cotogno* dicitur.

Theophrastus de cotoneorum odore loquens ait, Eorum odor validior est, *Descriptio*.

quæ terrena magis quibusque aquosa vis admiscetur, quæ per vetustatem ex-
arescente, quodam temporis spatio vibrant odorem. Dioscorides diuersis
in locis ita illud descripsit. Arborem habet arburo non dissimilem. Fronde
pingui solanum somniferum imitatur, quod aliqui balicacabon appellant, &
capparem, effigie verò saluam. Plinius hæc habet. Poma proxima amplitu-
dine pineis nucibus, incuruatos trahunt ramos, prohibentque crescere parente.
Et alibi. Citreis odor acerrimus, sapor asperimus quadamtenus & cotoneis.
Nos ita describemus, & si notior sit, quàm ut debeat describi. Arbore comuni
ferè malo simili, nisi quod infra illius magnitudinem subsidet. Flore albo, vel
ex albo purpurascente, sylvestris rosæ figura. Folio angusto ab ima parte albi-
canti. Pomo tenui lanugine pubescenti, cuius figuram supra descripsimus.

Celsum.

Palladij verba hæc sunt. Amant cydonij locum frigidum, humectum. Si
in tepido statuuntur, opus est illis rigatione succurri. Ferunt statum medio-
cris situs, inter naturam frigoris, & caloris, & in planis, & in decliuis proue-
niunt, tamen magis inclinata, & deuexa desiderant. Arianus ait, teste Athe-
nao, Egregia nasci poma in Sydunte Corinthi pago.

Solum.

Etsi alius inditum, solum tamen pullum, & pingue ei statuimus: (tale est
Octavianus pagus in Vesuuii positus, ubi optima nascuntur cydonia, & ferè
trilibræ,) quia in sicco, vel macro, vel exiguo, vitiatumque, vel fructus nullus
nascitur.

Satio.

Semine feri posse: sed fructus degenerare Theophrastus prodidit: cum è
struthei semine mala cotonea proueniant. Ex quo Plinius, Cotoneum semi-
ne satum degenerat, inquit. Palladius quomodo plantis ferenda sit, docet his
verbis. Cydoneis ferendis plerique tempora diuersa dixerunt, tamen mihi usu
compertum est, in Italia circa urbem mense Februario, vel inchoante Martio
plantas cydoniorum radicas in pastinato solo tenuisse adeo feliciter, ut sape
sequentis anni fruge gauderent, si postea maioris status fuissent. Locis siccis,
& calidis extremo Octobri, vel Nouembri inchoante ponantur. Ita ponen-
dæ sunt largæ arbores cydonij, ne alteram quatiente vento stillicidium tangat
alterius. Dum minor est, vel quando ponitur, iuuetur stercore, maior verò
cinere, vel cretæ puluere semel toto anno radicibus missò. Plinius, Tempus
plantationis post mediam hyemem in idus Februarias. Didymus ait, eodem
tempore, & modo plantari debere, quo pyrum & cerasum. Dixerat autem
pyrum post mediam hyemem usque ad ver esse plantandam. Palladius, ferunt,
inquit, aliqui cacuminibus & talea, sed tardus est in utroque prouentus. Pli-
nius, Surculos abscissos ferere, hoc primum sepius causa factum cotoneo depa-
cto, mox & cultura. Sed apud nos seminibus feri desitum est. Plantis tota hye-
me plantatur, cacuminibus verò frequentius, sed solo humecto pingui, & pa-
stinato, in Surrentinis vineis cum vites propagantur, eadem in scrobe virgas
cotoneorum ponunt, mox radicas transplantant.

Cultus.

De eius cultu hæc habet Palladius, Rigandæ sunt quoties cælestis negatur
infusio.

infusio. Circu-
gidis verò Feb-
efficiuntur, aut
tiosis omnibus
Palladius, A
cortice. Recip
malorum, qua
bus succus est i
tex, & lignum
10 possit, testatu

Sed mense
ba Aprilis infer
10 Ianuario vltim
Plinius tubere
suum genus fe
nes scriptum re
cunquæ ergo v
coalescit. Coto
doniam. Coto
nec vllis forcul
toneo, fierique
la. Tarentinus
mespilum in
30 vulgo Mos
niunt, omnis
Palladius
efficit. Dem
tit: si infor
Palladiu
debet affu
de mista cr
meri poma
quod annis
40 M. Varr
irectè puta

infusio. Circumfodiendæ sunt locis calidis Octobri mense, & Nouembri, frigidis verò Februario & Martio. Nisi enim circumfodiatur assidue aut steriles efficiuntur, aut earum poma degenerant. Putandæ sunt, sicuti probaui, & à vitiis omnibus liberandæ.

Palladius, Mense Februario cydonia inseruntur melius in trunco quàm in cortice. Recipiunt in se surculos propè omnis generis, punici, sorbi, & omnium malorum, quæ meliora producant. Inseruntur autem nouellæ arbores, quibus succus est in cortice. Si maior est circa radicem, melius inseretur: vbi cortex, & lignum beneficio foli adhaerentis humescit. Quod nulli arbori inferi possit, testatur his carminibus.

Cum præstet cunctis se fulua cydonia pomis,

Alterius nullo creditur hospitio.

Roboris externi librum aspernata superbit,

Scit tantum nullo crescere posse decus.

Sed propriis pandens cognata cubilia ramis,

Stat contenta suum nobilitare bonum.

Sed mense Martio dixit, Cydoniam Martio inferi: Et Ianuario ostendit, forba Aprilis inferi in cydonio. Et Septembri, tuberes in cydoniam inferi, mense Ianuario ultimo, vel Februario, surculus mirabiliter proficit cydonio insitus. Plinius tuberes inferi in malo cotoneo dixit. Struthæis autem cotonea insita suum genus fecere miluianum, quæ sola ex his vel cruda manduntur. Diophanes scriptum reliquit, Cydonia & caprificus omnem arborem suscipiunt, quæcunque ergo voles in his inferito. Damascena prunus cotoneæ malo impacta coalescit. Cotonea oxia canthæ cõsortium nõ aspernatur. Pyrus inseritur in cydoniam. Cotonea malus, & caprificus arboris cuiuscunq; consortium ineunt, nec ulli surculo denegant hospitium. Anatolius author est, malum inferi in cotoneo, fieriq; ex cotoneis mala pulcherrima, vocata apud Athenienses melimela. Tarentinus verò pyrũ in malum cydoniam inferi. Nos autẽ Ianuario mense mespilum in cotoneam inseuimus & optimè apprehendit. Pyra superba, quæ vulgo *Moscarelle* dicuntur, inseruntur in cotoneam, & optima poma proueniunt, omnisq; generis pyra, colore, odore, & magnitudine insignia.

Palladius. Poma in his & cito matura, & maioris incrementi assiduos humor efficit. Democritus cotoneum cuiusq; animalis effigiem representare promittit: si in formulis insculptis clausum adolesceret.

Palladius ait. Si arbor ægra est, amurca aquæ æqualiter admista radicibus debet affundi, aut calx viua temperata cum creta, vel resina locularis pici liquida mista trunco arboris adlini, vel ablaqueata arbori circa radices imparis numeri poma cydonia pro magnitudine eius ponenda, & obruenda firmantur, quod annis singulis factũ custodier à vitiis: sed arboris longæ derogabit ætati.

M. Varro conditiua mala in loco arido, & frigido supra paleas posita seruari rectè putat, & in pensilibus iunctis. Columella de malorum conditura hæc

habet, Multi eadem ratione, qua granata, in scrobibus vel doliis seruant cydonia. Nonnulli foliis ficulneis illigant, deinde cretam figularem cum amurca subigunt, & ea linunt mala, quæ cum siccata sunt in tabulato, frigido loco & sicco reponunt. Nonnulli hæc eadem in patinas nouas sicco gypso ita obruunt, vt altera altera nō contingant. Nihil tamen certius, aut melius experti sumus, quàm vt cydonia maturissima integra sine macula, & sereno cælo decrescen-
 te Luna legantur, & in lagana noua, quæ sit patentissimi oris, deterfa lanugine
 quæ malis inest, cōponantur leniter & laxè, ne collidi possint: deinde cum ad
 fauces vsq; fuerint composita, vimineis surculis sic transuersis arctentur, vt
 modice mala comprimant, nec patiantur ea, cum liquorem acceperint, suble-
 uari, tum quamoptimo, & liquidissimo melle vas vsq; ad summum ita replea-
 tur, vt pomum submersum sit. Hæc ratio non solum ipsa mala custodit, sed et-
 iam liquorem mulsei saporis præbet, qui sine noxa possit interdum dari febrici-
 citatibus, isq; vocatur melimeli: sed cauendū est, ne quæ in melle custodire vo-
 lueris, immatura mala condantur, quoniā cruda si lecta sunt, ita indurescant,
 vt vsui nō sint. Illud verò, quod multi faciunt, vt ea diuidant osseo cultro, & se-
 mina eximant, quod putent ex eis pomū vitari, superuacuum est, sed ratio, quam
 nunc docui, adeo quidē certa est, vt etiā si vermiculus inest, nō amplius tamen
 corrumpantur mala, cum prædictū liquorem acceperint. Nam ea mellis est na-
 tura, vt coerceat vitia, nec serpere ea patiatur, qua ex causa etiā exanimū cor-
 pus hominis per annos plurimos innoxium conseruat. Palladius verò, Legenda
 sunt matura cydonia, quæ hoc more seruantur, vel inter binas tegulas posita, si
 luto ex omni parte claudantur, vel si defruto incoquantur, aut passo. Alij, quæ
 maiora sunt sic foliis inuoluta custodiunt. Alij tantum locis siccis reponunt, à
 quibus vêtus excluditur. Alij canna, vel ebore in quatuor partes diuisa sublati
 omnibus, quæ in medio sunt, in vase fictili melle obruunt. Alij in melle sic in-
 tegra dimittunt. In quo genere cōdiendi satis matura deliguntur. Alij milio ob-
 ruunt, vel paleis separata demergunt. Alij plenis vino optimo vasculis mittunt,
 vel vini, & defruti ad seruandā cydonia æquū corpus efficiunt. Alij doliis musti
 mergunt, atq; ita claudunt, quod odoratū reddit & vinum. Alij in patina noua
 sicco gypso obruunt separata cydonia. Democritus verò lecta cotonea doliis
 musti mergit, atq; ita claudit, quod & odoratius vinū reddit. Face vini mirū in
 modū seruantur, aut fictile nouū iis malis assignatur, operculoq; picato in vinū
 doliū clauduntur, sic tamen, vt fluerent: ita recentia teneri promittit, & vinū,
 in quo enatant, odorem bonū contrahere; aut in floccis, tomentōve mundo
 cistis disposita cōduntur. Itidē diu in scobe demersa custodiuntur: quippe sco-
 bis ariditate defenduntur. Nec secus in straminibus minutis, vel paleis obruta
 cōponuntur. Sed in domo nō recondenda, vbi reliqui fugaces fructus, vel alij
 quoq; teneri resident: siquidē hos suo acerrimo sapore labefactantia vitiant,
 sed maximè vvas in vicino situ iacentes marcore cōficiunt. Nonnulli foliis in-
 tegunt, deinde argillo sum lutū, aut cretam figularem cum pilis subigunt, & ea li-
 nunt.

nunt mala; quæ
 habitus, fracti
 hordeo obrui
 terclus spirant
 tere. Sont qui
 nia melle cond

10 Nunc de
 M. Varr
 mel dixit. Ma
 iudicio, quan
 nata fuerit. I
 uicem malis
 amoris poma
 tonis epigram

10 Ha
 Ad id etiam
 Ap
 Pr
 Ad quos ve
 Et
 Exiis vetia
 rum: vnde i
 10 Claudij Imp
 Homerus m

Quarit P
 lū decorare
 arbore, cum
 magnum.
 bus conspic
 ner, & frag
 iucundissim
 40 pedocles
 casu epithet

nunt mala; quæ cum in sole siccata sunt, in tabulato reponunt. Cumq; postu-
labitus, fracto luti tegmine, coronea qualia fuerant indita inuenientur. Alij
hordeo obruunt, alij dolis musti mergunt: atq; ita claudunt. Plinius. Coroneis in-
terclusis spiramentum omne adimendum, aut incoqui melle ea, immergite oport-
tere. Sunt qui coronea cerapōtica illita melle demergant. Dicuntur mala cydo-
nia melle condita etiā melimela, quasi melle parata. Vnde Martialis in Xenii:

Si tibi Cecropio saturata cydonia melle

Ponentur, dicas hæc melimela licet.

De Malo. CAP. XII.

N V N C de malo dicemus, à quo fructus omnes mollis cutis nomē capiunt.
M. Varro ex malo apibus præberi cibum, ex quo conficiant ceram, &
mel dixit. Malum amorem significat & Veneri dicatum est, fortasse quod in
iudicio, quando cæteris deabus pulchritudine prælata fuit à Paride, malo do-
nata fuerit. Philostratus in imaginibus, quatuor esse amores ait, duo qui se in-
uicem malis petant: duo sagittis: quam rem ita interpretatur, quod principium
amoris poma mittat: sagittæ verò amorem perficiant. Id indicat elegans Pla-
tonis epigramma, quod sic vertit Bentinus.

Malo ego te ferio, tu si me diligis, illud

Suscipe, me imperti & virginitate tua.

Hoc fieri si posse negas, hoc suscipe malum, &

Quam pereat paruo tempore forma vide.

Ad id etiam Theocriti versus spectant in Bucolicis.

Appetitur malis caprarius à Clearistide

Propellens capras, & suauē quid occinit illa.

Ad quos versus Virgilius in suis Bucolicis allusit.

Malo me Galatea petit lasciuia puella,

Et fugit ad salices, & se cupit ante videri.

Exiis veri amoris, & prolificæ fecunditatis natū est hieroglyphicū argumen-
tum: vnde in veteri numismate Iulie præ Augustæ & Agrippinæ Augustæ
Claudij Imperatoris vxoris, Neronisq; matris Venus ipsa cum malo cernitur.
Homerus malum appellat aglaocarpum, in Odyssæa libro.

Egregio mali fructu, ficusq; suavis.

Quærit Plutarchus in Sympoticis, cur Poeta dignatus est hoc epitheto ma-
lū decorare. Ex Tryphonis opinione dicit id esse facta cōparatione fructus cū
arbore, cum arbor parua admodum, & aspectu vili, fructum ferat pulchrum, &
magnum. Aliorum verò auctoritate in solo hoc fructu pulchritudinē omni-
bus conspici formis compositam. Nam contactu est instar violæ, vt nō inqui-
net, & fragrantia oppleat tangentem. Saporem habet suauē, & olfactu, & visu
iucundissimum, vt merito lauderetur, quod vnā omnes sensus alliciat. Sed Em-
pedocles ἡσπρωια μήλα cur dixerit, ambigit Plutarchus: cum Philosophus non
casu epitheta apponat. Grammatici dicunt ob vigorem, & esse quosdam de

Græcis, qui Phloos Baccho sacrificent. quoniam de omnibus fructibus in malo maximè vigor, & viror permanet. Vel cū alij fructus foris cortice ambiuntur (is enim phloos est) id est tegmen in superficie habeant: solus mali cortex intus est glutinosa, & pinguis tunica, qua semen continetur, id verò quod esui foris est circa eam circumpositum, hyperphloos, id est extra corticem sitū appellatur. Non omitam notatu dignum illud de malis, quæ iumentis portatu graua sunt, vel si pauca sint, si quidem vires (vt Lucianus in suo asino aureo ait, eorū odoribus offensa fatiscunt, vt ponderi minus pares sint. Remedium esse si prius edenda apponantur, aut vtique, si ostendantur: quod etiā in symplosiacis Plutarchus sensit, bulimo corripit equos, & asinos, qui aut mala, aut ficos dorsuarij cōportarint, sed maiori dignū miraculo remedium, quo ipsis, & hominibus quoque succurratur. Exanimata ferè iumenta, extinctosque penè deliquio viriū homines obiectus panis reuocat. namque si pusillū huius vorarint animantes, ex eo protinus cibo sese recolligentes roborantur, firmatque pristinū iter prosequuntur. Macrobius ex Veranij verbis malū inter felices arbores cōmemorat.

Nomen.

Græcis arbor *μηλέα*, fructus *μήλον* dicitur, Latinis arbor hæc malus, fructus malum. Italis *Melo*.

Forma.

Mali descriptionē, vt pote vulgarem, hīc omitteremus, ni Theophrasti verba hinc inde dispersa de ea omisisse videremur. Inquit Philosophus. Assurgit itaque malus vnico caudice, ni exilitatis causa, multiplices caudice illā diffundimus. Confestim se in ramos spargit. Corticis lauore nitet. Peculiares nodos habet beluata facie sed pergradi vno, aliis circa eū pusillis minoribus. Folio carnofo, oblongo, mucronatoque. Flore foliato, albicanti, supra fructū insidente. Radicibus paucis, summa telluri inhaerentibus. Pomo corio tecto, figura oblongo, seminibus intus discretis, continente tunica vestitis. Succo aquoso. Serotino pullulatur: primis namque frigidibus dat fructum. Ex annotinis surculis frugifera. Breuissima eius vita: sed præcocius breuior, quam serotinis: dulcibus, quam acidis: sed vt cito occidit, ita celeriter crescit. Senescit citissimè, sed suo latere repullulat, & crescit. Sed Plinius discrepantem, vt accepit à Theophrasto, ita descripsit. Arbor statim se in ramos spargens, eorumque incōditus ordo. Cortice læui, in senecta rugoso, & cadenti. Foliis mucronatis, pluribus ex vno pediculo exeuntibus. Radice breui, & angusta per summa cespitū. Fructus partes, quæ à sole, rubent. Succo aquoso, spumeo mala callo placent, odore acuto, serotino germine. reddit semen, præter præcocia, autumnō, & quedā genera incipiente hyeme. Celerrime verò senescit, & in senecta deteriore fructū gignit. Namque & minora poma, pueniunt, & vermiculis obnoxia: quin & in ipsa arbore nascuntur. Vita eius breuis, ex his præcocius breuior, quam serotinis, dulcibus quam acutis, senescitque velociter, sed è radicibus repullulat. Materie fragili.

Genera.

Multa sunt, quæ à scriptoribus malorū genera describuntur, quæ nos nō pigebit recensere; adiiciemus alia etiā nostri aui, ne huic arbori & nos ingrati videamur, quā maiores nostri tantorū generum fœtibus fœcundarunt. Antiqua illa ge-

illa genera non
opus difficile a
vt ad cognoscen
tatore opus sit.
adhuc restitua
fiant. Genera
cundum diuer
ad rem accing
tium & sylue
10 co obsecratis
sunt, quæ præ
nos apponem
distinctione
medio temp
Neapolitan
quia pondere
nil boni habet
ge spadonia v
pione dictum:
20 imitari videtur
flauescere, sa
dia, longo ser
roticum malu
lata dicuntur,
liquas addit no
dulcedinem, i
rotunditatem
Græci, qui epy
Columella, &
ad nos Pureo
30 sapore dulci,
sta: videntur
gine ex mor
intus sangu
ba de Appia
relligatur. I
lio, item Cl
sunt cognos
lorubens. S
40 dūs & Appi
Claudianis tr

illa genera nostris accommodabimus, quoad eius fieri poterit, neq; ignoro me opus difficile aggredi, cum illi tam succinctè aliquorum historiam tetigerint, vt ad cognoscendū quibus nominibus his temporibus appellentur, Delio natatore opus sit. Scimus tamen non defuturos, qui aliqua ex his emendent, alia adhuc restituant vt agriculturalionis studiosi, curiosiq; voti compotes tandem fiant. Genera periisse nō est philosophi existimare sed in alia loca translata secundum diuersas regiones diuersa nomina sortita, nemo est, qui dubitet. Sed ad rem accingamur. Vniuersum igitur malorum genus duplex statuimus, satium & syluestre. Syluestre genus in aliud caput differemus, vt minus hoc loco obscuritatis pariat. Satium verò triplex facimus à tempore: nam inter ea sunt, quæ præcocia, tempestiua, & serotina sint atque vt nobis annus affert ita nos apponemus. Præcocia proximo sequenti capite attingemus, vt clariora distinctioraq; sint, quæ scribimus. Sed nunc tempestiua dicemus, scilicet quæ medio tempore maturescunt. Est nobis mali genus vnum, quod etiamnum Neapolitano vocabulo carere semine ostenditur, à Vesuuianis *Melo di paglia*, quia pondere leuissimum est, forma turbinata, carne alba, gustu insipido, vt nil boni habeat, nisi quod primum apparet. Id puto à Plinio spadoniū dici. Belgæ spadonia vocant à conditione castrati seminis. Malum apud nos vulgo *Appione* dictum: quia quodammodo odorem nostri, quod vulgus appium dicit, imitari videtur, ac magnitudine superat, est rotunditate insigni, colore albo flauescente, sapore dulci cum quadam aciditate, magnitudine plusquam media, longo seruat tempore, quod pretiosum habetur: existimarem esse epyroticum malum. De eo Dioscorides hæc habet: Epyrotica, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho vtilia, aluum sistere & vrinam euocare. Athenæus aliquas addit notas. Quæ orbiculata dicuntur, cum suauiter stringant, habent dulcedinem, ita vt stomacho sint vtilia. Plinius. Orbiculata à figura orbis in rotunditatem circumacti, hæc in Epyrum primum prouenisse argumēto sunt Græci, qui epyrotica vocant. Palladius toto anno seruari posse ait, à Varrone, Columella, & Macrobio orbiculata dicta. Maturescunt Augusto mala, quæ ad nos Puteolis asportantur, cortice toto rubro, vt cruore perfusa videantur, sapore dulci, in extrema maturitate, vt mora nigrescunt, vulgò *Mela orcole* dicta: videntur mihi à Plinio descripta mala. Sunt quibus sanguineus color origine ex mori insitu tracta. Nisi fuerit aliud apud nos genus, cuius caro etiam intus sanguine vel mororum succo tincta videtur: vt pastinaca. Sed Plinii verba de Appiano malo tam perplexa obscuraq; sunt, vt quid sibi velit non sat intelligatur. Eius verba sunt. Ergo habent originem à Matio, Gestioq; & Manlio, item Claudio. Quibus cotoneo insito ab Appio è Claudia gente Appiana sunt cognominata. Odor est his cotoneorum, magnitudo quæ Claudianis, color rubens. Sunt inter doctos, qui de solo Appio loqui intelligant, cum Claudius & Appius vnus itemq; fuerit, nec duo mala repererit: sed magnitudo, quæ

dicant, ac Claudianum malum magnum, ac colore rubrum fuisse à Claudio inuentum qui familiar cognomen dederit, idemq; malum Appium inuisse cotoneo, ex quo cotoneorum odorem acquisierit, non mutata magnitudine, nec colore. Si ita est: duo sunt apud nos mala, magnitudine, & colore paria, & preciosa, quorum vnum odorem seruat cotoneorum, alterum minimè. Quod odore caret, vulgò dictum *Melo rosa*. Id roseo colore perfusum est, mira teneritudine, & sapore, minimè fugax, pomum magnitudine media, vt facile cū ceteris de principatu certet, nec indignū Claudii nomine: hoc Claudianum dicerem. Videretur idem malum Athenæi platanium esse. Inquit ipse. Platanium bonum habet succum, & facile excernitur, at stomacho minus confert. quæ notæ huic malo conueniunt, nam bonum succum habet, & facile digeritur, & sua nimia dulcedine stomacho minus confert. Nam Dioscorides dulcia mala stomacho negotiū facessere scribit. Sed illud quod me magis mouet, platanium nomen est, quasi rubrum dixerit: nam malum, quod ex platanifusione nascitur, rubrum prouenit, vt ex Diophane videbimus inferius. Sed putari nolim, dum vulgare *Melo rosa* pronuntio, id genus mali intelligi quod etiam vulgò apud nos *Melo rosa* dicitur, non admodum huic dissimile forma, sed odore tam præstanti, vt dum manditur, fauces & palatum tam iucundissimo rosarum odore repleat, vt nil suauius desiderari possit: nam hæc mala rosea ab earum odore dicuntur, seruanturq; vsq; ad aliorum prouentum. Aliud verò mali genus, quod odore cotoneorum seruat, Augusto maturescit, colore rubro, tenero, rotundo, magnitudine pari Claudiano iam dicto, apud nos vulgò *Melo appio rosso* dicitur, nam odorem vulgaris nostri appii retinet. Sed nostrum vulgare malum appium, quia videretur cognatione quandam cum antedicto habere, assererem turo esse melapit Plinii: Is namq; paulò inferius subiungit, Cognatione melapia. Videlicet sunt etiā melapia cognatione sic dicta, quod similitudinem odoris cum appiano dicto retinent. Id apud nos principatum obtinet, odore cotoneorū tam grato, vt eius cortices igni proiectæ domicilia maximo odore repleant, sapore tā grato vt nil gratius exoptetur. Callo corporis duro, vt possit in annum seruari, & etiam in duos, vectū perdurat, vt trans maria veneat, colore cum maturuerit luteo, agris innocuū præbetur, vt proverbio dicatur, omne malum, malum, præter appium malum. Tertium est apud nos genus appii, colore nigro, forma vulgaris nostri melopyri, etiam cognatione melapia, odore cotoneorum. Mala, quæ Iunio supremo circa festum Diui Petri maturescunt, & ob id vulgò dicta *Melo di San Pietro*, superant cætera magnitudine, loco, quo flos exierat, tuberculum eminet, quo verò inherat ramo, crassiori orbe refidet, oblongo ductu, vt mammatum modo tument, & cum eis similitudinem maximam habeant, existimarem esse Plinii orthomastica. Cuius verba sunt, A mammatum effigie orthomastica. Callo fragili, & tenero, ventorum flatu deturbata, nō tam cito terram tangunt, quā in partes plures dissiliant, colore rubro, mira suauitate cum aciditate quadam,

V
dātū, & gustus
seruari non pot
ad hyemem vsq
nūm, Caro scar
in dolis, & alia
Ex iis Plinius. E
mala vulgò dict
ra corporis car
sine negotio v
xime omnium
carne intus fri
quod nobis M
diculo dena p
sis traxere no
færu. Quæ H
pristinum no
carne fungos
vel pulmonis
nil nisi id boni
tius syrica leg
te facile in eius
colorem ex Sa
lini. Qui color
rō velut ex Syn
compacto, vt
comprimant,
tur. Si qui ver
ca mala dixerit
lum id nigro e
pradito, ob id
iectura mem
sunt nigra for
ab inuentore
diana, quæ e
tur, orbicu
Catalogna d
maturitate
reponuntur
dolo vocant
phoromela
co, dū afferua

dam, & gustus teneritate, ita ut in ore frusta liquecant: sed ut fugientia, diu seruari non possunt, neque ad aetatis exitum prorogantur. Serotina mala, quæ ad hyemem usque suam differunt maturitatem, asseruanturque per totum annum, Cato scantiana vocat, & inter conditiua ponit, & alibi, Mala scantiana in doliis, & alia, quæ condi soleant. Columella, & Macrobius scandiana vocat. Ex his Plinius. Et quæ tradit Cato in doliis condi scantiana. Mihi videntur esse mala vulgò dicta *Oltromontane*, vel *de Cerrito*. Magna sunt, compressa, dura corporis cartilagine, pendent in arbore ad hyemem usque, asseruanturque sine negotio usque ad aliorum prouentum, idque insigne habent, quod maxime omnium condantur. Malum illud insignis candoris, ac rosei coloris, carne intus friabili, & si dura cartilagine cooperiatur, sapore non ingrato, quod nobis *Melo dicee* dicitur, quia sola, vel pauca sunt, quæ ex eodem pediculo dena pendeant, dixerim esse Plinii mala gemella. Cætera (ait) e causis traxere nomen germanitaris, coherentia gemella, nunquam singula in fœtu. Quæ Plinius pulmonea vocat, quod stolidè tumeant, retinent adhuc pristinum nomen, nam vulgò *Mela pulmonare*, aut *Mela di stoppa* vocant, carne fungosa, pulmonis instar, sapore insipido, sanguineo foris colore, vel pulmonis magnitudine media, usque ad noua absque cura seruantur, ut nil nisi id boni habeant. Plinius etiam mala serica à colore vocari ait. Ego potius syrica legerim, cum Columella prius syrica dixerit, & ex vocum affinitate facile in eius verbis mendum prorepisse iudicari, cum ipsemet syricum colorem ex Sandyce, & Synopide mixtis fieri dixerit, & ex eo minium sublini. Qui color visitur in nostris malis vulgò *Cannamele* dictis: videntur verò velut ex Synopide, & Sandyce coloribus rota perfusa, duro carnis callo, & compacto, ut si mordicus prehenderis, auellere nequeas carnem, & gingiuas comprimant, sapore tam dulci, ut à palato morosiore laborantibus fastidian-
 10
 20
 30
 40
 tur. Si qui verò fuerint nasutuli, qui nostratia *Cannamela* vocata non esse syrica mala dixerint, recipiant fortasse nostrum vulgò dictum melopyrum. Malum id nigro est foris colore, vel magis fuliginoso ac longiori pediculo cæteris prædito, ob id melopyrum dictum, composito nomine ex malo, & pyro. Coniectura memouet, quod syrica pyra etiam à Plinio descripta (ut videbimus) sunt nigra foris colore, atque huic malo simillima. Quæ Plinius Sceptiana vocat ab inuentore Libertino, rotunditate insignia, ea ipsa vocat Athenæus mordiana, quæ optima in Apolliniæ agro nascuntur, qui Mordicus cognominatur, orbiculatis similitudine respondent. Apud nos ea puto esse mala quæ dicitur *Catalogna* dicimus. Nam magnitudine insignia sunt, & rotunda valde, dulcia, maturitate friantur, colliguntur ex arbore cum iam dictis vltromontanis, & reponuntur sed non diu seruantur. Malum quod vulgò Neapolitani *Melo cedrolo* vocant, quia cucumeris instar in longum protenditur, posuerim inter
 40
 phrotomela, cum sua austeritate mandi non possit, nisi domito maturitate succo, dum asseruatur domiciliai, cundo odore replet, colore est citrino, maturitate

friatur. Reliqua ab antiquis memorata, cum notas aliquas illis non addiderint, difficile immo impossibile videtur coniectari, quæ fuerint, nisi propriè diuinare velimus. Athenæus vocat setania, refertq; Africani Pamphilum meminisse. Cato quiriniana vocat, Columella Mariana, Sextiana, Pelusiana, Amerina. Plinius dicta à Matio, Gestio, & Manlio. Nunc autem nuperrime adoptata sunt parua, gratissimi saporis, quæ petisja nominantur, patrias nobilitare camerina, & græcula. Melofoliis folium vnum aliquando & geminum erumpit è latere medio. (& alibi, iam & in pomo ipso, mali quodam in genere, parua mediis emicant folia, interim & germina.) Celerrime in rugas marcescunt pannucea: daxis vilissimis nomen, quamquam primis aduentu, decerpiq; properantibus: amerina maxime durant. Macrobius ex Cloatio malorum genera numerat: matianum, ogranum, panunceum, quirianum, pro-
 10 10

Picenis cedunt pomis Tiburtia succo.

Nam facie præstant.

Celum.

Theophrastus frigidum locum malos concupiscere scripsit: quippe in Egypto locis feruidis paucè admodum, vitiatèq; sunt. Præterea in Ponto mali permulta habentur, sed vernæ, & syluestres maiorem in modum: præterquam si quæ ferotinae. Ex quo Plinius scribit. Circa Bosphorum Cimmerium in Panticapeo vrbe, omni modo laborauit Mithridates Rex & ceteri incolæ sacro-
 20 30

Solum.

Palladii de solo sententia hæc est. Amant pingue, & latum solum, & cui humorem non tam rigatio, quam natura suppeditet, & si in arena, vel argilla sit, rigationibus adiuuetur. motanis locis debent ad meridiem versè constitui. Macrum, & aridum solum poma vermiculosa efficit, & caduca. Anatolius nigra gaudere terra scripsit. Apuleius solas malos etiam in aridioribus locis vehementer vberes provenire experimentum docuit.

Satio.

Suo fructusata omnino poma degenerare, Theophrastus est author. Cato ut cupressos, ita & mala ferere in seminariis docuit. ut iam vidimus in Sylua. Plinius ait. Ex semine autem quanquam dissimili, ea quoque, quæ & aliis modis feruntur ut mala, nanque eis pro semine nucleus, sed tarda prouentu, ac degenerantia, & infuso restituenda, & ut cupressi sic malorum semina nutiri. Palladius, mense Febuario & Martio mala seremus, (ait) si calida, & sicca regio est, Octobri, & Nouembri. Anatolius autem scribit. Mali duobus anni
 40 40

tura

rura non suppeditat, quando satæ post imbres, melius conualescunt. Plinius intervalla describit in pedibus nouenis, vel paulò amplius. Ramis etiam nasci posse, sed raro Theophrastus prodidit. Idem confirmat Columella dicens, Vltimis ordinibus vineti poterit (si quem tangit cura pomorum) in ea vineti fine, quæ subiacet septentrionalibus, ne cum increuerint obumbrent, cacumina malorum depangere, quæ vel inferas interposito biennii spatio, vel si generosa sunt, adultæ transferas. Plinius. Stolones auelluntur arboribus, & cum perna sua, partemq; aliquam è matris quoque corpore auferunt secum, simbrato corpore, & hoc modo plantantur mali.

10 Theophrastus de eius putatione hæc habet. Malus minus recidi desiderat, *Cultus* & quicquid siccum, & cortice tenui vestitum; hæc enim resecta, vehementer laborant: quæ de causa manu his auferri præcipiunt, aut ferro perquam leuissime: periculum namq; interitus propter vlcera imminet, quemadmodum radicibus vulneratis, cum fodiuntur arbores deteriorescunt, & sæpe agrescunt, ac exarescunt: sic etiam vulnere partis superioris noxam eandem his posse inferri credendum est, quam nequeant tolerare. Plinius. Est & quædam contusio falcis hebetioris, quibus omnibus causis difficilius tolerant frigora, aut æstus, quoniam in vlcus penetrat omnis à foris iniuria. Palladius autem, Nec exarari, nec effodi desiderant. Iccirco eis magis prata conueniunt. Stercus ouillum tantum non exiguum quidem sed libenter assumunt, vel si cineris pulueres misceantur. Amant modestas rigationes. Putatio illis apta est, sed maximè, vt arida, & male nata tollantur. Citius senescit hæc arbor, & in senectute degenerat.

Air Cato. Mala inferi oportet Luna silenti, post meridiem, sine vento austro, inter lignum & corticē. Sed insitio per ver, per solstitium dies quinquaginta, & per vindemiā. Plinius ex Catone dixit. Inferi autem Cato præcipit per ver, & post solstitium diebus quinquaginta, post vindemiam, Luna sitiente, hoc est sicca, præterea post meridiem, ac sine vento austro. Palladius autem, Malus omni generi inferi potest, quo pyrus. Mense Februario, Martio, & aliis, 30 quibus pyrus inseritur in malo, in pyro, in spino, pruno, sorbo, persico, platano, populo, salice. Dixerat autem in pyro etiam cydonio, & vt aliqui in punico sed fisso ligno; & omni generi inferi potest, vt etiā videbimus. In Iulio mense autem emplastratione malus inferi locis humidis me explorante processit. Inferitur etiam in prunum. Sed prunus eā degenerem reddit, & parua. In se verò recipit tuberes, & mespilum, vt suis idem ad Palsiphilum testatur versibus,

Insita proceris pergit concreveram amīs,

Et sociam mutat malus amica pyrum.

Seq. feros syluis hortatur linquere mores,

Et paringaudet nobiliore frui.

Spiniferas prunos, armataq; robora sentes

Lenigat, & pulchris vestit adulta comis.

*Exiguam sorbum dulci distendere succo
 Nonit, & ad cupidas flectere poma manus.
 Stipitibus gaudet nomen mutare salignis,
 Et gratum nymphis spargere flore nemus.
 Robora thyrsigero platani concordia Baccho
 Fœtibus instituit plenarubore nouis.
 Illius insolitas miratur persicus umbras,
 Populeaq; ferunt candida dona coma.
 Mespilus huic paret, lapidosaq; viscera mutans
 Tenditur, & nuneo plena liquore rubet.
 Pro sudibus fœtis, & pro pragnantibus armis
 Castanea fuluum dant nona mala decus.*

Virgilius in Bucolicis in platanum malum inferi posse cecinit.

Et steriles platani malos gessere valentes.

Plinius malum posse prunum recipere dixit, indeq; nata pruna malina dicta. Traditque antiquam in malis inoculationem, qua futoria simili fistula aperiebatur in arbore oculus cortice exciso, semenq; includebatur eadem fistula sublatum ex alia. Viditq; iuxta Tiburtes tiliam omni genere pomorum onustam, malorumque generibus. Diophanes scribit inferi in omnem pyrum syluestrem, & in cotoneorum malum fructumq; ex his cotonea mala pulcherrima vocata apud Athenienses melimela. Inferuntur etiam in platanum; à qua rubicunda fiunt mala: recipit quoque pyrum, morum, laurum, & damascenum. Didymus in commentariis suis, quæ de re rustica reliquit, iubet & malum pruno damascenæ inferendam, quæ si citrio insita comprehendet, toto anno pomiferam reddi pollicetur.

Docet apparatus Theophrastus, quo maiora euadant mala. Scilicet ut fructus ramis suis annexi, ollis inclusi, sequaci flexu in terram deducto obruantur. Cuius rationem dicemus in punicis. Palladius idem alio modo operatur. Si spissa poma ramos onerabunt, interlegenda sunt quæq; vitiosa, ut alimentum ceteris succus equiparet, & generosis abundantiam ministraret, quam numerosa utilitate perdebant. Quo rubra poma nascentur, rationem docet Berytus. Arbor vrina rigatu satietur. Sunt qui in alium modum malis rubrum colorem moliantur. Palo in terram fixo, fructiferos ramos citra vulnus incuruantes illigant, & iuxta vel scrobiculos, vel vasa complent aqua, obseruantes, ut meridie incidens in aquam solis radius calidum euocet vaporem, qui reflexu quodam in pomum resiliens, rubrum colorem conciliet. Non desunt, qui sub arboribus rosas ferant, sic rubra dari poma promittunt. Scribit Anaxolius. Ut dulciorem creent fructum, sunt qui caprinum finum vrinae adiciant, & veteris vini faciem radicibus iniiciant.

*Merbi &
 reu. edit.*

Ex Theophrasto videre est communem arborum morbum esse vermiculationem; omnes enim ferme arbores vermes gignunt, sed quædam pauciores,

V
 res, quædã plur
 interit: plures
 vastatur, sed qu
 videantur debil
 transmittat, nec
 vniuersum con
 re licet. Porro
 est, aut non ad
 cillionem caud
 10 net. Fructus eti
 culantur magis
 rum hoc sentiu
 Vermiculatio
 non interit. C
 tarum morbi
 Si verò in ipsa
 radicibus afful
 due est irrigan
 cem radicibus
 20 nino stercore a
 abundantiam
 plumbei tubi p
 ra strictum ob
 to id quoranni
 non putrescant
 ringet: vel rad
 lerrime à verm
 fodicandus, at
 vlcera loca
 30 arbor, & in se
 poma retineb
 Vermes eius
 tur, qui si plu
 tur, si ea loc
 trefcant, la
 Colum
 dulcissimi
 arundine ve
 si est multa
 40 vindicant:
 malorum, C

res, quædā plures, vt malus. Et cum pluribus infestetur vermibus, iccirco citius interit: plures enim habet interitus auctores. Eius fructus etiam vermiculis vastatur, sed quoties hoc vitium acciderit, perit. Mali non patiuntur à gelu, cum videantur debiliores, vt in Thessalia exitit: facit enim arboris raritas, vt frigus transmittat, nec aliqua parte retineatur. Quod autem diu non immoratur, nec vniuersum contendit, efficax id esse non potest: vt etiam de fulmine intelligere licet. Porro vt effugiant interitū, alterutro munimento se tueantur necesse est, aut non admittere intra se, aut amittere extra se, nec vsquam retinere. Difficillimam caudicis tolerat, non solum eam, sed etiam caudicis fissionem sustinet. Fructus etiam antequam coquat amittere potest. Ex quo Plinius. Vermiculantur magis, minusve quædam, omnes tamen ferè, maximè autem arborum hoc sentiunt mali. Infirmissima verò malus, maximeque quæ dulcis est. Vermiculationem, & poma ipsa per se quibusdam annis sentiunt. Fissa stirpe non interit. Quæ verò ex Anatoliipenu deprompsimus super huiusmodi plantarum morbis hæc sunt, Non et odentur à vermibus si circumfusa fuerit scylla. Si verò in ipsa arbore nascuntur, à suillo stercore, humanæq; misto vrina, & radicibus affuso, extinguuntur. Valde enim gaudet malus vrina, & hac assidue est irriganda. Sunt qui caprinum fimum vrinae adiiciant, & veteris vini fecem radicibus iniiciant: vt dulciorem creent fructum. Morbos abiges, si asinino stercore aqua macerato sex dies occiduo sole rigaueris. Si vis pomorum abundantiam subministret arbor, nec numerosam prolem perdat, dissectum plumbei tubi patulum os, sic vt circulum ducat, caudici altitudine pedis à terra strictum obducito, & cum mala cœperint adolescere, torquem hūc eximito, id quotannis est faciendum, vt vbertatem fecundam concipiat. Vt poma non putrescant, lacerti viridis felle perungatur caudex, nec ipsum eruca constringet: vel radices taurino felle oblinendæ ante plantationem. Hæc planta celerissime à vermibus iniuria afficitur, quod si ei negotium exhibeāt, æreo clauo fodicandus, atque vellicandus cortex, donec mucrone tacti, radantur, sed ad vlcerata loca bubulum fimum obducatur. Palladius verò, Citius senescit hæc arbor, & in senectute degenerat. Si caduca sunt poma fissæ radici lapis iniectus poma retinebit. Lacerta viridis felle si tangerentur cacumina, non putrescit. Vermes eius suillo stercore misto humanæ vrine, aut felle bubulo extinguuntur, qui si plures circa arborem sunt, æreo scalp pro semel rasi, non ultra nascuntur, si ea loca, vnde rasi sunt, bubulum sterces obducatur. Plinius, Mala ne putrescant, lacerta viridis felle tangi cacumina iubet.

Columella. Hoc eodem tempore, vel etiam primo mense Augusto mala dulcissimi saporis mediocriter matura eliguntur, & in duas, vel tres partes arundine vel osseo cultello diuisa in sole ponuntur, donec arecant. Eorum si est multitudo, non minimam partem cibariorum per hyemem rustici vindicant: nam pro pulmentario cedit. Possunt & in melle alia genera malorum, sicuti Orbiculata, Sestiana, Melimela, Matiana custodiri, sed

quā videntur in melle dulciora fieri sic condita, nec proprium saporem conseruare: arcule sagineæ, vel etiam tiliaceæ, quales sunt, in quibus vestimenta forensia conduntur, huic rei paulo ampliores preparari debent, ea quæ in tabulato frigidissimo, & siccissimo loco, quod neque fumus, neque teter perueniat odor, collocantur, deinde subtracta prædicta poma sic componi, vt flosculi sursum, pediculi deorsum spectent, quemadmodum etiam in arbore nata sunt, & ne inter se alterum ab altero contingatur. Ita obseruandum est, vt vnūquodq; genus separatim propriis arculis reponatur: nam cum vnà clausa sunt diuersa genera, inter se discordant, & celerius vitiantur. Propter quod etiam consensualium vinearū, non tam est firmum vinum, quā si per se syncerum amineum, vel apianū, aut etiam fecinum condideris. Verum sic, vt prædixi, cum diligenter mala fuerint composita, operculis arcularum cōtegantur, & luto paleato linantur opercula, ne introire spiritus possit, atq; ea ipsa nonnulli, sicut in aliis generibus, vt supra iam diximus, populnea, quidam etiam abiegna scobe interposita, mala custodiunt. Hæc tamen poma non matura, sed acerbissima legi debent. Palladius, Diligēter legenda sunt mala, quæ volumus custodire. Ea in locis obscuris, vbi ventus non sit, stramentis prius in crate subiectis, in cumulos secreta disponimus, qui cumuli frequentī diuisione separentur. Aliqui diuersa dixerunt, vel singula in vasculis fictilibus picatis, atq; oblitis, claudi, vel argilla inuolui, vel solos pediculos crate adlini, vel in tabulis substrata palea disponi, & stramentis de superiorū parte cooperiri. Mala rotunda, quæ orbiculata dicuntur, sine cura toto anno seruare se possunt. Aliqui in puteo vel cisterna mergūt vasa fictilia, quibus diligenter picatis & clausis mala committuntur. Alii ex arbore mala illa sumpserunt, & pediculis eorum pice feruenti meris supratabulatum per ordinem disponunt, nucum foliis subter expositis. Pleriq; scobem populi, vel abietis inter mala diffundunt. Constat mala sic ponenda vt pediculorum partes deorsum facias, neque ante, quā vñ necessaria videantur esse, contingas. Præcipit verò Plinius, colligi mala post æquinoctium autumnale, neq; ante x v Lunā, neq; ante primam horam. Cadiua separari, stramentis, storeis, paleis ve substerni. Rara componi, vt limites peruii spiritum æqualem accipiant. Amerina maxime durare, melimela minime. Aliqui mala in patinis fictilibus fluitantia, quo genere & vino odorem acquiri putant. Aliqui omnia hæc in milio seruare malunt. Plerique vero in scrobe duū pedum altitudinis harena substrato, & fictili operculo, deinde terra operto. Mala verò generosissima crustant gypso, vel cera, quæ nisi maturuerint incremento calicem rumpunt. Semper autem in pediculos collocat ea. Alii decerpunt cum surculis, eosq; in medullam sambuci abditos obruunt, vt supra scriptum est. Alii singulis malis, pirisq; singula vasa fictilia assignant, & opercula eorum picata, dolio iterum includunt. Nec non aliqui in floccis caplisq; quas luto paleato illinunt. Alii hoc idem in patinis fictilibus, aliqui in scrobe subiecta harena, ita sicca operiunt mox terra. Poma longo tempore dura-

starabunt, si, vt
vant, vt manu
uantur, sicut vi
te contingant:
quo neq; sumu
singula arcula
discordant, & c
postquam occa
quo substratu
frondibus nuc
tilli ceram inter
ruta. Seruantur
spiritu. Sed a
rem, deligant
quoniam alio sp
rentis surculo
condita. Hæc
tur quoque sin
gilla candida li
10 10 manent, qualia
perdunt, & a
in ollam nouam
lium oblinatur
ma canistris, ve
tur. Hyberna p
quorum cacum

NOMINA
viros per
30 erant peculiar
nostra hæc q
lectorum an
genus existit
horis septim
multo sua ar
ras antecellit
allisque sepa
Theophras
turefat, & 40
40 venit, quā h

starebunt, si, vt Apuleius suadet, vegeta legantur. Sed obseruationem desiderant, vt manu decerpantur illa fœ, & fucō, id est musco marino singula conuoluantur, sic vt vndiq; cooperiantur, interiecto quoq; eodem, ne sese vlla ex parte contingant: Sic patinis indito operculo clausa, tabulato frigoribus obuerso, quo neq; fumus, neq; terribimus perueniat odor, collocentur. Si desit fucus, singula arcula singulis pomis sunt assignandæ: nam vnâ clausa diuersa genera discordant, & celerius vitiantur. Sunt qui creta figulina singula crustent, quæ postquam occalluerit incolumia seruantur, foliis nucum subter expositis, quo substratu, & odori, & colori perquam belle consulitur. Melius cedit, si frondibus nucum non caducis singula conuoluantur. Custodiuntur in olla fictili cera interius inducta. A putrilaginis labe vindicantur, hordei aceruis obruta. Seruantur quoq; fidelis fictilibus non picatis, effracto fundo, & excluso spiritu. Sed ad id muneri integra & lecta manu, quæ non senserint vetustatem, deligantur: iis fidelis ad fauces vsque compleantur, & pyxantha, aut quouis alio spiracula vasis diligenter obturentur: sed hyemem totam in parentis surculo pensilia cohæreant: taliaq; inuenientur poma, qualia fuerant condita. Hoc experientia quadam accepisse idem attestatur Apuleius. Seruantur quoque singula ficulneis frondibus siccis inuoluta, si deinde luto, vel argilla candida linantur, & soli quoad crustam duret, credantur, tunc talia permagent, qualia concluduntur. Poma doliis multi merguntur, atque ita clausa perdurant, & à face seruata vini suauitatem supramodum commendant. Sed in ollam nouam immittit, & olla in dolium vini immersa, ita vt innatent, & dolium oblinatur, recentia erunt mala, & vinum odoratum. Porro seruanda poma canistris, vel vimineis cistis componuntur, & mundo tomento obruuntur. Hyberna poma seminibus, vt vuar, demerguntur. Non putrescent poma, quorum cacumina virentis satyrij herba fuerint illita. Hæc Apuleius.

De malo verna. CAP. XIII.

NOMINA vernæ malo attributa, tum quia multam apud etiam doctos viros pepererant difficultatē, tum etiam quia huic ab antiquis nonnulla erant peculiaria attributa, operæ pretium duximus in hoc caput dirimere, vt nostra hæc quantula cunq; commentaria dilucidiora sint, minusq; fuscadinis lectorum animis ingerant. Præterea inter cætera malorum genera nobilius genus existit, tantaq; eius nobilitas, vt in fenestris fictilibus vasculis, & ædium hortis sapius plantetur, asserueturque: cum ab infantia fructificet, pomaque multo sua arbore, quod vix credi possit, maiora producat, præcoci partu cæteras antecellit, duplicique partu fecundatur. Tantis dotibus iure existimandæ, aliisque separanda venit nostro Pomario.

Theophrasto *μυρταία* dicitur, id est malus verna, quod adulto vere maturescat, & *διπογερία*, id est bifera, nec vlli malo decentius id nomen conuenit, quàm huic: nam suum fructum tam cito perficit, & maturat, vt iterum

Nomen.

Te flore induat, ac fœtificet, ni hyemis rigiditate prohibeatur, & præsertim autumnante temperie, vt Neapoli quotannis ferè videtur. Varro in agro Cosenrino biferam esse malum tradidit. Plinius in malis biferas esse etiam scripsit, & in pyris, quod ex Theophrasto desumpsit. Dioscorides *μηλίμλα* vocat, id est melimela, nomine composito ex *μέλι*, id est mel, & *μῆλον* id est malum; quasi mellitum malū dicat, quod mellea dulcedine scateat: & *γλυκύμλα*, id est dulcia mala. Cato hæc mala mustea vocauit. Plinius mustea dicta refert à celeritate mirescēdi, quæ nunc melimela dicuntur sapore melleo. Varro ait. Ea, quæ mustea dicebatur, nunc melimela. Vnde genus illud cotonei præcox, musteū nominari diximus. Macrobius etiā mustea dixit. Columella melimela. Martialis:

Infanti melimela dato, fatuasq; mariscas.

Sunt etiam, qui hæc pomi genera à Virgil. mitia dici dixerint,

Sunt nobis mitia poma.

Sed ne putes obsecro mala, quæ nunc melimela diximus, eadem esse cum melimelis Atheniensium, nam (Anatolio auctore) ea mala erant, quæ malo cotoneo insito proueniebant. Inquit enim ipse. Malum inseritur in cotoneum, fiuntq; ex cotoneis mala pulcherrima, vocata ab Atheniēsis melimela, quod etiam superius admonuimus. Brasauola mala vulgò *Rosa* dicta melimela esse dixit Dioscoridis. Alij verò nostra vulgaria *Melapia*, quorū opinionibus, non solum quæ superius retulimus, sed etiam huiusmodi mali vires aduersantur. Dioscorides enim de huius facultate dicit, Ventrem emolliunt, ab eo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent, æstuationem faciunt. Præterea ex Auicennæ doctrina, & Serapionis libro de simplicibus, Mala dulcia odorata cordi conferunt, mala acida non cor, sed stomachum iuuant, sitim arcent, bilis vomitum reprimunt, ventrem constringunt. Videmus enim, quæ nunc dicimus melimela ventrem emollire, ac stomacho negotium exhibere, & æstuationem facere. Vulgaria nostra melapia cordi conferre, & vt vidimus, agris innoxie præberi. Sunt qui vulgò *Melanane*, ab arborum exiguitate, quibus producantur, dicant. Neapolitani *Mela acquatole*, ab aqueo humore, quo abundant, nominant.

Genera.

Theophrastus, verna mala imbecilla esse, & inter ea, quæ dulcia. Ex quibus verbis clarè perspicere potest, alia esse mala, quæ sint acida. Apud nos verna mala & acida, & dulcia sunt.

Descriptio.

Theophrastus ex annotinis, & nouellis surculis fructificare retulit, quod nulli, exceptis vite & ficu, nisi biferis malis concessit. Breuis est vitæ, facile interit. Cuius ratio est; Quod enim debile est, ex multis commoueri facile potest, & si super debilitatem fertilissima quoque natura sit arbor, vt malus verna, magis quoque ita fiat necesse est, quippe cum vtraque ratione noxa oriatur principis. Videtur enim rationi consonum, vt quod imbecille, absq; robore sit: vnde quæ vix sibi, multo minus fœtui sufficit: euenit enim ob sui imbecillitatem & pauperiem diuturni pensæ solutione, cum nō habeat, quod promatur è

tur è penu, vt ex
ximè quæ dulci
gnitudinem a
teo. Callo corp
tu derubentur
lea dulcedine, n
pomorum ferè
paru certarent.
lo dicimus, quo

10 pore grata, com
expetita. Sunt d
acidi saporis int
Ioannis matur
dum, sapore d
prægnantibus
Tepido cor
cilia.

Solo læto, cu
cultis. Vitibus i

10 Seritur semi
tempus Theop
gracilentia, lign
lufferre non va
curriculo radic
scitipit. Surren
huiusmodi mal

Theophrast
rum mouet, at

Theophrast
eorum mutati

30 ces, magis qua
tate, atque tot

Plinius m

N VNC
Napes m
Palladius ide
qua, vt quisq;
Macrobius a

40 Græci pyru

tur è penu, vt exhausta fatiscat. Ex quo Plinius. Infirmissima verò malus, maximè quæ dulcis est. Nos ita describimus. Arbor pumila est, nec cæterarum magnitudinem attingit. Mala magnitudine media. Colore cum maturerint luteo. Callo corporis tam fragili teneroque, vt quæ ex arbore ventorum impetu deturbentur, in partes dissiliant. Præpollenti odore. Sapore gratissimo, mellea dulcedine, mandendo ore in frusta liquefunt. Præcoci patu. Cæterorum pomorum ferè fugacissima, & ni tam fugacia essent, cum omnibus de principatu certarent. Acidorum plura sunt genera. Vnum nos vulgò *Melogaetanello* dicimus, quod Caieta nobis olim exportaretur. Hæc parua sunt, acidulo sapore grata, compressa, tenera, colore herbaceo, ac multum mulierum malacis expetita. Sunt & quæ vulgò *Mela grecole*, & *Mela grasse* dicuntur, cognatione acidi saporis inter se maxima. Est genus alterum, quod quia circa festum Diui Ioannis maturefcit, vulgus *Melo di San Giovanni* dicitur, tenerum, rubicundum, sapore dulcileniter acescente, ad iuuandum ægrotum appetentiam, & prægnantibus apponuntur.

Tepido cælo lætantur, vel calido, ideo permultæ arbores in Apulia, & Sicilia.

Solo læto, cultoque gaudent, nec vsquam agrestia reperiuntur, vel locis incultis. Vitibus innocens, ideo inter vineas feritur.

20 Seritur semine, eademque poma restituit. Seritur & plantis, plantandique tempus Theophrastus statuit, Vnum tempus malis vernis, quippe quæ cum gracilentæ, lignosæque sint, & sicca natura consistant, hyemem ob debilitatem sufferre non valent. Nascitur & propagine. Nam propagata, breui temporis curriculo radices proicit. Nascitur & surculo, vel cacumine, vt Theophrastus scripsit. Surrentino tractu in vineis, vbi vites propagantur, simul cum vitibus huiusmodi mali cacumina deponuntur, & citò, & optimè radicantur.

Theophrastus ait: si arbor feruenti aqua rigetur, meliorem fit: nam alimentum mouet, atque immutat, si diutius venit.

30 Theophrastus, quæ dulcia sunt, celerius putrescunt, dixit. Etenim succus eorum mutationem facilius recipit, quoniam imbecillior est. Hinc mali dulces, magis quam acidæ putrescunt, & omnium maximè vernæ, succi imbecillitate, atque totius naturæ.

Plinius melimela minime durare scripsit.

De pyro. CAP. XIII.

Nunc pyri historiam prosequi poscit ordo. Columella ex pyri floribus apes mel colligere scripsit, & si Varro ex syluestri pyro scripserit prius. Palladius idem ex pyro. Narrat Athenæus pyra in conuiuio solita deferri in aqua, vt quisque sumeret matura: scilicet quæ magis narent, ex Alexi in Breutia. Macrobius adducit Veranium dicentem pyrum inter arbores felices esse.

40 Græci pyrum pomum *ἄμυρον* vocat. Ister in rebus Argolicis narrat Polopon-

Nomen.

nesum Apiam vocatam fuisse (ex Athenæo) quod ibi planta huiusmodi plurima reperiretur: in qua sententia etiam Stephanus est. Theocriti tamen interpretes pyra à Poloponneſo nomen accepisse putat, quod in ea plurimum hic fructus apparuerit. Latinis arbor pyrus dicitur, pomum verò pyrum, dictumque volunt, quod ad pyramidis modum, ut plurimum elatum in aciem tendat, flamma similitudinem reddens. Italis *pero*.

Descriptio. Descriptionem toto volumine sparsam è Theophrasto adducere libuit. Arbor simplici confurgit caudice, & si ab imis plantigera sit, cæteris abscessis simplex redditur. Plurimis ramis brachiata. Cortex ex humore, carne, & nervo constituitur. Folio circinato. Flore foliato. Turbinata fructus figura. Aquoso succo præditus. Autumno reddens fructum, præter præcocia. Seminibus tunica contentis, principiumque annexus proprium habere videtur. Fructificat ex annorinis surculis. Latere, & cacumine germinat. Incremento velox. Prolixa radice, ut non solum è proximo, sed longinquo proliferet. Plinius hæc quæ ex Theophrasto accepit, refert: Folia pyro circinata, plura ex eodem pediculo exeuntia. E lateribus ramorum, & cacumine fert. Naturæ ordine urbanarum paulò post malum pyrus floret, ut simul videri possit. reddit semen, præterquam hyberna, aut præcocia, autumno. Turbinatior pyris figura, in iis serotina ad hyemem usque ad matrem pendent, gelu matureſcentia. Pyro proprietates vini, vinoſo enim succo præditum est. In hyberno pyro est pomum aspici in matre prius decidentibus foliis, velox est, & cito occidit.

Genera. Nunc ad genera tranſeamus, sunt etenim, ut malorum, æque multiplicia. Sed quæ fuerint antiquorum nomenclaciones pyrorum, quæque nostrorum temporum illis respondeant, ut pristinum nomen illis restitui possit, conabimur etiam, ut in malo aliqua coniectare. Nos primum, ut par est, pyra in sativa & sylvestria diuidemus, nunc de sativis, alibi de sylvestribus dicturi, sativa idem à temporibus diuidemus, verna scilicet, æstiva, & hyberna: & de vernis primum, nam Theophrastus pyra & præcocia, & serotina esse dixit: & quædam pyrorum genera bifera esse posse, sed locis hybernis, humidisque, ubi flatus commodi non desint, & cum tempus se longius protrahit, & priores fructus decerpantur. Vnde Plinius, In malis, & pyris quædam bifera sunt, & præcoces. Sed Neapoligenus est pyri, quod vulgus, *Pero due volte l'anno*, vocat, quod bis anno affert, immò semper fructu, & flore oneratum conspicitur. hæc genera ab antiquis mustea vocabantur. De præcocibus pyris hæc habet Plinius. Eadem causa taxatur in pyris superbiæ cognomine, parua hæc, sed ocyssima. Hæc Neapoli *Perabiancolelle* dicuntur, quia alba & parua sunt, & ocyssime cadunt, si diutius in arbore manserint, farina modo mandendo friantur, nil boni, nisi quod præcocia sint, habent, ut sola verè temporis prioritate superbiant. Cato, quia præcocia sunt, videtur mustea vocasse. Macrobius præcocia dixit. Manardus superba antiquorum pyra illa esse ait, quæ nostrates *Peramoscarelle* vocant, sed repugnat, quia ocyssima non sunt, nec tam insignem odoris

odoris notā
debimus. Succo
le. Hæc tam par
na, plurave vno
num afferunt
Plinio myrapia
tum est, & perla
marapia legitur
saporis, genera
10 & tardius matu
pyri, quod omni
illud, ob sui gra
Iunio maturat
cat. Hic pauca
nio, quæ purp
politano no
purpurea pyra
stra tempora
forma à suprad
20 nio etiam mat
eunt æstiva. A
stomina inter
Virgilius item

Seruij auth
mio Thufcia
pud nos sunt,
primus fuen
30 tia. Sunt alia
ta, ob id vulg
iam hordeat
reant. Fau
genuinum
iora sunt, &
colore est
& August
scriptum. I
tina, eadem
40 pñt, desum
iam memini

odoris notā maiores nostri præterissent, sed quæ ea fuerint, melius fortasse videbimus. Succedūt iis, quæ diximus, nostro tēpore vulgò dicta *Pera moscarelle*. Hæc tam parua sunt, vt baccas corporis tuberculo non excedant, quina, fenna, plurave vno pediculo exeuntia, saccharo condiuntur, vt in sequentem annum afferuentur, moschi dicti odoratissima iucunditate fragrant, dixerim à Plinio myrapia dici, quasi vnguentum redolentia: *μύρον* enim Græcis vnguentum est, & persæpe moschi odorem vnguentum dicunt. Sed apud Macrobiū marapia legitur, non myrapia. Cohærent his germanitate odoris quadam, & saporis, genera vulgò dicta *Pera moscarelloni*, sed magnitudine longe superant, & tardius maturantur. Plinius Dolobelliana vocat longissimi pediculi. Genus pyri, quod omnium pediculum longissimum habet, simul & subtilissimum est illud, ob sui præstantiam regale nomen adeptum, inter sui temporis pyra (nam Iunio maturatur) facile sceptrum gestat. Plinius item à colore purpurea vocat. Hic pauca adeo, multisq; aliis pyris communia dixit, vt solo eius testimonio, quæ purpurea fuerint coniectare nō possimus, verū si vnā vulgare Neapolitanum nomen cōsulamus, clarè quæ *Pera cremesine* dicimus, antiquorum purpurea pyra esse cognoscemus, nomenq; ab eis deductum, vsq; ad hæc nostra tempora seruatum censendum esse existimamus. teneritudine, sapore, & forma à supradictis parum recedunt, speciosissimaq; ob eorum colorem: luno etiam maturantur. Idemque putamus esse Macrobij rubile. Paulatim subeunt æstiuā. Ait Plinius, Cunctis autē crustumina gratissima. Columella crustumina inter generosissima pyra ponit. Meminit etiam horum Macrobius: Virgilius item Georgicorum secundo,

— *Nec fursculus idem*

Crustumius.

Seruij authoritate ex parte rubent, dictaque sunt crustumina ex Crustumio Thusciae oppido, vbi optima, copiosaq; erant. Optima, copiosaq; etiam apud nos sunt, vulgò dicta *Pera giacciole di Roma*, nam Roma ad nos exportata primitus fuere, ibiq; è Thuscia, tenera sunt, succosa, dulcia, alba, ex parte rubentia. Sunt alia huiusmodi pyrorum species apud nos Puteolis è Germania allata, ob id vulgò dicta *Pera giacciole di Pozzuolo*, & *giacciole di Alemagna*, quæ etiam hordearia dici poterunt, cum eo tempore, quo metunt hordeum, appareant. Fauoniana rubra paulò superbis maiora Plinius dixit. Retinent adhuc genuinum nomen, nam *Pera rossolelle* dicimus, hæc enim paulò superbis maiora sunt, & rubicundo colore perfusa. Quod nos *Pero inganna villano* dicimus, colore est foris nigro, vel si mauis fuliginoso, inter cætera præstātissimum est, & Augusto maturatur: existimarem esse illud, quod Syria donat, à Plinio descriptum. Inquit ipse. In iis alia colore nigro donant Syria. Columella Tarentina, eadem quæ Syria dici ait: quod à M. Carone, qui in sapa condi posse scripsit, desumpsit. Macrobius Tarentinum etiam Syrium dici narrat. Huius etiam meminit Virgilius,

Crustumis, Syriisq; pyris.

Apud nos sunt plura horum pyrorum genera, quod etiam Plinius non retulit, nam alia, dixit, colore nigro donant Syriæ, veluti sunt *Pera caranelle*, omnium huiusmodi rubiginoso colore infectorū optima. Item *Pera brutto buono*, aliud *Pera maluestito*, & *Pera pozzelle*. Proxima iis falerna à potu, inquit Plinius, quoniam tanta vis succi abundat: lactea hæc vocatur. Neapolim è Samnio afferuntur, ibiq; *Pera pane* & *vino* dicuntur vulgò: quia cum esantur, edere ac bibere putatur. Sapore & succo sunt præstantissima, forma turbinata, acerbæ virescunt, matura albescunt. Pyra, quæ Plinius à collo coroliana vocitari dixit, nos putamus *πῆ κορωνία*, quasi lunatus, vel inflexus, ut boum cornu, dici, unde quæ Neapolitani *pera coscia di donna* dicunt, Plinij coroliana esse, nam & pediculus carne obductus est, & inflexus ut boum cornu, venter ut viatorum vascula, hæc vili habeantur pretio, nam insipida sunt: per hordeum maturantur. Cato cucurbitina pyra nominavit, & in sapa condi posse dixit: itemque Macrobius. Plinius rationem nominis reddit, Brutæ gentilitatis cucurbitina, acidula succi. Neapoli vulgò *pero cocozzaro*, cucurbitam enim *cocozza* vulgus vocitat, in figuram efformatum vasculi viatorum, colore viridia, tactu duriuscula, maturantur Augusto. Maturantur item Augusto duo pyrorum genera, quorum vnum legitimum, alterum spurium vocamus, nullis iam dictis inferiora, magnitudine, teneritate, succo, & sapore: legitimum *pero pacoone* vocamus, spurium verè *pero pacoone bastardo*, quod parum ab eo sapore degeneret & magnitudine. Coniicerem ego Plinij Decimianum, & Pseudodecimianum. Inquit enim, Sed confessis vrbis vocabulis, authores suos nobilitauere Decimiana, & ex eo tractum, quod Pseudodecimianum vocant. Macrobius Decimianum dicit. Cato pyra volema nominavit: ex quo Virgilius,

Crustumis, Syriisq; pyris, granibusq; volemis.

Columella itidem. Plinius volema. Macrobius volemium dixit. Seruius volemis, id est magnis, dixit, nam & volema ab eo, quod volam impleant dicta sunt, vola enim palma mediæ est, dicerem esse posse, quæ nos *perapignatelle* dicimus, hæc optima sunt, nec ad libræ solum, sed etiam ad duarum librarum pondus ascendunt. Quæ verò Samnites *pero capacci* vocant, etiam ad trium librarum sæpe pondus ascendunt, hæc Augusto maturantur, albo, & croceo colore colorantur, coctum præstat, & ad hyemem seruatur. Maturantur etiam Augusto *perarosselle* dicta, alia à iam dictis præcocius, asseruanturque diutius: putarim Plinij venerea. Inquit enim, Incerta nominis causa est barbaricis, venereisque, quæ colorata dicuntur.

Suauent hyberna, siue sementina. Cato mustea, & sementina dixit, ac sementina conditiua esse, dictaq; esse, quod sementis tempore maturentur, scilicet autumn o. Plinius ab odore pyra laurea esse dixit, serotina esse, & ad hyemem usq; ad matrem pendunt, gelu maturescunt. Pristinum adhuc retinent nomen, nam vulgò *peralaure* dicunt, cum enim vorantur, fauces lauri odore replent,

plent, & serotina
caula regis, quæ
uit. hæc pyra
mo Italiz opp
nec vitis do
dicatis, ut seculi
quos regum m
dine, sapore eg
pla, & grato su
mnalia, acidula
na. Vatro ex C
legit, hæc nō
tumalia sunt
nomen habe
ture sceria in
tum pero bu
suauitate exin
scar, perennat
elui per optim
20 hyemem expe
lo octauo hic
culosi pyri me
generis vitio, o
ne charra, vel d
pyrorum gene
quæ exis nata
riana, quæ ma
descuntque, a
rissima omni
30 iis amerina, s
dore nardina
na, neuiana,
laterabanū
num, tullia
num serum
omnia, quæ
Theoph
vbi etiā m
tilis verò h
40 Pyrum in fa
gido, & repi

plent, & ferotina sunt. Laurei etiā pyri meminit Macrobius. Incerta nominum causa regis, quæ minimo pediculo sessilis, Plinius dixit. Columella regia vocauit. hæc pyra alia esse non possunt, nisi quæ vulgò *bergamotte* dicimus à Bergamo Italia oppido, quod sua peregrinatione insigniuit. Colore sunt herbido, nec vt foris dotem referant, minimo omnium pediculo, & compressæ rotunditatis, vt sessilis videatur, ferotina sunt, & facile ob sui præstantiam apud antiquos regium nomē adipisci potuerunt: mira sunt teneritudine, aquosa dulcedine, sapore egregio. Ab eorum etiam dote Imperialia nunc dicimus, quæ ampla, & grato succo, & singulari cōmendatione. Anitiana, Plinius ait, post autumnalia, acidulo sapore iucunda. Cato aniciana, per c, scribit. Macrobius antiana. Varro ex Catone in sapa cōdita manere pyra antiana. Columella anitiana legit. hæc nō nisi *pera sarricole* vulgò dicta esse possunt, nam sementina post autumnalia sunt, & acidulo sapore iucunda, ob id agris præbētur innocuē. Patriæ nomen habent Græca, ferotina ad hyemem vsq; ad matrem pendent, gelum maturescētia inquit Plinius, Macrobius græculū vocat. Id genus puto Neapoli dictum *pero buon Christiano*. Inter cætera nostræ Campaniæ præstantissimum, suauitate eximia, magnitudine, & teneritate tāta, vt gustatu vel ipso ore liquefcet, perennat, gestatumq; tolerat, hyeme crudum, coctumq; mandimus, vtq; esui peroptimum, agris innoxie præbetur, omnium postremū, nec prius, quàm hyemem experiatur, edomita acerbitate mitescit, Neapolim delatum à Carolo octauo hic res gerente, à nostra felici Campaniæ his dotibus adoptatū. Calculosi pyri meminit Macrobius. Huius Neapoli multæ sunt species. ab huius generis vitio, quod calculis præditæ sint, denominatæ. Sed hæc dixisse satis sit, ne charta, vel dies potius, quàm genera deficiant. Sunt etiam apud Plinium alia pyrorum genera, pomponiana cognomine, mammosa, ciceriana, feueriana, & quæ ex iis nata sunt tyranniana longitudine pediculi distantia, lateriana, tiberiana, quæ maximè Tiberio principi placere. Colorantur magis Sole, grandescuntque, alioquin eadem essent, quæ Liceriana. Patriæ nomina habent, ferissima omnium amerina, picentina, numantina, alexandrina, numidiana, & in iis amerina, signina, quæ alij à colore testacea appellant, sicut onychina. Ab odore nardina, & patricia, voconia, viridia, oblongaque. Item Columella signina, neuiana, vulsa. Item Macrobius citrium, ceruifca, lollianum, lanuuium, laterasianū, milesium, myrteum, nauianum, orbiculatum, præcianum, signinum, tullianum, ticianum, turriuanum, timosum, mespilium serum, sementinum serum, sextilianum serum, tarentinum serum, valerianum serum: quæ omnia, quia alias notas non addiderunt, penitus ignoramus.

Theophrastus pyrū syluestre inferuidis male se habere dixit, vt in *Ægypto*, *Calum*, ubi etiā mites pyri nihilo melius germinant ob calorem inhospitalē. Ex Quintiliis verò habetur, Pyrorum genus in frigidis & humidis locis. Ex Diophane, Pyrum in frigidis, aquosis, & vberibus locis gaudere habetur. Palladius in frigido, & tepido loco prouenire scripsit, sed in riguo, & florem plurimum profert.

re, & magnitudinem pomi turgentis acquirere. Plinius, Subit & in montosa pyrus. Athenæus, ex Hermippi sententia, in Euboicis optima pyra nasci tradidit. Sed animaduersione dignum est, cum de cælo, & solo pomiferis arboribus conuenientibus loquimur, de iis intelligendum esse, quæ syluestribus sui generis arboribus inferuntur, non alieni: nam si super alias diuersi generis arbores inferemus, velut cotoneo, sorbo, & oxyacantha, solū cælumq; illis tribuendū esse censeo, quæ inferiori trunco cōueniunt, non autē, quæ superiori.

Solum.

Palladius scribit, Pyra nasci talis solo maximè diligunt, quale vinetis conuenit, sed lato solo & validas arbores, & fructus plurimos consequi. His annexendum esse iudicāre, vt profundum sit solum, cum validas arbor in profundum radices agat.

Satis.

Theophrastus omnino semine satum pyrum de generare ait, & non nisi viriatum pyrastrum nasci. Palladius autem, Si quis semen pyrorum aspergit, nasci quidem necesse est, originem suam refouente natura, cuius æternitati nulla tarditas potest afferre fastidium, sed homini expectare longinquū est, cum & serō veniant, & de generis nobilitate decedant. Cato autem pyrorum seminata ex seminibus facere docet, quemadmodū in Cupressis retulimus. Ex quo Plinius excipiens, illud idem docuit. Vini radicibus serere docet Palladius. Plantas pyrorū mense Februario locis frigidis ponemus, calidis verò Nouembri: sed mense Nouembri pyra locis repidis cōserenda sunt. Sed pyrum plantis serere propè tardus est euentus; tamen quibus hoc placuit, vt semina generosa nihil sibi de agresti asperitate permisceant, plantas bimas, aut trimas eo more, quo oleæ ponuntur, radicas magnis serobibus ponant, supra terrā tribus altas, vel quatuor pedibus, quarū decisa cacumina, argilla mista mucus debet operire. Melius ergo hoc mense Nouembri fiet, vt pyrorū plantas radicas seramus agrestiu, subactis bene serobibus, vt cum prehenderint inferantur. Hoc autē interest, quod quæ plantis suis seruntur, dulcedinē ac teneritatem seruat, diu tamen seruata nō durat, insita verò moram temporis sustinebunt. Spatia inter pyros triginta pedū mensura discernat. Theophrastus pyrū vere ponendum arbitratur, cum autumno seri arboris natura nō ferat, quoniam lignosorum natura à germinandi facilitate abest, estq; cum earū siccitate imbecillitas aduersus hyemes, præterea lauros nō plus quam nouenos pedes præcipit distantes serere, malos distantiores paulò, pyros amplius. Quintilij. Si verò viui radices plantaturus es, sint hæ ipsæ triennes, aut nō minores duorū annorum. Sed pro diuersa earū natura, Diophanes ait, variā serendi rationē postulare. Etenim longorū, vel rotundorum generū arbores, quæ suos in matre partus maturāt, aliquanto celerius, ad mediū vsq; ver feri volunt, locis ad ortū solis, vel septentrionē spectantibus. Verum radicata plantula, nō iuniores binis deponuntur. Terra autē iniiciatur simul stercore admixto. Porro longè melius plantas syluestriu pyrorū radicas serimus, subactis bene serobibus, vt dum cōprehenderint, inferantur. Columella ait: pyros autumno ante brumā serito, ita vt mi-

nime

V
nime dies quin
ra omnia feri i
ab occasu Verg
sagitta, Subola
ratio tempora a
nec minus dieb
auollis, ex Qui
phrastus raro n
generosissimos
idem sentite vid
rint, post bienn
lo. Quintiliū,
easq; plantant
Theophrastus
supra in malo
Inferi autem
vento aulstro, d
Plinius ex eo re

Flor.

Palladius ver
re, quo dictum
Inferitur autem
lius orno, & fr
pyti, qui inferit
foliis, & omni
mum germen in
tione insita pyr
& tuberes. Qui

Ge

N

T

7

E

H

nāme dies quinq; & viginti ad brumā super sint. Plinius nō eodem tempore pyra omnia feri iubet, quoniā non æque floreat. Eadem oblonga, aut rotunda ab occasu Vergiliarum ad Brumam. Reliqua genera media hyeme ab occasu sagittæ, Subsolanum, aut Septentrionem spectantia. Cōmunis quidem Italiæ ratio tempora ad hunc modū distribuit: Pyro autumnum, ita vt brumā x v. nec minus diebus antecedit. Seritur etiam pyrus radicariis plantis ē radicibus auulsis, ex Quintiliorū placitis, quod Diophanes confirmat. Ex ramis Theophrastus rarō nasci posse scripsit. Quintilii, Ex superna arborum parte ramos generosissimos acceptos plantant, neque successu frustra sperato. Columella idem sentire videtur, nasci posse ex cacuminibus, atque depacta vbi adoleuerint, post biennium inferi, aut transferri si generosa fuerint, vt diximus in malo. Quintilii, Quidam etiam trunci generosissimas partes scytalas faciunt; easq; plantant: quemadmodum à scytalis oleas.

Theophrastus ait, quia plagis infirmatur, ideo min⁹ recidenda pyrus, vt supra in malo retulimus. Cultus.

Inferi autem præcipit Cato pyra per ver, luna silenti, post meridiem, sine vento austro, & post solstitium, diebus quinquaginta post vindemiam. Quod Plinius ex eo retulit. Virgilius orno inferi posse scripsit. Institio.

Ornusq; incanuit albo

Flore pyri.

Palladius verò ita monet, Mense Februario, & Martio pyrus inseritur more, quo dictum est, cum de insitione loqueremur sub cortice, & in trunco. Inferitur autem pyro agresti, malo, vt nonnulli, amygdalo, & spino, vt Virgilius orno, & fraxino, cydonio vt aliqui, & punico, sed fisso ligno. Surculus pyri, qui inseritur ante solstitium, anniculus esse debet, & prius quàm figatur, foliis, & omni tenera parte priuari, post solstitium verò eum figis, qui summum germen inclusit. Pyrus omni genere inseritur. Iulio mense emplastratione insita pyrus Palladio explorante processit. Recipit citreum, mespilum, & tuberes. Qui ad Pasiophilum sic scribit carmine,

Germine cana pyrus, nuneos haud inuida flores

Commodat, & varium nectit amore nemus.

Nunc rapit hirsutis horrenda sororibus arma,

Et docet indomitas ponere tela pyros.

Nunc teretem pingui producit acumine malum,

Fraxineasq; nouo flectit honore manus.

Phyllida quin etiam grandi mitescere fructu,

Instituens, dura dat sua membra cuti.

Et steriles spinos, & inertem foetibus ornum

Dorat, & ignotum cogit amare decus.

Huius & immissi vertere cydonia rami,

Pomaq; confusus blanda creauit odor.

Castanea septos a spro velamine fetus

Exiit, & placido pondere mutat onus.

Mespilaq, exarmat pugnacibus horrida membris,

Et mala tranquillo cortice fota premit.

Creditur in Libycis sua germina nectere ramis,

Lataq, puniceo posse decore frui.

Ait Plinius. Pyrum vel florentem inferere licet, & in Maium quoq; mensi protendere infitionem. Ait M. Varro, Pyrum non recipit quercus, neq; enim si malus pyrum. Hæc sequuntur multi, qui aruspices audiunt multum, a quibus proditum in singulis arboribus quot genera insita sunt, vno ictu tot fulmina fieri illud, quod fulmen concepit. Si in pyrum syluaticam inseueris pyrum quamuis bonam, non fore pyrum tam iucundum, quam si in eam, quæ sylvestris nō sit. Sed quercus bona pyra ferre Plutarchus est author. Ex Quintiliorum placitis, Cassianus animaduersione dignum esse iubet, ne malorum, pyrorumq; surculi, qui ad infitionem cautè, & diligenter accipi debent, acutissima falce deputentur: sunt enim hæc arbores valde tenui cortice præditæ, quapropter aliqui ipsos manibus potius auferunt, quam falce refecant. Pyrus (vt ait Tarentinus) inferitur in punicam, in malum cydoniam, in amygdalum, in terebinthum, & in morum. Insita autem in morum, pyra rubicunda producit. Diophanes myrapia commodè infoliari in mala, quod ipse experientia manifesta condidit. Nos autem myrapia, quæ diximus, in cotoneam insita maiora, quæ vnquam ex arbore pependerint, odoratiora, coloratioraq; produxisse vidimus. Alii pyrum in salicem inferi posse scribunt, sed salix humido loco sata sit oportet, optime autem inter lignum & corticem, tardissime omnium affert: inferendamq; esse vltimis deficientis Lunæ diebus.

*Morbi &
remedia.*

Theophrastus ait, in pyris præuenire solet lapsus maturitatem, vel debilitate appendiculorum, nam cum mole grandiuscula consistant, facili sentit pediculus incommoda distentionis ex pondere: vel vrgentur interdū copia flatuum, grauatur etiam humore, humiditatem verò esse causam lapsionis pomorum docet, humefacto Austris aëre, atq; nubilo, tum flores cadere, tum etiam priores fructus, qui statim flores subsequuti sunt. Ex quo Plinius, Si cum defloruere pyri protinus sequantur imbres, in totū poma depereunt, etiam si omnino nubilum fiat, austrinusve flatus, amittūt fœtus. Et alibi. Perdunt facillimè ante maturitatem fructus pyri, etiam si non pluat, & fiat austrinū cœlum, aut nubilum, amittunt flores, & primos fructus, si cum defloruere tales dies fuerint. Tradit Palladius crebris fossionibus, ac frequenti humore proficere, vt nulla floris iactura fiat. Multum quoq; prodesse, si interiecto anno quale libet adiungatur latamen, sed bubulum spissa & grauiā poma creare fertur. Aliqui cinerem miscent, existimantes argutiores pomis contrahi sapores.

Theophrastus vermiculationem etiam sentire pyra prodidit, eoque morbo celeriter interire. Ex quo Plinius. Maxime autem arborum vermiculantur pyri,

V
pyri, poma etiam
phantes à vermicul
linantur. Palladi
cibus felle taurin
Theophrastu
facto quorum
cant. Ex quo Pl
reda cuneo ad ad
& dulcis sit, iux
adiges, atque it
gando que ad qu
fusa tamen fac
cūm adoleuerit
dito, & fissura
ablaqueatione
arbor pyri: ve
vel in trunco
quercu. Item fa
diutius arbores
Præterea, S
uabis, & secer
cribro cretam in
doliq; generis p
Quintiliū verò a
los, quibus dili
cum suffundunt
Sed mitum trad
sa, pyro vtilis fi
fissionem tolet
Pyra alia se
sementina Cat
Sed M. Varro
condita man
uari & in pass
Varro iter
facile durare
poris medio
osseo cultello
& purgata gr
totidem mod
Ex Palladi

pyri, poma etiam ipsa per se quibusdam annis vermiculationem sentiunt. Diophanes à vermibus liberati promittit, si radices dum plantantur bubulo felle linantur. Palladius, Vermes enati necantur, & nasci quoque prohibentur, radicibus felle taurino frequenter infusis.

Theophrastus item, Si pyrus frondibus, & germine luxuriabit, foramini facto quernum palum adigunt, terraque occultant. Quod punire nonnulli vocant. Ex quo Plinius, Pyri, quæ germinant, nec fructum ferunt, fissâ radice è teda cuneo adacto, & cinere, ac terra cooperto. Diophanes, Vt pyrus ferax, & dulcis sit, iuxta radices truncus findatur, fissuræ cuneos ex quercu, vel fago adiges, atque ita obrues. Vel circa eam facie vini veteris radicibus affusa, rigandoque ad quindecim dies, postea verò obrues. Quod si non ægrotet, affusa tamen facie, dulcior euadet. Columella eadem docet, Vt pyrus ferax sit, cum adoleuerit, altè eam ablaqueato, & iuxta ipsam radicem truncum findito, & fissuram cuneo tedæ pinæ adigito, & ibi relinquito, deinde absumpta ablaqueatione, cinerem supra terram iniicito. Palladius verò, Si languida est arbor pyri: vel ablaqueata radicem terebras, & ibi ligneum palum deprimis: vel in trunco similiter terebrato ex teda cuneum figis: vel si hoc desit, ex quercu. Item facies vini veteris recentes si radicibus affundantur per triduum, diutius arbores in floribus laborare non faciunt.

Præterea. Si lapidosa pyrus est, ab extremis radicibus terram priorem leuabis, & secernes omnes lapillos, quibus diligenter remotis, alteram terram cribro cretam in loco eius infundis, sed hoc proderit, si rigare non cessas. Lapidosisque generis pyra vitium mutare creduntur, si terris mollibus conserantur. Quintilii verò ab extremis radicibus terram leuant, & omnes secernunt lapillos, quibus diligenter summotis nouam terram cribro cretam in alterius locum suffundunt. Sed frequens rigatio calculosæ pyro præsentis est remedio. Sed mirum tradit Plinius, quod animalium depastio, quæ arboribus perniciofa, pyro utilis sit apud Chios, quam vocant Phocida. Theophrastus caudicis fissiõnem tolerare posse scribit, quia facillimè coit.

Pyra alia sunt conditiua, alia minime. Conditiua, vt volema, anitiana, & sementina Cato iubet condi. In sapa verò tarentina, mustea, & cucurbitina. Sed M. Varro ex eo aliter sentit. Nam pyra antiana, & sementina in sapa condita manere. Plinius ex utroque Tarentina serissime legi, anitiana seruari & in passo.

Varro item pyra dissecta, & in sole macerata per se vbicunque sint posita, facile durare. Columella siccandi modum docet, Augusto pyra dulcissimi saporis mediocriter matura eliguntur, & in duas, vel tres partes arundine, vel osseo cultello diuisa in sole ponuntur, donec arescant. Palladius, Pyra diuisa, & purgata granis in sole siccantur. Plinius condi pyra, vt mala dixit, & vna, ac totidem modis.

Ex Palladii doctrina, Pyra, quæ huic negotio destinantur, à cadiuis dilâ

genter electa integra debent esse, placido die, decrefcente Luna, à vigesima secunda vsq; in octauam manu decerpta, vegeto solis calore ab hora secunda in quintam, vel à septima in decimam, dura tunc, & aliquanto viridia, picato vase claudantur, quod tegatur operculo, & inclinato deorsum ore breui obruaturscrobe, loco iuxta quem perennis aqua defluit. Item, quæ dura sunt in carne & cute, in acervo posita, vbi se mollire cœperunt, in fictile picatum ponuntur, & operculo superueniente gypso linuntur, vas breui scrobe demergitur, loco, qui quotidie sole tangatur. Alii statim lecta cum tenacibus suis picatis vrceis condiderunt, & oribus vasculorum gypso vel pice clausis, ipsa sub diuo obruta sabulone tixerunt. Plurimi pyra obruta inter paleas, aut frumenta seruarunt. Alii pyra, quæ non se contingerent, in melle seruarunt. Aliqui aquam salfam, cum cœperit vndare calefacta, despumant, & ei post iam frigide pyra seruanda demergunt: tunc exempta post tempus exiguum condunt vrceo, & eius lito ore conseruant. Vel nocte, & die in frigida salsa manere patiuntur, post in aqua pura biduo macerant, deinde in sapa, vel passo, vel dulci vino merfa custodiunt. Seruari pyra Democritus affirmat, quæ illitis pice surculis suspendantur. alii in sapa, vel passo, vel dulci vino, vel musto merfa custodiunt vasis plenis. Plurimi inter scobem obruta seruarunt. Alii ficcatis frondibus iuglandis inuoluta recondunt. Alii in vrceo fictili nouo in vino, vel musto demergunt, parum salis habenti, & operculato vase reponunt. Alii vinaceis discretæ, ne se contingant, obruunt. Apud nos funiculis laquearibus appensa, vsque ferè ad aliorum prouentum seruant, & præsertim quæ *bergamotte*, & *buon christiane* vocamus, quod etiam antiquitus fieri docet Martialis ad Mancinum.

Non pyra, quæ lenta pendunt religata genista.

De sorbo. C A P. X V.

SEQVITVR sorbus, cuius fructus malorum, pomorumq; generi iure venit annumerandus. Et si suus locus in syluis sit, tamen ob gratiam, quam apud omnes eius fructus adeptus est, in nostrum pomarium transtulimus. Inter felices arbores connumeratur à Verannio, Macrobio referente. Astringentem eius naturam Martialis innuit,

Sorba sumus molles nimium durantia ventres,

Aptius hac puero, quam tibi poma dabis.

Nomen.

Sorbus arbor Græcis *σῆν*, & *ἐν*, fructus verò *σῆα*, & *ἐα*. Ita & apud Latinos arbor sorbus dicitur, fructus verò sorbum: vel quia ore absorbeantur, vel quia diu seruentur. Itali arborem *sorbo* dicunt, fructus *sorbole*.

Descriptio.

Theophrastus sorbi arborem accuratissimè describit, tanquam incognitam sibi, & aduenam. Sorbus arbor de grandibus & subrectis est, coma concinna, & nisi quid impediatur, verticem nucis pineæ representans. A culeos non habet vt mespilus. Nouella cortice læui, pinguiusculo, flauente candido, an-

nosa

rosa scabro, atroque. Folia pediculo singulari, prolixo, nervaceo, conditain-
 versus, alæ modo à lateribus emicantia, tanquam ex omnibus vnum fiant, la-
 tiniis pennatim ad neruum vsque diductis, ampliusculo diuisis interuallo, o-
 mnibus ramulis in extremo pediculi folium prominet, cuius accessione im-
 par numerus efficitur, sunt in vetustioribus, breuioribusq; pauciora: figura iis
 lauri tenuifoliae, præterquam quòd serrata per ambitum breuioraq; sunt, neq;
 cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatem retusis: atq; hæc non paulatim,
 vt cæteris, sed vniuersa collabuntur. Flos racematim coactus ex pluribus can-
 didis ac minutis, petiolo vnico dependet. Fructus cum large proueniunt, vix
 modo farcti, congestiq; visuntur, ex vno petiolo faui speciem præbentes, a-
 cerbissimi. Noua admodum fructificat, etenim à trimatu fert. Autumno fo-
 liis subinde amissis, cachrym suam fundit, eduraturam hyeme. Radicibus ne-
 que multis, neque in altum defixis, validis alioqui, & crassis, auelliq; difficilli-
 mis. Plinius ex eo, non ante trimatum ferre ex vilo genere scripsit. Ei vni-
 uersa folia decidere: forba inter se densa, quæ ramos circundata ex omni par-
 te vuarum modo degravant.

Syluaticæ sorbo præstantior quàm vrbanæ fructus ait Theophrastus, quòd
 in hac, & in cornis præcipuum notauit. Suauius enim olent. Cuius rationem
 in libro de causis assignauit: quia sicciores sunt, ea tamen siccitate, quæ non in
 totum tollit humiditatem ad odorem conficiendum: syluestre nempe genus
 siccius, ieiunius, feruentius, ac succo tenuius est, nec succū carni permixtū vr-
 bani modo gerit. Præterea duo alia sorborū genera ab aliis tradit reperiri, fœ-
 minam, quæ sola fructificat, & masculam sterile. Aliud etiam discrimen in fru-
 ctu, quòd alia figurâ orbis, alia qui referūt. Item aliq; succo odoratiore dulcio-
 req; vt quæ orbiculatos fructus ferunt: alia acido, peiusq; olente, vt quæ oua-
 les. Plinius verò, Sorbis quadruplex differentia. Aliis eorū rotunditas mali, a-
 liis turbinatio pyri, aliis ouata species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia a-
 cori. Odore & suauitate rotunda præcellunt. Cæteris vini sapor. Generosissi-
 ma quibus circa pediculos tenera folia. Quartum genus torminale appellant.
 De quo nos alibi. Sed syluestre genus nos vocamus, quod in syluis absque ali-
 quo cultu fructus optimos affert, de quo intellexit Theophrastus. Sed est ali-
 ud genus, quod verius syluestre dici posset, nam arbor ab vrba nihil differt,
 nisi fructu qui exiguus est, & vix oxyacanthæ baccas superat, colore ferrugi-
 neo, & vtimur ad aucupia turdorum, cuius sunt auidiſſimæ. Mascula caremus,
 quia omnes fœtificantes sunt. fortasse feruentibus locis ea Theophrasto visa
 fuerit. Fœminam dicimus, quæ paruos, rotundosq; fructus affert, masculam
 verò, quæ magnos, acturbinatos. Sunt præterea discrimina multa, colore, sa-
 pore, & magnitudine differentia, nam alia oui magnitudine, alia oleæ fructus
 ferunt, alia lentiginosos, & inter hæc præcipua, quæ in arbore ad lanuarium
 vsque vegetos seruat.

Suapte natura frigidos tractus querere scribit Theophrastus: nam si ad lo-

ca feruentia venerit, sterilefcere. In montibus etiam nafci. Plinius sorba in frigidis, & humidis prouenire fcripfit, aquofus etiam montibus gaudere. Ariophanes (Athenæo auctore) ait,

In montibus funt sorba fronte plurima.

Palladius amare loca humida, montana, & frigidis proxima.

Solius.

Theophrastus alfofolium, humectumq; folum concupifcere, quo tamen fi uiuacior, aboleriq; contumacior, montibus etiam nafci dixit. Palladius folum pinguiſſimum, cuius indicium facit certiffimum, fi frequens ubiq; nafcatur.

Satio.

Theophrastus femine nafci fcripfit. Plinius idem confirmat. Palladius, Mense Ianuario, Februario, & Martio locis frigidis. Calidis uero Octobri, & Nouembri sorba feruntur egregie, ita ut matura in feinario ipfo poma pangantur. Ipseq; expertus est, arbores ex pomis sponte progenitas, & in crescendo, & in ferendo extitiffe felices.

Tradidit etiam Theophrastus uiniradice feri. Plinius ab eo, radice plantam feri fcripfit, ac post mediam hyemem in idus Februarias. Palladius, Plantas etiam fi quis ponere uelit, habebit arbitrium, dummodo calidis locis mense Nouembri, temperatis Ianuario, uel Februario, frigidis Martio inclinante difponat. Planta est transferenda robustior, fcirobem defiderat altiore, & spatia longiora, ut (quod illi maxime prodest) à uentis frequentibus agitata grandefcat.

Etiam auulfione nafci fcripfit Theophrastus. A quo Plinius. Cū perna sua auellitur, partemq; aliquam è matris corpore aufert fecū fimbriato corpore.

Cultus.

Veluti fylueſtris arbor refpuit omnem cultum, fed ficcitatibus fi irrigetur, ac hyeme fuffodiatur, maiores & dulciores dabit fructus, fed non odoratiores, ut è Theophrasto colligitur. Formanda est arbor, ut à terra decem, uel duodecim pedibus eleuetur.

Infusio.

Plinius in calabrice inferi monet, ea est spina fylueſtris. Pallad. Mense Aprili sorba inferi in fe, in cydonio, in spina alba, uel trunco uel cortice. Idè in uertib.

Sorba fuos partus merito maioris honeſtant

Seminis, & pulchro curua labore nitent.

Hæc arbor spina duras mucronibus artus

Exiit, ac libris mitibus arma tegit.

Aureaq; annexo mifcere cydonia fætu

Gaudet, & externi dona coloris amat.

Plinii calabra Dioſcoridis oxyacantha est, ut alibi monuimus, retinet apud nos priſtinum nomen, optimeq; ſuper ea prouenit ſorbus, etiam malus, & optimos fructus præbet.

Morbi & remedia.

Ait Theophrastus, Ipſa arbor in ſenecta uermibus obnoxia ruſſis, hirsutis ſui generis, atq; ita emoritur. Fructus etiam ſuper arborem crudus adhuc magis, quàm meſpila, pyraq; quauis hic maxime omnium ſit acerbiffimus. Plinius ex eo, Sorbus arbor infeſtatur uermiculis ruſſis, pilofis, atq; ita emoritur. Nos ex his ſape extraximus non ruſſos, neq; hirsutos, ſed ſicut cæteri. Palladius re-

medium

medium affert
interna ſectari
incendio. C

Plinius, Sor
neus è teda, ac
Si uero minus
partem ultimam

Theophr
eſſe. Plinius lig

10 liantur, arcæ,

M. Varro de

ſum oporteat

miferis ad ede

rum mite con

mitelcit, que

ut inde proma

tatem dixit, q

ſunt, & arbori

men quoad ſu

20 trefactionem

cum enim per

batur, frigoris

runt. Colume

picator adicte

bipedaneis ſic

rum ora deori

cato. Melius e

ponere nam i

celeriter ſor

30 ſpiffamento a

ac nihil domin

Plinius ait

uantur in ſer

co aprico, in

Lecta duris

claudantur

ſub ſole me

cta per part

uoluerimus

40 cum pedic

ſapa aſſerun

medium affert. Si vermes patitur infestus, qui in ea ruffi, & pilosi solēt medullę interna sectari, aliquos ex his sine iniuria arboris detractos vicino crememus incendio. Creduntur hoc genere, vel fugere, vel perire.

Plinius, Sorbis, quę generant, nec fructum ferunt, fissā radice inditur cuneus ē tēda, ac cinere, & terra cooperitur, fertilesq; fiunt. Ex quo Palladius. Si verō minus ferre cōperit, tēdę cuneus eius radicibus inferatur, vel circa partem vltimā fossa facta cumulo ingesti cineris adæquetur.

Theophrastus materiem sorbi solidam, spissam, coloratam, & validam esse. Plinius lignum ossibus carere inquit. Apud nos ex ea optima vasa expo-

Materia.

liuntur, arcę, & balistarum manubria.

M. Varro de sorbis pensilibus promendis ait, Ipsa ostendunt, quando ad vsum oporteat promi, quod colore mutato, & contractu acinorum, si non demiseris ad edendū, ad abiiciendum descensura se minitantur. Sorbum maturum mire conditum, citius promi oportet: Acerbum enim suspensum lentius mirescit, quod prius domi maturitatem assequi vult, quam nequit in arbore, ut inde promatur ad escam. Theophrastus ad hyemem suam differre maturitatem dixit, quia eius fructus plus sicci habent, terreni, acerbi, solidiq; natura sunt, & arboribus decerpti maturefcere possunt, et si non vera maturitate, tamen quoad succum conceperint esculentum, nisi hoc maturitatis genus putrefactionem appellare mauis, nec prohibet id fieri posse ab extremo calore, cum enim perpetuus humor effluere desierit, qui prius ab arbore suppeditabatur, frigoris superuentu calor intus naturalis obsidetur, quoad maturuerint. Columella ita seruat, In vindemiis sorba manu lecta, curiosē in vrceolos picatos adiicito, & opercula picata imposito, & gypso linito, tum scrobibus bipedaneis sicco loco intra tectum factis vrceolos ita collocato ut oblita eorum ora deorsum spectent, deinde terram congerito, & modice desuper calcato. Melius est autem pluribus scrobibus pauciora vasa distantia inter se disponere: nam in exemptione eorum, dum vnum tollis, si reliqua commoueris, celeriter sorba vitiantur. Quidā hoc idem pomum in defruto seruant, adiecto spissamento aridi feniculi, quo deprimatur ita sorba, ut semper ius supernatet, ac nihilominus picata opacula diligenter linūt gypso, ne possit spiritus introire.

Cōditura.

Plinius ait, Caro & sorba sapa condi iubet. Et in vasis fictilibus picatis seruantur in scrobibus, gypsato operculo dum pedum, terra superinducta, in loco aprico, inuertis valis, & in doliis ut vvas cum ramis suspendi Palladius ex iis, Lecta duriora, ac posita, ubi maturefcere cōperint, fictilibus vsque ad plenum claudantur vrceolis, gypso desuper rectis, & bipedanea scrobe loco sicco sub sole merguntur ore peruerso, & desuper spissius terra calcatur. Item secta per partes siccantur in sole, & seruantur in vasculis in hybernū. Cum voluerimus vii, aqua feruenti macerata reuifescunt sapore iucundo. Aliqui cum pediculis suis viridia lecta suspendunt locis opacis, & siccis. Alii sorba in sapa asserunt diu posse seruari.

H A C T E N V S de arboribus, quarum fructus semina intus habent, nunc de iis, quæ grana, vel frumenta in se continent, verba faciamus, à sicu incipientes. Macrobius ficum albam inter felices arbores connumerandam censet, nigram inter infelices, Veranii testimonium afferens, de verbis pontificalibus ita dicentis: Felices arbores putantur esse Quercus, Æsculus, Ilex, Sapinus, Fagus, Corylus, Sorbus, Ficus alba, Pyrus, Malus, Vitis, Prunus, Cornus, Lotus. Farquinius item Priscus in ostentario arborario idem innuit, cum ait: Arbores, quæ inferorum deorum, auertentiumq; in tutela sunt, infelices nominant; alaternum, sanguinem felicem, ficum atram, quæq; baccâ nigram, nigrosq; fructus ferunt; itemq; acrisolium, pyrum syluaticum, bruscum, rubum, sentesq; quibus portenta, prodigiaq; mala comburi iubere oportet. Sed ficum tanquam non pomum à pomis secerni iubet Afranius dicens. Pomum, holus, ficum, vnam. Et Cicero, Neq; ferit vitem, neque quæ fata est diligenter colit. Oleam, ficus, poma non habet. O Economicorum tertio. Nos autem ex Plinio, cæterisq; inter poma connumerari affirmamus. Ficus in ea æstimatione apud antiquos fuit, vt secundum ab vna locum ei dederint, primum inter horarios fructus: cum sit eius succus minime vitiosus, maioris nutrimenti, & demum succo vitis præstantior. A Græcis, Latinisq; adeo copiosè de ea differitur, vt nunquam de alia, vnde necesse est, quæ de ipsa tradimus in plures sectiones partiti, vt quæ ab aliis membratim discerpta accepimus, distinctè & ordinatè, quæq; nostra vidimus experientia luculentius explanemus, à cuius inuentione nostri sermonis initium erit. Magna sunt de ficu Poëtarum commenta, per plures historia, & in ea laudanda eo usq; progressa est antiquitas, vt à Diis originem traxisse dixerit. Pausanias in Attica primum à ditam ficum putat prope Cephissum. Phytalus Cererem (vt fama est) hospitio suscepit, Dea beneficii non immemor ficulnam arborem dono dedit, quod in eius monumento his numeris memoriæ prodium fuit,

Hic Cererem tectis Phytalus susceperat heros,

Cui primum sacri largita est semina pomi,

Quam mortale genus ficum vocat: illius ergo

Muneris, aeterno hic Phytali gens floret honore.

Athenæus verò Græcorum commenta luculenter complexus, hæc de ficu tradit. Sosibius Lacon Libero patri ficus inuentionem tribuit, & ob hoc Lacedæmonii Syctem Bacchum colunt. Naxii, vt Andrisus, & Agasthenes referunt, Liberum patrem vocari volunt Melichion, quod ficulnum fructum à dederit, Melichenq; iidem appellant. quare Liberum, vt vitis inuentorem, facie vitiginea, Melichium ficulna, Naxii excudebant. Poëta gigantem Sigeum nomine persequente Ioue, à tellure eius matre in Sycem, hoc est in ficum conuersum fabulantur: vnde in Cilicia vbi nomen fuit inditum Sica.

Phereni-

Pherenicus co
Oxylum verò
dem, cornu
nymphas. Ficu
primum repert
uere, quæ Ath
mela, quia prim
ctum inuentus
dentem non de
10 no vrantur, ne
Philippus Perse
ret, à Magneti
unrem postea
Ananias iamb
se Perlarum re
quæ imperio o
dorum rex Am
foit. Alexis cari
10 lianus item vede
cadibus glande
milium, & Saur
re Orpheo) Sat
fructus reperto
ga, apparatu ei
modi voluptatis
ricas, caryotides
ces anni dies à d
ipso ac comitio
riam eius, quæ
30 inuenta est lup
lo ex ære iuxta
gio illico arese
vrbis anno 26
chrum subue
Quia pecu
nos crebrior
vires omittere
sed de iis tant
subnectentes
40 cepta refert.
villissima, Her

Pherenicus commemorat Oxylum ex Hamadryade Sycen filiam suscepisse. Oxylum verò Orio patente natum sororis amplexu gennisse nucem iuglandem, cornum, populum, vlmum, vitem, ficum, & has Hamadryadas vocari nymphas. Ficus purioris vitæ mitiorisq; principium fuit, hinc locum, in quo primum reperta emicuit, Athenienses *τερεν πυκνόν*, id est sacram ficum appellauere, quæ Athenis via vocabatur, quæ ducit ad Eleusinem, eiusq; fructus *ήμεται*, quia primus ab Atheniensibus, quasi ante alias fruges ad mansuetum victum inuentus fuit. Herodotus suis in historiis introducit virum regi persuadentem non debere contra viros expeditionem facere, qui inter alia, neq; vino vtantur, neque ficus, quibus vescantur, nec aliud quidpiam boni habeant. Philippus Persei pater (vt ex Polybij historiis habetur) dum Asiam percurreret, à Magnetibus in annona ficum pro victu accepit, quamobrem cum Myuntem postea debellasset, regionem Magnetibus ficuum causa donauit. Hinc Ananias iambographus auro pronunciauit ficus esse meliores. Pergratas fuisse Persarum regi caricas scribit Dion, etiam si apponi modo nō consueuissent, quæ imperio obnoxia ferret regio. Aristophanes nil ischadibus dulcius ait. Indorum rex Amirochates per epistolam ab Antiocho mitti sibi ischadas poposcit. Alexis caricas Athenarum cibum insignem vocauit. Hæc Athenæus. Ælianus item veterem, primumq; fuisse cibum Atheniensibus scribit, sicuti Arcadibus glandem, Tiryntiis *ἀχάδας*, Indis calamos, Carmanis palmas, Mæotis milium, & Sauromatis Persis cardamum, ac terminthum. Cyrenenses (autore Orpheo) Saturno sacrificantes ficis recentibus coronabantur, quod eius fructus repertorem credant. Artaxerxes Mnemon iunioris Cyri frater in fuga, apparatus eius direpto, cū caricis vesceretur, exclamauit inquit: cuiusmodi voluptatis expertem me regalis fecerat affluentia? Calendis Ianuarij caricas, caryotides, & mella tum deo, tum amicis largiri veteres solebant, vt dulces anni dies à dulcibus auspicarentur. Colitur (inquit Plinius) arbor in foro ipso ac comitio, Romæ nata, sacra fulguribus ibi conditis, magisq; ob memoriam eius, quæ nutrix Romuli, ac Remi conditoris, appellata: quoniam sub ea inuenta est lupa, infantibus præbens rumen (ita vocabant mammam) miraculo ex ære iuxta dicato, tanquam in comitium sponte transisset. Adacto nauigio illico arefcit, rursusq; cura sacerdotum seritur. Fuit & ante Saturni ædem urbis anno 260. sublata sacro à Vestalibus facta, cum Syluani & Idis simulacrum subuerteretur. Eadem fortuito satū viuūt in medio foro.

Quia peculiare sunt aliquæ ficuum vires in nostris corporibus, cū apud nos crebrior sit earum vsus, physicis consulentes, aliqua de iis pertractemus, vires omittendo, quæ ad medicinam pertinent, cū id nostri consilij non sit, sed de iis tantum, in quas facile inconsulti incidere possent: Athenæi verba subnectentes, is nanq; diphnosophy statum libro 3. veterum medicorum præcepta refert. Quod verò ficus omnium fructuum, qui ex ligno nascuntur, sit vilissima, Herodotus Lycius demonstrauit, qui bene nutriti pueros nuper na-

Alique ficum operationes in nostris corporibus.

ros ficus succo asseruit. Pherecrates, & qui Persas inducit: Si quis nostrum no-
 uam ficum aliquando viderit, puerorumq; oculis imposuerit, quasi non vulga-
 ris medicinæ vtilitatem conferet. Philotimus libro 3, de nutrimentis refert, fi-
 cus multas habere differentias, & ex generibus, temporibusq; vires sortiri, &
 vt vniuersum dicatur, musteas ficus, & adhuc humentes melius, & celerius re-
 liquis pomis excoqui, nec reliquum cibum impedire, quo minus conficiatur.
 Vim humorem conglutinandi, cogendiq; possidere, & internum quippiam
 retinere, quo citam, facilem, fusamq; reddat aluum, humorem non insulsum
 alicuius acrimoniam participē præbere, si cū sale sumantur, sed qui celeriter dis-
 cutiatur, argumento, quod & si magna vis earum ingeratur, paulò post inani-
 tio, vacuitasq; eximia sentitur, quod fieri nō posset, nisi celeriter dissoluta fa-
 tiscerent. ocyus reliquo cibo conficiuntur, nō modo quod maiorem copiam,
 quàm reliquæ frugis sumpritantes innoxie degimus: sed solito cibatu præsen-
 tata nullū nobis exhibent negotium, facileq; calori cedentes, reliquū cibum
 excoqui minimè verāt. vis glutinatoria & salulago manifeste in eis deprehen-
 ditur, quum & manus extergant, & dulcis sapor, indice lingua, sentiat. Quod
 autem aluum sine torminibus cieant, eamque lauigent, euidētius est, quàm
 vt probari desideret. Salsedinem quandam licet leuem respiciunt, ideo nitrosa
 vi pollere iam dictum est. Heraclides Tarentinus nō illepide in conuiuio qua-
 rit, an post ficorum esum aqua calida, vel frigida sit obicienda? qui calidā sua-
 dent præbendam, celeriter eam & abstergere, & eluere causantur, ideo est
 verisimile breuiter calida dissolui, quod calor facto partiū diuortio extenuet,
 & in angustias ducat, frigus contra cogat. Cæterum qui frigidā aquam iubent
 præferendam, contendunt frigidi potius beneficio, quæ in stomacho reside-
 bant, gravitate quadā deturbari: Siquidem æstuantē stomachum ficus mole-
 stia afficiunt, & imbecilliorē reddunt, quare nonnulli secundum ficus merum
 præcipiunt offerendū, sic promptè recrementa ventris exigi. Sed crebriore, &
 largiore potu ab eo cibo vtendum non ambigitur, vt in ventre nō immoren-
 tur, sed ad imos intestinorū sinus rapiantur. Sunt qui ficus meridiano esu abdi-
 cent, tum enim, vt Pherecrates ait, morbū creant: quare Aristophanes cū æ-
 state agrotantem quendam conspexisset, meridiano ficuum esu præfagit. Eu-
 bolus nobis ciboficorū meridiano interdixit, morbū inde cōtrahi testatus. Da-
 monat item Nicophron inquit: ficus meridie sumentem statim febre corripi
 quæ vomitū flauæ bilis eliciat. Diphilus Siphnius memoriæ proditū reliquit,
 musteas ficos parua efficere alimoniam, noxiū creare humore, sed facile aluo
 excerni, cibis supernatare, verū meas melius siccis distrabi. Porrò quæ imminē-
 te iam hyeme gignuntur, magna difficultate maturescences euadunt deterio-
 res: meliores habentur, quæ solis vigorem expertæ, per naturā ematuruerint.
 Cæterum quæ multo turgent lacte, aut aquoso liquore madet, stomacho qui-
 dem gratiores, magis faciunt ad palatum, grauiiores tamen, ponderosioresque
 facilius descendunt. Studiosos vocis abstinere ficis Demetrius Sceptius iuber,

Hege-

Hegefiacis
 mus euserit,
 Sed quamqua
 rum vis, tanqua
 compositio illa
 ius inuenit in pe
 duabus nubi
 ditio salis grano
 rorefert apes è
 10 Sed afferam
 terum est tauro
 mobiles conq
 quam celerite
 causam demo
 stionis coquu
 & penè friabil
 bat Aristio, co
 re, quæ pensile
 halitumq; vhe
 20 que facit, quod
 bori mitescit, ta
 lassum deponit
 rus, imperet fu
 est, vt lignum
 rur, fumus quē
 deterget, purga
 si virentē lauc
 succo lac coeat
 calidā, acremq
 30 cōcoquat, sic
 carnes, aut pe
 quod frumen
 Sed alij sunt,
 ruræ miracu
 ritudini acco
 vitulus cōpr
 existimari ai
 ex fico capri
 & ex nigra ca
 40 tur, vt lauru
 caprifico fici

Hegeſianaſtis Alexandrini exemplo motus, quòd iſt tragœdiarum actor optimus euaserit, quia ſicu duodeuiginti annos abſtinuiſſet. Haſtenus Athenæus. Sed quamquam noſtri inſtituti non ſit, cogit me præſtans erga venena ficorum viſ, tanquam res maxima, remedium apponere. Nota iam eſt Mithridatiſ compoſitio illa tantopere ab omnibus celebrata, vt Plinius tradit. Cn. Pompeius inuenit in peculiari commentario ipſius manu compoſitionem antidoti è duabus nouis ficis, item ficis toridem, & rutæ foliis viginti ſimul tritis, addito ſaliſ grano, ieiuinoq; ſument nullum venenum nociturum illo die. Varro refert apes è fico mel capere, ſed non bonum.

- 10 Sed afferamus aliqua huius arboris prodigioſa naturæ miracula, quorum al-
 terum eſt tauros quantumlibet indomitos fico alligatos cicurari, & quaſi im-
 mobiles conqueſcere. Alterum, victimas earumq; animalium carnes per-
 quam celeriter tenereſcere, & fragiles effici, quæ in fico pependerit. Horum
 cauſam demonſtrat Plutarchus in ſympoſiacis dicens: Quæ inter obſonia Ari-
 ſtioniſ coquus immolatum Herculi gallinaceum gallum, recentem, tenerum,
 & penè friabilem obruliſſet, tam citam teneritudinem ſicui acceptam refere-
 bat Ariſtio, contendens iugulatas aues etiam præduras teneritatem cõtrabe-
 re, quæ penſiles adhæreſce ſicui. Cauſam affert Plutarchus: Nanq; quòd auram
 halitumq; vehementè, ac validum expirat ficus, viſus ſatis teſtatur. Fidem quo-
 20 que facit, quod vulgò de tauris dicitur: ferociſſimus quiſq; huic adligatus ar-
 bori miſeſcit, tangiq; manu, ac ſubigi tolerat, & eſſans iram, animumq; veluti
 laſſum deponit, tanta vi pollet ea ſpiritus acrimonia, vt ruat licet, ſæuiatq; tau-
 rus, imperet furori. Siquidem arboris ficus plus cæteris lacte copioſo prægnans
 eſt, vt lignum rami, pomum eo planè reſarciantur, quapropter cum comburi-
 tur, fumus què eructat maxime mordet & vellicat: lixiuſ quoq; cinis maxime
 deterget, purgatq;. Quin & cogitur caſeus ſiculneo lacte, quod emittit arbor,
 ſi virentè ſaucies corticem. Caterū caloris munere euenire volunt, vt iniecto
 ſucco lac coeat, qui humoris concrementū, & aquoſum liqueſciat, proinde
 calidā, acremq; auram, ac digerentè ficus exhalar, quæ carnes halitu deſiccet, ac
 30 cõcoquat, ſic vt friabiles reddantur. Hoc idè euenit, ſi tritici aceruo obruantur
 carnes, aut penitus immergantur, calore videlicet hoc præſtante, argumento,
 quod frumentū, in quo amphoravini fuerit obruta, cõfeſtim laticem depaſcit.
 Sed alij ſunt, qui hæc ad caprificū, non ad ficū referant. Aliud quoq; accedit na-
 turæ miraculū ab eodem traditū, quod ficus de cœlo nō tangitur, id vtiq; ama-
 ritudini acceptū referre oportet, tale genus quippe nō attingūt fulmina, quod
 vitulus cõprobat marinus, atq; hyæna. Theophræſtus ab aruſpicibus oſtenta
 exiſtimari ait, quæ fortuita mutatione fieri contingit, vt ex caprifico ficum, &
 ex fico caprificum, ſed de ſi o in caprificū deterius, vnamq; ex candida nigram,
 & ex nigra candidam, & pro oſtento etiam capi, cum arbor in arbore naſci-
 40 tur, vt laurus orta in platano, & quercu. Ex eo Plinius, Prodigio ſunt ex
 caprifico ficus, & contra graui oſtento, cum in deteriora mutantur, & ex can-

De prodigiosis ali-
 quot ficus
 naturam
 rabilibus.

noſtrum no-
 ſi non vulga-
 ris refert, ſi-
 res fortiri, &
 & celerius re-
 ſ conſiciatur,
 um quippiam
 non inuallum
 celeriter diſ-
 ſo poſt inani
 diſſoluta fa-
 tem copiam,
 ſuapra ſen-
 eliquū cibum
 eis deprehen-
 tiatur. Quod
 tius eſt, quam
 , ideo nitroſa
 oniuio qua-
 qui calidā ſua-
 20 ur, ideo eſt
 trio extenuet,
 quam iubent
 a: hoc reſide-
 ficus mole-
 ficus merum
 crebriore, &
 nō immoren-
 ano eſu abdi-
 panes cum æ-
 prælagit. Eu-
 teſtatur. Da-
 febre corrip-
 diuū reliquit,
 ſed facile aluo
 quæ imminē-
 duot deterio-
 ematurerint.
 tomacho qui-
 ero floresque
 40 ceptius iubet,
 Hege-

dida ficu in nigram. Sunt etiam prodigia cum alienis locis enascuntur, ut in capitis statuarum, vel aris, & cum in arboribus ipsis alienæ. Ficus in lauro nata est Cizici ante obsidionem.

Nomen.

Ratioposcit, ut de eius nomine dicamus. Græcis arbor *συκή*, fructus verò *συκόν* dicitur, de cuius nomenclatura apud eos existit controuersia. Nam alij ex gigante Sycaeo, alij ex Syce Oxyli filia, quæ omnia iam supra memorauimus, cum de eius inuentione verba fecimus. Sed tanta fuit apud antiquos ficus ueneratio, ut omnes eius partes, & fructus peculiaribus nominibus designauerint, ideoq; non iniucundum fore duximus, si eas Græcarum uocum studiosis apponeremus, cum in illius historia sæpe occurrant. Athenæus caprificum *ἐκπερικόν* vocat Homeri & Strattis autoritate, at Amerias grossos *ἐρμακας* appellari ait. Seleucus protericen fici genus quoddam scribit, quod præcoccem fructum fert; & Philemon maturam ficum *κόλυθρον* dici. Athenienses ficos maturitatis fallam speciem præferentes vocant *φίληκας*, hoc est phelecas, quia *φίληκα* dicuntur impostura, & deceptiones. Ficus antequam maturescant Græci iidem *ὀλωθους*, nos dicimus grossos, & si nomen sit etiam urbis in Thracia, à qua Demosthenis orationes Olynthiæ inscribuntur. Sed sunt inter Græcos, qui ita distinguant, ut primum sit *ὀλωθους*, mox *φίληκας*, inde *συκόν*, postremo *ἰχάρις*, & diminutiua forma *ἰχάριον*, id est caricula, *ἰχάριον* τὸ ἰχέον: quia ulterius augmentum fici prohibeatur autumnali tempore. plerique eo nomine aridas ficus intelligunt, è nostris nonnullos inuenias, qui aridas ficus caricas dicant, cum carica fici species sit, ut videbimus. *ἰχάρις* Iulius Pollux distinguit, ut alia recens, alia virens, item vetus, & sicca, itemque sale condita. Nouella ficus *συκάδες* dicuntur. Sed eius partes etiam peculiari nomine insignitæ sunt, ut *κράδα* eius surculi, *κεκραιμὸς* grana intus. Et auiculæ cum tam uvis, quàm ficubus pinguescant, à fico nomen indiderunt *συκελὶς*, id est ficedula, ut M. Varroni placet, non *ἀμπελὶς* ab uvis, quibus etiam pascitur. Ad quod alludit Martialis epist.

Cum me ficus alat, cum pascar dulcibus uvis,

Cur potius nomen non dedit una mihi?

Latini ficum à fecunditate vocant, M. Varrone & Quintiliano authoribus. *Itali fico.*

Descriptio.

Nunc verò arborē describamus. Theophrastus variis in locis ita depictam exponit. Arbor ficus statim ab radice simplici caudice brachiata ramis, surculosa, dissolutuque contumax assurgit, sed suæ exilitatis causa multifidam aliquando dimittere assolet. Corpore non magnopere procera, quanquam inter eas, quæ solum fructum progenerant, modo solum obtineat probum, vastum incrementum capiat, in altum se attollens, & ramoso admodum corpore, amplissimum locum occupet. Ligno contorto, carnosio, enerui, & enodi: Enodi, inquam, non quòd nodis omnino careat, talis enim arbor nulla videtur, sed ita enodem accipio volo, ut nodos paucos naturæ ordine habeat, etsi eius ramuli nuper oborti nodosi adeo sint, ut tactu asperi videantur, idq; quia breui

breui internodiorum diuortio sciunt si sunt, longe tamen quàm ea nodosior est caprificus. Medulla carnosa. Cortice simplici, & læui. Humore lacteo succo simili. Folio amplo, laciniato & (vt ita dixerim) cruciformi, quod cōstat neruo, cortice & carne. Serotina fici antequam fructū percoquant, folia deperdunt: at in Elephātino agro caduca nō sunt, tum cœli genio, tum humi præsidio, hæc enim vberem succū, qui sufficitur in consumpti locū, illud verò obsequens ad fouendum se præbet. Nouello furculo fructificat; aliquādo rei temeritate poma auersa ramulis affert, quod mirū videri nō debet, si alienis in locis fructuum eruptio fuerit: cōmutatio enim parua est, nec posterior hic locus à priori dissimilis admodū est, cum aggregatio imbecilla, & confluxus in eam validior sit. Præterea in ficuum genere species quædam est *ὀμίσκος*, id est quæ retro post frondem fert fructum, vnde illud, quod cum specie quadam naturale, & frequentissimum est, in altera eiusdē specie euenire, non ita mirum videri debet. Semina intus congeſta continet, atq; tunica contenta, sed incerta, & quæ præ nimio humore conculcantur. Cacumine, & latere germinat, paulo ante æquinoctium, ad ortū arcturi post ver: quod tempus etſi omnibus edomitis commune est, cōnuntius tamē fico. Non floret, sed protinus fructum ostendit. Ei datū est à natura, vt plura producat, & grossos deciduos, & ficus: & si pars maior fructuum acerba initio esse soleat, quia siccitatem sortita est. Humidorum omnium extrema esse putatur ficus, cuius succus lacteus existit. Fructus serò matureſcit, cum & putamine obtegatur, succū amplum, crassumq; obtineat, & summatim quodāmodo matureſcat, & ampliore mole constet. Sed celeriter perficitur, quia humidus, quia tenui amictu tectus est. Si arbor egregiè ramis, & frondibus luxuriabit, egregiè etiā vberes fructus promer, eius nanque talis natura priuata est: (reliquis enim omnibus ferè negatum, cum natura vtrumq; explere nequeat. Necesse est enim si in frōdibus materia abſumitur, quod debita pars fructibus intercipiatur, sic largiori fructus prouentu, minus germinationē frequentari:) quod & soli vbertate, & arboris robore euenit, id enim attrahere valet, illud largius suppeditat alimentum. Velocia incrementa capit: Cuius ratio est, quia rara, humidaq; est: rariotibus enim, & humidioribus celeres fiunt augmenti progressus. Radice præcipua est, quippe si sedem nanciscatur expeditam, subire quantumuis facile & euagari potest, sed oblique, quod expedita faciliq; semita careat. Breui vita est, nam cito senescit, & contabescit, ratione nimix fortificationis: diuturni enim pensi solutione, maxima & potissima naturæ pars exhausta fatiscit. Idq; in animalium genere videre licet, in quibus excessus superfætationis citam affert senectutem, & mortem, quod inter congeneres euidentius patet. Rectè igitur contra Democritū, qui arbores, quæ proluxa, crassaq; radice nituntur, vitam obtinere breuiorē dixit. Nunc Plinij ficus descriptionē, quam ex Theophrasto exceperit, multisq; in locis disseminauit, afferemus. Ficus simplici caudice surgit à radice, frequentibus ramis. Cortice simplici, læui, & in senecta rugoso. Humor corticis lacteus, huic ad ca-

seos figurandos coaguli vis. Corpus totū ē carne: ideo finditur velocius, quā res
 frangitur. Folio amplissimo, quod in serotina cadit, antequam maturescat fru-
 ctus. Sed in Elephantino Thebaidis nulli cadit, ne vitibus quidem. Arboribus
 subest folio pomū, ut protegatur, excepta ficu, cui folium maximum, vmbro-
 sissimumque, & ideo super eo pomū, eidemque; serius nascitur folium, quā po-
 mum. Ex reliquo pomorū genere ficus amplissima est: quā dā est pyri magni-
 tudine æmula: admirabilis est pomi huiusce festinatio, vnius in cunctis ad ma-
 turitatem properantis arte natura. Ficus mollis omnibus tactus, maturis fru-
 menta intus, succus maturescētibus lactis inest, percoctis mellis. Senescunt in
 arbore, anusque; destillant gummi modo lachrymā, siccatūque. Succus ficui dul-
 cis, lacteusque; in capite, in corpore nō item. Ficus teguntur carne, & cute detra-
 hitur hæc virentibus ut putamen, in siccis eadem maxime placet. Non florer,
 protinus enim fructū flores gignunt. In ficis mirabiles sunt abortus, qui nun-
 quā maturescunt. Eis nullus odor. Æstivas germinationes à canis ortu & Ar-
 cturi omnibus arboribus cōmunes putant, sentiri autē maxime in fico: causam
 afferentes, quia in Thessalia, Macedoniaque; plurima tum ficus exeat. Maxime
 tamen in Ægypto apparet hæc ratio. Gignit ē lateribus ramorum, & cacumi-
 nibus. Breuissima eius est vita, exiis præcocius breuior, quā serotinis, & dul-
 cibus, quā acidis. Radix copiosa, flexuosaque. Quidam breuitate radicū celeri-
 ter senescere arbores putant: quod coarguit ficus, cuius radices longissime, &
 senectus ocyssima. Hippocrates ficus foliū coronopoeidē vocat, id est cornicis
 pedi similē. Plutarchus ficū non florere scribit, & fructū proferre, verū grossi
 in hac decidui floribus respondent. Præterea à veteribus Græcis foliū *ἑρίον* dici
 ex scabritie. Vnde obreius asperitatē anguilla piscis facile lubricus, eo cōuoluta
 possit cōtineri. Vnde adagiū *τὴν ἑρίον τὴν ἐχέλιον*, id est ficulneo folio anguillam.
 A Plutarcho in Symposio agitur quæstio, Quā fiat, ut arbor amarissima fru-
 ctū producat dulcē, ac pinguedinis multā: Cuius propositæ ratio illa esse non-
 nullis videtur: quod arboris dulcedo quantacumque; sit, in fructum secernatur,
 proinde quicquid reliquū fiat in ligno succi in amaritudinem degeneret. Id vel
 hepatis præcipuè argumento patet, quod ipsum dulcissimū est, sæculento, &
 bilioso in vnum locū sequestrato, ac quodammodo percolato. Inesse autem fi-
 cui bonitatem succi quam euchymiam vocant eo probant indicio, quoniā ad-
 nata illi ruta, dulcior euadat, ni diuersum magis astruat quispiam, ficum videli-
 cet, dum alimentū sibi conciliat, eximere quod acre, quodque; amarulentum est.
 M. Varro, quæ laxiora, ea & sæcundiora esse dicit, ut fœmina; itaque; ficus, ppter
 fœmineam molliorem ad erefcēdum prona est. Lactique; pro coagulo addunt de
 fici ramū do lac. Columella de lacte eidem habet. Cogitur plerumque; lac ficulneo
 lacte, quod emitit arbor, si eius virentem sancies corticem.

Genera.

Ficus multīs inter se discriminibus distare prodidit Theophrastus, ut alia
 maturē, alia serō a. modum maturescant. Præterea tot subiēre genera, (inquit
 Plinius) ut vel hoc foliū a stimanibus mutatam appareat esse vitam. Apud
 nos in-

nos infinita pro
 & temporis pro
 bile fere effe
 spectione, fycop
 paratione vulg
 conatus frustra
 banam mox ag
 poribus, quib
 piendum duxi
 ctationis exhib
 certoque temp
 dequas dicitur,
 genus ficus qu
 citur. A Colum

Plinius ex
 Sunt & præco
 Ex Chalcidicis
 nit. Apud Sien
 lemole à manus
 lam implent. H
 tudine differen
 notno genere
 rudimenta gen
 alia ficus pro d
 vnde ex annot
 phrastus de ma
 nis, quā nou
 Tot generū p
 litate cetera a
 cipemque; locu
 gnedine, suat
 strar viscera,
 hæc vocant
 mus inclina
 thenæus A
 extrāsinari
 bus. Plini
 quæstio est
 40 nent. Sed à C
 documentū

nos infinita propemodum sunt, inter se sapore, colore, forma, magnitudine, & temporis prouentu differentia, quibus antiqua nomina tribuere impossibile ferè esset. Nos continua omnium generum ficuum nostræ Campaniæ inspectione, sycophantarum consilio, antiquorum librorum lectione, ac comparatione vulgaria nomina apponere conati sumus, speramusq; nec nostros conatus frustratum iri. Primò ficum in urbanā, & syluestrem diuidemus. Urbanam mox aggrediemur, de syluestri postea dicturi. Urbanarū genera à temporibus, quibus maturantur fructus distinguemus, vnde à præcocibus incipiendum duximus, è quarum genere bifera sunt. Hæ principium nostræ tractationis exhibent. Theophrastus ficus biferas vocat, quæ bis eodem anno, certoque temporis tenore fructus proferre solent. Achaïs præcox ficus *æpæspæos* dicitur, quasi præcurrens: forte proterice quoque: nam & Seleucus ita genus ficus quoddam nominat, maturius fructus promens, vt ex Athenæo elicitur. A Columella appellantur bifera, & trifera flosculi. Et in suo hortulo,

Tunc præcox bifera descendit ab arbore ficus.

Plinius ex his, Ficus & præcoces habet, quas Athenis prodromos vocant. Sunt & præcoces bifera alba & nigra, cum melle, vindemiāq; maturescentes. Ex Chalcidicis quarundā trifero pronentu. Macrobius etiā biferarum meminit. Apud Siculos adhuc retinent nomen, nam *bifere* vocant. Neapolitani *vollemole* à manus vola, vt spero, quia magna sunt, suaq; magnitudine manus volam implent. Harum apud nos nonnulla sunt genera colore, figura, & magnitudine differentia. Hæc prima omnium maturantur, fructificantque ex annotino genere: scilicet prioris anni furculo. Martio enim mense prima ficus rudimenta generantur, maturāturq; Iunio cum melle: inde ex nouo germine alia ficus producuntur, Augusto, & Septembri maturescentes cum vindemia, vnde ex annotino, nonelloq; ficus fecerit germinem, quod annotauit Theophrastus de malis biferis loquens. Fructificant ex vtriusq; furculis tam annotinis, quàm nouellis, sic etiā caprificus, quæ maturat, ficusq; profert ex nouellis. Tot generū præstantissimum est, quod vulgò *fico gentile* dicimus, quasi nobilitate cetera antecedit, tamq; vilia, rusticaq; cum eo minime cōferenda, principemq; locum omnium sibi vendicat, albedine est decora, sapore insigni, pinguedine, suauitate, iucunditate, ac dulcedine. Cū hiascit, cādidissima demonstrat viscera, videturq; ex hoc fructu dicta nostra Campania felix. Siculi *fica Zanæ* vocant, vel africanas, & adhuc pristinum africanæ nomen retinent, ac animus inclinat has esse, dicere Africanas ficus Carthaginis excidio celebratas. Athenæus Africanā Romæ maximè laudari dicit. Cato eas nominat. M. Varro ex trāsinaris esse dicit. Columella præcipuè serendā duxit. Sic etiam Macrobius. Plinius hæc habet, De Africanis, quas multi præferunt cunctis, magna quæstio est: cū id genus in Africā nupetrime transtulerit, patriæ nomen obtinent. Sed à Catone appellata iam tum Africana, admonet & Africā, ad ingens documentū vso eo pomo. Nāq; perniciali odio Carthaginis flagrans, nepotūq;

securitatis anxius, cum clamaret in omni senatu Carthaginem delendam, attulit quodam die in curiā præcocem ex ea prouincia ficū, ostendensq; patribus, interrogo vos, inquit, quando hoc pomum demptum putatis ex arbore? cum inter omnes recens esse constaret. Atqui tertium, inquit, ante diem scitote decerptū Carthagine, tam prope à muris habemus hostem. Statimq; sumptum est tertium bellū Punicū, quo Carthago deleta est. Est inter præcoces à Theophrasto memorata Laconica riguis gaudens, & esse quam minimam dicit. Ex quo Plinius, In Laconico genere præcoces ficus maximæ sunt. Quod præceptorum maximo aduersari videtur, qui quam minimas esse dixit. Sed hanc controuersiam soluit Athenæus, qui Aristophanis versus transcribens ait.

*Omnes sero ficus, procul Laconica
Sit, hac mihi est inuisa, quod tyrannica,
Non esset illa parua ni plebem oderit.*

Sed paruam dixit, quia exigua eius est planta; cui multum prodest aquam habere propinquā. Leucophalia etiam à Theophrasto memoratur inter præcoces. Athenæus Leucophias vocat. Plinius inter præcoces Tiburtinam ponit. Primo prouenit porphyritis longissimo pediculo. Auguror nobis dictam *fico molengiana*, hæc enim è præcocibus est, colore inter nigrum, & rufum, vel ut lapis porphyritis purpurefcere, quo etiam colore mala insana nobis *molengiane* dicta proprie vestiuntur, corpore & pediculo longo est. Subdit Plinius. Comitatur eam è minimis, & vilissimis popularis dicta. Hæc Neapolitanis *fico migliarola* dicitur, nam & sequitur antedictam, & corpore est exiguo, sapore vili, grano intus frequenti, dum manditur sub dentibus crepitant grana miliacea, (ex quo nomen *migliarola*) coriumque adhæret palato, & manibus, ut vix auelli queat. Nisi præcox esset, vix voraretur, ad aucupium potius, quam ad escam feritur.

Temporaria ficus.

Quæ sine nota præcocitatis, vel tarditatis temporis ficus ab antiquis memorata fuerunt, in hunc locum congeffimus. Charition, & Aration genus à Theophrasto nuncupari secundo historiarū libro memorat Athenæus, quod nusquam legitur. Plinius Aratiæ albæ meminit, pediculo minimo latissimæ. Idem Athenæus Atticam ficum Anriphanem laudare scribit: dicens regionem Hipponicam omnium totius orbis terrarum ficuum præstāissimas producere, nec licere cuiquam ex agro Atheniensi ficus caricæ ibi natas asportare, ut foli incolæ fruerentur. Carica ibi confecta erat Athenarum in signe, Dionis, & Alexis testimonio. Præterea Callistrutiæ, quæ Romæ nascuntur, alias totius orbis ficus antecellunt. Columella has inter præcipuè ferendas censet. In hortulo verò,

Et Callistrutiæ, roseo qua semine rident.

Latini passarias vocant. Nam apud Græcos *passarion* passer est. Refert Capitolinus Clodium Albinum quingentas ficus passarias ieiunum comedisse. Plinius

V
nitus parum sap
dicis, & mam
digitelle sunt,
renda, ut Colu
rum sit Clodiu
nascuntur, ma
ficuum in Itali
Romanos chia
nig; saporem p
Ch

Et alibi,

Chalcidic
simam. M. V
cam fuisse. C
dicam dicit. F
rum plura gen
Romæ nascen
10 cat. In hortulo
S
Delydia ha
scuntur, has m
quod nomen
tum ab omnib
ro, à cicurum
mella inter lau

Plinius lydi
30 puto Neapoli
maturefcunt
Catis popul
Matrica
foli varietat
nis, & depre
arbores sap
arbutus, & c
cipiens, arb
bus etiam on
40 & quercus, i
iam verba tra

nus parum sapore præstantiores iis, quas supra dixerat, scilicet Lydiis, chalcidicis, & mammillanis dixit. suspicor in Plinii textu mendum. Hæc nobis *fico digitelle* sunt, præstantissimo sapore inter cæteras, vt Athenæus, præcipue ferenda, vt Columella, ridens hiat roseo semine, oblongo pediculo, vt non mirum sit Clodium quingentas comedisse. Chiam inter eas ficus, quæ Romæ nascuntur, maxime laudari scribit Athenæus. M. Varro transmarina genera ficuum in Italiam perlata esse, vt chia. Plinius, Ex aliis gentibus transisse ad Romanos chias. Quarum plura genera. Hæc ficus in Setinis agris, ob salis, vniq; saporem præstantissima erat. Vnde Martialis,

*Chia seni similis Baccho quam Setia misit.
Ipsa merum secum portat, & ipsa salem.*

Et alibi,

Nam mihi, quæ nouit pingere Chia sapit.

Chalcidicam dicit etiam Athenæus ex iis, quæ Romæ nascuntur laudatissimam. M. Varro inter transmarina semina, quæ in Italiam venere, chalcidicam fuisse. Columella præcipue ferendam esse chalcidicam. Macrobius Chalcidicam dicit. Plinius, Ex aliis gentibus ad Romanos trāsire ex Chalcide, quarum plura genera, ex iis quædam trifero prouentu. Libyanam Athenæus è Romæ nascentibus laudatissimam dicit. Idem ait Columella, & Libycam vocat. In hortulo etiam,

Scissalibisca simul.

Delydia hæc habet Athenæus. Archilochus de his, quæ in Paro insula nascuntur, has mire celebratas scribit, easdemque esse, quas hæmonias dicunt, quod nomen ab innato colore adsciuerunt, ac egregias esse. quæ ficus tantum ab omnibus, quæ vbiq; nascuntur differunt, quantum apri syluestris caro, à cicurum suum carnibus. M. Varro inter transmarinas numerat. Columella inter laudatas, suoq; in hortulo,

Et picto quoque lydia tergo.

Plinius lydias purpureas esse scribit. Meminit earundem Macrobius. Has puto Neapolitico *pente* dici. Nigra est, vel si maui sanguineo colore infecta, maturefcentibus finditur putamen, vt affabre picta videatur. Celebratur à Cariis populis apud Lydos.

Mariscam ficum Cato in loco cretoso, & aperto vult feri. M. Varro cum soli varietates scriberet, quæ summis in locis plantis eueniant, quæq; in planis, & depressis, ait, In montanis prolixiora nasci, & firmitiora quia frigida, vt arbores sappini, in planis, quæ repidiora, populi, salices, sursum fertiliora, vt arbutus, & quercus, deorsum vt nuces græcæ, & mariscæ fici. Hæc Plinius excipiens, arborum fertilitati partium ascribit. Est verò, inquit, & ipsis arboribus etiam onustis fertilitatis differentia, summa sui parte fertilior est arbutus, & quercus, inferior iuglandes, fici mariscæ. Iudicent doctiores. Catonis etiam verba transcribens, addit: & ad annuos vsus aptissima. Hæc

grandiores, insipida, nimisq; pinguedine rumpuntur, ac maturescentes semina ostendunt. De his Martialis extat distichon,

Infanti melimela dato, fatuasq; mariscas.

Et alibi.

Non boletis hiare, non marisca

Ridere.

Id nomen à similitudine ad morbum transfertur, & ficus etiam dicitur. De quo Iuuenalis.

Sed podice leni

Caduntur tumida medico ridente marisca.

Videtur hæc Macrobio asinina dicta. Magna enim, ac vilia quæ sunt pomorum genera, asinina vulgò dicunt. Senecio hanc inter tot ficuum genera libentius comedeat, nempe is grandia solum appetebat, ut propterea sibi nomen grandioris acquisierit, Seneca authore. Nos hanc Neapoli *fico pallara* dicimus, vel si mauis *fico lardare*. Sapore insipido, magnitudine stolidi, ac multa pinguedine, ut laridi nomen sibi vendicavit. Soles passa ad servandum aptior, quam viridis ad escam. Græcis βάρυνος, Festo, & Macrobio authoribus dicitur: Nam Græci amplis rebus βε syllabam præponunt. Subdit Plinius, Et quas arundinum foliis macula variat. Ego potius legerem sine coniunctione, & sed mariscis ficubus subiungerem: quas arundinum foliis macula variat. Nam huiusmodi ficorum fructus colore sunt similes arundinum foliis. Vel si mauis separatam esse ficum, apud nos est *fico stella* vulgò dicta, à pediculo ad umbilicum striis, veluti teniolis depicta, ut stella videatur. Striæ albæ sunt, corporis color arundinum folii. Apud nos ob picturæ præstantiam potius, quam ob saporem feritur. Macrobius hanc, vel illam arundineam vocat. Alexandrina è nigris est candicante rima, cognomine delicata: inquit Plinius. Hæc nobis *albanera* vulgò est. Nam & nigro corio est, & cum hiat, albet, saporis nimium delicati. Apud plerosq; præstantissima habetur, fortasse hæc fuerit, cuius Cato, & Macrobius meminere, atra pediculo longo, quæ crasso, & stercoreato loco feri auct, ea nigra, & oblongo pediculo est, & præ cæteris humidis, crassisque locis feri auct. Cato herculanas, saguntinas, telanas in loco crasso, & stercoreato feri iubet. Macrobius herculaneâ, tellanam memorat. Plinius herculanam solum. Quibus quum alias notas non addiderint, quæ fuerint penitus ignoramus. Phibaleæ ficus meminit Athenæus, ac Pherecratem scribere, æstare phibaleis ficubus vesci debere, ac Teleclidem, pulcherrimas esse phibaleas, & ex Androtionis sententia in planitie plantandas esse. Sunt enim phibaleæ Hippocrati. Memorat etiam basilicas, & sycobasilicas, quasi regias ficus dicas, & à Palemone descriptas, & oporobasilicas, quæ ubiq; plantari possunt. Hæc nobis est vulgò dicta *fico Imperiale*, extrema superficie alba, Augusto maturescens, sapore, specie, & magnitudine singulari, ut non immerito regia nomen adpta sit. Idem præterea coracem ficum Hermippum commendasse, ac phibaleis

10

20

30

40

leis

leis æquipara
ne dicitur, qu
antiquum rect
stoque mature
sarcelaphia, la
lonia: sic & co
phrygiis ficub
der Thyatiren
scriptor, quar
10 præcipue lere
nigra est. Ath
tur scribit, &
Vatro Sabina
stare ficus sit
re tradidit. P
vltus aptissim
meminit hoc

Plinius albi
10 scens colore al
cus id habet pr
tur lunio cū bi
tasse quod alb
poritur, nam b
gusto. Palus i
numidicâ, & p
ctat velimus,
Cauneas (p
vipote egregi
30 mella in lypo

Plinius, P
ex hoc gene
cere M. Cr
è Syria int
Cesaris tem
Cum enim i
Cauno adu
40 ret, ne iret. C
cantechelido

leis æquiparasse scripsit. Hæc coronea à Strabone, vel corarium ab Aristophane dicitur, quod eius fructus corui colore sit, quem coraceum vocant. Adhuc antiquum retinet nomen, nobis dicta *fico corbo*, ab insigni nigredine, Augustoque maturefcit. Memorantur etiam ab Athenæo cirrhocaladiæ, hyladiæ, farcelaphiæ, lapyriæ, picridiæ, dracontæ, melanophiæ, cremiæ, myleæ, ascaloniæ: sic & coluræ, phomyriæ, & megarenfes, quibus prodest aquatio. De phrygiis ficibus meminit Alexis, de toxaliis Heracleon Ephesius, & Nican- der Thyatireus. Hæc omnia memorat Athenæus, ficorum historiæ diligens scriptor, quarum notæ, & descriptiones simul cum vetustate perire. Sullas præcipue ferendas monet Columella, sic topias, & rhodias. Plinius, Rhodia nigra est. Athenæus de ficibus Lynceum meminisse, quæ in Rhodo nascun- tur scribit, & cum optimis confert Atticis, & eiusdem naturæ cum tralianis. Varro Sabinam ficum, ait, quanto citius promas, iucundiore vtare, quod vetu- state ficus sit pallidior. Plinius mammillanas ficus earum similitudinem habe- re tradidit. Pompeias ex authoris nomine dictas, sole siccandas, & in annuos vsus aptissimas. Macrobio pompeianæ sunt. Columella in hortulo albiceratæ meminit hoc versu,

Albaq, quæ seruat flaua cognomina cere.

Plinius albiceratâ vocat. Hanc cenletem vulgò *fico ottata* dictam. mature- scens colore albo flauescenti insignitur, vt si eam pspexeris, cereâ dicas. Hæc fi- cus id habet propriû, vt præ ceteris prodromos ostendat hyeme, qui maturan- tur Iunio cû biferis, vt bifera dici possit. Macrobius adhuc albulâ nominat, for- tasse quòd albescenti colore insigniatur. Neapoli nascitur, pristinoq; nomine potitur, nam *bianchetta* vel *biancolella* dicitur, ex albo pallefcit, mitescitq; Au- gusto. Palusîa item, augustam, calphurnianâ, ludiam, leptoludiam, marficam, numidicâ, & pullam. Sed quia solum nomina, non signa apposuit, si eas conie- ctari velimus, non ita feliciter nobis, vt quamplurimis coniectura succederet.

Cauneas (Athenæo referente) Parmeno Bizantius laudat, ciuitatis Eolie, *Serotina* *ficus*. vtpote egregias. Ficus enim Cauni ciuitatis Cariæ ab omnibus laudari. Colu- mella in suo hortulo excellentia similes esse chalcidicis, & chiis dicit,

At grauis Arcturi sub sydere parturit arbor

Linia, chalcitis, & caunis amula chiis.

Plinius, Recentibus ficiis sale siccatis vice casei vesci nuper excogitatum est, ex hoc genere sunt costana, & caricæ, & quæ conscendenti nauim omen fe- cere M. Crasso, venales prædicantis voce cauneæ. Omnia hæc in Albenfe rus è Syria intulit L. Vitellius, cû legatus in ea prouincia esset, nouissimis Tiberii Cæsaris temporibus. Nec omittemus Ciceronis verba libro de diuinatione. Cû enim M. Crassus exercitû Brundisii imponeret, quidam in portu caricæ. Cauno aduectas vendês, cauneas clamitabat, sic monitus ab eo Crassus caue- ret, ne iret. Chelidonie fici mentione fecit Athenæus, inducens Epigenê vo- cantê chelidonias asperas. Androtiô verò ait chelidonias in planitie platandas

esse. Philemon verò chelidonias caricis vocari eas, quæ nigrae sunt, & rubicundas Erythro comelenas dictas. Columella in hort. Purpureæq; chelidonia.

Iulius Pollux chelidonias dicendo Atticas intelligit, quas Lacedæmonii chelidonias appellabant. Quidam à Chelidoniis Illyrici populis dictam volūt, in quorum frigidissima regione hyeme maturescat. Hæc nobis *fico asprina* dicitur, aspera enim corio & sapore est, & asperissima contra hyemis lauitiam. Hyeme maturescit multo tempore post foliorum casum. Duplex genus, alterū nigrum, alterum verò albū. Liuiam ficum in hortulo Columella memorat.

*At granis Arcturi sub sydere parturit arbor
Liua.*

Plinius, Sunt & authorum nomina iis, Liua, siccata hæc in annuos vsus aptissima. Macrobius Liuiam vocat. Nobis *fico Troiana* dicitur. Serotina est, sapore iucundo, ad siccandum inter cæteras aptissima. Serotinas à corio appellatas duro, Plinius dixit. Macrobius duricorias vocat. Plautus item,

Ficus nobis attulit duricorias.

Neapoli *cotinarole* dicuntur, serotinae sunt, & duro corio vestiuntur, quod Neapolitani *cotina* vocant. Coctanae ficus Martialis meminit,

*Hæc tibi, quæ torta venerunt condita meta,
Si maiora forent, coctana ficus erat.*

Et Iuuenalis,

— Quopruno, & coctana vento.

Statius,

Prunorum globus, atque coctanorum.

Omas Plinius Tarenti nasci prædulces ait. Caricis aliqui priuatum genus dicunt in Syria, Cariaue proueniens.

Cælum.

Et si ficus omnibus propè locis feri possit, ex Palladii sententia, tamen ut vberiores fructus, & meliores, ac arbores perennes sint, earum natalia loca designemus. Sub cælo maxime calido, ut in Ægypto, & tractibus illis, bona poma arbor nunquam producat. Theophrastus affert causam, Quia æstus perurit, ut concoctio minime fieri possit. Ita etiam in Assyria (Herodoto auctore) quæ in ferendis ficibus, & olea nequaquam de principatu ceter, cæterarum verò adeo ferax, ut singula ducenta reddat, trecenta etiam, ubi locus melior sit. Contra verò cælo maxime frigido ficeta fieri non posse contendit M. Varro. Idemq; confirmat Columella, frigidis regionibus ficos feri non debere, laudatq; apricum cælum, & temperatum, ad calorem potius vergens, quam frigiditatem. Ait M. Varro, Ficus quod densa materie non est, ideo sequitur calorem. Palladius scribit, Ficus in calidis locis natus pinguior esse, & siccitate durabiles, contra quæ in montanis, & frigidis nascuntur, quia minus latetis habent, ad siccitatem durare non posse; vsu illis in viridi esse, melioris magnitudinis, & saporis arguti. Ob id insulae, quia apricae sunt, ad calorem potius, quam ad frigiditatem vergentes ferendis ficibus idoneæ

magis

magis sunt. Hermippus apud Athenæum scribens quid quælibet regio generosum producat, ait:

Vuarum, passa Rhodo dantes & somnia grata

Ficus.

Cnidum Rhodi partem vuarum & ficuum abundantissimam scribit in Iconibus Philostratus. Plinius, Circa Bosphorum Cimmericum in Panticapeo urbe, teporis arbores abundant, ut fici laudatissimæ. Et in Hyrcania (ex Onesicriti auctoritate) multum nostris esse dulciores, fertilioresque, ut quæ modios

10 cœli x singula ferant, asserit. Et in Ebuso insula præstantissimas, amplissimasque, mox in Marrucinis. Et Scardona insula maris Adriatici Illyrico adiacens ficibus abundat. Sed cum fici genus multiplex sit, varioque inter se habitu distet, cœli differentiis ficuum qualitatibus obuiabimus, unde calidis, & æstuosis locis feremus serotinas ficos, Columellæ auctoritate, qui calidis locis hybernas feri præcipit ficos. Palladius item, Calidis & æstuosis locis eas feremus, quæ sero maturant. Sic frigidissimis locis præcoquas apponemus, ne importunus hyemis aduentus tenera ramusculorum cacumina comburat, idque superiorum auctoritate confirmabimus. Columella, Frigidis & aquosis locis præcoquas ponit, ut ante pluiam fructus deligas. Ex quo Palladius, In locis nimium frigidis præcoquas ficos seramus, quæ citò veniant, ut ante imbres genus hoc possit

11 10 sit occurrere. Theophrastus, In Ponto frigidissima regione fici multæ, & amplæ opacitatis habentur, bonæque; frugis ac vernæ, præterquam quæ serotinæ.

Theophrastus loca illis silentia conuenire scripsit ac campestria, solumque *Solum.*

solidum, ac siccum: quippe alimentum siccum, callosumque exoptant. Modice etiam ficus viginem attrahit, ratione suæ infirmitatis. Solum ut minus frugale sit necesse est, ne soli causa excessus vllus accedere possit, quapropter in insulis frequentiores videntur. Columella loca glareosa, calculosa, & interdum saxosa amare. Palladius verò, Genus terræ durum, & gracile, & siccum pro utiliori sapore pomorum. Prouenit & petrosis, atque asperis. Sic etiam soli qualitatibus cœlo obuiabimus, & id aptè illi coniungemus. Cœlo maximè calido, ficum humidis locis plantabimus, ut cœli æstus terræ humiditate compensetur:

30 Nam si calido sub cœlo siccis locis eam plantabimus, fructus antequam ad perfectam veniant maturitatem decident. Sic cœlo maximè frigido, humidoque in sicco solo feremus, nam si in humido feremus, arbores nimia frondium, & ramorum luxuria fructificationem absument. Theophrastus ait, Ficus in humidis locis putrefaciunt fructus, aut non bene maturant, cum fructus ipsi humidi sint. Didymus in pastinato solo, sed non admodum irriguo ficus plantari debere scribit: Siquidem aquarum copia genitiuam earum pulchritudinem, natiumque; decus tollit, opportunioreque; corruptioni reddit. Item Plinius, Ficus arbor ipsa riguis alitur, pomum verò eius marcescit. At si nos necessitas co-

40 git frigido solo plantare, orientem, vel occidentem versus feratur.

Ficum inter cæteras arbores, narrat Theophrastus, id præcipuum obtinere, *Satio ex san-*

mine.

R r

omnibus modis satā emergere, præterquam ramo. Sed à semine, prima arborum satione incipiamus. Seri semine posse idem affirmavit, sed omnino degenerare. Nam è ficario grano nullum genus, nisi caprificum, & ex candida nigram, & ex nigra candidam nasci. M. Varro in ficus satione, quia tarda ad crescendum, furculis potius utendum, quàm semine præcipit. Fici enim semen naturale intus in ea fico, quam edimus, quæ sunt minuta grana, è quibus parvis, quod enasci coliculi vix queunt: præter si aliter nequeas, ut si quādo quis trans mare semina mittere, aut inde petere vult, tum enim resticulas per ficos, quas edimus, maturas perferunt, & eas cum inaruerint complicant, ac quod volunt mittunt, ubi obruta in seminario pariant, sic ficorum genera Chia, Chalcidica, Lydia, & Africana, cæteraq; peregrina in Italiam translata esse. Didymus ficariis granis pangi non illepide posse docet, hoc modo: Maceratas ficos resti obducas, siccitas frequenti imbre inspergas, complures exhibunt arbusculæ: ubi in hoc seminario nutriuieris, transplantas in scrobes.

*Ex viura
dice.*

Viuit radicem ferendi duo tempora statuunt Græci, autumnū, & ver. Theophrastus ver præfert, ne ei post autumnalē sationem hyems secuta intestinum succum pinguefaciendo, & coagulando officiat. Sed iuxta scyllam sata lætior conualescit, ocyus augetur, minusque vermibus infestatur, & ut summatim dicatur, Satum omne scylla appositum facilius germinat, & celerius increscit. Scrobes non altos exoptat, cum radices habeat, quæ in summo cohæreant, sed quantos natura exigat. Molestissima est tam viti, quàm cæteris, cum multa attrahat alimentū, & umbram faciat amplam. Positionem in plantatione minime obseruandā censent, nam si in contrariā partem verratur, fructum nō amittere, atq; ita scan silē fieri. In ea plantanda, faciendæ sunt intervalla maiora, quàm malo pyro, aut amygdalo, cum in altum extollatur, & ramo so corpore amplū occupet locum. Didymus duobus anni temporibus, scilicet vere, & autumnō ficū ferendam: vernam tamen sationē magis probat. quippe arbor omnium ferè tenerrima, & delicatissima gelicidia & glacies horret, ventosq; mirum in modum formidat, ne cum ruunt, aut sæuiant flatu rumpatur. Ego vero (inquit ipse) Iulio mense toto plantas disposui, rigans, & transferens, & poma mihi adolescentes peperere. Si viuit radicē quis deponat, scylla bulbos interiici oportet. Alij madefactam muria plantā collocant. Melius tamen siue plantulam, siue ramulos velis ferere, prius in bubulo fimo madefacere oportet. Sunt qui cum planta viuā calcem obruant, sic satam suo domino decoquere negant. Cassianus ait, Hybernīs, frigidissimis, & humidissimis locis, aut qui rigari possunt, usq; ad idus Iunij plantant, quum manifestum sit omnem plantam, priusquā in germina extuberet, plantationi aptā esse. Nam quæ germen emisit, amplius nasci nō potest, sola fico excepta. Præterea Florentinus scribit. In spatiis virum ficū plantari posse dicunt aliqui, sed non ita se habere experientia conuincitur, quapropter præstat ficus foris in ambitu circūplantare. Quintilij dicunt, Aprilis mense ficos, quæ radices egerunt, transferri è plantariis, etiā si iam germen

germen emitt
ra sua quampl
maxime cau
cūm pones, su
eis, veltibusq;
res quinq; digi
ligari. Colum
plos, patētesq;
brimense, tem
10 Planta in scrob
da est. Si loca
dantur à frigo
des ficosū per
prehendendi
bus frequens
suos per long
rio, & matur
prodesse cōfir
culis collocem
sto cæterisq; ue
la. Umbra fico
tum quidā è di
lio, magisq; pr
scylla (bulbor
vermibus obn
suas notas hab
tunc maxime
tia, & tantor
Florentinus
Te inquit, Cat
Cato pro
nascuntur, a
biennio po
iam monē
aptius dep
plurimas a
Didym
tur cum pe
fimbriato
40 Ficus se
adigente, y

germen emittant. E Latinis Cato ficos docet eximi bene cum radicibus cū terra sua quam plurima, circūligariq; vt ferri possint in alueo, aut in corbula. idq; maxime cauendū esse. nō effodi, aut feri, cum ventus fiet, aut imber. In scrobe cūm pones, summā terram subdi, postea radices operiri, pedibus, deinde fistulis, vectibusq; calcari quā optime poteris, idq; esse ei rei primū, arbores crassiores quinq; digitis quæ erunt, eas præcisas feri, obliniri fimo summas, & foliis alligari. Columella hæc docet, Eiusmodi arbor cito conualescit, si scrobes amplios, patētesq; feceris. Palladius verò, Calidis locis fici planta radicata Nouembri mense, temperatis Februario, frigidis melius Martio, vel Aprili ponēda est.

10 Planta in scrobe deposita lapides substernēdi sunt, ad radicē fimo terra miscēda est. Si loca frigida sunt, plantarū cacumina diuisis canna internodiis defendantur à frigore. Ego mēse Februario vltimo, vel Martio in Italia plantas grandes ficorū per pascuinum solū disposui, & eo anno poma peperēre supra comprehendendī felicitatē, velut tributa reddentes. Legendæ sunt planta, in quibus frequens nodus extuberat. Steriles creduntur, quæ nitida sunt, & oculos suos per longa internodia distulerāt. Si plantā ficus prius nutrueris in seminario, & maturā transferas in scrobē, poma generosiora producer. Aliqui multū prodesse cōfirmant, si plantā fici diuiso scyllæ bulbo interstitā, stricamq; vinculis colloceamus. Scrobes amat altas, interualla maiora. Plinius è Theophras-

to cæterisque, Ficus interualla paulo amplius, quā pyrus, malus, & amygdala. Vmbra ficorū leuis, quamuis sparsa, ideoq; inter vineas feri nō vetantur. Sicutum quidā è diuerso affectant permutantes in contrariū. Densiores ita fieri folio, magisq; protegere fructum, & minus amittere, & sic etiā scansilem fieri. Si scylla (bulborū hoc genus est) feratur, ocysime ferre traditur pomum, neque vermibus obnoxium: quo vitio non carent reliqua poma similiter sata. Ficus suas notas habet, cū folia pauca in cacumine acetabuli modo germinant, tunc maxime ferenda. Ficum etiam arbutis non sperni. Sed Plinius experientia, & tantorum virorum authoritati aduersatur. Theophrastus nanque, & Florentinus Græci, reliqui que agriculturæ scriptores, viti ficum molestam es-

30 se inquit, solus ipse inter vites feri nequaquam vetat.

Cato propagatione ficum feri posse docet. Pullos ab arbore abs terra, qui nascuntur, deprimendo, extollendoq; primorem partem, vt radicem capiat, ac biennio post effodiendo, & ferendo. Palladius ficus ramis posse propagari etiam monet. Nos verò ficus ramos circa terram vsq; ad medullam incidimus, vt aptius deprimi possint, deinde in latum scrobē ramulos propagamus, sic quā plurimas arbusculas ex vno ramo biennio nasciscemur.

Didymus auulsione ficum nasci confirmat. Plinius docet. Sed cū auellitur cum perna sua, partemq; aliquam è matris corpore quoque auferat secum fimbriato corpore.

40 Ficus feri etiā grandiori ramo docet Theophrastus, Malleo in humū illum adigente, vt exiguus supra terram relinquantur, deinde arena superiecta coope-

riatur, easque plantas meliores efficiunt, quandiu nouella extant. Sed ligno, veteriq; ramo exurgere non potest, cum enim partes media sicca, lignosaq; sint, difficile germinare possunt. Ex quibus verbis facile intelligi potest, ficum omnibus modis oriri apud Theophrastum, nisi ligno, veterique ramo. Sed libro historiarum secundo, modis omnibus praterquam ramo, & furculis quod supradictis aduersatur: videbimus enim paulo post, quomodo furculo quam optime exoriatur, vnde verbis eius mendum esse arbitror. pro ramo, & furculo, ibi reponendum, ligno, & veteri ramo. Plinius haec verba perperam est interpretatus: nam verba Theophrasti vertens, Ficus (dixit) omnibus aliis modis nascens, praterquam talea. Quod est falsum, nam vt inferius videbimus, ficus optime talea plantatur. Sed ad rem redeamus. Plinius de ramo haec vertit ex Theophrasto, Optime quidem, si vastiore ramo pali modo exacuto adigatur alte, exiguo super terram relicto capite, eoque ipso arena cooperto. Didymus, Si ramos melius velis ferere, prius in bubulo fimo made facito.

Ex talea.

Seri talea docet Palladius, Taleam sic ponemus, vt caetera, cui leuiter ab infima parte diuisa lapidem mergemus in fasso. Idq; vltimo Aprili, cum ei se viridior succus infuderit. Didymus etiam taleam plantari posse docuit. Sed si in altitudinem luxuriari nolis, clauam in caput ferito. Plinius talea exire non posse scribit, cui continua refragatur experientia; etiam multerculis nota: fictilibus enim vasculis de more plantant taleam, atque inuerso cacumine, vt pumiles semper ficorum plantulas habeant, fenestris asseruandas. Theophrastus addit, Lignum subtile scindendum, & lapide iniecto ferendum.

Ex furculo.

Surculis, siue summis ramulis facile posse pullulare monet Theophrastus. Quia ficus habet humorem ingentem, eundemq; seruare potest. Et humida superiori parte melius germinant. Habet enim ficus summa tenera, & humecta, vnde facile potest germinare. Et ita pronus est ad germinandum ramus ficulnus, talia principia germinandi obtinens, vt defixus, germen saepenumero emittat, quamquam pars ima nullis radicibus innitatur. M. Varro ait, Ficus propter molliciem foemineam ad crescendum prona: quare ex terra potius in seminariis furculos de ficeto expedit obruere. Vbi eas in seminario plantaueris, quomodo tuenda sint, docet. In seminario quae furculis confita, & eorum molliora erunt natura cacumina, vt ficus. Ea summa integra binis tabellis dextra ac sinistra deligatis, herbaq; elidenda, & dum tenera sunt vellenda, nam arida facta rixantur, & celerius rumpuntur, quam sequuntur. Columella huiusmodi sationem etiam docuit, inquiens: Potes iam (si te cura pomorum tangit) vltimis ordinibus in ea vinei fine, quae subiacer septem rionibus, ne cum increuerint, obumbrat, cacumina ficorum depangere, quae vel inferas interposito biennij spatio, vel si generosa sint, adulta transferas. Februario mense ficulnea cacumina iam tumentia vtilissime ponuntur. Octobri vero ficorum arbutula in seminariis putari, & ad singulos stylos redigi debet, quae tamē melius diu tenere possunt per germinationē pampinantur. Plinius modum operosus docet, In fico.

quidem

quidem dodrant
fuerint proxima
borum furculis
rariis aliquando
tempelue fati p
cos tertio anno t
fulcum ramum b
diuisa cacumina,
Aprili, cum ei se
obruuntur vtilit
abundat.

Attonfionis
minationem. Ra
celerius coalesci
mno, & circa
plagae obducunt
scit, & hyemis sup
magis viger, fruct
gaudet. Excitato
diunt, cum pulue
corari debere Lu
debere, & in vine
follione gaudere
cipue de auariis:
reris, & ea ration
verò, alios rubric
Fillo trunco pr
stus, cum siccifi
aliquot ante dies
um est. M. Varr
defecant, vt qui
in fico, & si qua
ficus etiam inser
vento austro, in
us ex eo, Antiqu
sicciora, & elu
ver tantum, Lu
ne vento austro
genere inferitur
Columella ficu
validum librum

quidem dodrantes paxilli solo patefacto feruntur, sic ut descendant, quæ fuerint proxima arbori, duo oculi extra terram emineant. Oculi autem in arborum furculis proprie vocantur, unde germinant. Hac de causa & in plantariis aliquando eodem anno ferunt, quos laturos fructus in arbore, cum tempestiue sati pręgnantes inchoatos conceptus aliubi pariunt. Ita satas ficos tertio anno transferre facile. Palladius ex eo, Si cacumen velis ponere, trifidum ramum bimum, vel trimum ab australi parte decidas, & sic obrues, ut diuisa cacumina, terra interiacente, velut tres furculos reddant. Idque ultimo Aprili, cum eise viridior succus infuderit. Martio mense ficulnea cacumina obruuntur vtiliter cum tumescunt, ut plantas faciant, si earum copia non abundat.

Attonfionis tempus ficum peculiare ver statuit Theophrastus ante germinationem. Ratio est, quod tempore illo vulnus facile in cicatricem coit, & celerius coalescit; quippe cum ficus rara sit concretionem, & imbecilla, autumno, & circa Vergilias maxime laborat; quia tempestas illa sicca est, nec plagæ obducuntur, unde arbor ingruente se humore in hiantes meatus putrescit, & hyemis superuentu vndique ei paratur pernicies. Cum rigatur germine magis viget, fructumque deteriore parit, præter Laconicam, quæ iugi rigatu gaudet. Excitato puluere magis adolescit, ac viret, ad quem usum ficos suffodiunt, cum puluerationis opere indigeant. Plinius ex Catone iubet ficos stercoreari debere Luna silente, sic etiam interpurgari. Sed Cato ficos interpretari debere, & in vinea altè succidi, ne eas vites scandant. Palladius verò assidue fossione gaudere scribit: per autumnum prodesse, si sterces admoneas, præcipue de auiariis: recidenda esse in fico, quæ aut putria, aut mala nata repereris, & ea ratione putanda, ut inclinata per latera expandi possit. Didymus verò, alios rubricam, alios cinerem radicibus adicere debere, inquit.

Fisso trunco protinus post sectionem inserendam ficum monet Theophrastus, cum siccissima sit: secus autem in vite fit, cuius natura adeo humida, ut aliquot antedies cadenda ad futuram insitionem, ex ea fluat, quod nimium est. M. Varro ita transfert è Græco: Vitem triduo antequam inserant, defecant, ut qui in ea nimius est humor, defluat, antequam inferatur: contra in fico, & si qua etiam horum natura aridiora, continuo. Sed circiter solstitium ficus etiam inferi solet. Cato inferi monet Luna silenti, post meridiem, sine vento austro, inter lignum & corticem, & per ver. Etiam emplastratur. Plinius ex eo, Antiqua inoculatio in ficis erat, & malis. Sed vitibus, ficisque media sicciora, & è summa parte conceptus, ideo illinc furculi petuntur. Ficus per ver tantum, Luna siccente, id est sicca inseritur. Præterea post meridiem, ac sine vento austro. Ficus recastinare minime vtile. Tilia ficum recipit, omniq; genere inseritur. Emplastratio crasso cortici maxime conuenit, sicut est ficus. Columella ficum inoculari optime posse docet, quia humidum succosum, & validum librum habet, nam & lactis plurimum mittit, & corticem robustum.

habet, optime itaque inferitur caprifici ramus. Aprili mense optime inferitur. Calendis Septembris ficorum arbores inoculantur. Idq; licet vel commodius facere superiore mense post idus Iulias, quo tempore etiam aliarum arborum nonnulli emplastrationem faciunt. Quomodo autem olea inferi possit, docerimus in Oliueto. Nunc ad Palladii placita veniamus. Aprili mense ficum debemus inferere inter corticē, vel si nouellæ arbores sunt, fisso ligno, quod statim operiendum est, & ligandum, ne ventus introeat. Melius comprehendūt, si circa terram recisa inferantur arbuta. Aliqui & Iunio mense inferunt. Sursculus legendus est anniculus, inutilis enim creditur maioris, vel minoris ætatis, Inoculari ficus locis siccis Aprili, humidis melius Iunio medio poterit, Octobri mense locis tepidis. Inferitur in caprifico, in moro, in platano, & oculis & surculis. Et fico inferitur morus. In versibus autem hæc habet,

Persuadet moris tetrum mutare colorem

Ficus, & inuasit dat sua iura comis.

Se quoque miratur pingui grandescere succo,

Et solitum gaudet vincere poma modum.

Insignes solius platanos, felicia mensis

Brachia gaudentes vitis honore comas.

Ingrediens pingui se cortice maxima ficus

Sernat, & optatos implet adeptæ sinus.

Leontius Græcus ficum moro, & platano inferendam suadet, non modo vere, sed æstate ad brumam vsque, Florentini autoritate. Quod Diophanes roborat. Et inferi Octobri mense, & Aprili, & inoculari post idus Iulias docet Cassianus.

Ars.

Vt ficus præcoces ædat fructus, Democritus columbaceum fimum, piper & oleum adhiberi vult. Florentinus grossos columbino fimo, & oleo linebat. Apud nos verò cum ficus iam maturescit, ligna acu oleo peruncta ficum oscilla transfigunt, vt per aliquot dies maturationem accelerent. Palladius, Vt cito ficus maturet, succo cæpæ longioris cū oleo & pipere mixto vnge poma, quando grossi incipiunt subrubere. Sed Plinius diuerso admodū ab his artificio, ita præcoces producit ficus. Sunt & hybernæ quibusdam provinciis sicuti Mæsiæ, sed artis non naturæ. Paruarum genus arborum post autumnū fimo contegunt, deprehensasq; in his hyemē grossos: quæ mitiore cælo refossæ cū arbore, atq; in lucem remissæ, nouos soles, aliosq; quàm quibus vixere, auidæ tanquam iterum natæ accipiunt; & cum venientiu flore maturescunt, alieno præcoces anno, in tractu vel gelidissimo. Apud nos autem, quæ per intempestiuum hyemis aduentum ficus poma immatura in arbore remansere, scæno, aut frondibus inuoluimus, ne ea frigus perurat, incipiēte vere se ostentari, nuda soli exponuntur, sic maturescunt alieno præcoces anno. Contra autem, si ficum, quamuis nō naturæ, seram facere vis, docet Columella. Cum grossuli maturi sunt, fructum decutito, iterum alterum ædet, qui in hyemem serā differt

matu-

maturitatem. Ex
gnitudinem excel
vtrq; Palladius,
cute, dum illis fab
effigiem delineat
culneum oculū, &
ficus exhibeat, ita
ontias viticulas, r
stringi, ac torquer
10 & humoris rigatu
se annexu congru
feat, qui bicolores
nea grana hac va
transferunt. Plin
um fame deuora
camine abiecto i
corticum rimas,
rios fructus vna fi
vinculo stringis a
10 rati, & humoribu
annexione congl
nitate diuidat, di
punicis. Nobis au
cet & nigre, per n
emplastrabis, sic d
aluo deiectionē m
thymalo tritū, tad
ma ventrē moueb
quod anidoto th
30 botes, & feracior
summa pdest an
ficus, rubricā am
res efficit vberio
Fici cū frōde
firmioresq; su
tum multum
cutimus, vel ill
De ficus lapt
sito primum di
40 ter cæteras ar
phrastus, cui au

maturitatem. Ex quo Plinius, Fici ferotinq̃ fiunt, si primæ grossi, cum fabæ magnitudinem excessere, detrahantur: subnascuntur, quæ serius maturescunt. Ex utroq; Palladius, Si vis maturâ ficum ferotinam facere, incipientes grossos decute, dum illis fabæ fuerit magnitudo. Democritus affirmat, si quis alterius rei effigiem delineare contendat, ea figura, quam voluerit referre, conscribat ficulneum oculū, & poma hac specie prodibunt insignita. Vt varios fructus vna ficus exhibeat, ita ut pomum altera parte nigrescat, altera candicer, iubet Leontius viticulas, ramulosq; ficuum, albæ videlicet, & nigræ, inter se vinculo distringi, ac torqueri, ita ut germina misceri cogantur, sic ut obruti, & sterco-
 10 & humoris rigatu adiuti, ubi prodire cœperint, germinâtes oculi aliquo inter se annexu conglutinentur, ut compactum germen in vnum caudicem coalescat, qui bicolores ficus pariet. Alii tutius huiusmodi coitum moliantur. Ficulnea grana hac varietate nobilia linteolo deligata serunt, & cum res postulabit, transferunt. Plinius hoc eodem modo à natura doceri ait, Semine raptim auium fame deuorato, solidiq; & alui tepore madido, cum fœcundo fimi medicamine abiecto in mollibus arborū lecticis, & ventis sæpe translatō in aliquas corticum rimas, vnde baccas simul vidimus discolorēs. Palladius. Vt etiam varios fructus vna ficus exhibeat, ramos duos nigræ & albæ arborum inter se ita vinculo stringis ac torques, ut germina miscere cogantur, sic obruti, & sterco-
 20 rati, & humoribus iuti, ubi prodire cœperint, germinantes oculos aliqua inter se annexione conglutinas. Tunc germen adnatū parturiet duos colores, quos vnitatem diuidat, diuisione cōiungat. Hoc eodē modo Theophrastus vtitur in punicis. Nobis autē tutius, & celerius licebit, si vtriusq; ficus oculos albæ videlicet & nigræ, per media germina diuisos, atq; vna cōpactos stricte arbori ficus emplastrabis, sic discolorēs fructus p̄ducet. Democritus docet, Si quis fici esu aluo deiectionē moliri cupiat, veratrum nigrum cum lactuca marina, id est, tithymalo tritū, radicibus arboris quæ deponitur adhibeat, & quæ nascetur poma ventrē mouebunt. Pollere idem affirmat aduersus ferarū morsus pomum, quod antidoto theriacē pubescens fuerit delibutū. Columella ut firmiores ar-
 30 bores, & feraciores sint, hæc tradit. Cū frondere cœperint cacumina fici, ferro summa, p̄dest amputare. Ac semper cōueniet, simulatq; folia agere cœperint ficus, rubricā amurca dilutā, & cum stercore humano ad radices infundere. Eares efficit vberiorē fructū & farctum fici pleniorē, ac meliorem. Plinius ab eo. Fici cū frōdere incipiunt, si cacumina rami cuiusq; detrahantur, fertiliores, firmioresq; fiunt. Ex his Palladius, Cum folia incipiunt producere fici, ut fructum multum, & pinguem ferant, in principio germinis cacumina summa decutimus, vel illud tantum cacumen, quod ex arboris medietate procedit.

De ficus lapsu maturitatem præueniente, ac de remedio à caprificis accersito primum dicemus. Græcis ἐκμαρμός dicitur, Latinis caprificatio. Ficum inter cæteras arbores maximē fructū amittere, antequā coquat, prodidit Theophrastus, cui auxiliū magnopere quaritur, vnde & caprificatio cōperta habet.

Morbi & remedia.
De fructu in casu.

tur. Nam ex pomis annexis culices egredientes corrodunt, & pernia reddunt ficuum cacumina. Regiones quoque ad fructuum iacturam differunt, quippe cum in Italia iacturam fieri negent; quam obrem caprificandi vsus terræ illius incolis nullus penitus est. Nec in aquiloniis, & macrofis locis, vt Phalisco Megarenfis agri, & partibus quibusdam agri Corinthii. Flatuum quoque conditio pari ratione referre videtur. Aquilonis, quàm Austrinis potius fructus decidunt, & si crebriores, vehementioresque fuere, maior iactura sequatur necesse est. Item natura ipsarum arborum refert. Præcoces enim amittunt, ferotinæ nequaquam, vt Laconica, & aliæ quædam. Quam obrem eas caprificari minime solent. Hæc igitur loci, generum, cœlique ratione discrimen accipiunt. Culices verò ficarii è pomis caprifici egrediuntur: ex putrescentibus enim eorum granis gignuntur, cuius indicium afferunt, quòd post quæ euolauerunt, grana ficubus nulla penitus insunt. Euolant magna ex parte pennam aut pedem relinquentes in pomo. Est vel alterum culicum genus centinæ vocatū, ociosum, quemadmodum fuci inter apes: & quos ex altero genere sua poma ingressos adspexerit, protinus necat: id verò suis motitur operculis. Laudantur caprifici potissimum nigra, ex locis orta saxosis, quòd permulta ista grana contineant. Noscuntur, quæ aptè culicibus emerferint, quòd rubra, & versicolores, & robustæ constant; contra, quæ minus aptè, alba, imbecillesque cernuntur. Apponuntur ficis, quæ scilicet eam operam desiderant, cum pluerit. Quin & polium culices gignit, cum copiosè fructificat. Et vltimi folliculis genus quoddam bestiolarum innascitur, quod cnipes appellant, qui cum in ficis gignuntur ficarios illos culices deuorant. Huius rei remedium caneros statuunt alligandos: in eos vertere sese culices inquirunt. Libro verò de causis hæc affert: Vt ficus non labantur fructus ante maturitatem, artis parata præsidia hæc erunt. Vt caprifici ferta ficuum ramis appendantur, vel caprificus in summo ficeti limine feratur, eas species obseruando, quæ fructibus ferendis cum ficuum speciebus conueniant: vt maturæ maturis, ferotinæ ferotinis, & quæ medio tempore fœtificant, mediis coniungantur: ita tamen, vt culices ad ficos secundo vento deferri queant. Cuius causas sic inuestigato. Cum enim caprifici fructus perfici nequeant, & putrescentibus illis genus aliquod animalis generare necesse sit, culices generat: sed cum indidem alimentum sibi parare nequeant, migrant ad id auidè, quod simile est. Omnibus enim cognatæ rei natura desiderium iniecit. Sic ad ficos aduolant, crebroque morfu osculorum labra aperientes, superfluum depascunt humorem, & subeuntibus auris iter patefaciunt, spirantiaque poma efficiunt. Sed macro solo, boreali, puluerulento, & temperato, vt modicum suppediret alimētum, caprificatio nulla est, desiccatur enim puluis. Plinius eadem à Theophrasto refert: Ficus sola ex omnium arborum fœtu maturitatis causa medicatur. Caprificus vocatur ficus, nunquam maturefcens, sed quod ipsa non habet aliis tribuens, quoniam est naturalis causarum transitus, atque è putrescentibus identidem generatur aliquid. Ergo culices parit

VI
rit: hi fraudati al
ficorum crebro,
trantes, iactus sol
bus apertis. Mox
fit & sponte. Ideo
volantes in ficus
gata inlicerentur
niam sponte areles
nec non ubi mult
10 que & pulueri vis
caprificatione ho
cum quadam fragi
ces nasci è grolli
intrus grana, qua
pede relicto aut
cant centrinæ, f
vilium. Interim
maxime nigra, &
catio ipsa post in
20 ant, quod euenit
quo caprificatio
cum suspendere,
cidat, & vt celeri
circa solstitium c
pifico, lino, vel
ne sit necesse per
desit, abrotani vi
arietina cornua o
turgescant
30 grossi, vel iore
pifici inferunt.
Accidit ei
fructus amitte
taque humore
eodem vitio,
posito. Postea
to ad arborem
petet, terram
bræ non sient
40 dicamenta qu
borum radice

rit: hi fraudati alimento in matre, putri cius tabe, ad cognatam volāt: morsuq;
ficorum crebro, hoc est auidiore pastu aperientes ora earum, atque ita pene-
trantes, intus solem primo secum inducunt, cerealesq; auras immitteunt fori-
bus apertis. Mox lacteum humorem, hoc est, infantiam pomi absumunt, quod
fit & sponte. Ideoq; ficetis caprificus permittitur ad rationē venti, vt flatus e-
uolantes in ficus ferat. Inde repertum, vt illatæ quoq; aliunde, & inter se colli-
gatæ iniicerentur fico: quod in mactio solo, & aquilonio nō desideratur, quo-
niam sponte arescunt loci situ, rimisq; eadē, quæ culicum opera, causa perficit:
nec non vbi multus puluis, quod euenit maxime frequenti via apposita. Nan-
que & pulueri vis siccandi, succumq; lactis absorbendi: quæ ratio puluere, &
caprificatione hoc quoq; præstat, ne decidant, absumpto humore tenero, &
cum quadā fragilitate ponderoso. Et alibi: Caprificatione maturata, in ea culi-
ces nasci è grossis manifestum est: quoniam cum euoluere, non inueniuntur
intus grana, quæ in eos versa apparet. Exeundi tanta est auiditas, vt pleriq; aut
pede relicto aut penna pariter erumpant. Est & aliud genus culicum, quos vo-
cant centrinas, fucis apum similes ignauia maliciaq; cum pernicie verorum, &
utilium. Interimunt enim illos, atq; ipsi moriuntur. Caprificorum laudantur
maxime nigra, & in petrosis, quoniam frumenta plurima habeant: caprifi-
catio ipsa post imbrem. In primis autem cauendum, ne ex remediis vitia fi-
ant, quod euenit nimia, aut intempestiua medicina. Columella tempus docet,
quo caprificatio fieri debeat, Augusto tempus est ficulneis arboribus caprifi-
cum suspendere. Quod quidam existimant iccirco fieri debere, ne fructus de-
cidat, & vt celerius ad maturitatem perueniat. Palladius autem, Mense Iunio
circa solstitium caprificandæ sunt arbores fici, id est, suspendendi grossi ex ca-
prifico, lino, velut serra pertusi. Aliqui inter ficarias caprifici arborem serunt,
ne sit necesse per singulas arbores pro remedio eadem poma suspendi. Si hoc
desit, abrotani virga suspēditur, aut callum, quod in vltimis foliis inuenitur, aut
arietina cornua circa arboris radices obruuntur, vel truncus arboris, quo loco
turget scarificandus est, quo possit humor effluere. Democritus ait, Caprifici
grossuli, vel intorta ex iis serra suspendantur, quapropter aliqui ramulum ca-
prifici inserunt, & quotannis hoc idem tentant.

Accidit etiam ficubus (dicit Theophrastus) vt aliæ ante, vel post pluias
fructus amittant, aliæ deteriores reddantur arbores, putrefactæ strangula-
tæq; humoris nimietate, aut contrā vltra modum exiccatæ penuria. Cato de
eodem vitio, Ficus vt grossos teneant, ablaqueato, postea stramenta circum-
ponito. Postea amurcā cum aqua commisceto æquas partes, & circumfodi-
to ad arborem maximam amphoram vnā commisti satis est. Et cum ver ap-
peret, terram adaggerato bene. Si ita feceris, & grossi non cadent, & fici sca-
bræ non fient, & multò feraciores erunt. Ex hoc loco Plinius, Cato & me-
dicamenta quædam componit, mensuræ quoq; distinctione, ad maiorum ar-
borum radices amphoram, ad minorum vnā amurcæ & aquæ portionem

æquam, ablaqueatis prius radicibus, paulatim affundi iubens, stramentis artea circumpositis. Præcipue veterem adaggerari terram radicibus: ita futurum, ut non decident grossi, maiorq; fecunditas nec scabra proveniat. Sucus inutilis ficorum turgido cortice incisuris in obliquū leuibus emittitur, ita fit, ne decident fructus. Etiam radices circumcidisse prodest luxuriantium ficorum, & circumcisis cinerem addidisse. Fici cum Vulcanalibus tonuit cadunt. Remedium est, ut antè stipula hordeacea artea stringantur. Grossos non decidere Africanus pollicetur, si circum ablaqueatam radicem quaternos salis sextarios inieceris, dein terræ obraas aggere. Democritus asserit fici arborem fructu iacturam non facere, cuius caudex mororum succo sit illius. Nec amittere velut egram pomū, quum marino fucoradix obducitur, aut si quadrantibus lunæ rubrica caudices oblinantur. Si Pleiadum emersu in excavatis scrobes quis pares aquæ, & insulsæ amurcæ portiones infundat circum caudices, arbor sui fructus tenax pomum non abiiciet. Vnde Palladius: Si fructus suos velut ægra proiciet: alii rubrica, aut amurca insulsa mista aqua arborem liniunt, vel cancrum fluuialem cum ramo rutæ suspendunt, vel algam marinam, vel fascem lupinorum, vel radici terebratæ cuneum figunt, vel securi arboris corium sæpe prosciunt.

De vermicatione.

Nunc ad alios morbos accedamus, & primo de vermibus, qui in ficibus gignuntur. Nam etsi communis arborum morbus vemiculatio sit, Theophrasto authore, omnino tamen in arbore ficus peculiaris est. Et vermium, qui ficorum proprii sunt, alii ex ipsis arboribus nascuntur, alios parit vermis, qui cerasites vocatur, omnes tamen in cerasitem abeunt. Stridulum animal, & exiguo sonitu constrepens. Hic in olea nascitur, & in fico parit, unde habet ficus & suos vermiculos, & illos quoque enurit, quos alienos receperit. Sed omnino, quæ lentisco inserta mandantur terræ, vermicationem non sentiunt, odoris, feruorisque causa. Præterea fici fructus etiam vermibus infestantur, & quoties hic morbus accedit, pereunt. Conducibile est cinerem ficuum apponi radicibus, arcer enim sua siccitate à radicibus tabem, & vermicationem. Plinius idem, quod Theophrastus: Maxime autem arborum vermicationem sentiunt fici. Eorumq; qui in ficis existunt, alii nascuntur ex ipsis, alios parit, qui vocatur cerasites, omnes tamen in cerasitem figurantur, sonumque edunt paruuli stridoris. Vexant & tineæ semina ficorum. Contra quas remedium, in eodem scrobe defodere Italicam lentiscum, in uersa parte, quæ fuerit à cacumine. Ficus asperguntur ruta, ne fiant verminosa, neve radices putrescant. Sed quomodo vermibus liberentur, cum viu radices plantamus, iam diximus. Si autem nati sunt in arbore, hoc remedium eos arcerous. Didymus, Calce latebris vermium, aut radicibus inspersa, necantur. Palladius alia affert remedia: Ne vermes patiat, ramum terebinthi, vel lentisci caleam, cum plantis fici cacumine ponemus in uerso. Vncinis arteis tollendi sunt vermes ex fico. Alii amurcam, alii veterem urinam ablaqueatis

queat radibus
tebris vermium

Gigni & culi
re, & hico, & co
ci. Plinius ex eo
glandibus, fico,
Diophanes cont
suspendunt, atq;
sunt, rubrica, but
10 racinum piscem
Cœlius Rhodigi
batur prius in ve
ut differret à rel
substituit. Sed
quippe se expe
iam ego compe
Boëtia derolas
Scabies, &

phrastus. Non
20 corum euenire
bibus nullo modo
humore proveni
nimia alimentu
am cohibere sol
tate succum per
Vergiliarum ex
ring, referet uel
quod ubiores
tasse subeunt,
30 sto hæc interp
lent cochleæ,
dines & locor
res fuere, per
ficum, si scab
qua diluta,
Theop
Vocant radi
rami, quosp
perbellè tran
40 que modis, A
tículos, hoc

queatis radicibus miscant. Alii bitumen, & oleum, aut solam calcem viuat la-
tebris vermium inspergunt.

Gigni & culices (Theophrastus scribit) in aliquibus arboribus, ut in robo- *Culices & formicae*
re, & fico, & consistere ex humore videntur corticibus subdito, gustu dul-
ci. Plinius ex eo interpretatur, Sunt & culicum genera aliquibus molesta, ut
glandibus, fico, qui videntur ex humore nasci, tunc dulci, subdito corticibus.
Diophanes contra formicas, Quidā piscem appellatum coracinum ex arbore
suspendunt, atq; sic formicas disperdunt. Palladius ab eo, Si formica molesta
sunt, rubrica, butyro, & pice liquida mista circa truncum debet induci. Alii co-
racinum piscem contra formicas in arbore suspendendū esse confirmant. Sed
Cœlius Rhodiginus variæ vir eruditionis Palladii locum ita corrigebat. Lege-
batur prius in veteri exemplari non coracinum piscem, sed coracinam picem,
ut differret à resina, quæ alba pix est, sic ex Græco Diophane coracinum piscē
substituit. Sed ego cum Rondeletio male commutatum locum existimarem,
quippe se expertum dixit, coracinum piscem formicas non arcere, quod et-
iam ego comperi experientia falsum. Plinius inter fortuita miracula refert, in
Boëtia derosas à locustis ficus iterum germinasse.

Scabies, & cochleæ adnasci solitæ ficorum peculiare sunt, scribit Theo- *Scabies & cochleæ*
phrastus. Non tamen id eis ubique accidit, sed his morbi quoque ratione lo-
corum euenire videntur, quemadmodum animalibus. Nam apud aliquos sca-
bies nullo modo molesta est, ut nec circa Æneam. Sed hūc morbum ex nimio
humore provenire Chelidemus est author. Cuius remedium esse potest, ut
nimia alimenti vbertas detrahatur, quemadmodum aliarum arborum luxuri-
am cohibere solemus, vnde cum ficus germinare incipit, putetur ne sua opaci-
tate succum percrasset. Sunt qui scabiem alia ratione fieri arbitrantur, idque
Vergiliarum exortu ex minoribus pluuiis initium capere, quæ ubi infede-
rint, referuescentes erumpunt ut pustulæ, id namq; imbre largiore non fit, eò
quod vberiores aquæ tum arboris sordes, tum seipsas eluunt, atq; etiam for-
tasse subeunt, vnumq; sunt intus cum naturali succo. Plinius ex Theophra-
sto hæc interpretatus est: Scabies communis omnibus est. Et quæ adnasci so-
lent cochleæ, peculiaria ficorum vitia; nec ubiq; Sunt enim quædam ægritu-
dines & locorum. Scabies gignitur roribus lentis post Vergilias. Nam si rario-
res fuere, perfundunt arborem, non scalpunt scabiem. Leontius Græcus ait:
ficum, si scabie afficitur, curari scylla iuxta eius radices plantata, aut rubrica a-
qua diluta, circa ipsius truncum oblita.

Theophrastus ait, Ficus maxime radicationem, & cradationem noscit. *Radicatio & cradatio*
Vocant radicationem, cum radices maridæ contabescunt: cradationem cum
rami, quos priuatim cradas in ficu vocant, vnde & morbo nomen. Plinius hæc
perbellè transfert. Ut homini nervorum cruciatus, sic & arbori, ac duobus æ-
que modis. Aut enim in pedes, hoc est, radices erumpit vis morbi, aut in ar-
ticulos, hoc est, cacuminum digitos, qui longissimè à toto corpore exeunt;

inascunt ergo, & sunt apud Græcos sua nomina utriq; vitio. Vndiq; primò dolor, mox & macies earum partium fragilis, postremo tabes, morbusq; non intrante succo, aut non perueniente: maximeq; id sentiunt ficī.

Vredo & tabes.

Sunt & affectiones quedam temporariæ (Theophrasto authore) aut aliàs per se euidentes, quæ & necare arbores solent: & præcipuè ficus iis infestatur, quas morbos non dixeris, sed tabes, & quod vredinem appellant. Ex flatibus eueniunt, qui exurere solent, ut in Chalcide Eubææ Olympias cum ante solstitium frigidus flauerit, aut post hyberna solstitia; arbores enim aridas reddit, ut ne sol quidem diu reddere ita possit. Hæc sæpe aliàs, & Archippo Athenis magistratu anno quadragesimo facta vehementissima proditur. Laborat maxime loca concaua, & inter valles, & fluminibus vicina, & quæ ab omni afflatu penitus silent. Plinius ita vertit: Quædam temporum causa, aut locorum non proprie dicuntur morbi, quoniam protinus necant, sicut tabes cum inuasit arborem, aut vredo: vel status alicuius regionis proprius, ut est in Apulia Atabulus, in Eubæa Olympias. Hic enim si flauerit circa brumam, frigore exurit arefaciens, ut nullis postea solibus possint recreari. Hoc genere conualles, & opposita fluminibus laborant, præcipueq; ficus.

Frigus & calor.

Sunt etiam morbi à Theophrasto descripti, qui aëris excessu eueniunt, frigoris, vel caloris, sed plures squalore pereunt, exugitur enim naturalis calor vi frigoris, qui simul cum humore expirat, & maxime arborum partes, quæ supra terram quasi præsidio nudata intereunt, quæ verò terra reguntur, eius obicis beneficio frigorū iniuriā arcant. Sed tanta est interdum frigoris immanitas, ut ne illa quidem partes ab iniuria liberæ sint. Quamobrem coloni, apud quos id euenit, his remediis occurrunt. Plantam modicis operiunt glebis, satisq; est partem obtegi ad totius tuitionem. Aliud est, ficus incrementa prohibere: quod fiet attonsiōe. ita nec multum distabunt à radice partes. Quidam summa capita operiunt, ut in Ponto, & Media, nam si à vertice noxa incipiat, eo seruato reliquæ partes seruabuntur.

Syderatio.

Plinius. Proprium syderationis est, ab ortu canis siccitatum vapor, cum insit, ac nouellæ arbores moriuntur, præcipuè ficus. Theophrastus etiam de syderatione tradiderit, oblitus est ficus, videtur tamen ad Plinii assertionem accedere.

Sterilitas.

Theophrastus si arbor fructus non fert, sed se totum in germīna vertit, partem caudicis infimam scindit, atq; lapidem interponit, ita fructificare posse asserit. Ficorumq; non solum radices amputari, verum etiam obducto cinere obstrui, ac passim caudicem scindi præcipit, sic copiosius fructū dari assermat. Quod euenit nimia humorum vbertate, alimentique copia. Palladius hoc remedio vitur: Cum ficus locis humectis sita fructus obrui saporis producit: huic circumcisis radicibus, aliquantus cinis affundi debet.

Scissio caudicis.

Ficus non solum caudicis scissionem tolerat, sed fissiōem sine vitæ detrimento patitur. Theophrastus asserit causam, Esse succi copiam, quæ sui substantia

stantia subuenit
sitæ partes coale
fico excepta

Circumablato
stus. Sed apud He
se proditum est.
tis operientes, ne
delam supra docu

Dicemus prim

tionem seruanda
nobis Africanus
morum modo in
& si quoq; nemo
modum constata
dum, sed potius
minus maturæ c
suis dependent
& in dolo vini p
contrahat acore

secta fuerant. R
bitam clausa, loc
coclusis, suspensa
tet. Verum uti an
rent integræ. Alij
tangent, dein ind
peripicuum pocu
to ita relinquunt,
rides seruati poss
intra viridem cu
secat, inclusis,
ficus recentes m
separatas reclud

At quomodo
to docet. Fici a
cocta vngito. E
ter se alligato,
facito. Sed ea, q
ris, oblitio plat
gine vindicari h
bunt, si tribus li
to ficibus ad m

stantia subuenit in defectu partis locum, & glutinosa qualitate, qua rursus dif-
fusa partes coalescere possint. Plinius ex eo: Intereunt pleraque & filia stirpe,
fico excepta.

Circumablato cortice tardius cæteris ficum interire prodidit Theophra-
stus. Sed apud Heracliam Trachianam ficum restitui, regerminareque potuif-
se proditum est. Medentur luto fouentes, arundinibus & id genus stramen-
tis operientes, ne frigore, vel aestu subarescant. Sed quam nos inuenimus me-
delam supra docuimus.

*Circūab-
latis cor-
ticis.*

Dicemus primo viridis quomodo seruetur, mox passa ad vetustatem. Ra-
tionem seruandarum ficuum recentium, non secus quam in propria parente
nobis Africanus explicuit: Ficus ubi maturitatem conceperint, reliquorum po-
morum modo in matre coherentes non immanent, sed caduca dilabuntur,
& si quoque nemo decusserit. Mastreas perinde quasi in parente seruari ad hunc
modum constat. Cum vinaria dolia operculantur, in nouum fictile non rotun-
dum, sed potius ex arbitrio quadratum, fundoque fultum, missæ recentes ficus
minus maturæ cum suis pediculis, umbilicisve, hoc est particula, qua arboribus
suis dependent lectæ, à se sic ut bene intercedat spatium secretæ recluduntur,
& in dolio vini pleno diligenter operculato natare permittuntur, & nisi vinum
contrahat acorem, tali habitu mansisse comperies, quali constabant, quum in-
iectæ fuerant. Recentes quoque seruari possunt singulæ intra viridem cucur-
bitam clausæ, loculis unicuique cauatis, & item spleniata, quæ secatur, tessera
coclusis, suspensa ea in umbrato loco cucurbita, ubi nec ignis, nec fumus inspi-
ret. Verum uti antea dictum est, legendæ cum petiolis, quippe quæ diutius du-
rent integræ. Alij sic in melle disponunt ficus, ut neque se inuicem, neque vas
tangant, dein indito operculo sinunt. Alij calicem vitreum, aut aliud quoduis
petipicuum poculū, super ficos leniter inuertunt, & obducto cera spiramen-
to ita relinquunt, sic manent immaridæ. Palladius ex his transcribit: Ficus vi-
rides seruari possunt, vel in melle ordinatæ ne se inuicem tangant, vel singulæ
intra viridem cucurbitam clausæ, locis unicuique cauatis, & item tessera, quæ
secatur, inclusis, suspensa ea cucurbita, ubi non sit ignis, vel fumus. Alij missas
ficus recentes minus maturas in nouo vase fictili lectas cum pediculis, & à se
separatas recludunt, & in dolio vini pleno vas natare permittunt.

Coditura.

At quomodo ficæ condantur, videamus quid doceant maiores nostri. Ca-
to docet: Fici aridæ si voles ut integræ sint, in vas fictile condito, id amurca de-
cocta vngito. Et si ramos ficulneos voles cum fructibus seruare, cum foliis in-
ter se alligato, fasciculos facito, eos in amurcam demittito, supra stet amurca
facito. Sed ea, quæ demissurus eris, sumito paulo acerbiora. Vas, quo condide-
ris, oblinito planè. Docet Paxamus aridas ficos, quas vocant ischadas, à putril-
agine vindicari hac ratione. Passæ sine villo cariosæ labis sensu integræ mane-
bunt, si tribus liquida pice imbutis vna in fictilis fundo collocetur, altera refer-
to ficibus ad medium vase, tertia faucibus iam completo superponatur. Plu-

rimo tempore sanæ, & à vitio intactæ comperiuntur, si in tegere, qualo, vel cratibus indicæ fici calefacto furno post exemptum panem propendiant, & in fictilem, & bene picatam fideliā cōdantur. Sed eas cum fundo, cui refides hærebant, eximere conuenit, & candente muria ex oleo in sole rigare, condituiasq; collito vase luto, noctem vnā roris imbre sub dio conspergi, demum in cellas deferri. Alij cratibus expandunt toto sole siccandas, & recipiunt nocte sub tectæ. Columella ita monet, Ficus neq; nimium vieta, neq; immatura legi debet, & in loco expandi, qui toto die solem accipiat. Pali quatuor pedibus inter se distantes figuntur, & perticis iugantur, deinde cannæ iugis superponuntur, vt duobus pedibus absint à terra, ne humorē, quem noctibus remittit humus, trahant, tunc ficus iniicitur, & crates carice textæ ex vtroque latere super terram planæ disponuntur, vt cum sol occiderit, erigantur, & inter se accliuēs inarescentem ficum à rore, & pluuia defendant. Cum aruerit, in orcas picatas meridiano tempore calentem ficum condere, & calcare oportebit, subiecto arido feniculo, & iterum vasis repletis superposito, quæ vasa confestim operculare, & oblinire conuenit, & in horreum siccissimum reponi, quo melius ficus perennet. Quidā lectis fici pediculos adimunt & in sole expandunt, cum paulum siccata sunt, antequam indurescant in labra fictilia congerunt, & pedibus proculcant, iisq; admiscunt torrefacta sesama, cum aniso, feniculo, & cymino in modū farinæ redacta. Hæc cum calauerint, & fici massam pulueri permiscuerint, modicas offas ficulneis foliis inuoluunt, ac religatas iunco reponunt in crates, inde cum peraruerunt, picatis vasis condunt. Nonnulli formam fici oreis non picatis includunt, & oblito vasa clibano torrefaciunt, quo humor excoquatur, sic in tabulatum reponunt, & cum exegerit vsus, testam comminuunt. Alij pinguißimam ficorum viridem eligunt, & diu sam digitis dilatant, ita sole arescunt, quas meridianis teporibus siccatas, cum calore solis emollitæ sunt, colligunt, & vt mos est Afris atque Hispanis, inter se compositas comprimunt in figuram stellarum, vel aliā redigentes, rursus sole assiccant, & in vasis recondunt. Plinius in foliis verbasci feminæ ficus omnino non putrescere ait. Honos laudatas seruati in capsis. At vbi copia adundat, implentur orcæ in Asia, cadi autem in Ruspina Africæ vrbē, panisq; simul, & obsonij vicem siccate implent, vtpote cum Cato cibaria ruris operariis iusta ceu lege sanciens, minui iubeat per fici maturitatem. Palladius verò ex Martiale dicit: Caricas per genera multa seruari, cū ratio vna sufficiat. Ergo hoc genere, quo Campania tota custodit, seruare debemus. In cratibus ficus expanditur vsq; ad meridiē, & adhuc mollis in qualū refunditur. Tunc calefacto furno ad panis coquendi modū, supposita tribus lapidibus ne ardeat qualis includitur, & clauso furno vbi discocta ficus fuerit, sicut est calida, interpositis foliis suis, in vas fictile cōditur bene picatum, densius pressa, & operculo diligenter obducitur. Si pluuiis abundantibus crates non possis expandere, sub tecto eas ita ponis, vt semipede erigantur à terra, & eas ad vicem solis cinis calidus subiectus vaporet, & sub.

V
& subinde ficus, si
tunc duplicata in
cus, & diuisas in
sub tecto. Pherec
Fici materies, q
re, rectis idonea. V
ficoque, item cui
fusa madefacta de
stant, quin & flam
remque vehemen
cōtraria causa fac
& densa. Plinius v
hit se protinus, cl
rum. Queritur et
rimum fumum f

SE offert mori
S principio sylu
gratia non solum
datis cum malis n
commemorabim
ces, oua parunt,
lis radiis, vel hypo
foliis velcuntur, q
cantes nent, se in
Vergiliarum exor
moriuntur, mori
scunt, ascitis aliis
resque relictis ou
30 quenti anno ren
tiola linea cōtex
Crispus, bis con
postea, osculat
affundere Heg
sua ætate mori
lues tanta gra
in discriminati
fabulatur, post

& subinde ficus, sicut est diuisa, vertatur, vt fizarum coria siccantur, & pulpæ tunc duplicatæ in cistellis feruentur, aut loculis. Alij maturas mediocriter ficus, & diuisas in cratibus expandunt toto sole siccandas, & recipiunt eas nocte sub tecta. Pherecrates Athenæi testimonio nigras caricas improbat.

Fici materies, quibus idonea sit, ex Theophrasto excipimus. Rara est corpore, testis idonea. Valida & in rectum protendens. Fico fumus acerrimus, caprificoque, item cuiusque; lactis cremor redundat, atque hæc ipsa tamen aqua infusa madefacta detracto cortice, mox siccata, minime omnium tædio illo infestant, quin & flammam quoque mollissimam reddunt, lixiuium quoque, cineremque vehementer asperissimum. Ignem excipere optimam ficum, & oleam contrariæ causæ faciunt. Ficus quia lenta, fungosaque; materies, olea quia pinguis, & densa. Plinius verò: Ficus scutis faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, clauditque suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferum. Queritur etiam à Plutarcho in symposio lignum fici crematum cur acerrimum fumum faciat, & eius cinis ad detergendum maxima vi præditus sit.

De moro. CAP. XVII.

SE offert morus, cum eius fructus intus ficus instar minuta grana cõtineat: Principiò syluis degens neglecta, nostra autem tempestate sericeï velleris gratia non solum in nostris villis eius arboris plantaria instituiamus, sed in viridariis cum malis medicis, & citriis vnà ferimus. Nos prius mirificum lanificium commemorabimus. Bestiola sunt, quas Græci seres appellant, Latini bombyces, oua pariunt, è quibus vere appetente chartæ, vel linteolo adhærētibus foliis radiis, vel hypocaufto, vel pectoris calore vermiculi excluduntur, qui mori foliis vescuntur, quo grandiores facti, vellus, quo turget vterus, pedibus explicantes nent, se inuoluunt, ac inuolucra conficiunt, idque quadraginta diebus à Vergiliarum exortu ad solstitium. Postquam suum nendi munus obierunt, moriuntur, mortui testacea tunica obducuntur, aliquot post diebus reuiuiscunt, ascitis alis in volucres papiliones vertuntur, hi assidue insidentes, coeuntesque relictis ouis, piscium ouis haud dissimilibus, quibus rediuiua proles sequenti anno renascatur, iterum moriuntur, ex inuolucris vellus netur, quo pretiosa linea cõtexitur. Mori arbor è Plinij ætate eximiam adamauit Passienus Crispus, bis consul, orator, Agrippæ matrimonio & Nerone priuigno clarior postea, osculari cõplectique eam solitus, non modo cubare sub ea, vinumque illi affundere. Hegesander (referente Athenæo) posteritatis memoriæ mandauit, sua ætate moros viginti annos non tulisse fructum, quo tempore articularia lues tanta grassabatur, vt non viros modo, sed & mulieres quoque, & spadones in discriminatim corripuisset. Mori fructus primitus tantum albos fuisse Poetæ fabulatur, postea Pyrami, & Tyfbes amantiū sanguine tinctos. Vnde Ouidius,

Arbor ibi nuncis uberrima pomis

Ardua morus erat, gelido contermina fonti,

Arborei factus aspergine cadis in atram

te, qualo, vel
pendeant, &
do, cui refides
rigare, condi-
pergi, demum
recipiunt no-
immatura le-
tuor pedibus
superponunt
remitte hu
elateres super
ter se acclues
horcas picatas
ebit, subiecto
nifestum oper-
quo melius si-
pandunt, cum
gerunt, & pe-
o, feniculo, &
massam pulue-
gas iunco re-
Nonnulli for-
refaciunt, quo
rit vsus, testam
diuisam digitis
um calore solis
er se composi-
sole assiccant,
nino non pu-
at, implentur
& obsonij vi-
ta ceu lege san-
iale dicit: Cari-
nere, quo Cam-
itur usque; ad me-
no ad panis co-
ducitur, & celu-
Folii suis, in vas
inter obducitur.
eas ita ponis, vt
ectus vaporet,
& sub.

*Vertuntur faciem, madefactâq; sanguine radix
Purpureo tingit pendentia mora colore.*

Nomen.

Græcis arbor *συγαμνία*, pomum *συγαμνον* dicitur. Alexandrinis *συγαμνος*, & Nicandro in Georgicis *μορεα*, Athenæo referente. Sed à Iulio Polluce ea tantum, quæ ex rubis nascuntur. Latinis arbor morus, fructus morum dicitur, à mora, ut quidam putant, quod omnium postrema germinet. Sunt tamen, qui à Græco nomen deriuent *μωρον*, quod nigrum significet. Itali *moroni*, & *celsi* vocant.

Forma.

Et si cum multæ sit notitiæ, nihil operosius demonstranda foret, tamen ne quæ ex veteribus, tum Græcis, tum Latinis accepimus desiderentur, ea in medium afferenda duximus. Theophrastus ita format: Moro flos vitiginei modo lanugineus, fructui toti, nec postremis tantum infidet; in mediis inculcatus, neque singulas partes ambit, fallens interdum propter lanuginem, ut concerni nequeat. Fructus ex humore, & carne constat, lauis, laxis, & præ arboris magnitudine pusillus. Succus vinosus. Prepropere suos fructus perficit, humoris obsequio, & fructus nuditate, cum omnium tenuissima cuticula amigciatur, facile solis impressiones transmittit, celeresq; progressus ad maturitatem facit. Mnestheus author est: Morigerminatio sera, maturatio cita, hæc propria imbecillitate, illa loci frigiditate. Diu enim vires colligit, inde virium collectarum impetu facto, tam celeres progressus ad germinationem facit, ut sonitum facere videatur. Fructus statim ab ortu candidus, mox rubeus, cum maturuerit, ater, sic succus primum acerbus, deinde acutus, tum dulcis: cum enim albescit, acerbus sapor sentitur, secundo rubescens, acutus, ultimo dulcis est: rubescens autem acutioris saporis est quam cum albescit, quia tunc ad maturitatem propius accedit, cum verò albescit, acerbus sapor, quia remotior est à dulcedine: qua de causa morum albescens siccus est, rubescens humectus, ceu iam succum, saporemq; suum adipisci cœperit. Particulatim fructificat, unde diutius durat. Et si serotino germine, nihil tardius, quam cetera folia deperdit. Plinius ex Theophrasto: Moris succus in carne vinosus, trini colores, candidus primo, mox rubeus, maturis niger, tingunt manus succo matura, 30
luunt acerba. Carne & succo constant, cartilagine, succo vinoso, & sanguineo. Et si nouissime germinat, cum primis folia dimittit. Serotino germinatu floret, maturatq; celeriter, nam nouissima vrbano germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Sed cum cœpit in tantum vniuersa germinatio erumpit, ut vna nocte peragat etiam cum strepitu. Unde datur finiti frigoris indicium, cum germinare videris morum, iniuriam postea frigoris timere nolito. Tardissime senescit, fructibus minime laborans. Hæc Plinius. Quin postrema omnium germinat, ideo gelu non patitur, ob id diuinus Vates, ut ostenderet Israeliticorum populorum arbores omnes esse gelu consumptas, dixit, Occidit moros eorum in pruina. Fructum mollem Æschinus 40
esse dixit, Athenæo authore, de Hectore loquens,

Erat

Erat

Trinicolores

Mor

Græc

Et Sophocles

Videb

Mor

Nos morum in

& vrbano nam

10 nominatum, & L

differe videntur

Tusculana. Albu

sed colore nigr

bus diffunditur

crefcit ampliore

eximia fecundi

opera exercent

humiditatis aud

& muros frangit

10 Palladius calic

temere in monti

quam, & precipu

re velit, meridi

alit, ad explendos

Palladius fabu

dere. Nos in diru

sa, serat sicco loc

vermibus ferice

nam & frondib

30 uabuntur luxur

Palladius mo

sci & semine po

rigati contiou

ctium vernu

scribit, Planta

nera, Februar

tera vmbri p

ribus plantar

quinoctium.

40 natas propag

Seritur (ut Be

Erat vir ille mollibus maturior moris.

Trini colores in mori fructibus ab eodem describuntur in Cressis.

*Moris & albis, & nigri succi simul
Granatur arbor, atq; pictis murice.*

Et Sophocles:

Videbis alba mora primum, postea

Mori rubescunt fructus, atque pinguntur.

Nos morum in duo genera partiemur: in albū, & nigrum, scilicet sylvestre, & urbanum: nam nigrum sylvestre genus videtur. Album veteribus Græcis in-
10 nominatum, & Latinis etiam præter Ovidium, nigri genera nullo alio modo
differre videntur, quàm pomi magnitudine. Romæ (Plinius ait) Ostiensis, &
Tusculana. Album in duo partiemur, in albū vulgare, & albū sapore & forma,
sed colore nigrum. Hoc genus non pridem Neapolim allatum. Album radici-
bus diffunditur longioribus. Ramis maxima petulantia distenduntur. Corpore
crescit ampliore, ac prociore. Folia læuiora, tenerioraq; citius senescens ob
eximiā fecunditatem. Ante villæ domus fores nos plantamus, ut dum rustica
opera exercent coloni, à solis æstu defendantur. Longè verò à cisternis, nam
humiditatis auida improbo reptatu per longam distantiam petit, & penetrat,
& muros frangit.

20 Palladius calida loca amare scripsit, vel maritima. Plinius plana diligere, nec
temere in montibus conspici. In temperatis etiam nascitur, in frigidis nequa-
quam, & præcipue alba, quæ montibus non nascitur. At si quis in frigidis fere-
re velit, meridiei saltem, vel orienti exponat. Brutius in suis maritimis multas
alit, ad explendos fronde bombyces.

Palladius sabulosa loca querere scribit. In topho, vel argilla vix cōprehen-
dere. Nos in dirutis ædibus serimus, quia cements gaudet. Si quis fructus cau-
sa, serat sicco loco, ita sapidiore fructus enascentur: Si verò frondis causa, pro
vermibus sericeis velleris depascendis, humidis locis, vel qui irrigari possunt,
nam & frondibus maioribus, læuioribus, delicatioribus, & quæ melius conser-
uabuntur luxuriabit, eisq; libentius vermes vescuntur.

30 Palladius mora semine nasci scripsit, sed poma, & virgulta degenerare. Na-
sci & semine poma Beritius Græcus tradidit, si granula delecta deponantur, sed
rigari continuo desiderant. Columella plantas ab Idibus Februarij ad equino-
ctium vernū recte feri debere. Ex quo Plinius, Seritur & viuiradice. Palladius
scribit, Plantam si robusta est transferes mense Octobri, vel Nouembri: si te-
nera, Februario & Martio. Scrobes desiderat altiores, intervalla maiora, ne al-
tera umbris prematur alterius. Morus amica est & vitis. Beritius duobus tēpo-
ribus plantari, autumno & vere. Plinius feri debere ab idibus Februarij in æ-
quinoctium. Propagationis usus apud nos præualet. Nam virgas humotenus
40 natas propagamus, ac post triennium à parente recidimus, & transferimus.
Seritur (ut Beritius est author) ramis ficulnorum modo terræ defixis. Quod

Didymus confirmat. Sed Plinius morum talea tantum feri ait, quoniam ramo eam feri prohibet religio fulgurum. Talea Didymus morā plantari posse scribit. Beritius præstare: si talea plantetur. Palladius feri taleis sesquipedalibus ait, ex utraque parte laeuigatis ac fimo oblitis, cum locum palo ante fecerimus, tum immergimus, ac tegimus cinere terris admisto, non amplius quàm quatuor digitis operimus. Seremus à medio Februario, & toto Martio: locis verò calidioribus Octobris postremo, vel Nouembris initio, sed verno maxime, die nono calendarum Aprilium. Beritius etiam à claua plantari dixit, & ramulis ficulnorum modo terræ defixis. Palladius cacuminibus feri posse docet. Sed visitata est apud nos satio cacuminibus à summo recisis. In vineis enim cum vi-

Cultus.

tres propagantur, virgas mori apponimus cum propaginibus simul, trium, vel quatuor pedum longitudine, vno super extante, post verò triennium, vel quadriennium vegetiores factas transferimus in moreta.

Institio.

Palladius assiduū humorem moris prodesse non credit, fossionibus latari, & stercoreari. Putrida in his, & arida post triennium putāda. Circa Octobris calendas ablaqueandas, & radicibus eius vini veteris recētissimas faeces infundendas. Beritius ait: Vegetior prouenit, ambiente solo sapius effosso: siquidem altis radicum tenus fossionibus latatur. Qui frondes carpunt pro vermibus debent à virgarum cacuminibus manus abstinere: nam si cunctis frondibus fuerit spoliata, & fructificationē intermittit, & inutiles fructus producit.

*Mutua quin etiam moris commercia ficius
Præstat, & oblatum robore germen alit.
Fraxinus huic anida confert sua membra sorori,
Et metuit fetus sparsa cruore nonos.
Proceras fagos, & poma hisuta virentis
Castanea, duris aspera mala comis
Inficiens, monstrat piceo nigrescere partus,
Et succo pascit turgida poma nonos.
Obsequitur moris blando terebinthus odore,
Et geminis veniunt munera mista bonis.*

Palladius feracē, lætiorēq; arborē mori fieri aliquos tradidisse scribit, si perforato hinc inde trūco, singulos cuneos inferamus terebinthi hinc, inde lēuisci.

Beritius

Beritius seruauit
tradidit.

Mnestor apud
reignaria soleant
nam potissimum
ideo furculas ex
culas liburnicis, &
flexu constant, ei
her: Morus ollea
lentitia sicca, sed
vetustate etiam
ferē hora diei sec

De

I Am poma, qu
de offigeris po
auspicabimur, tu
his maiores nost
demus, secundum
& duracina. Con
commemorabim
nere possit, prin
te, & temporis pr
triginta annos re
genere per scoru
corrupti, vt illa,
Dioscoridi p
que ait Galenus
nati, sed vramo
meniacis
Palladius maxi
minibus, quā
Florent post ar
Bononienfes,
Dioscoridi
nium florere
ces. Nos ira d
natis, & per an
ceras. Fructu
norū simili, cu
parum turgē

Beritius feruari diutius vitreo vase, suo vino demersa, & diligenter operta, *Cōditura.*
tradidit.

Mnestor apud Theophrastum calidā esse morum prodidit, quod ex ea face- *Materies.*
reignaria soleant. Spissa, simulque lenta est. Post cupressum, ac thuia-
nam potissimum arbitrantur, ac validā, atq; vetustate, loti modo, nigrescere,
ideo surculas ex ea, circosq; faciunt. Item nauibus tornacula: similiter & auri-
culas liburnicis, & testudines, atq; firmamenta. Materies utilis operibus, quæ
flexu constant, eiq; hac in re primatus datur. Plinius ex Theophrasto hæc ha-
beret: Morus ossæ tota est. Calida est, ut omnis, ex quibus signaria fiunt. Est ei
10 lentitia sicca, sed ponderosa. A cupresso proxime laudatur ad æternitatē, quæ
vetustate etiam nigrescit. Mirum, cortex in moro medicis succū quærentibus,
ferè hora diei secunda, lapide incussus manat, altius fractus siccus videtur.

De persicis, & primum de præcoci. CA P. XVIII.

IA m poma, quæ semina, vel grana intus continebant, exposuimus. Nunc
de ossigeris pomis, & primum de iis, quibus singula insunt ossa: & à persicis
auspicabimur, tum quia apud nos maximo sunt in honore, tum quia parum de
his maiores nostri tetigerunt. Nos persicorum genus in quatuor species diui-
demus, secundum Palladij sententiam, scilicet in præcocia, armeniaca, persica,
& duracina. Commodius enim, & clarius sub his generibus omnium species
20 commemorabimus, ut nil omittatur, quod ad horum historiam fructuū perti-
nere possit, principiumq; nostrum à præcocius erit, cum & fructus nobilitate,
& temporis prioritate antecedere debeant. Narrat Plinius præcocia intra
triginta annos reperta esse, & primo denariis singula venundata. Galenus ex
genere persicorum præcocia esse, & nonnihil ea superantia, nec in ventriculo
corrumpi, ut illa, nec acescere, & esse suauiora, ac stomacho gratiora.

Dioscoridi *μῆλα ἀρμενιὰ* dicuntur, atq; à Latinis *αργυρόνια* dici narrat. Idem- *Nomen.*
que ait Galenus ab eo mutuatus, tamen sua ætate non plus armeniaca nomi-
nari, sed utramque speciem sine villo discrimine *αργυρόνια* dici: at tamen ab ar-
meniacis *αργυρόνια* differre, & hæc illis multo esse præstantiora. Sed Plinius, &
30 Palladius maximam differentiam faciunt, reorq; magis Latinis de Latinis no-
minibus, quàm Grecis de Latinis differentibus fidem adhibendam. Plinius ait:
Florent post amygdalam armeniaca, & præcocia. Neapolitani *albergio* vocant,
Bononienses *umbiliaco*.

Dioscorides, persicorum forma, sed iis minora facit. Plinius: Primam om- *Forma.*
nium florere amygdalam, ab ea proximè armeniacam, dein tuberes, & præco-
ces. Nos ita describemus. Arbor non sanè procera. Foliis nigrae populi mucro-
natis, & per ambitum serratis, ternis, quinisve simul emergentibus. Flore albo
cerasi. Fructu persicorū forma, non autē magnitudine, nam longe minori, pru-
norū simili, cute itidem, & odore, sed præstantiori, os intra se cōcludit, utrinq;
40 parum turgens, in quo nucleus dulcis eadem forma clauditur. Floret Ianuario

cum amygdala, vel paulo post, maturefcit Maio, ante alios fugaces fructus. Rami nouelli colore croceo, albis punctulis distincti, fructus optimo sapore placent, innocenti gustu, vt impune agris concedantur.

Cœlum.

Cœlum exoptat calidum, & apricum, locumq; concauum, à ventis tutum, vt est Surrentina planities, & Sicilia insula, cæteris Italiae locis non tam frequens reperitur. Nam cito florescens, si hyemis sauitia non desierit, facile floribus à vento priuatur.

Solum.

Amat solutam terram, & teneram, vel humidam arenaceam, vt prunus, odit argillam.

Satio.

Seritur semine Ianuario, vel Februario locis frigidis, vel Octobri, & Nouembri calidis. Transplantatur post trienniu. Plantatur Octobri, vel Nouembri, aut Decembri prius, quam floreat, sed raro semine nascitur. Etiam à radicibus pullulat soboles, si qua est à radice planta: quia apud nos in prunum insita viuunt.

Cultus.

Ablaqueanda arbor, & fossionibus exhilaranda, siccis temporibus riganda. Si qui fuerint sicci rami, aut putridi tollendi, vt in prunis consueuimus.

Institio.

Palladius Ianuario mense locis temperatis pruno præcoqua inserit. Nos inserimus in se, in persicum, amygdalam, sed omnium maxime in prunum, cum quo maximam habere affinitatē videtur. Sed æstate melius inoculatur, quam Martio fisso ligno: etiam ad modum digitalis.

Arbor.

Vt maiora pomaproducta, in id pruni genus inserimus, quod à similitudine, & vtilitate, *cogliopecoro* Neapoli dicimus. Nam ad eius similitudinem fructum producit magnum.

De Armeniaco, persicorum specie. CAP. XIX.

NON ceteram persici speciem prosequemur, quæ post præcocia fructus affert: ideo post illius tractationem hanc aggrediemur. Hæc armeniaca dicitur. Galenus à persicis parum natura differre scripsit, immò non tam citò in ventriculo corrumpi, & si contrarium recentiores arguant.

Nomen.

Dioscorides *ἀρμενιάκος* vocat. Galenus verò armeniaca vocari desita, & præcocia, vel præcoqua dici. Democritus verò de interpretatione Græcorum vocabulorum ait, Armeniaca est præcocium. Hanc peregrinam esse vel ipso nomine cognoscitur. Latinis, vt Columella, & Plinio armeniaca. Palladio armeniaca dicitur. Itali *moniache*, corrupto ex armeniaca nomine. Neapolitani *chrisomela*, quasi chrysomala vocant, id est aurea mala, cum enim maturuerint aureo splendent colore. Alterum armeniacorum genus recentiores Græci *βερίκοκ* vocant. Neapolitani *bericocche* vocant, ab eis detorta nomenclatione.

Quædam.

Nos armeniacarum genus in duo partiemur, vnum *chrisomela* vocamus, alterum *bericocche*, inter se colore, odore, sapore, forma, & magnitudine differentiâ. Ex quo Matthioli error apparet, quia ea differre non putauit. Sunt enim bericocchia forma fructus rotundiori, colore cædidiore, carne magis friabili, inspidiori, viliori que. Caro ab osse non separatur, & intus amaram includunt.

V
dunt amygdalam
magnitudine su
dulci amygdala
rentino tractu la
la. Chrysomela
dulcem amygdala
includunt vnum
sandrine dicta su
dine differunt, vt
ra sunt, & os à car
Arbor armen
duriore, validior
vniuersum mag
præcocem, & al
Idem cœlum
niet, nisi quod, c
bus minus obno
Est apud nos
& siccitatibus irr
Martio mense po
dum, distantia vi
Ianuario men
cùm prima flores
tatis. Nos Ianuar
hendit. Iulio ver
mus: sic restituti
in sita coalescit, i
sit, vimq; subdit

30 SEQUUNT
ceterisq; v
quid velint. Pl
gulis tricen
fugacius. Long
quia pomi suc
mens sumi,
præuentia, tel
cibo sumpra, v
quid præsump
tum flore apes

sunt amygdalam. Sed inter bericoccia genus est vulgò dictum *bericocce* vero, magnitudine superat omne dictorum genus, sapore, & odore præstantissimo, dulci amygdala, vt præcocia iam prius dicta ferè nobilitate præcedat. In Surrentino tractu large proueniunt, & hæc genera priora sunt, quàm chrysomela. Chrysomelarum genus in plures species partiemur, aliæ nanq; amaram, aliæ dulcem amygdalam intus includunt. earum, quæ amaram intus amygdalam includunt vnum genus est maius, alterum minus, hæc Neapoli *chrisomele alessandrine* dictæ sunt. Quæ verò dulcem amygdalam habent, inter se magnitudine differunt, vt maior species, & minor sit. Hæc odore suauiori, coloratio-
 10 rasunt, & os à carne diuellitur.

Arbor armeniacarum nil à prædicta præcocium differt, nisi quod maior, *Descriptio.* durior, validiorq; est. Internodia furculorum maiora habet, longioraq; & in vniuersum magis rustica. Fructus magnitudine persicum æquat. Floret post præcocem, & ab ea fructus maturat, id est Maio.

Idem cælum, solumq; quod præcocius conuenire diximus, his conue- *Calumet solum.* nient, nisi quod, cum serius floreat, arborq; validior sit, cælorum variationibus minus obnoxia est, id eoq; magis fructifera.

Et si apud nos vulgo iactetur semine non nasci, tamen si diligenter seueris, *Satio.* & siccitatibus irrigaueris, optimè nascuntur, humido, pingui, ac soluto solo. Martio mense ponantur. Cum plantantur trunci altitudo octo, vel decem pedum, distantia viginti quatuor sit.

Ianuario mense armeniacæ arbor inseri potest, Columellæ auctoritate, *Institio.* cum prima floreat. Palladius, Armenia inseritur pruno Ianuario locis temperatis. Nos Ianuario inserimus in prunum fissò ligno, sed difficiliter comprehendit. Iulio verò, cum pruni arbor fructus suos maturat, in eam emplastramus: sic res tutius agitur. Item in persicum, & amygdalam. Vbi supra prunum inserta coalescit, in vastam crescit magnitudinem, vt vix homo completi possit, vimq; subditæ pruno præstat, vt ad maiorem crassitiem increseat.

De persicis, & duracinis. CAP. XX.

30 SEQVNTVR persica, quæ succedunt armeniacis. Hæc Theophrasto, scaterisq; vetustioribus Græcis incognita fuere, blaterent indocti quicquid velint. Plinius: Potum innocuum expetitur agris: Pretiumq; iam singulis tricenari nummi fuere, nullius maiore: quod miremur, quia non aliud fugacius. Longissima nanq; decerpro bidui mora est, cogitq; se venundari. Sed quia pomi succus, & caro facile corruptione sentiunt; suadet Galenus primis mensis sumi, sic enim celeriter descendit, sternunt aliis viam commodè præeuntia, reliqui cibi subsequentes lubrico meatu facile labuntur. Postremo cibo sumpta, vt moris est plerisq; in summo natantia corrumpuntur, vt quicquid præsumptum fuerit vñ secum in corruptionem trahant. Palladius ho-
 40 rum flore apes vesci notauit.

Nomen.

Dioscorides *περσικὰ μῆλα*, id est, persica mala vocat, itemq; Galenus. Cassianus vocat *πόδακινά*. Sic recentioribus Græcis Aetio, & Paulo. Nicandri scholiastes *πόδακινέα*, & *πόδακινή*. Putat Hermolaus *πόδακινά* dicta vernaculo Græcorum sermone, quod in Rhodo ad florem usq; peruenierit, quod primum ab Ægypto venienti fuerat hospitium, Plinii, quem sectatur, verbis confidens, cuius opinionem, cæterorumq; explodimus, capite de Persea: vel putat nomen inuersum à *δορῆμα*, quasi duracina, quod falsum est. Columella persicum vocauit, atq; ex Perside arborem fuisse, vel ipso nomine constare existimauit, & ad nos primum aduectam, vt testatur in hortulo.

*Quin etiam eiusdem gentis de nomine dicta
Exiguo properat miscere persica mala*

Sic Plinius, & Palladius. Itali *Pesco*, & *Persico*.

Forma.

Plinius hæc habet de persico: Color succi Persicis nullus, cum præsertim duracina succo abundant: sed quis vllum eius dixerit colorem? Odor est dilutus. Foris corpus, intus lignum, viriumq; cinctum fructu, cum fructus a libi muniatur vitio. Eorundemque trigemina natura est, corpus, deinde lignum, rursusque semen in ligno. Quadam statim à ligno recedunt, quædam adhærent: quorundam generi vtræque est natura, vt persicis, etenim duracinis adhæret corpus, à lignoq; auelli nequit, cum in cæteris faciliè separeretur. Poma rara in ramis, non inter se densa. Nos verò ita describemus. Arbor pumila potius, quàm procera, & si humidum solum nacta in altum excresecat. Folio amygdalaceo maiusculo. Flore subpunico. Pomum carne, & cute constat, extrinsecus molli lanugine conuestitum. Dura intus, rotunda, & scabra nuce, in quo nucleus, qualis est amygdalis, continetur. Radicibus imbecillibus, nec profundis. Citò crescit, & celerem senectam sentit.

Genera.

Huius arboris fructus species tam variæ, multæq; sunt, quæ tum institionis mixtura, tum cultus mangonio prouenerunt, vt eas omnes enumerare, & fastidientis, & multiplicata esset lectio. Nos verò, quæ insigniori discrimine diuersa videbuntur, solum apponemus, sumpta à tempore tractatione. Primo genus in duo diuidemus, in persicum, & duracinum. Incipiemus à persicis, quia tempore priora. Inter persica species est vna, quæ reliquas omnes antecedit, & ferè cum armeniæ concurrit, à reliquis speciebus admodum differens. Foris herbaceo viret colore rubescenti, odore plusquam iucundo, sapore suauis, vberi succo, vt per mandentium ora fluat. Neapolitani, quia cum festo Diui Ioannis maturatur, vocant vulgò *Persico di san Giovanni*. Caro ab osse non recedit. Sunt illius variæ species, sapore, colore, & magnitudine differentes. Sequuntur vulgaria persica astate, omnibus his caro ab osse auellitur. Carne alba, vel excolori, exucca, friabili, sapore insuauis, & sine odore. Has vulgò *Persiche* vocamus. Hæc sunt Plinio popularia dicta, nullo succo & colore, vt diximus, nobis exosa, ægris obnoxia. Hæc species à Plinio vocatur Gallica, & à Columella excepit in suo hortulo:

Tempe-

Tempo

Subeunt docti
ossa adharreant ca
pomumque inno
vt in hortulo,

Frigor

De his Martialis
institione recepisse

Viliam

N

Huius innume
ris colore albo, o
quuntur duracin
tur, ac manibus l
ritore, quæ omni
cognita fuere, q
bilibria etiam na

Palladius ait,
frondibus, & dur
dis verò, & maxim
id à nobis sepe val
ventorum turbine

Idem, qui supr
rentinus aquosus
pud nos humidis
irriguetis, facile v
plantam amat. T
iusmodi arbor, ac
ra esse constituta

Palladius e
ci ossa in pastina
ibi planta excre
verso, & non a
rò, quæ ponent
ra soluta in qu
sæpe seruauit.
Sed habitiores
feremus, parte
brumam per a
te brumam. B
longè statuen

Tempeſtina manent, quæ maxima Gallia donat.

Subeunt *dogeſſia* Græcis, Latinis duracina ex eo dicta, quodd pertinet ad acter ossa adhæreant carni. Nobis vulgo *percoche* dicta. His datur à Plinio palma, pomumque innocuum expetitur agris. Asiatica Columella, & eidem dicta, ut in hortulo,

Frigoribus pigro veniunt Asiatica foetu.

De his Martialis intellexit, qui cum videret præcoqua persica vilia esse, ac inſitione recepisse persica duracina, seriora, melioraq; cecinit,

Vilia maternis fueramus præcoqua ramis,

Nunc in adoptivis persica sola sumus.

Huius innumera sunt species, prima, quam vulgo poma nuncupamus, foris colore albo, odore fragrantissimo, sapore excellenti, succo vberissimo. Sequuntur duracina. Sunt & in duracinorum genere, quibus caro ab osse auellitur, ac manibus leuiter compressa sponte aperiuntur, nobis dicta *Percoche aperitore*, quæ omnibus dotibus ceteris antestant, & expetuntur. Hæc antiquis incognita fuere, quorum itidem multæ sunt species, magnitudine insignes, ut bilibria etiam nascantur. Aliæ ad Ianuarium vsq; in arbore pendent.

Palladius ait, Locis quidem qualibuscunque proueniunt, sed & pomis, & *Cælium*, frondibus, & durabilitate præcipua sunt, si cælum calidum sortiantur. Frigidis verò, & maximè ventosis, nisi obiectu aliquo defendantur, intereunt. Ob id à nobis sæpe vallibus, & concauis locis seruntur, ut cum primum florent ventorum turbine flores non deturbentur.

Idem, qui supra, solum arenosum, & humidum concupiscere scribit. Florentinus aquosis locis, & assidue rigatis gaudere, ut fructus maior euadat. Apud nos humidis locis insipidos fructus procreat, facileq; putrescit arbor. Si irrigaueris, facile vermes generabit, sed solum arenosum altum, & solum & planitiem amat. Tales sunt Arentii vulgò dicti campi, ubi latè fructificat huiusmodi arbor, ac præ cæteris Italiæ locis viget, ut eius natalia loca ibi à natura esse constituta videantur.

Palladius calidis locis Nouembri mense, cæteris verò Ianuario persicis ossa in pastinatis areis ponenda iubet, binis à se pedibus separata, ut cum ibi plantæ excreuerint transferantur. Sed ossa ponantur acumine deorsum verso, & non amplius, quàm duobus, aut tribus digitis obruantur. Ossa verò, quæ ponenda sunt, aliqui siccata prius paucis diebus cineris mitione terra soluta in qualis reseruant. Ipse verò vsque ad serendi tempus absq; vlla cura sæpe seruauit. Dum tenera sunt germina, sæpe herbis circumfossa liberentur. Sed habitiores habebimus plantas, Florentinus ait, si simul ut ederimus, ossa seremus, parte aliqua carnis circa ossa relictæ. Columella persicum serit ante brumam per autumnum. Ex quo Plinius etiam serit per autumnum ante brumam. Bimam plantam Palladius transfert, scrobe breui. Nec à se longè statuendæ sunt, ut inuicem se à calore solis excusent. Sunt qui loco

vbi ossa ferunt, ibi satas velint. Tunc cum ossa ponemus, trium, vel quatuor pedum scrobes effodiemus, in fundo tria, vel quatuor ossa constituemus, quatuor digitis à se inuicem distantia, inde superinducta terra, vbi pullulauerint, arbuscula vegetior relinquatur, cetera tollantur, ac alio ferantur, illius incrementa terra operiendo prosequemur. Interualla duodecim pedum erunt.

Cultus.

Palladius ita colit: Ablaqueanda sunt arbores per autumnum, & suis stercoreanda foliis. Puranda per ficus in autumnum est, vt arida, & putrida tantum virgulta tollantur. Nam si quid viride ressecemus, arescit. Et si hæc arbor ardore folis inarescit, frequenti aggestione cumuletur, vespertino humore iueatur, obiectis defendatur umbraculis. Sed in nostris regionibus temperatis contrarium videtur, nam quo magis putantur, & abscinduntur rami, latius assurgunt. Formanda est arbor, vt vno se attollat stipite. rami sint in orbem circumnati, vt se à sole tutius defendant. Altitudo stipitis sex pedum.

Institio.

Mense Ianuario, vel Februario, Palladius ait, locis frigidis, Nouembri calidis per ficus inseratur, maxime circa terram furculis plenioribus, & propere arborem natis: nam cacumina, vel non tenebunt, vel diu durare non poterunt. Inferitur in se, in amygdalo, in pruno: sed armenia, vel præcoqua prunis, duracina amygdalis melius adhærescunt, & tempus ætatis acquirunt. Mense Aprili, vel Maio locis calidis, in Italia verò utroque exeunte, vel Iunio per ficus inoculari potest, quod emplastrari dicitur, præciso super trunco, & emplastratis pluribus gemmis, more, quo dictum est. Rubescit si platano inserta figuratur. Ad Paphilum postea,

Ipsa suos onerat meliori germine ramos

Per ficus, & pruno scit sociare genus.

Imponitq; lenes in stipite phyllidis umbras,

Et tali discit fortior esse gradu.

Alium inferendi docet modum, quem ab Hispano quodam se didicisse faretur, de quo in libro de Cultu diximus. Florentinus de per fici institutione hæc habet: Cum notum sit per ficum citò senescere, in damascenam arborem, id est, prunum, aut in amaram amygdalum inferi debet, vel etiam in barbylum: est autem barbylus arbor ex per fici osse enata. Didymus poma per fici rubescere scripsit, quæ platano insita coaluit, & in damascenum, & amygdalum inferi posse. Diophanes in cerasum inferi, & viceversa. Inferitur apud nos Ianuario fasso ligno, in prunum, & optimè apprehendit, sed fit institio circa terram, fructus diuturnius viuit, sed magnitudine degenerat. Sic etiam inter lignum, & corticem, optimè etiam ad modum digitalis mense Maio, vsque ad idus Iunii nouellis ramis. Si in amaram amygdalum inseratur, sentit gustus aliquid amaritudinis in fructu.

Amygdalo per ficus.

Ruellius genus quoddam per fici tradit à recentioribus agricolis amygdalo per ficum dictum, ab utroque parente, cum ea soboles mediam inter utrumque progenitorem naturam contraxerit, fortasse institutionis diligentia, aut satorum mixtio-

amixtione, nouum
genies in uila prior
rens, & effigiem
sicum pomum me
senter. Hæc species
non visitur. Retu
horro adhuc uiue
est per fici, in cus
omnino ignoratu
mus. Palladius ai
intus dulcem amy
bis ad Paphilum

Poma

L

Quibus autem
per ficum in amy
plastrationem in
vt cetera produco
lam inferitur, &
dem iudicio utri
coaptenturq; ocu
pruno, vel per fici
bit. Nam diuersi
ctus dimidiatos,
iam fier, si per for
etnium, vel quac
enim modo max
cedendi via.

Aliud est

30 riqvis incognitu
lum arbitror, se
ram contraxit,
dum, cutem n
cum leniter su
licet in autun
tatur ruber
poma, gustu,
perficorum n
bus clare par
40 do id etia fac
cem à per fici

amixtione, nouum adulterii repperunt genus, vt ex amygdalo & persico progenies inuisa prioribus seculis exoriretur, vtriusque parentis ingenium referens, & effigiem simul adoptans. Hoc est malum, quod foris æmula facie persicum pomum mentitur, intus dulcem amygdalam, & facie, & gustu representet. Hæc species in Gallia fortasse vulgaris: nos eâ Romæ vidimus. Neapoli non visitur. Retulerunt tamen amici in Mineruæ promontorio quoddam in horto adhuc viuere. Arbor media est inter amygdalam, & persicum. Fructus est persici, intus dulcem amygdalam continens. Quomodo id fuerit exortum, omnino ignoratur. Videamus si eius inuentionis modum tradere nos possimus. Palladius ait persicum in amygdalam insitum fructum producere, qui intus dulcem amygdalam includat, foris verò persici carnem. Quod his verbis ad Pasiphilum innuere videtur:

*Pomaq; permutat velamine persica misto,
Duriciemq; docet, tegminis esse loco.*

Quibus autem modis id fieri possit, non docet. Nam si vsitato modo quis persicum in amygdalam fisso ligno, vel inter lignum, & corticem, vel per emplastrationem inseruerit, persicum pducet, quod amaram intus amygdalam, vt cetera producet. Id restatur totius Apuliæ pomaria, vbi persicus in amygdalam inseritur, & omnes intus amaram producunt amygdalam. Sed meo quidem iudicio vtriusq; oculi, persici scilicet & amygdalæ, per medium findantur, coaptenturq; oculi duo, vt vnus fiant, sic demum emplastreantur amygdalo, vel pruno, vel persico, sic ex vtroq; semioculo enatum germen, tales fortasse dabit. Nam diuersi admodum generis duo germina fructus producent, non fructus dimidiatos, sed alter intus, alter verò foris sedem nanciscetur. Fortasse etiam fiet, si perforato amygdalæ trunco persici germen traducatur, ac post triennium, vel quadriennium, vbi optime coaluerint, recidatur à parente. Hoc enim modo maxima videtur fieri in fructu variatio, nec alia mihi videtur procedendi via.

Aliud est etiam persicorum genus, nucipersicum dictum, etiam antiquis incognitum, quod insitionis diligentia in lucem productum non solum arbitror, sed ratum habeo: ab vtroq; parente vt nomen, ita mediam naturam contraxit, ex nuce scilicet, & persico. Ex nuce colorem contraxit herbidum, cutem nulla exterius lanugine pubescentem: sed admodum leuem, succum leniter subamarum, serò maturescit, diutiusq; suam prorogat ætatem, scilicet in autumnum, à persico autem formam habes, carnem, succum, cum maturatur rubescit sole, duram intus & scabram nucem habent, qualem persica poma, gustu, saporeq; iucundo, sed multo nuce fugacius. Arbor humilis est, persicorum magnitudine, folio amygdalino, vel maiori flore puniceo, ex quibus clare pater facile ex vtroq; progenitore mixturâ contraxisse. Sed quomodo id etiâ factum fuerit, penitus ignoratur. Videtur enim maxime distare nucem à persico, adeo quod inde medium genus prodire nequeat. Sed agrico-

larum ars, & sedulitas, eam, omnemque difficultatem vincere potest. Ipse autem nullis fieri posse modis, quam supradictis conicio, ut utriusque dimidiatus oculus una compositus alterutri emplastratur. Vel perforato nucis truncus, perfici ramus inducatur. Horum pomorum plura sunt genera: Sunt autem stiuo tempore maturefcentia, sunt & ferotina, quæ usque ad Ianuarias calendas in arbore pendent. Sunt ex his duracina, & ex quibus caro ab osse diuellitur, sunt quæ viridi, & quæ alba cute matura sint induta, cæterisque pulchritudine, & suauitate præstant.

*Sanguini-
persicum.*

Sunt tandem, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, ut sanguinipersica dici possint. Apud nos admodum grata, & speciosa, non quod reliquis carne suauiora, sed quod oculis suo colore pergrata sint, vulgò, quod pastinacæ colore mimentur, *Persiche pastinache* vocitantur. Sed quomodo id genus productum fuerit indicandum. Rubra nasci persica Democritus promittit, rosas sub arbore consitis. Vel post septem dies, quum patefieri cœperint (nam totidem diebus obruta sponte fatiscunt) in ossium internos ventris sinus cinnabarum infundas, mox ut cohæreant strictim obligata simul cum suis nucibus obruas, sic rubra dabunt persica, & si alium quæuis coloris instillaueris in talem enata progenies degenerabit. Didymus in platanum insitam, rubicunda rhodacina producere posse scribit. Palladius etiam rubescere scribit, si platano inserta figatur. Apud nos tamen præualet opinio, ut in viuum, & perforatam pastinacam, ossis nucleus persici inclusus fuerit, ac inde enatus. Vel in sanguineum mori succum, si postquam enatum fuerit, germen pluribus diebus eo succo rigaueris: Vel in morum insita tales fructus proferre.

*Paratus
vel Ars.*

Maiora poma creari pollicetur Florentinus, si assiduo potu inebrientur: hunc in modum iugiter rigatu satiata, maiora multo poma creabit. Et si complura interlegantur, quæ ubertate nimia matrem onerauerint, ut arboris succus ad reliquorum nutrimenta pomorum conuertatur, succi enim copia in pauciores fetus se conferens, altius saginat incremento. Sed Palladius magna poma afferre scribit: si florenti per triduum ternos sextarios caprini lactis ingeris. Sed suillum sterco radicibus affusum maiora poma ut producat efficeret, quam ex arbore unquam pependerint. Ut persica scripta nascantur, docet Democritus. Exesi corporis os triduo madescat in aqua, dein aperto sensim ligno, nucleus intus inuentus cortice tenui a neo stylo, non alte, quibus placebit literis exaretur, dein papyro, vel charta reuolutus, commissis carinis feratur. quod in eo amygdalo depinxeris, hoc enatum inde pomum representabit. Ex quo Palladius: Affirmantibus Græcis persicus scripta nascetur, si ossa eius obruas, ea post dies septem, ubi patefieri cœperint, apertis his nucleos tollas, & his cinnabari quod libebit inscribas, mox ligatos simul cum suis ossibus obruas diligentius adherentes. Sine ossibus nasci persica scribit Africanus: si in perforatum truncum exclusa medulla, salicis vel corni palum adegeris.

*Morbi
remedia.*

Palladius ait, Contra solis ardores inuat serpentis spoliū appendi. Contra pruinās

pruinās Nouem
quod magis prod
cin seos amurce
fusa. Si poma cad
cuneus affigitur,
gola creabit, aut
anodius humor
ia persici profici

Idem, qui si

20 detractis ossibus
detractis ossibus
seruantur, si vni
rare cogantur v
liolo conclusa,
mensis incorru

N Vnc pru
N pomi men
demonstrat qu
20 tum sit. Vnde pr
moratur a Macr
retulit Martialis

Pom

Si

Aratus Græc
RARIUM vocat
dem esse scribit.
soluat, alia quasi
dios, & Siculo
30 Damascenum
mon Græcum
poma malus,
& Latino coq
dicas, cum
Latinis arbo
Theophi
supra fructu
intus durum
men indur
40 quæ facile ne

pruinās Nouembri sterqus ingeratur, vel faeces vini cum aqua permixtae, vel quod magis prodest, aqua in qua faba decocta est. Si vermes perficus patitur, cin seos amurcae mixtus extinguit, vel bouis vrina, cum aceti tertia parte confusa. Si poma caduca sunt, nudatę radici eius, vel trunco lentisci, aut terebinthi cuneus affigitur, vel terebratę in medio palus salicis imprimeretur. Si poma rugosa creabit, aut putrida, circaimum truncum cortex recidatur, vt cū inde modicus humor effluxerit, argilla, vel paleo luto plaga retegatur. Contra vitia perfici proficit spartum ligatum, vel sparteasus pensā de ramis.

Idem, qui supra: Duracina seruantur condita muria, & oxymelle. Vel *Cōditura.*
 10 detractis ossibus ficorum more in sole siccantur ac pendunt. Idem sape vidit detractis ossibus duracina melle condiri, & saporis esse iucundi. Item bene seruantur, si umbilicum pomi gutta picis calentis oppleris, vt sic sapā innatare cogantur vase concluso. Nos verō perfica, & huiusmodi generis mala doliolo conclusa, optime foris picato, ac sub cisternę aquis demerso per multos menses incorrupta seruauimus.

De Prunis. CAP. XXI.

N VNC pruni commentationem auspicabimur. Miratur Plinius huius pomi mentionem à Catone non habitam, præsertim cum condenda demonstraret quædam & syluestria: Cū & pruna syluestria ubiq; nasci certum sit. Vnde pruna omnia post Catonem cœpisse manifestum est. Commemoratur à Macrobio inter felices arbores. Vim subducendi alium insignem retulit Martialis,

*Poma peregrina carie rugosa senecta
 Sume: solent duri soluere ventris onus.*

Aratus Græcus, Athenæo authore, arborem κοκκωμηλέαν, fructum verō *Nomen.* κοκκωμηλον vocari dixit. Seleucus verō brabyla, ala, coccymala, & madrya eadem esse scribit. Nam madrya esse velut mali fructus, brabyla, quia ventrem soluāt, ala quasi mala. Clearchus peripateticus, & Theocritus Syracusius Rhodios, & Siculos Damascena pruna brabyla appellare dixerunt. Democritus
 30 Damascenum coccymalum appellari scripsit. Sed vnde huius nominis etymon Græcum descendat, ignoratur ex compositione. Nam κοκκος granum est, μηλέα malus, quasi granatum malum dicas. Sunt qui per barbaralexin putant ē Latino coquendi vocabulo deriuatum, vt coccymalum, quasi coquimalum dicas, cum ei præcipua vis sit deiiciendi. In Asia scribit Galenus προδμνον dici. Latinis arbor prunus est, fructus prunum. Itali *Sesino, Prugno.*

Theophrastus de eius forma pauca retulit. Emittere florem frequenti folio *Forma.* supra fructum insidentē. Pomum carne, humore, & neruo vestitum. Lignum intus durum, in quo nucleus includitur: natura enim liguo, & rursus carne semen induxit. Succus dilutus. Radices humotenus vltro citroq; vagantes, &
 40 quę facile nepotes generent, superficie viuaciores. Prunus & syluestris paucis

adhaeret radicibus, superficie viuacioribus. Arcades autem prunum altissimam radicem habere, & numerosam, vnde diu viuat opus est, & emori contumacem referunt. Plinius ex eo: Fructus pruni aquoso succo præditus, fortis corpus, intus lignum, vitiumq; cinctum fructu, cum fructus alibi muniat vitio. E radicibus pullulat sobole densa, & pariete matre, quas enecet, eius quippe umbra turba indigesta premitur. Velox crescit, in trimatu enim ferre incipit, ostendens & ante, & cito occidit. Sed quod cito occidat è Theophrasto perperam interpretatus est, dixit enim emori contumacem. Nosq; continua experientia videmus ad hominum vitam peruenire. Præterea Theodorus Theophrastum vertens, Prunum ait corpore humilem, folio arbuti, peculiarēq; in eo fructum lanugine pappo dicta perire, quod Theophrastus coggigryæ tribuit, non pruno. Pliniusque Theophrastum secutus etiam coggigryæ vocatæ ascribit. Decepit hominem nominum affinitas, forte quia cocconeliam, non coccomeleam scribendum erat, nam vnedo, cui similis est coggigryæ, nelia vocatur à Theophrasto. Nos ita describemus. Prunus arbor procera. Caudice subrecto, scabro, multis ramis brachiata. Folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato. Vere prius florem, quam folium emittit.

Genera.

Ingens turba prunorum, dixit Plinius, versicolor, nigra, candicans. Vt inueneret tot esse prunorum genera, & plenè inexplicabilia. Nos verò in vrbantum, & syluestre genus diuidemus: Vrbantum à Damascenis incipientes, utpote inter cæteras species principatum gerentibus. Damascena pruna dicta Athenæus scribit, quod in Damascenorum regione nascantur; cum ibi is fructus ita colatur, ut ab aliis qui alibi nascantur plurimum differat, cuius magnitudo minor, quam prunis, & gustus idem, nisi paulo esset asperior. Diolconides syriaca pruna vocauit, & præcipue, quæ Damasci gignuntur. Galeni testimonio, omnium opinione, prima bonitatis laus ei ascribitur. Meminit etiam huius Columella in hortulo,

Armenis, & cereolis, prunisq; Damasci.

Plinius in peregrinis arboribus ait: Damascena à Syriæ Damasco cognominata, iam pridem in Italia nascentia, grandiore quamquam ligno, & exiliore carne, neq; vnquam in rugas siccata, quoniam soles sui desunt. Alibi verò. Pruna Damasco monte nata, Italiæ familiaria. Neapoli vulgo dicimus, *Prune damasche*. Nigra sunt cute, carne suauis, crocea, rotundo intus ligno, in cacuminibus turbinato, exili nucleo, digitis pressum internum os exilit, parua, pauciq; succi. Post Damascena Iberica apponemus. Galenus proxima Damascenis, quæ ex Iberia, & Hispania proueniunt, verum hæc minus asfrictionis præ se ferunt. Neapoli vocantur *Prune pernigone*, à perdice deductum nomen, ut credo, quemadmodum enim inter aues ipsa carnis suauitate excellit, sic hæc inter prunorum genera, à citerioris Hispaniæ regione nobis allata, ob id nobis etiam catalonica dicta: non vulgaria nobis sunt, sed quibusdam in hortis afferuantur, dulci succo prædita, carne duriori, gustu suauis, purpureoq;

V
reosq; splendent
digitis os internum
rem Iberica prun
elle principatum
quam Damascen
callosa, oblonga,
graque, sed nigra
& pruna cerina à

Add.

10 Ouidius etiam

Prun

Veru

Columella in

Arm

Plinius ex his
si arbitrantur. E
præstantius ram
ctum, ex candido
gusto maturatur

Arm

Plinius dixit,
tur. Hæc quæ fu
Onychina ab vn
esse onychina di
cia sunt, immo p
ris candidiora su
etiam pruna pur
dicta sunt *Pruna*
colore, intus cre

30 fa, domita acidi
nius, seriora ma

Pruna cogliope
ineptum, nam

lio & Auguste
tantia. A tem

esse, cum sub
Pruna d Indi

tia, forma oua
quæ vsq; ad ca

40 adeo parua su
da, nigra, & all

reosq; splendent colore, parte, qua solem spectant, ex aduersa candicant, pressum digitis os internum dimittit, oblonga, exili nucleo, ac longo. Sed ego existimarem Iberica pruna esse, quæ nobis vulgo *de frate* dicuntur, nam inter cetera facile principatum obtinent, innoxie præbentur ægris, ac minus stipticitatis, quàm Damascena obtinent, colore gramineo, ingrato, succo melleo prædita, callosa, oblonga, os intus oblongum compressum acutumque. Sunt alba, nigraque, sed nigra dulciora, maiora ouï magnitudine, ac magis serotina. Sunt & pruna cerina à colore flauentis ceræ dicta, quorum Virgilius meminit,

Addam cerea pruna.

10 Ouidius etiam Metamorphoseos libro,

Prunaq; non solum nigro luventia succo,

Verum etiam generosa, nonasq; imitantia ceras.

Columella in suo hortulo,

Armenisq; & cereolis, prunisq; Damasci.

Plinius ex his: Sunt & nigra, ac laudatiora cerina. Multi & à Græcis vocari arbitrantur. Et si innumera sint apud nos genera huiusmodi colore prædita, præstantius tamen, & quod magis cereo colore flauet, est vulgo *Scaldaro* dictum, ex candido enim in luteum pallefcit, paruulum est, dulcore insigni, Augusto maturatur. Armenicarum meminit Columella in hortulo,

Armenisq; & cereolis.

20 Plinius dixit, Ab externa gente armeniaca, quæ sola & odore commendantur. Hæc quæ fuerint, cum alia signa non addiderint, diiudicare arduum erit. Onychina ab vnguis colore vocantur, & enim vnguis est. Columella matura esse onychina dixit iuxta messem. A colore candicantia Plinio dicta. Præcocia sunt, immo prima, quæ maturantur, vulgò nobis dicta *biancolelle*, quia cæteris candidiora sunt: & purpurea laudatiora à Plinio memorata, à Columella etiam pruna purpurea dicta, quæ inter reponenda pruna commemorat. Nobis dicta sunt *Pruna d' appendere*, sunt enim serotina, purpureo siue violaceo foris colore, intus crocea, dura, callosa, acida, nec esui apta, nisi laquearibus appensa, domita aciditate per hyemem promantur. Alia eodem colore, inquit Plinius, seriora maioraq; asinina cognominata à vilitate. Hæc Neapoli dicta sunt *Pruna cogliopecore*, honor sit auribus, obscenum quidem nomen, non tamen ineptum, nam pruna omnia magnitudine superant, colore flauetia, mollia, Iulio & Augusto maturantur, insipida, ac hircorum testiculorum formam imitantia. A tempore hordearia, à comitatu eius frugis dicit Plinius, ac flauentia esse, cum subdat; eo dē colore asinina. Huiusmodi multæ sunt species, sed quæ *Pruna d' Indie*, dicuntur, & *Pappacode*, insigniora sunt, magna enim sunt, flauentia, forma ouata, ac cum messe maturantur. Sunt & apud nos serotina pruna, quæ usq; ad calendas Ianuarias in matre dependent, vulgo, *Pruna cascaneglie*, adeo parua sunt, vt vix syluestrium prunorum magnitudinē superent, rotunda, nigra, & alba. Sunt & vario colore, dicit Plinius, inter quæ *Pruna simiana*

principatum obtinent, hæc rotunda, ampla, foris ruffa, intus crocea, pressa os forisiaculantur. Sunt etiam Surrentina carne suavi, ac friabili, & pleraq; alia, quæ ne tempus longius teratur, omittenda proposuimus.

Cœlum.

Calido cœlo lætari prodidit Pamphilus. Plinius non temere in montibus visam prunum. Palladius cœlo tepido melius prouenire, tamen & frigidum substinere valet.

Solum.

Scribit item Pamphilus sicco solo gaudere. Palladius lato, & humido, Sed si in lapidosis, & glareosis lætamine iuuantur, excusant ne poma caduca & vermiculosa nascantur.

Satio.

Palladius, Pruna si ossibus seratur autumnò, mense Nouembri solo putri & subactò duobus palmis obruantur. Ossa eadem ponantur & mense Februario. Sed tunc prius lixiuio sunt maceranda per triduum, vt cito germinare cogatur.

Idem & plantas poni tradit, quas sumit ex caudice mense Ianuario exeunte, vel Februario, circa idus, radicibus fimo oblitis. Columella post mediam hyemem vsq; ad idus Februarias ferit. Pamphilus pruna eodem modo, & tempore quo persica plantari debere monet. Interualla ex Theophrasto sumemus, qui punicis nõ plus, quàm nouem pedũ distantiam, præcipit, malis paulo maiore, pyris ampliore, & prunis. Plinius scrobium altitudinẽ in argilloso, aut duro solo trium cubitorum esse in quanq; partem aliis, sed in prunis palmo amplius.

Didymus etiam auulsione feri posse memoriæ prodidit.

Nos prunũ propagauimus, & breui tempore radices iniecit. Itemq; teneros eius ramos humidis, & vmbrosis locis seuiimus, & optime comprehenderunt.

Cultus.

Palladius ita colit; Extirpandæ sunt soboles à radice, exceptis rectoribus, quæ seruabuntur ad plantas. Iuuantur frequenti humore, & assidua fossione. Nobis formada est arbor, vt vno se attollat stipite, non admodũ procero, vt valeat sua vmbra truncum operire. Frigidis regionibus lætamen ingeritur. Sed etiam neglecta fœtificat.

Infitio.

Pamphilus iisdem horis inferi docet, quibus & persicus in sui generis arbores, & in malos. Diophanes in omnem pyrastum, & in cotoneum, & malum: & recipere persicum & præcocium. Quintilij indicant Ianuario fieri debere, quia primæ florent. Palladius hæc habet. Mense Martio extremo prunus infertur, melius trũco fisso quàm cortice, vel mense Ianuario antequàm incipiat gumen lachrymare. Inferitur in se, & persicum recipit, vel amygdalum, vel malum, verum vltimam degenerem reddit, & paruam. In versibus verò,

Pruna suis addunt felicia germina membris,

Donaq; cognato corpore lata ferunt.

Exarmat fetus, sed brachia roboris armat

Castanea prunus iussa tenere larem.

Nos autem docemus vt insita prunus in amplam exurgat magnitudinem. Die ante infitionem, fœnum, paleas, vel arida sarmenta inter arboris ramulos, & furculas apponimus, vt pede à loco distet, vbi infitio futura est, mox ignem appo-

apponimus, & con-
mus, ignis enim co-
gat, ac in contraria
positis videre con-
mox humore ab in-
rudinem. Possum
igne reuocetur hu-
inferenda est loco,
translata, in profun-
vt inde enata soboles
Nos Maio, & Iunio
tione optime reci-
Si prunum in per-
vitæ: si persicus i-

Id effecit ars, v-
na reperirentur. L-
eius verba recitab-
bimur. Peculiaris
cumq; adoptionis
malina appellari co-
tus in ligno nucle-
est. Sed quomodo
hoc ipso in persico
sitionis species, qu-
succum haurire po-
forando, & per for-
ges, vtriusq; natur-
de persico salici. E-
lucem producta

Palladius agri-
cum aqua & quib-
solum, vel hum-
ex fumno maxim-
tæ infige radici-
tur, extinguet
quod venenū
Pamphilus
nouo nantia
per crates loco
aqua marina, v-
sublata aut in fi-

apponimus, & comburimus ramos, vbi verò frigesceat, præsignato loco inferimus, ignis enim caliditas furculorum ramorumq; humorem in truncum sugat, ac in contrariam sibi partem descendere cogit, vt in viridibus lignis igni appositis videre contingit, quæ ex opposito latere humorem exudant: euocato mox humore ab indulgentis cœli temperie, in magnam prunus crescit amplitudinem. Possumus hac vti præceptione Luna crescente, si necessitas cogit, vt igne reuocetur humor ad radices, quem ipsa lumine suo euocauerat. Prunus inferenda est loco, vbi nascitur, & quanto terre propinquius, eo melius, vt inde translata, in profundiorē scrobē obruta, insitionis coalitus sit infra terram, vt inde enata soboles domestica sit, facile enim prunus circa truncum pullulat. Nos Maio, & Iunio emplastramus, vbi gummi lachrymare desierit. Emplastratione optime recipit persicum, & amygdalam, difficulter autem fisso trunco. Si prunum in persicum inferemus, maiorem producit fructum, sed brevis erit vitæ: si persicus in eam, paruum, & degenerem, sed vitæ diuturnioris.

Id effecit ars, vt Plinij temporibus nucipruna, & pruna malina, & amygdalis *Ars.* na reperirentur. Nostra autem tempestate cum arte ea genera periere. Primo eius verba recitabimus, mox artē, quæ id efficere possimus demonstrare conabimur. Peculiaris impudentia est nucibus insitorum, quæ faciē parentis, succumq; adoptionis exhibent; appellata ab utroq; nucipruna. Nuper in Boetica malina appellari cœperunt, malis insita, & alia amygdalina amygdalis. His intus in ligno nucleus amygdalæ est, nec aliud pomum ingeniosius geminatum est. Sed quomodo id fieri possit inuestigandum. Quæ supra monuimus, cum de hoc ipso in persico loqueremur, huc adducenda ducimus. Præterea est alia insitionis species, quæ de subiecto trunco multa haurit, vt facile prunus ex nuce succum haurire possit, faciēq; parentis retinere, scilicet truncum nucis perforando, & per foramen pruni ramulos transficiendo, vt ex utroq; facto cōpages, vtriusq; naturam referat, quemadmodū de vite insita ceraso retulimus, ac de persico salici. Huiusmodi enim insitione conicere licet, hæc inuenta, ac in lucem producta esse. De amygdalinis, & malinis prunis idem faciendum puto.

30 Palladius agris arboribus ita medetur: Si languida pruni arbor est, a murca *Morbi et remedia.* cum aqua æqualiter temperata radicibus debet infundi, vel bubulum lotium solum, vel humanum verus, cum duabus aquæ partibus mixtum, vel cineres ex furno maxime sarmentorum. Si poma decidunt, oleastri cuneum terebratæ insige radici. Vermes eius, atq; formicas rubrica cum pice liquida, si adlinatur, extinguet, sed modestius, propter arboris noxā, ne idem faciat remedium, quod venenum.

40 Pamphilus nobis scriptum reliquit, Damascena seruari cadis, vino dulci vel *Coditura.* nouo natantia, operto diligenter vase. Palladius verò. Pruna siccantur in sole per crates loco sicciorē disposita. hæc sunt, quæ Damascena dicuntur. Alij in aqua marina, vel in maria feruente recenter lecta pruna demergunt, & deinde sublata aut in furno tepido faciunt, aut in sole siccari. Columella aliam docet

condituram: Circa messem pruna onychina, & sylvestria adhuc solida, nec maturissima legenda sunt, nec tamē nimium cruda, deinde vno die umbra siccanda, tum æquis partibus acetum, & sapa, vel defrutum misceatur, & infundatur. Oportebit autem aliquid salis adicere, ne vermiculus, aliudve animal nasci possit. Verum commodius seruantur, si duæ partes sapa cum aceti vna parte misceantur. Pruna purpurea immatura, non tamen percruda, integra & sine vitio, aut vermiculo, in fistili picata fidelia componuntur, & defruto, aut passo, ita vt omne pomum sit immersum, vas completur, impositoque operculo gypsatur. Nos quæ diximus purpurea, cum ramulis ac pediculis lecta, suspensa que laquearibus, vsq; ad alium ferè prouentum seruari promittimus. 10.

De myxis. CAP. XXII.

DE sylvestri pruno diximus in sylua. Nunc autē de myxis: sunt enim prunorum species. Plinius scribit in Damasco monte nata, iamq; Italiæ familiaria esse sua ætate. Dioscorides, & Galenus earum nusquam meminere, ceterique veteres Græci: Plinius ex his vina fieri in Ægypto. Viscum que fit in Syria ex arboris huius acinis, commendatissimum aucupis, præterquā aquatiliū volucrum.

Nomen.

Græcis recentioribus *μύξα*, Paulo Æginetæ, Psello, & Actuário *μύξα* dicuntur per diminutionem *μύξιν*, id est à lento narium mucore fluente. Officinæ barbaro nomine, quæ iam ferè maxima ex parte à Mauritanis, vel Arabibus emendicare solent, Sebestena vocant, à *σεβαστός*, quoniam nonnulli in Casaris honorem factam arbitrantur. 20.

Forma.

Plinius perseam Ægyptiam rubentibus myxis similem esse scripsit. Id est, perseæ Ægyptia similis esset myxis, si myxa rubescerent. Recentiores, quibus frequens est arboris huius conspectus, ita describunt. Arbor supra terram atollitur procero caudice, qui cortice candido vestitur. Fundit ramos viridi colore nitentes. Folia circinata. Poma auellanae nucis magnitudine racematim collecta, per maturitatem cærulea. Callo corporis dulci, intrus albo, mucoso lentore, vnde Græcis nomen myxon, ita enim mucum nominare consueuerunt, osse oleagino triangulari, cuius nucleus insuavis non est.

Colum.

Palladius in tepido cælo feri debere scribit. Plinius Damasco monte nata.

Solum.

Palladius soluta terra pangi debere docet, humore moderato.

Satio.

Palladius, Februario seruntur myxa ex nucleis in aliquo vase positis, donec plantæ induant firmitatem.

Institio.

Plinius scribit: Ipse nunc cœpere nasci Romæ insitæ sorbis. Et myxas recte inferi in calabrice, ea enim est spina sylvestris, quæ eas optimè recipit. Ruellius, ceterique, qui ab eo desumpserunt ignorantes quæ sit calabrix, nescio quæ verba afferunt. In Calabria ea est spina sylvestris, quæ myxas optimè recipit. Vocatur enim Neapoli calabrix spina illa sylvestris, quam Dioscorides

oxya-

oxyacantham vocatur myxa mense M.

IA ad palmas risque dotibus tractationem in oleis (Plinio auctorem decantantem ter quas vna est, quæ ea multa gentes res, suo tempore pro vino triduo pus effluit, accequantur, efficitur. Simum autem dioscorides est. Dioscorides Parthi, & Indi vna ne scribit, ex palma & siccata etiam in quin & cerebri, que quandam in ex his in Oriente drupedum cibum ratum testatur. tur, vna maior in Saturnalia dona.

Quia

Et Martialis:

30 Nam decoctus & bellaria antestus est, hunc pabantur. Sed tu conuiscitur rare videtur perlequitur, lide dispensa Græcis paluccrum & cal40 maturuerint

oxyacantham vocat, vt vidimus in Sylua. Palladius ex Plinio melius. Inseruntur myxa mense Martio, forbis, & spinis.

De palmis. CAP. XXIII.

IAM ad palmas deuenimus. Erat hic oleæ locus: sed quum nobilitate, mirisque dotibus, quibus est prædita, satis amplam historiam exposceret, suam tractationem in oliuetum transtulimus: relictus est locus palmis. Nam à vino, oleis (Plinio auctore) proxima nobilitas palmis. Strabo est auctor Babylonios carmen decantare, quo tercentæ & sexaginta palmæ utilitates docerentur, inter quas vna est, quod nihil abiiciat, vt *ἀειφύλλος* cognominari possit. Vinum ex ea multa gentes faciunt, inter quas Indi, qui per Augustum, quomodo nos vires, suo tempore palmam putant, quod verò delachrymat, valis excipiunt, quo pro vino triduo post vulneratam arborem vtuntur, quod enim post illud tempus effluit, acescit, quod verò per triduum defluerit abenis ad tertias decoquunt, efficiturque mel suauissimum, quod si volunt, aquis diluunt, ad vigesimum autem diem defæcant: & deinde pro vino vtuntur, quod suauissimum est. Dioscorides quomodo vinum fiat ex chydeis docet. Et ex eo Plinius, quo Parthi, & Indi vtuntur, & oriens totus. Xenophon in Cyri minoris expeditione scribit, ex palmis vinum fieri, quin & acetum ex iisdem decoctis conditum, & siccitas etiam ad vsum bellariorum reponi, mensis ex his suauissimas epulas, quin & cerebro, id est, medulla ex viridibus ramis exacta vesci posse, præcipuamque quandam in eo cibi genere suauitatem admirati epulantes. Plinius etiam ex his in Oriente vina fieri, gentiumque aliquibus panem, plurimis etiam quadrupedum cibum. Et ante chartarum vsum in palmarum foliis primo scripturatum testatur. Ob suam nobilitatem duæ insignes ciuitates à palmis nominantur, vna maior insularum Balearium, alia Syriæ Palmira dicta. Præterea inter Saturnalia dona palmulæ mittebantur. Vnde Ouidius,

Quid vult palma sibi, rugosaq; carica, dixi.

Et Martialis:

Aurea porrigitur Iani caryota calendis.

30 Nam decoctæ, aspectus iucunditate, & gustus suauitate omnia tragemata, & bellaria antecedeant. Quibusdam verò palmis in palmulis nucleus lunatus est, hunc potissimum (auctore Plinio) contra fascinoles pollere arbitrabantur. Sed lunatum, quasi arcuatum intelligi debet, cuiusmodi in Luna à coitu conuiscitur schema. Sed cur maxime ea figura expetatur, Plutarchus declarare videtur in libro de Iside: Ait enim, Solem Luna semper appetit, eumque persequitur, eoque argumento ab amatoribus aduocari Lunam, & amatoria ab Iside dispensari Eudoxus scribit, quæ non alia est, quam Luna.

Græcis palma φοίνιξ dicitur. Palmæque fructuum adhuc florentium inuolucrum & calix ἐλάτη dicitur, vel *σπάγη*, qui posthac ubi prodierint *πῆμα*, ubi maturuerint, & folibus nigricant, φοινικοβάλανος appellantur, ac si dicas, palmæ

glans, hanc etiam ἐκφραλον, id est cerebrum à Galeno videtur appellari: fructus etiam à digitorum forma δακτυλῶν dicuntur. Iulio Polluci mascula φῆν, fœmella βελανος est, quod ab Herodoto sumpfit. Latinis verò palma arbor dicitur, fructus palmula, & dactyli generaliter vocantur. Sunt qui caryotas, caryotidas, vel caryotim appellent. Statius,

Latente palma

Pregnantes caryotides cadebant.

Et Martialis,

Et notas caryotidas theatris.

Ita arborem palma, fructus verò datteri vocant.

Norma.

Quæ apud Theophrastum per pauca extant & vaga, huc adducemus, ut palma delineationem adumbremus. Palma arbor tereti, ac simplici caudice altissime assurgit. Cortice cum adolescit læui, scabriore multo cum senescit. Lignum humore, neruo, & carne constat, sed processu lignescit. Nervos non per totum corpus expandit, neque prolixiores, neque positi eodem extensos: sed multifaria cunctos porrigit. Medulla omnino nulla. Folio arūdinaceo, angulari, duplici, & in medio dorso carinato, per quod amplius in longitudinem fertur meatus. Perpetua viret coma. Folia fructus, & germina propemodum cacumine gestat, quippe cum vis tota genitalis in eius vertice resideat. Fructum producit non ex anniculis, vel nouellis ramis, ut cætera arbores, sed è rudimentis præcedentis anni, cum turgent in spicis semina antequam proferantur: ramulos enim simul cum fructu in spica prodit. Huius rei causam & arboris proprietatem, & siccitatem dixerim: præterea fructus munimento quodam egent ad conseruationem & cum editi sunt, & cum exeunt, quando aliarum arborum fructibus hoc præsidium à frondibus petatur, in palma verò, quia secundum frondem fructus inest, necesse fuit, in ipso sinu conformatus, & constitutus, ut validiusculus, non tener prodeat in aerem. Quæ fructificatio similis est spicarum fecundificationi. Fructus dulci succo præditus. Semen protinus post regmè ambiens subest, ambientiaque plura sunt, cavitatem nullam habens, sed totum plenum, solidumque; est, tamen huic quoque humor quidam, calorque; inest, estque; maxime diuturnum, cum spissum, siccum, lignosumque; sit, pulpaque ambiatur. Plinius, quæ ex Theophrasto accepit habet: Palma arbor teres, & procera, densis gradatisque; corticum pollicibus, ut orbibus, facilem se ad scandendum orientis populis præbet, vtilem sibi, arborisque; induiis circulum mira pernecitate tum homine subeunte. Coma omnis in cacumine: & pomum est, non inter folia, ut in cæteris, sed suis inter ramos palmitibus racemosum, utraque natura vix, atque pomi. Folia culttrato mucrone, lateribus in sese bifidatis, bellas primum demonstrare gemmas, nunc ad funes, vitulumque; nexus, & capitum leuia umbracula finduntur. Prima nascitur pomi caro, postea lignum intus, hoc est semen eius. Argumentum quod parua sine hoc reperiuntur in eodem palmitē. Est autem oblongum, non ut oliuis orbiculatum, præterea ca sum à dorso puluinata

vinata fissura, & radix. Multis, cancri adherentibus, turefcit anno. Hæ præditus, caro statim nec extra. Fructus in spatibus hararata ocyus senescit di arboris decor n

cia Nausicaæ venires vnicam in quobus annum expleborem depingeb

Palmarum gerimine maxime & vasa conficiuntur florer, fœmina aliud arbore inui sapore. Fructuum

alii molli sunt. Cæ ad summum nrum, ut quatuor nus est, quod foli dine mali punici, deuoretur, sed su

sed optimum tan non vbique, sed i In Cypro genus dus tamen suau

bores longitudi cundiores, quæ nes fructifican ce, alia bifida, ditur, vel quin bifida, & tri

locis plura eia caudicibus, & lio amplo, & magnitudine 40 gustu gratio

nouo subna

vinata fissura, & in aluo media plerisq; vmbilicatum, vnde primum spargitur radix. Multis, candidisq; lignum hoc à carnibus discinditur tunicis, aliis corpori adhaerentibus, laxeq; distans, tantum à cacuminibus filo adhaerens. Caro maturescit anno. Huic folia non decidunt, & duplicia sunt. Fructus dulci succo præditus, caro statim à ligno recedit, sed quibusdam palmis lignum, nec intus nec extra. Fructus in racemis dependet. Carne, & succo placet. Sola ex arboribus in spathis habet fructum racemis propendentem. Tardè crescit, & subarata ocyus senescit. Cortice scabro, in senecta rugosior. Tantus est huiusmodi arboris decor non ingratus, vt Poetarum princeps Homerus puellæ Phæacæ Nausicaæ venustatem palmæ ramo assimilare permiserit. Sola inter arbores vnicam in quolibet Lunæ exortu frondem geminat, vt duodecim frondibus annum expleat. Quare Aegyptij annum exprimere volentes palmam arborem depingebant, vt author est Horus in suis Hieroglyphicis.

Palmarum genera à Theophrasto descripta hæc sunt. Primum, & quasi discrimine maximo aliud sterile, aliud fructiferum. Sterile quoque Babylonij lectos, & vasa conficiunt. Fructiferorum aliud mas, aliud fœmina, illa super spatham floret, fœmina suum fructum oblongum illico præstat. Horum aliud fructu, aliud arbore inuicem distat. Fructus inter se nucleo, colore, magnitudine, & sapore. Fructuum ipsorum alij sine ligno, alij cum ligno, & horum alij duro, alij molli sunt. Colore etiam discrepant, alij enim candidi, alij nigri, alij flauī, & ad summum non pauciores, quàm ficorum colores. Magnitudo aliis malorum, vt quatuor tantum in spica contineantur, aliis cicerum. Et in Cypro genus est, quod folium amplum habet, & fructum multo ampliorem, magnitudine malipunici, figura oblongum, inspidum, sapore radicibus simili, vt non deuoretur, sed succo expresso expuatur. Saporibus quoque plurimum differunt, sed optimum tam inter nigros, quàm candidos genus est, quod regium vocant, non vbiq; sed in hortis antiqui Batoni apud Babylonem cõperiri affirmant. In Cypro genus quoddam est aliud, cuius fructus nunquam maturescit, crudus tamen suavis, dulcis dulcedinemque peculiarem sortiens. Differunt arbores longitudine, & forma. Nam aliæ longæ, excelsæque, aliæ breues fœcundiores, quæ trimæ, & in Cypro, Syria, & Aegypto quadrimæ, & quinquen-
 20 nes fructificant, hominis altitudine assurgentes. Aliæ præterea simplici caudice, aliæ bifidæ, vt in Aegypto, quasi bifurcæ, statura caudicis à parte, qua fin-
 30 ditur, vel quina cubita, paresq; inter sese propè partes ipsæ assurgunt. In Crera bifidæ, & trifidæ. In Lapea etiã quino cerebro nasci tradunt, & fertilibus locis plura eiusmodi. In Ethiopia genus Cyce vocatum fruticosum, pluribus caudicibus, & interdū coniunctis, virga breui, leui coma cacumini annexa, folio amplo, & quasi ex duobus minutis cõpacto, forma eximia, fructū figura, magnitudine saporeq; diuersum, quàm cateræ præstant, quippe rotundiorē,
 40 gustu gratiorem, minusq; dulcem, triennio maturat, vt recentē fructū habeat, nouo subnascēte. Panes ex his quoque cõficiunt. Genus est aliud palmæ humile,

quasi æquiuoce dictum: excepto cerebro uiuit, & ab radicibus succisum repul-
 bulat: fructu enim, & foliis distat, est enim lato, molliq; folio; ob id sportulas,
 regetes, & capitis umbracula ex eo contextunt. In Creta, & in Sicilia multo
 plures tales proueniunt. Plinius, quæ ex Theophrasto aliisque excepit, habet,
 nos ne ad illorum lectionem lectores diuertamus, huc afferre non pigebit.
 Genera unde quinquaginta sunt: si quis omnium persequi velit nomina, etiam
 barbara, vinorumque ex iis differentias, genera earum plura. Prima fruticem
 non excedentia: sterilem hunc, aliubi & ipsum fertilem breuique ramorum
 orbe foliosum. Tectorij vicem hic parietibus plerisque in locis præstat contra
 aspergines. Procerioribus sylua arbore ex ipsa, foliorum aculeo frutificante circa
 toras pectinatim, quas syluestres intelligi necesse est. Incerta tamen libidine
 etiam mitioribus se miscet. Arboribus, imò potius omnibus, quæ terra gignit,
 herbisque etiam, vtrumque sexum esse diligentissimi natura tradunt, nullis
 tamen arboribus manifestius. Mas in palmitate floret. Fœmina citra florē ger-
 minat tantum spinæ modo. Caro quibusdam in locis, ut in Cypro, quanquam
 ad maturitatem non perueniat, grato sapore dulcis est, & folium ibi latius, fru-
 ctusque reliquis rotundior, nec ut deuoretur corpus, verum ut expuatur succo
 modò expresso. Et in Arabia languidè dulces traduntur esse palmæ. quanquam
 Iuba apud Scenitas Arabas præfert omnibus saporibus, quam vocant dabulan.
 Quædam in Syria, & Ægypto in binos diuidunt se truncos, in Creta & ternos, 20
 quædam in quinos. Ferunt statim in trimatu. In Cypro verò, Syria, Ægypto
 quadrimæ aliæ, aliæ quinquennes, altitudine hominis, nullo intus pomi ligno,
 quandiu sunt nouellæ, ob id spadonū accepto nomine. Sterilibus ad materias,
 operumq; lautiora vitur Assyria, & tota Persis. Sunt & cædæ palmarum quoq;
 syluæ, germinantes rursus ab radice succisæ. Dulcis medulla earum in eacumi-
 ne, quod cerebrum appellant: exemptaq; viuunt, quod nō aliæ. Vocantur au-
 tem chamæropes, folio latiore, ac molli, ad vitilia vtilissimo. Copiosæ in Cretâ,
 sed magis in Sicilia. Fructiferarum aliis breuius lignum in pomo, aliis longius,
 his mollius, illis durius, quibusdam osseum, lunatumq; dente cōtra fascinantes
 religione politum. Aliud pluribus vestitum, paucioribusve tunicis: aliud cras-
 sioribus, tenuioribusve. Fructuū quoq; plura genera. Differunt figura rotun-
 ditatis, aut proceritatis. Differunt & colore nigriores, ac rubetes. Nec pauciores
 ficu traduntur colores, maximè tamē placent cādidi. Distant & magnitudine,
 prout multi cubitum effecere: Quidam sunt nō ampliores faba. Alexandri mi-
 lites palmis viridibus strangulati sunt. In Gedrosia id factum est pomi genere,
 alibi copia euenit. Est enim tanta musteis suauitas, ut finis mandendi non ni-
 si periculo fiat. At in meridiano orbe præcipuā obtinent nobilitatem syagri:
 proximamq; margarides. Eæ breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis si-
 miliores, quare & nomē a margaritis accepere. Vna arbor earum in Chora esse
 traditur, vna & Syagrorum. Mirumq; de ea accepimus, cum phœnice aue, quæ 40
 putatur ex huius palmæ argumento nomē accepisse, emori, ac renasci ex se ipsa,
 (quod

(quod erat prius)
 & à cæteris generi-
 cui dentissimeq;
 dine appellatum.
 dunt, non raritate
 celebrantur, & cil-
 orienti, iniqua ca-
 nobilitas in ludæa
 Archelaide, & Ph-
 præcipua succo pi-
 Sicciore in hoc g-
 rum longitudine
 ob hoc adelphid-
 Tertiū ex his ge-
 etiam in sua ma-
 iacens, dactylis p-
 deorum dicamus
 Arabicæ, macro-
 quàm cutem ob-
 tas,) & farinæ mo-
 libus, folio latiore
 vocant. Trienni-
 Apud nos palmæ
 candidi sunt. Gen-
 Plinius chamærop-
 vulgo dicta Terra
 vilitur, quæ iuxta
 palmola dicitur.

30 Et Silius,
 Palma
 Sed cur Plin-
 quendam fuisse
 gregia indole
 paulo plenior
 rator, eumq;
 dine præcipua
 colai ab Augu-
 sopher, crebro
 40 Palma non
 pe suos hospite

(quod erat prius) pomis refertam. Ipsum pomum grande, durum, horridum, & à cæteris generibus distans, sapore ferino, quem ferme in apris nouimus: euidentissimeq; causa est nominis. Quarta authoritas sandalium à similitudine appellatum. Iam in Æthiopiæ sine quinque earum, nec plures arbores tradunt, non raritate magis quam suauitate mirabiles. Ab his caryotæ maxime celebrantur, & cibo quidem, sed & succo vberimæ. Ex quibus præcipua vina orienti, iniqua capiti, vnde pomo nomen. Sed vt copia ibi atque fertilitas, ita nobilitas in Iudæa, nec in tota, sed Hiericunte maxime, quanquam laudatæ & Archelaide, & Phaselaide, atq; Liuiade, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua succo pingui lactentibus, quodamq; vini sapore in melle prædulci. Sicciores in hoc genere Nicolai, sed amplitudinis præcipuæ, quaterni cubitorum longitudinem efficiunt. Minus speciosæ, sed sapore caryotarum sorores, ob hoc adelphides dictæ, proximam suauitatem habent, non tamen eandem. Tertiū ex his genus patet, nimio liquore abundans, rumpitq; se pomi ipsius etiam in sua matre ebrietas, calcatis similis. Suū genus est, sed è sicciore turba iacens, dactylis prælonga gracilitate curuatis in terrā. Nam quos ex his honori deorum dicamus, chydæos appellauit Iudæa. In totum arentes Thebaides, atq; Arabicæ, macro corpore exiles, & assiduo vapore torréntes, crustam verius, quam cutem obducunt. In ipsa quidem Æthiopia friatur hæc (tanta est siccitas,) & farinæ modo spissatur in panē. Gignitur autem in frutice ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore, quam mali amplitudine; cymas vocant. Triennio maturescunt. Semperq; frutici pomū est subnascante alio. Apud nos palmæ fructus variū sunt generis, alii enim crocei, rubescentes, alii candidi sunt. Genus Theophrasto humile dictū, quo Creta, & Sicilia abundat, Plinius chamærope appellat, Palladius, cefalonem. Nobis copiose affertur ex vulgo dicta *Terra del police* fortasse à Pollucis templo, quo loco cadauer illius visitur, quæ iuxta Lylibeum sita est, antiquitus Selinis dicta, ob id à Vergilio palmola dicitur:

— *Palmosa Selinis.*

30 Et Silius,

Palmis quoque Selinis.

Sed cur Plinio Nicolai dicantur, comperio apud Plurarchum, Nicolaum quendam fuisse peripatericæ familiæ philosophum, suauissimis moribus, egregia indole præditum, corpore procero quidem, sed non indecoro, facie paulo pleniore sparsa puniceo rubore, quo cum maxime oblectaretur Imperator, eumq; diligeret plurimum, similitudinis argumento, balanos magnitudine præcipua, & pulchritudine nicolaos dici instituit. Ex Athenæo verò, Nicolai ab Augusto in primis nominati in honorem Nicolai peripatetici philosophi, crebro eas ad illum mittentis.

40 Palma non omnium prouinciæ hospes, nec ubiq; fructuaria est, sed sæpe suos hospites fallit fructu, & maturatione. Theophrasto auctore æstuosi

aëris auida est, imo gaudet excessu, quocirca in Babylone, & Syria fructu præcellit, & nisi caliditas faueat plaræ, fructus non maturatur. Si quis è Babylone in Græcia serat, peregrini cœli ignara sterilefcit, sed si quis è Græcia in Babylonem serat, reddi fructiferam, ac loci illius domesticam dicunt. Diximus de Cypro, Creta, Æthiopia, & Ægypto. Plinius, Nulla est in Italia sponte genita, nec in alia terrarum parte, nisi in calida: frugifera verò nusquam nisi in feruida. Iudæa inclita est vel magis palmis, nec in tota, sed Hyericunte maxime. Sunt quidem & in Europa, vulgoq; in Italia, sed steriles. Ferunt in maritimis Hispaniæ fructum, verum immitem, dulcem in Africa, sed statim euanescentem. In Oriente maxime vigent. Quamobrem iure dicentur externæ. Diximus in Assyria, Syria, Ægypto, Creta, Cypro, Babylone, Æthiopia, Arabia nasci. Fastidit palma vbique nasci, aut nata parere, vel cum promissit etiam, ostenditq; ea educare, quæ tanquam inuita peperit. Palladius locis delectari apricis, & calidis dixit. Idumæa Syriæ regio palmis abundantissima est, vnde Virgilius,

Primus Idumæas referam tibi Mantua palmas.

Lucanus,

Et arbusto palmarum diues Idumæ.

Silius verò:

Palmiferamq; senex bello domitabit Idumen.

Persiam vsq; ad Melenem, & mare magnum palmis abundare scribit Ammianus, vt instar ingentium nemorum videantur. Dioscorides in Ægypto gigni scripsit. In ipsa Ægypto apud Tentyram præciosa sunt. vnde Iuuenalis,

Qui vicina colunt umbrosa Tentyra palma.

Plinius etiam. Essenigens sola, palmarum locia: infra hos Engadda oppidum fuit, secundum ab Hierosolymis fertilitate, palmorumq; nemoribus. Quod ab eo Solinus etiam affert.

Solum.

Theophrastus solum arenosum, saluginosumq; concupiscere scripsit. Quodq; tale appetat locum illud argumēto est, quod vbi palmarum copia sit, humus arenosa concernatur, quippe Babylonem, in qua palmæ nascuntur, ita esse aiunt. Sic Africam, Ægyptum, Phœnicem, & Syriam quoq; cauam cognominatam. Plinius ex eo, Gignitur leui, sabulosaq; terra, maiore in parte, & nitrosa: salsumq; ab his solum diligitur. Anatolius scribit ab ea solum concupisci salisam terram, & ad omnia ineptam, & sic optimos fructus proferre, quapropter sua regio, quia saluginosa, optima erat ad palmarum plantationem. Palladius terram solutam, vel sabulonem requirere scripsit. Ceterum non solum saluginem, sed etiam riguum locum palmam concupiscere narrat Theophrastus, nec admodum in profundo aquam, & dulcem, & salisam inuicem propinquas habere oportet. Pars Africa in qua nunquam pluit, palmas magnas, atq; optimas producit. Aquam item subditam palmis ad Ammonis delubrum esse ferunt. Plinius: Gaudet & riguis, totoq; anno bibere cum amer,

met, anno
falsis iuu
rus Iudæa
aquis irige
stis sit, & n
Palmas
degenerant
tribus insu
germen eni
pter in earu
principium
plantatio e
dis caudic
foratis. Ex
na, super
scunt. Virg

Serenda
20 cubitorum
bet, præter
clei palmul
rientem sp
Quotidie d
terra credi
transferri.
rendis. Ocl
recentia ol
eligimus n
30 cas, aut in
tio mense
rum vrinæ
ferantur.
Sunt qui
ex his on
re: quod
Seritu
tissimè g
lemq; adi
40 pars maior
Ergo plan

met, anno sitienti, squallidoq; lætior est. Palladius: Aquis palmæ aliquatenus falsis iuuantur, & si tales eas natura non præbuit, infici debent salibus. Diodorus Iudæam omnibus in locis palmetis fertilem describit, quæ fluminibus, & aquis irrigentur. Scribit etiam Theophrastus ancipitis esse vitæ, & quæ terrestris sit, & mari nonnunquam viuat. Vita in sicco æque vt in humore.

Palmas Theophrastus ex his esse dicit, quæ semine tantum nascantur, non degenerantes, sed in suo genere persistentes. Serantur autem ligna, quæ fructibus insunt, bina iuxta composita, superque totidem, omnia tamen prona, germen enim non de supinis, cauissq; partibus mittunt, sed è supernis, quapropter in earum coniunctione quæ superponuntur, minime est operiendum principium, vnde germen. Plura simul seri debent, quoniam infirma singulis plantatio est, horum radices amplexu mutuo connectuntur, in vnum ex cunctis caudicem primo ortu promiscuo coeunt. Seriturq; fistilibus in vasis perforatis. Ex quo Plinius, Seritur autem pronum, & bina iuxta composita femina, superque totidem, quoniam infirma singulis planta est, quaternæ coalescunt. Virgilius etiam semine nasci cecinit,

*Chaoniæq; patris glandes, etiam ardua palma
Nascitur.*

Serendarum palmarum ratio à Leontio ita traditur: In excavatis duorum cubitorum altitudine, & totidem latitudine scrobibus, & aggere fimo quolibet, præter caprillum, saginato, sesquipodem in altum completis, ossa seu nucleï palmularum humantur, ea tamen conditione, vt eorum mucrones in Orientem spectent, dein terra stercore satiata post respersum salem obruuntur. Quotidie dum germinant imbre, rigantur. Palmarum verò semina non illico terræ credi debent, sed fistilium fundo mandari, & vbi comprehenderit transferri. Palladius: Cui placet curas agere sæculorum, de palmis cogitet serendis. Octobri mense dactylorum non veterum, sed nouorum, ac pinguium recentia ossa debet obruere, terræ cinerem miscere. Nos autem palmulas eligimus maiores, pinguiore, quæ ex arbore vnquam pependerit, non siccas, aut in rugas contractas, sed quæ conspicuo succini colore micent, ac Martio mense vsq; ad Maium seri possunt ossa: vt visolis citius nascantur, puero-rum vrina, aut salsa aqua, aut dulci permixta sale biduo madescant, fistilibus serantur, vt post sextum, vel decimum annum transplantentur in terram. Sunt qui scribant maris, & fœminæ ossa simul colligari quatuor, vt vna planta ex his omnibus efformetur, sic fœminam mascula ad sui fœtificationem egeret: quod mihi plane commentitium videtur.

Seritur etiam viuiradice. Nam Theophrastus mutatione sedis vehementissimè gaudere scripsit, easque anniculas transferunt, & bimas iterum, salemq; adiciunt, idq; vere faciunt. Sed Babylonii circa sydus, & ad summum pars maior eo tempore serit, vt proueniat, crescat celerius. Ex quo Plinius: Ergo plantaria instituunt, anniculasque transferunt, & iterum bimas. Gau-

dent enim mutatione sedis, verna alibi, in Assyria autem circa carnis ortum. Leontius verò: Sunt qui plantas transferant, alii vernaculo situ contenti sic inolescere patiuntur. Palladius, Si plantam velit, ponenda est Aprili mense, vel Maio, ita tamen, ut quando planta deponitur, circa eam, vel sub ea pinguis terra fundatur. Annicula transfertur, aut bima, Iunio mense, vel Iulio incipiente. Nos quod huc afferamus, nil habemus, cum nostris regionibus vix semine ferantur ob specimen. Didymus auulsione etiam plantari posse dixit. Plinius, Ab radice auulsæ vitalis est satus.

Quod etiam propagari possit scribit. In Assyria arbor strata in solo humido, tota radicitur, sed in fruticem, non in arborem abit. Theophrastus ramos superne caesos in locis Græciæ si quis ferat, radicem demittere, & germen non solum è cerebro nasci, verum etiam subtus radicari, largius asserit. Plinius etiam, E ramorum tenerimis vitalis est satus.

Trunco etiam nasci posse docet Theophrastus, cum supernam partem auferunt, qua cerebrum includitur. Auferunt enim duorum cubitorum longitudine, quam fissuris humore ipso detracto defodiunt. Item si truncus inuersus ponatur, sitque solum humidum, multis partibus radices dimitti, & germina dari exploratum habet. Id tamen maiorem amplitudinem capere nequit. Ex eo Plinius: Seruntur autem palmæ & trunco duorum cubitorum longitudine à cerebro ipso arboris viridi fissuris diuiso, atque defosso.

Fit quoque satus è virgis, & à Theophrasto iidem edocetur, hoc modo: Virgas enim tenerimas Babylonios viuiradices efficere, adultasque transferre accepimus, ex quibus palma facile procreari potest, tum humi feracitate, tum nascendi facilitate. Tenerimæ enim virgæ petuntur, quia tales humidissimæ sunt: sed è cerebro potius, quam imis partibus germen prodire ratio est. Huic enim & virgarum exortus, & omnino velut principium quoddam vitale est. Ortus vndique propterea sequitur, quia humor, calorque naturalis vbiq; aliquandiu valet perdurare; scilicet ea de causa, quia ob angustiam meatuum prohibetur exuccatio illa.

Trogus palmas foliis feri apud Babylonios scripsit, atque ita arborem producere, quod Plinius admiratur.

Cultus.

Theophrastus ait, Nouellam minime tangunt, sed comas duntaxat ei reliquant, ut procera assurgat, nec virgæ torqueantur. Post hæc deputant, cum iam maiuscula sit, & crassitudinem habeat ad magnitudinem palmi. Quandiu nouella est, fructum nullo intus ligno producit, postea cum ligno. Quidam Syrios nullam adhibere culturam, sed purgare tantum, atque irrorare affirmant. Plinius ex eo: Nec ferro attingunt in Assyria nouellas, sed religant comas, ut in altitudinem exeant. Robustas deputant crassitudinis gratia, semipedales ramorum relinquentes truncos, qui decisi alibi necant matrem. Aquam scaturientem potius, quam pluuiam eas quarere aiunt. Talem autem in conualle, qua palmaria insunt exuberare. Conuallem hanc, per Arabiam usque ad rubrum

brum tenderem
In eius itaque conu-

De fimo in
statuunt, eamque
incrementum in
miscere oportet,
ipsum cum aqua
Plinius, A fimo
rius miscetur.

10 Salem concup
agricola sal asper
portet, sed long
asperitas in pal
curas agricolaru
& germination
ria, nil refert, na
lo, & radicibus
& distam facit
hunt ex apertis

20 stare non possit
men radicibus re
comptum est
re proprietati in
stant, ob id sale
quantum exigui
salum ab his fol
bus, sed longius
tannis ablaquea
tatem exhibunt.

30 infici debent sa
Aristoteles
mus semella
Discernitur m
si ventus mal
Theophrast
connumera
rare, & mat
larunt. Que
re semetgun
40 ner super fru
Aus nullo pa

brum tenderemare Syrios affirmare, ac plerosq; qui inde venissent, referre. In eius ira; conuallis parte cauiissima palmas exoriri enarrant.

De fimo inter scriptores non constitit. Quidam ab eo prorsus abhorre-
re statuunt, eamque quouis modo delectari negant. Alii vsum fimi concedunt,
incrementum inde magnum consequi affirmantes. Riuis tamen fimum im-
miscere oportet, inquit, quemadmodum Rhodii facere solent, & fimum
ipsum cum aqua vtilem & sine aqua non esse contingit. A Theophrasto hæc
Plinius, A fimo quidam etiam lædiputant, & Assyriorum pars aliqua, si non
riuis misceatur.

- 20 Salem concupiscere scripsimus, iccirco, vbi saluginosum solum non sit,
agricolæ sal aspergunt, quod quidem circum radices facere haudquaquam o-
portet, sed longius amandando accumulare, quantum semestarius. Est &
asperitas in palma, auferturque ab ea vi salis ab initio. Sed nil peculiarius inter
curas agricolarum, quàm sal, quod radicibus palmarum adicitur; quod opus
& germinationi, & fructificationi conducibile est. Sal ne adhibeatur, vel mu-
ria, nil refert, nam vbi sal in solo non sit, salis ope subueniunt. Sed ratio in so-
lo, & radicibus requirenda est; sal terram, & radices afficit: sal terram leuem,
& distitam facit, & radices vegetiores, crassioresque, nam pabuli plus tra-
hunt ex apertis meatibus, & causa est refrigerationis, cum stercoreatio idem præ-
stare non possit: etsi palma calidum quærat aërem, vt maturescat fructus, ta-
men radicibus refrigerari desiderat, quod sal præstat. Babylonis experientia
compertum est sale iuuari palmam, non fimo. Quod sal pro fit pama, Natu-
ræ proprietati imputandum, materies enim arborisque radices à cæteris di-
stant, ob id sale remorsa, alimentum vberius trahunt, vt sibi satis habeant, &
quantum exigitur ad fructum nihilo secius queant suppeditare. Plinius dixit
falsum ab his solum diligi, ergo vbi non est tale, salem aspergunt, non radici-
bus, sed longius paulo. Leontius, Cæterum cum falsa humo gaudeant, quo-
tannis ablaqueare conuenit, & salem iniicere, sic celeriter in magnam proceri-
tatem exhibunt. Aquis palmas aliquatenus salis iuuari scripsit Palladius, quæ
30 infici debent salibus, etiam si tales eas natura non præbuit.

Aristoteles: In palmis si folia, vel foliorum puluis, vel palmæ masculæ ra-
mus scemellæ apponatur, maturescit ei fructus, eorumque casus prohibetur. Morbi et
remedia.
Discernitur mas à scemina, quia prius folia eius pullulât, & sunt minora. Quod
si ventus masculæ odorem ad sceminam duxerit, maturescunt earum fructus.
Theophrastus inter arbores, quæ maxime fructum amittere possunt, palmam
connumerat. Palmis autem mascularum coitum referunt. Hoc enim & perdu-
rare, & maturescere fructus efficit, & ob similitudinem caprifigatione appel-
larunt. Quæ sic fieri solet: Dum mascula floret, spatham abscedentes, qua flo-
res emergunt protinus, & lanuginem, & florem, & puluerem, quem conti-
40 ner super fructum sceminæ decutiunt. Illa sic eo aspersu afficitur, vt suos fru-
ctus nullo pacto amittat, sed cunctos conseruet; vnde fit, vt duplici adimen-

to mas esse fœminæ valeat. Fructiferam enim fœminam quoq; facit. Sed alterum coitu, alterum alia ratione contingit. Causam dicere aliquis fœminam ad perficiendum minus sufficere, & cum conspicua putetur caprifactionis ratio, in palma nulla causa dari potest. Ex quo Plinius: Perdit facillime ante maturitatem fructus palma. Cetero non sine maribus gignere fœminas sponte edito nemore confirmant, circaq; singulos plures nutare in eum pronas blandioribus comis. Illum erectis hispidum, afflatu, visuq; ipso, & pulvere etiam reliquas maritare. Huius arbore excisa viduas post sterilefcere fœminas. Adeoque est Veneris intellectus, ut coitus etiam excogitatus sit ab homine, ex maribus flore, ac lanugine, interim verò tantum pulvere insperfo fœminis. 10
Caterum non est silentio prætereundum, quod Leontius veterum testimonio fretus memoria prodidit: Palmas vehementi se prosequi amore, ita ut altera alteram depereat: adeo inest Veneris intellectus, nec prius ardenti desiderio, cupiditateq; leuabitur, quam ipsam adamat mas consoletur. Quandoquidem videre licet pronam suis comis incumbere, impatientemque suum non ferre stabilimentum, quin & quasi viduam sterilefcere, quæ res agricolam non latet, sed cuius amore desflagret, aut in quem maritandi cupidine sollicitetur, incompertum habet. Quapropter complures palmas inibi circiter obstitas digitis contrectans, ac blande demulcens, reuersus ad hanc denuo, quæ corripitur amore, & manibus dato tanquam osculo contingit, tum quæ 20
damtenus veluti refricato huiuscemodi desiderio denunciâns, blandioribus comis, perinde quasi manibus in eum nutat, cuius cupidinis rabe peribat, hoc velut oculorum gestu amorem confessa, seseque huius studio constimulata, quasi radicibus abiicit. Huius vesaniæ remedia sunt, si subinde manus ei admoliatur agricola, quæ marem, cuius inani amore capiebatur, attingerit, multo magis insanus amor discutietur, si maris flores capite erutos amantissæ capiti circumponat, hæc mariti ornamento collustrata fructum dabit, hocq; pignore amoris exhilarata fœcundabitur. Herodotus scribit, Babylonios palmas curantes more ficorum. Harum, ut aliarum arborum Græci masculas vocant, quarum fructus his, quæ palmulas ferunt, alligant, ut illinc prodiens culex palmulas penetrans cogat maturefcere, alioqui occasuras. Ferunt eorum mares quemadmodum caprifici culices. Athenæus ex eodem idem affert. Nobiliorem creati fructum Democritus promittit, si inutiles vagina, thecave, quas nonnulli helices florentes vocant, ubi resicata fuerint, palmarum caudicibus quemadmodum caprifici ficis adpendeant. Claudianus hæc innuit,

Viuunt in Venerem frondes, animisq; vicissim

Felix arbor amat, nutant ad nutua palma

Fœdera.

Vberiores & proceriores adolefcere pollicetur Didymus, colata vini veteris fœce, & radicibus affusa. Iuuari quoque consperfo itidem sale. Palladius, Si 40
ægra est arbor, fœces vini veteres ablaqueatæ oportet infundi, vel radicibus

cum

V
cum superuacua
bus premi.

Vulnerato co
germinatiavein
aeris calorisq; ali
descendit. Arbor
decaumination
meatum rectit
& frigoribus, cu
propter transmi
quia alimentum
ca singulari radi
superfluit, nec
gendæ proli in
ea si depascatur
test ad causam i
men, & fructu
non feret ergo fi
regionibus, in q
butdam debilita
ferat sterilefcit
rarur, ex Nican

Theophrastu
rea incuruatur
dus fornicatim
curuatur, & è co
quam de caul
omnia. Alii su
certatim cooria
30 imagine, idq; t
in un exen, id est
statem. Alii su
interitu, & se
macrobia sit

Huic etia
succrescunt a
ornatur, qua
tendum sit, le
40 ens, de sacra
præmium est

cum superuacua capillamenta decidi. Vel cuneum salicis interfossis radicibus premi.

Vulnerato cerebro palmam emori tradit Theophrastus: vis enim vitalis germinatrixve in eo sita est, quam obrem cum id resiccatum, alteratumq; sit, aeris calorisq; alieni intrusu corrumpitur, partisq; superioris perniciēs ad ima descendit. Arboris peculiaris natura est, ut pars ea vitæ auctrix sit. Interit etiam decacuminatione palma, idq; non sine ratione contingit, scilicet sua siccitate, meatuum rectitudine, & radice simplicitate, vulnus præbet aditum caloribus & frigoribus, cum sit circulare, & superincumbens facile ad ima descendit, propter transmissionis facilitatem, quia recta est, nec ipsa radice pullulat, tum quia alimentum superioribus partibus ministrat, tum radice siccitate. Præterea singulari radice prædita, & alte descendens, nusquam alimonix quicquam superfluit, nec verò dimotum aliorum se vertit, itaq; sit, ut nullum sit exurgendæ prolis initium: Vnde omnino huic mortem sequi necesse est. Præterea si depascatur palma, ei exitium non affert, sed sterilitatem. Refertur hoc potest ad causam iam dictam: ex offensione principii finem ladi. Iam est germinem, & fructus nondum est, quia futurus, absumitur succus in germine, non feret ergo fructus absumpta materia. Sed id fortasse non patitur in suis regionibus, in quibus non sunt, ut apud nos, peregrinæ. Plinius ex eo. Quibuldam debilitas sterilitatem non necem affert, ut si quis palmæ cacumen auferat: sterilescunt enim nec moriuntur. Cum cerebrum eruitur palmæ, efferratur, ex Nicandri traditione.

Theophrastus ait. Palmæ materies prævalida est, & in diuersum, quàm cætera incuruatur, quippe cum non infra flectatur, pandaturq;: sed contra pondus fornicatim surgit. Ex quo Plinius: Palmæ arbor inualida, in diuersum enim curuatur, & de contrario fornicatur. Querit Plutarchus Symposiaca non octauo quam de causa alia certamina alias habeant coronas, palmam communiter omnia. Alii sunt à foliorum æquabili ordine institutum id esse opinantes, cunctatim cooriantur, & quodammodo simul currant, quadam contentionis imagine, idq; tacito naturæ consensu, tum victoriam dicunt, quasi *τὸ μὴ εἶναι*, id est, à non cedendo. Alii ob pulchritudinem, & germinandi venustatem. Alii sunt opinantes victoris gloriam quantum omnino fieri potest ab interitu, & senio immunem esse, cum palma inter longæuas plantas maxime macrobia sit, id est, longioris æui. Id Orphicum illud comprobare videtur, *Animal æquale longicomis palmæ ramis.*

Huic etiam congruere videmus, quod arboribus decussis prioribus foliis succrescunt alia, palma nullum abiiciens de se natum folium, suis semper foliis ornatur, quam vim victoriæ arbori accommodant. Sed si quid ex historiis petendum sit, legitur in Atticis, quod Theseus primus in Delo cerraumen instituit, de sacra palma frondē auulsi, inde spadice dictam. Videtur etiam hoc præmium esse Pythicū, quod Amphictyones Pythiis primum victores in ho-

norem Apollinis lauro, ac palma coronauerint. Sed peculiare præter hæc omnia, & cum nulla alia planta cōmune, quod palma si superne imposito onere premas, non deorsum inflectitur, sed contra incuruatur, quasi vi renitens prementi: ita res se habet in athleticis certaminibus, imbecilles enim, & molles flectuntur, & deprimuntur, qui verò validi sunt, non corpora modo, sed animi etiam eriguntur. Tradit Pharnutus, Musas palmis coronatas propter homonymiam: quod Phœnices primi inuenisse literas credantur, nam palma (vt diximus) Græcis *palme* dicitur, sed ratio magis probat ob arboris teneritudinem, propter quam non facile scanditur, sicut nec ad Musas & Poësim: vel propter eius virorem, & beneficentiam, nam dulcissimos fert fructus. L. 10
Papyrio, & Sp. Caruilio cons. deuictis Samnitibus, captisque illorum oppidis Aquilonia, & Cominio, palma data est, more tunc primum è Græcia in Romam translato, vnde postea inoleuit, vt victores spadicem haberent. Virgilius,

Eliadum palmas Epeiros equarum.

Victoriam ob id eam palmarem Apuleius vocitat, & palmatis vestis triumphantium fuit, & palmaris statua, quæ alicui propter victoriam erigebatur. Sed de palma victoriæ symbolo hæc tenus. Palma item ex Theophrasto materie tractatu facili, & cum dolatur & ferratur, molliore & lentiore, quam suberis: suber quidem rigidus est; quare simulachra è palmis condere cœperunt, repudiata, spretaque, suberis materia, vt incommoda. Cremata fumo infestat, de quo & Cheremonis poetæ carmen. Palmas ad venas vsque, & radice tenus esse fumosas.

Palma Deli longæua proditur. Plinius: Quæ in laminas secatur, cuiusque operimento vestiatur alia materies, præcipua est palma. E palmis prunæ viuaces, ignisque lentus. Palma Deli ab eiusdem Dei ætate conspicitur. In Oriente funes validos è palmæ foliis fieri dictum est, eosque in humore vtiliores esse, & apud nos ferè palmis à messè decerpuntur. Ex his meliora, quæ sese non diuiserint. Siccantur sub tecto quaternis diebus, mox in sole expanduntur, & noctibus relictæ, donec candore inarescant, postea in opera finduntur. Didymus scribit candidos, & ad implexus regetum, sportularumque aptiores reddi spadices, si à termitibus enulsi virides, quaternis diebus sub tegmine condantur, postea sinamus quatrimum imbre rorido perfundi, deinde solibus, dum inalbescant, exarescere.

Ceditura. Palmulæ, quæ condi & reseruari possint, Theophrastus in arenosis locis nascantur oportere dicit, vt in Calesyria, tribus duntaxat locis, ubi arenæ sint, proueniant: alibi computrescunt. Recondi autem fructus, qui in Syria nascuntur, illos tantum posse, quos palmaria conuallis parturit, narrant, qui verò in Ægypto, Cypro, & alibi gignuntur, hos adhuc recentes omnes cōsumi. Ex eo Plinius: Seruantur hi demum, qui nascuntur in salis, atque sabulosis, vt in ludæa, & Cyrenaica Africa, non item in Ægypto, Cyro, Syria, & Seleucia

era Altyrix: quam
verusti eius pomi
ferit. Thebaidis
ni ita fiat, celeriter
quanto citius pro

DIXIMVS d
quia medi
prima è pomis co
10 quarum Græca n
non fuisse in Itali
vexit è Ponto. a
næus memoria
primum arbore
fructumque ge
Siphnius vir arte
pote qui Lysima
minit. Cerasa, in
menti, stomacho
20 bentiora præstan
inquit, antequam
sed durū, & corn
est vocatum.

Græcis, Latin
gum, & uogaw à
ctus cerasum. Se
Ciregio, & Cirap
Theophrastu
liarem naturam
30 crassa quaternis
spili, prædure,
meatu flexo, p
biat, ab imos
scriptio est.
præscinditur
præternis mo
nec iactura hu
est humor, el
mucosa: & vi
40 resarcit. Neru

era Allÿria: quamobrem sues, & reliqua animalia his saginantur. Vitiati, aut vetusti eius pomi signum est decidisse candidam verrucā, quæ racemo adhæferit. Thebaidis fructus ex tempore in cados conditur, cum sui ardoris anima: ni ita fiat, celeriter expirat, marcescitq; nō retostus furnis. M. Varro, Palmulas quanto citius promas, iucundiore vtare, quod vetustate palmula fit cariosior.

De cerasis. CA P. XXIII.

DIXIMVS de baccis, dicturi de acinis. Nunc historiam cerasi cōtexemus, quia medium genus habet, inter baccas, & acinos, authore Plinio. Inter prima ē pomis colonio annuam gratiam refert. Peregrinæ & cerasi, & omnes, quatum Græca nomina, aut aliena. Ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuere in Italia, ad vrbs annum sexcentesium octogesimum, is primum vexit ē Ponto. annis cxx trans Oceanū in Britanniam vsq; peruenire: Athenæus memoriæ prodidit, Lucullum debellato Mithridate victorem reuersum, primum arborem hanc à Cerasunte Pontico municipio in Italiam detulisse, fructumq; gentilitio nomine cerasium appellasse. Veruntamen Diphilus Siphnius vir arte, & facundia celebris, longis annorum curriculum vetustior, vt pote qui Lysimachi regis successoris Alexandri ætate vixisset, cerasorum meminuit. Cerasa, inquit, bonum succum creant, sed parum subministrant alimentum, stomacho grata sunt, & eidem auxiliantur in frigida sumpta. Sed rubentiora præstant, & Milesia, quæ vrinam pellant. Sed Seruius grammaticus inquit, antequam ē Ceraso vrbe Lucullus adueheret, cerasium erat in Italia: sed durū, & cornu appellabatur, quod postea mixto nomine cornocerasium est vocatum.

Græcis, Latinis, & Italis cerasus eodem nomine appellatur. Græcis enim *κεράσιον*, & *κεράσιον* à Cerasunte gentilitio, vt diximus. Latinis arbor cerasus, fructus cerasum. Seruius pomum cerasium, non cerasum vocitari præcipit. Itali *Cireggio*, & *Ciraso*.

Theophrastus satis anxie eius descriptionem profecutus est. Cerasus peculiarem naturam sortita est, ad quatuor, & viginti cubita proceritatis erigitur, & crassa quaternis dodrantibus à radice, siue bicubitali crassamento. Folio mespili, præduro, & latiore. Corticis lauiore, colore, & crassitudine tiliæ similis. Is meatu flexo, nec complente gyrum obducitur arbori, quasi mucronatim ambiat, ab imo sursum in angustias sese colligens, qualis in fronde quoq; ipsa descriptio est. Quum desquamatur, hoc eodem modo delibrari solet, alioquin præscinditur potius, quàm filo eodē detrahi possit. Quin & per crassitudinem prætenuis modo folij finditur, reliquumq; durare, arboremq; tueri valet, nec iactura huius arbor ipsa emoritur. Quod si totum deglubas, qui reliquus est humor, elabitur. Porro tunica exterior adempta nigricat pituita quædam mucosa: & vice eius secundo anno tenuior subnascitur, priorisq; damnum refarcit. Nerui ligno contorti, conuolutiq; in anfractus, vt cortici: virgæ con-

tinuo nascuntur eodem modo. Rami dum adoleſcunt, alij pereunt, qui ab imo ſparguntur, alij continuo creſcunt, vt ſuperi. rama proſus arbor nō eſt. Paulo enodior, quā populus. Flore albo pyri, vel meſpili, pluribus ſoſculis racematim congeſto, fauaceo. Fructu rubro dioſpyri figura, magnitudine fabæ, quamquā acinus dioſpyro prædurus, ceraſo mollis. Radix multiiuga, ſumma telluris cute niritur, nō crāſſa. Contortio eadē radicis, & corticis radicē tegentis. Athenæus à Theophrasto deſcriptionē deſumens, ait: Florem habet ſimilem pyro ſylueſtri, eumq; pluribus ſoſculis, veluti faui, cōpoſitum: fructū rubicundū, ſimile melampyro, fabæ magnitudine, niſi quod melāpyro nucleuſ eſt aſper, ceraſo mollis. Hermolaus Theodori verſionē non probat, nam dioſpyrō Theophrasti Iouis flammā ipſe interpretatus eſt, cū Iouis triticū dicere debuiffet, quandoquidē vulgo granū ſolis dicatur. Sed Plinius aliter ceraſum deſcribit: Ceraſus lotipenē natura eſt. Ramaſa admodū. In quadraginta cubitorū trabes æ quali per totū duorum cubitorū crāſſitudine reperiri dicuntur. Cortex libris ſimilis, cuius humor gummoſus. Pomū extra carnē habet, intus lignū, conſtatq; cute, & ſucco. Primo candicāt bacca, mox rubent, deindē nigreſcūt. Succo ſanguineo præditū. Non alternat fructus, quia lignū carnoſum habet, nō vt olea, cui ſiccum lignum. Pullulat ab radice denſa. Vnde Virgilius,

*Pullulat ab radice aliis denſiſſima ſylua,
Vt ceraſis.*

Genera.

Plinius octo ſui temporis ceraſorū ſpecies ponit, quem ſequemur. Et primo Aproniana maxime rubent. Apud nos huiuſmodi generis multa ſunt ſpecies, habent magnitudinem, & molliem, ex omni parte maximē rubent, & quia nobis Surrento optima afferuntur, vulgo *Ceraſa di Sorrento* vocamus. Actia nigerrima ſunt. Hæc nobis *Ceraſa di Lettere* dicuntur, inde enim nobis exportantur, & Coruine. Corpore magna, & nigerrima ſunt, vt veſcentium manus & labra ſanguineo viridi ſucco, mororum more, inſiciant. Hæc raro menſis apponuntur, cū mantilia deturpent. Cæciliana verō & rotunda. Exiſtimarem, quæ Neapoli vulgo *Imperiale* dicuntur. Sunt enim cæteris rotundiora, ac pretio habita, parte ſoli obuerſa rubescunt, auerſa lacte candicant, ſapore dulci cum quadam aciditate miſto. Iulianis gratus ſapor, ſed penē tantum ſub arbore ſua, adeo teneris, vt geſtatum non tolerant. Matthiolus hæc in Hetrutia *Acquairole* vulgō dici, minimiq; haberi ait, quia ob aquæ redundantiam inſipida ſunt, oriſque ingrata. Sed quomodo, bone Deus, iis gratus ineſt ſapor, ſi inſipida ſunt, oriſque ingrata? Rectius igitur putandum eaſſe, quæ Neapoli *Ceraſa cannamele* dicuntur. Hæc Iulij fine maturantur, vel Iulij initio, ideōq; Iuliana dicuntur, dulci ſapore, melleo, ac plurimo ſucco prædita ſunt, adeōque mollia, vt non ſolū geſtatum non tolerant, ſed vix parum per manibus pertractari licet, quin celerius marceſcāt. Principatū duracina ſibi vendicāt. Hęc nobis *Toſtole* dicuntur, plurimæque horum ſunt genera, rubentia, callo prædura, 40

gultu præſtanti, carne nucleopertinacius hærente: alia ſunt, quæ *Olinette* dicimus,

ſimus, alia *Cornolæ* referunt, omnium ſequentia cum præ. Et quæ Pliniana Cornolæ. Tertius color per Eæſe, quæ Theophrasti viridi, rubent q; n. milia videantur, Iulianam quæ Pliniana. Si quis verō hæc v. genus illud erit, M. ingrata amaritudinis nobis ignota ſit, multos ſetellæ. Sed puto quæ Neapoli quidem cætera locum, ineſt in nimia acerbitate nobis Roma cubita excedentis creſcunt altitudinem in ſequentibus cocia, quæ Matrona eadem ratione, ſunt tunc vix modo dicuntur. Plinius ceraſa date, & trans Oceanum curauit, vt præc. Ceraſus amat coclidum non poteſt Pamphilus ceraſa ditatem cæteris iungi rigatu ad Theophrasti aquoſis montibus Pamphilus videretur, quæ ad poma adeo præſiſſe videantur. Palladius ex Arbri, vel Nou-

emus, alia *Cornole* vulgò, quia vtriusque magnitudinem, formam, & duritiem referunt, omniumq; maxime gestatum tolerant. Sunt qui legant Plinij verba frequentia cum præcedentibus annexa, sed mihi videntur separatim legenda. Et quæ Pliniana Campania appellat: in Belgica Lusitanis. In ripis etiam Rhæni. Tertius iis colos è nigro, ac rubenti, viridiq;e, similis maturescentibus semper. Ea esse, quæ *Tostole* *verdader* dicimus passim. Colore sunt mixto ex nigro, viridi, rubentiq;e, nec perfectè, albescencia ferè semper, vt maturescentibus similia videantur, Iunio maturantur, sepiissime vno pediculo duos affert fructus: nam quæ Pliniana Campani vocent, nulla hodie sunt, fortasse nomen perijt.

10 Si quis verò hæc verba cum præcedentibus annexa legere velit, vltimum hoc genus illud erit. Minus quinquennio est, quod prodire quæ laurea vocât, non ingrata amaritudinis, insitæ in lauro. Hoc genus ex lauri insitione ortum penitus nobis ignotum est, & si communi insitionis modo multoties expertum sit, multos fetellit experientia, maximo enim lauri amarore germen emoritur. Sed puto quæ Neapoli, *Visciole di Roma* dicuntur, id esse nobilissimum genus quidem cætera longe superans, magnitudine perspicua, colore sanguineo, succosum, inest in maxima dulcedine amariusculus quidam sapor, vnde fit vt nec nimia acerbitate respuantur, nec maxima dulcedine fastidium pariant, id genus nobis Roma aduectum est. Sunt & Macedonica parua arboris, raroq; tria

20 cubita excedentis. Neapoli genus id non visitur, nam omnia in magnam excrescunt altitudinem. Minore etiamnum frutice chamæcerasi. De hoc videbimus in sequenti. Multa & innumerabilia ferè apud nos genera sunt, vt præcocia, quæ *Maiatiche* dicimus, quia Maio maturantur: sic serotina *Agustegne*, eadem ratione, sunt quæ vno pediculo terna, quaternaq;e sunt, & quæ racematim vix modo dependeant, aliaq;e, sed sat sit antiqua memorasse.

Plinius cerasa gaudere septentrione, frigidisq;e dixit, ob id in Ponto abundare, & trans Oceanum in Britanniam quoque vecta, eadem in Ægypto nulla cura eualuit, vt prouenire possent, & iuxta Romam ægre prouenire. Palladius: Cerasus amat celi statum frigidum. In tepidis regionibus parua prouenit. Calidum non potest sustinere. Montana, vel collibus constituta regione latatur. 30 Pamphilus cerasum frigidis gaudere scripsit. Ob id Apulia nostra ob celi caliditatem cerasis caret, sed si necessitas cogit his locis fortè eas plantare, saltem iugi rigatu adiuuentur.

Theophrastus vbi amnes, & rigua, & omnino vbi uilea, nasci scripsit. Plinius aquosis montibus gaudere. Palladius solum positionis humectæ desiderare. Pamphilus vda loca. In nostra Campania vallis ea, quæ prius Suesulanorum fuerat, quæ ad caudinas furcas protenditur, cerasis tota consita est, quarum poma adeo proba sunt, vt Cerasuntij potius à nobis petiisse, quàm ad nos mississe videantur, solum enim leue, humidumq;e obtinent.

40 Palladius ex semine nasci probauit, immo ex eis plantaria creari posse: si Octobri, vel Nouembri spargantur poma, quæ summa facilitate nascentur. Ser-

tur & viuiradice. Vnde Octobri, vel Nouembrimense syluestrem plantam transferre debemus. Plinius, Circa brumam cerasa feri debent. Intervalla maiora esse debent, cerasis enim umbræ enormes sunt. Pamphilus auctoritate cerasus feri malorum, & pyrorum more debet. Auulsione etiam plantatur cerasus Didymi auctoritate. Nascitur etiam virga, quod Palladio experienti optime euenit. Is enim virgulta ex ceraso pro adminiculis per vineam posita, in arborem prosiluisse confirmat, tanta est huius nascendi facultas. Amat scrobes altas, & spatia largiora. Apud nos sunt quadraginta pedum.

Cultus.

Palladius: Amar continuas fossiones. Putria in ea, & sicca putari debebunt, vel quæ densius arctata protulerit, vt rareseat. Fimum non amat, atque inde degenerat. Siccis locis nos irrigamus, & optima producunt poma, sed celestibus aquis putrefiunt. Arborem formamus, vt truncus octo, vel decem pedum à terra eleuetur.

Infitio.

M. Varro, brumalibus diebus cerasus inferi solet, ait. Columella: Possunt circa idus Ianuarij cerasi, ceteræque arbores, quæ prius florent, inferi commodè. Cassianus Octobri inferit. Quintilij Aprili inferunt. Pamphilus cerasum maxime in fitione latari scripsit, neque vnquam bonum, dulcemque fructum afferre: nisi alteri arbori insitam. Diophanes cerasum in terebinthum inferi ait, in persicum, & viceversa. Plinius, Virgilij auctoritate cerasis vltimum insitum, dicit. Cerasus statutum tempus anni habet ferendi, vel inferendi vbi-
que circa brumam. Demptolibro finditur: habet enim post eum veluti lanuginem, quæ si comprehendet insitum putrefacit. Præterea in laurum inferi (vt diximus) & inde enasci cerasa laurea. Palladius verò: Inferitur mense Nouembri melius, vel si necesse sit, extremo Ianuario. Alij & Octobri mense inferenda esse dixerunt. Martialis in trunco inferi iubet. Mihi inter lignum, & corticem fel cicer semper euenit. Qui in trunco conferunt, vt Martialis dixit, omnem lanuginem, quæ circa est auferre debebunt, quæ si remanserit, insitis nocere ait. In cerasis hoc seruandum est, & in omnibus gummatiss, vt tunc inserantur, quando his vel non est, vel desinit gummi effluere. Cerasus inferitur in se, in pruno, in platano, vt alij, in populo. Ad Pasisphilum verò Palladius.

Inferitur lauro cerasus, partuq; coacto

Tingit adoptiuus virginis ora pudor.

Umbrantes platanos, & iniquam robore prunum

Compellit gemmis pingere membra suis.

Populeasq; nouo distinguit munere frondes,

Sic blandus spargit brachia cana rubor.

Nos Ianuario inferimus trunco per media fisso, & facillime comprehendit. Vnde qui in fitionibus iniantur, huic arbori incumbunt. Emplastratione etiam optime comprehendit, tempore cum arbor maturat poma, id est Maio, & Iunio. Inferitur etiam ad modum digitalis. Sunt qui in salices, & castaneas inferant.

Cerasa

Cerasa sine ossi
Democritus itam
non vulnerata pa
cyrenaicam aqua
humente charta d
octauo die eadela
clearus fructus ex
iungantur. Pallad
opus esse experiri
10 set à Martiale, doc
dicé findes, med
partes in se vineu
suras. Post amū
etum non attul
Quod falsum est
quæ adeo molli
potius in salice in
Vt præcoces vna
re cerasus fructū
20 uam nigrā ceras
ces facit, cogitq;
rat, vel si calidam
Cerasus, auct
simul incidatur c
mum corpori, ve
si concepto hum
formicas patitur
permixtum, vel
cularum fatigari
30 sum radicibus a
dat. Vel herba
nam, vel ex ear
herba fuerit, a
mo scribit. P
lem folijs des
folijs diceret
ni accedit, &
Condiend
te solis exort
40 iiciuntur, de
non nihil acie

Cerasa sine offe quemadmodū nascantur, Græci Latiniq; demonstrauere. Democritus ita monet: Si quis tenellum cerasi caudicem radice tenus scindat, non vulnerata parte ima, medullamq; auriscalpio eruat, deinde lachrymam cyrenaicam aqua dilutam dummodo sapæ crassitudinem referat infundat, & humente charta diligenter obligata adminiculo fulciat, ne lachryma effluat, octauo die eadē lachryma perfundi præcipit, vt germina ceter: sic exos, & enucleatus fructus exhibit. Sed si scylla cōsita fuerit, præstabit, vt segmenta facilius iungantur. Palladius hæc eadem, quæ ex Democrito exceperit, etiam in cerasis opus esse experiri dicit, cum de vite præcepisset. Sed quomodo aliter fieri posset à Martiale, docet. Arborem tenerā ad duos pedes recides, & eam vsq; ad radicē fines, medullā vtriusq; partis ferro curabis abradere, & statim vtrasque partes in se vinculo stringis, & oblinis fimo, & summā partem, & laterum diuisuras. Post annū cicatrix ducta solidatur. Hanc arborē furculis, qui adhuc fructum non attulerunt, inseris, & vt afferit, ex his sine ossibus poma nascuntur. Quod falsum esse demonstrauit experientia. Sed sunt apud nos earū genera, quæ adeo molli offe prædita sunt, vt ferē cum carne mandantur, existimarem potius in salice insitum modo, quo persicum enatū diximus, esse productum. Vt præcoces vuas habeat, Florentinus in cerasum vitē inserit: sic quo tempore cerasus fructū afferre solet, eo tēpore vuas afferet, hoc est vere. Pamphilus

20 vuam nigrā ceraso inseri debere, quōd vere afferat vuas. Plinius, Cerasos præcoces facit, cogitq; maturefcere calæ radicibus admota. Sed id antequā flores afferat, vel si calidam aquam sapius radicibus infundis, et si postea inarescat.

Cerasus, auctore Plinio, cortice in orbem detracto non offenditur, si non simul incidatur corpus, alioquin corticem mittit, sed non vitalem, nec proximum corpori, verum eum, qui subnascente alio expellitur. Palladius: Cerasus si concepto humore putrescit, in trunco foramen accipiat, quo possit educi. Si formicas patitur, succum portulacæ debet infundere, cum aceti media parte permixtum, vel vini facibus truncum arboris florentis adlinire. Si astu canicularum fatigatur, trium fontium singulos sextarios sumptos post solis occasum radicibus arboris iubeamus influere sic, ne remedium Luna deprehendat. Vel herbam symphoniacam circa arboris truncum torquebimus in coronam, vel ex ea iuxta imum caudicem cubile faciemus. Sed symphoniaca, quæ herba fuerit, ambigitur. Apuleius symphoniacam eandem esse cum hyoscyamo scribit. Plinius symphoniam herbam alternis, viridibus roseisq; per caulem foliis describit, in posca sanguinē reiicientibus mederi, sed si floribus, non foliis diceret, credendum esset hyoscyamum esse, quod Dioscoridis descriptioni accedit, & ad sanguinis eruptiones laudatur.

Condiendi ratio à Florētino rei rusticæ auctore sic tradita est. Cerasia ante solis exortum at bore sua decerpta in vas, substrata in fundo satureia, coniciuntur, dein cerasia superponuntur, iterumque alternis satureia adiicitur & non nihil acidij mellis aliquantum dulcescentis. Seruantur itidem interiectis

arundinum foliis, & in eundem modum alternatim dispositis in cado. Plinius, Siccatur etiam sole, conditurq; vt oliua cadis. Palladius, Cerasa nō aliter, quā in sole vsque ad rugas siccata seruantur.

Mat. 12.

Theophrastus: quia cortice similis est tilia, ob id cunas ex eo conficiunt, sicut etiam ē corticibus tilia.

De pumila ceraso. CAP. XXV.

VISVM est præsens caput à præcedenti separare, cum genus id cerasi à cæteris longè distet, tum facultate, tum quòd diuerso indigeat cultu, vt quæ à nobis præcipienda fuerint, clariora videantur. Quæ enim supra memorauimus, Galeni auctoritate aluum subducunt, ac stomacho minus cōmoda sunt, 10 at hæc acida contrario modo se gerunt; nam phlegmaticis & fluidis, superfluantibus stomachis phlegma incidunt, & exsiccant. hæc insolata reponuntur, ac viridia saccharo condita per annos asseruantur, commendanturque ad extinctus conficiendos, quibus non modo edulia sanis iucundissima præbentur, sed ægrotantibus biliosis febribus afflictis, & sitim sedant, & oris insauitatem emendant, & cibi appetentiam inducunt.

Nomen.

Videntur sub chama-cerasi nomine reponendæ, cum non in altum, sed in latum spatientur. Alij sub sylvestri genere cerasiorum posuere, cum neglectæ viuant. Græcis *ὀξυκέρα* ab aciditate dicuntur. Itali *Marasche*, *Visciole*. Neapolitani *Amarendole* vocant.

Forma.

Non frondium, & fructus effigies, quæ alioqui eadē cum superiori est, sed succus, utpote qui acidus sit, diuersitatem inter genera facit. Præterea magnitudine, & humiliori corporatura à superiori distat. Fructus longiori pediculo dependent. Succus morosa laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis expetitus. Ab imo crure maxima soboles pullulat, vt arbor vna breui tempore totum pomarium expleat.

Celsum.

Vnumquodque cœlum fert, calidum, frigidumve fuerit. In Apuleia, vbi difficile esset aliud genus provenire, frequenter nascitur, & maxima generum varietate.

Genera.

Infinita propemodum sunt huius generis varietates, quemadmodum alterius iam dicti. Differunt enim aciditate, forma, colore, nam alia diluto rubore matura, alia in nigrum vertuntur poma, sic magnitudine, temporis prouentu, aliisque diuersitatibus.

Solum.

Sicco solo, leui, areosoq; melius proueniunt, & optimos præbent fructus, etiam pingui leuiq; humido verò fructus affert, qui nimia aciditate reiciantur.

Satio.

Suis ossibus sata optime proueniunt. Quæ seminiò destinantur, eligantur maiora, coloratiora, speciosiora, & quæ breuiori pediculo dependent. Sed tardè proueniunt. Nascuntur sobole, nascunturq; etiam surculo, sui enim natura maxime viuax, & omnibus ferè modis apprehendit. Densus serenda est.

Cultus.

Arboris truncus sex pedibus assurgat. Fossiones continuas quarit. Dege- 40 nerat,

nerat, decrescit
interlucet.

Quæ in Italia
rescit, omnibus
asum inferemus
seremus, & arbo-

DE BEVERA
decora por
to lo recta iam sylu
in Italiam vener
poribus. Diolec
recenseri, cum p
prædulcis, suau
principe miris l

Lote

Sem

Dulo

Aue

Hau

Alterum genu
ad vrendum vtu
& Polybij testin
non veretur. C
vtraque zizipha
bonibus zizipha
flore, vel succo,
coctioni, nec ste
lieribus cibi gra
30 eius vi Pallada
faretur. Is eni
conualuisse &

Græcis
enim modis
stoviderur
40 Plinio zizipha

nerat, decrefcitque arbor, fi circa caudicem foboles nocitura pullulat, & non interlucetur.

Quæ inſita ſunt præcociorem afferunt fructum. Mutua inſitione melior eſcūt, omnibusq; inſitionum generibus comprehendunt, ſi in ſylueſtrem ce- raſum inferemus, poma maioris magnitudinis producent. Si ceraſa in has in- feremus, & arbor & poma degenerabunt.

De Ziziphis. CA P. XXVI.

DE BVERAT ziziphus in ſyluis ſeri, ſed ſui iucunditate fructus, ſpecieq; decora pomaria cultidra ferè omnia colunt, vt rectè protulerit Plinius, in teſta iam ſyluæ ſcandunt. Peregrina eadem eſſe teſtatur, quæ non pridem in Italiam venere ex Africa. Sex. Papinius attulit diui Auguſti nouiſſimis tem- poribus. Dioſcoridi in nominata eſt. Videtur à Theophaſto inter loti genera recenſeri, cum plura eſſe deſcribat. Vnum enim Lotophagorum, cuius fructus prædulcis, ſuauiſ admodum, & intus ſine ligno, quod à Græcorum Poetarum principe miris laudibus Odyſſæa nono celebratur.

*Lotophagumq; ſolum ſubeunt, quod turgida loti
Semina dat mandenda viris, hi prorsus, vt hæſit
Dulcis in ore ſapor, patriam de corde fugarunt,
Auelliq; noua capti dulcedine truncis
Haud poterant.*

Alterum genus paliurum vocat, in Africa frequens, quippe quo Heſperides ad vrendum vtuntur, cuius deſcriptionem inferius afferemus: ſic Agathoclis, & Polybij testimoniis noſtram ziziphum Africanam eſſe paliurum affirmare non veremur. Columella de apum paſtionibus, Arbores, inquit, probatiſſimæ vtraque ziziphus, cum mediocriſ guſtus ſint eius flores. Palladius ex eo: In arboribus ziziphus, pomiferæq; arbores, quibus nulla amaritudo reſpondet in flore, vel ſucco, apibus aptæ ſunt. Galenus parui ſucci poma eſſe dicit, nec con- coctioni, nec ſtomacho facilia, namq; in ſolentibus, & effrenatis pueris, & mu- lieribus cibi gratia tantum expetuntur, exiguumque præbent alimentum. De eius vi Pallada Græci Poetæ extat epigramma, quam ſe inueniſſe in ziziphis fatetur. Is enim cum quartana febris laboraret, & zizipha inſpexiſſet, ſubito conualuiſſe & ſanum, vt croto, factum.

*ἐκ ἀλόχου ἐν δίζυφοις δώματι πνα θεῖαν
εἶναι εἶπον, χρεὶς γὰρ δίζυφον ἐν χρονίῳ
ἡ πάλω κάμνοντι τεταρταίῳ περὶ νῆα,
καὶ γάρ ἐν πάλω οἱ αὖ χρότων ὑγίης.*

Græcis ζίζυφα, & ζίζυφα, & ζίζυφα, & aliquibus exemplaribus etiam δίζυφα tot enim modis ſcriptura variare ſolet. Galenus μέλα vocare videtur. Theopha- ſto videtur παλιούρος Africana. Latinis, vt Columelle, ziziphus fæminini generis, Plinio ziziphum. Officina Barbaros imitata, iuiubas dicunt, Itali giugiuile.

Forma.

Theophrastus de sua Africana paliuro: Fruticosior est Lotophagorum paliuro. Folio nostrati simili, sed fructu diverso, non lato, sed rotundo, rubroque. Nucleo, qui non simul mandatur, acinorum punici modo. Magnitudo fructus, quæ fructibus cedri, paulo amplior, iucundus per se, atque suavior, etiam vino affusus, quin & vina succo suo commendans. Sed Græcia paliurus cui huius Africanæ paliuri folia similia dicit, videtur non altera arbor esse, quam Dioscoridis rhamnum tertium, cum sæpe rhamni, & paliuri nomina inter scriptores confundantur. Hic nanque frutex folia tam similia zizipho affert, ut nisi propinquius inspexeris, facile in utriusque distinctione hallucineris. Distant maximè fructu, nam nostræ zizipho rotundus, magnitudinis, quæ cedri, paulo amplior, esu iucundus. Rhamno verò, siue paliuro in siliquis folliculari specie, verticillo similis. Agathocles item libro historiarum suæ patriæ tertio videtur hanc quoque paliurum describere. Assurgit hæc arbor in Alexandria ad pinus, vltimique proceritatem, ramis frequentibus aculeatis, folio viridi, rotundo, tenui. Hæc bifera est, non tam vere, quam autumnò. Fructum profert oliuæ phauliæ vocatæ magnitudinis: crudus mandaturis, ac virens, ubi verò exaruit in farinam molitur, atque ita estur nullo liquore subactus. Polybius Megalopolitani libro historiarum duodecimo (referente Athenæo) se vidisse testatur hanc arborem spinis asperam, folio virenti, quale rhamno, tantum profundiore, latioreque, fructu candidæ myrti per initia, sed processu puniceo, magnitudinis oliuæ, sed rotundo. Eum cibo familiæ rundi cum nucleo, qui ei per exiguus est, seruari conditum eundem nucleum, herilibus mensis eximi, saporem fici & phœnicobalani inesse pomò, sed præstantiori odore, vinum, & acetum inde fieri. Plinius poma similia baccis, quam malis dixit, cyprifoliis. Nos autem ita describemus: ut omnium collatione Africanæ paliurus fuerit possit iudicari. Arbor infra pruni magnitudinem subidet. Caudice retortido, nec satis recto. Ramis senticosis, multis aduncis intercalantibus spinis, è quibus furculi præduri, foliosi, spithamæ longitudine exeunt, frondes gerentes utrinque per intervalla impari exortu, lentis ei modo per cubitum ferratas, similes tertio Dioscoridis rhamno, qui hyeme cum frondibus una decidit. Flore muscoso oleæ, sed odorato magis, pomò cornis baccis simili, dulci, primo viridi, vltimo phœniceo, vel rubello colore. Radicibus firmis, validisque.

Genera.

Columella duplex affert genus ziziphi, rutilum & candidum. Neapoli vnum tantum genus visitur, rutilum. Sunt qui azadarat Arabum albam ziziphi speciem putent.

Cælum.

Palladius loca calida, & aprica amare scribit. In temperatis nostris regionibus etiam optime fructificat.

Solum.

Palladius terram non nimis lætam, vel proximam tenui, & ieiunæ. Plinius in castrorum aggeribus sata, & aggeribus præcipue decora.

Sætas.

Plinius granis feri debere scribit mense Aprili. Palladius ossibus suis feri in serobe palmari, ita ut terna grana per serobem caeuminibus ponantur inuersis, quibus

quibus in imo, & bus manu plantata transferatur in

Seritur etiam tio, magis in terris gidis verò Maio, ca eius crus facile

Vindanionius miè media arbor

describit stipite

Didymus etiam lora reddi. Et si

tio mense ponet

Palladius hæc

pidum cumulus

ferrea strigili sub

frequenter affus

altitudo sex ped

Facile inferi p

cum omnium fe

se. Hyeme filio

Zizipha colle

cione composito

ficitur ne ea ruga

sis, aut fronde

Marces intus

D

latus dunt. Plin

monet, nec eas

Theophrast

bor mespilus,

A Theophr

in gyrum, ma

impediat. Acu

te dum adoles

rubenti, sed p

res, validas tat

ri contumax. S

40 sunt, unde sero

quibus in imo, & summo affundatur latamen, & cinis, & herbis adnascentibus manu planta liberetur erumpens. Cum pollicis soliditati similis fuerit, transferatur in locum pastinatum, vel in scrobem Aprili mense.

Seritur etiam stipite, & planta. Crescit tardissimè, sed si plantam ponis Martio, magis in terra molli. Locis calidis Aprili mense ziziphum conferitur, frigidis verò Maio, vel Iunio. Nos omnes viuiradice serimus, cum stolones circa eius crus facile fruticent, quod etiam à Didymo adnotatum reperimus.

Vindanionius, Didymi auctoritate, ziziphum ramis plantari retulit, sed ramus è medta arbore accipiendi sunt. Quemadmodum quoque & Palladius supra descripsit stipite seri posse.

Didymus etiam talea seri posse memoriæ mandauit, & transplantata meliora reddi. Et si tempus non præsignent, quando id faciendum sit. Nos Martio mense ponere poterimus, & optimè in frigidis, humidisq; Aprili.

Palladius hæc de eius cultu. Per hyemem prodest illi, ut circa caudicem lapidum cumulus aggeretur, qui astate auferri debet. Si arbor hæc tristis erit, ferrea strigili subrala hilarior fiet, vel si finum bubulum radicibus modice, & frequenter affundas. Nos arborem formamus, ut vno stipite assurgat, cuius altitudo sex pedum erit.

Facile inferi posse existimarem in oxyacantham, vel prunum syluestrem, cum omnium ferè furculorum susceptrices sint, Febuario, vel Martio mense. Hyeme fisco trunco, astate verò emplastratione uti possumus.

Zizipha collecta matura in longo vase fictili seruantur, oblito, & loco sicciore composito. Vel recenter lecta poma si guttis vini veteris perfundas, efficitur ne ea rugarum deformat attractio. Seruantur etiam decisa cum ramis suis, aut fronde sua inuoluta, atq; suspensa. Hæc Palladius.

Materies intus colorata est, solidaq; Ideo ex ea citharæ conficiuntur.

De Mespilo. CAP. XXVII.

DIXIMVS de baccis singulari offe præditis, nunc de iis, quæ plura includunt. Plinius malorum, pyrorumque generi iure adnumerari mespila monet, nec eas in Italia fuisse Catonis auro: cum earum nusquam meminerit.

Theophrasto *μεσπίλη*, Dioscoridi verò *μέσπιλος*, fructus *μέσπιλον*, Latinis arbor mespilus, cuius fructus mespilum. Itali *mespilo*.

A Theophrasto ita describitur. Arbor inter amplissimas est, & recta coma in gyrum, magna ex parte pineæ nucis formas vertice suo æmulatur, nisi quid impediat. Aculeis caret. Cortice læui, pinguiusculo, colore ad flauum albicante dum adolescit, scabro, nigroq; dum veterascit. Flore amygdalæ, non tamen rubenti, sed propemodum herbaceo. Radices nec multas, nec alte descendentes, validas tamen, & crassas, & incorruptibiles agit. Maxime viuax & aboleri contumax. Serò suos perficit fructus, cum terrestres naturæ solidi, acerbisq; sint, unde serò suum adipiscuntur humorem, & saporem. Et mespila syluestria

montibus odoratiora sunt, & tam agrestium, quàm vrbanoꝝ acerbiora sunt odoratiora minus acerbis. Cuius rei ratio libro de causis fusiꝝ explicatur: Quum sicciꝝ sint, ea tamen siccitate, quæ non tollat, sed patiatꝝ quantum humidi sit ad odorem necessarium in natura. Sed alia est nostra vernacula mespilus ab hac Theophrasti, cum inter amplissimas illa sit, nisi nostra sylvestris, vel chamæmepilus fuerit. Præterea corruptus textus Theophrasti, & hians, quid de generibus statuendum sit, difficultatem affert. Dioscorides ita depingit, Alterum mespili genus in Italia nascitur. Arbor foliis mali, sed minoribus. Pomum fert rotundum esui aptum, umbilico latiore, quod astringit, seroq; maturescit. Plinius, putamen in mespilis mandi, scripsit, quod in aliis reicitur, ac vasculis constare. Nostratem verò mespilum ita describemus, Arbuscula est similis sylvestri pyro: Ramis in gyrum comosis, aculeatisq;: Folio mali, promissiori, angustioriꝝ. Longo pediculo. Flore subherbaceo, amygdalæ forma. Pomo dum pubescit viridi, & duro, ubi maturuerit fuluo, & molli, umbilicello superne extante, foliosis vnguiculis redimito, tribus, quatuorve intus nucleis. Radice numerosa. Politianus noster de cristato illo vertice ipsius ita meminit,

— Regum imitata coronas
Mespila.

Genera.

Theophrastus Idæorum secutus obseruationem tria genera tradidit: Anthedona, Sataneam & Gallicā. Sataneum, quod in præsentem memoramus, fert malum grandius, candidius, solutius, molliori intus acinorum ligno, verum ceteris fugacius. De alio in sequenti capite. Dioscorides ex eo: Mespili hoc genus aliis *αιτάνιον*, vel *εμπυλίσ*. Pomum rotundum affert, umbilico latiore, quod astringit, & serò maturescit. Ex quibus Plinius: Mespili tria genera, Anthedon, Serania, tertium degenerat, tamen si anthedoni simile est, quod Gallicum vocant. Seraniæ maius pomum, candidiusq;: acini molliore ligno. Sed nostratis mespili genus vnum est, grandiori pomo, ut ferè malum magnitudine peræquet, cuius rami carent spinis, quod videtur & cultu & insitione in pomariis committuisse, & sylvestrem habitum exuisse. Alterum spinis horret, syluis & vepribus nascens, pomo paruo, acerbioriꝝ, ut vix edendo sit, nisi prius per hyemem frigore mollescat: vulgè *Nespolo canino* dicitur. Est & tertium genus oblongiori pomo, tenuioriꝝ, internis ossibus carens, quod cultu, humique frugalitate potius prouenisse credendum est, quàm quod genus diuersum sit, cum vna, eademq; arbore, & rotunda cum ossibus, & oblonga sine ossibus poma habeat.

Cælum.

Theophrastus in montibus nasci scribit. Palladius calidis locis maxime gaudere, sed irriguis tamen, & frigidis quoque prouenire. Nos in calido, frigido & temperato cælo vidimus, sed in calidis arbores parua sunt, paruosque ferunt fructus.

Solum.

Theophrastus solum gelidum, atque humectum quarere dixit. Palladius

in

in irriguis locis, & n
est, vel argilla cur
Semine nasci
ri, & degenerant
longiorem sperant
Theophrastus
rum apriliū feri
Theophrastus
vunt stolones, se
10 simbratio corpor
iam nascitur mesp
Possunt etia
possis. Tale fer
sed solo stercore
Sant eius incre
Palladius: An
sæpe refoueri. Fo
dum altitudine ei
Palladius doce

10 tamen eius de arb
In trunco fillo in
philum verò,

Am.

S.

Et ge

e

Nos in oxyas
nem lanuario m
cherrimam, & si
10 rauerit, miore
ut fructus sine o

Theophrastus
mesque prægr
tur & fructus
acerbus sit. Pl
vermiculatio
us: Si vermib
vetere vrina,
xiam: Vel aq
40 mas, & cinis
formicæ mole

in rignis locis, & magis sabulone pingui, aut glareosa terra, cui arena permixta est, vel argilla cum saxis.

Semine nasci Theophrastus prodidit. Plinius semine feri, sed tarda prouenit, & degenerantia, ac insito restituenda. Palladius etiam feri semine, sed in longiorem speratur ætatem.

Theophrastus viuitradice quoq; nasci scribit. Didymus ante diem calendarum aprilium feri, modo quo cotonea malus.

Theophrastus item auulsione nasci retulit. Plinius: Auulsi ab arbore uiuunt stolones, sed cum perna sua, & aliquid è matris corpore auferat secum fimbriato corpore: & hoc modo plantantur mespili. Didymus, Auulsione etiam nascitur mespilus.

Possunt etiam propagari, & optime concipiunt radices, quo transferre possis. Talea ferendam esse Palladius retulit mense Martio, vel Nouembri, sed solo stercoreato, & subacto, ita ut utrunque caput taleæ sterco obducatur. Sunt eius incrementa tardissima.

Palladius: Amat putari, & circumfodi, & parco humore inter siccitates sæpe refoueri. Formanda est arbor, ut à terra truncus duorum, vel trium pedum altitudine erigatur, ex quo spargantur rami.

Palladius docet mense Februario inseri in se, in pyro, & in malo. Surculum tamen eius de arbore media debere assumi, nam de summitatibus vitiosus est. In trunco fisso inferenda est, nam corticis macies ieiuna nil nutriet: ad Paphilum verò,

Emula dura pyri despecti mala saporis

Mespilus admissio germine iuta subit.

Et geminis sese violentior inserit armis.

Aque auidas terrent robora sena manus.

Nos in oxyasantham insetuimus fisso per medium trunco, & optime prouenit Ianuario mense. Insetuimus etiam in cotoneam malum, ac fructum pulcherrimum, & supra magnitudinem assecuti sumus, & si quis insitionem iterauerit, maiorem habebit. Albertus magnus inferere docet in mala & pyra, ut fructus sine ossibus nascatur, quod falsum esse experientia nouimus.

Theophrastus vermiculationi arborem obnoxiam esse ait in senecta, vermesque prægrandes ei diuersiq; quàm cæteris arboribus cernuntur. Eroditur & fructus à vermibus adhuc crudus in arbore, & si minus, quàm sorbus acerbus sit. Plinius ab eo: Mespilus in senecta obnoxia vermiculationi est, & vermiculationem quoq; pomi ipsa per se quibusdam annis sentiunt. Palladius: Si vermibus occupatur stylo æreo purgandi sunt, & amurca vel humana vetere vrina, vel uina calce profundendi, sed parcius propter arboris noxiam: Vel aqua decocti lupini. Si putatur, hinc arbor sterilis fieri. Fixus, & cinis vitium simul si radicibus infundantur, fertilem reddunt. Si formicæ molestæ sunt, rubrica cum aceto, & cinere temperata necabuntur.

Satio.

Culm.

Insitio.

Morbi & remedia.

Si poma labantur, frustum de eius radice præsum in media trunci parte figatur.

Coditura. Palladius: Mespila ad seruandum leguntur nec dum mitia, quæ in arbore diu durabunt, vel in vrceolis picatis, vel in ordinem suspensa, vel, vt quidam posca, vel sapa condita. Die serena legantur, ac media, & paleis obruantur discreta, ne ea vicissim tactus afficiat. Vel cum pediculis lecta semimatura, & salsa aqua, per dies quinq; macerata, postea sapa infundantur, vt enatent. Seruantur & melle, sed si minus matura collegeris.

De Tuberibus. CAP. XXVIII.

ALTERAM mespili speciem prosequemur. Plinius æque peregrina esse zizipha, & tuberes scribit, nec pridem in Italiam venisse, atque à Syria Sex. Papinium attulisse in castrorum aggeribus satam. Hæc inter mespili species à Theophrasto descripta est, itemq; à Dioscoride. Plinius ex illis excipiens, & ignorans qui fructus fuerint, alibi postea tuberes vocat, quas prius mespili species vocauerat.

Nomen. Theophrasto videtur μέσπλος αὐθιδαν ni fallor. Dioscoridi ἀρωμία, & ita à multis vocari refert, & τεῖνοκκος. Galenus communi vocabulo τεῖνοκκος, quasi triosium appellari ab aliquibus dicit, quum tria intus grana, aut ligna, seminis loco fructus contineat. Columella tuberes vocat. Ab eo Plinius, & Palladius. Itali corrupto vocabulo ex aronia *Azarolo* vocant.

Descriptio. Theophrastus suum anthedona ita describit. Arbor inter amplissimas habetur. Ramis in gyrum comosis. Lignum spissius, flauiusq; cætera pruno simile. Folium scissum, extremitateq; apio simile, sed maioribus diuiculis promissum, rigens, nervosum, tenuius, quàm apium, longo & gracili pediculo, antequam decidat, vehementer rubescit. Fert pomum minus quidem, sed fugacius, astringentis ingenii, & vetustatis impatiens. Flos vt amygdala rubescit. Radix alta, numerosaq; ideo longæua arbor, & inextirpabilis. Dioscorides verò. Aculeigera arbor est, folio oxyacanthæ, fert pomum suauis, & exiguum, paruo malo non dissimile, ternis intus ossiculis, qua ex causa nonnulli tricoccon appellant. Sera ei maturitas est, astringit, stomacho gratum est, aliumq; suppressit. Plinius quam excepit à Theophrasto descriptionem affert: Arbor ipsa de amplissimis est. Folia antequam decidant rubescunt. Pomum minus, quàm prædicto generi, sed odore præstantius, & quod diutius seruetur. Radices multæ, & altæ, & ideo inextirpabiles. Alibi verò tuberes describens ait. Poma baccis similia, quàm malis, & aggeribus præcipuè decora. Florent post armeniaca. Apud nos est arbor mediocrius amplitudinis, longè alterum mespili genus superans, cortice, & materie pruno similis, spinis non admodum acutis armata, foliis calabricis, floribus racematim coeuntibus, albis, odoratis, & in totum calabrici similibus, fructu rubenti, arctiore vmbilico, maturaturq; Septembri.

Plinius

Plinius duo eni
troque genere no
magnitudinem
tha, cui Dioscori
eo nil nisi pomi
colat, ac suomet
mellificum genus
seruimus, pomu

Nos calido, ve
bunder, sic nostra
portet: quippe cu

Palladius pingui
Theophrastu
tim grana decul
simul ponunt,
ne iuuandum el
bur inducat. Po
ne planta transfe
etiam auulsione

vel Februario tul
infantia. Sumat
statuatur pingui
magna parte cor

Palladius ait p
Plinius: Tub
& in calabrice, q
ris, & prunis, &
vel sicili vase m
cum stercore. In

domestica arbor
Morbus ear
mesistigrande
Palladius,
catas & oblit
nondum per
integra à vit
bus viarum a
eorum occu
inspargunt, in
40 rur: & opert
illa sæ asserua

Plinius duo eius genera describit, candidum, & à colore sericum dictum, & *Genera.*
 utroque genere nostra Campania scater. Rubeum magis vulgare, candidum
 magnitudine malum æquat, odoratius, dulcius, & preciosius. Sed oxyacan-
 tha, cui Dioscorides assimilat, nil aliud est, quàm tuberum sylvestre genus, ab
 eo nil nisi pomi magnitudine, & sapore distans, quod si quis hortis serat, ac
 colat, ac suomet furculo multoties inserat, affirmare non vereor in hoc do-
 mesticum genus mutari. Iam nostra villa seuimus, ac suomet furculo bis in-
 seruimus, pomumq; maius produxit.

Nos calido, vel tepido cœlo gaudere credimus, cùm Syria, cui tale est, iis a- *Cœlum.*
 bundet, sic nostra Campania, Sicilia, & loca maritima. Sed à ventis tuta sit o-
 portet: quippe cùm tempestiue floreat, hyemis sæuitia nondum sedata.

Palladius pingui terra gaudere ait. *Solum.*

Theophrastus semine nasci scripsit. Palladius nucleis feri. Nam pomis sta- *Satio.*
 tim grana decussa, & sole siccata, pingui, & prope cribrata terra autumnò tria
 simul ponunt, quæ feruntur in vnum coire virgultum: quod assidua rigatio-
 ne iuuandum est, atque fossura, quæ solum leuiter scalpens teneritudini ro-
 bur inducat. Post annum deinde, vel aliquando tardius, quæ fuerit de semi-
 ne planta transfertur, & hoc genere fructus efficit dulciores. Theophrastus
 etiam auulsione nasci. Palladius: mense Septembri, circa calendas Octobres,
 vel Februario ruberes seremus sobole, cuius tenera diligenter nutriri debet
 infantia. Sumatur cum radicibus planta diuulsa, bubulo fimolinatur, ac luto
 statuatur pingui terra & subacta, subditis conchis, & marina alga, terris sui
 magna parte condatur.

Palladius ait prodesse tuberibus, quæ malis prodesse memorauit. *Cultus.*

Plinius: Tuberes melius inferuntur in pruno sylvestri, & malo cotoneo, *Institio.*
 & in calabricæ, quæ spina sylvestris est. Palladius, Inferitur malis omnibus, py-
 ris, & prunis, & calabrici, melius trunco fisso, quàm cortice, desuper qualo,
 vel fictili vase munitur, repletis vsq; prope summitatem furculis, terra subacta
 cum stercore. In nulla alia arbore melius concipit, quàm supra calabricem, vt
 domestica arbor supra sylvestrem.

Morbus earum, vt Theophrastus ait, vt senescens vermibus erodatur. Ver- *Morbi & remedia.*
 mes isti grandes, & alii, quàm qui in reliquis cernuntur arboribus.

Palladius, ruberes seruabuntur, ait, si obruantur in milio, vel vrcolis pi- *Coditura.*
 cati & oblitis. Vesuviani vsque ad Maium ita seruant: Decerptas ex arbore
 nondum perfectè maturas, & per hebdomada intactas relinquunt, vt tuius
 integræ à vitiatas separentur. Inde sabulonem è fluminibus, vel procurrenti-
 bus viarum aquis accipiunt, ac incerniculo minutum à lapillis secernunt, ne
 eorum occurſu tenera fructuum cutis offendatur. Inde fictili vase sabulonem
 inspargunt, inde fructus, ne se contingant, ac vicissim vsq; donec vas complea-
 tur: & opertum vas sicco loco reponunt. Si annus siccus fuerit, ferè omnes
 illæ sæfferuantur: si pluuius, multæ vitiantur.

Matæies.

Lignum spissum, solidum, nullamque putredinem sentiens esse prodit Theophrastus.

De Myrto. CAP. XXIX.

MYRTVS hortorum præcipuus decor, & delicia, ad plurimos mortali-
um usus venit. Plinius succorum naturam præcipuam admirationem
in myrto habere scripsit, quando ex vna omnium, olei, viniq; bina genera fi-
unt. Item myrtidanum. Et alius usus baccæ fuit apud antiquos, antequam
piper reperiretur, illius obtinens vicem, quodam etiam generosi obsonii no-
mine inde tracto, quod etiam nunc myrtatū vocatur. Eademq; origine apro-
rum sapor commendatur, plerunque ad intinctus additis myrtis. Caro docuit
vinum fieri è nigra, siccata vsq; in ariditatem. In vmbra, inquit, arefacito, ser-
uatoq; ad vindemiam. In urnam multi contundito myrtæ femodium, id obli-
nito, ubi desierit feruere mustum, myrtum eximito. Si non siccetur bacce, o-
leum gigni docet. Postea compertum & ex alba vinum fieri album, in duobus
sextariis myrti tusæ in vini tribus heminis macerata, expressaq; Oleo quoq;
(mirum dictu) inest vini quidam sapor, simulque pinguis liquor, præcipua vi
ad corrigenda vina saccis ante perfusis. Retinet quippe faciem, nec præter pu-
rum liquorem transire patitur, datq; se comitem præcipua commendatione
liquato. Virgæ quoq; eius gestatæ manu viatori profunt in longo itinere pedi-
ti. Quin & virgæ anuli expertes ferri inguinū tumori medentur. Prodest myr-
tus coturnicibus vescentibus, quippe verarum depastæ (Didymo auctore)
non satis tutæ sunt cibo, nam & distentionem, & vertiginem inducunt. Vnde
si quis ab earum esu infestabitur, myrti baccæ ei subueniendum est. Præterea
turdi in suis nidis myrtum ingerunt, vt abigant animalium noxas, Pamphilo
scribente.

Fabule de
myrto.

De myrti planta fabulæ nonnullæ inueniuntur, quas huc adducere opera
precium esse visum fuit. Græci arborem Mineræ dicant, commenti fabulam,
quod Myrsine Attica puella fuerit, pulchritudine ac robore insignis, amica Pal-
ladi, quam iuuenis ab ea cursu, & palestra superatus interemit, inuidia du-
ctus, quod elegantia, cæterisque naturæ dotibus reliquæ iuuentuti præstaret.
arbuscula in demortuæ vicem succedens semper Mineræ chara remansit, re-
fricans aspectu suo desiderium. Sed cur Veneri myrtus dicata sit, vnde & ppe-
ri dicta? Amat enim myrtus maris littora:

Littora myrtetis gratissima.

Seruius ait, quod huius arboris in mulierum necessitatibus usus multus, ac
plurimus sit, vt ex medicorum libris patet. Alii ob arboris odorem: nempe Ve-
nus odoribus, & vnguentis delectatur. Odor quoq; arboris creditur nonnul-
lis venerea suadere, & è baccis ipsius compositum fiebat, per quod libido ex-
citabatur. Demonstrat id Poëta Furius, dum Digonem meretricem introdu-
cit, dicentem, *Myrrhinū mihi affers, quod Veneris armis occursem fastidiuncula.* 40

Virgilius in Georgicis:

Formosa

Formosa myrtus Veneri.

Et apud inferos syluâ myrteâ fingit, in qua essent, qui amoribus affliguntur.

Nec procul hinc partem fusi monstrantur in omnem

Lugentes campi, sic illos nomine dicunt.

Hic quos durus amor crudeli tæbe peredit

Secreti celant calles, & myrtea circum

Sylua tegit.

Myrtum etiam Paphiam vocant, ob insulam Paphum Veneri dicatam:

Solido Paphia de robore myrtus.

- 10 Plutarchus in Numa prodit, menſe Aprili Veneri ſacrificari, quòd is menſis huic deæ ſacratus eſſet, ad cuius calendas myrto coronatæ lauarentur. Querit idem in quaſtionibus, cur matronæ Bonæ deæ ſacellum ornantes, myrtum non inferant, cum plantis & floribus cunctis ſtudioſè tunc petantur: an quod putæ omnibus ſagitiis, & præcipue veneris ſacra peragunt, vt non ſolum maritos, ſed omnes è domo mares expellant: itaq; myrtum, vt Veneri ſacram abhominantur, nam quæ hodie murtia Venus dicitur, olim myrtia dicebatur. Etiam ſympoſiorum primo ait, morem antiquis fuiſſe, vt omnes conuiuii initio prænam Deo canerent: deinde ſinguli accepta myrto, quam ex eo ſaſcon appellabant, quòd is caneret, cui tradebatur in eum finem, circumlata lyra qui peritus erat eam ſumebat, & carmen illud concinne modulabatur, quod quoniam muſicæ rudes reſuſabant, ſcolion dicebatur. Alii dicunt myrtum non ordine ſolere circumduci, ſed è lectulo in lectulum tranſmitti, ita vt qui primus cecinifſet, primo in ſecunda menſa illam mitteret, is primo tertiæ, eodemq; modo ſecundi ſecundis, vt hoc modo in circuitum iret. Veneri ſimulachrum ex pullulante myrto ad flumen Hermon fecit Pelops, vnde Hippodamiæ nuptias eſt conſecutus. Myrtus quia Veneri, coniugio etiam ſacra fertur: & inter myrti genera genus eſt vnum coniugale dictum à Catone. Traditur myrtea verbena Romanos, Sabinosq; cum propter raptas virgines dimicare voluiſſent, depoſitis armis purgatos eo loco, qui nunc ſigna Veneris Cluaciæ habet. Cluere enim antiqui purgare dicebant. Ignoratq; Plinius an prima omnium in locis publicis Romæ ſata ſit, fatidico quidem, & memorabili augurio. Inter antiquiſſima nanq; delubra habetur Quirini, hoc eſt, ipſius Romuli, in eo ſacræ fuerunt myrti duæ, ante ædem ipſam per longum tempus, altera patricia appellata, altera plebeia. Patricia multis annis præualuit flacceſcente plebeia, quandiu ſenatus floruit, plebeia retorrída ac ſquallida. Quæ poſteaquam eualuit, flacceſcente patricia Marſico bello languida patrum authoritas facta eſt. Quin & ara fuit vetus Veneri myrteæ, quam nunc Murtiam vocant.
- 30 Memorat Athenæus Apollodori authoritate, quòd Dionyſius, qui author
- 40 potionis fuerat, idem fuit adiutor, vt malis, quæ adinuenerat, præſidium afferret, nam ebrietate laborantibus, coronam ad aſpectus, & odoris iucun-

*De Corona
nis quæ ex
myrto.*

ditarem, è myrto astringentem donauit, vt vini vapores reprimeret. De corona idem Naucratis hæc habet è Polycharmo: Herostratus mercator, cum Paphum Cypri appulisset, Veneris simulachrum coemit, cum naue in Naucratem contenderet. Iuxta Egyptum cum hyems repente incidisset, nec ubi locorum esset, cognouisset, ad Veneris simulachrum confugit, orauitque vt omnes seruariet. Tunc dea myrtos omnes appositas virides fecit, naueque odore repleuit, sic sol emicuit, & in Naucratem peruenerunt. Tunc Herostratus è naui egressus in Veneris templo simulachrum & myrtos deposuit, & sacrificia instituit, & singulis coronam myrteam donauit, vocauitque Naucraticem, quæ Philonidis etiam testimonio vini vapores reprimit. Seleuci etiam traditione habetur, coronam ex myrto compositam Hellotidem vocari, & viginti vlnarum habere circumferentiam, & Helotum festo in pompam procedere, & Europæ ossa circumferri, quam Hellotiden appellant. Philetas asserit myrti ramum Lesbios Hypothymidas dicere, circa quem alios flores innedere consueuerunt. Bellicis quoque rebus se inseruit myrtus, inquit Plinius, triumphansque de Sabinis Posthumius Tubertus in consulari, (qui primus omnium euans ingressus urbem est, quoniam rem leuiter sine cruore gesserat) myrto Veneris victricis coronatus incescit, optabileque arborem etiam hostibus fecit. Hæc postea ouantiū corona fuit. Massurius auctor est, curru quoque triumphantes myrtea corona vfos. L. Piso tradit, Papyrium Massonem, qui primus in monte Albano triumphauit de Corsicis, myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum. M. Valerius duabus coronis utebatur, laurea, & myrtea, qui & hoc vouerat. In Hercis certaminibus, quæ Argis fiebant in honorem Iunonis, victores myrtea corona & a neo clypeo donari consueuerunt. Apud Eleos (etiam Theophrasto auctore) pulchritudinis certamen fieri solitum, cuius victor arma, quæ Palladi offerebat, & myrteam coronam accipiebat, quæ redimitus comitantibus amicis ad Palladis eodem ducebatur. Perla, Herodoto auctore, diis sacrificantes cinctam myrto tyram gerunt.

Nomen.

Græcis *μύρτις* dicitur, sed Galenus *μύρτις* vocauit, cum soleant sapius Græci *ρ* in *σ* commutare. Puto sic vocatam propter myrtæ quandam amulam odore gratiam, quæ pollent eius bacculæ. Nicander in Theriacis *μύρτις* dixit, id est, constipantia myrta, ubi & scholiastes admonuit *μύρτις* pro fructu accipi debere, vt *μύρτις* arbor, & *μύρτις* fructus dicatur: *μύρτις* etiam ab Archilocho dicitur, ab Antiphane verò phibaleos. Sed adhaescentia quædam myrti *μύρτις* dicitur, & *μύρτις* dicitur nominatur. Latinis myrtus dicitur, à Catone myrtum, & myrta masculino, & fæminino sexu. Varro murta dixit. Vnde murtaum genus fæmininis. Itali *mirto*.

Norma.

Vagam myrti descriptionem à Theophrasto afferemus. Myrti arbor in fruticem abit, nisi crebro repurgetur. Medulla caret. Froude semper virenti, angusta, crebra, & seriatiim disposita, myrobolani arboris simili, sed breuiore flore supra fructum insidente, qui senescens in pappum vocatam conuertatur.

atur. Cacumina
tingit post Arcturum
etiam perficeret
nandum propen
uersus inter sese
sus myrti sapor p
bet enim talem c
detrahatur, & ad
tis è mera pulpa
re: quia exhalat a
uior: & quæ mol
vacans enucleat
Nonnulli fructus
temperatur à n
rata sunt folia,
infus, & vino si si
sola, quia dulci
quia sicciore sunt
exacerbatque, t
dissimè alunt. N
figenitis arbor
ribus & cacumina
nigrescit. Succo
diuitis: nam in t
de myrti odore p
rit. Quamobrem
quemadmodum
demiat: etenim
quippe qui vele
que in conditio
dulcedinem ac
sistatque fun
rur, itaque duci
ta enucleatio
ta adoleueru
nulla contin
minora, iccirco
puratus est, q
riores, partus
nucleum: fun
Aristoteles

ratur. Cacumine, & latere germinat. Ex anniculis fructificat furculis. Sed con-
 tingit post Arcturi exortum, vt denuo concipiat, floreat, foetificetque, sed fru-
 ctum perficere nequeat, nam semiconditus remanet: adeo est ad supergemi-
 nandum propensa natura, cum suapte natura affici facillime possit. Fructus ad-
 uersus inter sese, densusque in ramis, vt lotus. Succo vinoso praeditus. Sed vino-
 sus myrti sapor perspicuus non est, minus etiam qui pinguis est in eodem: ha-
 bet enim talem quoque humorem, qui vino cum sacclatur, supra innatat, qui
 detrahitur, & ad lucernarum lumina vritur. Fitque purior si detractis operimen-
 tis mera pulpa extrahatur humor. Idem consequitur etiam procedente ara-
 te: quia exhalat aqueum & terrestre subsideat. Brevis est vita: sed fertiliori bre-
 uior: & quæ molli sunt nucleo celerius moriuntur, quam quæ duro: & nucleo
 vacans enucleatis. Sunt qui durissimam, & validissimam myrtum esse affirmant.
 Nouelli fructus acerbiores, amarioresque sunt, sed maturando dulcescunt, quia
 temperatur à natura humor aquosus, unde dilutiores, dulcioresque fiunt. Odo-
 rata sunt folia, flores, rami, & fructus. Ratio est, quia eis acrodo & pinguedo
 insit, & vinosi sunt. Myrtus suauius halat, si eam multo prius maceraueris, quam
 sola, quia dulcior, meliorque redditur temperata. Sero suos maturat fructus,
 quia sicciores sunt, unde leuiorem frigiditatem requirit, nimia enim exiccat,
 exacerbatque, media verò temperies, & austrini, & humidi status commo-
 dissimè alunt. Nec longa, nec numerosa nititur radice. Plinius ex eo: Frutico-
 si generis arbor. Folio angusto atque disposito, nunquam decidenti. Fert late-
 ribus & cacuminibus. Bacca primo candida, mox viret, deinde rubet, ultimo
 nigrescit. Succo vinoso praedita, piperis gustu. Cito occidit, tamen antecedit
 diuitiis: nam in trimatu ferre incipit, ostendens & ante. Sed quæ Theophrastus
 de myrti odore protulit, ab Aristotele excepit, quippe libro problematum qua-
 rit. Quamobrem myrta collisa in manu dulciora sentimus, quam integra. An-
 quemadmodum racemorum acini vindemiati dulciores sunt, quam non vin-
 demiat: etenim musto, quod natura suaue est, excepti acini quasi condiuntur,
 quippe qui vel extrinsecus mustum resudent: at qui in racemo coherent, vti-
 que inconditiores constant. ergo myrta quoque naturam dulcia, intusque suam
 dulcedinem acinorum in modum vnae continentia, ubi manu compressa, con-
 flictataque sunt, diffusa intestina dulcedine, parte quoque exteriori inopple-
 tur, itaque dulciora non immerito sentiuntur. Quarit item Aristoteles, cur myr-
 ta enucleatiora sunt, quæ minora, & palmula nucleo penè carent, quæ minu-
 ta adoleuerunt, & vuarum acini, qui passim consterunt exigui, vinacea vel
 nulla continent, vel pauciora, minoraque. An quia minus perfecta sunt, quæ
 minora, ideo semen continent indiscretum, cui perinde vt finis, nucleus de-
 putatus est, quamobrem & minora sunt, vtpote furculi quidam agnati exte-
 riores, partusque imperfecti, & minus dulcia, quam quæ iustum continent
 nucleum: sunt enim minus concocta: concoctio autem non nisi perfectio est.
 Aristoteles meminit albe, nigraque myrtus. Alba domestica, nigra syluestris, Genera.

quæ crebriori folio est. Causam reddit in problematibus. Sylvestre esse, quod sylvestribus locis proueniat, minimeque ex cultu mutetur: humida autem omnia crebriore fronde condi, quodque minus fructus suos decoquat, iccirco ad frondes alimentum se vertere. Theophrastus, myrti genera varia esse, & explorata communis usus fecit. Meminit alterius myrti, sed ab hac diuersa, oxymyrfinæ, quæ fructum supra frondem gerat. Aliam esse molliori nucleo, aliam duriori, aliam verò nucleo carentem, scribit. Præterea fructu nigro, alboque, & rubro etiam. Meminit præterea tenuifolia, videlicet coronarij generis. Columella albam, nigramque memorat. Plinius Catonis verba referens tria dicit esse genera, scilicet coniugalem, albam, & nigram. Coniugalem putat dici à coniugis ex illo Cluacinæ genere, ac coniugalem nostratem dici. Aliamque adducit distinctionem satiuæ, & sylvestris, & in vtraque latifolia, in sylvestri propriam dicit esse oxymyrfinem. Satiuarum genera inquit, topiarij fecerunt: tarentinam folio minuto, nostratem patulo, exoricam densissimo, senis foliorum versibus: hæc non est in usu, ramosa vtraque alia. Dioscorides diuidit in nigram, & albam, & satiuam, & sylvestrem, quippe satiuæ nigra vilior, quam candida. Diuidit etiam in tenuifoliam, & latifoliam: nam capite de Tithymalis inquit, Dendroidem constare myrti foliis tenuioris. Celebris est Hypolyti, & Phædræ amoribus Træzenia, cuius folia, ut inquit Pausanias, prope delubrum Veneris satæ perforata nascuntur; iniuriam videlicet ferentia satuentis vnguibus, & calamistris fœminæ. Nos hoc modo genera distinguemus. Primo in satiuum & sylvestre. Sylvestre in duo genera diuidemus. Primum est oxymyrfin dicta, quam etsi vera myrti species non sit, apposuius tamen quia à Theophrasto, & Plinio appositæ est. Aliud genus est, nostras Plinij, vel latifolia, Catonis coniugula, Græcis dicta *πλανόφυλλος*, ramosa, minus gracilis, cuius baccæ lagenulas efficiant, floribus albidis, ex quibus chymicis organis aqua extrahitur odoratissima, mire vnguentariis expetita, à nobis vulgo dicitur sylvestris, cum totius nostri tractus maritima, & colles aprici, & sepes hac scateant, ac sponte nascatur, & sine cultu viuat, & optime fructificet. Hæc in albam, nigram, purpuream, & inter hos colores, mediam diuiditur. Alba maiores efficit fructus, & magis urbana videtur, sic nigra minores fructus, acutiores frondes. Putabat Matthiolus albam, & nigram myrtum dici ex frondium colore, quod tum albos fructus, & nigros myrti non inspexisset, tum aucthores, qui horum meminerant, Theophrastum, Dioscoridem in vini compositione, Columellam, Plinium, reliquosque, nec considerasset locis siccis nigriora folia, tenuioraque ut fructus, cultis verò & humidis albidiora, maioraque. Plinius tria Catonis genera myrti commemorat, coniugulum & album, & nigrum, cum coniugulum album genus vnum sit, alterum nigrum, ut duo sint, non tria. Satiuam nos vocamus, quæ minuto folio est, hanc Plinius tarentinam vocat, & in opere topiario tonsilis. Theophrastus coronarij generi accommodat. Huius species plures sunt, & quæ latiori, & quæ minutioni folio,

& quæ

& quæ albos, nigros, & bini, & Græci hanc *myrtum* flexilibus, minore, fructu miguiculis redimito, albicantibus officinam contrahunt, vocant. omnes in

bis infrequens, &

Inter ea, quæ fructu argumento quod summo studio, a In Propontide vmo odore in Egriate foli, & a ra. Nam & myrtus est, quod & fronda spicietur, hæc enim

quod parum est f

sistit. Euenit autem placidus, quæ v

humectat, ob id f

ridie, iis quæ in v

quicquid hauseru

nem crescant, sed

gitudinem crescu

nia profus hebes

mesacit, ut pote

mesacit: validi

quia cælestia qu

proscribit, cæte

bus locis feri pr

L. Theophras

littora amare,

tus aquis abund

vocant excellen

dunt indigena

in quo primū v

à Ceraunius m

& quæ albos, nigros, & purpurascens fructus afferat, præterea in surculis teretibus, & bini, & terni, quaternive frondium ordines distincti conuiscuntur. Græci hanc στενόφυλλον, siue angustifoliam vocant. Fruticat hæc virgis consiliibus, flexibilibus, nigricantibus, topiario operi accommodatis, folio buxi, sed minore, fructu minore, hedera simili, copiosiore, in summitate pluribus vnguiculis redimito, vinosum succum presso remittenti, intus minutis, crebris, albicantibus ossiculis prædito, quo aues autumnno saginantur, tantumq; odorem contrahunt, vt non exenteratas voremus. Neapolitani *Mortela gentile* vocant. omnes in arborem cultura commeant in viridariis. Exotica Plinij nobis infrequens, & nisi aliquis studij gratia asseruauerit, non visitur.

Inter ea, quæ frigidos odit tractus, nec iis mansuescere potest, myrtus est, *Cælum*. argumento quod omnino nulla in Olympo, nulla in Ponto prosilierit, & si summo studio, adhibitaque omni solertia, etiam religionis causa cõseruerint. In Propontide verò, & montibus, & locis multis prouenit. Fragrant suauissimo odore in Ægypto, causamq; perscrutatur Theophrastus. Primò vi & proprietate soli, & aeris id euenire putandum est, secundo ab ipsius plantæ natura. Nam & myrtus omnis sicca sua natura est, Ægyptia tamen cæteris siccior est, quod & frondium tenuitate, fructus exiguitate, ac nigro eius colore perspicitur, hæc enim omnia ex sicco proueniunt. Succus humoris parum habet, quod parum est facile excoquitur, suauitasq; odoris non nisi in excoctione consistit. Euenit autem soli & aeris opera, quippe solum siccum, & aer mollis, & placidus, quæ vtræque cocturam augent, alterum quia coquit, alterum quia humectat, ob id syluestria vrbis odoratiora, & quæ in apricis, præcipuè meridie, iis quæ in vmbra degunt, suauius olent, quia minus alimenti hauriunt, & quicquid hauserunt, melius concoquunt. Vnde efficitur, vt non in longitudinem crescant, sed fruticosæ, & crassiusculæ euadant. Quæ circa Cisthū, in longitudinem crescunt. Sed cur odor præcipuus myrti in Ægypto vbi cætera omnia prorsus hebescent, causa est, quia cælum roscidum est, & flores largius humefacit, vtpote natura humidiores: at quæ sicca sunt, vt myrtus, minus humefacit: validius enim humiditati resistere valet, & fructus ideo pusillus est, quia cælesti aqua nõ fruitur. Plinius ex eo myrtum odoratissimam esse in Ægypto scribit, cætera sine odore. Subit & in montosa myrtus. Didymus editioribus locis feri præcipit, quod vicinia odoris suauitate repleat. Virgilius,

Littora myrtetis latissima.

Theophrastus vt quædam animalia, ita myrtum ancipitem vitam degere, & *Solum*. littora amare, & terrestria loca prosequi asserit. Præterea Latinus ager, qui totus aquis abundat, & plana myrtum habent. Circæum promontorium, quod vocant excelsum, frequentissimè myrto scatere. Circem illud incoluisse tradunt indigenæ, & in Elpenoris inibitumulo myrtum coronario genere nasci, in quo primū visa traditur. Plinius: Arbor ipsa in Europæ citeriore cælo, quod à Cerauniis montibus incipit, primū Circæis in Elpenoris tumulo visa traditur,

& quæ

Græcumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse apparet. Nos solo fabuloso, siue arenaceo, sicco & leui optime prouenire conspeximus.

Satio.

Semine satam myrtum interdum præstare, inquit Theophrastus, sed eam ut plurimum degenerare, ne colorem quidem seruare, sed fructum ex rubro fieri nigrum, ut in Antandro. Didymus ex baccis seminaria facit, quas leuiter rufas, & restibus butomo contextis inuolutas fossiculis obruit. Columella ab idibus Februariis myrti baccas in areolas differere optimum præcipit. Plinius, Myrti genera omnia in Campania baccis feruntur. Democritus & alio modo feri docet, grandissimis baccharum tufis leuiter, ne grana frangantur, eaque intrita restem circumlini, atque ita feri, parietem fore densitatis, ex quo virgula differantur. Palladius Februario tempore ex myrti baccis seminaria facit, & facta excollit.

Seritur & plantis, & à trimatu tempestiuum est transferri, ex Plinio. Theophrastus crebras ferere docet, non plus, quam nouenos pedes, & nisi frondibus obsepta sit, feruari non potest, cum sicca spissaque sit, fructum enim nucleosum vel humidum gerit, itaque soli expositus obarescit, in umbra autem coalescens, & solem modice sentiens humorem suum seruare, atque coquere nimirum potest, quam obrem breui intervallo conferere oportet, ut se contactu operiant mutuo, ut solis nimios a stus auferre possint, tum etiam, quod radice numerosa non sit, nullo alimenti mutuo raptu infestatur. Mutuo etiam amore coniunguntur olea & myrtus, Androtionis auctoritate, qui eas mutuo amplexu radicum degere refert, & myrti virgas per oleæ brachia prorepere, fructumque olea protectum, ut nullam vim solis, statiusve pateretur, tenerum ac dulcem euadere, sed minorem, quam locis soli expositis. nec aliud est quod feri iuxta oleam velit. Seri myrtus sub pino comode poterit. Democritus tradit puniceam & myrtum mutuo amore coniungi, & ex propinquo simul plantatas fructu abundare, & radices mutuo implicare, & si non valde vicinæ existant. Plinius, Quidam myrtos densiores feri iusserunt, in pedibus tamen nouenis. Theophrastus, In consuetudine amputari desiderat, & quo propius terræ fuerit, eo melius, sed plagas alleuatas contegunt, ne intrudatur sol, aut imber.

Didymus auulsione plantari posse docet, sed auellatur cum conspicua radice parte.

Propaginis etiam plantari posse docet idem, viuit radices faciendo. Plinius tarentinam Romæ propagine feri.

Ramis feri monet etiam Theophrastus, sed terra iugiter accumulada, dum germinantes ramuli roborentur, & hic myrti satus proprius est. Didymus: Decerptus à cacumine termes, proceritate subrectus pangitur, qui solo stercore satiato, quousque ramulos emittat, exaggerari debet. Plinius: Seritur & ramo myrtus laxato prius meatu, longitudine trium pedum, crassitudine minus brachiali, cortice diligenter seruato, trunco exacuto. Myrtus etiam ligno conua-

genita-

genitaleq; confectis
caloris haud e-
tum procreatione

Didymus tradit
mergant. Alij lo-
tur, & alibi trans-
Aprilis mense myr-
in Erelio nusqua-

Solidi

Theophrastus
myrtum dixit: la-
que fructum mi-
pata germinatio-
ergo recilis erat
proceritatem a-
sed alternam to-
mos ab ea decidi-
inquit Theopra-
ne copiosissima

facibus, & vrin-
delectari homin-

Didymus in-
malum, & mespi-
cipere ait, & sup-
mum fundum m-
xime myrtus pu-
sim myrtus in p-

Quomodo m-

aqua rigetur, in-
esse fortuito, c-

nucleo reddit-
esse inceperat.

vrinâq; adhibe-
sine interiori

genus immu-
bit crebro aq-

fructum par-
rosâ fructuâ

Theophr-
40 do sub terra

ipsiusq; rami

genitaleq; conseruare principium valeat, non tamen sine adiumento naturalis caloris. haud enim satis spissitas illa facit, si admodum sicca sit, & ad nepotum procreationem inhabilis.

Didymus tradit esse, qui cubitales taleas scrobibus olearū more in obliquū mergant. Alij longe melius fructificare pollicentur, si in caput plantulæ figantur, & alibi transplantatas meliores reddi. Cassianus, Theophrasti autoritate, Aprili mēse myrtos in taleas sectas plantari posse humidis & riguis locis, quod in Erelio nusquam legitur. Plinius & taleis myrtum feri dixit. Virgilius,

Solida Paphia derobore myrtus.

- 10 Theophrastus, Androtionis autoritate, maximam purgationem querere myrtum dixit: latius enim germinat, à qua plura fuerint adempta, largioremque fructum ministrabit. Myrti luxuria ideo compescenda, quia sua natura stipata germinatione fecunda est; adhuc facile exarescunt propter gracilitatem, ergo recisis crassescunt. Didymus. Gaudet arbor iugi repurgatu, in excelsam proceritatem adolescit, ad textile vasculorū opus utilis. Plinius non annuam, sed alternam tonsuram quatit, quia celeriter fruticescit. Cum vetusta est, ramos ab ea decidere, & truncum deinde colere, tãquam denuo satum oportet, inquit Theophrastus. Androtionis etiã autoritate, acerrimo fimo, & rigatione copiosissima myrtum egere dixit, vehementissimo stercore, uti pellium facibus, & vrina ex syluestri genere in vrbani habitum transire. Didymus delectari hominis vrina, & maxime ouilla.

Didymus inferi ait, in suum genus, in albam, & nigram, & viceversa, & in *Ansia*. malum, & mespilum, & punicam. Diophanes in salicem. Tarentinus vitem recipere ait, & super ipsam arborem vitis sarmenta insita vuas producere, quæ immum fundum myrti baccas habebit. Myrtus punicam ferre visa est: quia maxime myrtus punica delectatur, vnde si punica in myrtum inferatur, aut vicissim myrtus in punicam, multo maiorem afferet fructum.

Quomodo myrtus sine interno nucleo fiat, docet Theophrastus. Si feruēti *Ars.* aqua rigetur, in tantum meliorescit, ut sine nucleo reddatur. Deprehensum id esse fortuito, cum myrtus iuxta balneum staret neglecta: ab hac enim vacua nucleo reddita semina petentes serebant, atq; ita genus huiusmodi Athenis esse inceperat. Alium quoq; demonstrat modū: spurcitas pellium congerere, vrinaq; adhibere, cum germina profiluerint, præcipiunt: quasi fructus ita reddi sine interiori nucleo possit. Id enim genus stercoreandi ex syluestri in vrbani genus immutat. Didymus à Theophrasto: Baccas sine internis nucleolis creabit crebro aqua repentis imbre rigata. Latiore coma virebit, vberioremq; fructum pariet, si comes rosa coniungatur. Et cum myrto consortium iniens rosa fructuosior emicabit.

- 40 Theophrastus, Androtionis autoritate, nec medullā habere, nec vllomodo sub terra infestari, tradit. Agelu facillime ladi, imbecilla & gracilis cum sit, *Morbi & remedia.* ipiusq; rami tenues, tenellique, totaque arbor minus calida.

Cultura.

Cato docet, Virgas myrteas si voles cum baccis seruare, cum foliis inter se alligato, fasciculos facito, eos in amurcam demittito, supersteret amurca facito, sed ea, quæ dimissurus eris, sumito paulo acerbiora. Vas quo condideris oblitico planè. Didymus: Myrti baccas diutissime virentes seruant vase non pincato, & diligenter operculato conditas. Alij cum eius ramulis reponere malunt. Aristoteles quærit, Cur fructus myrtorum nõ conditarum magis, quàm folia defluant, conditarum autem, reseruatarumq; alga, vt fit, folia defluant, fructus adhæreant? An ita euenit non conditis, quoniam natura sancitum est, vt fructus peracta decoctione flaccescant, ac decidant, quæ quidem decoctione repositis agi non potest, sed eatenus tantum efficitur, vt alga vapor prohibeat, ne humor fructus immutetur: folia contra cùm siccant decidunt: alga autem, vt salsa, exiccandi vim habent. ergo non idem foliis accidit arbori adhærentibus, & conditis, modo quo dictum est.

Materia.

Virgilius de eius materie,

At myrtus validis hastilibus.

Claudianus,

Et pastoralem prefixa cuspide myrtum

Gerit.

De vua spina. CA P. XXX.

HABETVR frutex pomariis frequens, topiario operi accommodatus, vteribus, vt spero, indictus. Quia ciborum condimentis omphacij modo expetitur, nec non mulieribus vtero gerentibus, nobis non erit silentio prætereundus.

Nomen.

Cùm nomen Græcum, vel Latinum quo appellemus, non subueniat, vulgari, & omnibus vſitato contenti erimus. Vuam spinam, vel crispam nominant ab acinis, quos affert vuæ modo effigiat, & à spinis, quibus frutex toto suo cursu horret: vel crispum à foliis apij modo crispantibus.

Forma.

Fruticosi nanq; generis arbuscula est, ramulis crebris, vietis, crebrisq; horrentibus spinis, aculei mucrone fauentibus. Foliis circinata rotunditatis, æmula facie apium, vel oxyacantham exprimentibus. Flore ex herbido candicante. Granis primo viridibus, acerbisq; mox flauescētibus, dulcibusq; & pellucidis, à pediculo ad umbilicum striatis, non racematim, sed baccatum more dependentibus. Veris initio pubet, dein flores, nec diu post vuas aciditate astringentes affert.

Genera.

Duorum est generum, satiua altera, syluestris altera, quæ baccas pilosas fructu, & vepribus affert.

Celum.

Temperato viuut cælo.

Solum.

Solo tenui, soluto, & pingui.

Satio.

Seritur semine, sed rectius ramulis ad radicem crebrius fruticantibus.

De ma-

DE MO CR
ces, non in
ce, inus verò ha
mala, inquiens:
nata. Nos in ho
lis vltimum est,
lum capere scrip
propter in locis.
10 manibus ramos
admodum videt
fugent, neque v
& punicarum
Mercurio p
mæ latebræ su
eruditus Clem
nicam in hono
lis satam primò
sam reor, nisi o
memorable fu
re, cuius manu
rò malum puni
mone possit exp
malum punicu
tantum numen
Respondit tot
Artabano de ec
tius, quàm Græ
bræorum cetin
30 bar, à cuius am
ne mystica tat
mus cortex pi
sua conseruat
lonem Crot
manuita cor
pomum ipsi
res diu per q
restituere
tria mali pun

De malo punico. CAP. XXXI.

DEMOCRITVS, aliq; Agriculturę scriptores malum punicum inter nuce-
ces, non inter mala reponendum censent, cum foris duro tegatur corti-
ce, intus verò habeat, quod esui sit, eā Gręci *ἀπὸ δρυὸς* vocant. Plinius verò inter
mala, inquit: Mala appellamus, quamquam diuersi generis, persica, & gra-
nata. Nos in hoc loco reposuimus, rati omnibus satisfactum iri, nam & à ma-
lis vltimum est, nucum verò primum. Varro ex malo punico cibum apes so-
lum capere scripsit. Africanus affirmat punicæ ramos serpentes arcere, qua-
propter in locis amœnis tutaminis gratia deponi consuevere. Plinius etiam in
manibus ramos punicorum serpentes fugare scripsit. Quod mihi ridiculum
admodum videtur, cum cuiusque arboris rami in manibus gestati serpentes
fugent, neque vnquam serpentes peiores me vidisse memini, quàm sub vmbra,
& punicarum cespitibus. Sed ad Poetarum commenta veniamus.

Mercurio punicæ fructum antiquitas dicauit, nam veluti in eo quampluri-
mæ latebræ sunt, ita in oratione, quam Mercurio ascripserunt, vt apud Græcos
eruditus Clemens Alexandrinus prodit. Apollonius verò Tyaneus malum pu-
nicam in honorem Iunonis plantari dixit. Habetur etiam ex Græcorum fabu-
lis satam primò in Cyprum malum punicam à Venere, nullam aliam ob cau-
sam reor, nisi ob eius pulchritudinem. Insuper Hereum templum in Eubœa
memorable fuisse Iunonis simulachro ex ebore, & auro factò, Polycleti ope-
re, cuius manuum altera malum punicum, altera sceptrum gestaret. Cur ve-
rò malum punicū gestaret, Pausanias secretius esse dicit, quàm vt alicuius ser-
mone possit explicari. Ideoque prætermittendum. Darius Xerxis pater, cum
malum punicum haberet præ manibus, à quodam interrogatus, cuius nam rei
tantum numerum desideraret, quanta granorum illorum esset multitudo?
Respondit tot Zopyros, erat enim hic vir probus. Sed Herodotus Darium ab
Artabano de eo percontatum tradit respondisse se optare tot Magabizos po-
tius, quàm Græciam subditam. Fuit & punicum maxime laudatū in sacris He-
bræorum ceremoniis. Sacerdos enim tabernaculum ingressurus vestem gere-
bat, à cuius ambitu alternatim, mala punica, & tintinnabula pendebant, nō si-
ne mystica ratione, vt à sacris interpretibus edocemur. Quemadmodum exti-
mus cortex plura continet grana, sic fides vna innumeros populos sacre eccle-
siæ conseruat. Alij dicunt hoc malū concordiam significare. Ferunt etiam Mi-
lonem Crotoniatem inter egregia suæ fortitudinis facinora malum punicum
manu ita continuisse, vt nullis conatibus inde eripi permiserit, & quod mirum,
pomum ipsum premendo non collidebat. Proserpinam à Plutone raptam Ce-
res diu perquisiuit, tandem rescuit, & à Ioue impetravit, vt sibi communis filia
restitueretur, hac lege si nihil apud inferos degustasset: sed inuentum est, eam
tria mali punici grana comedisse. Ouidius in Fastis,

Rapta tribus, dixit, soluit ieiunia granis

Punica, qua lento cortice poma legant.

*Fabule de
malo pu-
nico.*

Aliubi septem fuisse cecinit.

— Et culis dum simplex errat in hortis,
Puniceum curua decerperat arbore pomum,
Sumptaq; pallenti septem de cortice grana
Presserat ore suo.

Sed post multas matris querelas indultum est, ut sex menses apud illam maneret, totidemque cum Plutone. Sed id non sine mystagogica ratione. Proserpina enim luna est, quæ sex mensibus crescit, totidem decrevit, videlicet, ut per menses quindecim diebus crescens apud superos, quindecim aliis deficiens apud inferos videatur. Sed de punice ortu Arnobius fabulam cõtextit: In Phrygiæ finibus ingens saxum fuit Agdus dictum, ex quo Deucalion & Pyrrha ex Themidis præcepto ad humanum genus renouandum post diluuium lapides sumplerunt, ex quorum iactu deam mater efficta fuit, quam in Agdo obdormientem Iuppiter incestis cupiditatibus appetiit: diu oblectatus, cum quod optauerat, obtinere nequisset, sperma in lapidem fudit, ex quo Agdestis natus fuit, qui sua immani efferitate, cum nec deos, nec homines timeret, à diis de eius temeritate imminuenda constitutum est, ut Liber in eum animaduerteter, cui cum merum potui Liber apposuisset, grauissimoque somno oppressus esset, Liber setis complicatis laqueo plantas nexuit ex vna parte, ex alia testes cum pene, qui somno solutus extensis pedibus membrum virile sibi amputauit, cuius cruore mali punici arbor cum suis pomis nata est: quæ cum Nana legisset, ac in sinu reposita, Atym concepit.

Nomen.

Græcis *ποία*, & *πόα* dicitur. Hippocrati, & Nicandro *οἰδῶν*. Menandro, Athenæo auctore, *ποιδῶν*. diminutiuum autem est *ποιδῶν*, veluti puniculum dicas. Bati *οἰδῶν* vocant, nomenque sibi vendicauit ex Side eorū loco, qui frequentissimam hanc habet plantam. Idemque ex Agatharchidis autoritate declarat, quod inter Athenienses & Batiōs orta contentione de Sida regione, Epaminondas protinus ex dextra conditum depromens punicum, sciscitatus sit, quonam modo malum hoc vocatis? qui Rhoan responderunt. sed nos, inquit sidam vocamus, & ita Athenienses victi memorantur. Latinis malum punicum dicitur, quod è Pœnorum regione primum in orbem nostrum sit translatus, ob id Plinius, E Carthagine nomen sibi vendicant, crescunt enim ibi laudatissima. Aliquādo & punica Columella mala granata vocat, & granata. Sic etiam Plinius, quod numerosis intus acinorum granis infarctum sit. Est & vna pars Beticæ regionis in Hispania, quæ ab eorum copia Granata appellata est. Itali *Me- lo granato* vocant.

Forma.

Punica descriptionem membratim discerptam à Theophrasto in vnū colligemus. Exurgit punica haud adeò procero caudice, sed breui, & cõorto. Medulla ligni carnosa. Fruticosa est, suæque exilitatis causa multiplici caule diffusa relinquenda. Ramosa, superiore coma multo fusiore. Folio angusto, cuo- 40 mi arbori simili, quemadmodum & magnitudo, nitidiq; viroris. Flore cõtra quam

V
ceteris arboribus
subrubicundum
cinemque sui pom
attollens se collig
corio, prætenui
farcto, qui cons
paliori. Acini p
mumque: vnde ex
tio, quæ ad ortu
10 omnibus comm
culo, quam quau
Quod remotius
ce fructus etum
ne propter at
iam institutas
valet, alimentu
supergerman
ne, qui non sol
fectionem vsq;
10 eius serius ex
cinia arbores, l
rosa radice nitat
citò senescat. A
vis est vita, ratio
tas obnoxiam r
vita fundament
punica non ita,
Et si senescit pun
tur radicibus, &
30 pè stipitem, sed
mum solum gr
confluxerit, eo
ex eo ita depin
vocat, &
men accepit
membrana t
ut in fauis, co
quia vulgus
Graci. Germi
40 ribus ramoru
in matre. Breu

cæteris arboribus puniceo, excipiendo amygdalarum genus quoddam, quod subrubicundum florem substat: qui creber, copiosusq; erumpit, amplitudinemq; sui pomi, quadamtenus æmulatur, is in fructum incumbit, qui subtrus attollens se colligit, & ambitu congruo sinuatur, calatiq; effigie. Pomo quod corio, prætenuiq; membrana tegitur, numerosis intus acinorum granis infarcto, qui constant cute, & humore, vel succo vinoso, acidoq; modo nuclei paliuri. Acini principium annexus proprium habere videntur, euidentissimumq;: vnde expresse discernitur. Germinat latere, & cacumine. Germinatio, quæ ad ortum Arcturi post vernum æquinoctium fieri solet, & si vrbani omnibus communis, peculiaris est tamen punicæ. Anniculo fructificat surculo, quamquam suo caudice fructificasse nonnunquam prodigiose fertur. Quod remotius à ratione videtur, cum ex crassioribus brachiis, aut ex caudice fructus erumpat: sed caudex, & rami non differunt, nisi materiæ crassitudine propter ætatem, ædito enim ramo ex parte noua, & iam via facta, facile per iam institutas laxitates subit ad fructum succus: facile germinat, quia viribus valet, alimentoq; abundat. Nec est ad germinandum solum propensa, sed ad supergerminandum, nam secundo turget, etiam inchoata fructus ostentatione, qui non solum prioribus specie cedunt, sed fructificandi impetus ad perfectionem usq; non peruenit. Cuius causa est, quia facillime afficitur. Cytini eius serius exeunt, quia operosiores sunt, cum sint corpulenti. Parum sua viciniæ arbores lædit, verasq; obrinet innocentia conditiones, cum non numerosa radice nitatur, & modico leuiq; egeat nutrimento, & brevis vitæ sit, cum citò senescat. Auctu facilis, quia natura humidior, solutioreq; constat. Brevis est vitæ, ratione fecunditatis, ac concretionis raritate, quippe partium laxitas obnoxiam reddit externis impressionibus, fecunditas autem exhaurit vitæ fundamenta, cum robore careat, quod sibi, & fœtui sufficiat. Et acidæ punicæ non ita, vt dulces putrescunt, & magis quæ nucleo carent interiori. Et si senescit putrescitq;, velocius arbor suo latere germinat. Breuibz innititur radicibus, & angustis, prolemq; suam sursum generat. Sed non solum prope stipitem, sed procul fecundat noua sobole: quacunq; enim radix per summum solum graditur, illic germen formam stipitis induit, quò enim succus confluerit, eò facile vi solis coit coquiturq;. Fisso caudice nō moritur. Plinius ex eo ita depingit: Punicæ arbor angusto folio comatur. Flos eius balauustum vocatum, & medicinis idoneus, & tingendis vestibus, quarum color inde nomen accepit. Pomi partus florere incipientis cytinus vocatur Græcis. Pomum membrana tegitur. Acini sub cortice intus. Angulosi soli, structura eorum, vt in fauis, communis. Corticis maior vsus ex acerbis ad perficienda coria. Et quia vulgus coria perficere maxime illo nouit, ob id malicorium appellant Græci. Germinat præter quàm vere, etiam Canis ortu, & Arcturi. Fert è lateribus ramorum, & cacuminibus. Decidentibus foliis poma tantum est aspicere in matre. Breuissima eius vitæ, ex his breuior dulcibus, quàm acutis. Velociter

senescit, sed è radicibus repullulat. Velox nascitur, cito occidit, in trimatu ferre incipit, ostendens & ante. E radicibus pullulat densa soboles. Hæc Plinius. M. Varro ait: Quæ laxiora, ea & fecundiora, ut malus punica propter molli-
 tiem, ad crescendo pronæ.

Genera.

Theophrastus plura genera punicarum connumerat. Durum, & enuclea-
 rum: aliud insuper genus, cuius acini glauci, aliud cuius viles. Item acidum,
 dulce, vinolentum, sic & sylvestre. Est & genus punica, quod fructum perficere nequit, sed ad florem vsq; eius generatio tantum provenit. Plinius verò
 diuisit & in genera, apyrinon vocando, cui lignosus nucleus abest, sed candi-
 dior ei natura, & blandiores sunt acini, minusque amari, distincti membra-
 nis. Nucleos habentium quinque species, dulcia, acria, mista, acida, vino-
 sa. Samia, & Ægyptia distinguuntur erythrocomis, & leucocomis. Et alibi,
 Punici mali nouem genera, dulcia, apyrina alio nomine appellantur; paruum
 nucleum habentia acida. Est & sylvestre punicum à similitudine appellatum.
 Dioscorides tres species apposuit, acida, dulcia, vinosa. Nos ex his ita distin-
 guemus: Punica in duo primum genera diuidemus, sylvestre & vrbantum. Syl-
 uestri generi accommodabimus, quæ fructum vsq; ad florem producant. Vrb-
 antum in duo genera diuidemus, alterum ἀπύρινον Græcè dictum, quod præci
 medici dulce granatum vocarunt. Sed nos Græcam etymologiam sequentes,
 ἀπύρινον, ut Dioscorides explanat, cui lignosus nucleus abest. Seneca, Non cui
 nulla nucleorum durities sit, sed cui minima. Nucleos habentium species quin-
 que. Dulcia, acida, acria, mista, vinosa.

Calum.

Florentinus feruente cælo gaudere retulit. Palladius regionem illi aptam
 esse, quæ calida sit, memoriæ mandauit. Ob id frigidis regionibus, ut in Ger-
 mania Flandriaq; minime visuntur.

Solum.

Florentinus loca illi minime aquosa conuenire dixit. Apuleius aridiori-
 bus locis vehementer vberes provenire experimento didicit. Palladius solum
 cretosum, & macilentum amare, sed in pingui etiam provenire scripsit. Pli-
 nius in montibus non temere videri, atque in Africa Carthagine laudatissi-
 mas. Theophrastus in Thmolo Olympoq; Mysio copiosissimas, & in Ponto
 ample opacitatis haberi. Athenæus Sidam Bætiæ regionem frequentissimam
 hanc plantam habere scripsit. Imò & loca sunt, quæ eorum priuatam natu-
 ram conuertunt. Refert Theophrastus, Si sata punica fuerit acida, in Ægypto
 in dulcem, & vinolentam conuertitur. In Cilicia verò circa Solos iuxta Pina-
 rum amnem, ubi cum Dario conflixit Alexander, præter suauitatem nascun-
 tur sine ligno interiori, & visenda acinorum specie. Quamquam aliubi puni-
 cum acidum edere dulce, vel dulce acidum, ostentum aruspices existimaue-
 rint. Sed punica cur mutetur, in causa est sua raritas, & imbecillitas, quæ nanq;
 huiusmodi sunt natura, obnoxia sunt mutationi. Cur verò sapor illius pecu-
 liaris in Lycia excellit, causa est amnis vicinitas, ac illius aquæ qualitas. Est e-
 nim punica aquarum præauida; & rigatione fit dulcior, imò ex profluentis
 amnis

amnis

amnis rigatione
 rum esse non deb-
 mus, quales Afri-
 midis est magna
 eida, & parum du-
 runt, montes, col-

Theophrastus
 cinis glaucis villa,
 pro, & Cilicia, v-
 & natas tarde cr-
 si infirmitate meli-
 dis in locis minim-
 ri locis temperat-
 ferit. Plinius in
 que ipsam ita lo-
 feri iubet comite-
 nouem pedes di-
 earumque fructu-
 tur, tantundem

propter earum infir-
 bent, ut à nimio
 sima cunctis est
 constat radicibus
 rusque improbus
 atam experitur,
 deniores senius
 Plutarchus in sy-
 autumni exitum
 him enim, & re-

dior fieri, ob id
 eum maturare
 consuetudine
 gantur, fertilio
 epo complexu
 bere ne decid-
 prius palis me-
 tis Cassianus
 neribus seratu-
 dine, & capite
 40 gieur: prius ta-
 est, oblinatur

amnis rigatione magnitudinem acquirere, & ex acida in dulcem mutari, mirum esse non debet. Nos arenosis pinguibus locis latas prouenire conspeximus, quales Africa esse retulerunt. Confurgunt enim lapidosi loci: sed humidis etsi magna quidem poma producantur, insipida tamen, vel maxime acida, & parum durabilia sunt. Conuenienti solo vnumquemque situm suffe-
runt, montes, colles, plana, & valles.

Theophrastus, punica semine sata omnino degenerare contendit, & ex acinis glaucis vilia, & ex enucleatis dura, & plerumque acida oriri, nisi in Ægypto, & Cilicia, vt diximus. Sunt qui dicant ex satis seminibus, paucas nasci, & natas tarde crescere, & fructus inutiles, & insipidos ferre, & non nisi infitione meliores euadere. Nos tamen in Stabiarum seminariis, humidis in locis minimè vilia enata granata conspeximus. Palladius viuiradice feri locis temperatis Martio mense, vel Aprili, calidis, & siccis Nouembri asserit. Plinius in satione radices inflexas poni melius esse docet, arboremque ipsam ita locari, vt media sit totius scrobis, necessarium est. Florentinus feri iubet comite scylla. Theophrastus crebras esse serendas, non plus, quàm nouem pedes distantes præcipit. Ratio est, quia opacitatis amatrices sunt, earumque fructus ficii, & nucleosi sunt, quippe si plusculum solis experiantur, tantundem acerbatis accipiunt, quantum soles excessere. Ideoque propter earum infirmitatem mutuis opacationibus vmbra cōsequi necesse habent, vt à nimio frigore, æstūve se defendant. Vnde facillima, & innocentissima cunctis est punica, nec arbores vicinas fatigat, tum quia breuioribus constat radicibus, adeo, vt nullus radicum decursus, nullus complexus, rixatusque improbus infestet, neque intolerabili egeat pabulo, tum quia cito senectam experitur, nec diu queat molesta esse. Ab eo Plinius: Quidam punicas densiores seri iusserunt in pedibus tamen nouenis. Sed Empedocles (vt refert Plutarchus in symposiacis) punicam malum ὀψιγενήν dixit, quod scilicet sub autumnii exitum calore eneruato, hæc arbor suum excoquit fructum. Imbecillum enim, & tenuem humorem sol non sinit coire, nisi arbor incipiat frigidior fieri, ob id Theophrastus hanc arborem in vmbra rectius, & celerius fructum maturare dixerit. Democritus testatur punicam, & myrtum matua consuetudine mirum in modum oblectari, quod si inter se consortio iungantur, fertiliores reddit: radices quoque si non longo distent interuallo mutuo complexu ex hilarari. Aristoteles ait punicas inter oleas plantatas prohibere ne decidant, & maturentur. Palo feri Plinius punica monstrat laxatoprius palis meatu. Sed in taleas sectos ramos plantari locis humidis, & rigatis Cassianus docet ex Quintiliis. Palladius autem, Quamuis, ait, multis generibus feratur, melius tamen ramus eius cubitalis incisus manubrii crassitudine, & capite utroque acuta falce leuigatus, scrobi veluti obliquus immergitur: prius tamen porcino stercore, & in capite, & in parte, quæ ima est, oblinatur, vel in crudo solo malleo cogatur ad inferiora desigi. Melius

Satin

proueniet, si ponendus ramus gemmata iam matre sumatur. Nos has taleas decidimus, quas diu fecundas conspeximus, si malleo adigitur, pars ea, quæ terræ adigitur, acuat, ut facilius ad inferiora descendat, & quatuor digitis supereminet. Melius tamen proueniet, si scrobem pastino aperiemus, ac ipsi apte collocabimus: habeat pars ima à matre aliquid, ac circumcirca optime calcetur terra, caput taleæ in nodum finiat, unde spes futuri germinis. tempus huic aptum ver erit, eoq; modo optime prouenisse conspeximus. Prouenire ex virga etiam Theophrastus prodidit, sed ramo prius infixo foramen fiat, ratione suæ infirmitatis. Quidam in contrarium seri præcipiunt, ea ratione, ut subinde se valeat inclinare, nec in altum excreseat, ne flores in altum erecti suscipiant humorem, indeq; excidant. Palladius curandum esse ne in uersa virgulta ponantur dicit: contra prædictum Theophrasti præceptum. Apud nos virga sata etiam optime apprehendit.

Cultus.

Inter cæteras, Theophrasto auctore, punica maximè coli desiderat, nam nisi cultus adhibeatur, sylvestris omnino redditur, & si neglecta degenerat, non solum cultu mitescit, sed etiam mutatur. Androtionis etiam autoritate, purgatione maxime indigere, nec medullam habere, nec vlllo morbo sub terra infestari, sed cum arbor vetusta est, ramos cadere, & truncum deinde colere, tanquam denuo satum oportere. Præterea frequentium aquarum copiam desiderat. Palladius credit acidum fieri si rigeret assidue, nam siccitas in eo & suauitatem præstat, & copiam, cuius tamen nimietati aliquid debet humoris apponi. Circumfodi autumnus debet, & tempore verno. Plinius ait punicas præcipuè riguis ali.

Institio.

Punicam, & quæ ea sicciore sunt, protinus à sectione inserere iubet Theophrastus. Ex quo Varro: In malo punica, & si qua etiam horum natura aridiora, continuo postquam defecata fuerit, inferi debet. Punicam, Plinius ait, quamquam aliàs sicca sit, recraftinare minime utile. Florentinus verò diuerso à cæteris arboribus modo inferi docet. Caudicem eligi præcipit flexilem, qui possit vsq; ad terram deduci, ipsumq; sub corticem inferi, deinde vinculis distringi, & obrui, ne possit in suam sedem resilire, sic ut insita pars supereminet, demum amurca suffundi. Est & aliud scitu non indignum. Punicæ surculus iam oculis gemmascens accipi debet, in aliis prius, quam germinet. Latatur hæc myrti coniugio, ut refert Didymus, ideo insita myrto punica, aut contra myrtus punicæ, multo plurima poma largietur. Item salici inseritur. Recipit etiam citrium, ut idem testatur. Punicam variis gaudere adulteriis Diophanes retulit, inferi in salicem, & pyrum recipere. Plinius omnis generis arbore inferi posse punicam autumat. Palladius verò ex Martialis relatione inferi posse affirmat ramorum connexionem, ut medulla viriulq; diuisa se iungat: in se tamen inferi potest, circa Aprilem calendæ, mense Martio vltimo, sed secto trunco furculus recentissimus statim debet inferi, ne mora exiguum, qui inest, siccet humorem. Ad Paphilum verò,

Punica

Nolrantes agri
io, sed difficillime
vanitatis potius G
gaudere adulteris

Punicarum mu

10 dulces transeant,

porcino radicibus

cia sunt. Ex quo

vrina, vel pellium

ri desiderant, id

nam radices pun

est, cum aliment

cum radix quali

mutatio sequitur

& Cilicia totarum

10 natura agri tribu

biudine causa pe

tionem facere do

peculiaris in prim

suillam, vel quoc

iectum dulcorat

afferri aliquam di

suillum iniici, ac

nica acidum, aut

Stercore suillo,

30 & fecundas ar

verò & dulcem

ris vino diluit,

acorem malor

queatis radicib

dulcia futura

singulis ampl

ladius: Si aci

boris cacumini

gi. Alii algam

40 alfinium, atq

sic comparari,

Punica non alios unquam dignata saporē

Mala, nec externis associata comis.

Ipsa suas argent mutato semine gemmas,

Et sibi cognato picta rubore placent.

Nostrates agricolæ fisso trunco Februario inserunt, emplastrant verò Maio, sed difficillime omni modo comprehendit, nec recipit, nec aliis inseritur. vanitatis potius Græcos redarguerem, quàm laudarem, cū punicam variis gaudere adulteriis dixerint.

Punicarum mutationes culturæ ratione exultant. Vt ex acidis amarisve in ^{Axi.} dulces transeant, docet Aristoteles libro de plantis. Mala granata stercore porcino radicibus iniecto, ac frigida aqua dulci rigata, meliorescunt, & dulcia fiunt. Ex quo Theophrastus eius discipulus, Earum radicibus ingeratur vrina, vel pellium fæces, non tamen multum. Earum enim radices remorderi desiderant, idque diutius, vt in amygdalis tertio quoque anno diximus, nam radices punicæ plus temporis persistunt. Ratio, qua fructus permutatur, est, cū alimentum magis percoquitur: tunc verò alimentum percoquitur, cū radix qualitatem quandam cepit, sic mutato principio, totius naturæ mutatio sequitur. Alimentum immutat, si diutius sequetur. Sed in Ægypto, & Cilicia totarum arborum permutatio fit & sponte, vnde effectio, & vis illa naturæ agri tribuenda est: sed si non arbor tota mutetur, ex alimento & habitudine causa petenda est. Theophrastus granata dulciora mollioraq; aquationem facere docet, nam acerbitas, atq; duricia, tale auxilium desiderat. Sed peculiaris in primis mollietis, quæ radicibus exhibetur, apparet, stercus enim suillum, vel quod vim proximam illi obtinet, radicibus punicarum superiniectum dulcorat succum, quin etiam copia, & frigiditate aquæ mutationem afferri aliquam dicitur. Paxamus radices arboris circumfodi iubet, & stercus suillum iniici, ac superiniecta terra hominis vrina irrigari. Columella, si punica acidum, aut minus dulcem fructum ferat, hoc modo emendari iubet. Stercore suillo, & humano, & lotio humano veteri radices rigato, ea res & fecundas arbores reddet, & primitiuis annis fructum vinosum, postea verò & dulcem, & apyrenum faciet: Ipse verò exiguum admodum laseris vino diluit, & ita cacumina summa arboris obleuit, ea res emendauit acorem malorum. Ex quo Plinius: Si mala punica acida nascantur, ablaqueatis radicibus suillum adhibent, eo anno vinolenta, proximo dulcia futura. Alii vrina hominis aqua mista riganda censent quater anno singulis amphoris, aut cacumina spargi vino lasere diluto. Ex quibus Palladius: Si acida nascatur, modicum laser cum vino tritum per summa arboris cacumina oportet infundi vel ablaqueatis radicibus tedæ clauus infigi. Alii algam marinam obruunt ad radices, cui nonnulli stercus miscent asininum, atque porcinum. Sed quomodo magnitudo pomorum arte possit comparari, docet Theophrastus: Cytini, vbi formati sunt, in pertusam

eos transmittunt ollam, deorsum absque noxa deflexo ramo, terra obruunt, eoq; modo in miram crescunt magnitudinem. Ratio est, quia defendit eos olla ab iniuria caloris populantis. Item à terra nonnihil suppeditatnr humoris, unde fiat accessio magnitudinis ex alimento. Arbor enim fructui non præproperum distribuit alimentum, quare acini non euadunt maiores aliis, qui nulla terra obruti adolescunt, sed eis crassius corium fit. Succus proprius in tantum naturali conficitur, & excoquitur: ideo sapor malorum dilutior, ac deterior, cortex autem extrinsecum recipit alimentum, utpote, qui minus alimentum conficiat. Quod Palladius ex Martiali recitat. Locis calidis, Maio mense, mala punica florere incipiunt. Ramus ergo cum flore, si obruto circa arborem fictili vase claudatur, & ne resiliat ligetur ad palum, pro vasculi magnitudine pomum reddit autumnno. Itemque Martio mense miræ magnitudinis poma fieri, si olla fictilis obruatur circa arborem punici, & in ea ramus, cum flore claudatur, ne resiliat ligatus ad palum. Tunc cooperta olla, contra aquæ muniatur incursus. Autumnno patefacta, suæ magnitudinis poma redhibebit. Etiam Iunio mense fieri potest. Nos tutius, & melius id facere consueuimus. Accipimus vêtus latamen, cui æquales adicimus partes suilli stercoreis, ac vini facium, itemque ordeaceum furfurem, locoque ab aquis tuto commixta seruamus per annum, singulis quoque mensibus remiscendo, his demum acetum adicimus, ac in vnguenti formam reddimus, & Nouembri, vel Octobri mensibus radicum partes punicæ disco operimus, ac misturam circum accommodamus, inde rerram inducimus. Sic suo tempore miræ magnitudinis poma euadunt, & singulis quoque annis idem faciendo, maiora semper producemus. Quomodo varios punica fructus ferat demonstrat Theophrastus. Malleo castigant virgarum duriciem, ut contulis partibus facilius admittantur ad vniionem, mox arctissime colligatas pangunt. Tunc arbor vna, ex compositarum virgarum coitu exurgit, sed vniuscuiusque pars sibi facit, & suum ius tuetur, & suum quemque succum trahunt, & coquunt, nec aliud inter se commune habent, quàm mutuum illum complexum, coalitumque. Sed ut acini sine nucleis nascantur, superius ex Theophrasto vidimus nucleorum duritiem aquatione tolli. Sed sine nucleis Africanus nasci promittit, si dempta, ut in vite, medulla, fissum furculum obrues, & dum comprehenderit, recidas, quod emerferit. Democritus ramuli medullam auriscalpio eradit alte, quantum fieri possit sarmento non fisso, & laseris cyrenaici succum aqua dissolutum ad sapæ spissitudinem coctum infundit, & erecta sarmenta ad ridicas illigat, ne succus effluere possit, singulis deinde hebdomadibus succum eundem sarmento infundit, donec germen emitat. Rubra fieri mala Diophanes scriptum reliquit, si ex lixiuo balneorum arboris radices rigentur. Sed Didymus aquam cum lixiuo permisceri iubet. Candida in punicis grana fieri pollicetur Palladius, Martialis auctoritate, si argilla, & creta

quartam.

quartam partem
ius adiungas. Vt
totidem numerum
arbore legantur. In
tudine malorum
stant. Sed ramus in
rum, ne dum de
ybi corni proprius
bri per medium se
furculus descen
cum, & imprime
me apprehendat
tinentem.

Theophrasti
le labuntur. R
untur, cum eni
stant, ideoque
dunt arbores el
ramorum nutan
quoque eorum co
ctos nequeant
puius flores an
rem infestum ex
continet, vrinat
num radicibus in
mites in fufam
boris florentis tr
involuere. The
teum succus eo

us: Vermiculat
us: Si vermibu
tur, aut clatio
rina stercorea
canus in exca
plantata fuer
scorda, nec
si secundum
arbore, reme
locaueris. At
ces ferito. Al
petiolos quib

quartam partem gypsi misceas, & toto triennio hoc genus terræ radicibus eius adiungas. Vt dicere possis, quot grana punicum habeat: Acinos granati totidem numero in singulis affirma, & si magnitudo variat, modo ex eadem arbore legantur. Nam quod plures, aut pauciores acinos habeat, id ex magnitudine mali non euenit, inde enim est, quod acini maiores, aut minores existant. Sed tam in siue mendacium ferre nequeo, cum magnum paruum centum, ne dum decem acinis vincat. Vt ex vno acino punicum facias: In syluis vbi corni proprius natalis locus, earum viuaciorem eligas, vltimo Nouembri per medium seca, & cera circunda plagam, & à trunci parte illa, per quam furculus descensurus est, post decem circiter dies amoue ceram, & finde truncum, & imprime fissuræ punicæ furculum, vt ere agricolationis arte, vt optime apprehendat, ostendet opportuno tempore fructum vnum acinum continentem.

Theophrasti testimonio punicæ ante maturitatem flores, & fructus facile labuntur. Ratio est, quia debili pediculo pendent, facile iacturam patiuntur, cum enim celestes imbres decidunt in cytinis, eos subeuntes humectant, ideoque facile dilabuntur. Contra hæc ars parat præsidia. Non concedant arbores elatiores fieri, sed breues ac sub iuctas, sic imbecillitate exilium ramorum nutant cytini, ita vt os auersum à cælo non excipiat humores. Par quoque eorum consilium, qui virgas depangi iubent, vt obtenuitatem subrectos nequeant cytinis substinere. Ex quo Plinius: Punica roribus nimis, & pruinis flores amittit, qua de causa inflectunt ramos eius, ne subrecti humorem infestum excipiant, atque contineant. Palladius: Si florem punica non continet, vrinam veterem cum pari mensura aquæ temperabis, & per annum radicibus infundes, vni arbori amphora ingesta sufficiet. Vel amurcam mittes insulsam, vel algam radicibus iunges, & bis rigabis in mense. Vel arboris florentis truncum plumbeo circulo debebis includere, vel corio anguis inuoluere. Theophrastus ait, punica quæ dulcia sunt, celerius putrescere: etenim succus eorum imbecillior est, & mutationem facilius recipit. Plinius: Vermiculationem poma ipsa per se quibusdam annis sentiunt. Palladius: Si vermibus laborant, tanges radices felle bubulo, & continuo moriuntur, aut clauo æneo si vermes eorum punges, difficile nascentur, vel asini vrina stercorei admista porcino vermibus obuiabit. Ne punica dehiscant: Africanus in excavatos scrobes cum pangerentur silices ingerebat. Si arbor prius plantata fuerit, scyllam iuxta plantabat, quippe cæca quadam naturarum discordia, nec dissilire mala, nec rupta fatiscere patiuntur. Similiter nec dehiscet, si secundum caput plantata fuerit. Columella: Mala punica ne rumpantur in arbore, remedio sunt lapides res, si cum feris arborem ad radicem ipsam collocaueris. At si arborem iam satam habueris, scyllam secundum arboris radicem ceserito. Alio modo, cum iam matura mala fuerint, antequam patiolos quibus pendent intorqueto, eoq; modo seruabuntur, etiam

Plinius ait: Quidam punicis malis substrato lapide non rumpi pomum in arboribus tradunt. Palladius, Si crepant mala, lapidem in media arboris radice supponas, vel squillam circa arborem seras. Et si dum pendent poma, tenacibus, sicut in arbore habentur, intorseris, in totum annum sine corruptione seruabis. Sed qui in scrobe deponit, si tres lapillos in ipsa radice constituat, prouidebit, ne poma findantur. Copiosa in punica mala nasci Democritus asserit, si rithymali, & portulacæ succo bene commixto arboris truncus antequam germinet adlinatur. Lata, & fructuosa reddi Palladius arbusta dicit, si cinis cum lixiuo, circa punici truncum frequenter imponatur. Si fructus crudos creabit, Theophrastus nimiam humoris ueritatem detrahendo eam castigat. Ab auibus non impeti Florentinus scribit, si cucurbita & rapum, quæ nullo antea humore maduerint, apponantur. Languentes arbusculæ fuso in mari scaturiente recreantur, si parte ima candelæ radice tenuis inuoluatur, ex Florentini placitis. Et si punica inualida est, quia rara, non ob id laborat gelu, raritas enim facit, ut transmittat gelu, in solidis uero validius inhaeret.

Codiura.

Speciosum hoc pomum, & utile, quomodo diuturnius custodiatur in columine, tum ob ipsius erga ægrotos facultatem, præsertim in extinguenda siti, tum ob alios mortalium usus, non pauca excogitarunt, & adinuerunt maiores nostri præsidia, nos ea primum, quibus in arbore vegeta permaneant, mox quibus decerpta feruentur recitabimus. Beritius hoc modo in sua parente hære repatitur: Arente flosculo singillatim inuoluta mala funiculis obstringunt, ne tumescencia dehiscant in rimas: sic tamen munera relinquunt. Potest & hoc in aliis malis obseruari. Alii in singulis fictilibus ollulis singula collocant, & diligenter operas ita stabiliunt, ne vel caudicis occursum, vel mutuo eorum collisione possint confringi, ita & uerius, & adultis semper potentur. M. Varro: Punica immatura cum hærent in sua virga si dimiseris in ollam sine fundo, eamque si conieceris in terram, & obteres circum ramum, sic ne extrinsecus spiritus efflet, non modo integra eximi dicit, sed etiam maiora, quam in arbore unquam pependerint. Columella: Quidam pediculos punicorum, sicuti sunt, in arborem torquent, ne pluuiis mala rumpantur, & hiantia dispareant, eaque ad maiores ramos religant, ut immora permaneant, deinde sparteis restibus arborem cludunt, ne aut coruis aut cornicibus, aliisue auibus pomum laceretur. Nonnulli vascula fictilia dependentibus malis aprant, & illa luto paleato, arboribus hære patiuntur. Alii fæno, vel culmo singula inuoluunt, & insuper luto paleato crasso linunt, atque ita maioribus ramis alligant, ne ut dixi vento commoueantur. Sed hæc omnia sereno celo administrari sine rore debent, quæ tamen, aut facienda non sunt, quia læduntur arbusculæ, aut certe non continuis annis usurpanda, præsertim cum liceat etiam detracta arboribus eadem innoxia custodire. Granata autem lecta, quæ custodire cupis ad hybernos usus. Beritius: Poma leni manu, ne tactu

aspetiore:

aspetiore uirgine
originem afferunt
scrobe querna, su
te aqua marina, v
co suspendunt fri
custodiuntur tem
in arena sicca con
runt, recondantur
iam decerpta, ac n
10 daneæ siccissimo
est, infinguntur san
pediculis, & sam
medollam habet
ne minus quatuor
et scrobi opere
quæ fuerat egest
let resolutam ten
fluuialem arenam
præcipit aquam
10 tõe illigata paul
le siccari, postea
sterò die, usque in
ri. Sed idem auct
& cum argilla ex
quam dimittere
rum custodit. I
paleam, vel illig
facto primo tabe
donec virens im
10 so luto diligente
nitur, cum pedic
iam cum ramul
ramulis suis arb
in sole siccant, de
co suspendunt.
sole siccata, ita
ciper luit. M. C
seruantur, si pi
marina, vel m
10 centur, ut sub
volueris uti, aqu

asperiore vitientur, aut vulnus sentiant, interlegi debent, nam ea putrilaginis originem afferunt, & incocta pice mergi, refrigerataque suspendi. sunt qui in scrobe querna, suffuso prius aceto, composita obruant. Alij integra in feruente aqua marina, vel muria demergunt, vt combibant, dein sole reficcant, & loco suspendunt frigido, & cum vti volunt, aqua dulci pridie macerant. Longo custodiuntur tempore, si in feruentem aquam intingantur, & protinus erepta in arena sicca componantur, aut tritici cumulo in vmbra, dum rugas contraxerint, recondantur. M. Varro mala punica demissis suis surculis in dolio arenam decerpra, ac matura condit. Columella ita feruat: Sub recto fossula tripedaneæ siccissimo loco sunt, eoque cum aliquantum terre minuta repositum est, infiguntur sambuci ramuli. Deinde sereno cælo granata leguntur cum suis pediculis, & sambuco inferuntur, quoniam sambucus tam apertam & laxam medullam habet, vt facile malorum pediculos recipiat, sed cauere oportebit, ne minus quatuor digitis à terra absint, & ne inter se poma contingant, tum facta scrobi operculum imponitur, & paleato luto circumlinitur, eaque humo, quæ fuerat egesta superaggeratur. Hoc idem in dolio fieri potest, siue quis volet resolutam terram vsque ad dimidium vas elicere, seu, quod quidam malunt, fluuialem arenam, cæteraque eadem ratione peragere. Pænus quidem Mago præcipit aquam marinam vehementer cale fieri, & in ea mala granata, lino spartove illigata paulum demitti, dum decolorentur, & exempta per triduum in sole siccari, postea loco frigido suspendi, & cum res exegerit, vna nocte, & postero die, vsque in eam horam, qua fuerit vtendum, aqua frigida dulci macerari. Sed idem auctor est, creta figulari bene subacta recentia mala crasse illinire, & cum argilla exaruit, frigido loco suspendere. Mox cum exegerit vsus in aquam dimittere & cretam soluere. Hæc ratio tanquam recentissimum pomum custodit. Idem iubet Mago in vrceo nouo fictili substernere scobem populeam, vel iligneam, & ita disponere, vt scobs inter se calcari possit. Deinde facto primo tabulato rursus scobem substernere, & similiter mala disponere, donec vrceus impleatur, qui cum fuerit repletus operculum imponere, & crasso luto diligenter oblinire. Omne autem pomum, quod in vetustatem reponitur, cum pediculis suis legendum est, sed, si sine arboris noxa fieri possit, etiam cum ramulis, nam ea res plurimum ad perennitatem confert. Multi cum ramulis suis arbori detrahunt, & creta figulari cum diligenter mala obruerunt, in sole siccant, deinde si quam rimam creta facit, luto linunt, & assiccata frigido loco suspendunt. Plinius ex eo, Punica aqua marina feruente indurari, mox triduo sole siccata, ita ne nocturno rore contingantur, suspendi. cum libeat vti, aqua dulci perlui. M. Cato in doliis arenam seruari iubet. Palladius ab his: Punica mala feruantur, si picatis pediculis ordinata suspendas. Aliter, Lecta integra in aqua marina, vel muria feruente mergantur, vt combibant. Post triduum sole siccantur, vt sub dio nocte non maneant, post in loco frigido suspendantur. Cum volueris vti, aqua dulci pridie macerabis, feruntur hæc pomis recentibus æmu-

lari. Item si tactu inuicem separata paleis obruantur. Item fossa sit longa, & cortex eiusdē magnitudinis paratur, cui mala acutis surculis suis affiguntur. Tūc inuersus cortex supra fossam ponitur, vt mala sine terræ tactu subter pēdētia ab humore defendant. Item si induantur argilla, & ea siccata loco frigido pendēat. Item si seriola sub dio obruatur, quæ habeat arenas vsq; ad mediū, & mala cum tenacibus lecta imprimantur cannis singulis, vel sambuci virgulis, & ita separata in arenis figantur, vt ipsa quatuor digitis emineāt ab arena. Hoc & sub tecto in scrobe bipedanea fieri potest, & vtilius est ad seruandum si cum ramo longiore tollantur. Aliter: In seriola, cui ad mediū aqua mittatur, suspenduntur mala, ne humorem tangant, & seria clauditur, ne ventus irrumpat. Item in do-
lio intra ordeum sic ordinantur, ne se inuicem tangant, & dolium desuper o-
peritur. Hęc de punicorum conditura maiores prodidit, quæ referre non pi-
guit, & si eadem proferant, aut si alter ab altero aliquid immutat, ex diuersa,
quæ successit, experientia descripserunt, vt & lector sibi melius consulat.

De pinu. C A P. XXXII.

DIXIMVS de malis, de nucibus dicturi auspicabimur à pinu, cū & fru-
ctus omnes conī magnitudine superet, & perpetuo vireat folio, cuius
proprius locus licet sit in syluis, Theophrastus tamen & Plinius inter urbanas
arbores recensent, sic etiam Virgilius:

Fraxinus in syluis pulcherrima, pinus in hortis.

*Fabula de
pinu.*

Pitys (vt Græci fabulantur) puella fuit olim perquam illustris, quam vnicē
Pan adamabat, hanc quoq; deperibat Boreas, puella viriq; adducta potius Pa-
ni adhæsit, propterea zelotypia irritatus rivalis Boreas, Pityn in saxa propul-
sans, neci dedit, cuius mortem tellus dolens, in eius nominis arborem cōmuta-
uit, mutatoq; vitæ genere apud eos mansit. Pana virens coronat, lugetq; indi-
gnum facinus arbor collachrymans, quod Boreas eam immeritam proteruo
spiritu impulerit. Huius fabulæ inuolucro Poetæ mirā arboris naturā innuunt,
nam flet arbor, vbi Boream afflantem percipit. Cybelæ deorum matri pinum
dicaui antiquitas, vnde pini nuce à Martiali Cybeles poma dicuntur:

*Poma sumus Cybeles, procul hinc discede viator,
Ne cadat in miserum nostræ ruina caput.*

Cybelæ iccirco sacra propter Atym ab ea adamatam, atq; in hanc arborem
transformatam. Fuit Atys speciosus puer, qui sacris magnæ matris præfuit, à
sua ciuitatis Rege perditē dilectus, qui cū ab eo sibi vim inferri intelligeret,
in syluas ad Cybelem profugit. Rex autem inuento quem vim inferre cona-
retur, dea stupratoris verenda abscondit, qui moriens, & facinus vlciſci cupiēs,
puero eadem perſecit, quem quum sub pinu semianimem iacentem Cybeles
antistites inuenissent, in templum deportarunt, nixiq; sunt, verū frustra, re-
ficere, mortuumq; sepelierunt. Pinum arborem, sub qua ille iacuerat, tutelæ
sue dea adſcripſit, sed vt eius in perpetuum memoria remaneret, edixit deo-
rum

rum mater, vt
uidius.

Cad.

Alii Atym cū
uenisse memora
Iuuenalis,

Sem.

10 Sed Arnobius
natæ filius. Hac
denter amauit,
nefanda coniu
& nequis nupti
ris, turribus qu
tur, turribus qu
liter inter mort
ctus esset. Ac de
conuiuantibus.

20 mo Atys sub pi
iaculatur, & cū
noluit, & in terr
mitur, cœprum
fuit enim louem
tus est ne ptreſ
solis, Ouidius i

Et si

Græ

Ex

30 Ida mons Pl
buunt. Fraudē
dem interima
affert Pharnu

Ei

Prope

Plinius au
vrbs Caria v
40 pinnorum sy
pinu Piryode

rum mater, vt singulis annis defleretur, eiusque cultores castrarentur. Ouidius.

Mollesq; ministri

Cadunt iactatis vilia membra comis.

Alii Atym cum per mare Phrygium nauigaret, ad flumen Gallum vsq; peruenisse memorant, cuius potu ad insaniam versus, filice testes sibi amputarit. Iuuenalis,

Seminir obsceno facies reuerenda minori,

Molli qui rupta secuit genitalia testa.

- 10 Sed Arnobius hæc fabulam aliter describit. Fuit Atys Nana Sangarii amnis natae filius. Hæc autem illum hircino lacte enutriuit. Hunc deorum mater ardentem amauit, sed perditissime Accestis: quod Midas Rex sentiens, vt illum à nefanda coniunctione tutum faceret, filiam suam ei matrimonio destinauit, & nequis nuptialia munia violaret, intra oppidum eos recludit, illudque muris, turribusque circummunit. Cybele Atys rescens fatum, ciuitatem ingreditur, turribusque spoliatur, vnde postea cognominata: sciebat enim non aliter inter mortales liberum quemquã esse, quamdiu matrimonii fœdere victus esset. Accestes verò amore & ira æstuans propter puerum à se alienatum, conuiuantibus furorem ingerit, vnde orta est inter eos non parua rixa. Postremo Atys sub pino arbore se proiciens, genitalia sibi defecat, quæ in Accestim iaculatur, & cum sanguine vitam efflat. Abscissa autem deum mater veste inuoluit, & in terra recondit: flos viola è sanguine nascitur, ex qua arbor redimitur, conceptumq; postea sacras pinos hoc flore velatier, ac coronatier. Accestis enim fouem deprecatus, vt Atys reuiuisceret, non obtinuit: tamen affecutus est ne putresceret, sed semper in virides comas cresceret, & minutissimis foliis. Ouidius in sua Metamorphosi,

Et succincta comas, hirsutaq; vertice pinus,

Grata deum matri, siquidem Cybeleius Atys

Exiit hac hominem, truncoq; induruit illo.

- 30 Ida mons Phrygiæ pinis refertissimus est, quamobrem matri magnæ attribuant. Fraudem verò consecratam pinum Seruius ait, quod eius poma per fraudem interimant. Panes, & Satyri è pino coronas facitatas gerunt. rationem affert Pharnutus, quod montanum quid, ac syluestre hæc habeat. Lucretius,

Et genus agricolum lare sentescere, cum Pan

Pinea semiferi capitis velamina quassans.

Propertius:

Et Arcadio pinus amata deo.

- Plinius author est apud Isthmos pinea corona coronari victores. Misericordia vrbis Cariæ vetustiore vocabulo Pityusa dicebatur, cuius incolæ *phēpes*, quia
40 pinnorum syluis abundauit, quarum flores vel fructus *phēpes* dicuntur: ab eadem pinu Pityodes, vel Pityula insula in mari Balearico. Lampfacus, Hellepontii

vrbs Troianis temporibus Laomedontea, & Pityusa, & Homero Pityus dicebatur.

Nomen.

Theophrasto πύκη dicitur, cum omne quod de πύκη tractet, pino adaptari possit. Theodorus optime interpretatus pinum vertit. Bellonius, quia viros etiam acutissimos πύκη, & πύς dictionum affinitas sefellit, litem dirimere gestiens, πύκην piceam vocat, πύκιν pinum, magisque tenebras offundit. Idem que sentit Leoniceus. Sed hi mea quidem sententia Pliniū secuti facile lapsi sunt. Plinius πύκιν pinum vertit, nam πινυκάμιας Græcas, Latine pinorū erucas vertit, ac toto suo volumine πύκιν nunc pinum, nunc piceam indifferenter vertit. At quomodo Dioscorides vocauerit, vix è paucis ipsius verbis elici potest. Theophrasto pini nuces στροβίλοι dicuntur, sic Pindaro. Galenus κώνον communē facit pino, picea, & pinastro. Simeon Sethi κωνάκια vocat strobilos. Mnastheus Atheniensis pinearum nucleos, & conos ἰσρακιδας vocat. Ab Hippocrate id totum κόκκαλος dicitur ex Athenæo. Latini pinum vocāt à pinnato foliorum cacumine, cuius lignosos fructus frequenti nucamento in turbinatā effigiem compactiles, conos & strobilos vocant. Itali pino.

Forma.

Theophrastus ita suam pucem depingit. Assurgit procero, & recto caudice, nodo foque. Folio perpetuo, in extremitate pungenti. Medulla carnosā, succo pingui, & resinaceo. Quidā florere existimant, alij minime, sed nucamenta quadam proportionē præciduis grossis respondere. At Macedonia incolæ ne illas quidem florere arbitrantur. Eius germinatio intermissa, ter turgens, tēve germina edens: ideo id genus arboris τετραπύς dicunt, quod ter inchoatum opus, intermissumq; repetat. Prima germinatio Februario ineunte, quāquam in monte Ida serius ac ferè idibus. Secunda mensē Martio, germinans ab extremo surculo, vsque ad proximum antecedentis, & quādā sursum, quādā in latera, circumquaq; emittunt, veluti geniculo factō surculo primi germinis, vt fieri prima germinatio solet. Tertia Aprili mēse diebus circiter quindecim interiectis, forte id diebus sex, vel septem absoluitur, quod cum ventum sit, non amplius in longitudinem, sed in crassitudinem incrementa vertuntur, & si omnium germinationes conspicuæ sunt, in pino maximè videntur, nam germina in versus rectos porriguntur, ramiq; ex aquo conditi spectantur. Conis adhuc pendentibus semina prosiliunt, vasaque relinquunt inania. Semen nucem est. Amentum profert, hyphæ & stelis in ea nascitur. Radice singulari, & prægrandi, & ad ima descendente, parua autem cōplures ab ea exeunt, sed ab ea nulla soboles procreari potest. Vec̃te sollicitatam quo transferretur, longiorem, quā octo cubita radicem habere quidam vidisse retulit, quamquam non totam refossam, sed abruptam. Radicibus abruptis numquam amplius repullulat, vt in Lesbo accidit incenso nemore Pyrrheo. Auctu difficilis. Plinius, quæ ex Theophrasto: Pinus habet folium capillamenti modo præternue, longumq; & mucrone aculeatum, perpetuo virens. Fructus grandissimus pineis nucibus, altissimèq; suspensus, intus exiles nucleos lacunatis includit to-

V
dit toris, vestitos
locadi. Larix inter
cortici spargit, q
gnantium rumpi
quindecim dieb
prima cacumina
earundem ad fol
tunc cernitur ex
ratione pinus est
turritatem ventu
mense ex ea nux
lo non mense m
duntque cetera
morum reculsu
non repullulat
tamen lectores
vbi ipse τετραπύς
turgere. Theophr
buit. Præterea
dicum repullulat
Theophrast
nestri in sylvis
fragili putamin
uantur genera
mine. Durum e
sed non possis.
petantur. Vulg
ramis affixi Sol
Theophrast
30 pacis verò nul
se, argumento
super eam ni
quod pingui
que esse, arg
feruidis loc
In Latin
leius areno
scriptis. Lot
dis arboru
40 tia quæ cum
M. Varro in

dit toris, vestitos alia ferruginis tunica, mira naturæ cura molliter semina collocâdi. Larix intermittit tripartito, & terna germina addit, & ideo ter squamas cortici spargit, quod omnibus arboribus in germinatione euenit, quum prægnantium rumpitur cortex. Est autem prima earum incipiente vere, circiter quindecim diebus. Iterum germinant transeunte Geminos Sole. Sic fit vt prima cacumina impelli securis appareat, geniculato incremento. Tertia est earundem ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus, clareque & tunc cernitur excrecentium cacuminum articulatio. In maxima etiam admiratione pinus est, habet fructum maturescentem, habet proximo anno ad maturitatem venturum, ac deinde tertio, nec vlla arborum auidius se promit. Quo 20 mense ex ea nux decerpitur, eodem maturescit alia, & sic dispensatur, vt nullo non mense maturescat. Quæ se in arbore ipsa diuisere, lamia vocantur, læduntque cæteras, nisi detrahantur. Nullo flore exhilaratur, natalesque pomorum recursum annuos versicolori nuntio promittit. Vltis radicibus larix non repullulat, vt in Lesbo accidit incenso nemore Pyrrheo. Præmonendos tamen lectores diximus Theodorum in Theophrasti versione lapsum, nam vbi ipse *περίπτερος*, Theodorus ter squamosas vertit, quasi *περίπτερος*, quum ter 20 turgere Theophrastus intelligi voluisset, cuius erroris causam Plinius præbuit. Præterea Plinius larici tribuit, quæ Theophrastus pino, de vstarum radicem repullulatione, & de germinatione.

Theophrastus pinorum alteram vrbani, alteram syluestrem dicit. De syl- *Genera.* uestri in syluis diximus. Plinius vrbani generis alteram Tarentinam dicit, digitis fragili putamine, auiumque expositam furto in arbore. Apud nox duo obseruantur genera, syluestris, & vrbani. Urbani duo tantum, duro & molli discrimine. Durum contumaci tegmine occluditur, vt nisi lapidis ictu frangatur, vesce non possis. Alterum fructus affert adeo molles, vt digitorum compressu aperiantur. Vulgò *pigne molles*. Hoc genus à Plinio Tarentinum dicitur, & coniamis affixi Solis estu dehiscetes, nucleos emittunt, qui & ab auibus deuorantur.

Theophrastus frigida loca concupiscere scripsit, montes, & loca aprica, o- *Calum.* 30 pacis verò nullo modo, aut prauè exurgere. Mnestorisque sententia calidam esse, argumento, quod locis algentibus perdurare valeat, sui caloris ratione, nec super eam niues insistant, sed eas excutiat hyeme. Sensu etiam probari posse, quod pinguis, & acris, odorata sit, & quæ facile ignem concipiat. Humidam quoque esse, argumento ex picis generatione tracto. Imò adeo frigoris amatrix, vt feruidis locis provenire posse multis sit dubium.

In Latini agri montuosis passim obuiam pinus retulit Theophrastus. Apu- *Solum.* 40 leius arenosis in locis. Palladius locum gracilem amare, & sæpe maritimum scripsit. Inter montes, & saxa vastior, & procerior inuenitur. Ventosis, & humidis arborum fiunt incrementa latiora, sed siue montes conserere velis seu spatia quæcunque huic generi deputabis, quæ alteri vtilia esse non possunt. Ob id M. Varro in prædii finibus seri iubet, ne familiæ rixentur cum vicinis, ac limites ex

litibus quarant iudicem, vt eius vxor habebat in Sabinis. Nos in sterilibus, & inutilibus locis passim ferimus.

Satis.

Id genus non nisi seminio nasci, vt omnes conifere, prodidit Theophrastus, solamque nō degenerare saru. Didymus legi strobilos iubet Iunio antequam Etesia spirare cœperint, & dehiscences tegumēto exiliant, & ab Octobri mense vsq; ad Ianuarius, vt amygdalus suis feri nucleis. Cato nuces pineas feri, vt cupressi, & ad eundem modum tanquam allium. Plinius nucleis septenis ferē in ollas perforatas additis. Tempore à kalendis Martii ad idus eiusdem. Palladius: siccis regionibus mense Octobri, vel Nouembri: frigidis & humectis Februuario, vel Martio, feritur nucleis suis. Exarabis ergo loca diligenter, atq; purgabis, & frumenti more semen asperges, ac leui sarculo curabis operire, nec enim plusquā palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore, ne calcetur inualida. Proficiet si nucleos aqua triduum macerabis. Dicūt pineum fructū translatione mitescere. Sed plantas hoc modo procurāt, vt prius. Multa semina in calyculis terra & fimo repletis obruunt, quē vbi processerint, relicto eo quod solidius est, auferunt alia, vbi iustū cœperit incrementum, trimā plantam cum ipsis calyculis transferunt, quibus fractis in scrobe, indulgent radicibus largitatem. Terræ tamen equæ stercus admiscet, facientes straturā alterno ordine subinde crescente. Seruandum est tamen, vt radix eius quæ vna & directa est, vsq; ad summitatem suam possit integra, & illa sola transferri. Pinus benigna omnibus arboribus esse putatur. cum enim singulari radice nitatur, circa se non fugit, eaq; alte descendit è profundo sibi hauriens alimētum, non defraudat superficiarias adsitaram arborum radices. Vnde patitur myrtos, & lauros prope satas bene habere, ex quo manifestatur radices maius incommodū afferre, quā vmbra. Plinius: Quibusdam satis vmbra, aut nutrix, aut nouerca est, pinorum quęcunque attigere, non dubie venenum est. necat & germina pinus, nocet & stillicidio. Palladius: Pinus prodesse videtur omnibus, quæ sub ea feruntur. Vbi semel lata est pinus transplantari non patitur, nam si quis fibrillas aliquas fregerit, exarescit. Vnde qui agris, vel pomariis ferere cupiunt, vasculis primo, inde scrobibus confractos deponunt. Nos etsi maxima diligentia transplantare conati sumus, raro comprehendit.

Insistio.

Pinus, vt cæterę resuiferę omnes, alterius sobolem aspernātur, nam vt pingues picem, resinamq; illachrymant, diffissoque libro hiant, quasi de proprio lare saniem contrahant, quocirca aliis generibus immisceri recusant.

Cultus.

Palladius expertus est nouellas arbores pationē promouere, vt quæ speraueras incrementa duplicentur. Omnes neglectam viuere, nec cultu indigere putarunt: tamen quæ campis feruntur, & coluntur, in vastam amplitudinem crescunt, & conos maiores, vberiores, & sapidiores proferūt. Crebri rami inter lucandi sunt, & vt melius arbor increseat, & vt ordinata speciosior videatur.

Morbi & remedia.

Pini morbus est, vt Idæi incolæ tradunt ex Theophrasto, vt teda fiat, tam

parte

V
parte candidis ex
larga luxurians
morbo afflicta
fescētes in teda
alimentum, quia
animalia quæ dat
nequeat, nec spir
ne sunt angustata
cunt, pinum obel
10 meatum libert
turam. Ratio est
pinguedo fit, qu
ad earum quæ s
alios meatus, no
oblesq; viis a
non possit, extr
est non multa, jo
quæ resinam fer
guescere cœper
20 tur, quod non si
datur rectissim
& ardor facilius
dine non pigrē a
tem, non necē a
ritur, detracto c
seruari potest, pi
adulta sufferre p
non semper redi
teda catet, quur
30 cum dilatare co
detractus in pin
Cum enim cor
tim morietur.
xerit corticem
moritur; ean
Huius pin
sunt, & matu
clei nisi purg
ra repletis in
40 De resinif
pice.

parte caudicis externa, quàm corde, id quod ex abundantia succi, & vbertate
 larga luxuriantis naturæ prouenit, isque morbus naturalis est: non enim vllō
 morbo afflictata, sed optimæ habitudinis causa emoritur. Radices enim cras-
 fescētes in tedā abeunt, quod euenit ex succi copia, ac nutritionis excessu, cum
 alimentum, quia pinguedine obstructæ sunt viæ, transmittere nequeant, sicut
 animalia quædam, quæ supra modum crassescunt: cum enim auram attrahere
 nequeāt, nec spirationis vſu frui possint, quoniam venarum oscula pinguedi-
 ne sunt angustata, obductaq; suffocantur. Idcirco nō inepte rustici de pino di-
 cunt, pinum obesitate strangulari, omnia nanq; spirituum egent solutione, &
 10 meatuum libertate. Alibi verò: Cum tota radix abierit in tedam, pinum mori-
 turam. Ratio est, quia alimentipars excocta, purissimaq; insidet, ex eo infessu
 pinguedo fit, quod verò ad ceteras partes superiores pertinere deberet fertur
 ad earum quæ super terram sunt alimentum, non per pingues partes, sed per
 alios meatus, non enim amplius supeditabit ad alendum, occupatis aditibus,
 obfessiq; viis à pinguedine illa, interclusoq; sic spiritu, vt amplius commeari
 non possit, exstinguitur. Aliis autē arboribus quibus nulla pinguedo, aut si in-
 est non multa, id uō euenturum. Plinius ab eo: Aliæ verò obesitate, vt omnia,
 quæ refinam ferunt, nimia pinguedine in tedā mutantur, & cum radices pin-
 guescere cœpēre intereunt, vt animalia nimio adipe. Decacuminatione mori-
 20 tur, quod non sine ratione accidit, quia cū humore nō abundet, & meatu con-
 datur rectissimo, & singulari radice inhæreat, vulnus infestat, facitq; vt frigus
 & ardor facilius subeat, præsertim cū vndiq; inferatur, cū meatuum rectitu-
 dine non pigrè ad radices deueniat. Plinius ab eo: Quibusdā debilitas sterilita-
 tem, non necesse affert, vt si quis pino cacumen auferat, sterilefcit enim, nec mo-
 ritur, detractō cacumine piceæ, aut ignibus adusto interit. Pinus detracta tedā
 seruari potest, pinguedo enim huic pro morbo habetur. Sed hæc non nisi bene
 adulta sufferre potest, & hinc quamuis putruerit, seruari ac viuere potest, nam
 non semper tedificare consuevit, sed cum viget, & ætate adulta est. Nouella
 tedā catet, quum nutrimentum ad germina, in cremētāq; altitudinis absūmit,
 30 cū dilatare cœperit, statim tedæ habitudo consequitur. Cortex in orbem
 detractus in pino mors est, sed refert anni tempus, scilicet in germinatione.
 Cum enim cortex turgēt Februario, vel Martio mense si quis ei detraxerit sta-
 tim morietur. Hyeme diutius durat. Refert & anni tēpus. Pino si quis detra-
 xerit corticem, solet aurum vel geminos transeunte, cum germinat, statim
 moritur; eandem verò iniuriam hyeme passæ diutius tolerant.

Huius pineæ, Palladius ait, vsq; ad mensem Nouembris in arbore esse pos-
 sunt, & maturiores legentur, prius tamen legendæ sunt, quàm pateſcant. Nu-
 clei nisi purgati durare non possunt, tamen alii in vasis fictilibus nouis, & ter-
 ra repletis in testis suis missos asserunt custodiri.

40 De resiniferarum omnium arborum materie diximus in cædua sylua, & de Materie
 pice.

ANVCIBVS pineis locum amplitudine vendicauerunt, quæ cessere authoritati, nuces iuglandes (inquit Plinius) multum pineis minores vniuersitate, eademq; portione ampliores nucleo. Peregrinas esse arbores, & à Regibus è Perside translatis indicio sunt Græca nomina. Creditum est hoc genus nucis Ioui sacrum esse, eò quòd hæc arbor inter omnes nuces suauissimum ferat fructum. Fuit enim glans apud antiquissimos maximo in honore, antequam mortales se ad delicias conuerterent, ut qua sola innocuæ vitæ atq; simplicia alimenta præberent, quapropter quum nucem veteres illi egregiam existimarent, decorare eam digna appellatione volentes, iuglandem quasi Iouis cibum nuncupauere. Hæc inter nuces primum obtinet locum, & per antonomasiam nux appellatur. Prisca etiã atas nuptiis religiosas fecit, spargebantur enim eæ nuptiis, cuius rei ratione Seruius Varronis autoritate narrat, ut Iouis omine matrimonium celebraretur, ut nupta matura sit, sicut Iuno. Festus autem: Nouæ nupte mariti domum intranti fiat auspicium secundum. Nam illud vulgare est spargi nuces, ut à rapientibus pueris fiat strepitus, ne puellæ virginis deponentis vox exaudiatur. Ad id alludit Virgilius:

Nouas incide faces, tibi ducitur uxor,

Sparge marite nuces.

Plinius: Quamquam & ipsa nuptialium Fescenniorum comites, honoris natura peculiaris, geminato protectis operimento, puluinati primum calycis, mox lignei putaminis, quæ causa eas nuptiis fecit religiosas, tot modis factum munito, quod est verisimilius, quàm quia cadendo tripudium sonum ve faciât. Tinguntur cortice earum lana, & ruffatur capillus primum prodeuntibus nucleis, id compertum infectis tractatu manibus. Vim, quam contra venena habent, iam diximus in ficu.

Nomen.

Theophrasto καρύνη περικλή id est nux persica. Dioscorides καρύνη βασιλική, εὐβοϊκή, & περικλή vocat, id est nucem basilicā, siue regiam, euboicā, & persicā. Democritus Græcus vocabula declarās βασιλικήν καρύνην dicit esse nucē regiam, vel quæ simpliciter nux dicitur. Sed διὰ βαλάνου castaneam esse dicit. Plutarchus in Sympotiacis καρύνην dictam putat, quod spiritum grauem, ac soporem inducentem profundum exhalans lædat eos, qui sub eā recumbunt, & πικρὴ καρύνη id est odoris grauedine. Macrobius verò iuglandem nucem secundum aliquorum opinionem dictam à iuuando, & glande existimat. Ex C. Bassi opinione iuglās arbor dicta inde est perinde ac Iouis glans. Nam id arboris genus nuces habet, quæ sunt suauiore sapore, quàm glans est. Hūc fructum antiqui illi, qui egregiū ipsum, & ipsam arborē Deo digna existimabant, Iouis glandē appellauerūt, quæ nunc literis interlisis Iuglans nominatur. Ex Cloatii autē opinione in iuglans prætermisum est, quasi diuglās, id est διὰ βαλάνου. Caryatides, de quibus Virgilius tractat libro primo, ait Lactantius apud Statium in Thebaide à nucē arbore nominatas esse, quòd virginū chorus has arbores propter hostiū metum

metum

V
metum cōscendi
na, quippe optim
ma nomina. Cary
dictum. Erenim
hocq; minore m
interpretantes, &
caluz dici, & si P
Gracas: cum cal
dicitur, quòd hæc
eius succus corpor
do, quòd & corp
Descriptio hæ
xima pars arbor
ces toti, & præg
procumbunt, igit
mē erumpat. Ne
respondere existi
te fructificat. Se
natura peculiari
mox lignei puta
sit. Nam; sunt b
stinctio, lignea i
ius extra gemina
te fertilior est. F
ut repræsentari
Arbor allurgit p
tibus brachiato,
xus sapius crasse
bus nervosis, la
30 grauius subole
tumnum decid
tim quàm fro
nixa radicibus
ceosq; cortice,
tenui tunica,
geruntur, lig
Theophr
enim deterio
ficiuntur, spi
40 earum, persi
ne duro, fragi

metum cōscendisset. Plinius has à regibus translatas indicio esse Græca nomina, quippe optimum genus persicum, & basilicum vocant, & hæc fuere prima nomina. Caryon à capitis grauedine propter odoris grauitatem conuenit dictum. Etenim arborum ipsarum, foliorumq; vires in cerebrum penetrant: hocq; minore momento, sed in cibis nuclei faciunt. Sunt qui honoris nomen interpretantes, & Iouis glandem esse dicunt. Videntur hæ à Catone nuces caluæ dici, & si Plinius galuæ dicat. Inquit enim, Nuces galuæ, prænestinas, Græcas: cum calua nux non nisi iuglans esse possit. A M. Varrone iuglans dicitur, quod hæc antequam purgetur, gladii similis sit, & ideo nux dicta, quod eius succus corpus atrum faciat, veluti nox est. Aliquibus nux dicitur à nocendo, quod & corpori nocet, vt diximus, & satis, vt dicemus. Itali vocant *noce*.

Descriptio hæc à Theophrasto adducitur. Germinat non cacumine, vt maxima pars arborum, sed lateribus impulso priore pullulo, qua forma & caudices toti, & prægrandes rami crescunt, vt quibusdam aliis, in foliorum vnum procumbunt, idque optima ratione prouenit, quum desit initium, vnde germinē erumpat. Non florer, sed villum affert, quod præciduis grossis proportionē respondere existimatur. Maturè germinat, paulo ante æquinoctium, & astate fructificat. Semen protinus post ligneum tegmen est. Plinius, Honor his naturæ peculiaris gemino protectis operimento, puluinati primum calycis, mox lignei putaminis, solum hoc pomum natura compactili operimēto clausit. Namq; sunt bifidæ putaminum carinæ, nucleorumq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurfante membrana. Fructus pingui succo præditus, cuius extra geminantur vitia. Fauonio inter primas germinat. Inferiore sui parte fertilior est. Fructus vetustate pinguescit. Et si apud nos notior sit, quàm vt representari debeat, cum à summo viro prætermissa sit, non relinquemus. Arbor assurgit prægrandi, & procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, latitudine spatiosa, ad binum ternumve cubitorum complexus sæpius crassescente. Cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente. Frondibus neruosis, latis, oblongis, terebintho, vel fraxino maioribus, è iucundo grauiter subolentibus, patulamq; iactantibus vmbra, & insalubrem, per autumnum deciduis, verni temporis initio panicula prælonga protuberat, statim quàm frondem facere cœpit, eadua prolabitur. Multis, prælongisque nixa radicibus. Fructus multis occultitur inuolucris, calloso primum, herba-ceoq; cortice, quem guliocam dicunt, hinc compactili carinarum loculo, mox tenui tunica, quæ nauci aliquibus dicitur. Crispi intus nuclei quadripartitè digeruntur, lignosa intercedente membrana.

Theophrastus è syluestri genere esse ait, cum cultu mansuescat. Syluestria enim deteriorem fructum pariunt, & foliis, ramis, totaq; forma breuiora efficiuntur, spissiora, contortiora, durioraq; Plinius, Optimum quidem genus earum, persicum atq; basilicon vocant. sola differentia generum in putamine duro, fragilive, & tenui, & crasso, loculoso, & simplici. Et Tarentinarum

duo genera, fragili putamine, ac duro, quæ sunt amplissima, & minimè rotunda. Præterea mollusca putamen rumpentes. Insuper consulare virum audiuit iuglandes nuces & biferas habere se profitentem. Sed Macrobius Saturnalium libro, nux tarentina, dicit, quæ ita mollis est, ut vix attrita frangatur. De qua in libro Favolini sic reperitur: Itemq; quidam tarentinas oves, vel nuces dicunt, quæ sunt Terentinae à Tereno, quod est Sabinorum lingua molle. Vnde Terentios quoque dictos putat Varro. Quam in culpam etiam Horatius potest videri incidere, qui ait,

Et molle Tarentum.

Nux mollusca quæ fuerit, ab eodem declaratur.

Plautus in Calceolo sic eius meminit:

Molluscam nucem super eius dixit impendere tegulas.

Sed persicum, quod vulgo vocatur, molluscam esse nucem ait, quod cæteris omnibus nucibus mollior sit. Cuius rei idoneus assertor est Sueuius in suo moreto, qui inter cætera, quæ eò mittit, hoc pomum mitti ait, his verbis,

Admisce in Acca basilicis hac nunc.

Partim persica: quod nomen sic denique fertur,

Propterea quod qui quondam cum rege potenti

Nomine Alexandro Magno fera prælia bello

In Persas retulere suo: Post deinde reuentum,

Hoc genus arboris in prælatis finibus Gratis

Disseruere, novos fructus mortalibus dantes,

Mollusca hac nux est, ne quis forte inscius erret.

Sed Macrobius aperte hallucinatur, quod persicum vulgò dictum molluscam nucem esse putat. Quippe Sueuius in suo moreto persicas nuces, id est, molluscas basilicis, & congeneribus esse miscendas dixit, nomenq; persicis inditum refert, quod post bellum ab Alexandro aduersus Persas gestum, eæ ad Græcorum fines delatæ, satuiniferos antea fructus dedere, & basilicæ, & persicæ nuces dictæ fuere. Sed Macrobi erroris causa fuit, quod putauerit idem esse malum persicum & nucem persicam. Sed persicæ hæc nuces, vel, ut Plinius ait, mollusca, nobis afferuntur ex oppido, quod vulgò *Castelluccia* dicitur, corio adeo fragili vestitæ, ut crescendo illud rumpant, auiumq; furto exponantur. Sed parua sunt, nobis dicuntur *molles*, dura verò *maschie*, quas moracias, & moracillas dictas à frangendi mora sunt qui dicant.

Celum.

Nux, Theophr. authore, montibus propria, in planis nasci recusans. In Thmo Olympioq; Mysio plurima nascitur. E sylvestri genere esse videtur, quæ frigoris cupida montanaq; potius sit, sed cultu miscetur. Plin. ex eo. Nux in montibus non temere visa est. Damageron Græcus in frigidis potius quàm calidis gaudere ait. Pallad. amare loca montana, humida & frigida, plerumq; lapidosa, potest tamē & locis temperatis iuante humore nutriri. Antiphanes, ex Atheno, optima cuiusq; regionis laudans, nuces è Paphlagonia optimas afferri dicit:

Paphla-

Apulia his ca-

nerat arbore, & f-

quod tantorum v-

cis, si nascantur,

Damageron

temperatis degin-

cantes iuxta aqua-

ta terra, nigraq;

serere eas cogatu-

in medio eas con-

arboris naturæ r-

Damageron

transplantatas f-

dem serere opo-

distribuitur. Pa-

frigidis bima, in-

lis arboribus fol-

planta tingenda

ris aduratur, nan-

ctuum densitate

dine, & desider-

ximis vel sui gene-

dicem mittit, &

duritia humi coe-

ces mittit. Nos e-

atq; limitibus, iu-

Oulidius de nuce

Spon-

F-

M-

Quercum &

nucem iuglan-

transmutari d-

Nasci etiam a

Ramo etia

qua trunci co-

validè terra. I-

Erigatur tr-

cultu ferax est

Paphlagonumq; Iouis & glandes.

Apulia his caret, vbi calidum cœlum, & si sibi aliqua forte seratur, degenerat arbore, & fructu. Petrus Crescentius quocunque cœlo viuere scripsit, quod tantorum virorum doctrinæ, & experientiæ repugnat, cùm calidis locis, si nascantur, non fructificent.

Damageron siccis gaudere ait. Plinius: aquas odere iuglandes. Nos qui ^{Solum.} temperatis degimus regionibus multas habemus consitas, & optime fœtificantes iuxta aquarum decursus, in conuallibus, vel montium radicibus, soluta terra, nigraq; Sed maxime argillam reformidat. At si quis argillosis locis ¹⁰ serere eas cogatur, scrobem profundam excauer, prædictaq; repleat terra, & in medio eas conferat. Idem faciendum est reliquis locis, in quibus soli natura arboris naturæ repugnet.

Damageron iuglandes plantari ait tempore, quo & amygdalæ, ac sapius ^{Satio.} transplantatas fieri lætiores. Columella ante calendas Martias ait iuglandem serere oportere. Plinius, iuglandi à calendis Martii ad idus eiusdem satio distribuatur. Palladius lætorem fieri tradit, si sapius transplantetur: in locis frigidis bima, in calidis trima transferri debet. Radices plantarum sicut in aliis arboribus solemus, in hoc genere refecare non debes. Fimo bubulo ima planta tingenda est, sed melius cinis aspergatur in scrobibus, ne calore stercoreis ²⁰ aduratur, nam cinis creditur vel corticis teneritudinem procreare, vel fructuum densitatem afferre. Altis scrobibus delectatur pro arboris magnitudine, & desiderat interualla maiora, quia stillicidiis foliorum suorum, proximis vel sui generis nocebit arboribus. Columella ait: Omnis nux vnâ radicem mittit, & simplici stylo prorepat. cùm ad solum scrobis radix peruenit, duritia humi coercita recuruat, & extensa in modum ramorum alias radices mittit. Nos eas transplantamus, quæ à sua arbore caducæ seipsas ferunt, atq; limitibus, iuxta vias, locaq; inutilia serimus, cùm sua vmbra vicina lædat. Ouidius de nuce,

Sponte mea facilis contempto nascor in agro,

Parsq; loci, quo sto, publica penè via est.

Me, sata ne ladam, quoniam sata ledere dicor,

Imus in extremo margine fundus habet.

Quercum & iuglandem tam pertinaci odio dissidere dicit Plinius, vt iuxta nucem iuglandem depacta, moriatur. Etsi hanc nonnulli in quercum senio transmutari dicant. Interualla sint quadraginta, vel quinquaginta pedum. Nasci etiam auulsione Damageron scripsit.

Ramo etiam depacto vitalis fuit satus. Euellitur à radice ramus, cum aliqua trunci corporis parte simbriata, & scrobibus accommodata calcari debet valide terra. In calidis regionibus Ianuario, in frigidis Februario.

⁴⁰ Erigatur truncus à solo decem, vel quindecim pedes. Omniq; abdicato ^{Cultus.} cultu ferax est. Vnde Ouidius,

P.
& minime ro-
alarem virum
Macrobios Sa-
tre etata fran-
rentinas oues,
orum lingua
culpam etiam

tr, quod cate-
Suenius in suo
his verbis,

etum mollu-
nucens, id est,
q; persicis in-
restum, ea ad
silica; & per-
trauerit idem
vel, vt Plinius
uocia dicitur,
furto expo-
ne, quas mora-

ans. In Thmo-
deretur, q; sit-
Nux in moni-
ia calidis gau-
lapidola, po-
er Aibeneo, 40
afferri dicit:
Paphla-

Non mihi falx nimias Saturni deputat umbras,

Duratam renocat non mihi fossor humum.

Sole licet, siccaq, sit peritura laborem,

Irrigua dabitur non mihi sulcus aqua.

Institio.

Posteritati memoriæ mandarunt rei rusticæ periti, neq; iuglandem, neque resiniferas arbores vilo inſitionis inter ſe, aut cum aliis pignore iungi poſſe, ita vt iuglans aliam non admittat arborem, & ſuum etiam ſurculum reſpuat: ſi pangantur nullo fœderis nexu coaleſcant. Sed ii planè, vt Damageronti placet, à veritate ſunt deuii, experientiaq; docuit iuglandis ſurculum reſinoſa terebintho, aut piſtacio inſitum comprehendisse, & in grandiore ſua ſorte arborem euaiſſe. Terebinthus, & iuglans ſurculum piſtacci recipiunt, qui conceptus perſæpe conualuit, & licet forſitan non facile coëat, non ideo tamen negligendum, ſi res ſemper ſuum non ſortiatur effectum. Sunt qui hoc inſitionis vtantur genere: Nucem obruunt, & vbi adoleuerit, bimam aut trimam radicibus eruunt, radiciq; ſurculum iuxta carnem inſigunt, & iterum terræ religant, alii ramulum anniculum eligunt, & inuertunt, quia medullam pleniorẽ habet, & raſuram facilius ſuſtinet, ſic inſita melius comprehendet. Diophanes nucem in arbutum ſolam inferi dicit. Quod Virgilius confirmat,

Inſeritur verò & fœtu nuciſ arbutuſ horrida.

Plinius: Quippe cum Virgilius inſitam nucibus arbutam dicat. Palladius: Inſeritur, vt pleriq; aſſerunt menſe Februario in arbutu ſed melius in trunco, vt alii, & in pruno, & in ſe. Ad Paſiphilum,

Arbutuſ frondeſ vaſte nuciſ occupat umbra,

Pomaq, ſub duplici cortice tutareſert.

Cætera, quæ ſolereſ proceſſu temporis uſuſ

Exprimet, exempliſ inſtituere nouiſ.

Nos Aprili vltimo nuceſ digitali inſitione mutuo inferimus, & optime comprehendunt. Sunt qui dicant in caſtaneam inferi poſſe. Inoculamus & vere, & concipit.

Aſſ.

Nuceſ nudas, & ſine putaminibus ædent iuglandeſ, vt pollicetur Africanuſ: ſi fractiſ vtrinq; cariniſ integer nucleuſ illaſa proruſ carne, lana, vel vitigineiſ foliiſ recentibuſ, aut platanuſ foliiſ obuoluatur, quo minus à formicis enucleatuſ erodatur fruſtuſ, dein terræ mandetur. Hoc etiam modo, Florentinuſ aſſerit, in amygdaliſ venturuſ; ſi cinis ſcrobibuſ aſpergatur. Damageron ait: Si quiſ terebro per medullam arborem traiciat, & foramini parem vlmeuſ adigat cuneuſ, nodosaſ duritiem nux exiuet. Latioremq; fieri aſſerit, ſi quiſ cuprinuſ clauuſ imprimat arbori, qui vſq; ad medullam penetret. Cinis etiam ingiter caudici, vel radicibuſ aſſuſuſ, & teneritudinem aſſert, & fragiliorem nucleuſ carnem efficit. Palladiuſ: Si dura nux erit, vel nodosa: cortex vulneranduſ non circumcidenduſ erit, vt vitium mali deducat humoris. Alii radicum ſummam prædicunt. Alii terebrataſ radici palum de

de buxo imprimi
volueris, ſolam
debeſ obruere.
num continuuſ

Nux fruſtuſ
cocciniuſ eſt ſtercuſ
uetuſ, Palladiuſ a
ſic beneficio ſoliſ
bant. Arcebituſ
mocrituſ ſcriptuſ
adhuc manuſ in
deat, arbor diſtal
ſi in traieſtam te
queatam radiceſ
riſ imbutuſ de

Theophractuſ
putamine obteg
cundiore vttere,
miſſuſ maturitat
leiſ obrutaſ, vel
vel capuſ mixtaſ,
Martialiſ aſſerit
buſ ſuiſ melle de
fieri, vt ex eo fac
um, nucem ruſti
peritiſ feriantuſ
colligaſ, miniuſ

At

I

Per

Vbi colle
corticibuſ den
ſole reliccent
gantur integ
tur, nam ſi c
eſt apud noſ
vna condit
tur, teſtaſ alb
40 quuntur vſq
no perfeſte c

de buxo imprimunt, vel cuprinum clauum, vel ferreum. Si Tarentinam facere volueris, solam nucis carnem lana propter formicas inuolutam in seminario debebis obruere. Si ferentem iam in hoc genus velis mutare, lixiuio per annum continuum ter rigabis in mense.

Nux fructum non abiiciet, Damageron ait, si quis verbasci radicem, vel coccinium è sterquilinio pannum amuleti vice suspendat. Si senectæ vitio cauetur, Palladius ait, longus canalis à summo trunco ad imum debet excludi, sic beneficio solis, & venti diffilantur, & durescunt, quæ in marcorem transibant. Arcebitur etiam hiantis carinæ vitium si frequenter ablaqueetur. Democritus scriptum reliquit, Si quispiam ieiunus lentis grana mandat, atq; dum adhuc mansum in ore versat, quum flore pubet iuglans, eius rami demordeat, arbor distabescet. Item si flagrans igni clauus radicibus imprimatur, aut si in traiectam terebro arborem puerile lotium indatur, aut si quis iuxta ablaqueatam radicem dictamnium, fabas, vel pannum menstruo sanguine mulieris imbutum deponat, arborem ariditate tabida conficiet.

Theophrastus nuces perraro seruari, quia prararo minimeque continuo putamine obtegentur. M. Varro ait, nucem iuglandē quanto citius promes iucundiore vtete, quod vetustate nux fiat aridior. Palladius: cortex in nuce demissus maturitatis indicium est, qualis debet & poni. Nuces seruantur vel paleis obrutæ, vel arena, vel foliis suis aridis, vel arca ex suo ligno facta inclusæ, vel capis mixtæ, quibus hanc vicissitudinem reddunt, vt eis acridinem tollat. Martialis asserit, & expertum se ait: virides nuces tantum liberis putaminibus suis melle demergi, & post annum virides esse, & ipsum mel ita medicabile fieri, vt ex eo facta potio arterias curet, & fauces. Fertur apud nos prouerbium, nucem rusticorum naturam sortitam esse, quo enim immitius eius rami perticis feriantur, eo vberiores fructus sequenti anno proferre. Si leni manu colligas, minus fertilem futuram. Quidius hoc versu exprimit,

At cum maturas fisso noua cortice rimas

Nux agit ad partes, pertica sana venit.

Pertica dat plenis immitia vulnera ramis,

Ne possim lapidum vulnera sola queri.

Vbi collectæ sunt nuces in cumulos rediguntur, vt biduo, vel quadriduo corticibus denudentur, dein eiusdem temporis spatio areis relinquuntur, quo sole resiccentur, vt commodius seruari possint. Priusquam reponantur, eligantur integræ, vitiosæ separentur, rumpanturq; vt nuclei ad oleum feruantur, nam si cum testis diutius immorauerint, à vermibus erodentur. Maximus est apud nos vsus conditarum saccharo, vel melle nucum. Albæ hoc modo die vna condiuntur. Teneræ nucis putamen antequam lignescat, cultro deglubitur, testæ albæ tenues illico ne nigrore contrahant, in aquam proiciuntur, coquantur vsq; dum mollescant, inde cinamomo, & garyophyllis traiectæ saccharo perfecte cocto bulliunt tribus quatuorve bullitionibus, tū quo saccharū bi-

bant, triduo aut quatrduo inibi sinuntur, & quia saccharū recrudescit, propter humorem imbibitum, idem per se denuo coquitur, & bis tēve sic repetitur.

Matris.

Theophrastus eius materiem amplam esse dicit, eiusq; vsum ad rectorium opus, sed frangi se sonitu prænunciat, ita vt præsentire homines possint, quod in Antandro contigisse, omnesque è balneis terrefactos profugisse traditum est. Sub terram obruta à putredine immunis durat, quinimo omnium præcipua operi subterraneo redditur. Etiam carbonēs iuglandis expeti solent ferreis metallis, cum iam exarserit. Plinius ab eo: Cariem vetustatemque tardissimè sentit iuglans. Non improbat iuglans in aqua, hæc quidem in his, quæ defodiuntur, vel principalis. Colos mire adulteratur iuglande tincto, atque in medicamine decocto. Facile pandatur iuglans. Fiunt enim ex eo trabes, frangiq; se prænunciant strepitu, quod in Antandro accidit, cum è balneis terrefacti sono profugerunt. Apud nos arcis, & mensis, & vrensilibus lautis dicatur, materie vndatim crispa.

De Amygdalo. CAP. XXXIII.

TERTIVM ab his locum amygdalo Plinius assignat, cui nos assentire volumus. Hæc arbor an fuerit in Italia Catonis ætate dubitare ait, quoniam Græcas nominat, quas quidem & in iuglandium genere servant. Legitur apud Arnobium fabula de Amygdalo: Ia Myda regis filia fuit, quæ mortuo Aty sponso suo exanimati pectus mitioribus lanis velat, illachrimans cum Ac-
deste, qui mortis causam dederat, seseque interficit. Cruor in purpureas violas vertitur, corpus à deū matre sepelitur, vnde amata amygdalus nascitur, amaritudinis causam secum afferens. Virgilius de futura frumenti copia, ex amygdalo prognosticon desumit,

Contemplator item, cum senex plurima sylvis

Inductus in florem, & ramos curuabit olentes:

Si superant fetus, pariter frumenta sequentur,

Magna, cum magno veniet tritura calore.

At si luxuria foliorum exuberat umbra,

Ne quicquam pingues paleæ teret area culmos.

Ebrietatem arcere putavit Plutarchus in Symposiacis, qui apud Drusum Tiberii Cæsaris filium quendam medicum comestari solitum retulit, qui omnes bibendi certamine prouocabat, neminiq; cedebat in vini potu, is tandem deprehensus est, antequam biberet, quina, senave comesse amygdala, quominus temulentia tentaretur. Porro cum deuorare vetuissent, ne pauxillum quidem in huiusmodi potu resistebat. Hoc idem Athenæus retulit, cuius causam amaritudinis vim dicit, quæ resciet & humores depascat. Sunt qui amygdala putent facultate mordendi, detergendaque carnis donati, sic vt faciei fuscas & contractas sole maculas obliterent. Ergo cum præsumpta fuerint, amaritudine sua meatus vellicant, & quodam lacerant morfu, qua de re
vaporem.

vaporem, quem
mygdalarum am
sic vt non sinat
remulentiam cou
gumentum est m
lumbere, intestin
ministerium fieri
caliacos fieri. Co
Ex his Palladius:

Græcis arbor a
autore, de prom
porter, sicut in
chus & fructum
vtrumq; circum
fert, quod nos r
nam cum nomen
re. Lacones muc
dicit. Nicander in
Alexandrinus in
ficatus ostendat
amygdala nux
crobius amygdal
Caro è Latinis n
auellanam, præ
mella etiam nuc
denique Græca se
maximè miror
Columella sit at
lam vocat. Pall
A Theop

mili, sed minus
liorum ortum
liato, candido
ronæ melspil
dimittit, cum
toq; abunda
to, ad superg
du perlexit
biētiq; plura
vitiis est, atq
acerba, acuta

vaporem, quem humor in cerebro creauit absorbent. Sic itaque non ab re amygdalarum amarulentia contra meri iniurias pollet, interanea resiccans, sic vt non sinat venas impleri, quarum, vt tradunt, distensione, & perturbatu remulentiam contrahi volunt, effluuiis obfessa mentis arce. Pereuidens argumentum est mori vulpes amarorum pastu, si non cōtingat è vicino aquam lambere, intestino humore affatim exucto. M. Varro ex nuce Græca triplex ministerium fieri ab apibus, cibum, mel, ceram, earumque florum pastu cæliacos fieri. Columella probatissimam arborem amygdalum vocat ad apes. Ex his Palladius: Ex amygdalis apes mel conficiunt.

- 10 Græcis arbor ἀμυγδαλή dicitur, fructus ἀμυγδαλον. Sed Pamphilus, Athenæo Nomen. autore, de pronunciationis tono loquens ait: ἀμυγδαλής in fructu grauati oportet, sicut in ἀμυγδαλή, at arborem vult circumflecti, vt ἀμυγδαλή. Aristarchus & fructum & arborem indifferenter posuit accentu acuto. Philoxenus utrumque circumflectit. Triphon Atticus amygdalam fructum cum graui profert, quod nos neutro genere amygdalum dicimus, sed amygdalam arborem: nam quod nomen à fructu sit deductum, videtur merito circumflecti oportere. Lacones muceros vocat amygdalas, vt Seleucus scribit. Amerias mycerum dicit. Nicander in suis Georgicis amygdalum dicit neutro genere. Herodianus Alexandrinus inquit amygdalas dici, quod post viride putamen multos scarificatus ostendat, & hiulcas rimas, quas Græci amychas vocant. Dicitur etiam amygdala nux Thasia, quemadmodum declarat Democritus Græcus. Macrobius amygdalam dicit nucem Thasiam, & Græcam ex Cloatii doctrina. Cato è Latinis nucem græcam vocat, nuces omnes commemorans, caluam, auellanam, prænestinam, & græcam. M. Varro nuces Græcas vocat. Columella etiam nuces Græcas amygdalas vocat. Argumento quod omne, quod de nuce Græca scripsit, à Theophrasto excepit de amygdala loquente. Vnde maximè miror Hermolaum doctissimum virum ambigere, an Græca nux Columellæ sit amygdala. Plinius, & Thasiam, & Græcam nucem amygdalam vocat. Palladius etiam nucem Græcam vocat.

- 30 A Theophrasto ita formatur: Arbor vestitur folio fœminicoruo simili, sed minus pingui crassove. Inter arbores soli peculiare est, quod ante foliorum ortum floreat, vel cum flore folium promat, vel paulo post. Flore foliato, candido, quamquam & amygdalarum quarundam subrufus exeat. Aronix mespilo forma simili. Germinat præmaturè, sed non præmatura folia dimittit, cum multis ferior sit. Facile germinat, quia viribus præualet alimentoque abundat. Facileque afficitur, & nisi siccitas suæ naturæ foret impedimento, ad supergerminandum propensa esset. Fructificat ex annotinis surculis. Fructu perfea simili, vel fraxini semini. Cuius semen sub tegmine ligneo est, ambiciatque: plura habet. Succo pingui prædito. Principio succus aquosus, quandiu viridis est, atque recens, sed senescens crassiusculus redditur. Cuius putamina acerba, acutaque sunt: Vnde sordes omnes, terræque partes eo vis naturæ secer-

nēs expellit. Sed cur cito floreat, fructus verò serò maturet, causa est, quòd flores, & folia sunt faciliora, utpote quæ crassiore consent materia, fructus verò purgatiore succo consistunt, quòd maioris paratus indigeant, præsertim cum lignosus, pinguis, siccusq; natura sit fructus, tales igitur difficilius confici necesse est. Visitur aliquando fructum sine foliis afferre, quod non aliunde evenire credibile est, quàm ex nimia fructus frequentia, & ob id folia minus frequentia: absumpta enim naturæ vi in fructu, folia parva, imbecilliaque remanent, & casui obnoxia prolabantur, ut nuditatis speciem in arbore relinquant. Prima quidem specie fructum abunde parit, sed quos peperit sæ penumero educare non potest, quippe cum in perficiendo potissimo labore sit opus. Et si fecunda sit, non ob id brevis vitæ eam censere fas est. In senecta enim fertilior evadit. Cuius ratio est, quòd ætate viribus detractis detrahatur & alimenti vbertas, itaque sit, ut facile quod reliquum est concoquatur ad fructus confectionem. Singulati radice firmatur, prægrandemque ac alte defixam agit. Pingui succo turget, lachrymamq; rimosa plorat, quæ concrevit in gummi. Plinius ab eo. Amygdala folia rubentia habet. Floret prima omnium mense Ianuario, Martio verò pomum maturat. Nec interest maturius germinasse, cum prima germinet, & inter novissimas nudetur. Messibus reddit semen. Fructus tenuiore, sed simili iuglandium summo operimento, item secundo putaminis: nucleus dissimilis latitudine, & acriore callo. Extra germinant vitia. Succo pingui prædita. In senecta fertilissima. Sed valde miror Theophrastum in re arboraria diligentissimum virum soli amygdalæ inter arbores tribuisse, ut prius flores, quam folia promat, cum contra eum testentur Neapolitana pomaria, ubi præcox, armenia, persica, cornus, cerasus, prunus, malus, populi, vlmique, quæ ante folia florent, ut videantur arbores frequenter albo linteo coopertæ. Plinius item Ianuario florere. Martio maturare, cum præcox amygdalus Iunio suos maturet fructus, serotina autumno. Dioscorides amygdalum rhododendri foliis esse. Palladius etiam in vetustate plus afferre scripsit. Apud nos novellis amygdalis folia hyeme non cadunt, adultis cadunt.

Censura.

Theophrastus sylvestris, & domesticæ, dulcis, & amaræ, duræ, & mollis meminit. Athenæus Cypriæ meminit, quæ reliquis longior, & extremitatem aduncam habet, item Naxiæ, & in pretio habitæ, quia erat mollis, ut ex Phrynici testimonio patet apud eundem, qui se molares dentes sibi rupisse dicit, ut ne Naxiam quidem amygdalam frangere posset. Plinius à Theophrasto dulcis, & amaræ. Nos autem ita diuidemus. Amygdalarum duplex genus, sylvestre, & urbanum. Sylvestres amygdalæ amaræ sunt, & salubriores, quippe in remediis magis quàm dulces valent. Urbanum genus in duo itidem diuidemus: Molle & Durum. Molles amygdalas tarentinas dicimus, quæ tam fragili putamine sunt, ut manibus atrectatæ frangantur, & arboribus furto avium exponantur, nam hiascunt, & decidunt, vel aves

rostro

rostro frangunt,
ita à mulieribus
rum dux species
mus. Athenæus h
medium, & mini
cuius apex veluri
Apuli attendit
producit, nec co
apponuntur, ac se
sunt retrusiori, fol
colæ ambrosiæ v
maximoque hab
demus, maiore
possit, sed respe
uusque, totam
lium angustius
nimio onere fra

Theophrastus

Plinius calido co

20 lum calidissimu

borea ad meridi

ta, ob id insolis p

Græcis amygdalæ

sibi vendicant Cy

pando cacumini

tus sibi venerunt

Thraciæ insula.

gido verò aut pe

cælum. Aium

30 Theophrastus

altum nanciscit

soliditate vale

ro: deorsum fr

Columella ap

tura eiusmo

tia ait gaudet

Amat agrum

regni accom

tentissimæ p

40 tudinem cal

mygaliradix

roſtro frangunt, & vorant, à mercatoribus ſpernuntur, quia fragiles ſunt, non ita à mulieribus & pueris, qui manibus preſſis, vel dentibus ruptas edunt. Harum duæ ſpecies, altera maior, altera minor. Neapoli *amendule pomegue* dicimus. Athenæus has Naxias vocat. Durum genus in tria diuidemus, maximum, medium, & minimū. Maximum quatuor digitorum longitudine fructus eſt, cuius apex veluti hamus incuruatur: Athenæus Cyprias vocat, Plinius ſalcatas. Apuli *amendolagine*. & ab eis pro vili pretio habitæ, quia earum arbor paucas producit, nec continuo fertificat, nec exportari tolerant, ſed ſecundis menſis apponuntur, ac ſaccharo condiuntur. Medium genus communes vocat, à pice ſunt reſuſori, folia arboris maiora. Sed minimum genus preſtantius eſt. Incolæ *ambroſine* vocant, hæc exportantur in diuerſas partes, geſtatum tolerant, maximoque habentur pretio à mercatoribus. Hoc genus in duas ſpecies diuidemus, maiorem, & minorem. maior non dicitur, quod cum cæteris conferri poſſit, ſed reſpectu alterius ſpeciei, quæ minima eſt. Fructus rotundus eſt, paruusque, totam ſuæ teſtæ cavitatem replet. Arbor tenuior, & delicatior eſt. Folium anguſtius breuiusque. Hæc ſingulis annis vberiores fructus producit, vt nimio onere frangantur rami, ni ſubdita furca ferat opem.

Theophrastus ei cœlum ſerenum apicumque tribuit. Columella calidum. Plinius calido cœlo, & meridianis partibus gaudere dixit. Palladius: amant cœlum calidiſſimum, quia mature florere conſueverunt. Ita ſtatuendæ ſunt, vt arbores ad meridiem ſpectent. Florentinus: gaudet calidioribus locis hæc planta, ob id in ſulis plantant, vt vberius adoleſcât. Naxia ab inſula Naxo veteribus Græcis amygdala maxime commendabatur, ex Athænei authoritate: ſecundas ſibi vendicat Cypria, quæ præter cæterorum morem, quæ gignuntur alibi, reſpondendo cacumine prodiit. Ex Hermippi ſententia, ex Paphlagonia, & primitus ibi venerunt. Plinius ait Thasias & Albenſes celebrari. Eſt enim Thasus Thraciæ inſula. Apud nos qui temperato degimus cœlo minus fructificat, frigido verò aut perit, aut ſterileſcit, nec ſemine ſata pullulat, ita aquilonium odit cœlum. Aiunt in Anglia interdum nuces maturare.

30 Theophrastus amygdalis gracile ſolum tribui vult, quoniam ſi pingue, vel altum nanciſcatur, nimia pabuli vbertate ſterilitate afficietur. Adeo virium ſoliditate valet, vt ex nimio alimento in germinum luxuriam proruat. M. Varro: deorſum fertiliores nuces græcæ, id eſt in planis conſitæ, vt ſupra diximus. Columella agrum durum, & ſiccum deſiderare ait, nam ſi in locis diuerſis natura eiſmodi poſueris nuces, protinus putreſcēt. Plinius ex Magonis ſententia ait gaudere dura terra, in pingui, aut humida ſterileſcere. A quib⁹ Palladius: Amat agrum durum, ſiccum, & calculoſum. Ob id Apuliæ ſolum totius noſtri regni accommodatiſſimum eſt amygdalis, calido enim fruuntur cœlo, vbi parentiſſimæ planities conſitæ, & ſolum, cui poſt duorum, vel trium pedum altitudinem calculi ſubſunt, vel perpetuus tophus. Prohibet hic enim, ne vnica amygdali radix in profundum deſcendat: ſed alimentum in fructus conuertat.

tur. Ideo Italia Apulas laudat. Et nobis inuidendæ parum sunt Cyprus, Naxos Thasusq;.

Satio.

Satam semine amygdalam Theophrastus exurgere posse ait, sed degenerare sapore, duramq; ex molli reddi. Iccirco aut adultâ inserere, aut sapius transferre præcipiunt. Cuius ratio seminis infirmitas est: deuincitur enim ab influxu copiosioris alimenti, quod digerere nequeat. Sic durior euadit. Ob id Thasii amygdalas inoculant, ex mollibus enim præduræ post satum redduntur. Didymus semine feri ait, & transplantatas meliores fieri. Florentinus Græcus seminio pagi posse docet. Nuces, quæ feri debent, pridie liquido fimo macerantur, alii aqua mulsa madefaciunt, in eaq; noctem solam esse patiuntur, ne germen extinguat mellis mordacitas. Cacumina in terram recte figuntur, sic ut lignosior pars sursum spectet. Tradunt vegetiores enasci, si in scrobiculos, quibus obruuntur, ferula coniiciatur. Columella, Antequam nuces deponas in aqua mulsa, nec minus dulci macerato, ita iucundioris saporis fructum, cum adoleuerit, præbebit, & interim melius & celerius nascetur. Ternas nuces in trigonum statuito, parsq; durior inferior sit, quia inde radices mittit, nuxq; à nuce minimo palmo absit, & anceps ad Fauonium spectet. Plinius ex Magonis sententia, qui in nucibus operosus fuit: Serendas quàm maximè falcatas, & è nouella, fimoq; diluto maceratas per triduū, aut pridie quàm ferantur, aqua mulsa. Mucrone defigi, aciem lateris in aquilonem spectare: ternas simul serendas trianguli ratione, palmo inter se distantes, denis diebus adaquari, donec grandescant. Palladius nihil utilius, ait, quàm seminarium facere. Fodiemus ergo altam pede vno semis aream, in qua obruemus amygdala, non amplius quatuor digitis, ita ut acumina figamus in terra spatio inter se binorū pedum separata. Sed ipsa amygdala ad ponendum, & noua legamus, & grandia, quæ antequam ponamus, pridie mulsa aqua, ita ut nimis maceremus, ne germē extinguat ex multo melle mordacitas. Alii prius fimo liquido per triduū nuces eas macerant. Deinde die, ac nocte esse patiuntur in mulsa, sed quæ suspicionē tantum possit habere dulcedinis. Cū in seminario amygdala disponimus, si siccitas intercesserit, ter in mense rigemus, & herbis nascentibus circūfodiendo saepe purgemus. Terra seminarii latamen debet habere admistum: seruandæ sunt à pecore, quia si rodantur, amarescunt. Seri debent Ianuario & Februario, locis calidis Octobri, & Nouembri. In Baro aliquando satæ amygdalæ degenerare conspiciuntur, quippe si eas seras, quas ambrosinas nominari diximus, eas proueniunt, quas communes diximus, si communes seremus, prouenient sylvestres, si molles, duriusculæ nascuntur, ob id ex sobole, quæ circa matris crus nascitur, plantatur. Qui Neapoli seminaria facere velint, ex Apulia semina exportari curent, nam meliores nascuntur, quàm ex iis, quæ nostra regione nascuntur, nam si nostratia seueris, plerunque euanida fiunt. Viuiradix ab autumno ad Brumam, ut Florentini fert opinio, commodius seritur, verno satū difficilius comprehendit, quod arbor ea præcoci partu germinet. Columella serit Ari

V
Atti signo, vel citi
nio referente, an
tempus. Palladiu
Nouembri. Cui
plantis, alias tra
uallo, cum & nun
inter vites ferend
& simul quod ma
Theophrasti opini

10 non tam infestant
cursu, implexuq;
quàm malis, pyri
distantiores, quàm
viginti quinq; pe
plur. Florētini
se plantis, quæ d
positis germen e
de cacumine sum
lum ratio, sed et
20 Cum amygd
rat, ut bonos fru
semine satas, &
amygdalas infer
currentibus. Flo
vere germinet, se
dia ardore. Quin
tempus habere f
cembri, vel lanu
bruario. Sitam
30 summitate sum
& in persico. In

Ph
P
In
C
40 In Baro Ap
gusto iuxta m

Arcturi signo, vel circa kalendas Februarias, quia prima gemmascit. Mago, Plinius referente, amygdalas ab occasu Arcturi ad Brumam feri iubet, statuitque tempus. Palladius: Seritur Ianuario & Februario, calidis locis Octobri & Nouembri. Cum in seminario adoleuerint, relictis ibi, quæ spatio sufficiant plantis, alias transferemus mense Februario. Amplo distent inter se interuallo, cum & numerosam radicem habeat, & vires solidas hauriendi. Sunt qui inter vites ferendas censeant, tanquam innoxias, & cibo mediocri contentas, & simul quod maturè fructificent, nec latè adumbrent, minime graues, sed Theophrasti opinione hi non recte existimant. Umbra enim & sera feracitas, non tam infestant, quàm vires radicū. rapiunt enim alimentum suo amplo discursu, implexuq; enecant. Amygdalis ampliora distribuenda sunt interualla, quàm malis, pyris, sed minora quàm fico. A quo Plinius: Amygdalas feri iusserūt distantiore, quàm malos, & pyros. Palladius: Spatia inter arbores viginti, aut viginti quinque pedū dedisse sufficiat. Didymus auulsione nasci amygdalas scripsit. Florentinus etiam pangi posse auulsione vel stolonibus. Palladius feri posse plantis, quæ de maiori radice tolluntur. Theophrastus ramo prægrandi depositis germen erumpere raro solere. Florentinus ait, Nonnulli ramulos, qui de cacumine sumerentur, non infelici successu deposuerunt. Didymus non solum ramo, sed etiam taleis nasci posse scripsit.

- 20 Cum amygdalam semper fererent semine ob nascendi facilitatem, opus erat, ut bonos fructus afferret, ut eam infererent, ob id Theophrastus Thasios semine satas, & adultas amygdalas inoculasse dixit. Paxamus autumnii exitu amygdalas inferere iubet non iuxta summitates, sed in ramis iuxta mediū excurrentibus. Florentinus verò etiam autumnio inferendam præmonet, cum vere germinet, sed inferendos furculos non summatim legēdos esse, sed è media arbore. Quintilius verò Ianuario inferendam præcipiunt. Plinius: statutum tempus habere suæ insitionis amygdalas circa brumam. Palladius: Mense Decembri, vel Ianuario circa idus amygdalus inferitur, locis verò frigidis & Februario. Si tamen furculos condias antequàm germinet viles sunt, qui de summitate sumuntur. Inferuntur & sub cortice, & in trunco: inferuntur in se & in persico. In versibus verò,

Phyllis odoratos primæis floribus artus

Discissi pruni cortice fissa tegit.

Pomaq; permutat velamine persica misto,

Duritiemq; docet tegminis esse loco.

In modicam tornat siliqua tendente figuram,

Et frondes pulchro ditat odore feras.

Castaneamq; nucem depulsis cogit echinis,

Mirari fructus lentia poma sui.

- 40 In Baro Apulia Octobri, & Nouembri inferunt. Inferendas arbores Augusto iuxta medium detruncat, ne frondibus & germinibus arboris succus ab-

sumatur, defitis mox caloribus, ubi cœlum frigesce cœperit, truncum præci-
dunt, & inter lignum, & corticem inserunt, acuunt surculum, ne dum intrudi-
tur corticem rumpat. Surculum ex Austrina arboris parte desumunt, & è ra-
morum summitatibus, non trunco supernascentibus, Luna decrecente po-
stremis diebus, nam si crescente id fieret, materiam multam, fragilemq; pro-
duceret arbor, fructus verò paucos. Nos in Campania in prunum inoculamus,
& optime concipit, difficilius trunco fisco, medio modo inter lignum & corti-
cem in persicum inferimus. Ipsa recipit persicum, præcocia, chrysomela & ce-
rasia, & tempestiua proueniunt, contra rusticorum opinionem, qui pertinaci-
ter ferotina prouenire affirmant. Sed si subdita amygdalus amara fuerit, tan-
tillum fructus cortices amatoris sapiunt.

Cultus.

Nihil æque degenerat vt amygdalus, vnde sapius plantam transplantare li-
cet. Amygdalam, Theophrastus ait, dum fructus parit, neque tigandam, neq;
stercorandam, neque purgandam præterquam aridis, neque vlla cura tractan-
dam existimant, ne plus æ quo validior facta fructum in flore amittat. Plinius,
Amygdalæ si colantur, fosiione florem amittunt. Palladius: putandæ sunt No-
uembri mense, vt superflua, & arida, & densa tollamus. Seruandæ sunt à peco-
re, quia si rodantur amarescunt. Circumfodi non debent, quoties florêt, quia
inde flos eius excutitur. In vetustate plus affert. Theophrastus: Cultu mitescit
amygdala, vnde neglecta amara ex dulci, & dura ex molli redditur.

Ars.

Amara amygdala quomodo esculenta fieri possit, multa Græcorum, & La-
tinorum extant experimenta. Aristoteles docet clauum confixum amygdalæ,
vt gummi per multum tempus destillet, vrbam reddere, & per hoc artifi-
cium sylvestres arbores fiunt domesticæ. Theophrastus amygdalam cultura
maxime immutari posse multis in locis profiteretur sui operis. Vnde si quis sti-
pitem circumfosso, & ab ima parte perforato mensura dodrantali, vndique la-
chrymam affluentem in idem destuere sinat, hoc tam ad bene sapiendum,
quam ad fructificandum conferre creditum est. Amygdala perforatu castiga-
tur. Si paxillo deciso humorem influentem abstergas, idq; biennio, vel trien-
nio facias, dulcẽ ex amara efficies. Amaror enim ex nimia alimenti copia pro-
uenit, humorisq; vbertate, quod perforatu castigatur: nã illo liberata humo-
re, in meliorem & suauiore fructum transit. Reliquus humor facilius con-
coqui potest, sic dulcescit. Amygdalam mutari posse ex toto procul à ratione
est, cum arbor sit satis robusta; sed diminutam meliorescere verisimilius est.
Præterea si stercorebus nonnullis ex validioribus vtetur, ceu suillo, amygda-
læ ex amaris in dulces transeunt. Sed amygdalæ triennio post mutatur, cultum
enim per tantum temporis adhiberi par est. Africanus ex amaris dulces fieri
affirmat, si circumfosso stipite quatuor digitis à radice cauernula imprimatur,
per quam noxium defudet humorem. Vel si circa radices apertas vrina, vel
suillum sterces diffunditur. Quintilii ex Aristotele, Martio mense amygdala-
rum radicibus suillum sterces imponunt, nam ex amaris faciunt dulces, maio-
res, &

res, & deliciores.
pite, & ab ima parte
his, Ex amaris dulce
na per quam noxiu
neus ligni melle o

E duris molles
Si radicibus ante
dius ex Martiali: T
laquearis per dies
facere hoc modo
eo terram minuta
to: cum ferula fue
cem græcam absc
ter nonis & idus
ram facere prom
ni foliis propter
trunco, & radice
fiant, docet Theo
mento meliori v

antur: nam alime
sci scripam asseri
buerit descripti
core congesto ob
aperta testa nucle
& portino sterco
Silas iur arbo
dum docet Theo
lus adigatur arbo
modo in eam an
dices refollas sp
nera. Sublata e
let. Ab eo Afric
& iuxta terram
prius humano
fertiles fiunt,
dæ cuneum t
gente clauda
falice paxillum
materiem, se
infixi durent
phrastus, quia

res, & delicatiores. Plinius: amygdalæ ex amaris dulces fiunt, si circumfosso stipite, & ab ima parte circumforato, defluens pituita abstergatur. Palladius ex his, Ex amaris dulces fiunt si circumfosso stipite tribus digitis à radice fiat cauer-
na per quam noxium defuder humorem, vel medius truncus terebretur, & cu-
neus ligni melle oblitus imprimatur. Vel circa radices suillum stercus affundas.

E duris molles reddere etiã docet Theophrastus. Africanus ita pollicetur:
Si radicibus ante florem ablaqueatis aqua calida frequenter ingeratur. Palladius ex Martiali: Teneras nucas amygdalus creabit, si ante florẽ radicibus ablaqueatis per dies aliquot calida aqua ingeratur. Nucem græcam tarentinam
facere hoc modo docet Columella: In quo scrobe destinaueris nucas serere, in
eo terram minutam pro modo semipedis ponito, ibiq; semen ferulæ repangi-
to: cum ferula fuerit enata eã findito, & in medullam eius sine putamine nu-
cem græcam abscondito, & ita obruito, hoc ante kalendas Mart. facito, vel in-
ter nonas & idus Mart. Sed Florentinus amygdalam suis operimentis spolia-
tam facere promittit, si solam amygdalæ nucis carnem vitis recentis, vel plata-
ni foliis propter formicas inuolutam terræ obruas, sed cinis assidue aspergatur
trunco, & radicibus. Vt amygdalæ testa tenuior fiat, intestina verò ampliora
fiant, docet Theophrastus, si continua fossione exhilaretur arbor, nam ali-
mento meliori vberiori; cum ipsæ arbores vigent, tum fructus meliores cre-
antur: nam alimenti copia humefacit, pulpamq; fructus auget. Africanus na-
sci scriptam asserit, si eius testam fregeris integro nucleo, & in eo quicquid li-
buerit descriperis, mox papyro religatam, ac luto circumlitam, ac suillo ster-
core congesto obrueris. Palladius: Græci asserunt nasci amygdala inscripta, si
aspera testa nucleum suum tollas, & in eo quodlibet scribas, & iterum luto,
& porcino stercore inuolutum reponas.

Si salciuit arbor frondibus, & germinibus, nec ferax fuerit, castigandi mo-
dum docet Theophrastus, sic copiosorem fructum dari affirmat, si ferreus pa-
lus adigatur arbori, impressoq; foramini querneus inferatur paxillus, & hoc
modo in eam animaduerti volunt. Vel si posthac fructus abunde nō dabit, ra-
dices refossas spoliatasq; hybernis frigoribus dabunt, & reliqua puniendi ge-
nera. Sublata enim nimia alimenti copia, calor insitus amplius in residuo va-
let. Ab eo Africanus. Si ferax non est amygdalus, hyeme radices ablaqueabis,
& iuxta terram terebrato trunco tedæ præpinguis adactum cuneum, infuso
prius humano lotio, immergemus. Plinius: cuneo è robore adacto fissa radice
fertiles fiunt, si germinant, nec fructum ferunt. Palladius, Si ferax non est, te-
dæ cuneum terebratæ radici mergamus, vel salicem sic inseramus, vt libro te-
gente claudatur. Sed Theophrastus querneum, Africanus è tedæ, Palladius è
salice paxillum arbori adigunt, & alii diuersum, ex quo perspicui licet non cunei
materiem, sed duritiem & incorruptibilitatem queri, quo diutius arboribus
infixi durent. Perdit facillime amygdalus fructus ante maturitatẽ, dicit Theo-
phrastus, quia nexu infirmo dependent, cum mole grandiuscula cõstent: nam

quodlibet humefacere, atq; debilitare eos facile potest. Tū etiam flatus interdum vehementes inuadūt, vt nil resistere valeant: imò etiā si non pluat, dummodo aer austrinus, nubilusq; sit, amittūt flores & primos fructus, si illico postquam defloruere illud acciderit. Plinius ab eo: Si amygdalæ cū defloruere, proptinus sequantur imbres, in totū poma depereunt, etiam si omnino nubilū fiat, austrinusve flatus, amittunt fœtus. Perdit facillime ante maturitatem fructus amygdala etiam si non pluat & fiat austrinum cœlum aut nubilum, amittunt florem, & primos fructus, si cū defloruere tales dies fuerint. Apud nos à Martio mense vsq; ad medium Aprilem gelu timent, quia tunc flore & fructu pubent, & si noctu pluit in flosculis insidente aqua, gelu torpebūt, & caduci fiūt flores, hoc elapso tempore tutius viuūt. Amygdala non solū plagam, sed etiam discissionem caudicis sustinere potest (& si permultæ fisso caudice pereant) Ratio est, quod dissectas partes celerrime comprimere potest, & coagmentare. Vt redine non infestatur. Aliquando gummosus humor efficitur. Mutilatione deterior euadit, quippe ex dulci amara efficitur. Ratio est, quod principio alterato, finis quoque alteratio sequitur. Palladius: Locis frigidis vbi metus est de pruina, Martialis dicit hoc remedio subueniri. Antequā floreat, radices nudantur, & albi lapides minutissimi misti arenis cogeruntur, & vbi iam tempus videbitur, vt debeant germinare, effossi iterum lapides submouentur.

Cultura.

Amygdalæ, Florentinus ait, ad legendum maturitatē fatentur, quū fuerint spoliatæ corticibus, quæ si muria lauentur, & candidæ fiunt, plurimum durant, mox siccata ad vsum seruantur. Si difficulter corium exuant, paleis obruta continuo relaxabunt. Semina, quæ mollia, Theophrastus ait, carnosaq; sunt, vt amygdala, putamine ambiente optime seruantur, omniaq; diutius seruantur putaminis circundantis præsidio. Sed minus perdurat, quā auellana, quum pinguiscula illa sit. Palladius: amygdala maturitatem fatentur ad legendum, cum fuerint spoliata corticibus. Hæ sine cura hominis seruantur in lōgum. Si difficulter corium dimittent, paleis obruta continuo relaxabunt. Item decorticata, si aqua marina lauemus, aut salsa, & candida fiunt, & plurimum durant. In Baro septem, vel octo diebus in solata cum putaminibus earū sicco loco per triennium, vel quadriennium asseruantur.

Materies.

Arboris cinerem, ad lixiuiam quæ probauit Theophrastus vim acerrimam. Ad fornaces, artesque aliquas non incommoda materies.

De auellana. CAP. XXXV.

ET si montes, & nemora corylis vestiantur, vt syluestribus arboribus, nos tamē tum ob eorum fructuū gratiam quā apud omnes adepræ sunt, tum quia facile cultu mitescunt, in pomarium transtulimus. Plinius esse in ipso nouum genere ait. Habent eæ facultatem non minimam aduersus venena, præcipitq; Cato in suburbanis hortis conferendam. Plutarchus scribit appensam in laquearibus nucē scorpiones prohibere, ne in domicilia irrepant, lectorum etiam pedibus adligatam, scorpiones ne cubantes adorianur inhibere, nec ad equilia,

equilia, si præsepibus nauit rusticitas: sed dem emori. Met. coryli arborem sy vbi metalla lateant cū cæteris locis remeratur. Nec præ virgæ veru instaribus lignum, vel qu ti, mox prunæ subitium ritu, se ipsam ui falso, sed coryli. In magnis est. Diocorides. Hermoglandis. Athenæo. Macrotem natio homin. ex loco, in quo n. nucem non auel vocat. Plinius: Ar. Græciamq; vener. no Campaniæ op. nellino distant sex. piosas & varias af. Arbor Græciæ. Rara admod. prosequatur. Au. perneram is br. nullis. Folis pe. admodum leu. tenui & suffla. ce præludia q. squamosum. longus vermi. pineæ viridis. pemodum te. 40 flauescens de. iuli supra ped.

equilia, si præsepibus affixa sit, irrepturos. Nec omitemus, quæ simplex obseruauit rusticitas: serpētem coryli virga, vel caudice ictum obtorpescere, & tandem emori. Metallicorum etiā experientia compertum est tantam cū metallis coryli arborem sympathiam habere, vt si illius recta virga per montes & loca, vbi metalla lateant, deferatur, illico flectatur in absconditi metalli indicium, cū cæteris locis recta maneat. Hac nux inter felices arbores à Macrobio enumeratur. Nec prætereūdum duximus ridiculum Alberti experimentū: Coryli virgæ verū instar accommodatæ regulus parua auis figatur, virgæ extremitatibus lignum, vel quoduis aliud subiiciatur, supra quod facile possit circumuerti, mox prunæ subiiciatur, fiet vt calescente colurno verruculo, non sine astantium risu, se ipsam vertat, dum coquatur, auis. Sed putat ipse eam vim inesse aui falsò, sed corylo, quæ per se sola conuertitur obiecta igni.

In magnis est ambagibus auellana ob sui nominis varietatem. Theophrasto *Norma.* *ἡρακλεωπικὴ* dicitur, id est nux Heracleotica ab Heraclia Ponti ciuitate dicta. Dioscorides *λεπτοκάρυον* vocat, id est tenuem, & exigua nucem, respectu iuglandis. Hermonax, & Timachidas auellanam nucem iuglandem vocant ex Athenæo. Macrobius prænestinā nucem vocari ait, à loco vbi luxuriat. Est autem natio hominum iuxta agrum Prænestinum, qui Carfirani vocantur *καρφύρον*, à nucibus, inde scilicet prænestinæ nuces. Hanc autem nucem etiam à Græcis vocari ait *καρφύρον πυνηκόν*, cū vnaquæq; gens indiderit huic nuci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Putat idem, Oppii opinione, heracleoticam nucem non auellanam, sed iuglandem dici, falsò. Didymus ponticam nucem vocat. Plinius: Auellanas antea abellinas patrio nomine vocabāt, & in Asiam, Græciamq; venire à Ponto, ideo ponticæ nuces vocantur. Seruius ab Auellano Campaniæ oppido. Sed nunc duo oppida in Campania vulgò *Anello* & *Auellino* distant sex millia passuum; circa ea *Corigliano* vulgò, quæ optimas, copiosas & varias affert. Neapolitani respectu maioris nucis *nocelle* vulgo dicunt. Arbor Græcis *κάρυλος* dicitur, Latinis etiam corylus.

Rara admodum videtur fuisse Theophrasto, quod tā anxie eius historiam *Forma.* prosequatur. Auellana assurgit caudice multis internè stolonibus fruticāte, superne ramis brachiato. Virgis sine alarū sinu enodibus, breuibus, crassissq; nonnullis. Foliis per ambitū serratis, utiq; alno similibus, tamē latioribus. Materie admodum lenta. Cortice summo tenui, pingui, maculis albis & variis. Medulla tenui & sufflata, quæ dematur. Florere hanc nonnulli inficiantur, sed floris vice præludia quædā ostentare, quæ iulos vocant: Siquidem fructu iam caduco, squamosum quiddam minutis squamis racematim compactum, veluti prælongus vermis, erūpit, quod singulari fultum pediculo pensile nititur. Is nux pineæ viridis, & nouellæ rudimentū exprimit, nisi quod tereti crassamēto propemodum tendit, tripollicari longitudine, crescens hyeme, vere dehiscens, & hauescens defluit, cū folia profiliunt, tunc calyculacea tegumenta totidē, quot iuli supra pediculū exeunt, eorūq; singulis singulæ nuces insunt. Germinat & e

lateribus se fundentibus surculis, & ipsum quod præsit propellitur, sic caudex & rami sua prosequuntur incrementa, ut ea quorum germina in singulare folium finiuntur. Radice altissima, tenui, & robusta, & ob id diuturnioris vitæ. Plinius: Has nuces molles protegit barba, sed putamini, nucleisq; solida rotunditas inest. Umbilicus illis intus in ventre medio. Ferunt & auellana iulos compactili callo ad nihil viles. Macrobius ait: Pontica nux & basilica, germina & flores agunt, scilicet eisdem temporibus, quibus græcæ nuces.

Genera.

Theophrastus ait: Duo eius genera: sylvestris, & urbana. Sed sylvestris prorsus utriusq; naturæ, nec urbana fructus magnopere, quam indomitæ præstantior, folium urbana maius, & caudex procerior. Ambæ bino genere constant: quædam rotundam, quædam oblongam nucem largiuntur, urbana candidiorem fructum. Didymus: est alia rotunda, alia oblonga. Apud nos sylvestres, & urbana copiosissima sunt. Sylvestres putamine duriori, minores, & sapidiore. Urbana fructu rotundusunt & oblongo, sed oblongus fructus cure tegitur rubra, præcocior est, & calyx summam magis fimbriatus. Rotundæ altera præcox, altera serior.

Celum.

Hyemis utraq; patientissima, & montibus magna ex parte proveniunt, cum natura sylvestres prorsus sint, ut ait Theophrastus. Descendit in plana corylus, dixit Plinius. Palladius verò frigido cælo gaudere scripsit.

Solum.

Theophrastus aquosis locis urbanas gaudere retulit. Didymus argillaceis, & viginosis, Palladius loco humido, macro, & sabuloso. Tale est Abellinum solum, ubi in planis, & montibus optime, copiosissimeq; fructificat.

Satio.

Seritur, ut Didymus tradit, eo quo amygdalæ modo, & tempore eodem deponitur. Palladius: Auellana ponendæ sunt nucibus suis, non amplius supra terram ducenda est, quæ crassitudine digitorum duorum. Viuiradice Plinius feri iubet à kalen. Martiis ad idus easdem. Palladius planis, & sobole expertus est melius provenire. Mense Februario seu planta, seu semen exponitur. Caro propagari posse docet. Plinius avulsione nasci, sed cum parte corporis matris, quam secum auferat fimbriatam. Nos sationis modum, & cultus, quibus in Abellino utuntur exponemus. Nucibus raro, vel nunquam, sed sobole frequentius ferunt. Effodiunt scrobes altitudine quatuor pedum, latitudine trium, inde virgas quinque circa matris crus fruticantes trimas, vel quatrimas euellunt, panguntq; ut singulis scrobius angulis, & in medio vnam statuunt Octobri, vel Novembri, terram iniiciunt, & optime calcant, cacumina obtuncant, & vinculis simul religant, ut simul crescant, nec se in latitudine fundant. Interualla viginti pedum ponuntur, ut cum ad iustam proceritatem increuerint, cacumina ne se obubrent. hoc modo ingentia auellana in Abellino conspiciuntur. Sed à vitibus longe absint oportet. Virgilius, *Næve inter vites corylos fere.*

Cultus.

Ex quo Plinius: Vites odit corylus, & ni procul absit, tristis & ægra. Theophrastus maxime coli iubet. Translatu mitescit sylvestris. Prægraciles eius virgæ de squamatur, crassioresq; derafa interpolantur. Fructum meliorem,

V
rem, & copiosior
proprietate fructu
reddi, quare tot
liquis, in corpore
uellana fructuosi
sperla ramos. Ab
ratur, optant lun
rini, semiplenas

Apud nos non
ferunt tamen per
fructus produci
quàm hac arbore

Columella n
dulla feratur, qu

Cato nuces p

Palladius mense

Abellini populi

rides afferunt,

lulant. Iunio fur

uius allequantur

cariorum more,

lyculaceis suis te

Haslibus pr

tylo facta erant.

Et co

Plinius. Erat

nascitur, terra q

fiunt ex ea ad val

bones ad pyrium

30

IN nucum g

vestus serpe

primus intulit

ques Roman

Theophr

Nicander Co

donius Stoi

scorides me

Theophr

40 rebinthum ha

reliquis omni

rem, & copiosiorē afferre traditur, si plures virgas reliquerit, vt quę naturę suę proprietate fruticosa sit. Arborem si quis frequenter collucet, fecundiorē reddi, quare tonderi, refecariq; præcipiunt, alioqui si arborefcere patiatur aliquid, in corpulentiam alimentum omne sumptitabit. Plinius ex eo: Nux auellana fruticosi generis, quinimo melior est, & copiosior fructu in plures dispersa ramos. Abellini populi ita colunt: singulis annis ablaqueant, ager bis aratur, optant Iunio aquas pluuias: tunc enim repleti nuces dicunt. Si defierint, semiplenas & paruas procreabit, neglecta com meat in fruticem.

Apud nos non inferuntur, & cū sapius inferuissē rarō comprehendit, *Institio.* ferunt tamen persicum emplastrari, & inferi posse filo trunco in eam, immo fructus producere, qui amygdalam intus dulcem habeant, nec ingeniosius, quā hac arbore fructus posse duplicari.

Columella nucem auellanam tarentinam fieri posse docet, si ferula me- *Ar.* dulla feratur, quemadmodum diximus in amygdala.

Cato nuces prænestinas recentes in vrceo in terra obrutas condere docet. *Coditura.* Palladius mense Iulio circa nonas auellanam maturam esse in locis calidis, ait. Abellini populi arenis obrutas, vel sub terra coopertis locis vsq; ad Aprilē virides asseruant, inde tunc eximi oportet, nam cælo incalescente cōtinuo pululant. Iunio fumo suspendunt in cratibus, vt assiccantur, vel furno, vt breuius assequantur. Sunt qui nucleos nudent, ac filo traiciant globulorum precariorum more, ac suspendunt locis siccis. Maturitatis signa, cum sponte è caryculaceis suis tegumentis exiliunt.

Hastilibus præcipua est, vnde columna hastilia F. Pompeio sunt, quæ ex cary- *Materia.* lylo facta erant. Materies fragilis: ob id Ouidius,

Et coryli fragiles.

Plinius. Erat corylus olim facibus familiarissima. Cædua est, sed tardius nascitur, terraq; defixa vix tolerat, non modo humorem. Apud nos circuli fiunt ex ea ad vasa vinaria constringenda, & ex eius virgis bimis vel trimis carbones ad pyrium puluerem conficiendum aptissimi.

De pistaceis. CAP. XXXVI.

IN nucum genere etiam pistacea nota esse Plinius dixit, quæ prodesse aduersus serpentum traduntur morsus, & potu, & cibo. Vitellius in Italiam primus intulit, eodem tempore, simulq; in Hispaniam Flaccus Pompeius eques Romanus, qui cum eo militauerat.

Theophrasto πέρσιδος, dicitur, vt paulo post in eius descriptione dicemus. *Nomen.* Nicander Colophonius, authore Athenæo, pistacia vocat, & phistacia. Possidonius Stoicus bistacia: Fratres Georgici bistacia. Damageron φρακία. Dioscorides πικρία. Latini pistacia vocant. Neapolitani *pistacchi*. Siculi *festuchi*.

Theophrastus ita suam terebinthum Indicam describit. Ferunt Indiam te- *Forma.* rebinthum habere, vel, vt alii, arborem similem terebintho, foliis, ramis, & reliquis omnibus, fructu tamen diuerso, amygdalarum similitudine, nam &

in Baëtris terebinthum hanc esse, ferreque nuces amygdalarum magnitudines non magnas, sed visu similes, suauitate verò amygdalis præstantiores, & ideo incolae eis potius uti. Plinius ex eo. Est & terebintho similis cæteræ, pomò amygdalis, minore tantum magnitudine, præcipuè suauitatis. In Baëtris vtrique hanc aliqui terebinthum esse proprii generis potius, quàm similem ei putauerunt. Possidonius Stoicus ex Athenæo ait, Arabia, & Syria affert pistaciū vocatum. Fructus racematim cohaeret vni modo, longus, cortice albo, & lachrymis simillimus. Et Fratres, qui Georgica conscripserunt, inquirunt: Terebinthum pistacia Syri vocant. Nos hanc Indicam terebinthum Theophrasti, pistaciorum arborem esse haud temere affirmamus, cum vtraque similis, & resinifera sit. Præterea super terebinthum insita, utpote in proprium genus mirè coalescit, & fructificat, nec pistaciorum aliter Theophrastus meminit, cum suo tempore nondum in Græciam essent allata. Nos ad horum maiorem declarationem pistacii arborem conscribemus. Planta tota est terebintho similis. Folio maiore, quàm lentisci, ita in ordinem vtrinque disposito, distantioribus frondium interuallis, subrufo. Arbor omnino nuda præterquam ramorum cacuminibus: nam supra comatur densiore folio. Nuces racematim pendent ex ramorum extremitatibus, facie vnguentariæ glandi simili, internus nucleus cuticula tegitur rufa, medullæ sapor pineæ nuci proximus, sed odoratior, ut terebinthi.

Genera.

Palladius duo genera dicit, marem, & fœminam: marem cui sub corio velut osseilongi videntur latere testiculi. 20

Cœlum.

Theophrastus terebinthum Indiam ferre, & Baëtrum. Dioscorides pistacia Syriæ esse. Galenus Alexandriæ magnæ nasci pistacia scripsit, verum in Beroea Syriæ municipio copiosissime. Damageron querere locum soli expositum dicit. Plinius in Syria nasci. Palladius loco calido, & sole gaudere. Sicilia pistaciis scatet.

Solum.

Palladius humectum solum, & rigationem desiderare ait.

Satio.

Pistacia Damageron feri ait Aprilibus calendis, sexum vtrumque matrimonio coniungendo, eo ordine tamen, ut mas deorsum in Fauonium spectet: ita connexa largiorem, ut asserit, fructum dabunt. Diophanes nucem integram, suisque putaminibus illam terræ dabat. Pistacia, Palladius inquit, feruntur aurummo, & mense Octobri. Qui diligentius facere volet, pertusos calyculos, & stercoreata terra repletos parabit, & in his pistacea terna constituet, ut ex omnibus germen quaecumque procedat, quod ubi conualuerit, planta hinc facilius transferetur mense Februario. Nos Neapoli Aprilis feruimus in calyculis, Maio profuerunt, foliis sui generis, & caducis, tardeque crescebant. Si viuiradices plantate necesse fuerit, Paxamus docet, scrobes locis apricis, & iugiter insolatatis elaboratos excuari, & viuiradices vegetas recentes una colligatas infuso stercore luna secunda demergi, iisque plantulis ab imo solo ad ramos usque vinculo constrictis, terra in gyrum accumulata scrobiculos implere, dareque operam, ut rigatione, potuque satientur, ab octauo die rursus vinculis ut committe-

mitterentur, coilaqueatione facta trunco aggerere hoc munere firmum

Damageron terebinthum, vtrique idem pistacium in amygdalario, & Martio, at

Quin

En

Hac

N

ULTIMA da, duro

Virgilius nuces

Cast

Heraclion Ep

nuces & castane

20 quam Dioscori

stimet. Sic Plin

ne, qui glandes

& præstant ieiun

Græcis & Syri

est, nominaram

orgicis suis, refer

chum amotas ap

dicuntur. Plini

quia Sardibus

30 bant, adeo ut le

minatur. Diph

catur etiam &

Heraclæotica

ait casta

etiam Dama

Theophr

nime, sed vill

te vere, feru

germinatione

40 dehiscit postea

mitterentur, coirentq; comprimere. Sed ubi caudices trimatum agerent, ablaqueatione facta, effossisq; serobibus, finum inspargere, & impulso altius trunco aggere terræ munire, arbor enim in vastam crescens proceritatem, hoc munere firmius hærens, impetu ruentis venti non deturbabitur.

Damageron Aprilibus calendis inserit in sui generis arbores, & terebinthum, utq; idem arbitratur, in amygdalum. Didymus in suis Georgicis pistacium in amygdalum inseri dicit. Palladius, Inseritur terebintho mense Februario, & Martio, at alii amygdalo inseri posse firmanunt. Ad Pasiphilum,

Quin & amygdaleos subeunt pistacea ramos,

Et debitum maius de breuitate petunt.

Hæc & cognato cingens terebinthus amictu,

Nurit adoptiuus nobilitanda comis.

De castaneis. CAP. XXXVII.

VLTIMA omnium accedit castanea, etiam nucum generi connumeranda, duro enim tegitur corio, quod proicitur, intus verò quod esui est. Virgilius nuces vocat,

Castaneasq; nuces, mea quas Amaryllis amabat.

Heraclion Ephesius etiam nuces vocat, Athenæo authore, sic Mnastheus nuces & castaneas. Nicander, & Theophrastus etiam nuces vocant: quamquam Dioscorides iuglandium, & gladium generi accommodatius tribui existimet. Sic Plinius ab eis, cæteri q; Etiam Diui Tiberii nominum impositione, qui glandes nominare fecit. Torrere has in cibis gratius. Moluntur etiam, & præstant ieiunio scæminarum quandam imaginem panis.

Græcis κάστανον dicitur: à Castana Magnesiæ oppido, unde primum aduecta est, nominatam esse constat. Theophrasto κάστανον εὐβοϊκόν. Nicander ait in Georgicis suis, referente Athenæo, Euboicos nucem castaneam vocare: Agelochum amotas appellare. Dioscoridi σαρδαναι βάλανοι, & διὸς βάλανοι, & λόπιμα dicuntur. Plinius reddit rationem, cur Græci Sardianos balanos appellent, quia Sardibus ex proveniēre primum. Iouis glandes, quia glandibus præstant, adeo ut Ioue dignam existimarent. λόπιμα à cortice, quæ Græcè λέπες nominatur. Diphilus etiam castaneas sardicas glandes nominat ex Athenæo. Vocatur etiam & nux Heracleotica, ut Macrobius ex Oppii autoritate testatur. Heracleotica nux, quam quidam castaneam nominant. Democritus διὸς βάλανον ait castaneam designare. Apuleius castaneas eodem nomine vocat. Sic etiam Damageron. Latinis castanea dicitur. Italis *castagna*.

Theophrastus quorundam opinione castaneam florere existimat, alii minime, sed villum proportionem grossis præciduis respondere. Germinat ineunte vere, seriusque. Virgiliarum obitu fructificat. Amentum profert, id ante germinationem verni temporis initio gignitur, fit veluti foliorum conceptus, dehinc postea, & squammata illa flauescunt, & in longitudinem vel tripolli-

Forma.

carem increfcunt, cum vere folium exit, ifta decidunt. Fructus glandeus in calyce echinato, fimilis glandi, fagi dulcedine, & fucco, fed illi leuis, & placida, non hispida vt caftaneæ. Plinius ab eo. Armatum iis echinato calyce vallum, quod inchoatum glandibus. Mirumque, viliffima efle, quæ tanta occulta uerit cura naturæ. Trini quibusdam partus ex vno calyce, cortexq; lentus: proxima verò corpori membrana, & in his faporem, ni detrahatur, ineflat. Germinat vere ccepturo. Virgilius hirsutas vocat,

Sunt & iuniperi, & caftanea hirsuta.

Genera.

Plinius plura eius genera defcribit. Tarentinæ faciles, nec operofe funt cibo, planæ figura. Hæ Neapoli *caftagne piatte* dicuntur à figura. Facillimè purgantur membrana, imò corio inhaerent. Plinius. Rotundior, quæ balanitidis, purgabilis maxime, & fpon te profiliens. Neapolitani vulgò vocant *caftagne palombelle*. Glandis figura funt, acuminatæ, dentibus frangendo profilit albus fructus, & ob id experuntur, corio flauefcenti. De Salariana, quæ pura, & plana eft. Multa funt apud nos genera, quæ bis accommodari poffunt, prima præcox eft, quæ Augufto maturatur, figura eft plana, ac facile decorticatur. Laudatior Corelliana. Adhuc antiquum retinet nomen, nam vulgò *Cordeglia* nã dicitur, quòd cordis fpecimen gerat, cum ignoret Corellium, à quo nomen acceperit. Materana vulgò *marroni* dicuntur, corrupto à materana vocabulo. Hæc maximo eft apud nos pretio, quia magnitudine ferè malum æquat. Cortex ex flauo rubefcit. Hanc Campania laudat, & ferior eft. Triangulas, & populares fyluæ affatim produciunt, fcrupulofa corticis intra nucleos quoq; ruminatone, quæ fuum pabulo gignuntur, minore corporis tuberculo.

Culm.

Quia caftanea è fylueftrium genere eft, etfi cultu urbana, non ob id fylueftrum habitum exiit. Theophriftus, montibus exultat, ait, quia frigoris auda, atq; adeo montibus gaudet, vt in plana non defcendat. Septentrionalium locorum incola, vt in Thmolo, Olympioq; Myfio, in Eubœa, & circa Magnefiam Euboicæ. Ab eo Plinius: Montes, & valles diligit caftanea. Damageron frigidis lætari ait. Columella: Opaco, & feptentrionali cliuo lætatur. Plinius iterum ab eo: Gaudet opaco, feptentrionalibus, & præ frigido fitu, vel etiam decliui. Palladius: Diligit cœli ftatum frigidum, fed & tepidum non recufat, fi humor affenferit. Delectatur cliuis, & opacis regionibus, ac maxime in Septentrionem verfis. Apulia caftanetis caret, quia calida regio, & plana eft: ob id etiam puto iuxta Romam ipfam caftaneas agrè provenire, vt refert Plinius. Sic apud Allobroges caftaneæ multæ, generofæq;. Parisius ager non nifi paucas, & degeneres habet.

Solum.

Apuleius caftaneas in locis affiduam pluuiam excipientibus deponi monet. Damageron in arenofa terra. Plinius: patria laudatiffimis Tarentum, & in Campania Neapolis. Columella, Pullam terram, & refolutam defiderat, fabulonem humidum, vel refractum tophum non refpuit. Spiffum folum, & rubricofum reformidat. Plinius ab eo, Querit folum facile, nec non arenofum,

V.
ffum, maximeque
nam. Recufat ead
tem, quæ feri nuce
tamen arenofum.
eft, & carbunculu
vix prouenit. In a

Damageron ferè
gefecus, fufum m
fe docet Caffianu
in repaftinato nux
tam hyemem fice
ces in ordinem fer
tur. In altitudin
cibus funt confu
nearum pangit
mulatq; femina
nipedes arbulcu
autem femen pro
fcantur, aut fice
interdum fubter
que fæpe nouell
uenit, nec nifi qu
bri mense in Febr
fcantur. Interual
feruntur in aliud
renda eft ergo ip
cembri, item Feb
des, maturæ, qu
ipfius præftat. Si
30 eft. In vmbra ca
translatæ cumu
Post dies triginta
merguntur, fup
rues, & post tri
initium ferere
napariter mi
titudine pedi
natis, aut cer
daclus in pul
40 demerfum. V
fingulis locis

sum, maximeque sabulum humidum, aut carbunculum, vel topi etiam farinam. Recusat eadem gallicam, rubricam, cretam, omnemque terræ fecunditatem, qua feri nuces diximus. Palladius: Amat solum molle, & solutum, non tamen arenosum. In sabulone proueniunt, sed humecto. Nigra terra illis apta est, & carbunculus, & topus diligenter infractus. In spisso agro, & rubrica vix prouenit. In argilla, & glarea non potest nasci.

Damageron semine plantari docet, verum fructu, amygdalo, & nuce longesecus, sursum mucronem habente. Decembri mense castaneā plantari posse docet Cassianus. Columella de eius ex semine satione hæc habet: Castaneę in repastinato nux posita celeriter emicat. Seritur ab Nouembri mēse per totam hyemem sicca terra, & repastinata, in altitudine dupondii & semissis. Noces in ordinem semipedalibus, ordines autem quinum pedū spatiis dirimuntur. In altitudine dodrantis castanea depressis sulcis committitur, qui vbi nucibus sunt confiti, prius quam cōplanentur, breues arundines ab latere castanearum panguntur, vt per hos sationis indices tutius fodi, & runcari possint. Simulatque semina stillauerint, & iā bima transferri queunt, interualluntur, ac binipedes arbusculis vacui relinquuntur, ne densitas plantas emaciet. Spissius autem semen propter varios casus deponitur, nam interdum priusquam enascantur, aut siccitatis nux inarescit, aut aquarum abundantia putrescit, & interdum subterraneis animalibus, sicuti muribus & talpis infestatur, propter quæ sæpe nouella castanea caluescunt. Plinius ab eo: Non nisi ex maximis prouenit, nec nisi quinis acruatim satis. Perfringi solum debet supra ex Nouembri mense in Februarium: quo soluta, sponte cadunt ex arbore, atque subnascuntur. Interualla sint pedalia vndique sulco dodrantali. Ex hoc seminario transferuntur in aliud, bipedali interuallo, plus biennio. Palladius à Columella: Serenda est ergo ipsis castaneis; hoc est seminibus suis mense Nouembri, & Decembri, item Febuario. Eligendæ sunt castaneę ad ponendum recētes, grandes, maturæ, quas si Nouembri mense seramus, facilem se præsentia fructus ipsius præstat. Si verò Febuario ponamus, vt vsq; tunc durent, ita faciendum est. In umbra castaneæ siccantur expansæ. Tunc in angustum, & siccum locum translata cumulum faciant, & eas omnes fluminalis arena diligenter operiat. Post dies triginta eas, remota arena, in aquam frigidam mittis. Quæ sanæ sunt, merguntur, supernat quæcunq; vexata est. Item quas probasti, similiter obrues, & post triginta dies æque probas. Hoc cum tertio feceris, vsq; ad veris initium serere debebis, quæ manserint illibata. Aliqui in vasculis seruant arena pariter missa. Pastinari ergo locus debebit, qui huic destinatur arbusto, altitudine pedis vnius semis, vel duorum: vel totus, aut sulcis in ordinem destinatis, aut certe aratris resoluī hinc inde findentibus. Qui simo satius aut redactus in puluerem castanearum semen accipiat, non amplius pedis dodrante demersum. Vnicuique semini propter notam furculus debet affigi. Ipsa semina singulis locis simul terna, vel quina ponantur, & inter se quatuor pedum spa-

tio separentur. Quibus transferre placuerit, bimas plantas transferre debent. Locus tamen deductoria liquoris accipiat, ne humor insidens limo, germen extinguat. Seritur & plantis, sed quæ radicibus exempta, & deposita est, biennio reformidat: (dicit Columella) ob id commodius nucibus, quàm viuiradicibus syluas institui cōpertum est. Plinius ex eo: Translata nescit hospitari, pauetq; nouitatē, biennio ferè postea profilit, ideo nucibus potius, quàm viuiradicibus plantaria cædua impleantur. Tempus ferendi à Calendis Martii ad idus eiusdem. Palladius. Quibus transferre placuerit, bimas plantas transferre debebunt. Seritur & plantis quæ sponte nascuntur, sed quæ plantis seritur ita ægra est, vt biennio de eius vita sæpe dubitetur. Columella propagare docet: Vbi frequentāda sunt, melius ex vicino, si competit (mergi more) pertica declinata propagatur, quàm exempta refertur. Hæc enim velut immota sua sede vehementer germinat. Plinius: Sunt & propagines nulli quidem faciliores, nudata enim radice tota in sulco prosternitur, tunc ex cacumine super terram relicto renascitur & alia ab radice. Palladius ex his: Cui placet, potest castaneæ ducere in propaginem ima virgulta, quæ in radice nascuntur. Damageon viuiradice feri docet, qui modus longè tutior est, & bima fructum reddit. Pangitur etiam auulsione, & stolone ab æquinoctio. Quintilii castaneam à palo, siue talea in frigidioribus, vel humidioribus locis plantant.

Destitio.

Diophanes ait, Aprili mense inferi incipit castanea. Recipit morum. Inferitur in nucem, quercum, & fagum. Plinius suomet furculo insitam longe meliorem fructum reddere scripsit. Corellius eques Romanus Ateste genitus inseruit castaneam suomet ipsam furculo in Neapolitano agro: sic facta est castanea, quæ ab eo nomen accepit inter laudatas. Postea hares eiusdem liberrus Corellianam iterum inseruit: hæc est inter eas differentia, illa copiosior, hæc Corelliana melior. Palladius. Inferitur in se, & in salice, sed ex salice tardius maturat, & sit asperior in sapore. Inferitur, vt ipse probauit, sub corrice mense Martio, vel Aprili, tamen genere vtroque respondet. Potest & in oculari. Ad Paspophilum,

Flumineam salicem fecundant ardua membra

Castanea, & multa pasta liquore vigent.

Nos Martii fine inserimus fisco ligno, sed melius inter lignum, & corricem, aliquanto verò serius emplastramus, & admodum digitalis, & optimè comprehendit.

Cultus.

Columella. Cultus eiusdem est fossionis, positionisq; qui vineæ. Supputari debet bima, quin etiam trima, nam bis ferro repetenda est veris principio, vt inciteretur eius proceritas. Plinius: Cultura non alia quàm supra dictis fossiendis, supputandisq; per biennium sequens: de cætero ipsa se colit, vmbra stolones superuacuos enecante. Palladius: Nouum castanetum circumfodi debet assidue, mense Martio, & Septembri, incrementum maius acquirit, si putationibus adiungetur.

Palladius

Palladius ita c
tra fabulone, n
condita, & lo
lutata vt spiraeu
palustri vltua figu
Castaneæ dei
nerari debent, v
flamma magno
angustius elius à

IOA
PO



exposcebant,
lex locus: ho
uerit, cōplec
fici operis p
nobilissima,
victum traba
perabit, quæ
(Plinio refer

Palladius ita condit: Castaneæ seruantur, vel in cratibus dispositæ, vel in ^{Coditura} ~~era~~ sabulonem, ne inuicem tangantur inuersæ, vel in vasculis fistilibus nouis conditæ, & loco sicciore defossæ, vel inclusæ virgeis ex fago receptaculis, & lutatæ vt spiracula non relinquant, vel ordeï paleis minutissimis obrutæ, vel palustri vlua figuratis densioribus sportis reclusæ.

Castaneæ deinde, priusquam cineribus credantur, ferro, vel dentibus vulnerari debent, vt plagæ hiatus spiritus igne citatus euadat, alioqui flagrantēs flamma magno cum crepitu profiliunt, assidentium periculo: flatus enim in angustiis elisus à noxa vindicabit, impetu in sibilum eunte.

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER SEXTVS

SIVE

OLIVETVM

PROOEMIUM



DOMARIUM meum clausum iam, firmoq; munimen-
to vallatum putaram, & in vineam progredi accinge-
bar, sed memini de olea me dicturum, ob id lectores ne
tædeat proximum montem subire, vbi oliuetum con-
stitutum. Decreueram enim prius oleam ipsam apud
bacciferas arbores in pomario locare, sed delicia, & di-
uitiæ huius plantæ, & accurata, diligensq; eam ferendi
ars, quæ amplam, exactioremque commentationem
exposcebant, me ab instituto proposito auerterunt, vnde hic proprius erit o-
leæ locus: hoc libro eius historiam pressius, quàm quisquam author designa-
uerit, cõplecti decreuimus. M. Cato oleto quartum locum dedit. Varro sui ru-
stici operis principio Mineruâ deprecatur, cuius procuratio oleti est. Stiprium
nobilissima, & mortaliũ sorti vtilissima, vt qua animalium princeps homo ferè
victum trahat. Virgilius ob suas dotes viti præposuit: quod si vitæ dignitate su-
perabit, quæ ex nascētibus planta erit, quæ ei conferri possit? Fenestella tradit
(Plinio referēte) omnino non fuisse in Italia, Hispania, atq; Africa, Tarquinio

Prisco regnante, ab annis populi Romani 183. quæ nunc peruenit trans Alpes quoq; & in Gallias, Hispaniasq; medias, vrbis quidem anno quingentesimo quinto Appio Claudio Cæcinepote, L. Iunio cos. olei libræ duodenæ assibus veniere. Et mox anno sexcentesimo octogesimo M. Scius T. F. ædilis curulis olei denas libras singulis assibus præstitit populo Romano per totum annum. Minus eamiretur, qui sciat post annos 22 Cn. Pompei IIII consularu oleum prouinciis Italiam misisse.

Quod olea Minervæ dicata sit. CAP. I.

MINERVÆ oleam sacram dicunt tum Græci, tum Latini scriptores omnes, quod illius inuētrix fuerit, aliasq; multas ob rationes. Virgilius, 10

Oleaq; Minerva.

Inuentrix.

Plinius etiam scripsit: Olea Minervæ dicata seruatur. Primo quod olea virginea manu sata, & exculta, vberiores præbeat fructus: puritatis siquidem amantissima, labisq; nescia, ob id virgini Minervæ dicata. Addit Florentinus Græcus; quod quum pura sit olea, pueros etiam esse vult suos collectores, & iurare, quod à sola propria vxore veniant, & non ab alieno cubili, & sic insequenti tempore plurimum fructum exhibebit. Ferunt etiam in Anazarbo Ciliciæ pueros castos oleam colere, & propterea oleam apud ipsos fertilissimam & fructuosissimam esse. A quo Palladius: Græci iubent oliuam, cum plantatur & legitur, à mundiis pueris, atque virginibus operandum, credo recordati arbori huic esse præfulem castitatem. Martianus Capella oleam Minervæ sacram dicit, quod artes & disciplinæ, quarum illa dea est, oleo lucernarum lubricationibus perdiscantur, iniquiens libro sexto;

Hinc iam vernicoma frondent tibi munera oliuæ,

Artes cura vigil per te quod discat olino.

Demosthenes demonstrare quærens, quod sobrius multas noctes vigiliis absumpisset, & lumen, & oleum multum triuisset, dixit, plus olei, quam vini absumpisse. Phurnutus olei munus Minervæ esse dixit, quod semper in virore sit, & glaucum colorem præ se ferat, & adulterari alio liquore nequeat: sed semper in sua sinceritate permanear. Sed de olearum origine ita Græci scriptores fabulantur. Cum à primordio tellus aquis emerisset, primum Athenis emicuisse dicunt: cumq; Minerva & Neptunus amore loci capti, de ciuitatis sibi nomine dicando contenderent (vt Cicero pro L. Flacco dixerit, de quorum vrbis positione propter pulchritudinem inter deos cerramen proditum est) Iuppiter eorum controuersiam dirimere cupiens, tulit sententiam, Eum oppidi principatu positurum, qui hoc meliori possessione donaret: Neptunus itaq; portu, & naualibus exornat, Minerva in Acropoli cum lætam, & virentem, tum fructiferam oliuam edidit: cuius ramum in coronam cōtorquens capiti suo imposuit, omniumq; calculo vicit, & ciuitatem suo nomi-

V
æ nuncupauit
ta munia secessit.
in Attica terra op
oleam senisset, iu
tionem, etiam v
ciuitas appellaret
perculso litore el
ua autem iacta h
paci in sine fore
inde aquarum fall
nius diceretur, &
est, atque ita vt ei
tercationem in i
contentione Sta
Ipsa
Lus
Rup
Et Virgiliu
Fudi
Plinius ad sua
nerua. Sed hæc fa
Athenis, & ibi im
co aquarum scaru
ta futurarum cal
rum misit, qui res
contetione binor
Minervam, & p
bus ex vrbis dei
30 minas ad confer
Minerva senten
bique, pro Min
undauit: quare
sed edixerit ne
mulieres suffir
fabulæ locum
ficere, vt ciues
regionem red
rum fructu no
40 Neptuno de re
nit. Vel Atheni

re nuncupauit: nam Minerua ^{ad oleam} dicitur: victus itaq; Neptunus ad consue-
ta munia secessit. Higinius verò ait, inter deos decertatum fuisse, qui primus
in Attica terra oppidum conderet, & secundum Mineruam à Ioue, quòd in ea
oleam seuisset, iudicatum. Alii verò inquit, Post deorum longam dimica-
tionem, etiam vsq; ad succumbentis vindictam, placitum est, vt eius nomine
ciuitas appellaretur, qui munus mortalibus melius protulisset: sic Neptunus
perculso littore effecit vt tellus equum, animal bellis aptum proferret: Miner-
ua autem iacta hasta oleam procreauit, quæ res melior comprobata, quòd
pacis insigne foret. Sunt qui dicant Neptunum arcem percussisse tridente, &
inde aquarum salios hauitus profuuisse, vt inde fons in arce fuerit, qui Neptu-
nius diceretur, & Mineruam oleam euocasse hasta, quæ omnibus vtilior visa
est, atque ita vt ei Athenæ cederent arbitratum. Alii dicunt: post longam al-
tercationem in id conuentum fuisse, vt ambo simul Athenis præessent. De hac
contentione Statius,

*Ipsa quoque in pugnos vacuatur collis, ubi ingens
Lis superum, dubius donec noua surgeret arbor
Rupibus, & longa refugum mare frangeret umbra.*

Et Virgilius Georgicorum primo,

Tuq; o cui prima frementem

Fudit equum magno tellus percussa tridenti.

Plinius ad sua vsq; tempora oleam durare tradit in certamine editam à Mi-
nerua. Sed hæc fabulam M. Varro ad veritatem ita tradit. Edificatis autem
Athenis, & ibi imperante Cecrope: in arce sponte nata olea, & ibidem alio lo-
co aquarum scaturigo: his prodigiis perterritus Rex, formidans ne hæc porten-
ta futurarum calamitatum præagia forent, Apollinem Delphicum sciscita-
tum misit, qui respondit, ostentum illud nihil mali portendere, sed deorum
contentione binorum de vrbis nominis impositione decertantium, per oleam
Mineruam, & per vndam Neptunum significari, liberumq; esse Athenienfi-
bus ex vtriusq; dei appellatione ciuitatem denominare. Cecrops mares, & fœ-
minas ad conferenda suffragia conuocat, mares pro Neptuno, mulieres pro
Minerua sententiam tulere, & quia fœminæ numero plures, vt ferè semper v-
bique, pro Minerua vicerunt: indignatus Neptunus Atheniensium terram in-
undauit: quare vt supplicio mulierum vacarent, Athenas quidem vocarunt,
sed edixerunt ne nascentium vllus materno nomine censeretur, & demum ne
mulieres suffragia ferrent. Sed Plutarchus in Themistoclis vita ait ex re ipsa
fabulæ locum fuisse, etenim cum reges Atheniensium (vt ferunt) studerent ef-
ficere, vt ciues omnia nauigatione arbores confererent, & fertiliorem eorum
regionem redderent oleis, quarum ager Atticus apprimè ferax esset, atq; ex ea-
rum fructu non minimum questum facerent, sermonem illum vulgatum, quòd
Neptuno de regione contendente, Pallas oliuam iudicibus obtulerit, ac vice-
nit. Vel Athenienses primos fuisse, qui hæc plantam & nouissent, & studio co-

luisse. Theophrastus refert Athenis oleam antiquissimam fuisse. Sed de oleæ inuentione alii alia tradunt. Quippe Diodorus Mercurium inuentorem, non Mineruam fuisse, huicque olei educendi, exprimendique inuentum tribuit: nam ante Mineruam, hæc cum cæteris syluestribus immista, ignotaque erat, vilisque habebatur. Et Cicero libro de natura Deorum, Aristeum Apollinis filium oleæ inuentorem fuisse scribit. Tacitus refert Latonam partu grauidam apud Cenchrum amnem, prope Ortygiam, oleæ adnixam Apollinem & Dianam enixam. Sed hæc poetarum figmenta sunt, qui sub fabularum inuolucris vim & plantæ naturam demonstrarunt, secus autem nostra fides sentit: Immensus enim omnium creator Deus iussit, vt terra plantas omnes produceret, quæ nulla penitus intercedente materia, quod est supra hominis caput, plantas, stirpesque omnes produxit: solius Dei honos & gloria est.

Quanto honore habitifuerint, qui in ludis, solemnitatibus, & victoriis corona oleaginea coronarentur.

CAP. II.

EX prædicta Palladis victoria super Athenarum vrbs nominis impositione, tanti Athenienses oleam fecere, vt in eorum victoriis, solemnitatibus, ludisque oleaginea corona donum & gestamen fuerit, & victoriæ signum apud eos esse cœperit, vt ex Halicarnasseo habetur. Scribit in artibus Dionysius, In oleæ laudibus illud merito recenseri, non modò, quòd illa sit Palladi sacra, sed quòd veteribus ex ea cõstituebantur trophæa, quodque sit victoriæ symbolum: nam & Neptuno superato, hac primum dea est coronata. Cassianus Græcus ab hac victoria scribit non solum certaminum victores, sed inspectores etiam, & arbitros ex oleastro apud Athenienses coronari. Ex Plinio quoque habetur Athenis victores olea coronari. Seneca oleam gentilem Atheniensium frondem vocat in Hercule furente,

Teramus olea fronde gentili regat Theſen.

Et Athenienses patriam coronam vocarunt. Græcos Achilli, & Aiaci ob hostium victoriam prædamque coronam ex olea donasse memorat Dictys Cretensis. Et in bello, quod Græci cum Xerxe gesserunt, Themistocli & Euribiadi eandem coronam sunt largiti. Idem Dionysius Halicarnassensis ait, Romanos idibus quintilibus, quæ dies cladis Latinorum fuit, Castori, & Polluci sacra facere, & milites, quibus equi è publico donati sunt, tributum curiatimque, ac cateruatim olea coronatos incedere, ac si è pugna, & victoria redirent, ab æde Martis vsque ad eorum ædes progrediendo. Plinius ad id: Oleæ honorem Romana maiestas magnum præbuit, turmas equitum idibus Iuliis coronando, item minoribus triumphis ouantes. Qui etiam pro republica aliquod egregium facinus peregissent, eadem oleaginea corona donabantur. Thralibulus occupato loco, cui Phila nomen, & quum triginta Atheniensium tyrannos sustulisset, & ciuitatem in pristinam libertatem

tatem

VI
tatem vindicaret,
nos ciues Athenienses
duobus ramulis
nathenzæ, quæ Ath
ta, quæ Theſeus in
certatores, quorum
ex sacra olea pressu
cit, in quibus victo

Accip

Qu

OLEAM GR
cantium, &
Athenienses con
liti fuerat, vt narra
lippi, Sidonem ob
obuiam sunt, pac
nibale, ad Scipio
uitatis principib
ni quum bellum
forditati, barba,
cutiam progressa
que Rege denicto
precantes, & rami
mulieres propter
cupientes, ramos
dam ob tempesta

Ipse co

Stian

Porri

Et libro se

Cen

Ire

Do

Sed luge

Pa

Et Stratus

Vitt

Ouidius M

tatem vindicasset, prædicta corona insigniri requisivit. Hac enim donare bonos ciues Athenienses consueuisse Valerius Maximus est author, quæ ex duobus ramulis complicabatur, eaque Periclis caput incinctum fuisse. Pannathenæa, quæ Athenis magna sacra dicebantur, singulis annis celebrari solita, quæ Theseus in Mineræ honorem primus instituit. Erant solum pueri certatores, quorum victoris præmium corona oleagina fuit, & oleum, quod ex sacra olea pressum erat. Instar huiusmodi ludorum Æneas ludos curules fecit, in quibus victores oleaginea corona coronabantur. Virgilius,

— Tres præmia primi
Accipient, flauaque caput necentur olina.

Quod olea venia, & pacis index sit. CAP. III.

OLEAM Græci *ελαια* vocant ab *ελεος*, id est misericordia, est enim supplicantium, & pacis symbolum, ut qui has petant, oleam manibus gestent. Athenienses contra Timocratem sordidati, & oliuam gestantes supplicare soliti fuerat, ut narrat Demosthenes. Artaxerxi, ut author est Siculus in vita Philippi, Sidonem obsidenti, quingenti primores ciuitatis oleæ ramos gestantes obuiam fiunt, pacem petentes. Deuicti item Carthaginenses, consulente Annibale, ad Scipionem ad deprecandam pacem & misericordiam decem à ciuitatis principibus seligunt, quos nauis oleæ ramis velata deferrebat. Romani quum bellum cum Perseo Macedonia Rege gererent, Alexandrinilegati sordidati, barba, & capillo promissis, & oleæ ramos ferentes, in Romanam curiam progressi ad miserationem procubuerunt, Liviò scribente. Eodemque Rege deuicto, Rhodiorum oratores, vniuersi prociderunt. Et apud Apuleium mulieres propter homicidium viduæ, iudicibus sui commiserationem mouere cupientes, ramos oleaginos ferunt. Æneas ad commiserationem implorandam ob tempestatem, Æneidos quinto,

*Ipse caput tonsa foliis eninctus olina,
Stans procul in prora pateram tenet, extaq; saluos
Porricit in fluctus, ac vina liquentia fundit.*

Et libro septimo.

*Centum oratores angusta ad moenia regis
Ire iubet, ramis velatos Palladis omnes:
Donaq; ferre viro, pacemq; exposcere Teucris.*

Sed lugentes non coronatos, sed manibus tantum ferre decet.

Paciferaq; manu ramum pratendit olina.

Et Statius Thebaidos duodecimo,

Vitata laurus, & supplicis arbor olina.

Ouidius Meram. sexto,

Circuit extremas oleis pacalibus oras.

Et columba post commune omnium animantium naufragium à Noa ex Arca tertio emissâ, rostro oliuæ ramum pertulit, generi videlicet humano à Deo summo pacem redditam significare volens. Immo cum nos meliorem aliquem significare volumus, olea ei ramum porrigimus: quod etiam expressit Virgilianus Æneas,

*Optime Graiugenum, cui me fortuna precari,
Et vitæ comptos voluit pretendere ramos.*

De Olea laudibus, & quanta antiquitus habita sit veneratione. CAP. IIII.

TANTA erat apud Athenienses olea dignitate, ut si quis aliquam oleæ plântam vel subriperet, vel discinderet, in iudicium vocaretur, ac pro sacrilego condemnaretur. Erantq; magistratus deputati pro huius oleæ cultura. Et quum Lacedæmones ad Atheniensium expugnationem venissent, eorumq; regionem ferro, & igne dēquassent, oleas solum non attigerunt, tum plantæ veneratione, tum pœnæ timore: Nam Athenienses & hostes, & amicos diris blasphemis persequabantur, qui oleam violarent. In profanis vsibus, auctore Plinio, oleam pollui fas non erat, ut ne propiciandis quidem numinibus accendi ex ea altaria, aræve deberent. Plutarchus in Solonis vita narrat, quod Athenienses cum ciuitatem sollicitam haberent ostentis, & piacula appeterent, ad expiandam eam Epimenides Phæstius ex Creta Athenas venit accersitus, cumq; se Athenas contulisset, in multis Soloni adiutor fuit, ad legum condendarum rationem, & quod maximum fuit, placationibus, expiationibusque ad mysteria, & religionem urbem instituens, iustitię obnoxiam, & ad concordiam prouocantem reddidit. Magna igitur admiratione habitus, opes multas, & honores largientibus Atheniensibus, non aliud, quam ex sacra olea ramos poscens, atque accipiens decessit. Erat & Athenis celebritas, quam *εἰρηοία* vltu vocabant, à Theseo instituta, qui è Creta Athenas incolumis reuersus, supplicationem Apollini Delphico pro facili reditu peregrinatus, crescentiam offerens. Erat enim ramus è sacra olea, alba lana implexus, *εἰρηοία* Græcis dicta, in quo plurimarum arborum fructus, quos *acrodrya* vocabant, circūpendebant. A Theseo post Athenienses annuatim Apollini votum persoluerunt, hunc enim ramum puer in Apollinis foribus affigebat, singuli verò post ante dium ianuas, eademque die, ut meminit Plutarchus in Theseo, *ἡγεροία* celebrabantur, ac si ramalia dicas à ramis ferendis: *ἡγερος* enim ramus est. Sophocles in OEdipo Coloneo in Atticæ terræ encomio, sacras sibi oleas fuisse dicit, quarum Iuppiter cognomento Morios custos erat. Hæc olea morias dicta erat à cede Halirhothii Neptuni filii, qui cum eam in odium Palladis victoriæ excidere tentasset, sibi met securim cum aberrasset impexit, ut inde occumberet, ut à casu hoc olea

Hea nomen de sum
poetarū Homerus
rit, olea comparat
te nitida vigore qu
tur, comparat eu
bat: ubi verò iuue
Et in sacra pagina
commemoratur:
ritatis specimen q

OLEA RV
eius vtilitat
afferre non inco
maior inueniri p
bus gratissimi, in
lei necessarius. C
facere, & contra a
borum, Existima
Saturni Romæ i
tione homines in
stodirent, respon
tur. Celebris cri
dentem eum diu
vigorem illius ar
ris oleo. Diuis A
fieri manūs olea
foliis, illud non o
leo tangerent, qui
medio est oleo
30 natura est. Th
non apes tantu
sole ponantur.
das, ne ladanu
rius omnia pa
ait: à fructu fa
nius scribit, A
primum habi
uis earum, fab
leique, ac vi
40 bras discunt,

Olea nomen desumpserit. Tantaque est huius plantę pulchritudo, vt princeps poetarũ Homerus, cũ egregiam aliquam speciem iuuenum describere quærir, olea comparet, quæ humilitatia, cœli clementia, ac ventorum benignitate nitida vigoreque plena è solo surgat. Euphorbus cũ à Menelao caderetur, comparat eum casum olea, quæ ventorum videtur turbata humi procumbat: vbi verò iuuenum formam non memorat, eos quercui, vel pinui assimilat. Et in sacra pagina vbi necesse est perfectæ alicuius speciei meminisse, olea commemoratur: Quasi oliua speciosa in campis: cũ virginalis pudoris, & puritatis specimen quoddam præ se ferat.

De olea necessitate, & utilitate. CAP. V.

OLEARVM vsus tantus, & tam multis in rebus varius est, vt multiplices eius vtilitates arduum sit enarrare, sed paucas, vel nonnullas in medium afferre non inconcinnum est visum. Ad rei medicæ necessitatem nulla res ea maior inueniri poterit. Plinius inquit: liquores duo sunt humanis corporibus gratissimi, intus vini, foris olei, amborum è genere ambo præcipui, sed olei necessarius. Olei liquor recreans membra est, cuius etiam potestas tepescere, & contra algores munire. Veteri oleo vsus est ad quædam genera morborum, Existimatur & ebori vindicando à carie vtile esse. Certè simulachrum Saturni Romæ intus oleo repletum est. Interrogatus Democritus quæ ratione homines in offensa valetudine degerent, atque animi illum vigorem custodirent, respondisse fertur, si corporis externa oleo, interna melle linirentur. Celebris etiam Pollionis Romuli exemplo: centesimum annum excedentem eum diuus Augustus hospes interrogauit, quam ratione maxime vigorem illum animi, corporisq; custodisset. At ille respondit, intus mulso, foris oleo. Diuus Ambrosius in Hexamero prodit agrotantem ceruum sanum fieri mansis olea ramusculis, & locustas ab ægritudine liberari, arrosis olea foliis. Illud non omit tam perquam vtile, vt qui ferrum remollire cupiant, oleo tangant, qui obdurescere, in aquam ignitum mergant. Contra vespas remedio est oleo aspergier ore. Pix oleo extrahitur, quando vtrunque pinguis natura est. Thracius lapis aqua accenditur, oleo restinguitur. Oleo quidem non apes tantum, sed omnia insecta exanimantur, præcipuè si capite vincto in sole ponantur. Ad venenorum haustus oleo succurritur ad vomitiones ciendas, ne cadantur præcordia. Vrinantes oleum ore si b aquis spargunt, & clarius omnia patescunt. Ad victum necessarius est olei vsus. Diuinus psaltes ait: à fructu frumenti, vini, & olei multiplicati sunt. Memorabile est, quod Plinius scribit, Alpibus coercitas, & tam inexuperabili munimento Gallias, hanc primum habuiss. causam superfundendi se Italia, quod Elico ex Heluetiis ciuis earum, fabrilis rob artem Romæ commoratus, ficum siccam, & vnam, oleique, ac vini præmissa remeans secum tulisset. Oleum suo lumine tenebras discutit, ac noctem in diem vertit. Nec prætereundum, quod eius vsus ex-

ga deos, eorumque sacrificia frequentissimus sit. Sed ne illoris manibus ab ea discedamus, scriptum reperimus, quod luctaturi oleo perungebantur: cuius vñctionis & ludorum olympicorum inuentor Hercules extitit, vt ex Lucano habetur,

Ille Cleonei proiecit terga leonis,

Anteus Libyci perfudit membra liquore

Hospes olympiaca seruato more palestra.

Et Philostratus in Palestre iconē, oleagineum ramum in Palestre Mercurii filia luctu inuentricis nudo sinu locauit. Vngebantur luctaturi tum vt eius vnguinis lubricitate difficilior foret mutua brachiorum connexio, tum quod validiores euadebant. Author est Polybius, victoria causam, qua potitus est Annibal in Italia contra Tiberium, fuisse milites prius oleo perunctos. Propterea Anacharsis Scythia oleum infania pharmacum esse dicebat, quoniam eo peruncti athletę feruentius inuicem insultarent. M. Varro dicit, Olea corpus non solum intus vngit, sed etiam extrinsecus, itaq; dominum & ad balneas & ad gymnasium sequitur. A quo Plinius, Vsum eius ad luxuriā vertere Græci, vitiorum omnium genitores, in gymnasiis publicando. Notum est, magistratus honoris eius octogenis sestertiis strigmenta olei vendidisse. Porphyrius Essæos è Iudæorum genere vngi oleo non pati scripsit, quod si quis oleo tactus fuisset, tanquam à magna corporis macula, diligenter abstergebatur, quod eos corpore aridos, & duros, non molles esse oporteret. Odores oleo optimè seruantur, ex Plinio habemus, quod diuturnitati eorum tãto vtilius est, quanto pinguius: & ipsa vngueta verustate meliora. Mirumq; dulcem succum bibere, & alieno infici sapore, etiam si oleum absq; odore sit, vt ideo vngueta, ad quæ frequens vsus, nullo modo inficiat; quod testatur Lucretius.

Cum primis querere par est,

Quod licet & potius reperire in olenti oliui

Naturam, nullam quæ mittat naribus auram,

Quam minimè vt possit mistos in corpore odores,

Concoctosq; suo contactos perdere viro.

Oliua hyeme secundis mensis libenter vescimur, & sua amaritudine, & salis potum sapidiorem efficit, condit dapes, suauiore efficit cibum, vbi imponitur. Diogenes cum vidisset iuuenem in diuersorio oleas esitantem, inquit, Si sic prandisses, non ita cœnares. Idem etiam cum Platonem in lautissimo conuiuio degustantem oleas intuitus esset, illum percunctatus est, quam obrem in Siciliam huiusmodi mensarum gratia profectus, appositis modo non frueretur? Cui ille, At Hercules ô Diogenes, illic & oleis & reliquis huiusmodi pluribus vesebar. Curigitur, respondit ille, Syracusas adnauigare te oportuit? An Attica tunc oleam non ferebat? Quibus verbis Platonis nauigationem subarguere videbatur. Tanta longæ arbor est vita, vt propè immortalis videatur. Multiplici modo seritur, citò comprehendit, & fructificat maxima vbertate.

Et

Et quia frondosa,
pissimè deturbari
detruncatis bra-
fructificet, vt qua
cta deperit, vt Co-
sam desiderat ole-
nuatis annis, sed f-
quod leui cultu su-
si quam recipit, sul-
vine deficit, eoq;
& cum adhibita cu-
solum securos, &
num est, & ad om-
bet, quod non si-
nā ab omnibus co-
de oleis non euen-
nisi ad oleum, vel
arbore ceram cor-
attingi, ideoq; ha-
non sperni dixit,
ria dixit, quod el-
sina tenuius, sapor-
ex vulgari olea et-
rare. Manat è ten-
pello incisis, oliua
te hyemis fructua-
nolus latex eman-
manna præferet

30 30 **E**X Theophr.
Enim, Olea
& Thessalo Piss-
& frigoris viole-
cadit, ante id te-
dentur quide-
Sic recila olea
lulasse. Sunt e-
statis, humia-
riat, quam pi-
40 Ratio: Quoti-
rate: haud tam

Et quia frondosa, æternaque pubet coma, solet hyeme à ventis agitari, & sapissimè deturbari, & ne tam utili bono priuaremur, effecit Dei benignitas, vt detruncatis brachijs, & denuo effosso scrobe sata, comprehendat, & citò etiam fructificet, vt quæ tam humanæ vitæ vsui inferuiat. Facile colitur, nec neglecta deperit, vt Columella inquit. Longè ex omnibus stirpibus minorè impensam desiderat olea, quæ prima omnium arborum est: nam quamuis nō continuatis annis, sed ferè altero quoq; fructum afferat, eximia tamè eius ratio est, quodd leui cultu sustinetur, & cum se non induit, vix vllam impensam poscit, & si quam recipit, subinde fructus multiplicat, neglecta compluribus annis, nō vt vinea deficit, eoq; ipso tempore aliquid etiam interim patrifamilias præstat, & cum adhibita cultura est, vno anno emendatur. Florentinus ait, quodd non solum securos, & firmos redditus habet ex olea prouentus, sed & maximū bonum est, & ad omne vile. Id præterea præcipuum, & consideratione dignū habet, quodd non sicut ficus fructus depradantur eo tempore, quo maturantur, nā ab omnibus colliguntur ficus, nec ferè alio tunc rustici cibo vitant, quodd de oleis non euenit, cum ab omnibus sua amaritudine tuoc respuantur, & non nisi ad oleum, vel ad condituram expetantur. Præterea M. Varro apes ex olea arbore ceram conficere dixit, et si Plinius scripserit oliuæ florem ab apibus nō attingi, ideoq; hanc arborem procul esse melius fore. Sed idem in arbutum non sperni dixit, si non sit vmbrosa ramis. Plinius spōtè nasci in maritimis Syriæ dixit, quodd elæomeli vocāt. Manat ex arboribus pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore dulci. A scriptoribus etiā accepimus, Galliæ locis quibusdā ex vulgari olea emanare manna verè melleū, sapore, colore, & incorruptū durare. Manat è tenellis ramis, & stipitibus, & rimosis corticibus, vel etiam scalpello incisis, oliua nigricante, vel purpurascente, Nouembri mense, ingruente hyemis sæuitia. Sectis etiam maioribus truncis initio melle liquidior glutinosus latex emanabat, postea frigore densior euadebat non tam mel, quàm manna præseferens.

De oleæ prodigijs. CAP. VI.

EX Theophrasto multa, quæ de oleæ prodigijs dicuntur, afferemus, inquit enim, Olea aliquādo visa est delapsis folijs vberes fructus protulisse. Quod & Thessalo Pistrati filio accidisse proditum est. Folium enim imbecillius est, & frigoris violentia magis obnoxium, ideo abire: sed fructus non nisi maturus cadit, ante id tempus in permanendo pertinax est, ob id perticis decutiunt. Videntur quidem hæc naturæ leges exire, non tamen monstris accipienda. Sic recisa oleæ ligna, obiecta & reposita terræ, fortu omni destituta, spōtè pululasse. Sunt enim hæc natura viuacia, propensaq; ad germinandum, suæ densitatis, humiditatisque causa, quæ cum extrinsecus liquoris aliquid senserint, quàm primum germina edunt. Simile in statuis ligneis, cum sudant, Ratio: Quoties adblanditur eis austrina tempestas tepore suo, suaq; humiditate, haud tamen omnia, sed quibus modo pinguis succus incit, hæc inter o-

stentia relata habent: Sic etiam olea penitus aliquando adusta, regerminauerat tota. Bætiæ verò germinibus omnibus à locustis derosis iterum germi-
 nauit. Sæpè etiam pars arboris comprehensa ab altera proxima est, atque in
 eiusdem corporis coagmentata magnitudinem: & si lapidem, aut aliquid si-
 mile arboris alæ inculcaueris, demum insinabitur, atq; occultabitur ample-
 xu auctoris obducta, quod etiã in oleastro, qui Megaris in foro stabat, eue-
 nisse accepimus, quo succiso urbem capi, ac dirimi oraculum erat, sicuti actum
 est: in hoc enim percisso, repertæ ocreæ sunt, & alia quædam Atticis ritus, par-
 te qua primum affixa fuere, ad ramorum ambitum concauata. A Theophra-
 sto Plinius: Inter arborum vitia est & prodigiis locus. Inuenimus oleas folia
 misisse baccis hærentibus. Sunt & miracula fortuita: oliua in totum ambusta
 reuixit, & in Bætiæ erosæ à locustis ficus, iterum germinauere. Prodigio au-
 tem sunt graui ostento: cum in deteriora mutantur, vt olea in oleastrum. Et
 Laodiceæ Xerxis aduentu platanus in oleam. Super omnia, quæ vnquam au-
 dita sunt, erat prodigium in nostro æuo Neronis principis ruina factum in a-
 gro Marrucino, Vectii Marcelli è primis equestris ordinis, oliueto vniuerso
 viam publicam transgresso, aruis quæ inde è contrario in locum oliueti profe-
 ctis. Herodotus author est, In arce Athenarum templum Erechtheo terrige-
 ne fuisse, & in eo oleam Mineræ, & mare Neptuni, testimonium quoddam de re-
 gione decertassent. Hæc cum in Athenarum à Medis facto incendio confla-
 grasset, eodem die duorum cubitorum altitudine repullulauit. Pausanias au-
 thor est, Cum Xerxes Græciam inuasisset, milites oleam exusserunt, & altera
 ab incensionis die cum Athenienses ad rem diuinam missi templum ascendis-
 sent, fructificasse inuenerunt, edito à stipite virgulti instar. Illud quoque ex
 historia succurrit, Augusti temporibus è taberna meritoria trans Tyberim o-
 leum terra erupisse, ac toto fluxisse die, nulla intermissione, quo significatam
 interpretantur Christi gratiam ingentes.

De oleæ nomine. CAP. VII.

Eλεῖς & Ἀἰλιάς Græca appellatio, illam enim primum vocauit Minerua,
 quæ vt vidimus oleæ munere Atticam dicauit. Aliis ἐλαια. Latinis olea, &
 oliua. Caper Grammaticus oliuam arborem esse dicit, oleam verò fructum.
 Sed hæc differentia vana est apud classicios autores. Virgilius arborem oleam
 & oliuam vocauit Georgicorum secundo:

Sed truncis oleæ, melius propagine vites.

In Eclogis.

Incumbens Damon tereti sic cœpit oliuæ.

Ἐλαια fructus est, Latine olea, & oliua dicitur. Varro oleam conditiuam vo-
 cat, quæ ad condituram adseruatur. Columella, Sic curata oliua tertio die
 possis vti. Incipientes baccas nigrescere Græci dryperas, Latini drupas dicunt,
 authore Plinio. Sic oleæ liquor dicitur oleum, & oliuum, oleum ab olea, oli-
 uum ab oliua. Virgilius Georgicorum secundo,

Liquidum

Est notior de distractan-
 do & tractando distrac-
 quirendus. Arbo-
 cile dissolubili, no-
 linquat. Medulla
 in medio ligno li-
 10 cerus medulla lo-
 à quibusdam voc-
 premnum nonn-
 contorta, & pla-
 vrbis perpetu-
 lo, vt quasi de fixa
 dium supinas par-
 stici confectum
 terarum, candic-
 quia eo tempore
 10 in firma, & quali-
 tur tantummodo
 dius in iis est, qui
 hæc enim viridis,
 formato, sed ita
 auerla parte non
 medio flos ambig-
 lur perforati spec-
 nullatenus pæf-
 lateribus, & qu-
 30 stum vix modo
 temq; soli. Bac-
 nucleo est: tam-
 dio tendente fi-
 sis, & villosis.
 suas fundunt
 bis eodem m-
 Summo cespit-
 nequeant, sed
 mē durat. Cau-
 40 iam stirpe inco-

— *Liquidi corrumpitur vsus oliui.*

De oleæ descriptione. CAP. VIII.

ETSI notior sit, quàm vt debeat explicari, tamen è Theophrasto hinc inde distractam historiam colligemus, diuersis quippe capitibus eiusdem doctrinam distrahit, vt Absyrtus ille Medæ non tam membratim fuerit conquirendus. Arbor est, caudice ab radice surgens ramoso, furculoso, non facile dissolubili, nodoso, & simplici, nisi quis multiplici caudice diffusam relinquat. Medulla in ea tam incerta spectatur, paruaque, vt sint, quibus non in medio ligno haberi, sed per totum lignum spargi videatur, vt nullus sit certus medullæ locus, nec defunt, qui ea omnino carere existiment. Gongros à quibusdam vocatos habet, eoq; morbo plusquam cæteræ laborare videtur: premnum nonnulli appellant, alii crotonam, alii alio nomine vtuntur, quia contorra, & plantigera esse solet, sic etiam concauitate laborare videtur. Ex urbanis perpetuo viret. Frondibus angustis, quæ tam breuinituntur pediculo, vt quasi defixæ cohæreant. Illud sanè peculiare euenire videtur, quod frondium supinas partes vertit mox post æstiuum solstitium, eoq; argumento rustici confectum solstitium intelligunt, cum supina foliorum contra, quàm cæterarum, candicant magis, quàm prona, minusq; sunt lauia. Cuius causa est, quia eo tempore foliorum agitur profluum, & cuncta affici necesse est, & infirma, & quasi senio confecta exarescunt & decidunt, reliqua circumaguntur tantummodo. Omnibus igitur illud euenit magis, vel minus, sed conspectius in iis est, quia summo coloris discrimine pars prona discrepat cum supina: hæc enim viridis, illa aquosa. Flore pusillo quidem, sed foliato, vno folio conformato, sed ita implicato, vt plura videantur, vt flos lasinoes: conceptaculo auersa parte non indiget, sed postrema eius in angulos exeunt. Fructum in medio flos ambit, & tunc probè defloruisse præbet augurium, cum cadiui, velut perforati spectantur, nam si exaruerint, aut madefacti cum fructu defluant, nullatenus perforantur. Fructificat annotinis furculis, tam cacumine, quàm lateribus, & quando cacumina ferunt, copiarum indicium esse dicitur. Congestum vix modo fert fructum, vt Syriæ, alijsq; locis ob fertilitatem, feracitatemq; soli. Baccæ carnis callo & nucleo interiacentibus constant, & caro in nucleo est: tamen ligno natura operuit. Radice parua, & velut lacinia ex medio tendente firmatur, cæteris grandioribus & contortis, inæqualibus, nodosis, & villosis. Quod vsu venit, quia breues & tenues illas permultas atq; pmissuas fundunt, nam etsi omnibus parua è grandibus exeat, tamen non omnibus eodem modo congesta, frequentesq; quod naturæ ipsius proprium est. Summo cespite hærent, non solum loci ratione, cum recto tramite progredi nequeant, sed ipsius proprietate. Auctu difficilis, sed viuax postea, & diutissimè durat. Caudice & laterali germine, nepotumque procreatione, atque etiam stirpe incorrupta. Viuere ducentos annos tradit Theophrastus. Cum

myrto amore coniunctam esse, mutuoq; radicum coniugio, & amplexatione gaudere, Androtion refert, virgasq; myrteas per brachia oleæ subire, & versari, & fructum oleæ protectum dulciorem producere, oleamq; ab cuiusvis alterius arboris vicinia remouendam. Sed Plinius, quæ ex Theophrasto accepit, habet. Oleæ folia non decidunt, angusta, & pediculo breui, superne candidiora, & minus leuia. Mirum id, quod oleis euenit: circumaguntur enim folia earum post solstitium, nec alio argumento certius intelligitur sydus confectum. Florentibus aliis germinant. Paulo serius solstitio florere incipiunt, concipiunt Vergiliarum exortu. Hoc sydus illarum est. Succus earum pinguis. Baccis intus lignum, extra caro, & caro adhæret ligno. Pediculis, & ramulis adhæret. Alternant fructus, quibus siccius lignum, vt olea, magis, quàm quibus carnosum. Radices inæquales, & ramosæ, per summa cespitum recto meatu incedentes. Familiare eis, quòd plurimum ventorum concipiant, propter densitatem ramorum, quibus amputatis leuatæ onere in sua scrobe reponuntur. Tardè crescit. Hesiodus negauit oleæ satorem fructum ex ea percipisse quenquam. Longa est vitæ. Durabant ad tempora vsque Plinii oliuæ in Liternino Africani prioris manu satæ. Et Argis olea etiam, ad quam Io in vaccam mutatam Argus alligauerit. Firmissima ad viuendum olea, vt quas durare annis 200 inter authores conueniat. Athenis quoque olea durare traditur in certamine ædita à Minerua. A Virgilio describitur pallido folio, trunco tereti, tarde crescenti, pingui, viuaci, & semper viridi,

Lenta salix quantum pallenti cedit oliuæ.

Incumbens tereti Damon sic cepit oliuæ.

Virgulia, & procul tarde crescentis oliuæ.

Et pingui Pallas oliuæ.

Palladia gaudet sylua viuacis oliuæ.

Consequitur viridi Mnestheus inictus oliuæ.

M. Varro ait, Admiranda discrimina naturalia sunt, quòd ex foliis propter eorum versuram, quod sit anni tempus, dici possit, vt olea, cuius folia cum conuertant se, solstitium dicitur fuisse. Sed Aulus Gellius de eo item: vulgo & scriptum, & creditum est folia olearum arborum brumali, & solstitiali die conuerti, & quæ pars eorum fuerat inferior, atque occultior, eam supra fieri, atq; exponi ad oculos, & ad solem: quod nobis quoq; semel, & iterum experiri volentibus, ita esse propemodum visum est.

De olearum generibus, & primo de oleastro. CAP. IX.

THEOPHRASTVS oleam primo in duo genera distinguit, in vrbanam, & syluestrem. Dicemus primo de syluestri, postmodum de vrbana. Prima oleastri apud Græcos origo sic ducta est, si Pausaniæ credendum est, homini doctissimo quidem, sed alioquin iis in rebus superstitioso: Nam & clamam Hercules ex Hyperboreis reuersi ex oleastro voluit fuisse, prius ignoto
Gracia,

Gracia, quæ terram in nemine Alpheum admodum ab insula daurum, adiecta a cule illac per meas tantes nymphas in

Arb.

Quip.

Exhib.

10 Celebrabantur ces dicebatur, cui les, in cuius honore Paulania. confitus, ex quibus ex quo corona dætonis vita, ait ipsi quo victoribus e Græci Olympiarum natus est, & nunc color fronde, hu

Gracia corino

Corinusa ab olea

mus. Et syluestri

citur & agrielæ,

agrippus dicitur.

Streptos dictus o

eius euerfus. Lat

Indi

Et oleastrum

30 Theophrastu

stres omnes hab

deo. Sed man

ci, vt credat. Ol

haberetur. Vi

dam æternitat

bore ex eaden

ueta consensu

tudine, & hab

horridiore asp

40 esset, perennis

mosi, candidi,

Græciæ, quæ terræ defixa sponte effloruit apud Trœzenios, aut certè iuxta amnem Alpheum, in qua gente locus est versus mare oleastris frequens: quem admodum ab intorta specie olea celebratur cognominata Strepte, circa Epidaurum, adiecta ab eodem authore fabula, euenisse circumacta manu ab Hercule illac permeante. Ouidius aliam eius originem tradit: Appulus pastor saltantes nymphas irridens, & rustica cōiuitia addens, in oleastrū commutatus est,

Arbor enim est, succoq; licet cognoscere mores:

Quippe notam lingua baccis oleaster amaris

Exhibet, asperitas verborum cessit in illas.

- 10 Celebrabantur apud Olympiā Græciæ urbem ludi, quorum victor olympices dicebatur, cuius præmium erat ex oleastro corona, quod primum Hercules, in cuius honorem inuenti, hanc arborem ex Hyperboreis attulerit, authore Pausania. Ante Olympiam templum fuit, & ante illud lucus oleastris confitus, ex quibus victores contextis ramis coronabantur. Hoc genus oleæ, ex quo corona donabatur, *elæa* callistephanos vocabatur. Plutarchus in Cætonis vita, ait ipsum M. Fauonii adilitate spectaculum in theatro edidisse, in quo victoribus ex oleastro coronas, veluti in Olympicis proposuerit. Plinius, Græci Olympiæ oleastro coronant victores. Ex quo primus Hercules coronatus est, & nunc custoditur religiosè. Elephas chamæleonte deuorato concolori fronde, huic suo veneno occurrit oleastro.

- 20 Græcis corinos dicitur. Gadir Hispaniæ ciuitas, aliquando Tartessus, & *Nommo* Corinusa ab oleastri vbertate, qui corinos dicitur, dicta est, si Eustathio credimus. Et syluestris olea, si domesticæ inferatur, fiet, quæ vocetur corinod s. Dicitur & agrielæa, id est, syluestris olea. Apud Lacedæmonas, authore Suida, agrippus dicitur. Deputato oleastro, quod inde gignitur phaunos vocatur. Streptos dictus oleaster, cui implicitæ fuerunt Hippolyti habenæ, currusque eius euersus. Latinis oleaster dicitur. Virg.

Indicio est tractu surgens oleaster eodem.

Et oleastrum oppidi est nomen in Bætica Hispaniæ, Ptolemæo authore.

- 30 Theophrastus ita describit. Oleaster satiuæ fecundior est, quod ferè sylue- *Descriptio* stres omnes habent, ceu cura fertilitatem minuente. Nascitur ex satiuæ nucleo. Sed mansuescere cura, vel sata surculis, vel translatione vix potest adduci, vt credat. Olea incuria fit oleaster, sed si ex oleastro olea fieret, pro ostento haberetur. Vita longior quàm oleæ: sed Olympia longissima. Plinius: Quædam æternitate consenescent, proxima adoptioni virga emissæ, atq; ita alia arbore ex eadem iuuenescente, iterumq; & quoties opus sit, vt ævis eadem oliueta consent. Nos autem ita describimus. Olea distat ab hoc non nisi magnitudine, & habitiore corporatura: est enim ipse rigidiusculus, impexo atque horridiore aspectu, senticosus si in faxis nascatur, qui alioqui cum satiuâ idem *40* esset, perennis viroris, fructus numerosior, par myrto maiori, flosculi ramosi, candidi, odorati, & foliati.

Ercus.

Infusio.

Materies.

Oleum.

Plinius oleastrum in montibus nasci tradit.

Africa quidem peculiare est oleastro inferere, inferitur autem calamo, & inoculatione, eodem authore, & cotinodis vocatur, ut diximus.

Cariem, vetustatemque non sentit.

Oleum ex oleastro tenue est, multoque amarius, quam olea, tum ad medicamenta vile.

De domesticarum olearum generibus. CAP. X.

VRBANARVM Theophrastus plura genera esse inquit. Verus Cato multorum generum meminit, eademque ab eo M. Varro, Virgilius, Columella, Plinius, & Palladius mutantur. Sed Columella olearum, sicut vitium, plura genera esse inquit, sed in suam notitiam decem modo peruenisse, quæ in duo partiuntur, scilicet quæ ad escam, & quæ ad effusionem, ut de vitibus dicemus. Omnis olea maior ferè ad escam, minor verò oleo aptior: & ut à Catone incipiamus: Cato meminit conditiua olea. Sed ab eo M. Varro non conditiua, sed conditaneam dicit. Sed Columella & Plinius huiusmodi non meminere. Ego potius olearum genus existimarem, quæ condiuntur, quam olearum speciem: nam idem M. Varro conditiua mala vocat struthia, cotonea, & reliqua: quæ apta condi, & asservari, quemadmodum postremo quæ apta condi sunt, manifestabimus. Orchitis Cato meminit, & eiusdem ab eo M. Varro, & Virgilius Georg. secundo,

Nec pingues unam in faciem nascuntur oliua,

Orchites, & radii.

Columella ait. Orchis melius ad escam, quam ad liquorem stringitur. Orchites Cato optimè condi dixit, vel virides in muria, vel in lentisco contusas. Et ab eo Plinius eadem refert. Et post pausiam colligi, non naturæ vitio, sed operæ, cui plurimum olei, & quia tenerima amurca cogit decidere. Dicitur orchitis, ut Seruius inquit, ab obscœna & Græca etymologia, id est, à testiculo, qui orchis dicitur. Probus à magnitudine appellatas dicit, quod testibus ferè pares sint, nam grandes sunt, ut à nonnullis archemora vocentur. Has ergo ipse existimarem certo esse, quas Hispania nobis, vel Caieta mittit: sunt enim nucis iuglandis ferè magnitudine, testiculorum similitudine ovata, ad escam condiuntur, toto orbe insignes, ut Columella in sampsa, epityro, & nigra oliuæ conditura docet. Vocat & vetus Cato radium maiorem: eadem verba recenset ab eo M. Varro. Virgilius plures radios esse demonstrat suis versibus,

Orchites, & radii.

Columella enim radium ad escam idoneum magis, quam ut liqueat dicit. Plinius ab autumno post pauseam, & orchitem radium colligi tradit, quia tenerissima amurca cogit decidere. Columella: radius neque specie, neque oleo tam grata est, quam licinia, & pausia. Minorem radium in sampsa radiolum vocat,

ut

ut videbimus. Seruius nos perit. Quæ acute sunt. Cato oleo idoneam tractat, neque cibo est tumore oliuæ olei copiam olei non ab aliis paulia, gmis olei exiguum carne ramen com nucleus parvus, & ci paulia est, quæ recreates trambes oliuæ rotundæ, quæ conditis utimur Georgicorum se

Orch.

Cato positas olei quæ eadem ab eo ca est, cuius olei prime vapores sunt pityro, & in nigra tur paulia operatur occupatam, quia ut vis in nigra fortasse exlitera dendo, dictam a natam dicunt, quæ comestibiles. E las immature, & cularis, comm oleo, & cave. Sed eo Varro: sed conficiendo, hæc desit, & contra. Autum nigra licinia glori ipsi odore. nulla avis ap rupto licinia

ut videbimus. Seruius radium dici ait à longitudine, quod oblonga sint. Apud nos *pizelle* vulgò dicimus, quasi acutiunculas dicas, quod oblongæ, & virinque acutę sint. Columella regiam speciosissimam facit, & potius escæ, quàm oleo idoneam tradit: sed siliciniana, pausię & orchiti comparaueris; neq; specie, neq; cibo est tam grata. Plinius ad hæc: Omnino in vita error est publicus, tumore oliuæ oleum crescere existimantium, præsertim cum magnitudine copiam olei non constare, indicio sunt, quæ regia vocantur, ab aliis maiore, ab aliis phaulia, grandissime, alioquin minimo succo. Et in Ægypto carnosissimis olei exiguum: Decapoli verò Syriæ perquam parua, nec cappari maiores, carne tamen cõmendantur. Theophrastus phaulias dicit, quibus caro multa, nucleus paruus, & parçissimè præstat oleum, & iis acerbum oleum fieri. Polluci phaulia est, quam hic collimidam, & trobellum vocat, & apud eundem Phecrates trambellos in oleastro insitas oleas vocabat. Nobis vulgò dicuntur, *oliue rotonde*, quia rotunda specie sunt, magnæ, & pulcherrimæ, & ad escam conditis vtitur. Poseam oliuæ speciem Cato dicit, ita etiam Varro. Virgilius Georgicorum secundo non poseam, sed pauseam dicit,

Orchites, & radii, & amara pausia bacca.

Cato posias optimè condi dixit, vel virides in muria, vel lentisco contusas, quæ eadem ab eo Plinius recenset. Columella: Ex iis pausia iucundissima bacca est, cuius oleum saporis egregii dum viride est, vetustate corrumpitur, & optime vapores sustinet. Eam in Sampsa nominat pauseam, & posiam, & in capityro, & in nigra olea conditura. Plinius ad hæc: Prima ab autumno colligitur pausia operæ vitio non natura, cui plurimum carnis: hanc etiam ocysimè occupatam, quia est tenerissima, amurca cogit decidere. Purpureæ sunt & in iis, ut vis in nigrum colorem transeuntibus, pausia. Probus posiam appellat, fortasse ex literarum cognatione: Seruius posiam à pauiendo, id est, tundendo, dictam autumat, aliter enim oleum ex se non facit. Alii à sapore nominatam dicunt, quòd fiat pausi, sunt enim eius bacca amarissimi succi, ob id incomedibiles. Ego ipse puto pauseam Apuliæ vulgo vocatam *pasola*, cuius callosus immaturę virescit, maturæ ex purpureo punicat, nitidiore cuticula: orbicularis, communi maior, virescens amarissima, matura iucundissima, optima oleo, escave. Sunt & oleæ, quæ ad effusionem. Cato Liciniam nominat, & ab eo Varro: sed Columella ait, optima oleo licinia, vel liciniana: & ubi de oleo conficiendo loquitur, maximè ad oleum licinianam peti post regiam, & si hæc desit culminiam. Plinius etiam differri ad Martium mensem, quia callosæ, & contra humorem pugnaces, ob idq; minimæ, vel licinia, non ante fauonii flatum nigrescentes. In agro Venafrano, licinianum habetur oleum, vnde & licinæ gloria præcipua oliuæ. Vnguenta hanc palmam dedere, accommodato ipsis odore. Dedit & palatum delicatiore sententia. De cætero baceas licinæ nulla auis appetit. Hodie vulgò *oliue pollinole* dicuntur, quia parua, vel corrupto licinæ vocabulo. Cato etiam culminianam nominat. M. Varro ab eo

culminiam dicit. Columella post liciniam & regiam ultimo loco culminiatam baccā probat. Plinius cominias vocat, & vsq; ad Martium d'fferri ait, quia callosa, & contra humorem pugnaces, ob idq; minimæ. Cato sergianam nominat, & ab eo Varro. Sed Plinius sergiam baccam à Sabinis regiam dici ait. Sed Cato & Varro, qui sergiam nominant, regiæ non meminerunt. Sed Columella & sergiam, & regiam nominat, & plurimum olei afferre dixit, ac optimè frigus sustinere. Meminere etiam Cato, & Varro salentinæ, omiffa à Columella, & Plinio. Ego eam familiarem existimo Salentinorum regioni in hoc nostro regno, ubi ingentia oliueta sunt, & maxime fructifera. Atq; etiam à regione Plinius picenas, & fidicinas in Italia. De picenis Martialis,

Si mihi picena turdus polleret oliua.

Meminerunt idem albiceræ, à Plinio & Columella prætermiffæ: sed eius loco Columella algianam, nauiam, circitem, & myrteam nominat, & nauias conuiuiorum epulis præparari, vt in eius conditura dicemus. Plinius cotinas nominat, & in Maium mensem d'fferri, quia callosæ, & contra humorem pugnaces, non ante 6 idus Februarii nigrescentes. Suntq; & superbæ, & prædulces præteriam dicta genera, per se tamen siccata, vuisq; passis dulciore, admodum raræ in Africa, & circa Emeritum Hispaniæ. Sunt & apud Pollucem olearum genera hæc, drypetes, halmades, neëtrides; cotinadas, trambelos vocauit Pherecrates. Est & proprii generis olea dicta callistephanos, de qua Aristoteles, huius folia contrario modo se habent, quàm in aliis, extra siquidem non intus albert, ramos mittit, vt myrtus, ad coronas peraccommodos.

De celo, & situ oleæ conuenienti. CAP. XI.

THEOPHRASTVS, vt ab eo initium sumamus, neq; frigidis, neq; calidis locis optimè oleam prouenire posse memoria scriptum reliquit, quòd per summa terræ radice cohareat, facile nanq; gelu concrefcit, frigiditas enim eximit humorem, & ad conuenientem cocturam perducere nequit: hinc olearum alia fructu nulla carne, sed oleo refertum profundunt, alia carnosum sine oleo præstant, nam plus caloris ad oleum concoquendum requiritur. Gelidioribus locis oleas succo carere (nō sapore, vt perperā vertit Theodorus) tradidit libro de causis, cum succus ad conficiendam carnē intendatur, & calor deficiat, qui oleo conficiendo necessarius; quam obrem vere nullum fit oleū, quia calor exiguus: æstate non bonū, quia non regnavit satis: at autumno fit, quia calor inualuit, & si in æstate vigor, in autūno diuturnitas: quā obrem oleum æstate fieri solet, neq; frigus oleosum succum coquere potest. Aquæ ram cœlestes, quàm per rigua demiffæ pulpa augment. oleum nil se carni permiscet, sed per se manet. Sunt olearum aegyptiarum species, altera oleo faciundo inepta, altera utilis, & pinguis. Cateri verò agricola variis olearum generibus varias cœli qualitates statuerunt. Cato: in calido agro conditiuā oleam, radium maiorem, salentinam, orchitem, poseam, sergianam, colminiā, albicerem;

bicerem; Si
ris hostis ne
rit. M. Varro
Ait enim hosti
tēpore confici
minus magnu
& quanta habe
aut perferuidu
rrionali colle,
10 gus sergia. Plin
diffimis oleam,
refert. In The
desierunt, quæ
cipatum in ho
no, eiusq; part
terram, & Ba
ro solo. Reliqu
Pr

Herodotus,
10 patu contendit
to præfert, quæ

In Sabinis la

Pa

Na

Sed Florent

& Ciliæ vider

uit Theopha

Huc spectant

30 oleis id accidit

tur, & cum fl

populatur C

res inualerit

rum, & soli

loca, neq; a

tota prouin

fium sexage

dam locis re

40 Plinius,

bicerem: Si ager frigidior, ibi oleam liciniam feri oportet, nam si in calido seu-
 ris hostus nequam erit, & ferundo arbor peribit, & muscus ruber molestus e-
 rit. M. Varro eadem ab eo recenlet, sed ipsius abstrusa vocabula interpretatur:
 Ait enim hostū vocari, quod ex vno facto olei reficitur, factum dici, quod vno
 tēpore conficiunt, quem alii centum sexaginta aiunt esse modiorum, alii ita
 minus magnum, vt ad centū viginti descendat, & exinde, vt vasa olearia, quot,
 & quanta habeant, quibus conficiunt illud. Columella: Nulla ex iis generibus,
 aut perferuidum cœli statum patitur, aut gelidum, itaq; æstuosus locis septen-
 trionali colle, frigidis meridiano gaudet, optimè vapores sustinet pausia, fri-
 10 gus sergia. Plinius, quod ab his habet, refert: Fabianus negat, puenire in frigi-
 diffimis oleam, neq; in calidissimis, & sine dubio in his solum maxime, cœlūq;
 refert. In Thessalia circa Larissam emissio lacu frigidior facta est regio, olea q;
 defierunt, quæ prius fuerāt. In India sterilis, præterquam oleastri fructu. Prin-
 cipatum in hoc quoq; bono obtinuit Italia toto orbe, maximè agro Venafrano,
 eiusq; parte, quæ licinianum fundit oleum: reliquum cerramen inter Istrie
 terram, & Bæticæ par est. Vicina bonitas provinciis, excepto Africa frugife-
 ro solo. Reliqua ex Catone refert. Horatius de venafrana olea,

Pressa venafrana quod bacca vetustat oliua.

Herodotus, In Assyria in feruidis locis ficus, & olea nequaquam de princi-
 20 patu contendit, cæteris vsq; adeo ferax, vt ducenta reddat, & trecenta. M. Var-
 ro præfert, quæ in Agro Cassinate nascuntur. Virgilius idem,

Atq; olea magnum vestire Taburnum.

In Sabinis laudatissima, Bætica Hispaniæ regio oleis fertilis. Silius.

Palladio Betis ornatus cornua ramo.

Nulla palladia magis sese arbore tollit.

Sed Florentinus sic loquitur. Calido, siccoq; cœli statu gaudet, vt in Libya,
 & Cilicia videre est. Sed de situ nunc videndum. Id peculiare in oleis adnota-
 uit Theophrastus, quod trecentis à mari stadiis prouenire non posse videtur.
 Huc spectant locorum differentiæ ad arborum habitudines. Apud Tarentum
 30 oleis id accidit: silēs enim spiritus sensu perspicuus est, quippe pleraq; adurunt-
 tur, & cum flatus ex mari talis occurrerit, inuncta salugine corrodit flores, ac
 populatur. Calgo quoq; sine vilo vento quædam egredi videtur, quæ vbi flo-
 res inuasit, exurit. Cato: ager oleto conferundo in fauonium spectet ven-
 tum, & soli ostentus sit, alius bonus nullus erit. Columella, Sed neq; depressa
 loca, neq; ardua, magisq; modicos cliuos amat, quales in Italia Sabinorum, vel
 tota prouincia Bætica videmus. Hanc arborem pleriq; existimant vltra milia-
 rium sexagesimum à mari, aut non viuere, aut non esse feracem, sed in quibus-
 dam locis rectè valet. Ouidius de Sabinorum agro,

Primus oliuiferis Romam deductus ab agris.

40 Plinius, Negauit Theophrastus nisi intra x l. millia passuū à mari nasci. &

Cato ait: spectare olea in fauonium debent, loco solibus exposito. Palladius: Amat hac arbor arduo locorum situ mediocriter ab humore suspendi, scalpi assidue, lataminis vbertate pinguescere, feracibus ventis clemēter agitari. Sed Florentinus accommodatē de situ loquitur: Auxiliantur ad aeris commoditatem terræ situs acclini, & alti. In iis enim solis ardor ventorum proflatu refrigeratur, quare optimum exhibent oleum, planis verò, & campestribus locis olea minus impetu ventorum agitata, atque insidenti aestu ambusta spissius oleum mittunt, si quidem cum omnes stirpes, tum olea maximē aduerso flatu roborata vigent, argumento, quod oleas lauires, & virentiores offendes locis, qui ventis patent, tristiores iis, qui à flatu silent, nec spiritus nouitate recreantur, modo id intercedat spatii, quo libere peruagetur aurē. Igitur accliuibus, & arduis locis oliuæ latantur, quod proprium nactæ ventum, nil præter spirant, sed in omnes partes æqualiter insinuans ventus arborē excitat & auget.

De solo olea debito. C A P. XII.

NON minus in soli electione, quàm cœli, veteres agricolæ diligentes fuerunt. Theophrastus albicantem argillam oleis fertilem esse dicit, quæ multum vaporis, flatusque contineat, quod olearum natura desiderat. Exoptat præterea solidum, siccumque solum, quia olea alimentum siccus, callosumque quarunt. Ad summum campestre solum oleis maximē conueniēte statuit. Cato diuersis olearum generibus diuersas soli differentias distribuit. Crasso agro oleam conditiuam, radium maiorem, salentinam, orchitem, poseam, sergianam, coliminiam, albicerem, vel quam earum in his locis optimam dicunt esse, eam maximē ferito, mactiori oleam licinianam. M. Varro eadem ab eo refert. Vergilius secundo Georgicorum oleis his versibus solum statuit,

Difficiles primum terræ, collesque maligni;

Tenuis ubi argilla, & dumosis calculus arvis:

Palladia gaudet silua viuacis oliuæ.

Indicio est tractu surgens oleaster eodem

Plurimus, & strati baccis siluestribus agri.

Columella aptissimum genus terræ esse oleis dicit, cui glarea subest, si superposita creta sabulo admista est. Non minus, probabile est solum, ubi pinguis sabulo est, sed & densior terra, si vuida est, & lata, commodē recipit hanc arborem. Creta ex toto repudianda est, magis etiam scaturiginosa, & in qua semper vligo consistit. Inimicus est ager sabulo macer, & nuda glarea. Nam si non emoritur in eiusmodi solo, nunquam tamen conualescit. Potest tamē in agro frumentatio feri, vel ubi arbutus, aut ilex steterat. Gaudet etiā collibus siccis, & argillosis, at humidis campis & pinguibus lætas frondes sine fructu affert. Plinius omnia, quæ Cato habet, transfert. Præterea glareosum solum oleis aptissimum in Venafrano, pinguisimum in Batica. Palladius libro primo. Terra profunda (quod Græci allerunt) olea grandes arbores efficit, fructus minores, 40

V
minores, & aqu
iuuat, & ventus
Florentinus ad
arborem, vberic
dum sibilocum
dum, & rubic
gis salebrosu
quippe quod st
nior paulo terra
10 nibus locis vhe
menissimi coll
ua adiungunt
reola terraga
palmam vngue
quædam ad vic
grum Cassinat

Bac
Et Martia
Ha
20 Turditanun
pareto Metam
Et
Samos etiam
An
De Mitilæa
Ere
De Eurota
30 Di

Cassinas ag
gal ex eo com
les olea disti
mendantur.
spectu, quib

40 Non par
Quod ol

minores, & aquatos, ac seros, magis que amurca proximos. Aer oleas tepidus
 iuuat, & ventus mediocris sine vi, & horrore perflabilis: cetera ex aliis habet.
 Florentinus ad hæc: Porro solum vuidum, & latum commodè recipit hanc
 arborem, vbetioresque dat oliuas, quapropter id præferendum fuerit: secun-
 dum sibi locum vendicat, cui argilla alba subest, tertium argilla dura. Profun-
 dum, & rubricosum repudiatur, quod suo æstu stirpes exurat: sed longè ma-
 gis salebrosus, & scaturiginosum, in quo semper vligo consistit, damnatur,
 quippe quod strigosas, & minimè altiles baccas, vliginososq; parit, creat, ieiunior
 paulò terra, vt Attica restatur, accommodatior. Apuleius, Oleas in aridioribus
 locis vehementer vberes prouenire experimentum docuit. Apud nos amœnissimi
 colles, & tepidiores planicies oliuetis virent: iuxta Cassinatium at-
 ua adiunguntur Venafrana, montium imæ partes oliuis conuestiuntur, gla-
 reosa terra gaudentibus, & meridiano sole, quarum oleo ob purum succum
 palmam vnguenta dedere. M. Varro connumeratis aliquot Italiae locis, vbi
 quædam ad victum humanum ceteris præstantiora nascuntur, ad oleum a-
 grum Cassinatæ prætulit. De Venafro Horatius.

— Viridique certat.

Bacca Venafro.

Et Martialis;

20 Hæc tibi Campani sudauit bacca Venafræ.

Turditanum oleum bonitate præcipuum aliqui dixerunt. Ouidius de Pe-
 pareto Metamorphoseos septimo;

Et Gyaros, nitidaq; ferax Peparetos oliua.

Samos etiam oliuetis fecunda: Sycion vrbs Achaïæ. Ouidius in Ibin.

Aut vt oliuifera quondam Sycione profecto.

De Mitisca Virgilius Italiae vrbe, Æneidos septimo,

Eretimæ manus omnis, oliuiferaq; Mitiscæ.

De Eurota Statius libro quarto, & duodecimo de Lycabeso.

— Et oliuiferi Eurota.

30 Dura manus.

— Et pingui melior Lycabesos oliua.

Cassinas ager apud nos olei, quàm frumenti feracior, magnumque vecti-
 gal ex eo comparant agricolæ, & non procul ab eo montana Calatia, cuius col-
 les olæta distincta oleastris habet, quarum bacca reliquarum dulcedine com-
 mendantur. Surrentini colles letis etiam oliuetis conuestiuntur, in maris pro-
 spectu, quibus viuum saxum, lætumq; subest solum.

Quibus modis nascatur olea. & primum de semine.

CAP. XIII.

40 NON parui momenti est hæc inter eas, quas primo explanauimus dotes,
 quod olea modis omnibus enascatur sola, quibus omnia terræ nascentia

ferè generantur, nam ita facilius oliueta comparabimus, olearumque copiam nanciscemur, dempto modo vno, quem recenset Theophrastus libro de causis, scilicet, quod à summis furculis prodire nequeat, cuius causam affert, quod furculi, qui in summo nouelli nuper extant, inepti sint ad radicum conceptionem, ob eorum siccitatem, & tenuitatem, in ea enim tenuitate haud multo succo abundare possunt, qui germinationi fauet. Et si in historiis scribat, nonnunquam adminiculo ad hederam defixam vitam egisse communem, & arborem factam, id verò raro accidit, sed id scribendum, quod maiori ex parte à natura factitatum videmus. Nec nobis raro in vincis, summis oleæ furculis, virgisque pro palo depactis, & radicales, & ad iustam magnitudinem deuenisse, vidisse contigit. Sed olea nascitur semine, ramo, taleis, trunco, ligno, radice, aliisque modis, quos recensebimus. Sed sationis per semen modus ab omnibus improbatur, tum quia seculorum turba indigemus, dum fructum afferat, tum quod fructus deteriores sit. Theophrastus è nucleo oleæ syluestrem nasci ait, & ex olea oleastrum fieri posse, sed ex oleastro oleam raro euenire. M. Varro ait, Olea semen, cum sit nucleus, quod ex eo tardius enascatur caulibus, quam ex taleis, ideo potius in seminariis taleas, quam nucleos ferimus. Antonius Venutus non in prima satione nucleum deteriorescere scribit, sed sexta, vel septima, quod magis veritati consonum reor, sic à syluestri habitu in urbanum, non nisi æuis euenire. Si quis tamen semine ferere velit, eligat oliuam magis oleosam, & optimè maturam, quam pulpa munda, ac liquiore stercore ammittam scrobiculis palum profundis obuat, & singulis hebdomadibus irriget, tertio deinde anno transferat, immo quo pluries transfertur, meliorescit, ubi optimè comprehendenti, inserat sub terra effosso scrobe, paulatim ubi crescit, terram aggerando.

Olea plantatio per ingentes ramos. CAP. XIII.

EX multiplici olea ferendæ ratione, non in ultimis ponenda est ea, quæ per ingentes fit ramos. Theophrastus in historiis, & libro de causis scribit oleam ramis exurgere posse, cum oleæ rami prægrandes humore non vacent, scilicet pinguedinis, spissitatisque causa, unde exiccari difficiles sunt. Intelligit Theophrastus pergrandiores, siue grossiores ramos oleæ brachia, quæ non in summo, sed quæ iuxta truncum sunt: sunt enim humor, pinguedo, & spissitas præsentis vitæ sedes, & futuræ auspicia. Leontius Græcus huiusmodi sationis modum edocet. Nonnulli crassiores ramos ex arboribus adimunt, & ex iis partes præcidunt, quæ binum cubitorum proceritatem impleant, dein in rectum constitutas adobruunt. Alii insignes ramos quinum, aut quaternum cubitorum longitudine à caudicibus terra præcisos solo committunt, sed rubrica partes notant, quibus obuersa steterant, ut quemadmodum in scrobe cohaerebant, ita parte ima terram, & cacumine celum spectantes deponantur, ut celeriori proficiant incremento, celeritoremque fructum largiantur.

V
giantur. Hoc enim rami prægrandes vix citè in ima parte ramorum ac vestibus calcantur, ma pars non dolescit, ac lapide, ra fimo, lapide, trudatur, & exaroluerunt.

Quod etiam

Nunc etiam facilem hauriri ramis, & taleis, per longum discidium rami Theophrastus minationem suis corporis vel naturalis humore sufficere nequitiam arundinem, gna enim olea ad excitandum minorum diuina admiratione Theophrastus morem nasci citabit, ita ut iaminasse. Obiis mandauit Georgicis,

Sed reor quod longum discidium sic ut si lignum videatur. Didicimus radicibus postea quod co-

giantur. Hoc modo satum Moroni iuxta Capuam oliuetum vidimus. Erant enim rami prægrandes, vt vtriusque manus indicibus, & pollicibus in orbem diductis vix cingeretur: erant scrobes trium pedum altitudinis, & latitudinis, in ima parte rami acuti, stercore vitulino obducti, intus infixi, terra cooperti, ac vestibus calcati, senis vel septenis pedibus supra terram extantibus, suprema pars nodosior, ex qua sperabantur germina. Sunt qui infimam partem scindant, ac lapidem indant, & sic citius radices elicere dicunt. Superior casura fimo, lapide, vel aliquo munimine cooperitur, ne gelu, vel calor intus intrudatur, & exarescat ramus, sic tertio, vel quarto à satione anno fructus attulerunt.

Quòd etiam ligno, vel stipite per longum discisso olea exurgere possit.

C A P. X V.

N Vnc etiam nascendi modum ferè prodigiosum oleæ proferemus, ad facilem huius plantæ propagationem demonstrandam, vt non solum ramis, & taleis, & trunco sine radicibus, sed ligno id est trunco in plures partes per longū discisso (quod nulli, nisi soli oleæ contingit) exurgere possit. In historiis Theophrastus ligno oleam nasci posse scripsit, etsi inepta videatur ad germinationem substantia. In libro verò de causis rationem affert: Nam densitate sui corporis vitale illud, genitaleque semen, præcipuè non sine adminiculo naturalis humoris seruare diutius potest, at si densitas siccitati comes sit, sufficere nequit, & si vel vnistipites sint: Sectam nanque non solum depactam arundinem, sed etiam sectæ partem prodire videmus, sicut & oleam. Ligna enim oleæ è truncis abscissa seruare suum vitale principium possunt, vt ad excitandum germen mouere se valeant. Modus autem est. Ligna oleæ palmo minora diuidi haudquaquam oportet, neque corticem detrahi. Nec minori admiratione dignum videtur, quod vna omnium germinat in opere, vt Theophrastus dicat: oleaginea materies tum rudis, tum sapè elaborata, si humorem nacta fuerit, locumque adipiscatur humectum, germen potissimum citabit, ita vt iam cardo valuæ, & poculum limo immersum prodantur reget. Ob id Virgilius, qui omnia, quæ de plantarum generatione carminibus mandauit, ex Theophrasto excepit, id non prætermisit, inquiens in Georgicis,

Quin & candicibus sectis (mirabile dictu)

Truditur è sicco radix oleagina ligno.

Sed reor quòd per siccum lignum caudices intelligat in plures partes per longū discissos, vt ligna scindere solemus, quæ igni destinamus, non quòd verè siccu sit lignum, sed post longam moram humore ferè omni orbatum, siccu videatur. Didymus sationis modum demonstrat. Non desunt, qui secta ab imis radicibus ligna, quæ apud Syros gorphia appellantur, plantariis deponant, postea quū comprehensisse sic videbuntur, vt mutationi sit locus, transferunt.

Multi non in plantariis, sed propria terra deponentes ipsa, non aberrarunt. Leontius etiam adhuc. Non defunt, qui recisa ab imo caudice segmenta sesquipedalia; ita ut ne corticem quidem aut ullam aliam partem, quam serra præciderit, lædant, in defossam scrobem lapide subiecto deponunt, & aggere sic obruunt ad palmi altitudinem. Memini me vidisse oliuetum deputantes, ramos, truncos, & imos caudices igni destinatos securi scindentes in congeriem accommodasse, ut cum occasio daretur, aliò transmitterent, ac per annum ibi stetisse, captumque postea ex iis lignum vnum, & arenis in litore malleo validis ictibus infixum, cuius ope ergata nauigia ad sicum traherentur, post annum pullulasse, & ramos emisisse, ut quod de oleæ viuacitate nostri maiores scripserint, procul dubio sit credendum.

Quod etiam trunco exurgat olea, & propagine. CAP. XVI.

TRUNCUS etiam nasci posse oleam Theophrastus libro de historiis tradidit. Leontius Græcus & credidit, & docuit, inquiens. Quidam recisos & caudicibus maiores truncos, & relicto superius cortice, cacumine tenuis adobruunt, sic tamen, ut quatuor alte digitis superemineat. Caro quomodo olea propagetur docet, ut cetera plantæ, Ab arbore abs terra pulli qui nascuntur, eos in terram deprimito extollitoque primorem partem, ut radicem copiat, inde biennio post effodito, setitoque.

Vsitus per sobolem oleæ ferendi modus. CAP. XVII.

QUOD sobole nascatur olea, reticuit Theophrastus, utpote triuialis, frequens & vsitatissimus modus, eos describens, qui mirabiliores, ac incredibiles viderentur: non tacuit tamen oleam prolificam esse, & radice summa terra hærentem, unde iuxta caudicem plurima proles exurgat. Virgilius peculiarem credidit oleæ sationem per sobolem, vocans stipites illos ramis spoliatos truncos,

Sed truncis olea melius propagine vites.

Plantas enim, quibus cacumina, & germina præcisa sunt, truncos vocare solemus, sic etiam Priami corpus capite mutilatum, truncum vocauit. Ab eo etiam Columella truncos vocat, ubi libro de arboribus inquit: Melius autem truncis, quam plantis oliuetum constituitur. Sed quinto libro ubi de plantarum translatione & seminario in oliuetum loquitur, ait, Optimum est omni fronde priuare truncum, atque leuatis plagis, fimoque, & cinere oblitis in scrobem, vel sulcum deponere. Truncus autem aptior translationi est, qui brachii crassitudinem habet. Poterit enim longè maioris incrementi, & robustioris transferri, quem ita conuenit poni, ut si non periculum à pecore habeat, exiguis admodum supra scrobem emineat, latius enim frondet. Si incurfus pecoris vitari non poterit, celsior truncus constituetur. Quod Leontius Græcus non omisit. Alii sobolem cum radice ferunt. Alii residem adhuc caudici plantulam

de cisis

decisis falce capere
Arui orum de
enim mense, re
cisis capitibus,
ninus, & palmi in
te, ordeigrana
rit aut arentis,
lis, vel tenacibus
ficiant incrementum
10 contra eas simili
oliueta constituit
trimi vel quad
que radicibus
sint, & plurib
pedibus supra
& si Heliodus
ram tarda res
anno decerpunt
cum hic expedit
10 nuntur, quinto
proferunt, cum
rentur apud m
& si nulla cura
erescunt, & sec
ellearboribus
rentia, nisi abra
dum erescunt,
ab arbore long
cibus impetra

30 Quo
RADICE
Rationis
uestrium o
utrunque
cit. Scio ple
plerunque
minario, si
adiuuare. Q
scatur. Sed
40 superius dixi

decisis falce capitibus & brachiis, in truncum redigūt, & terra fossa circa Ar-
 cturi ortum defigunt. Palladius è sobole oliuetum constitui docet: Februario
 enim mense, temperatis locis, qua in pastino ponuntur, radicata planta de-
 cisfis capitibus, & brachiis, & in truncum redacta, vsq; ad mensuram cubiti v-
 nius, & palmi in fermento terra fossa defigūtur, locum palo antea deprimen-
 te, ordeigrana subteriaciantur, & amputetur iis quicquid putridi inueniū fue-
 rit aut arentis, & tunc amputata capita luto velentur, & musco vlmeis vincu-
 lis, vel tenacibus quibuscunq; constricta. Sed maximū beneficium est, vt pro-
 ficiant incremento, si rubrica partes notentur, quibus obuetera steterunt, &
 10 contra eas simili ratione ponantur. Hic est vltatissimus, & principalis apud nos
 oliueta constituendi modus, quippe antiquis arboribus adnatos stolones, qui
 trimi vel quadrimi sint, paucis negotio securi dissecamus, et si paucis, minimis-
 que radicibus muniuntur: sed eò meliores fuerint, quò longius à trunco orti
 sint, & pluribus radicibus fulti fuerint: hos scrobibus mandamus, vt septenis
 pedibus supra terram emineant, sic tertio, vel quarto anno fructum præbent,
 & si Hesiodus negauerit oleæ satorem fructum ex ea percepisse quenquam.
 tam tarda res tunc erat, nunc autem in plantariis serunt, translatarum altero
 anno decerpuntur bacca. Sunt qui modum sationis per taleas huic præferant,
 cum hic expeditior, & paratior sit: nam si deputantur rami, & plantariis depo-
 20 nuntur, quinto anno transferuntur, & primo inde, vel secundo anno fructus
 proferunt, cum stolones, vt transplantationi apti sint, per decennium immo-
 rentur apud matricem, & quinto anno fructus proferant, sed id falsum est. nam
 & si nulla cura, industriæ uero rami apud truncum, ita & stolones apud parietem
 crescunt, & secundo anno fructus proferunt apud nos. Præterea multum ob-
 esse arboribus dicunt, quibus detruncantur, cum vulgaris sit apud colonos sen-
 tentia, nisi abradantur interficere parentem. Si verò dicent, hoc tēporis spatium,
 dum crescunt, fructum arbori adimere: respondemus eos eliciendos esse, qui
 ab arbore longiusculè absunt, semper supra terram adaggerando, vt suis radi-
 cibus impetratis parenti non officiant.

30 *Quomodo ex radicibus oculis exurgat olea.* CAP. XVIII.

RADICE etiam nasci Theophrastus tradidit oleam. Sed Columella sa-
 tionis modum docet: Quidam melius existimant ex radicibus oculis syl-
 uestrum olearum hortulos excolere, & chorda simili ratione disponere, sed
 utrunque debet post vernum æquinoctium feri. Palladius ab eo excipiens di-
 cit. Scio plerosque, quod facilius, & utilius est, radices olearum, quæ in syluis
 plerunque sunt, aut in locis desertis, in cubitalem mensuram recisas, aut in se-
 minario, si placuerit, aut in oliueto solere disponere, & admistione stercoreis
 adiuuare. Quare proueniet, vt ex vnius arboris radicibus numerosa planta na-
 40 scatur. Sed Plinius Columellæ placita confutat, & recitat verba Catonis, cum
 superius dixisset, vbi de olearum plantatione agit, gemma, vel oculo seruato,

ait ipse, oculos serito. Sed sapius ego animi causa expertus sum, cum superuacuas radices à plantâ dis truncis relecarem, eas in plures partes dissecui, & scrobibus disposui, ubi a state ingruente ex eis virgarum sylua pullularit. Sed ego non possum satis admirari doctissimum Columellam, expertissimumque agricolam præcepisse, dissecandas radices ex oleastris desumendas esse, cum planta, quæ ex iis nascuntur, & tardè crescant, & sylvestres proferant fructus. Sed si aliquis responderet fieri posse per insitionem, ut in urbanum habitum mutentur, magis veniret irridendus, cum multis annis id accideret, & contra Virgilium peccaret, qui sylvestres oleas inferi vetat, nam cum sapè accidat comburi oliuetum, germina, quæ imò repullulant trunco, sylvestres iterum producunt oleas, ubi si urbana radibus plantata essent, idem restituerent oliuerum. Sed sunt, qui non integras radices, sed oculos quosdam, seu tumores dicas, ubi eleuata pars rûpere nititur ad termites procreandos, plantent, quos è veterum olearum radibus euellunt, hos aliqui oua, ab ouorum similitudine vocant, hæc dixerim Columellam, & Palladium per radices intellexisse, nam si eiusmodi oculos ex imò stipite, vel radibus securi euellis, & scrobibus committis, non plus quatuor digitis altis, subtili supra iniecta terra, miraberis ex eis germina lata, & felices plantulas provenire. Nec oculos illos eligas, qui turiones foras emittunt, nam trunco sublato, humoris egeni, vi caloris facile marcescunt, sed qui iam germina parituri sunt. Nec peritimescendum id arboribus obesse, ex quibus huiusmodi oua diuelluntur, si bina solum ex singulis arboribus demas, nam quodammodo arbores sollicitantur, & iuuenescunt. Possimus etiam sine veterum arborum noxa hisce oculis nostra oliueta multiplici sobole replere, inspiciendo veteres arbores, quæ duplici, vel triplici stipite humo surgunt, duos abscindere, solum vnum relinquere, nam sequenti anno, qui reliquus est, obtruncati damna repender, nam & vberius fructus afferet, & latius germina producer, vacuumq; locum replebit, & ex obtruncati radibus, caudice & lauioribus brachiis, ubi nitidiores partes conspiciuntur taleas & oua secare. Hunc oleas ferendi modum sunt qui præferant taleis, primo quia & breuiori tempore radicanter, quàm taleæ, præterea quia è seminario in plantarium transferuntur, faciliiori negotio effodiuntur, & faciliior erit cum sua terra in suos scrobes translationis ratio: nam taleæ, cum profundius hæreant, in earum effossione radiculæ non sine læsione transferuntur.

De modo ferendi per taleas, & de seminario olearum faciend.

CAP. XIX.

VERAM, & præcipuam olearum sationem Theophrastus per taleam statuit. Ait enim, Ex ramo præciso taleas deorsum versus sectura inuersa ferere oportet, nec palmo minora præcidere, corticemque minimè detrudere. Seruntur autem ex his rami, quibus germinantibus terra semper assidue

duè accumula
doquit, semina
saturus eris,
dolabis, aut sec
serito. Locus b
res, pede tantu
to, caueto que
taleam dimittit
ma sunt, tū de
10 seres, remas tal
transuersis em
quā seueris, ser
erunt fodere
ba in eius text
oculos serito.
seminario qu
tura cacumina
herbeque elia
tur, & celerius
20 bus arbores vi
cissum, quas al
lumella et si ve
Libeto cælo p
soluto solo, po
pedes pastina
tati finito. T
circumuenire
corticem lade
ramum secato
30 leas secetur.
ce leuentur, &
ina ima parte
mergarur, &
learum cap
mergere op
dicibus ex
gnorantiam
dantur. Id
narium pri
40 minum con
singulis sem

Jue accumulanda, quoad satis roborentur. Cato inter Latinos ita primus
 docuit, seminariumque hoc modo instituit. Taleas oleaginas, quas in scrobe
 saturus eris, tripedaneas excidito, diligenterq; tractato, ne liber laboret, cum
 dolabis, aut secabis: quas in seminario saturus eris, pedales facito, easque sic in-
 serito. Locus bipalio subactus fiet, beneque glutus fiet. Cum taleam demit-
 tes, pede tantum opprimito, si parum descendit, malleolo, aut mateola adigi-
 to, cauetoque ne librum scindas, cum adiges. Palo locum prius si feceris, quo
 taleam dimittas, & si ita seueris, utilis fiet talea, meliusq; uiuet. Talea ubi tri-
 ma sunt, tū deniq; tibi curæ sint, ubi liber sese vertet. Si in forobibus, aut sulcis
 10 seres, ternas taleas ponito, easq; diuaticato supra terrā, ne plus quatuor digitis
 transuerfis emineant, gemma, vel oculo seruato. Sed si uoles olea cito crescat,
 quā seueris, semel in mense sarrito, & circum capita oleagina usq; donec trimæ
 erunt fodere oportet. Plinius eisdem verbis eadem recitat, sed aliqua sunt ver-
 ba in eius textu corrigenda. Nam Cato ait: gemma, vel oculo seruato. ipse ait,
 oculos serito. Quod ibi tale præcipiendum non erat. M. Varro ad hæc. In
 seminario quæ surculis confita sunt, ut olea, & quorum erunt molliora na-
 tura cacumina, ea summa integenda binis tabellis, dextra ac sinistra deligatis,
 herbæque elidendæ, & dum teneræ sunt vellendæ, nam aridæ factæ rixan-
 tur, & celerius rumpuntur, quā sequuntur. Demum in oleagineis semini-
 20 bus arbores videndum, ut sit de tenero ramo ex utraq; parte æquabiliter præ-
 cisum, quas alii elauolas, alii taleas appellant, ac faciunt circiter pedales. Co-
 lumella etsi uerbo sius, præcisus tamen docet: Primo seminarium instituito.
 Libero cælo præparetur, terreno modicè valido, sed succoso, neq; denso, neq;
 soluto solo, potius tamè resolutio, id genus terræ ferè nigre est, quā cum in tres
 pedes pastinaueris, & alta fossa circū dederis, ne aditus pecori detur, fermenta-
 tari finito. Tum ramos nouellos nitidos, quos comprehensos manus possit
 circumuenire, ex feracissimis arboribus adimito, & ex his taleas recidito, ne
 corticem ladas, id cauebis si prius varam feceris, & partem eam, supra quam
 ramum secaturus es, stramentis texeris, ut sine noxa corticis superposita ta-
 30 lea secetur. Talea deinde sesquipedales præcidantur, & utraque parte fal-
 ce leuentur, & rubrica notentur, ut quemadmodum in arbore steterat ramus,
 ita in parte terram, & cacumine cælum spectans deponatur: nam si in uersa
 mergatur, & difficulter comprehendet, & si conualuerit sterilis erit. Sed ta-
 learum capita & imas partes misto fimo cum cinere oblinire, & ita totas im-
 mergere oportet, ut putris terra quatuor digitis altè superueniat. Sed binis in-
 dicibus ex utraque parte humantur: hoc facere utile est propter fossorum ig-
 norantiam, ut cum seminarium bidentibus colere institueris, talea non læ-
 dantur. Id debet post uernum æquinoctium fieri, & frequentissimè semi-
 40 narium primo anno sarriri, postero, & sequentibus, cum iam radiculæ se-
 minum conualuerint, rastro excoli, biennio à putatione abstineri, tertio anno
 singulis seminibus binos ramulos relinqui, quarto ex duobus ramis infirmior

amputandus, sic ex culta quinquēnio arbuscula habiles sunt translationi. Pal-
 ladius eadem quæ Columella habet. Didymus autem suadet, ut oliuetis plan-
 tula serantur citra moram, quæ in seminariis contingit: quia verò è seminariis
 translate tutiorem habent generationem, etiam seminarii modum tradit. So-
 lum in quo stirpes pangentur, qualitatem non modo, & figuram seminarii, sed
 & cœli quoque conditionem referre debet, ne quod in eo pangitur, noua lo-
 ci peregrinatione tentetur, maxime quæ profecerint, si rubrica partes noten-
 tur, quibus obuersa steterunt, ut similitudine ponantur. Porro legi debent,
 qui seminario destinabuntur, non stolones caudicibus adnati, sed summatim
 decerpti rami, longitudine cubitali. Danda est opera ne cortex sectione viola-
 tus collidatur, sed falcula, quæ acie polleat, vulnus vndique laxigetur, seruata
 stirpis integritate. Stylus parte ima bubulo fimo cum cinere liniendus. Scrobes
 concamerato sinu, ut imbrium sint capaces, excanandi, ramulus non in verti-
 cem, hoc est inuersus, humandus, qui tamen palmo à terra extet, arundo affi-
 genda, ut à cultoribus cognoscatur, singulis mensibus vsque ad septimū men-
 sem moueatur. Extirpari debet arbuscula trimatu altilis, & vegeta, quadrima
 iā collucari debet, & superuacui termites putari, & sic transferantur in terram,
 quam plantare instituisti, sublata cum plantis terra propria, & hic præstantior
 est oleæ plantandi modus. Nos eodem die, quo plantare taleas destinamus, ab
 arbore recidimus, & in taleolas diuidimus, ne nimia supra terram mora rescic-
 centur. Et si aliqua præpeditus occasione fator, quo reciderit die plantare ne-
 quiuerit, melius inhumare, quàm sub dio rescicari sinere compertum est. Id
 tamen admonendum, cum plantantur, si humiditatem terræ aliquam con-
 traxerint, rescicantur; quod videtur Plinius adnotasse. Non inhumare taleas,
 aut siccare prius quàm serantur, vtilius compertum.

De olearum plantatione. CAP. XX.

CVM è seminario in locum, in quem oliuetum instituere cōstituisti, trans-
 ferres plantulas, hæc obseruabis maiorum nostrorum præcepta. Et pri-
 mò Theophrastus ait: Olea in consitione amputari desiderat, ut arbores
 omnes, quæ ampliorem magnitudinem capiunt, plagas alleuatas contegunt,
 ne intrudatur sol, aut imber, nam si id acciderit, contrahendi morbi pericu-
 lum imminet. Circumlinunt alii lutum, alii subdita scilla lutum superimpo-
 nunt, restam quæ superadiciunt, scilla plantam viridem seruat, lutum scillam,
 resta lutum. Catop plantare ita docet: Oleas cum seres benè cum radicibus exi-
 mito, cum terra sua quam plurima, circumligatoque; uti ferre possis, in alueo fer-
 ri iubeto. Caueto cum ventus, aut imber fiet, effodias, aut feras, nam id maxi-
 mè præcauendum est. In scrobe cum pones, summam terram subito, postea o-
 perito terram radicibus fimi, deinde calcato pedibus benè, deinde fictucis, ve-
 titibus quæ quam optime poteris, id autem erit rei primum. Post hæc arbores
 crassiores digitis quinq; quæ erunt, eas præcisas serito, oblititoque; fimo summas,
 & foliis.

& foliis alligato. Columella de eius confitione hæc habet. Scrobes quaternum pedum præparantur anno ante, vel si tempus non largitur, prius quam deponantur arbores, stramentis incendantur scrobes, ut eos ignis putres faciat, quos sol & pruina facere debuerat. Antequam explantes arbusculam, rubrica notato partem eius, quæ meridiem spectat, ut eodem modo, quo in seminario erat, deponatur. Deinde ut arbusculæ spatiū pedale in circuitu relinquatur, atq; ita cum suo cespite planta eruat, qui cespes ne resoluatur in eximendo, modicos furculos virgarum inter se connexos facere oportet, eosq; pilæ, quæ eximitur, applicare, & viminibus ita innectere, ut constricta terra, velut inclusa teneatur, tum subruta parte ima, leuiter pilam commouere, & suppositis virgis alligare, atque plantam transferre. Antequam deponatur oportebit solum scrobis inum fodere bidentibus, & terram aratro subactam immittere, & ordeï semina substernere, & si constet in scrobibus aqua, ea omnis haurienda est, antequam demittantur arbores. Deinde ingerendi minuti lapides, vel glarea mista pingui solo, depositisq; seminibus latera scrobis circumcidenda, & aliquid stercoreis interponendum. Quod si cum ea terra plantata non conuenit, tunc optimum est omni fronde priuare truncum, atq; leuatis plagis, fimoq; & cinere oblitis, in scrobem, vel sulcum deponere. In libro verò de arboribus inquit: Omnes arbusculas, prius quam transferantur, rubrica notare conuenit, ut cum serentur easdem cœli partes aspiciant, quas in seminario conspexerant, alioquin frigore, vel calore laborabunt ab iis partibus, quas præter consuetudinem sub alio tractu expositas habuerint. Arbusculam in scrobe deponere ita rectam oportet, ut quod à scrobe exiit, in medium sit, arbusculam autem à tempestatibus tueri diligenter oportet adminiculando, & terræ quæ in scrobe reponitur stercorea immiscendo. Plinio adiucendum videtur, ut scrobes fiant ex arborum natura, ut altius demittantur ea, quæ summa tellure gaudent, ut olea. Didymus: Locus, quem oleis dicaueris, runcandus est, omniq; alterius generis frutice extirpandus, maceris, & viuis sepibus cingendus, ne aditus pecori derur. Scrobes ante sationem fodiendi, ut sole, ventis, & imbribus terra reddatur fragilior, stirpesq; iaciant vltro, citroq; radices. Vno, aut altero mense minimum aridis fruticibus, cremis, & iis, quæ ignem facile concipiunt stramentis, scrobes adurantur, qui tricubitali altitudine, aut minimum sesquicubitali cauentur. Id etiam omittendum non duxi, quod tantopere monent veteres agricolæ, & primò M. Varro, quod multum refert ad fundi fructus, quemadmodum vicinus in confinio constitutus agrum habeat: si enim ad limitem quercetum habet, non possis rectè secundum eam syluam ferere oleam, quod vsque eo est contrarium natura, ut arbores non solum minus ferant; sed etiam fugiant, ut introsum in fundum se reclinent. Columella autem ait, quod olea feri potest, ubi arbutus, aut illex steterat: nam quercus excisa radices noxias oliueto relinquit, quarum virus enecat oleam. Plinius: Olea, ubi quercus est ossa sit, male ponitur, quoniam ver-

mes, qui raucæ vocantur, in radice quercus nascuntur, & transeunt. Et alibi Quercus, & olea tam pertinaci odio dissident, ut altera in alterius scrobe depa-
ctæ moriantur. Palladius verò in Februario. Potest olea feri, ubi arbutus, aut i-
lex steterat, nam cerrus, & esculus excisas radices noxias relinquit, quarum vi-
rus oleam necat. Sed in Arcadia spectari solitam arborem Pausanias affirmat,
è cuius radice vna ilex, & olea nascerentur in quodam fano. Serendarum au-
tem arborum intervallum indicandum. Cato in viginti quinq;, aut triginta,
pedes ferit. A quo Plinius: Oleam maximo intervallo, de qua Catonis Italica
sententia est, in viginti pedibus minimum, plurimum triginta. Sed hoc varia-
tur locorum natura. Non alia maior in Bética arbor. In Africa verò (fides pe-
nes authores erit) miliarias vocari multas narrant à pondere olei, quod fer-
rant annuo proventu: Ideo 75. pedes Mago intervallo dedit vndiq; etiam in
macro solo, ac duro, & ventoso, cum minimum 45 Batica quidem vberri-
mas messes inter oleas metit. Columella verò: Spatium inter ordines mini-
mum esse debet pingui, & frumentario solo sexagenum pedum in alteram
partem, atq; in alteram quadragenum, macro, nec idoneo segetibus quidem,
& vicenum pedum. Libro verò de arboribus addit: Oleam decet inter sexage-
nos pedes disponi, ut spatium in latitudinem crescendi habeat, nam quæ in
proceritatem extenduntur, euanida fiunt, parumque fructus ferunt. Didy-
mus: Sed liberale quinquagenum cubitorum intervacet spatium, ut & cau-
dices per flatu venti fruuntur, & intercedens locus feri possit, alioqui si sementis
subtus neglectui habeatur, tanto ramorum stipatu luxuriabunt, ut in sese
mutua umbrarum beneficia non conferant.

Nunc de tempore statuendum. Tempus autem plantationis Theophras-
tus vernum statuit, & præcipue oleas: nam quæ autumnò feruntur, post sa-
tionem hyems secuta corticem detrahit. Cato sic tempus præfinit. Si quis
quærat, quod tempus oleæ ferenda sit, Agro sicco per sementim, agro lato
per ver. M. Varro: inter vernum æquinoctium, & Vergiliarum exortum ole-
am feri oportet. Dicit Columella, Plantæ oliueto disponuntur optimè siccis,
minimeque vliginosis agris per autumnum, latis & humidis verno tempore
paulo antea, quam germinant. Libro de arboribus: Magoni autem placet, sic-
cis locis oliuam, aut mox post æquinoctium feri, aut ante brumam. Nostræ
ætatis agricolæ ferè vernum tempus circa calendas Maias seruant. Plinius:
Mago in colle, & siccis, & argilla inter autumnum, & brumam feri iussit, in
crasso, aut humido, aut subriguo à messe ad brumam, quod præcepisse eum
Africa intelligitur. Italia quidem nunc vere maximè ferit, sed si & autumnò
libeat, post æquinoctium 40 diebus ad Vergiliarum occasum 14 soli dies sunt,
quibus feri noceat. Sub Etesiarum flatum conferunt oleam in Laconia. Flo-
rentinus autem Græcus inquit, Seritur ab succularum occasu ad brumam, i-
tem vere, quando hæc duo tempora sese imitentur, calidam, humidamq; for-
tita naturam. Autumnus calorem adhuc retinet pristino solis illustratu, con-
ceptum

ceptum humor
tem præcedent
fianus Theophr
etiam oleas in ta

I Am olearum
demus, quib
nius dicat, care
primò de aratio
dam semper sen
ne arare. Quid
sapissimè, & al
radices sursum
quo eadem Pl
turum oliueto
neq; enim olea
est, arbor colicu
sum oliueto c
no arari debet.
ra altibus biat,
Palladius Gau
latur, & quoci
bus sollicitent
altiores cum ale
Prodest etia
re, quo pulvis e
rum reddit, qu
ctum ferunt, p
Abliqueati
30 curandum est
dum mergatu
putandæ, &
ficiarias radice
coactam pro
merè effund
ladanturq; a
calore tueri v
ad tiro confo
mella. Post æ
40 petiore parte,

ceptum humorem à caducis eo etiam tempore imbribus contrahit. Ver autem præcedentibus pluuiis humorem, ab accessu solis calorem concipit. Cassianus Theophrasti auctoritate, Aprili mense oleam plantari posse scribit, sic etiam oleas in taleas sectas humidis, & riguis locis.

De olearum cultu. CAP. XXI.

IAM olearum sationum rationem descripsimus, nunc autem præcepta trademus, quibus iam consitum, constitutumq; oliuetum colamus, etsi Plinius dicat, cæteri que, nec desiderare rastum, aut falcem, vllamve curam. Et primò de aratione loquemur, & maximi viri Catonis inter Latinos præferendam semper sententiam audiamus. Quid est agrum bene colere? Primum bene arare. Quid secundum? Arare. Quid tertium? Stercorare. Qui oliuetum sæpissimè, & altissimè miscbit, is tenuissimas radices exarabit, si male arabit, radices sursum abibunt, crassiores fient, & in radices vires oleæ abibunt. A quo eadem Plinius pferit. Columella: Optimum est constitutum iam, & maturum oliuetum in duas partes diuidere, quæ alternis annis fructu induantur, neq; enim olea continuo bienniò vberat. Cùm subiectus ager consitus non est, arbor coliculum agit, cùm seminibus repletur, fructum affert, ita sic diuisum oliuetum omnibus annis æqualem redditum adfert, sed id minimè bis anno arari debet, & bi dentibus alte circumfodi: nam post solstitium cùm terra æstibus hiât, curandum est, ne per rimas sol ad radices arborum penetret, Palladius. Gaudet hæc arbor assidue scalpi. Omnis subinde circa eas herba velatur, & quoties inber se infuderit, breuissimis & frequentissimis fossionibus sollicitentur, & subinde ducta à trunco terra, atque permista in aliquanto altiores cumulos congeratur: idq; mense Februario.

Prodest etiam pulueratio. Cassianus iubet Augusto mense glebas dissolvere, quo puluis excitetur: hic enim ubi in fructum inciderit, citius cum maturum reddit, quapropter oleæ iuxta viam sitæ vberiore, & plenior fructum ferunt, propter excitatum à prætereuntibus puluerem.

Ablaqueatio necessaria est. Theophrastus: Postquam pactæ sunt oleæ, curandum est de ablaqueatione, ut altè descendat radix, & in profundum mergatur, ob id radices luxuria, & auiditate supra excurrentes amputandæ, & præcipuè dum nouellæ sunt. Olea enim suapte natura superficialias radices habet, & in sublimi euehantur, vnde prohibere oportet in coactam profunditatem. Cùm adultæ fuerint, auferendas eas iubet, quæ temerè effunduntur, quo plures fiant, & firmiores, & ne matrem exhauriant, lædanturq; à quavis intemperie, quia obex terræ debilis est, nec à frigore, vel calore tueri valet. Cato: Circum oleas autumnitate ablaqueato, & stercore ad lito confoueto. Si locus siccus erit, per fementim oleas ablaqueato. Columella, Post æquinoctium autumnale, ita sunt arbores ablaqueandæ, ut à superio-
40
re parte, si olea in cliuo sit, incilia excitentur, quæ limosam aquam ad cau-

dicem deducant. Omnis deinde soboles, quæ ex imo stipite nata est, quotannis extirpanda est. Palladius: Octobri mense ablaqueandæ sunt arbores oleæ prouinciis siccioribus, ac repidis, ita ut eis à superiori parte humor possit induci. Omnem sobolem conuelli Columella præcepit, mihi autem videtur paucas dimitti semper, ac solidas, ex quibus vel in vetustate, matris loco succedat delecta, vel melius nutrita, & aggestæ terræ beneficio, & iam suas habens radices, ad oliuetum instituendum sine cura seminarii transferatur arbuscula. Plinius. Circumfodi autem omnibus annis à solstitio duum cubitorum scrobe, pedali altitudine.

Theophrastus de stercoreatione putat lotium, & pellium strigmenta maxime oleis prodesse ad latè fructificandum. Columella tertio quoque anno simo pabulandas esse oleas censet, atque eadem ratione stercoreari oliuetum, quæ in secundo libro proposuit, ac si ipsi inquit tantummodo arboribus satis stertraueris, singulis stercoreis caprini sex libræ, stercoreis siccis modii singuli, vel amurcæ in singulis congius. Stercus autumnno debet iniici, ut permixtum hyeme radices oleæ calefaciat, amurca valentibus infundenda est, nam per hyemem si vermes, atque alia suberunt animalia, hoc medicamento necantur. Plinius: Nuper repertum oleas maxime gaudere cinere, è calcariis fornacibus. Stercoreari oliueta tertio anno melius inuentum. Hedui, & Pictones calce vberrimos facere agros, quæ sanè & oleis vtilissima reperitur. Palladius Octobri mense. Intermissio triennio stercoreanda sunt oliueta, locis maxime frigidis Octobri mense. Caprini stercoreis sex libræ vni arbori, vel cineris modii singuli sufficient. Amat hæc arbor latamini vbertate pinguescere. Post ablaqueationem simi aggerelatanantur, ut Sotion scriptum reliquit, sed locis vlginosi longe minus stercoreari debent, ante tamen superfluum repurgatione stercore satiari conuenit, ut aduersus noxam, quæ putatione contrahitur, simi iuamen opponatur. Siquidem repurgati quoque caudices reserminum causa vitio laborant, quibus celeriter stercoreatu succurritur, sed stercoreis aggestionem, & multitudinem, & altitudinem iuxta truncos, iuxta terræ, & arborum naturam facere oportet. Quæ enim germinibus luxuriant, & loci humecti, pauciore indigent stercore, & per spatium plurium annorum. Aggestione autem terræ vtendum est, ne à sole exurantur. Didymus autem ait: omne sterces aptum esse oleæ præter humanum. Conuenire autem ad radicem non inficere ipsum sterces, sed paulo longius à trunco. Stercoreationem quarto aut quinto quoque anno fieri.

Semper post stercoreationem sequitur irrigatio, nec stercoreare debemus, nisi irrigare valemus, tantoque vberius irrigandum, quanto vberius sterces inteceris. Palladius. In siccis verò prouinciis, cum pluuia defuit, rigare cōuenit.

At demum de putatione agendum. Theophrastus, Androtione auctore, scribit maxime purgatione oleas indigere: etenim quo pauciora reliqueris, le-

breuiter

breuiter maxim
um vernum in
bis. Id hoc mo
tus interfeger
ro, aratoque ber
etium vernum,
lomella: Pleru
quem nisi terra
cer. Quin etiam
10 veteris prouer
etum, qui ster
no anno feciss
in olea vnus r
contristabitur
& pluuium co
nibus duobus
bri, vique in id
si tamen arbor
eratur, & pu
10 anno sicca, &
nius eadem, qu
certè superflu
tra vergilarum
mentondent
cus & putare
occalu Pleiad
medius humo
ob ætatis ard
dum hauseru
30 nem fieri vol
sint. Superu
& marcida, &
re, qui inuic
tim cum in
ceritatem
pter inter
tudinem o
omnibus p
tur, & flore
40 versus terra
procumben

breuiter maximus Cato docet. Oliuetum diebus quindecim ante æquinoctium vernum incipito putare, ex eo die dies quadraginta quinque rectè putabis. Id hoc modo putato: qui locus ferax erit, quæ arida erunt, & si quid ventus interfregerit, ea omnia eximito, qui locus ferax non erit, eo plus concidiro, aratoq; bene, enodato, stirpesque læues facito. M. Varro inter æquinoctium vernum, & vergiliarum exortum oleam interpretari oportere dicit. Columella: Plerumq; etiam locis siccis, & humectis arbores musco infestantur, quem nisi ferramento refecueris, nec fructum, nec la tam frondem olea inducet. Quin etiam compluribus interpositis annis oliuetum putandum est: nam
 10 veteris prouerbii meminisse conuenit, Eum qui aret oliuetum, rogare fructum, qui stercoret, exorare, qui cædat, cogere. Quod tamen satis erit octauo anno fecisse, ne fructuarii rami subinde amputentur. Nonnunquam etiam in olea vnus ramus cæteris aliquanto latior est, quem nisi recideris, tota arbor contristabitur. A kalendis Martiis vsq; in idus Septembris, vbi prægelidum, & pluuium cælum est, olea putantur, & emusantur. cæterum tepidis regionibus duobus temporibus anni facere istud oportebit. Primò ab idibus Octobris, vsq; in idus Decembres, iterum ab idibus Februarii, vsq; in idus Martias, si tamen arbor librum non remittit. Palladius ab eo: Octobri mense muscus eradatur, & putetur octo annorum ætate transacta. Videtur mihi vnoquoq;
 20 anno sicca, & infructuosa, cum aliqua debilitate nascentia debere recidi. Plinius eadem, quæ Cato habet, sed illud, aratoque bene, non habet, quod mihi certè superfluum videtur. Præterea vetus oliuetum ab æquinoctio verno intra vergiliarum exortum interradi alternis annis melius inuentum. Veruntamen tenduntur olea cum & vites, atq; etiam interradi gaudent. Sotion Græcus & putare & formare eas docet. Adularum olearum putationem moliti occasu Pleiadum, vt in reliquis arboribus oportet, quia illo tempore primùm medius humor in germina & in fructus alimoniam consumptus est. Secundo ob æstatis ardorem reliquus humor exiccatus est. Tertio hybernos imbres nō dum hauserunt: horum omnium gratia autumnō temporius hanc putationem fieri volunt, quòd cum reliquæ arbores, tum olea maximè robustiores
 30 sint. Superuacuis arbor exonerata latius fruticat. Refecare autem oportet & marcida, & sicca, & media, vt liberalius disflentur: item ramulos detrahere, qui inuicem incumbunt, itidem inflexos, & recuruos amputare, præsertim cum in nimiam longitudinem exeunt, & alia etiam, quæ in difformem proceritatem tendunt, vt pote cum suapte natura notentur infertiliora, quapropter inter omnes rei rusticæ prudentes conuenit, incommodam esse longitudinem olearum, quæ denos excedit cubitos, amplius etiam incrementum omnibus patere noxis addiderunt, quòd & rami ventorum impetu frangantur, & flores quoque succussi intempestiue procidant. Ideo complures ramos
 40 versus terram trahunt, vt humiliorem redditam arborem cogant in solum procumbere. Conuenit etiam stolones, & adnatos caudicibus nepotes ad-

huc molles, & teneros quotannis eximere, ne his onustus caudex fatigetur. Cassianus etiam Græcus monet oleas post decerptum fructum putare tempustum esse: nam copiosior fructus ex nouellis ramis prodit: Et mense Aprilis oleas purgare oportere, ut purgatæ meliorem fructum producant. Neque esse cogitandum ablatis manifestis, & conspicuæ magnitudinis ramis pauciorum fieri fructum, nam multo copiosior fructum ex recentium ramulorum ubertate feres. Sed quod Sotion appositum maximam afferre utilitatem in purgatione, & si cæteris in arboribus, in oleis maxime animaduerti, si adnati caudicibus ramuli abscindantur locis incongruis: nam si circa truncum magnus, & antiquus ramus detruncetur, exarefcit non solum cæsuræ, sed nerui, & ligna, & cortices è trunci corpore progredientes usque ad radices, quod olea inter cæteras arbores peculiare habet: quod in veteribus oleis apparet, cum caro exiccata est, nerui, & ossa conspiciuntur, ut in humano corpore, & apparebit experienti, quod à cæsuræ per corpus usque ad radices, quibus pars illa incumbit, sicca erit. Debet ergo putator in oleæ efformatione à principio ramos illos decidere, qui incongruo loco nati videntur, ne cogantur, ubi adultiores fuerint, detruncare.

De oleæ insitione. CAP. XXII.

EX Theophrasti præceptis oleam in oleastrum inseri, & inoculari posse perbelle patet, nam si mite in agreste inferatur, valido succulus proficiet incremento, robustiores sunt arbores ferè domesticis, atque ab subministrante solo plus sapiens alimentum radix, sic ut probè fecundet arborem. Sed in olea serius proficiet insitio, quia serior est oculorum proventus. Hoc ultimum collegit Plinius, verno tempore esse inferendum, cum tempus viget, incitantibus se gemmis, præterquam in olea, cuius diutissime oculi patruntur, minimamque succi sub cortice habent, qui nimis insitis nocet. Africa peculiare est inferere oleastro, inseriturque calamo, & insitione. Cato noster oleam per ver inferi iubet, luna sitiente, post meridiem, sine vento austro. Inoculatur, inseriturque inter lignum, & corticem. Plinius eius verba recitat, declaratque luna sitiente, id est, sicca. Miraturque Catonem inoculationem docuisse mensura præfinita secundum reliquam diligentiam suam. Virgilius oleam in oleastrum inferi vetat, non quod mire non coalescat, & fructificet, sed ne casu aliquo incendatur oliuetum, quod facile contingere potest, & ambustis ignis stipitibus, radices imæ oleastrum repullulent. Georgicorum secundo:

— Nè ve olea sylvestres insereramos;
Nam sæpe incautus pastoribus excidit ignis,
Qui furtim pingui primum sub cortice tectus, &c.
Hoc ubi non a stirpe valent, casusq; reuerti
Possunt, atq; ima similes reuirescere terra,
Infelix superat foliis oleaster amaris.

Sed Palladius, ne olea in oleastrum inferendi utilitas, & commoditas deperdatur, remedium affert. Aprili mense inferatur olea inter corticem. Sed ut oleastro inferas, contra illud, quod ex oliueto infito, & casu incenso renascatur oleaster infelix, sic providendum erit. Positis prius oleastri brachiis in scrobe, in qua disponemus inferere, scrobes ita replebimus, ut media vacua sint. Cum comprehenderit oleaster, inferemus in infimo, vel infitum ponemus, & insitionem propè infra terram nutriemus. Deinde sicut adolescit, terram subinde colligimus. Ita commissura in profundo latente, quisquis vrit, aut cædit, oliuæ locum non aufert pullulandi, quæ & apertam redeundi felicitatem de olea, & occultam valendi feracitatem de oleastri connexione retinebit. Aliqui oleas in radicibus inferunt, & ubi comprehenderit, cum aliqua parte radicis auellunt, & transferunt more plantarum. Græci oleas ab octauo calendarum aprilium die, vsque in tertium nonarum Iulii inferi debere præcipiunt, ita ut locis frigidis serius, calidis maturius inferantur. Et in suis versibus,

Robora Palladii decorat syluestria rami,

Nobilitat partus bacca superba feras.

Fecundat sterilis pingues oleaster olinas,

Et quæ non nouit munera ferre, docet.

20 Sed Hispanus oleam in ilicem inferi posse iudicat, Palladii autoritate, quia per syluestria robora ilices interpretatur, sed hæc admodum difficilis, dissimilisq; esset insitio, cum in suis mensibus nil habeat Palladius de huiusmodi insitione, cum in versibus ea canat, quæ pro sa oratione dixerat prius, & potius per syluestria robora syluestres oleastri truncos intelligendum, quam ilices. Crescentius oleas vindemiæ tempore inferendas dicit, suæq; infantiæ Catonem authorem facit, qui nil tale vsquam habet. Columella inferi debere monet circa æquinoctium vernum vsq; ad idus Aprilis, atq; luna crescente, & calidis regionibus Maio mense inferi, & emplastrari, si iam librum remittunt. Florentinus Græcus hæc addit, Ex oleis, quæ crassum librum habent, vduumque, iuxta 30 corticem inferuntur: quæ tenuem & aridum, in ipsum lignum. Tempus à decimo calendarum Iunii vsque ad Iunias calendas. Sed insita olea multoties, quippe arida existentes, riganda sunt. Plutarchus Chæroneus oleas tradit ex lentisco pallulasse in hortis Soclari, quos Cephissus amnis ambiebat.

Sed oleosa arbores, ut diximus, insitiones difficillimè, vel nullo modo admittunt, cui rei argumento est, si plantam quamlibet oleo inunxeris, demoritur protinus: proinde aliis permisceri nequeunt, sicut nec oleum ipsum. Sunt qui aliam causam refundant, scilicet corporis tenuitatem, cuius imbecillitas cum ariditate sedem insitis præbere nesciat. Nos hic Martii calce oleam inferimus inter lignum, & corticem, & optimè apprehendit. Inoculamus verò 40 aliter, quam in cæteris. Truncum serra præcidimus, inde à summo corticem scindimus, de glubimusque trium digitorum latitudine, longitudine duorum,

& eiusdem magnitudinis scutulum, cum sua gemma pupilla, ex qua fructum speramus, imponimus, labraluto munimus, & vinculis alligamus. Quo etiam modo vitur Apulia. Salkem si oleastros inferere nolumus, oleas ipsas inferamus, quas masculas vulgus vocat, quæ ramos viridiores, frondes arctiores, carnosioresq; habent, habitioem truncum, minusq; fructificant, & fructum paruum afferunt, cuius os magnum, caro minima est: hæ enim optime apprehendunt, concipiuntq; feliciter.

Quid arte, paratūve in olea fieri possit. CAP. XXIII.

NON est silentio prætereundum, quod de vitis, & oleæ naturalis concordia Florentinus memoriæ mandavit. Oleam, si viti inferatur, non v- 10 uas modo, sed oleas quoque parere. Addit visam arborem à Mario Maximo, qui quum fructum eius degustasset, negavit vnquam se quidpiam comesse, quod magis oleum, vnamque resiperet, tam exactè simul vtriusq; sapor lingua representabatur. Nascuntur huiusmodi arbores in Libya, gentiliq; ac vernacula regionis voce vbolima vocant. Perticæ subiciendæ, quæ possint brachiorum onus fulcire: si verò alio modo quouis inferantur, longius non erit opus. Ergo prope terram vitem terebramus, & oleæ ramulum imponimus, simul vt à vire dulcedinem, simul vt ab humo vernaculum alliciat nutrimentum, vt tandem eius iucundiore cibo fruamur. Postremo si nondum fe- 20 rentis viticula sarmenta fructuaria transferantur, misturam progenitorum seruabunt. Porro fructus à promiscua parentum conditione, insitoris vtriusque nomen adoptauit, elæostaphylos Græcis, quasi dicatur vuolea, nominatur. Columella præterea docet, quomodo omnis arbor, omni arbori inferatur, exemplumque apponit, in ramum fici oleam inferi posse, quod nos iam libro de insitione recitauimus. Audiui ab amico se vidisse in iuglandem insitam oleam, & fructum insignis magnitudinis, & ferè sui fructus protulisse & egregii saporis.

Olearum fertilitatis, & caritatis prognostica.

CAP. XXIII.

SVNT & prognostica, ex quibus olearum fertilitatem, & caritatem 30 sprascire poterimus, nec nobis parum erit emolumenti, si rem optime cognouerimus, vt olim insignes philosophos fecisse legimus. Ferunt Democritum, (inquit Plinius) qui primus intellexit, ostenditque cum terris cœli societatem, spernentibus hanc curam eius opulentissimis ciuium, præuisa olei caritate ex futuro Vergiliarum exortu, magnam vilitate propter spem oliuæ, coemisse in toto tractu omne oleum, mirantibus, qui paupertatem, & quietem doctrinarum ei sciebant in primis cordi esse. Atq; vt apparuit causa, & ingens diuitiarum cursus, restituisse mercedem anxie, & auidæ dominorum penitentia, contentum ita probasse, opes sibi in facili, cū velle fore. Hoc postea Sextius è Romanis sapientia adfectatoribus Athenis cit ea- 40

(em)

dem ratione. Futuram olearum penuriam Thales Milesius philolophus per astrologiam præciuit. Hic enim vnus è septem Graciæ sapientibus, cui quum obiceretur paupertas propter studium philosophiæ, tanquam inutile, parum pecuniæ simul coegit, vigenteq; adhuc hyeme, in Mileto, & Chio insulis paruo pretio olearia cōduxit, arrasq; dedit, nemine plus offerente, secutaq; olearum caritate, innumeras pecunias sibi comparauit, ostenditq; facile esse, philosophum contemnentem diuitias ditari, si velit. Sed iam ad prognostica veniamus. Scribit Diophanes, Luna existente in Leone, si canicula exorietur, magna erit olei abundantia: si verò in libra, raritas: si in Capricorno, vel Ariete, fertilitas olearum. Zoroaster verò Iouis stellam existentem in Cancro & Leone olearum fertilitatem causare dixit, sic etiam in Scorpione. Si recte floruerit olea optimum erit præsagium. Ouidius fastorum libro,

Si bene floruerint olea, nitidissimus annus,

Poma quoq; euentum temporis huius age.

Sed oportet flores, quos fructus sequuntur, bene cecidisse. Theophrastus, Intempestiui imbres pessimi sunt, atque ex toto inopportuni, qui circa floris exortum accesserint, omnia nanq; imbecillia redduntur, & omnia ferme, aut certe plurima pereunt, deciduntq; partim rubigine, partim nimio humore, oliuæ autem germinibus omnino intereunt, cum alimentum deducatur ad germen. Olea florem circa fructum ipsum producit, cuius prostrati flosculi perforati spectantur, idque argumento capitur probe arborem defloruisse, nam si exaruerint, aut madefacti fuerint, vnà cum fructibus defluent, atque ita nullatenus perforabuntur. Plinius de prognosticis hæc. Pessimum inter omnia, cum deflorescentem oleam percussit imber, quoniam simul defluit fructus. Circa Vergilias quidem pluere inimicissimum est oleæ: quoniam tunc coitus earum est. Hoc est illud quadriduum oleis decretorium. Hic articulus austrinus nubili spurci, quod diximus. Serotinæ aquæ oleis viles sunt, quoniam fructus suos diutius contineant, longioresq; desiderant cibos. Olearum conceptus exortu Vergiliarum incipit ad 6. Idus Maii. Aliud hoc quadriduum est, quod neque rore sordere velint: exhorrent enim frigidum sydus Arcturipostridie occidere: & multo minus plenilunium incidere. 4 nonas Iunii iterum aquila exoritur vesperi, decretorio die florentibus oleis, si plenilunium in eum incidat. Nos autem optimam abundantia spem concipimus, cum oleam optimè concepisse videmus, id est primos florum conceptus profert vberrimos, quibus mox se aperientibus oleam florere dicimus: spem nostram confirmamus, si deinde optime florebit, & deflorebit, vt diximus. Certius erit signum si non solum ex summitate surculorum, sed etiam ex lateribus flores, & fructus proferant.

De morbis oleæ, & remediis, & primo de nimia fertilitate, & vermiculatione. CAP. XXV.

MORBI sunt (vt superius diximus libro de infectione) vel intrinseci, vel extrinseci, & intrinseci vel copia, vel inopia alimentum eueniunt, vt est corruptio plantarum ex nimia fertilitate. Oleæ, auctore Theophr. nouellæ ob nimiam fertilitatem intereunt. Causa quoque est, quod succus, qui trunco debetur, in nimiam fructuram absumitur. Ob id Plinius ab eo: Nocet oleis nimia fertilitas. Extrinseci morbi vel secundum naturam, vel præter naturam sunt: qui præter naturam, aut maximè violenti sunt, vt vulnera: aut minus, aut minimè, vt corruptiones. Sed hi morbi, vel corruptiones, vel sunt omnibus communes, vel pluribus, vel particulares. Dicamus de communibus, vt de vermiculatione. Sed vermiculatio si est in ipso fructu, Theophrastus ait, Vermis oleæ natus sub cute fructum adimit, sed in ipso nucleo erodens prodest: prohibetur pluuiis, quæ post arcturum sequantur. Et in drupis quoque oleis vermes nascuntur, qui ad lacturam peiores certe deprehenduntur, vt maridi, putresque omnino videantur, hinc & austrinis nascuntur, & riguis magis. In caulibus verò. Oliuæ, si sub cute vermiculi nascuntur, pereunt: quoniam positus adimuntur, sed si ipso nucleo, augentur. Caro enim non tangitur: prohibet illos flatus, & pluuiæ quæ sunt sub arcturum, facit enim refrigeratio, vt fugiant omnes. Sed vermiculorum species multæ, discrimen præcipuum in his, quod in alia arbore, fructumve alio nati, trāslati in aliud genus seruari nequeunt, sed peculiare notatur de eo, quæ cerastem appellat, in olea creati, & in fico parere asseuerant. Plinius quæ ex Theophr. exceptit, habet: Vermiculationem & poma ipsa per se quibusdam annis sentiunt, sed in oliua antequam ipse eueniat, quando subeunt nati, fructum adimunt, augent, si in ipso nucleo fuere erodentes eum. Gigni illos prohibent pluuiæ, quæ sunt post arcturum. Eodem si austrine fuere generant, in drupis quoque, quæ maturescentes tunc sunt præcipue caducæ. In riguis magis euenit, & si non ceciderint fastidiedis. Aiunt Quintilii. Si radices siccæ, & velut morbo languentes offendas, huic acceptum causam feres, vermium progeniem interno sinu delitescere, quos cum pluribus, vt dictum est, modis, tum circumscissa scilla demolieris.

De particularibus oleæ morbis. CAP. XXVI.

NUNC de morbis particularibus. Olea lichenes patitur, Chelidemo auctore, fructus enim præternaturalis fluxusque, creatur. remedium erit, vt ei alimentum ubertas detrahatur, vt amygdalas & punica castigare soleamus, & arbor firmior robustiorque reddetur. Oritur & oleis peculiaris morbus, arachnium dictus, nascitur enim hoc, & fructum absumit, proficisciturque ex humiditate, generatur anniculis ramis, cum imbres secuti sunt, quæ germinatione fructus absumitur, cum eò pabulum trahatur, quandoquidè & fructus nondum vires conceperint, & aggregato humore, perficit germen. Plinius ad id, Est etiam nunc peculiare oliuis, araneum vocant, cum veluti telæ inuoluunt fructum & absumunt. Columella: Solent quauis læta arbores fructum non afferre, eas terebrari terebra gallica conuenit, atque ita in foramen viridem telæ oleæstri dimitti. Sic veluti inita arbor secundo semine fertilior extat. Quintilii: Si sterilitate laborat oleæ, ad fertilitatem adduci poterunt hac ratione. Ab radice cubitali spatio caudicem terebra gallica perforabis, parte quæ spectat in Austrum, impresso foramine digiti maioris amplitudinem

dinem capiente.
fritie, quæ hiarum
vehementer patitur
to luto curabis
volueris oleas a
impressis foramen
dem Africanus
excavatum terebra
adegeris, sic vt
traxeris: dūque
verticem, hoc est
oras foraminis,
rem partem emittit
fert, terebra gallica
informis talea
verus vrina sua
durat malitia
cibus eius infigitur
euenire solet, C
10 calci, p magnitudinem
donat. Hoc remedium
hec Quintilii: Si
maturitate non
vitiū abigeretur, si
xeris, minori sinu
casio, solius am
torrida frondis,
spargere oportet
culū intus con
30 sic labas fructum
nimia ramorum
sic combetur.
stri, vel pini, vel
semine fertilior
nius: Oleæ si p
nito. Olea si fr
cūponito, post
circumfodito,
res arbores pro
40 meliores fiunt
tione inuadit
modus seruatur

intrinseci, vel ex-
tr, vt est corr-
ellæ ob nimiam
eberur, in nimia
tilitas. Extrinseci
er naturam, aut
ruptiones. Sed
trib. vel particu-
culario si est in
admir, sed in
sequantur. Et
certe deprehē-
is nascuntur, &
ut, per eū: quo-
non tangitur: p-
frigeratio, vt fu-
um in his, q̄ in
eant, sed pecu-
fico parere affe-
ne & poma ipsa
beunt nati, fru-
los prohibent
drupis quoq;
uenit, & si non
morbo languē-
no sinu delite-
illa demolieris.

idemo autho-
vt ei alimenti
arbor firmior
niū dictus, na-
tate, generatur
ctus absuntur,
conceperit, &
culiare oliui, a-
Columella: So-
bra gallica con-
i inita arbor
e, ad fertilitatē
ebra gallica p-
ioris amplitu-
dinem

dinem capiēte. Hinc duos frugiferę arboris ab australi parte ramos tolles, craf-
sitie, quæ hiatū foraminis explere possint, & strictē in ipsum cōiicias, detractis
vehemēter palorū cacuminib. abscissoq; eo, quod superabit: aceroso vel palea-
to luto curabis occulere. Hoc veluti coitu steriles arbores vberātur, & quales
volueris oleas adipisci, tales fructuarios indes sūrculos. Ita melius oleum dabit,
impressis foramini ramulis eius à cœli parte lectis, quæ ad austrū dirigitur. Ea-
dem Africanus promittit, & restibilem oleis adferre fœcunditatē, si semel in
excauatū terebro foramē, duos feracioris oliuę ramulos in cacumina vtrinq;
adegeris, sic vt traiectu penetrent, manibusq; vehementer transactas partes
traxeris: dūq; veluti impacti cuneoli strictim adhæserint, exertū vtriusq; taleę
verticē, hoc est extātes foramini stylos refecueris, lutoq; cū aceribus, aut paleis
oras foraminis, & hiātem sinū illeueris, hoc veluti initu, grauida arbor, vberio-
rem partū enitetur. Palladius, In Octobri mense, si fructus arbor lætos nō af-
fert, terebra gallica terebretur vsq; ad medullā foramine impresso, cui oleastri
informis talea vehementer arctetur, & ablaqueatæ arbori amurca insulsa, vel
vetus vrina fūdatur, hoc enim velut coitu steriles arbores vberātur, quas tamē
durāte malitia oportebit inferere, sed si sine fruge luxuriāt, oleastri palū radi-
cibus eius infige. Si verō olea fructificant, sed non maturant, quod ex soli vitio
euenire solet, Columella huic vitio medetur. Altis gyris ablaqueat eas, deinde
20 calcis, p magnitudine arboris plus minus circūdat, sed minimæ arbori modicū
donat. Hoc remedio si nil fuerit effectū, ad remediū cōsitiōis cōfugiat. Ad
hec Quintili: Solent enim, quāuis latę arbores fructū copiosum adferētes, ad
maturitatē non producere, aut largū florē induentes, perperam exuere, quod
vitiū abigetur, si ablaqueata arbore, maiusculo caudici fuci corbes duos cōdu-
xeris, minori singulos, dein amurcā aque mistā infuderis. q̄ si fuci non erit oc-
casio, solius amurcæ vsu eris cōtentus. Vel si parū fructuosā, vel cacuminib. re-
torridæ frondis, magnis arborib⁹ quaternos modios stercoris caprini circum-
spargere oportet. Democritus autē docet: ne baccas abiiciat olea, fabā pedun-
culū intus continentē, obstruso cera foramine, in gleba radicib⁹ hæreri cōdes,
30 sic labās fructus firmabitur. Ad luxuriantes verō sine fruge oleas, scilicet, quæ
nimia ramorū petulantia syluescūt, earum multiplex lapsus, erraticusq; furor
sic cohibetur. In foramē, quod gallica terebra excanauerit, vii idem talē olea-
stri, vel pini, vel quercus palos, vel lapidē immittis, sic velut inita arbor fœcūdo
semine fertilior extabit. Quod etiā ab eo Palladius recēset Martio mense. Pli-
nius: Oleę si parum fructus promissere, nudatas radices hyberno frigori oppo-
nito. Olea si fructū non ferat ex Catone: Ablaqueato eam, postea stramen cir-
cūponito, postea amurcam cū aqua cōmisceto aquas partes, deinde ad oleam
circumfodito, ad arborē maximam amphoram vnā cōmisti satis erit, ad mino-
res arbores pro ratione indito. & idē hoc facies ad arbores feraces, he quoq;
40 meliores fient, ad eas stramēta ne addideris. Columella, Sed & sine ablaquea-
tione iunāda est amurca insulsa cū suilla, vel nostra vrina vetere, cuius vtriusq;
modus seruat. Nā maxime arbori, ni tantundē aque misceatur, vrina abundē

erit. Palladius ab eo Martio mense oleis laborantibus circum radices insulsa amurca fundetur. Maximis arboribus sex congi, mediocribus quatuor, ceteris pro aestimatione sufficiunt. Alii paleas fabæ binos per maiorem arborem qualos. Alii veteris vrinae humanae trunco, quantum satis videtur, affundunt, & arbori mortarium statim faciunt, maxime locis siccis, trunco ante cooperito. Quintiliorum agricultura docet: Latiores, & virentiores plurimum fructum afferent, si circum radices ablaqueatas insulsa amurca aqua mixta fundatur, vtriusque sextarius sufficit. Acus quoque fabaginum, vel fraces satis est indidisse, vel etiam humanae vrinae, quantum satis visum fuerit, affunditur, aut argilla bubulo stercorei permixta imponitur, aut marini fuci tantundem: sed post hæc confestim adaggeretur terra circa radices dodrantali altitudine, sinu in orbem fornicato, ut imbres pluuii retineantur, & cum se infuderint, breuissimis, ac frequentissimis fossionibus sollicitentur. Id genus etiam auxilii adhibere licet, cum canicula incendiis arbores deflagrant, quo tempore, & etiam quum siccitates inceserunt, rigationem desiderant. Patitur etiam clauum, quidam fungum appellant, olea, inquit Theophrastus, alii ollam, hæc est veluti solis exustio: quæ verba etiam recitat Plinius. Et nocere ait Cato eis muscum rubrum. Columella: Plerumque locis siccis & humidis arbores musco infestantur, quem nisi ferramento reseueris, nec fructum, nec latam frondem olea inducet.

De morbis, qui ex aeris excessu veniunt locorum proprietate, & ab animalibus. CAP. XXVII.

MORBI VERÒ extrinsecus venientes, qui sunt minus violenti, sunt aeris excessus. Olea gelu facile aduritur, quod eius radices per summa cespitum natent, ut frigus desuper inuadere possit, & oleastrum ea magis laborat, quod robustius est, ob id frigus densis magis infidet, atque immanet, quam raris. Et olea tum frondetum toto corpore arefacta apparatus regerminauit. Haud equidem arefactio fuit, sed esse quidem apparuit ex siccitate, atque colore, quæ vim genitalem frondis non attingit. Adurunt & astus quidem oliuas, adurit & flatus, ut in Chalcide Eubæa Olympias cum flauerit frigidus ante solstitia, aut post solstitia hyberna, arbores enim exurit, quo circa vredinem vocant. Id Archippo Athenis magistratu anno quadragesimo facta vehementissima proditur. Laborant maxime loca concaua vicina fluminibus, & loca, quæ ab omni flatu silent. Et oleaster magis infestatur, quam olea. Deprehenduntur quædam statim in germinatione: olea, quod semper vireat, tardius. Afferit etiam Theophrastus propria locorum vitia, ut quod apud Miletum, atque Tarentum oleis euenit, quippe apud Miletum cum florent, si aer austrinus, serenisque sit, erucæ varium genus creatur, quarum alia frondes erodunt, alia florem. Inuat contra hoc si astus sit consecutus, omnes etenim disrumpuntur, atque intereunt. Apud Tarentum cum florent, aliàs desiderio flatus æ rugine infestantur.

V
infestantur, alia
te odorem flor
Plinius ex eo:
duntque fronde
arborem turpi
lenro. Fit aliud
murauit. Quæ
morbis, quoniam
Apulia atabolus
gore exurit aref
conualles, & ap
uenerit, detegit
tis Ouidius,

Flo

De ea, quæ

Con

Sunt autem
tura sunt inimi
10 corrumpit, &
les, eius enim sa
do capra lingua
thor est Varro.
gultum carpan
nere, sed & de
cotiabat, & in
bat Liber pater
tus prohibetur
quam repetit
30 ad necessarium
fit. Plinius hu
ulas depasta
vbi modus eri
bunt, & latius
tius agrotabat

De

N VNO
simus
40 randa sunt, n

infectantur, alias habitu quodam ex mari caliginoso, crassoque floribus residen-
te odorem florum amittunt, & ob id etsi arbores pulcherrimæ fructu carent.
Plinius ex eo: Sunt & ex eadem causa nascentes erucæ, dirum animal, ero-
duntque frondem, alia florem, oliuarum quoque, ut in Mileto, ac depastam
arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc malum tempore humido, &
lento. Fit aliud ex eodem, si sol acrius insecutus inussit ipsum vitium, ideoque
mutauit. Quædam temporum causa, aut locorum, non propriè dicuntur
morbi, quoniam protinus necant, ut flatus alicuius regionis proprius; ut est in
Apulia atabolus, in Eubœa olympias. Hic enim si flauerit circa brumam, fri-
gore exurit arefaciens, ut nullis postea foliis recreari possint. Hoc genere
conuales, & apposita fluminibus laborant, & præcipue olea. Quod cum e-
uenerit, detegitur statim in germinatione, in oliua tardius. De noxa ex ven-
tis Ouidius,

Florebant olea: venti nocuere protervæ.

De ea, quæ ex æstu, Horatius,

— haud quia grando

Contuderit vites, oleamque momorderit æstus.

Sunt autem & ex animalibus noxæ. M. Varro: Quædam enim pecudes cul-
tura sunt inimicæ, ac veneno, ut capra, hæc enim omnia nouella sata carpando
corruptit, & non minimum oleas, quod eas, quas læserit, fieri dicunt steri-
les, eius enim saluam esse fructui venenum. Plinius: Quin & oleam si lamben-
do capra lingua contigerit, depauperitque primo germinatu, sterilefcere au-
thor est Varro. Hinc & nomen sortitæ: quippe F. Pompeio dictæ, quod vir-
gultum carpant, & M. Varroni, carpa, & omnicarpa capra, non solum vul-
nere, sed & dentium veneno plantis pestifera. Rustica iuuentus capram ex-
coriabat, & in utrem eius per vicos exiliebat. pereuntem verò videre gestie-
bat Liber pater. At contra Minerua videre præ odio nolebat. Quare antiqui-
tus prohibitum ne illi quid ex caprino genere sacrificaretur, propter oleam,
quam repetit. Quare Athenis in arcem non ducebatur, præterquam semel
ad necessarium sacrificium, ne olea ibi primum nata ab hoc animali tangi pos-
sit. Plinius huic deæ capram immolari dixit. Sed ubi animalia huiusmodi plan-
tulas depasta fuerint, his nos hoc remedio succurrimus, ut cultro sub morsu,
ubi modus erit, detruncetur abrosa pars, nam ex nodis noua germina pullula-
bunt, & latius crescent, quod si depastas ita relinques, ex morsus veneno diu-
tius ægrotabunt.

De præparandis ad oliuitatem necessariis vasis, & instrumentis.

C A P. XXVIII.

NUNC de cõficiendo oleo verba faciemus. Sed multa sunt, inquit doctis-
simus Columella, quæ ante oliuitatem, sicut ante vindemiam, præpa-
randa sunt, ne cum res desideratur, operæ auertantur: velut copia lignorum,

MM

quæ multo ante apportanda est, scalæ, corbula, decem modia, trimodia satō-
ria, quibus districta bacca suscipiatur, fisci, funes cannabini, & sparrei, conchar
ferrea, quibus depletur oleum, opercula quibus vasa olearia cōregantur, spon-
gia maiores & minores, vrcei, quibus oleum progeritur, cannea tegetes, qui-
bus oliua excipitur, & si qua sunt alia. Cato ad cogendam oleam multa paran-
da esse inquit, vt vimina matura, & falices per tempus legātur, vt fiet vnde cor-
bula fiant, & veteres sarciantur. Salsæ enim, vt Tarētinus Græcus habet, ad o-
lei pulchritudinem multum facit. Docet etiam Cato quomodo olearia dolia
imbui debeant. Amurca impleto dies septem, & quotidie suppleas, inde exi-
mito, & arefacito, vbi arebit, cuminum pridie in aquam infundito. Ea postri-
die diluito. Postea dolium calefacito. Minus, quàm si picare velis, tepeat, satis
est. Leuibis lignis facito caleseat. Vbi temperate tepebit, tum cuminum indito,
postea linito. Si recte liueris, in dolium quinquagenarium cumini pedum
quatuor satis erit. Columella, dolia, & seria, vbi oleum reponitur, quomodo
curanda sint, monet, idque non solum cum necessitas cogit, sed vbi euacuata
fuerint. Si fæces, vel amurcæ in vasorum fundis subsederint, emundētur, non
calida lixiuia, ne vasa ceram remittant, sed semel atque iterum eluantur, & te-
pida aqua manibus defricentur, & spongia humor afficeretur. Alii vbi lauerint,
figularem cretam aqua resoluunt, & intus oblinunt, & arefcere patiuntur,
& cum resexigit, aqua eluunt. Alii amurca, deinde aqua perluunt, & afficcant,
ceraq; perlinunt. Nam sexta quaque oliuitate cerari debere antiqui dixerūt,
quod fieri haud leuiter potest, nam noua quidem vasa calefacta ceram reci-
piunt, sed vetera ob olei succum ceraturam non patiuntur. Sed melius alii li-
quida gummi perlinunt, siccataq; alba cera suffumigant, eamq; suffutio-
nem faciunt, cum noua, vel vetera vasa curantur. Alii cum crasso gummi liue-
runt, vna illa gummitione in perpetuum contenti sunt, nam testa olea perlita
gummitione non recipit.

In oleo eliciendo quinque instrumentis maiores nostros vobis scribit Colu-
mella, scilicet mola, trapeto, canali, solea, & tudicula. Sed mola meliores sunt,
quàm trapetum: trapetum, quàm canalis, & solea. Mola quàm facillimam pa-
tiuntur administrationem, quoniam pro magnitudine baccarum submitti, &
eleuari possunt, ne nucleus, qui saporem olei vitiat, confringatur. Rursus tra-
petum facilius, & plus operis, quàm solea, & canalis efficit. Est & organum ere-
ctæ tribulæ simile, quod tudicula vocatur, idque non incommode opus effi-
cit, nisi quod frequenter vitiat, & si bacca plusculum ingesseris, impeditur.
Pro regionum consuetudine prædictæ machinæ exercentur, sed est optima
molarum, tum etiam trapeti. Torcular, & trapetum quomodo conficiantur,
docet Cato. Sed quia alias & optimas nostras adinuenit machinas, consul-
to omisimus. Hæc omnia, & multo plura prius preparari debent, quoniam in
vfu deperent, & perniciosa sunt, quorum siquid suo tempore defuerit, opus
intermittitur.

IN Libro de
aretur, qu
abit succus, no
entrefrigore, ne
accedant imbr
coquitur in ole
zius habet argu
fit post imbrui
cum. Statuit ig
lore, & fit oleu
copia non ex in
oluerum, min
dinem præsta
corpus incref
scit, & oleum
cet, sic amplius
ria proditum e
das O & obris,
20 accessere, vitia
ideoq; incipien
num fallus, exi
inde quod oleu
pus abeat, lign
cura multa, bu
que co: pus, ex
quare & in tor
stringendas el
Se
30 E
Columell
& ante hoc tr
ca lunc men
leum facere
nisi bacca te
domesticis
maxime ex
eo Plinius:
tis, hæc sap
40 ma. Quant
ma autem a

De oliuitatis tempore. CAP. XXIX.

IN Libro de causis Theophrastus scrutatur causam, cur in aestate oleū com-
paretur, quoad arcturus oriatur, tunc enim ossis duritia superuenit, & in os
abit succus, non in oleum, abiit enim æstiuus calor cum aestate, & superueni-
ente frigore, nequit fructus elaborari, ob id introsum ad os adigitur, nam etsi
accedant imbres, repleanturque fructus succo, adueniente hyeme, non con-
coquitur in oleum, quia deest calor: olea enim prius quam nigrescat, oleū pu-
rius habet. argumento est illud, quod ex phaulis exprimitur; illud autē, quod
fit post imbrium accessionem, impurius est, multam enim trahit amurcam se-
cum. Statuit igitur ipse, quod ante arcturam excoquatur humor à multo ca-
lore, & fit oleum, & minuitur pulpa, post verò æstatem crescit pulpa: olei enim
copia non ex imbribus accidit, argumentum, quod pluuio anno, vel si rigetur
oluetum, minuitur oleum. Et alibi. Calori datum est, ut oleū, & succi pingue-
dinem præstare possit, sed si vehementior sit, vim succi impellens ad carnem,
corpus incrementum cogit, quod etiam imbrium accessu accidit: nam caro excre-
scit, & oleum alimenti nimietate absimitur, nisi secuta serenitas corpus exic-
cet, sic amplius exuberare potest, quod magistratu Nicodori obtrigisse memo-
riæ proditum est. A quo Plinius: Augetur oleum ab arcturi exortu, 16. Calen-
das Octobris, postea nuclei incrementum, & caro. Cum sitienti imbres copiosi
accessere, vitiatur oleum in amurcam. Huius color oliuam cogit nigrescere,
ideoque incipiente nigræ minimum amurcæ, ante eam nihil. Et error homi-
num falsus, existimantium maturitatis initium, quod est vitii proximum. De-
inde quod oleum crescere oliuæ carne arbitrantur, cum succus omnis in cor-
pus abeat, lignumque intus grandescat. Ergo cum maxime rigantur (quod ubi
cura multa, huc imbribus accidit) oleum absimitur, nisi consecuta serenitate,
quæ corpus extenuet. Omnino uti Theophrasto placet, est olei causa calor,
quare & in torcularibus, & iam in cellis multo igne quæritur. Virgilio hyeme
stringendas esse oleas videtur his versibus,

Sed tamen, & quernas glandes tunc stringere tempus,

Et lauri baccas, oleamque cruenta que myrta.

30 Columella, Media oliuæ est plerumque initium mensis Decembris. Nam
& ante hoc tempus acerbum oleum conficitur, quod vocatur æstiuum, & cir-
ca hunc mensem viride premitur, deinde postea maturum. Sed acerbum o-
leum facere patris familias rationibus non conducit, quoniam exiguum fuit,
nisi bacca tempestatibus in terram decidit, & necesse est eam sublegere, ne à
domesticis pecudibus, ferisve consumatur. Viridis autem nota conficere vel
maxime expedit, cum & satis fuit, & pretio penè duplicat domini reditū. Ab
eo Plinius: Olea prima omnium cruda, atque nondum inchoata maturita-
tis, hæc sapore præstantissimo. Quia & ex ea prima vnda prælaudatissi-
ma. Quanto maturior bacca, tanto pinguior succus, minusque gratus. Opti-
ma autem ætas ad decerpendum inter copiam, bonitatemque incipere bacca
40

nigrescere. Cetero distat, an maturitas illa in torcularibus fiat, an ramis; tigua fuerit arbor, an suo tantum bacca succo, nihilque aliud, quam rores cœli habebit. Tempus oliuitati statuit idoneum Paxamus, quando parte plus dimidia bacca nigricat: accelerare autem olearum collectionem decet, antequam gent frigora, sic largiores partus matres ministrabunt, & bacca copiosius fundent oleum. Crescentius dicit, quod quanto diutius in arbore immorauerint bacca, eò perfectiorem maturitatem consequentur, & quò nigriores, eò perfectius, & copiosius oleum profundent, sua que ineptia Aristotelem, & Plinium authores facit, quod nusquam in eis reperitur, ex quo reor Latinam linguam ignorasse. Sed quia ob variam locorum naturam, anni & syderum variationes, certa oleitas præscribi non valet, vno omnium consensu euenit optimam esse ad decerpendum baccam, quum variare cœperit, & quædam nigra, plures tamen alba, quas Græci drypetas vocant, nostri drupas.

De leguli, custodis, capulatoris, & factoris officio. CAP. XXX.

POST QUAM maturitatis tempus designauimus, qualis collectio esse debeat manifestemus, in qua præcipua versatur vtilitas, maiorque, quam in reliquorum fructuum collectione, propter olei accessionem, & decessionem, quæ ex tempestiua, & intempestiua strictione fit, vt olea strictio longe difficilior, quam olei collectio fuerit. ob id legulos in hac re prudentiores esse oportet, quam aliis in rebus, vt hanc rem diligentissime tractent. M. Varro optimè de olea legenda sentit, quem omnes sequuti sunt. Inquit enim: Oleam, quam manu possis è terra tangere, aut scalis, legere oportet, potius, quam quatere, quòd ea, quæ vapulauit, inarescit, nec dat tantum olei, quæ manu stricta, melior ea, quæ digitis nudis legitur, quam illa, quæ cum digitalibus. Duricies enim eorum non solum stringit baccam, sed etiam ramos glubit, ac relinquit ad gelicidium relictos: quæ manu tangi non poterunt, ita quati debent, vt arundine potius, quam pertica feriantur. Grauior enim plaga, medicum quatit. Qui quatit, ne aduersam cadat: sæpe enim ita percussa olea secum defert de ramulo partem, quo factò, fructu amittuntur posteri anni, vt hæc non minima causa, quòd oliueta dicantur alternis annis non ferre fructus, aut non eque magnos. Cato inter Agriculture iura, hæc habet: Olea ne stringito, neue verberato iniussu domini, aut custodis. Olea qui legerint, omnes iuramento ad dominum, aut ad custodem sese oleam non surripuisse. Leguli volunt, vt olea cadauca quamplurima sit, quo plus legatur, sed olea, quæ diu fuerit in terra, ind minus sit olei, & deterius. Legulos, & factores, quot opuserunt, præbeto. Factores volunt, vt in sabulato diu sit, vt fracida sit, quo facilius oleum efficiant. Columella sereno cœlo baccas distringi manibus præcipit, & substratis tegitibus cribrari, & purgari debere. Plinius à Varrone hæc habet: Tertia culpa est in parsimonia, quoniam propter impendium decerpendi expectatur, vt decidat oliua. Qui medium temperamentum in hoc seruant, perticis

decu-

decutunt, cur
bus lex antiqu
me agunt, ha
mare fructus co
Harendo enim
tinent locum.
res resumunt, &
ipsa sereno cœl
lus imbecillitat
10 ramoli concuti
rum humor sol
qua si defuerit
pestatibus deci
re sit oblita, to
gulum actas su
li, manibus bac
dam, quod ex
capula Varron
sara sint. Quar
leum vtatur: n
ponito, quò ole
concha oleum
at ne tollat. Ole
Deiis labris frac
cortina amurca
gulos factus, ol
iiciat, amurcam
mum peruenien
quam minitui
10 vasa erunt, pur
Ligna in torcu
quod olei surrip

TRIA OL
rum. D
facies, tam ole
bum oleum fi
tris familias ra
pestatibus in t
40 cudibus, feris

decutiunt, cum iniuria arborum, sequentisq; anni damno. Quippe oliuanti-
bus lex antiquissima fuit: Oleam ne stringito, néve verberato. Qui cautissi-
me agunt, harũdine leui ictu, nec aduersos percutiunt ramos. Sic quoq; alter-
nare fructus cogitur, decussis germinibus. Nec minus si expectetur vt cadat.
Hærendo enim vltra suum tempus absumunt venientibus alimentum, & de-
tinent locum. Argumentum est, quod nisi ante fauonium collectæ, nouas vi-
res resumunt, & difficiliter cadunt. Paxamus non inutilia his addit: Collectio
ipsa sereno cælo fiat, minime cum pluuius imber incescit, quia profusus ramu-
lus imbecillitate languens, facile disrumpitur, qua de causa neq; rorulenta die
30 ramuli concuti manibus, neq; bacca decerpi debent, prius quàm omnis arbo-
rum humor sole discutiatur. Si lutum subest, canistri & regetes substernende,
quæ si defuerint, immundæ bacca, & inquinatæ, & obstita luto, & quæ tem-
pestatibus deciduæ sublegantur, calida perluantur aqua. Caduca, quæ pulue-
re sit obstita, terrestrius dabit oleum. Longè ergo satius fuerit scalas in trian-
gulum actas subiicere, & latos asseres superimponere, quibus infidentes legu-
li, manibus baccas distringant. Nunc de capulatoris, & custodis officio dicen-
dum, quod ex Catone mutuabimus. capulator est, qui capulis oleum deplet.
capulæ Varroni vasa sunt, à capiendo dicta, quod capi facile possint, quod an-
sata sint. Quam mundissimo, purissimoq; fiat vase aheneo, neq; nucleis ad o-
20 leum vtatur: nam si vtetur, oleum male sapiet. Cortinam plumbeam in lacu
ponito, quod oleum fluat. Vbi factores vectibus prement, continuo capulator
concha oleum quàm diligentissimè poterit, tollat, nec cesset. Amurcam caueat
ne tollat. Oleum in labrum primum indito. Inde in alterum dolium indito.
De iis labris fraces amurcamque semper subtrahito. Cum oleum sustuleris de
cortina amurcam dehorito. Oleum frequenter capulet. Factoribus det in sin-
gulos factus, olei sextarios, & in lucernam, quod opus fiet. Fraces quotidie e-
iiciat, amurcam commutet vsq; adeo, donec in lacum, qui in cella est, postre-
mum peruenerit. Custos seruet diligenter cellam, & torcularium. Caueat
quamminimè in torcularium, & in cellam introeatur. Quæ in torculario
30 vasa erunt, pura habeat, curetque vti olea bene perficiatur, beneq; siccetur.
Ligna in torculario ne cadat. In torculario, & in cella caueat diligenter, ne
quid olei surripiatur.

Acerbi, vel viridis olei faciundiratio. CAP. XXXI.

TRIA olei genera apud authores traduntur, acerbum, viride, & matu-
rum. De acerbo oleo Cato hæc habet. Quàm acerbissima olea oleum
facies, tam oleum optimum erit. Columella: Ante Decembris mensem acer-
bum oleum fieri debet, quod vocatur estiuum. Sed acerbum oleum facere pa-
trisfamilias rationibus non conducit, quoniam exiguum fluit, nisi bacca tem-
pestatibus in terram decidit, & necesse est eam sublegere, ne à domesticis pe-
40 cudibus, ferisve consumatur. Et alibi: Nouembri olea distringenda est, ex

qua velis viride oleum efficere, quod sit optimum, ex varia oliua, cum incipit nigrescere: nam acerbum nisi ex alba olea fieri non debet. Plinius ab his. Oleum quàm acerbissima oliua optimum fieri. Sed media oliuitas plerunque auctore Columella, initiū mensis Decembris, & circa hunc mentem viride premitur. Viridis autem notæ conficere, vel maxime expedit, cum & satis fluit, & pretio penè duplicat domini redditum. Cato ita facere docet. Oleum viride sic facito: Oleam quamprimum ex terra tollito. Si inquinata erit, lauito, à foliis & stercore purgato. Postridie, aut post diem tertium, quàm lecta erit, facito. Domino de matura olea oleum fieri maxime expedit. Si gelicidia erunt, cum oleam coges, triduum, aut quatrimum post oleum facito. Eam oleam, si voles, sale inspergito. Quàm calidissimum torcularium, & cellam habeto. Olea ubi lecta fiet, oleum sit continuo, ne corrumpatur. Cogitato quotannis tempestates magnas venire, & oleam deiicere solere. Si cito sustuleris, & vasa parata erunt, damnum nihil erit ex tempestate, & oleum viridius, & melius fiet. Ex quavis olea oleum viridius, vel bonum fieri potest, si temporifacies. Sed Columella exactius docet. Necesse est, ut vniuscuiusque diei fructus molis, & prælo statim subiiciatur, sed quia aliquando accidit, ut multitudo baccæ torculariorum vincat laborem, necessarium est tabulatum, quo feratur olea, & habeat lacusculos tam multos, quàm postulauit oliuæ modus, ut vniuscuiusque diei coactura separetur. Lacusculorum solum lapide vel tegulis construi oportet, & ita decliue fieri, ut omnis humor per canales defluat: est enim amurca oleo inimica, quæ si remansit in bacca, olei saporem corrumpit. Super lacusculorum solum asterculos inter se distantes semipedalibus spatiis ponito, & cannas spissè textas iniicito, ut pondus sustinere, nec baccam transmittere possint. Sub ipsis canalibus concavum pavimentum esse debet, in quo defluat, & exhauriri possit, quicquid deflexerit. Sed modum exequamur. Baccas diligenter purgas in torculari deferri, & in fisticinis nouis includi, prælisque subiici oportet, ut paulisper exprimantur. Postea resolutis corticulis emolliri debent, adiectis binis sextariis integri salis in singulos modios & sampsa exprimi. Quod primum deflexerit in rotundum labrum capulator depleat, & inde in fisticilia labra defundat. Sint autem in cella oleatia tres laborum ordines, ut vnus primæ pressuræ oleum recipiat, alter secundæ, tertius tertiæ; Nam refert non miscere iterationem, longe enim melioris est saporis, quod minore vi præli, quasi lixiuum, deflexerit. Cum paululum in primis labris constiterit oleum, eliquate id capulator in secundæ labra debet, & inde in sequentia usque ad vltima, nam quanto sapius ventilatur, tanto sit liquidius, & amurca liberabitur. Singulis ordinibus tricena sint labra. Si verò frigoribus cum amurca oleum congelabitur plusculo sale cocto vitore: ea enim res resoluit oleum, & purum facit. Nec verendum, ne salsum fiat, nam quantumcumque adieceris, eius saporem non recipit. Si ne hoc modo resoluatur, tostum nitrum inspergitur, & commiscetur. Alii integram baccam prælo non subiiciunt,

unt, existiman
exprimitur, se
damid cōficu
rei inimica, &
rum torcular &
ut neignis des
nam quàm rec
expandis ne ca
ris modum fac
10 & molis primo
salibus, ac man
concepto. Foc
nius ex his om
beat, consulti
oleum ex acer
viminea crate
liditate noxa a
nam si remane
mole iniicito,
10 punt, sed solu
transportato,
fluit, & tenue
liquas violenti
hinc deterius p
permisceto, &
ra, & serua vas
sublinito, locis

D
30 P O s t v i r i
celle est v
bimatura erit
tabulato effe
scere posse. Q
diis colle &
Nam oleum
Columella d
da est olea, &
quonia hyem
volunt, prinu
40 oleū in tabulat

unt, existimantes aliquid olei deperire, nam præli pondere non solum amurca exprimitur, sed secum pinguitudines attrahit. Caueto ne fumus, aut fuligo, dum id cōficitur in torculari, admittatur, aut in cellam, nam est vtraq; res huic rei inimica, & vix ad lucernam opus fieri permittitur, & ob id ad eum cœli statum torcular & cella construenda est, qui maxime à frigidis ventis auersus est, vt ne ignis desideretur. Palladius aliqua de nouo addit. Octobri mense oliuam quàm recentissimam, cùm varia est, colligis, si diebus aliquot collegeris, expandis ne calefiat. Si qua ibi putris, vel sicca est, remoues. Vbi compleueris modum factorii, sales tritos in eandem mittis, per decem modios tres salis, 10 & molis primo, & sic salitam in nouis canistris esse patieris, vt pernoctet cum salibus, ac mane premi incipiat, olei meliorem fluxum redditura, salis sapore concepto. Focos non propius admouebis, ne olei saporem fumus inficiat. Plinius ex his omnibus breuissime colligens describit, quod quum nil noui habeat, consultius omisimus. Apuleius omphacinum oleum ita conficit. Viride oleum ex acerbis oliuis, quas omphaces Græci appellant, fit. Decerptas oleas viminea crate expandito, quò aquositas ex ipsis remittatur, & ne ex mutua caliditate noxa accedat. Segreganda sunt earum folia, & virgulta ipsis admista: nam si remanent, olei diuturnitati obfunt. A vespere acceptas sale consperfas molæ iniicito, leuiterq; molito, ne nuclei conterantur: nam oleum corrumpunt, sed solum caro, & cutis, quod moliturum est, paruis peluibs in torcular transportato, leueq; pondus superponito, nam quod ex leui cōpressionē profuit, & tenue & iocundum est, ac in vasa transfusum seorsum adseruabis. Reliquas violentiore pondere exprimes, ac priuatim recondes, nam semper dehinc deterius profluet. Vtriq; parum salis, & nitri adiciatur, & rude oleagina permisceto, & quiescat: nam pingue supernabit, aquosum subsidebit. Separa, & serua vase vitreo, quo gaudet oleum, quia frigidum est, vel fictili gypso sublinito, locisq; siccis ad arcum versis repone.

De maturi olei conficiendi ratione. CAP. XXXII.

30 **P**OST viride oleum, fit maturum. Quum enim vasta sunt oliueta, necesse est vt aliqua pars earum maturo fructui reseruetur. Cato: Olea vbi matura erit, quamprimum cogi oportet, quam minimum & in terra, & in tabulato esse oportet, quia putrescit. Nolito credere oleum in tabulato crescere posse. Quàm citissime conficies, tam maxime expediet, & totidem modis collectæ, plus olei efficiet, & melius. Oleum si poteris bis in die depleto. Nam oleum quàm diutissime in amurca & fracibus fuerit, tam deterrimū erit. Columella de eo: Post mensem Decembrē, circa calēdas Ianuarias distringenda est olea, & statim exprimēda, nam in tabulatū reposita celeriter cōcaleſcet, quoniā hyemalibus pluuiis amurca plus concipit. Si ex ea fieri oleū cibarium volunt, ptinus illata de agro bacca, cōmolita, & expressa sit. Pleriq; credidero: 40 oleū in tabulato crescere, quod tam falsum est, quàm frumēta in area crescere.

Idq; mendacium vetus Cato refellit. Ait enim in tabulato corrugari oliuam, minoremq; fieri, propter quod rusticus, cum facti vnus mensuram sub tecto reposuerit, & post multos dies eam molere voluerit, oblitus prioris mensuræ quam intulerat, ex alio acerno, quantum mensuræ defuit, supplet, ob id videtur plus olei quæta, quàm recens bacca reddere, cum longe plures modios acceperit. Vnde si quid ponderis, aut mensuræ oleo accedit, si portionem velis in factum adiectæ bæcæ computare, non prouentum, sed detrimentum senties. Quapropter non verendum lectam oliuam subito commolere, præloq; subiicere. Si vermiculis exesa, aut tempestatibus olina decidit, & in lutum defluxit, calida aqua eluantur bæcæ, quo commodior gustus olei fiat, non feruenti, nam vermiculorum, & immunditiarum saporem contraheret. Cibarium, & improbum oleum non iisdem fuscis premi oportebit, nam veteres ad caducam oliuam, noui autem cibatio, oleo aptari debent, & cum expresserint facta, feruentissima aqua bis, tæve elui debent, & profluentibus aquis immorari. Palladius eadem habet. Nos hic oleas trapeto confractas in saccum indimus ex cannabino filo contextum, accalida aqua superius iniecta pedibus calcamus, comprimendosq; oleum cum aqua exprimimus, facit enim calida aqua, vt defluat, inde aheneo vase incoquimus, & quod supernatat clarum, & purum tollimus.

Purgandi modi à vitiiis oleum. CAP. XXXIII.

OLEVM, vt cateri liquores, quamplurimis vitiiis obnoxium est, tum in ipsa confectione, tum postquam confectum fuerit, cui, vt in reliquis, eandem operam impendimus, vt medeamur.

Si sordet oleum.

Tostos, & adhuc calentes sales Tarentinus iniicere iubet, ita mundum post exiguum tempus pollicetur. Purgat idem nux pinea igni candens, si oleo restinguatur. Emendat & citri radix in oleum demersa. Et fax olei torrefacta oleum limpidius reddet. Quod ab eo etiam Palladius habet.

Ad oleum rancidum.

Oleum rancidum idem sic posse curari ait. Albam ceram mundam, & optimo oleo resolutam, adhuc costuraliquentem in oleum immitti iubet, tunc sales frictos calentes addi, sic fieri vt oleum purgetur, sapore & odore mutato. Neq; ignorandum eius esse naturam, vt sole, vel igne curetur, vel aqua feruenti, si simul misceantur in vasculo. Oleum tamen omne fistilibus, non æreis, aut aheneis esse seruandum. Rancori quoq; medetur immersum anisum. Et non rancescet oleum, in quo prius anisum maduerit. Palladius ex hoc eadem recenset, sed addito sale fricto operiri vas, & gypfari iubet, & terrenis locis esse seruandum.

Si fetidum oleum sit.

Si fuerit oleum odoris horrendi, præcipit idem author virides oleas sine osibus

abus rudi, & i
rimos olea sim
iam sale, sed om
tunt, postea tri
alia vala transfe
riq; panes hord
& novos subind
cas mittunt, &
fertulam camp
10 ex Gracis eade

Quod si alio
iubet Democri
diebus manere
donec supererit
permiscant, vel
Si acerbis odor
fos, & in mass
10 oleum, & in va

Si oleum ru
iectum oleum
stiterit, spurcu
ramos oleagin

Damageron
& omni putri
ma, & exigui
30 bans agitabat
pariebatur, d
deplebat, idq;
commiscebat
um, vbi con
oleum defu

A D m
differ
learum con
40 milias perna

Abustundi, & in vasa per solis calorem mitti. Si bacca defuerint, caules tenerimos oleæ simul effertundendos. Nonnulli vtraque permiscunt, adiecto etiam sale, sed omnia intra linteum clausa suspendunt, atq; ita in vas olei demittunt, postea tribus diebus exactis auferunt, & agitantes, vbi conquieuit, in alia vasa transferunt. Quidam mittunt vetustum laterem torrefactum, pleriq; panes hordeaceos breuiter friatos, & raro linteolo inuolutos mergunt, & novos subinde permutant: vbi hoc bis, aut tertio fecerint, salis callos, vel miccas mittunt, & in alia vasa translatum paucos dies subsidere patiuntur. Alii fertulam campanam oleo delibutam interdium, noctuq; macerant. Palladius

10 ex Græcis eadem.

Aliquod animal in oleum illapsum, si eius odorem vitiauerit.

Quod si aliquod animal fortè deciderit, & oleum putri nidore vitiauerit, iuber Democritus coriandri manipulum in olei vase suspendi, atq; ita paucis diebus manere: si nihil de nidore decesserit, immittendum est coriandrum, donec superetur hoc vitium. Quidam fœnigræci semen siccum, tritumque permiscunt, vel incensos oleagineos carbones in oleo frequenter extinguunt. Si acerbus odor fuerit, vix acinos, quos gigarta Græci vocant, præcipiunt tufos, & in massam redactos mersari, & post denos dies gigarta eximunt, agitantq; oleum, & in vasa munda decapulantur. Palladius eadem ex Græcis transfert.

Vt oleum turbidum sedetur.

Si oleum turbulentia vexet, Tarentinus suadet in fideliam ampli oris coniectum oleum inferuescere, tenuissimumq; salem frictum inspargi, & vbi subsiderit, spurcum oleum elutriari. Pellucidum efficies oleum: si corticem, & ramos oleaginos cum sale detritos, & linteo conclusos in vase suspendas.

Vt oleum Hispanico simile facias.

Damageton oleum Hispalensi simile conficiebat hac ratione, Oleo sincero, & omni spurcicia repurgato, vbi efferbuerit, triplum aque minimè feruentissimæ, & exiguum salem in farinam detritum confundeat, & tantisper conturbans agitabat, dum in vnum coire perciperet: tum spatio quodam conquiescere patiebatur, donec iniecta aqua instar amuræ subsideret, dein oleum concha deplebat, idque iterum faciebat, postremo succum recentium foliorum oleæ commiscebat, vt amarulentiam quandam oleum contraheret, & post triduum, vbi constitisset, ad vsus deptimebat. Alii in pilam eodem succo prolitam oleum defundebat, & cum vocaret necessitas, Hispani vice in vsum veniebat.

Albe oliue quomodo condiantur. CAP. XXXIV.

AD MONET me scribendarum rerum ordo, vt de condiendis oliuis edisseram aliqua, cum maiores nostri, qui de agricultura scripserunt, olearum condituras præcipue docuerint, vt crebrior sit eius vsus, qui patrifamilias pernecessarius videbatur, & inter eas, quas recensuimus oleæ dotes, ob

id præsertim commendauimus, quodd secundis mensis inferuiat. Hæ enim ante omnia edulia comestæ, si Paulo credimus, cibi appetentiam comouent. Sed diuersa sunt, ut earum genera, conditura, nam alia in cadiuis, alia in lectis, alia in albis, nigrisve erat. Et primo de cadiuis dicendum, quam M. Cato edocet, nulla collectionis, aut temporis, utpote propter illarum casum, per scripta ratione. Pulmentarium familia, inquit, oleæ caducæ quam plurimum condito. Postea oleas tempestiuas, unde minimum olei fieri poterit, eas condito, & partito, uti quam diutissime durēt. Docet & alibi. Oleæ albæ, antequam nigra fiant, contundantur, & in aquam deiciantur, crebro aquam mutet. Deinde ubi satis macerata erunt, exprimat, & in acrum coniciat: oleum addat, & salis felibram, in modum olearum feniculum, & lentiscum seorsum condat in acrum. Si vnâ admiscere voles, cito utitor, in orculam calcato manibus siccis: cum uti voles, sumito. Oleam albam, qua uti secundum viridentiam voles, sic condito, musti tantundem addito, quantum aceti. Cætera item condito ita, uti superscriptum est. Oleæ orchites, postea optimè conduntur, vel virides in muria, vel in lentisco confusa. Et ab eo eadem M. Varro recitat. Columella sampsas vocat olearum carnes comminutas sine ossibus, quæ conduntur, & ad cibi usum reponuntur. docetque quomodo fieri possint, ut tertio die uti possis. Mense Septembri pauseam acerbam cõtunde, & aqua calida paululum maceratam exprime, feniculique seminibus, & lentisci cum cocto sale permistam reconde in fideliā, & mustum recentissimū infunde. Inde, ut mergantur oliuæ, fasciculum viridis feniculi superpone. At si toto anno uti voles: Pauseam orchitem, radiolum, vel regiam contunde, illico in frigidam muriam iniice, amphoræ imo aridi feniculi fasciculum substerne, exemptas de muria exprimito, & in vas cū viridis feniculi & lentisci seminibus distinctis permisce, dein recentis musti partes duas, & vnā durā muria adiecto, & seruato. Alii non contundunt oliuas, sed arundine infecant, & cãdior remanet oliua. At si laurioribus mensis adhibere velis, & ut confusa quamcunq; recipiat condituram: Pauseas vel regias integras eligito, conicito in amphoram ut diximas, inde duram muriam adiecto, ut ad summum amphoræ labrum perueniat, & cum res exigit, de amphora promito. Oleæ poseæ cū decolorantur, cum petiolo leguntur, & in oleo seruantur, ut post annum representent viridem saporem, ac trito sale asperfas pro nouis apponunt. Palladius ad id: Oliuas quas iacentes repereris, rugis contrahentibus crispas colligis, & salibus tritis resperfas expandis, donec sole inarescant. Tunc substrato lauro alternas crates baccarum sapius ordinabis. Tunc defrutum cum satireia fasciculo duabus, aut tribus vndis feruere patieris. Et postquam tepuerit, supra compositas baccas resundes admissio sale paululo, & origani falcæ confecto, supra ius omne perfundes. Florentinus, Alba oliuæ aqua marina sex diebus macerantur, mittuntur in vas, & mustum superfunditur, non repletur vas, ne in feruore effundatur mustum, ubi inferbuerit, obliuunt. Alii salis pugnum præmittunt. Plini-

us. Fiant & præ
qui condituram
uaro. Sumito
quam, quantum
quing, selectar
rude leuiter per
se recedat, quo
ea quinis, vel se
& condito in m
uerurq; fictili,

Cato do
os, postea
frutum condito
orchites, & na
dist. i. 2. s. lecer
regi ternas be
ginta die cons
spongia salem
tres partes def
modo salunt,
lata oliuarum,
fun sunt, adie
gulos sex terios
niculi, salis co
feniculi fascicu
to die, quicquid
diffundi, & a
nacea recentia
30 in vas condes
cum ramulis i
pelum mittit
rum, leniter
dito, ut sup
Sidicina sal

D I D M
gida a
ac in iunum

us. Fiunt & præcoces feruenti aqua perfusa quamlibet immatura. Nos nostri
 10 qui condituram apponemus, vt breui tempore condiantur, viridi colore fer-
 uato. Sumito viua calcis libras sex, querni cineris duodeviginti; admisce a-
 quam, quantum ad dissoluendum sufficiat, & in ea macerentur libræ viginti
 quinq; selectarum olearum, accommodando ne seinuicem premant, lignea
 rude leuiter permiscendo, post diei medietatem exime, & vide an pulpa ab os-
 se recedat, quod est optimæ macerationis signum. Inde lauentur aqua, & in
 ea quinis, vel senis diebus macerentur, sæpius aqua permutata, eximito post,
 & condito in muria, in qua ferbuerit feniculus in plures partes dissectus: fer-
 uerurq; fictili, sed ternis quibusque mensibus immutetur muria.

Nigra oliua conditura. CAP. XXXV.

CATO docet. Orchites ubi nigra erunt, & sicca, sale confricato dies du-
 os, postea salem excutito, in solem ponito biduum, vel sine sale in de-
 frutum condito. Eadem habet ab eo M. Varro. Columella ita docet. Pausias,
 orchites, & nœuias, cum nigruerint, & immatura fuerint, sereno cœlo manu
 distictas secernere conuenit à vitiosis: dein in singulos modios oliuæ salis in-
 tegri ternas heminas adiciere, & in vimineos qualos confundere, finito tri-
 ginta dies confudascere, & amurcam exillare, postea in alueum diffundere,
 spongia salem munda, & in amphoram iniice, sapa, vel defruto reple. Alii
 20 tres partes defruti, & vnâ acetî, alii duas, & vnâ acetî miscent. Alii eodem
 modo salunt, & collocant in qualis, immistis seminibus lentisci, alterna tabu-
 lata oliuarum, & salis, & post quadraginta dies mundas oleas in alueum de-
 fundunt, adiecto defruto, vel sapa, vel melle. In singulos modios oliuæ sin-
 gulos sextarios maturi seminis anisi, lentisciq; & ternos cyathos seminis fe-
 niculi, salis cocti non moliti ternas heminas admisceri, & in amphoras condi,
 feniculi fasciculis obturari, & quotidie per terram volutari, & tertio aut quar-
 to die, quicquid amurcæ est mitti oportet. Post quadraginta dies in alueum
 diffundi, & à sale separari, sine spongiis, & in amphoram condi. Didymus: Vi-
 nacea recentia prius quàm exprimantur, vnâ cum oliuis vicissim interpositis
 30 in vas condes, & oblines. Florentinus: Oliuas longas nigras, pulcherrimas,
 cum ramulis integras accipe, & aqua frigida lotas in cratibus sicato, dein in
 peluim mittito, affuso oleo, ac sale trito chœnicis mensura ad nouem oliua-
 rum, leniter manibus commoueto, in vas translatis acerum multum affun-
 dito, vt supernatet liquor, & feniculo obturatum vas reponatur. Plinius:
 Sidicinæ sale priuatim condiantur, & vt reliquæ amurca, sapaue.

Colymbades oliua quomodo fiant. CAP. XXXVI.

DIDYMVS ita docet. Oliuas ppè maturas cum pediculis suis lectas, fri-
 gida aqua lotas, per diē vimineis cratibus assiccato, leuiter cōuertendo,
 ac in inum vasis sale immisso, muria congiis quatuor, & acetî heminis tribus

infusis, olearum chœnices viginti mitito. Expletum vas commoueto, & ius supereminet. Alii in marinam aquam oleas immittunt, post dies quinque, vel septem eximunt, & in vase cum muria coniectas reponunt; idq; cum solstitium est, faciendum. Palladius Nouembri mense. Colymbades oliuę sic fiunt. Alternis cratibus oliuarum puleium spargis, & mel, & acetū, & sales modice, stratura intercedente suffundes. Item sternes oliuas supra furculos feniculi, vel anethi, siue lentisci, & ramulis oliuę subditis, aceti heminam, & muriam superfundes, & has constructiones vsque ad vasculi plenitudinem patieris insurgere. Columella, Maturam oliuam in stratura factam colymbadem de muria tollito, spongia tergito, deinde canna viridi scindiro duobus, vel tribus locis, triduo in aceto habeto, quarto die spongia extergito, in vrceum nouum mittito substrato apio, & modica ruta: concisis deinde pleno vase oliuis immitte defrutum vsque ad os. Laurituriones mitito; vt oliuas deprimant, post dies viginti vttere. Plinius: Nec non aliqua oleo suo sine accersita commendatione purę innatant colymbades, franguntur eadem, herbarumque viridium sapore condiuntur.

De amurca. CAP. XXXVII.

DIXIMVS de oleo, dicemus de amurca. Ex olea enim fructus duplex, vt M. Varro inquit, oleum quod omnibus notum, & amurca, cuius utilitatem licet videre ex torculis oleatis fluere in agros. Dicitur Græcis amorgi, & trix, à qua tragœdiam primum denominatam dicunt, auctore Donato, quod ea scenici ad personarum vsum ora sua perluerent, quod primo Æschylum reperisse dicunt. A quo Horatius,

Ignotum tragice genus inuenisse Camæna

Dicitur, & plaustris vexisse poemata Thespis:

Quæ canerent, agerentq; peruncti facibus ora.

Latinis amurca dicitur. Plinius: Amurca est oliuę sanies amara, quæ fit ex aquis, ideo siccitatibus minima, riguis copiosa. Est enim sedimentum, & fax olei amara, verustate fit melior. Cato, vt ab eo initium sumamus, summis laudibus extollit, quas omnes Plinius in vnum collegit: Dolia oleata, cadosque illa imbui, ne bibant oleum. Amurca subigi areas terendis messibus, vt formicæ, rimaq; absint. Quin & latum parietum, ac tectoria, & pauimenta horreorum frumeti, vestiariū etiam contra teredines, ac noxia animalia, amurca aspergi: semina frugum perfundi: morbis quadrupedum, arborum quoq; illa mederi, efficaci ad vlcera interiora humani quoque oris. Lora etiam ac coria omnia, & calceamina, axesq; decocta vngi, atq; aramenta contra aruginem, colorisq; gratia elegantioris, & totam supellectilem ligneam, ac vasa fictilla, in quib; sicum aridam libeat asseruare, aut si folia, baccasque & virgas myrti, aliudve id genus simile. Postremo ligna macerata amurca, nullius tui tedio ardere. Præterea amurca olearum radicibus infusa, feraces, & meliores.

meliore effici
tulus in vinea
murca. Pecud
lesti erunt. Bot
cupide appetu
nigrare terram
ad multas res,
rum radices in
cer. Idemq; de
pressa est, qui
quidam sic oleo
pletur, vt tritic
sibus proximis
fenescit luna,
tum deniq; ad
ac sic grandese

Se
Et
Gr
20 Columella
Se
Pr
Pa
Neq; hac lit
difficillimos cu

2
Nō erat
Neo dictu
persequemur
30 bus. Fit ex nu
enimvero si q
na Gallia vitu
sas ab integri
men clarum
feret tota in
decem fund
leum effund
vncias olei fi
cibus optimu
40 modū demon

meliores efficit. Et si ci grossos continebunt eadem radicibus satiatis. Conuol-
nulus in vinea non nascitur, si vitem circum caput, & brachia perunxeris a-
murca. Pecudes & oues de onsa ea illinuntur, nec scabra fiunt, nec ricini mo-
lesti erunt. Boues, qui cibum fastidiunt, si pabulum amurca conspergas, magis
cupide appetunt, & corpore valebunt. M. Varro ait amurcam non solum de-
nigrare terram, sed multitudine facere sterilem, cum is humor modicus, cum
ad multas res, tum ad agriculturam pertineat vehementer, quod circum arbo-
rum radices infundi solet, maxime ad oleam, & ubicunque in agro herba no-
cet. Idemq; de ea promenda, & tuenda hæc habet. Amurca cum ex olea ex-
pressa est, qui est humor aquatilis, ac recrementum conditum in vas fictile, id
quidam sic solent tueri: diebus 15 ex eo, quod est leuissimum, ac summum, de-
pletur, ut traiciant in alia vasa, & hoc iisdem interuallis duodecies. In sex men-
sibus proximis id faciunt. Cum id nouissime faciunt potissimum traiciunt, cum
senescit luna, tunc decoquunt in ahenis leui igni duas partes, quoad regerunt:
tum deniq; ad vsum rectè promitur. Virgilius amurca profundius iubet fabam,
ac sic grandescere promittit.

Semina vidi equidem multos medicare ferentes,

Et nitro prius, & nigra perfundere amurca,

Grandior ut fœtus siliquis fallacibus esset.

20 *Columella vititur ea contra animalia, quæ segetes carpunt, eroduntq;.*

Sed ne dira nouas segetes animalia carpant,

Profuit interdum medicantem semina pingui

Palladia sine fruge salis conspergere amurca.

Neq; hac libenter carerent medici, si quot, & quanta ad morbos quam-
difficillimos curandos præstet remedia, scirent.

De aliis olei generibus.

CAP. XXXVIII.

NON erat Catonis æuo fictitium oleum, ob id arbitratum Plinius nihil ab
eo dictum, sed Plinij tempore genera plura, nostro plurima: primumq;
persequemur ea, quæ ex arboribus, postmodum ex herbis, & primo de nuci-
bus. Fit ex nucibus iuglandibus, quod carynon vocant, iners, & graue sapore,
30 enim uero si quid in nucleo putridi fuerit, totus modus deperit. Nunc Cisalpi-
na Gallia vititur ad lucernarum lumina, & ad esum. Ad lumina secernunt vitio-
sas ab integris, & illas, his secundis mensis, illis ad effusionem vtuntur. Lu-
men clarum efficit, nec est inter omnia, quæ copiosius oleum effundat, nam
fere tota in oleum vertitur, ut libra una mundatarum nucum, uncias ferè olei
decem fundat. Sequitur auellana, quæ copiosum, odoratum, & optimum o-
leum effundit, quo etiam ad cibarium vsum uti poterimus, & libra una octo
uncias olei fundit, quod superior ætas ignorauit. Amygdalinum oleum ex dul-
cibus optimum est, ex amaris ad medicamenta vtitur. Dioscorides conficiendi
40 modum demonstrat. Amygdalæ amaræ sextarios octo purgant, assicantq;: ubi

exaruerint, pistillo ligneo in mortarium collatas contundunt; quoad massa fiat. Hanc heminis duabus feruentis aqua aspersam, semiboram dimittunt, ut perbibat, postea vehementius iterum tundunt, deinde ad tabellam prementes cremorem excipiunt, & quod in digitis pingue adhæsit, in cornicula effingunt, ac tergunt, rursusque in id, quod presserunt, heminam aquæ vnâ infundunt, & spatio ut combibat interposito, iterum exprimunt, forma, qua prius. Iustum est ut octo sestarii heminam reddant: eodemque nos extrahimus modo. Ex pistaciis etiam optimum elicitur ad esum, & ad remedia. Ex fructibus nucis pineæ, scilicet ex nucleis oleum ad lumina satis copiosum elicitur, ex vitæ cum seligantur. Plinius Indos ex castaneis oleum facere dicit, quod difficillimum videtur, cum experientia non successisset, saltem perparum. Ex roborum glandibus elicit oleum Cisalpina Gallia, quo ad lucernarum lumina utitur, sed valde paucum. Plinius: Inopia cogit aliquando luminum causa & è platanis baccis fieri, aqua, & sale maceratis: sed etiam perpaucum. Sed ex sagina glande copiosum, optimum elicitur, & ad cibarium vsum, & ad lumina: lumen clarum reddit, & sapore est, ut dulcium amygdalarum, totaque fere in oleum absumitur, ut nuces iuglandes. Quo vetustior, eo copiosius oleum promit, ex expressis fraces saginandis bubus, & subus egregia. Paruo impendio colligitur, mundatur, tunditur, exprimiturque. Laurinis è baccis, priusquam maturæ sint, iam tum colorem mutantibus. Has in aqua decoquito, pinguedine quam dâ cortices reddent, euocabitur ea diuerberatis manu, tum cremore in cornua colligito. Palladius ferè ut Dioscorides: Ianuario mense lauri baccas quamplurimas, & maturitate torquentes in aqua calida bullire facias, & ubi diu ferverint, olei, quod ex se dimiserint, supernatantis vndam, pennis leuiter cogentibus in vasa transfundes. Lentiscinum ex maturis lentisci seminibus eodem instruitur modo, ut de lauro diximus. Palladius præcipit dicit: Grana matura lentisci quamplurima colligis, & vna die, ac nocte supra se aceruata esse patieris, deinde sportam grani eidem plenam cuiusque vasculo superponis, & calida adiecta calcabis, & exprimes. Tunc ex eo humore, qui defluerit, supernatans oleum lentiscinum, sicut laurinum colligeretur. Memento autem, ne rigore possit astringi, aquam calidam saepe suffundere. Ex toto hoc nostro Surracino tractu copiosum eliciunt: simili etiam modo fit terebinthinum, quod docet Damageron: si terebinthi fructus in mola, quemadmodum oliua, molatur, & exprimat. Ipsi autem nuclei in porcorum cibum veniunt, atque igni etiam alimentum sufficiunt. Expressimus etiam ex arbore pseudocomoro quam vocant: quippe semine copiosissima, & hyeme eius rami onerati seminibus solis conspiciuntur. Februatio mense collegimus, & friauimus, os in sex vel septem partes rupitur, nuclei pyro assimilantur, tunduntur, & abeno calefacti, prælo subiecti, oleum remittunt, claram lucem efficit in lucernis, quarumque partem seminis olei effundunt. Ex sanguinea arbore etiam bonum ad lumina oleum exprimitur. Septembris medietate acini maturi ex corymbis decerpantur, si

decerpantur, si
horam ferè ea
mam ferè par
minibus, quæ
tulis is, calefa
aprilissimum, qu
rur. Proximū
tonem, alii trix
nit altitudine
10 pallidarumque
in aqua, innata
qua sale asper
docet, Ricino
sternito, ut pe
cadat, tum fra
leberem plum
reddiderint, ig
parua colligito
glabrique ad
10 sportulam con
pestiuitas ricin
Scribit Plinius
ob id ellychnia
te collegimus, t
tur, calido abe
fer. Bis tundi
ut superiora fre
pro ex raphani
Gallia ex rapha
30 euelluntur, ac
tur, ut Maio se
Sed aliud est r
dit semen. Ex
luminibus, &
quinque sem
epies. Aratu
leum ad lumi
loris, copiosu
quod inter leg
40 simi fere vbiq
Plinius.

decerpantur, finito paucis diebus siccescant, tundantur, ac aqua aheneo vase per horam ferueant, præloque subiciantur, oleum viridis coloris habebis, septimam ferè partem seminum: hoc vtuntur monticolæ. Ex vuarum acinis, siue seminibus, quæ Græci gigarta vocant, oleum exprimitur. Cisalpina Gallia ex contulis iis, calefactis, & torculari expressis, sed paucum excipit. Verum luminibus aptissimum, quia clarissimum lumen reddit. Ex herbis copiosissimum extrahitur. Proximum fit è cici (vt Plinius inquit) arbore in Ægypto copiosa, alii crotonem, alii trixin appellant, ibique non pridem. Et in Hispania repente prouenit altitudine oleæ, caule ferulaceo, folio vitium, semine vuarum gracilium, pallidarumque. Nostri eam ricinum vocant à similitudine seminis. Coquitur in aqua, innatansque oleum tollitur. At in Ægypto ubi abundat, sine igne & aqua sale aspersum, exprimitur, cibus fœdum, lucernis utile. Dioscorides clarius docet, Ricinos eius maturos in solem conferto, expansosque vuarum modo sternito, vt perarescant, nec dimoueto antequam cortex sponte rumpatur, & cadat, tum fraces eorum collectas in mortarium diligenter contundito, & in leberem plumbatum relatas, igne inferuefacito, ubi verò succum omnem ita reddiderint, ignem subtrahito, atque oleum omne, quod innatat, tollito, & in parua colligito cornua. In Ægypto ubi abundat, aliter elicitur. Repurgati, deglubiti que ad trusatiles molas feruntur, ubi diligenter frangantur, pinistros in portulam coniiciunt, deinde machinamētis cremor omnis exprimitur. Tempestiuitas ricini ad decerpendum, cum folliculi, qui bus ambitur, abscedunt. Scribit Plinius ex oleo fieri obscurum lumen propter nimiam pinguedinem, ob id ellychnia ex vua fieri, claritatis præcipua. Nos Septembris hic medietate collegimus, tunc cum spinoso operculo, & tunica semine integre spoliatur, calido aheno facillime mundatur, olei pondus seminis medietatem refert. Bis tunditur, exprimiturque. Ex sesama Indii oleum facere dicuntur: fit, vt superiora fieri diximus, copiosum & optimum remittit. Plurimum in Ægypto ex raphani semine, vtuntur que obsomandis cibus vnà decocto. Cisalpina Gallia ex raphani, & raparum semine elicit. Sed rapæ Nouembri mense solo euelluntur, ac sabulo obruuntur, cum suis frondibus, Martio mense plantantur, vt Maio semine proferant: nam nisi euellantur, hyemis frigore gelantur. Sed aliud est rapigenus, quod Iulio ferunt, sarculatur, vere proficit, Maio reddit semen. Ex quarta modii parte duodeviginti olei libræ eliciuntur, bonum luminibus, & cibus plebis. Si huiusmodi semine integrum iugerum seminabis, quinque seminum onera colliges, & ex vnoquoque olei libras ducentas percipies. Aratur, sarculaturque solum. Ex myagri semine copiosum elicitur oleum ad lumina. Cisalpina Gallia ex quodam semine, *dradella* dicto, aurei coloris, copiosum sibi comparat oleum. Folia sunt ei laciniata syluestris erucæ, quod inter legumina ferunt. Eodemque modo ex vrticæ, & sinapis semine, & lini fere vbi que, quod lucernis plus durat. Ex oriza Indos oleum facere scribit Plinius.

Olea, & oleastri materies. CAP. XXXIX.

DE olea, & oleastri materie hæc habet Theophrastus. Olea spissa est corpore, atq; crispa, ideoq; ex radicibus olearum minora simulachra sculpebant, quod carnis æquabilitate constarent, neque dehiscerent in rimas. Eius materiem perpetuam dicunt amaritudinis causa, neq; tineæ rodit, neq; tere do exest. Medulla eius orbicularis non est, quia medulla carere omnino existimatur. Nec distrahi posse autumant, id est ut mota medulla, contorqueatur materies. Pondus sustinere non valide potest, & nonnunquã rumpitur. Malleus & terebra ex oleastro optime fiunt. Ignem quamvis optimè subditum excipiat, quod pingui, & spissa materie sit, ignariis tamen suo virore æterno ineptissima habetur. A quo Plinius. Nec carnem, nec adipem habet olea, nec medullam, minimumque etiam sanguinis. Cariem vetustatemq; non sentit oleaster, & olea. Rimam, fissuramq; sponte non capit. Omnia in maritimis nauibus obnoxia tere dini tradunt, præter quàm oleaster, & olea. Incuruatur, ceditq; ponderi. Terebris vaginas ex oleastro, & malleos vtilissime fieri dicunt. Lignum ex quo Vlysses Polyphemo oculum transfixit ex olea fuit, authoribus Homero, & Euripide. Et securis manubrium, quod Vlyssi Calypso dedit eodem scribere, etiam oleagineum fuit. Fumus, qui ex olea exurgit, caput grauat, & caliginem ob oculos obducit.

Super olei natura veterum Philosophorum aliqua notata digna.

CAP. XL.

QUÆRIT magnus Peripateticus, cur oleum facile stet, & vinum rareret congelascat. Vinum iccirco minus cito coalescit, quod semina quadam caloris in se habet, estque natura ignitius, ob eamque rem ab Homero dictum æthopænon, id est calidum vinum, potumque calefacit corpora, sed oleum quoque calorificum est, nec minorem vim corporibus calefaciendis habet. Sed si isthæc, quæ calidiora sunt, difficilius gelu coguntur, congruens est, ut quæ frigidiora sunt, facile cogantur, acrum autem omnium frigorificum est, atque id nunquam tamen concrevit. Num igitur magis causa oleo coaguli celerioris in leuitate est, faciliora enim ad coeundum ideo videntur, quæ leuiora, leuioraque. Ad explicandum quoque olei naturam & illud pertinet, quod potum vomitum cit, & præsertim flauam bilem: cuius ratio est, quod leue sit, & superna petens, cibos ipsos elicit, ad stomachum eleuans, stomachus verò grauat vim egestiuam ad vomitum exulscitat, præcipue flauam bilem, utpote leuem, tenuissimam, ac facile sursum euadentem. Quæritur etiam cur oleum inter cætera liquida non remiscetur: quoniam glutinosum est, & in se reductum nequit dissecari in minutiores portiones, reliquisque liquoribus immisceri. Quæritur etiam vinum cur medium optimum, melinum, oleum superfluens? Inquit enim Hesiodus, cum ad medium dolli peruenrum est,

est, comparcen
proculdubio vin
posiorum septim
quoniam crassu
est. In oleo, quo
proinde superna
tis vtiulque par
tarchus verò inc
gere videtur, in
culæta impurita
mo est, ex aeris c

IO A

P

gnauerit, na
tempore co
neg; frutex,
medium inte
caudice, ram

est, comparandum, ceteris eius partibus ad satietatem abutendum, optimum proculdubio vinum significans, quod in dolji cōsisteret medietate, quod symposiorum septimo idem comprobat Plutarchus. Cuius ratio est. Quod mel quoniam crassum sit, & terrestrem prorsum naturam respiciat, melius in imo est. In oleo, quod superfluit ideo creditur præcellere, quoniam aerium sit, ac proinde superna scandat, naturæ suæ vi, comparatione vinum in proprietatis vtriusque participatum veniens ad dolji mediana creditur præcellere. Plutarchus verò inquit, quod vini vis calida censetur, ob id ad medium sese colligere videtur, in ibique bonitatem cōfouere: nam quod inferius est, quia faculēta impuritate permixtum est, sapore deterius sentitur: quod verò in summo est, ex aeris conuicinia facile corrumpitur, & illius permistione diluitur.

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER SEPTIMVS

SIVE

VINEA.

PROOEMIUM.



Dum oliuetum clausimus, ordo flagitat, vt vineam aperiamus, vt vuarum & vini voluptatem, & vtilitatem degustemus. Absoluta enim arborū commentatione, ad cætera è terra nascentium genera perueniamus. Eum tamen rogatum velim, qui hanc nostram ingreditur vineam, ne ipsum vlla sui honoris gloria defraudatum iri sibi persuadeat, si in septimū librum reiecerimus, quum maximus Cato in iuris censu principem ei locum assignauerit, nam vt & stirpium dignitati & scribendorum seriei, vno eodemque tempore consuleretur, nunquam præstare potuimus. Vitis enim neq; arbor, neq; frutex, suffrutex, aut herba est, sed variaz veterum agricolarum sententiæ, medium inter hæc quoddam esse censuerunt. Theophrastus quod simplici caudice, ramis brachiata, surculosa, dissolutuque contumax assurgat, eam ar-

borē appellat. Columella verò libro de arboribus arborem ficū, & oleā vocat, rosam fruticē, vitem autem tertium quiddam, quod neq; arbor neq; frutex propriè dici possit. Cōsultò igitur post arbores de vite dicemus: frutices, & herbas, dicturi in subsequētib. In præceptionib. Theophrastū, & Columellā sectabimur, qui inter ceteros de vinea diligentius, accuratiusq; scripisse visū sunt.

De vitis & vini laudibus. CAP. I.

VITIS laudes à iucunditate, utilitate, & necessitate desumemus, quas humanis corporibus affert, & adeò insignes, ut ad humanā vitā commoda, maxima Dei benignitate fuisse elargitam agnoscere debeamus. Vitis fructus (ut hinc incipiam)estate optimus est, iucundissimè sapit, nutritq; & in arbore sua usq; ad hyemem vivit, inde laquearibus suspēsus, usq; ad aliorum proveniētū viridis suas prorogat moras, ut verus simul, & novus conspiciatur: mox passus, assiccatusq; non solū anno, sed pluribus annis asseruatur, ut commodè in alienas regiones transferatur. Ex eius succo fit vinum, cuiusmodi liquor tantum tribuisse ferunt Æsculapium, ut aqua illum cū numinibus lance statuerit. Homerus Deum fecisse scribit vinū, curis mortaliū & mœstitiis dissipadis.

O Menelae dii fecerunt optima vina,

Qua tristes hominum curas dispellere possint.

Plato vinū remediū vocat senectutis: nā eius potū mœstitiæ obliuione capiuntur senes, ut iuvenescere videantur. Niceratus à Poetis nil optimū fieri posse dicit, nisi prius biberint, ac plus etiam quā sit æquum. Alexis eos, qui se largius inuitant, vinum loquaces reddere. Vnde auctor in Cratinum.

Vinum equus est lepidus promptus, veloxq; Poeta,

Si potantur aqua, nil paris egregium.

Diphilus comicus ait vino conciliari bibentibus risum, sapientiam, docilitatem, & bona consilia.

Prudentibus, ac cordatis omnibus amicissime

Bacche, atq; sapientissime, quam suavis es,

Abiecti magnificè ut sentiant de se, tu solus efficias,

Superciliosus & retricis persuades, ut rideant,

Ignavis ut audeant, ut fortes sint timidis.

Est enim liquorū omnium suauissimus, purissimum generat sanguinē, ocysimè vertitur in alimentum, concoctionē adiuuat, cerebrum purgat, intellectum auget, cor exhilarat, spiritus viuificat, flatu discutit, innatū calorem roborat, cibi appetentiam inuitat, obstructions aperit, & calorem conciliat. Auicēna semel saltem in mēse ebrietatē admitti debere iubet, ut inde insignes sequatur humanā vitā emolumentum: nam animalibus virtutibus leuamentū, & quies inducitur, somnus profundior conciliatur, ac sudore, quā superfluerint, resoluit. Vita conciliator etiā est: nā veneno obluatur, & quæ veneno obluantur, vitæ salutaria censentur. Cicuta homini venenum est, cicuta vinum mox haustum, Plato libro de legibus inquit, ad bonam valetudinē vsum

vini conducere, vnde de dando eo volumen Asclepiades scripserit. Nec solum gustatum corpus egregie alit, sed eius exhalans odor (spiritus excellenter nutrit, voluptate sensus omnes delinens, calidum, odorum, ac nitens. Maesithicus ad remedia mille prestare ait,

— vinum Deos

Mortalibus monstrasse recte utemibus,

Illas enim, modeste qui bibunt, alit,

Animumq; pariter, & corpus roborat,

Ad vsus medicina varios est utilissimum.

Miscetur iis, quæ propinantur pharmacis,

Ulcera lauare corpus vino expedit,

Animum exhilarat.

Quapropter Bacchum omnibus in locis vocant

Medicum, quibusdam verò edixit Pythia,

Bacchum vocandum sanitatis presidem.

Horatius nullam esse posse hilaritatem in eo, qui aquam bibat, inquit festi-
uè ad Mecenatem:

Prisco si credas, Macenas docte, Cratino,

Nulla placere diu, neque viuere carmina possunt,

Quæ scribuntur aqua potoribus.

Socrates apud Xenophontem, vinum, ait, non aliter mœrori mederi, quàm mandragora hominibus, lætitiâq; non aliter excitare, quàm oleum inpersum igni flammâ adauget. Apud Philostratum vinitor sub vitæ confidendum Phœnici suadet, quod ex ea spirare soleat læticia. Et Salomon ait, Exultatio animæ & cordis vinum moderatè sumptum: ad iucunditatem enim creatum est. Maro,

Ad sit lætitiæ Bacchus dator.

Apud Homerum si aliqua celebratur hilaritas, ipsa pauimenta vino natant, & musica, quæ ad hilaritatem comparata, nullo alio magis stimulo comparatur, quàm vino. Ovidius,

— nec non & carmina vino

Ingenium faciente canunt.

Tibullus Ofirum vitisatorem laudans, ita cecinit.

Ille liquor docuit voces inflectere cantu,

Mouit & ad certos nescia membra modos.

Si utilitatè autem, quæ ex vitibus percipimus, inspexerimus, vberiorè ceteris rebus redditum percipiemus. Proinde M. Cato & illum sequutus Varro, singula iugera vinearum sexcentas vini vinas præbuisse scribunt. Narrat Columella vitæ effudisse vuarum numerum duorum millium, & apud eum octogenæ stirpes in sita intra biennium septenos cullos per aquarum, ut primæ vineæ ceteras amphoras iugeratim præberet. Probabiturq; Iulii Græcini calculo, si quis agri iugera, & dotè, & pedamenta, & vimina comparauerit, pretiumq; usure soluerit biennii temporis,

quo vinea, velut in infantia, cessat à fructu, etiam vinitoris mercedem soluendo, ac omnium vsuram, redditum è vineis sortem & vsuram longè superare. Vnde ipse nil magis rusticis conuenire quàm vitem colere præcepit. Idem querefert Paridium quendam Vererensem duas filias, & vineis confitum habuisse fundum, cuius partem tertiam nubenti maiori filia dedisset in dotem, ac nihilo minus æquè magnos fructus ex duabus partibus eiusdem fundi percipere solitum. Minorem deinde filiam nuptui collocasse cum dimidia parte reliqui agri, nec sic ex pristino redditu detraxisse.

De vitis, & vini inuentore. CAP. II.

ATHENÆVS Dipnosophistarum libro 2. refert, Hecataum Milesium dixisse in Ætolia vitem primum inuentam fuisse: Oresteia Deucalionis filium ad Ætolia Regem venisse, illi quæ caudicem suam canē peperisse, quem quū defodi iussisset, natam ex eo vitem vnīs onustam, ac ideo gnatum suum *φύλον*, id est satorem appellasse, nepotem quæ; ex illo genitum OŒnea, à vite scilicet, quam prisci Græci *ὠνείδα* nuncupabant, Ætoliam quæ ab OŒneo fuisse procreatum, Virgilius Bacchum primum vino aquam miscuisse dicit,

Liber, & alma Ceres, vestro si munere tellus

Chaoniam pingui glandem mutauit arista,

Pocula quæ inuentis Achelora miscuit vnīs.

Ex quo Probus hæc norat: Ætolus pastor Staphylinus nomine, quū OŒnei capellas in pabulum deduceret, notauit vnā præcipuè egregiè lauiorē, ac ceteris se in præsepia seriùs recipientem, cuius rei vt causam cognosceret, sequutus eā elàm est, & in remota stirpe animaduertit vnam edentem, pomum ei incognitum, substulit ergo, & OŒneo Regi protulit, qui expresso humore delectatus est, quum quæ; eum vetustate cognosceret mitescere, Libero patri, à se hospitio accepto apposuit, cuius rei cultū quū demonstraret Libero, vt perpetua inuentorū esset gloria, constituit, vt ab OŒneo cœnon appellaretur vinū, à Staphyle, vna staphylis. Varro Bacchum vitis repertorē vocat: nā quum capræ vitis virgulta carperent, eam quæ; corrūperent, esse institutum, vt Libero patri vitis repertori hircus immolaretur, videlicet vt capite pœnas daret. Ex Theopompo accepimus apud Chios vitem primū nigram esse inuētā, quin eosdem omnium primos ab OŒnopione didicisse vitē colere. Philonides Medicus tradit vitē à Baccho in Græciam è mari rubro translata, quapropter Græci, quū remetum inter cœnandum infertur mensæ, elato clamore bonū Deum vocāt illius inuentorem Bacchum. Tibullus Osirim vitisatorē laudat. Sunt qui Rheg vitem sacram dicant. Et eiusmodi deæ de vitē fieri simulacrum tradit Ephorion. Accius in Bacchis Dionysium primum vitem plantasse ait: O Dionysie pater optime vitisator Semele genitus. Ouidius idem putat,

Additur his Nyseus, in tonsus, Thioneus,

Et cum Laneo genialis confitor vna.

Recitat quæ; de eo hanc fabulā. Quum amaret Iuppiter Semelem Cadmi filiā,

& ipsa

V
 & ipsa ex eo
 inito quæ cum
 arbitrari se di
 piter eo pacto
 Strygis iurament
 inde munus po
 fulminauit, &
 tempus partu
 dit, quæ ei alim
 Sed per hanc fa
 num intelligitu
 morem terræ i
 dam facit, & in
 munit. tunc fu
 ratem, sed por
 tur necesse est
 quum pressum
 potui aptum re
 rumpatur, scilic
 id est, vitis vere
 apertis bottis co
 vt quod ex matr
 occulit, id est, pa
 miditaribus in st
 eius alumnus est
 est inuenis, quæ
 creta propalet.
 primo vini vsum
 plantasse certiss
 30 terpretationem
 quæ est in Lim
 carum Bacchu
 mustum biber
 pellari, quoniam
 sic temperatu
 ait, quibusda
 libitis, quum
 miles concide
 fuerat, aqua re
 40 locum reuerse
 propter inter

& ipsa ex eo concepisset, accessit ad eam Iuno, formam gerens Beroës anus, initoque cum ea colloquio, perquisiuit num à Ioue diligeretur, cui respondit, arbitrari se diligi. tunc docet Iuno, vt cognoscat si ametur, vt promittat Iuppiter eo pacto secum coniungi, quo cum Iunone coniungeretur, interposito Strygis iuramento. Semele experientia auida, venienti deo iuramentum, & inde munus poposcit; condolens Iuppiter ne aduersus iuramentum ageret, fulminatur, & è mortua vtero filium traxit, suoque apposuit femori, donec tempus partus perficeretur. Hunc primum Ino nutriuit, mox Nymphis tradidit, quæ ei alimenta dedere, & ne à Iunone inueniretur, hederis occultauere.

- 10 Sed per hanc fabulam quid Physici intelligant enucleemus. Per Bacchum vinum intelligitur, per Semelem vitis, quæ ex Ioue, id est, ex calore in altum humorem terræ immixtum per vitis poros trahente, se prægnantem, vel turgidam facit, & in palmites, botrosq; succos, tanquam in conceptum fœtum emittit. tunc fulminatur, quum adueniente autumnali calore, non in maturitatem, sed potius in corruptionem conceptum fructum ducit, vnde auferatur necesse est, & femori Iouis, id est, alteri calori applicetur, quod euenit quum pressum vinum ad bulliendum traditur, donec bullitione defæcatum, potui aptum reddatur. Ino in contactum fert, ne à Iunone, id est, ab aëre corrumpatur, scilicet in vegete seruetur. Vel aliter sic. Semele prægnans ex Ioue, 20 id est, vitis vere turgens, fulminatur, id est, æstiuo calore concoquitur, tunc apertis botris conceptum emittit, qui Iouis femori, id est, calori applicetur, vt quod ex matre non habuerat, in vegete maturitatem concipiat. Ino eum occultit, id est, pampinis tegitur, illum nutriunt Nymphae, id est, nocturnis humiditatibus instauratur, quod diurno calore fuerat exustum. Silenus senex eius alumnus est, quod senes non esca, sed potu sustentantur. Semper Bacchus est iuuenis, quod vini vires nunquam senescant. Nudus est, quod omnia secreta propalet. Græci Bacchum dicunt primum vitem plantasse Thebis, eisq; primo vini vsum demonstrasse, sed longè prius apud Hebræos. Noe vineam plantasse certissimum est. Sed Phædemus apud Athenæum aliam affert interpretationem, dicens Athenienses haustum è dolis mustû ad ædem Bacchi, quæ est in Limnis, deo miscuisse, deinde ipsos bibisse, ac propterea fuisse vocatum Bacchum Limnæum, quoniam aqua mista tum primum temperatum mustum biberunt, eademq; ratione fontes, ac Nymphas, Bacchi nutrices appellari, quoniam aqua permista vinum augetur: quum igitur bibissent vinum sic temperatum, læti ac hilares Bacchum versibus canebant. Philonides verò ait, quibusdam ad litus maris compotantibus, intemperati vini voluptate delinictis, quum alii furis actris insanirent, alii obruti vino, & crapula mortuis similes conciderent, ingruente pluuia, poculum, in quo parum vini relictum fuerat, aqua repletum fuisse, deinde facto sereno cælo, conuiuas in eundem 40 locum reuersos vinum dilutum gustantes, miram voluptatem sensisse: quapropter inter cœnandum quum infertur mensæ, elato clamore Bacchum re-

pertorem inuocant, & Iouem seruatorem, pluuiæ largiorem, & vini moderatorem. Infans etiam Bacchus effingitur, quia bibentes insanite facit. Cornutum pingebant, quia antiquitus cornuum bubulorum pro poculis vsus erat, antequam inuenta alia essent vasa, & in Cizico tauri effigie colebatur.

De vitis nomine. CAP. III.

HECATÆVS Milesius, vt diximus, authore Athenæo, à priscis illis Græcis vitē *οἶνός* dici, ab O Eneo fatoris nepote ait. Ab aliis *αἰνός*. Latinis vitis dicitur. M. Varro à vino ferendo, siue quòd inuitet ad spem percipiendarum vuarum. Alii vitem dictam dicunt, quasi vitam, propter multam humanæ vitæ quam affert vtilitatem. Vel vitis primùm dicta videtur, quod inuitetur ad vvas pariundas. Et à pariendo parilema, ex imminutis literis, vt in multis dici cœpta est palma. Italis *vite*. Eius fructus succus à Græcis *οἶνος*. Colophonius Nicander vocatum censet ab O Eneo,

*Qui vinum pateras O Eneus diffundit in amplas
Οἶνός, quod retinet, nomen dedit.*

Idem recitat Melanippides Milesius. Plato in Cratylo vocis *οἶνος* rationem & originem indagans, sic dictam fuisse inquit, quòd animum nostrum implet *οἶνός*, id est, arroganti de nobis ipsis opinione, vel *οἶνός*, id est, vtilitate, quam ex eo percipimus. Latini vinum. Itali *vino*.

De vitis generibus, & primò de escariis. CAP. IIII.

VIRGILIUS Maro vitium genera omnia colligere, nec vtile esse, nec possibile dicit,

*Sed neque quàm multa species, nec nomina quæ sint
Est numerus, neque enim numero comprehendere refert.
Quem qui scire velit, Libyci velut aquoris idem
Discere quàm multa Zephyro turbentur arena,
Aut ubi naniguis violentior incidit Eurus,
Nosse quot Ionii veniant ad littora fluctus.*

Columella, Vniuersæ regiones, regionumq; penè singulæ partes habent propria vitium genera, quæ consuetudine sua nominantur. Quædam enim stirpes cum suis locis vocabula mutauerunt, quædam propter mutationes locorum etiam à qualitate sua discesserunt, vnde nec numerum, nec appellationes certa fide referre quis potest. Nos Plinium imitabimur, qui ait: Genera vitium numero cõprehendi posse vnus existimauit Democritus, cuncta sibi Græciæ cognita professus: cæteri innumera, atq; infinita esse prodiderunt, quod verius apparebit ex vinis. Nec omnia dicentur, sed maximè insignia, quippe quæ toridem penè sunt, quot agri. Quamobrem celeberrimas vitium, aut quibus est aliqua proprietate miraculum, ostendisse satis erit. Nos primùm vitis genus in satium & sylvestre diuidemus, de satiuo primùm, mox de sylvestri d. Cturi. Satiuum

V
dum genus ali
vvas, quæ ad eff
bet Columella
banus est ager,
mum vendere.
mendentur. N
suerum tempus
dicitur, quia I
pne, quia prima
10 cini: puto Plini
reant parui, mi
cocibus est, pra
la ait: Magnis
goque & arbor
nam duæ lana
tate sunt dispa
lo feracissima,
dislocis apri
ture lectæ: plu
20 propter hanc e
re cognomen
iplæ pubescun
tera properant
bre putrescunt.
qua Myrtis ap
vinum dendro
tiarenum vocat
ti præstantissi
rit confita, fr
30 us in cibo inu
tant. Est aute
eosq; torunde
reant. Ceteru
lignosas hab
frequenti pa
tur. Græci h
signi moschi
bis neq; mosc
rū est genera
40 solum ad escan
mur) duro, & c

uum genus aliud ad escam, aliud ad effusionem est, vocabant prisci escarias
 uuas, quæ ad esum erant: ad effusionem, quæ vino effundendo plantantur. Iu-
 bet Columella ad escarias uuas, non instituenda vineta, nisi quum tam subur-
 banus est ager, ut ratio postulet, inconditum fructum mercantibus velut po-
 mum vendere. Eæque non solum iucunditate saporis, sed etiam specie com-
 mendentur. Nos à præcocius incipiemus. Præcoces vites sunt, quæ ante con-
 suetum tempus maturitatem sentiunt. Quæ prima nobis maturatur *Gingliese*
 dicitur, quia Iunio mense mitescit, specie & sapore commendabilis, sed præci-
 pue, quia prima exoptata venit: adherent in racemo pregrandes, & minimi a-
 10 cini: puto Plinii leptoragam. Est & illa natura lasciuiæ, ut prægrandibus adhæ-
 reant parui, mites & suauitate certantes, leptoragas has vocant. Apiana è præ-
 cocibus est, præcipui gustus celeberrima, ad escam, & ad effusionem. Columel-
 la ait: Magnis etiam dotibus tres apianæ commendantur, omnes feraces, iu-
 goque & arboribus satis idoneæ: generosior tamen una, quæ nudis foliis est,
 nam duæ lanatæ quamuis frondibus, & palmitum pari facie fluxuræ, quali-
 tate sunt dispariles, quum tardius altera recipiat cariẽm verustatis. Pingui so-
 lo feracissimæ, mediocri quoque fecundæ, præcoquis fructus. Ideoque frigi-
 dis locis aptissimæ, vini dulcis, sed capiti, nervis, venisq; non aptæ, nisi ma-
 20 ture lætæ: pluuiis, ventisq; & apibus afferunt prædam, quarum vocabulo
 propter hanc expopulationem cognominantur. Plinius: Apianis apes dede-
 re cognomen, præcipue earum auidæ. Ex his duo genera lanugine &
 ipsæ pubescunt. Distant quod altera celerius maturescit, quamquam & al-
 tera properante. Situs frigidus non respuunt, & tamen nullæ celerius im-
 bre putrescunt. Florentinus præ cæteris eam celebrat. Ex omnibus vitibus,
 quæ Myrsinis appellatur, præstantissima est: hæc est enim, quæ in Bithynia
 vinum dendrogaleum appellatum facit, & rursus in aliis eius regionibus
 tiarenum vocatum. In Tio verò Paphlagonia tianum, & in Heraclea Pon-
 ti præstantissimum vinum, & omnino ubicunque huius vini planta fue-
 rit constituta, fructum multo aliis præstantiorem producit: nam & uua ipsi-
 30 us in cibo iucundissima, & nectarea existit, ut etiam apes inde pabulum pe-
 tant. Est autem & fertilis valde, ut per omnem caudicem botros ferat,
 eosq; rotundos, acinos verò perspicuos, ut & vinacea, & pelliculæ transpa-
 reant. Cæterum appendices ex quibus dependent botri, ut plurimum duras &
 lignosas habet. Gaudet autem maxime arboribus, & eiusmodi altitudine, &
 frequenti pampinatione. At verò vinum ex his assidua defæcatione delecta-
 tur. Græci stichin vocant. Nos Neapoli vulgò vuam moschatulâ dicimus, ab in-
 signi moschi odore, quum estur. Maiores nostri moschum ignorabât, ob id neq;
 his neq; moscho redolentibus fructibus à moscho nomen imposuerunt. Duo-
 40 rum est generum albi nigriq; Est & aliud genus vuarum omnium nobilissimum, quo
 solum ad escam utimur (quum prædictis generibus ad escam, & effusionem uti-
 mur) duro, & calloso corio, carneq; magnitudine cæteras antecellens, odorato

ac nectareo succo, colore verè aureo: vulgo *moscarellone*. Ex temporaneis præcipuè duracina est. Plinius, Vua non aliubi gratior callo, vt inde possit inuenisse nomen, duracina. Constat enim carne, & duro corio, magno acino, saporis dulcissimi, coloris aurei nigriq;, maturatur æstate, magnatum mensis carissima, vulgo Neapoli *vua duraca*. Est & alterum genus minoris acini, sed durioris corii, quod in arbore sua vsque ad hyemem durat, suspensum verò laquearibus, vsq; ad nouarum prouentum. De his videtur Cato intellexisse, in-
 quiens, Vuas, quas suspendas duracinas. Et ab eo Plinius: Duracina sine vllis
 vasis in vite seruabilis, tanta est contra frigora, æstus, tempestatesq; firmitas.
 Vesuuio vulgò dicuntur *toftole maiorine*, & *minorine*. Est & apud Columel-
 lam pergulanæ memoria. Nam has nuper mihi cognitæ, pergulas dico:
 ob id non facillè asseuerem, quo gradu habendæ sunt. Dictam puto pergula-
 nam, quod pergulis viuat, retinetq; adhuc nomen Romæ: nam vulgò *pergo-
 lese* vocatur, præcipua apud Tiburrinos. Neapolitani *vua groia*. duracine sus-
 pensa vsque ad aliarum prouentum. Bumastos inter escarias vuas Columella
 cõnumerat, & specie insignes. A Virgilio inter præstantissimas cõnumeratur,

— *Tumidis bumaste racemis.* —

Varro bumammam vocat, atq; à magnitudine sic dictam putat, & à boue
 dici pleraq; magna, vt *βούκων, βότεινα, βούκων, βούτιν*, & vuam quoq; bumam-
 mam. Plinius de eiusmodi vua, Tument verò mamarum modo bumasti. Græ-
 cis *βύμας*, quasi bouis, siue vaccæ mamam dicas, est enim mammarum mo-
 do figurata & magna. Retinet adhuc Neapolitanum vulgus prisicum nomen,
 nam *vua mennauacca* vocat, *menna* enim vbera dicit, quasi vaccarum vbera.
 Duplex genus, album nigrumq;, quod non racuit Plinius. Et bumasti totidem
 coloribus, scilicet albæ nigræq;. Sequitur Plinius: Et magis purpureæ cogno-
 mine bimammia, quando non racemos, sed vuas alias gerunt. Macrobius bu-
 mammiam non bimammiam dicit, nominis vicinitate deceptus. Hæc in Ve-
 suuio monte reperitur, innominata & escaria. Prælongo constat racemo, aci-
 ni non infarcti, vt in cæterarum racemis, sed bini acini à principio racemi vsq;
 ad finem, purpurei coloris. Sunt & ceraunia. Columella inquit: Nos vuam
 corneolam vocamus, Græcam nomenclaturam sequuti. *κέρας* enim cornu
 instar curuatur. Apud nos alba, nigraq; est, & triferi proventus. Quæ sit Co-
 lumellæ vncialis declarat Plinius, velut à pondere acini. Neapoli vulgo dici-
 tur *vua pruno*: nam acini prægrandes instar pruni, vt ab vnciali pōdere parum
 distent. Tripedaneæ nomen Plinius à mensura dici confirmat, nam longitu-
 dinem trium pedum racemus æquat. Sed harum apud nos multæ sunt species,
 vt non solum trium pedum longitudine sint, sed pondere triginta librarum.
 Inter alias vna est, quæ *vua San Nicola* vocatur. Stephanitæ sunt Columel-
 læ vuæ, de quibus Plinius, & coronario naturæ lusu stephanitis, acinos foliis
 intercurrentibus. Hanc ipse non vidi, nec contrigit ab amicis visam audire, sed
 plerasque conspexi, acinos foliis intercurrentibus, casu enatis. Nec reticebo
 speciem

speciem nostris
 verò albescente
 re putantes, in
 Theophrasti cap
 nigrum præstat
 non solum gerit
 ad florem vsq; t
 quas ob id infan
 florent. M. Va
 10 Hæc apud nos v
 floret cum aliis
 dunt palmitem
 ea prima watu
 superuentu no
 puro Plinii ter
 phraisto & Var
 de peregrina
 ter vites bonita
 Atyli porrigunt
 10 ci vocant digite
 militudine. Ho
 les, vtriusque
 lio Thasie, &
 ea, & consemin
 quas longum e

D^{lximv}
 ma om
 Sa

30 Cato, In
 & nebulosio
 duntur. Co
 cæli statu
 gis aut min
 Ex cūm flu
 gnoaimus,
 iugo, illic
 iorem, quia
 rumpitur,
 40 etiam arbu

speciem nostris hortis familiarem, cuius acini immaturi nigri sunt, maturi verò albescentes, ad illudendos amicos peridoneam, nam maturam ex colore putantes, in os iniecta, illud acerbissimo sapore conturbat. Quæ fortasse Theophrasti capnia vna erit, quæ ex nigro racemo candidum, & ex candido nigrum præstat. Insanas vuas memorat Theophrastus, suiq; generis esse, quæ non solum germinant, sed coquunt & florent, & racemantur, & si quid aliud ad florem usq; tantummodo veniat. Plinius ab eo: Vites quidem triferæ sunt, quas ob id insanas vocant, quoniam in iis alia maturescunt, alia nigrescunt, alia florent. M. Varro author est, vitem fuisse Smyrnæ apud mare biferam.

- 10 Hæc apud nos vulgaris est, diciturq; *vnatre volte l'anno*. Germinat primò & floret cum aliis, inde octauo calendas Iunii circa festum diui Ioannis incidunt palmitem supra florem, inde denuo germinans secundo floret, interea prima maturatur, tertio paulo post iterum floret, sed tertia vna hyemis superuentu non maturatur, sed acerba tota hyeme in arbore asseruatur. Sed puto Plinii tempore non fuisse in Italia, quum quæ scripsit de ea, à Theophrasto & Varrone mureretur, (si de ea intellexerit Theophrastus) tanquam de reperegrina loquentibus. Numerantur quoque dactyli à Columella inter vites bonitate, & specie commendabiles. Plinius ab eo: Prælongis dactyli porriguntur acinis. Et alibi. Dactylides gracilitate digitali. Dactylos Greci vocant digitos, ob id palmæ fructus Græci vocant dactylos à digitorum similitudine. Hodie Neapoli *vua digitella* dicitur. Sunt enim acini digitis similes, vtriusque speciei albæ, nigræve, & æstate maturantur. Sunt & Virgilio Thasiæ, & Libycæ, Columellæ venuculæ & nemesianæ, Plinio etesiæ, & conseminæ, & talpanæ: Athenæo staphylæ, nicostratiæ, & in fine aliæ, quas longum esset recensere.

De vnis ad effusionem. C A P. V.

DIXIMVS vuas ad escam eligendas, nunc quæ eliquescent in potum. Prima omnium se offert aminea celebratissima. Virgilius:

Sunt Saminea vites, firmissima vina.

- 30 Cato, In loco ostento soli amineum minusculum conserito, qui si crassus, & nebulosior, ibi amineum maius. Quæ in ollis, & ollæ in vinaceis recte conduntur. Columella hæc habet de amineis: Sole traduntur amineæ excepto cæli statu nimis frigido, vbi cunq; sint, etiam si degeneret, sibi comparata, magis aut minus probi gustus vina præbere, & ceteras omnes sapore præcedere. Ex cùm sint vnus nominis, non vnâ speciem gerunt. Duas germanas cognouimus, quarum minor ocys & melius deflorescit, habilis arbori, nec non iugo, illic pinguem terram, hîc mediocrem desiderat, longeq; præcedit maiorem, quia imbres & ventos fortius patitur: nam maior celeriter in flore corumpitur, & magis in iugis, quàm in arboribus, ideoq; non est vineis apta. vix
40 etiam arbutto, nisi præpingui, & vuida terra: nam nec mediocri valet, multoq;

minus in exili, prolixarum frequentia materiarum, foliorumq; & vuarum & acinorum magnitudine dignoscitur, internodiis quoq; rarior, largis fructibus à minore superatur, gustu non vincitur, & hæc quidem utraq; aminea. Verum & alia duæ gemina, quæ ab eo, quod duplices vuas exigunt, gemella vocatur, austerioris vini, sed æquæ perennis. Earum minor vulgò notissima, quippe Campaniæ celeberrimos Vesuvi colles, Surrentinosq; vestit. Hilaris inter æstiuos Fauonii flatus, austris affligitur, cæteris itaq; partibus Italiæ non tam vineis quàm arbusco est idonea, quum prædictis regionibus commodissimè iugum sustineant materiam fructumq; nisi quòd duplicem, non ab similem minori germanæ, quæ tamen minor, hoc melior est. quod fecundior etiam mediocri solo: nam illam nisi præpinguiterræ non respondere iam dictum est. Lanatam quoque amineam quidam maximè probant, quæ hoc vocabulum non ideo usurpat, quod sola ex omnibus amineis, verum quod præcipuè canescit lanugine. Sanè boni vini sed leuioris, quàm superiores, crebram quoq; materiam fundit, atq; ideo propter pampini densitatem, sæpè parum recte deflorescit, eademq; maturo fructu celeriter putrescit. Super hunc numerum singularis habetur aminea, maiori geminæ non dissimilis, primùm specie pampini, & trunci, sed vini sapore aliquanto inferior, quamuis generosissimus sit, proximæ præferenda etiam propriis virtutibus, nam & feracior est, & flore melius exuitur, spissasque & albidas vuas, actumidioris acini gerit, gracili aruo non desciscit, atque ideo inter vberrimas vires numeratur. Ab eo Plinius: Principatus datur amineis propter firmitatem, senioq; proficentem vini eius ubiq; vitam. Quinq; earum genera. Ex iis germana minor acino melius deflorescit, imbres, tempestatesq; tolerat. Non item maior, sed in arbore, quàm in iugo minus obnoxia. Gemellarum, quibus hoc nomen vuæ semper geminæ dedere, asperimus sapor, sed vires præcipuæ. Ex iis minor austro læditur, cæteris ventis alitur, ut in Vesuuii monte, Surrentinisque collibus, in reliquis Italiæ partibus non nisi arbori accommodata. Quia- rum genus lanata, ne Seres miremur, aut Indos, adeò lanugo eam vestit. Prima ex amineis maturescit ocysimè atq; putrescit. Sed videamus num conii- cere poterimus, quale nostris temporibus amineum sit vinum. Seruius in Virgilium, dicit amineum vinum dici quasi sine minio & à dictione priuatiua, & minio siue rubore, quasi album, non rubrum vinum sit. Macrobius inquit amineum vineum nuncupari à regione: nam Aminei populi sunt, ubi nunc Falernus est. Nos verò ex notis, quas affert Columella, dicimus amineum vinum esse nostrum vulgare Græcum: nam nobilissima notæ est inter cætera, diutiusque in vetustatem asseruatur, ut etiam centum annorum reperiatur. Inter cætera id peculiare habet, quòd vuas geminas ferat, nulliq; nisi ipsi contingit, scilicet racemum in duos diuisum. Duas solùm species vidimus, minorem, quam græcam dicimus, maiorem græculam. Eius vires Vesuuium montem conuestiunt, repèdentem fructu illata damna, ut inueniat apud posteros gratiam,

gratiam, ciner-
porum caput
to alias species
amignas vocat
millimum. Se
neq; purpurea
nigrior abund
conspicitur æ
nus asserunt;
quoq; solo se
grasq; medio
ræ. Præfertur
parcior. Athe
tis albescens.
colas antiqu
paniam vidi
ducit, purpur
annis putant
dunt, Vesuui
Columellæ, &
Apud nos adh
ea ad effusio
vlsq; ad præse
& alia, quas le
tilitatem pare

Nunc a
scripta
tranillatas, v
30 ponit Cam
puz contri
xime Faustu
pia porius
liaria à vic
in vino ma
genera, au
Gauranum
tem, nulli
inter alia vi

gratiam, cinere & conflagratis faxis, & calore suo vino vim tribuit. In patria potum caput tentat, mare transuectum, vi domita, mitescit, fitq; suauius. Puto alias species prope Beneuentum reperiri: nam ibi simillimas nostris uvas *ammignas* vocant, nobilissimumq; vinum fundunt, etiam nostro Græco simillimum. Sunt & Columellæ heluolæ, quas ab aliis varias dici testatus est, neq; purpureæ, neq; nigræ, ab heluo, ni fallitur, colore vocitate, melior est nigrior abundantia vini, sed hæc sapore preciosior: color acinorum in neutra conspicitur æqualis, utraq; candidi musti, alterna vice annorum plus, aut minus afferunt; melius arborem, sed & iugum commodè vestiunt, mediocri quoq; solo fecundæ. Ab eo Plinius: Insignes iam colore, inter purpureas, nigrasq; medio heluolæ, sæpius varianti, & ob id varianæ à quibusdam appellatæ. Præfertur in his nigrior, utraq; alternis annis fertilis, sed melior vino, quum parcior. Athenæus: Heluolū principio nigrum, aliquot post annis, non ita multis albescens. Apprimè bonum est, & delicatū. Ergo nostras hellanicas heluolas antiquorū dicerē. Duæ sunt species, altera altera nigrior, & extra Campaniam vidi dilutioris coloris, in Surrentinis vineis propè album vinum producit, purpureiq; sunt coloris, alternis annis fertiles, ob id apud nos alternis annis putantur: & si sint qui singulis annis parcius refecent. Vinum quod fundunt, Vesauio *lachrymam* dicunt, secundæ post græcum notæ. Oleagineam Columellæ, & Pliniū, dictam putant à similitudine oliuæ, nuper inuentam. Apud nos adhuc suum retinet nomen, nam uua oliuella dicimus, utiturque ea ad effusionem. Plinio alopecis dicitur caudam vulpium imitata, hæc etiam vsq; ad præsens tempus à vulpinæ caudæ similitudine, *coda volpe* vocatur. Sunt & aliæ, quas longum esset recensere, & lectoribus nauseam potius, quàm utilitatem parerent, ob id consulto omitimus.

De uinis. CAP. VI.

Nunc aliqua vinorum genera, & præcipuè insignia, à maioribus descripta recensere conabimur. Plinius, Gauranas vites, à Falerno agro translatas, vocari falernas, celerrimè ubique degenerantes. Falernus ager à ponte Campano læua petentibus vrbaniam coloniam Syllanam nuper Capuæ contributam incipit. Secunda nobilitas Falerno agro erat, & ex eo maxime Faustiano, cura, culturaque id collegerat. Exolefcit hoc quoque, copia potius, quàm bonitati studentium. Faustianus autem circiter quatuor miliaria à vico prope Cédias, qui vicus à Sinuessâ vi millibus abest. Nec ulli in vino maior autoritas, solum vinorum hoc flamma accenditur. Tria eius genera, austerum, dulce, tenue. Quidam ita distinguunt. Summis collibus Gauranum gigni, mediis Faustianum, imis Falernum. Non omittendum autem, nulli eorum, quæ celebrantur, iucundum saporem vix esse. Dioscorides inter alia vina principem locum obtinere dicit, quod facile coquatur. Græci

phalerum vocant: duo eius genera, austerum, ac subdulce: quod fit eiusmodi, si per vindemiam Auster fiat, & vinum nigrius fit: alio tempore & vento, quum est vindemia, tum austerum vinum fit, ex colore giluum. Athenæus ex Galeno. Hodie ager, ubi falernum nascitur, vulgò *alla falorni* dicitur, *alla rocca di Mondragone*. Ex eo non multum colligitur vinum, ut vix triginta vegetes impleat. Album est vinum & optimum. Malleoli variis in locis translati degenerant, & vernaculum vinum fundunt. Plinius, Ad tertiam palmam varia venere. Albana vrbi vicina, prædulcia, ac rara in austero. Hac Romæ placent, sed non conferenda cum Neapolitanis. Item Surrentina, in vineis tantum nascentia, conualescentibus maxime probata propter tenuitatem, salubritatemque. Tiberius Cæsar dicebat, consensisse Medicos, ut nobilitatem surrentino darent, alioquin esse generosum acetum. C. Cæsar, qui successit illi, nobilem vappam. Dioscorides & Galenus: Surrentinum post annum vigesimum quintum incipit aptum esse potui. Vix sanè hoc maturescit, quia valde squalidum, & omnino pinguedinis expers: solum propemodum ex omnibus, quum inueterascit, assiduo potu salubre. Nunc non solum tertiæ notæ, sed ne dignum quidem inter præfata numerari, idque euenisse puto, vel antiquos gustu caruisse, vel vitibus, quæ vinum illud fundebant, nunc locus omnino destitutus: nam diximus ex Columella, Vesuvii & Surrenti colles amineis vitibus plantatos: nunc ex vernaculis leue vinum fundunt, agris propriatur, quod facile concoquatur. Iuncta his præponi solebant calena, ait Plinius. Vbi Calenus ager fuerit alibi Plinius. Hinc Serini, & Cæcubii ob- tenduntur agri. His iunguntur Falerni, Caleni. Dein consurgunt Massici, & Gaurant Surrentinique montes. Locus hodie *Cacinola* vulgò dicitur, vel stellatus ager. Vinum est optimum, nec à Falerno longè distat, vulgò *vinno di Carinola*. Antea Cæcubo erat generositas celeberrima, in palustribus populeis, sinu Amyclano, quod iam intercidit, incuria coloni, lociq; angustia, magis tamen fossa Neronis, quam à Baiano lacu Ostiam vsque navigabilem inchoauerat. Ob fossam igitur, quam Nero perducere effreni animo cogitauerat, Amyclensium ager devastatus est, & sic cæcubum vinum dispersit, hodie incognitum, indictumque. Plinius de Mamertinis: Quartum curriculum publicis sepulis obtinere à Diuo Iulio (is enim primus autoritatem his tribuit) Mamertina circa Messanam in Sicilia genita. Mamertinum hodie Siciliæ celeberrimus locus, *Sauoca* dicitur, vulgò *vin di Sauoca*, prope Mamertum. Optimæ quoque notæ censebatur vinum trifolinum. Galenus libro de antidotis trifolinum collem in agro Neapolitano esse dicit, & Neapoli imminere, à multitudine trifoliorum ibi nascentium dictum putat, scilicet asphaltitis. Athenæus, Serius peruenit ad vigorem trifolinum, Surrentino crassius. Mons Neapoli im-
minens dicitur hodie, *monte di San Martino*, prope Antinianum, & mari

V
imminens, ubi
producit Treb
ventriculo. Tre
nunc solo aqua
citavit novis
poli lapidem T
alioqui semper
num fundit age
rentia affertur.
10 *Candia*. Putat
coniectura cau
balsa dicitur, v
bastes vino dat
Creta compo
pellasse. Gracu
parua, ut nisi p
vulgò dicitur, te
vinum, ut in Cre
bratissimum vin
20 tendere possit,

Sed vitis figu
Saplici caudice
tex multiplici tu
constat. Medul
tafronde lasciu
nola, nervosa, co
circa Memphis
fructum ambit
30 nica clausis. Ex
sed ad florem v
rattu asperitimi
in arundine, mi
succidas purgè
quia natura h
petuaque fert
sumitur, quod
consensu cunct
creandi vim ob
40 aliquando ex
ls est, semper re

imminens, vbi villa mea, optimum vinum ex omni vva, & cum cæteris certans producit. Trebellium è Neapoli, temperatis viribus est, ori iucundum, amicum ventriculo. Trebula olim in apertis campis inter Capuam, & Sueffulam stetit, nunc solo æquata, vbi cadauer iaceat ignoratur. Plinius: Campania nuper excitauit nouis nominibus auctoritatem, siue cura, siue casu, ad quartum à Neapoli lapidem Trebellicis, iuxta Capuam Caulinis, & in suo agro Trebulanis, alioqui semper inter plebeia, & trifolinis gloriata. Nec hodie spernendum vinum fundit ager iste, vnde à similitudine puto vinum *trebianum*, quod è Florentia affertur. Creticum ad nos è Creta aduehitur, dicitur hodie *maluasia* dici. **10** *Candia*. Putat Hermolaus monobasitis vocabulo corrupto, *maluasia* dici, coniecturæ causa, quod locus vbi Tanarum in Laconia monstratur, Monobasia dicitur, vnde in Cretam directo ferè cursu nauigatur. Fortè que monobasites vino datum est nomē, non quod ibi nascatur, sed quod illuc primum è Creta comportaretur. Vites, quæ illud fundunt, videtur Plinius græculas appellasse. Græcula non inferior amineis bonitate, præterea acino, & vva tam parua, vt nisi pinguiissimo solo colere non proficit. Apud nos hæc vva maluasia vulgò dicitur, tenera & paruo acino, & dulcissima, sed apud nos tam austerum vinum, vt in Creta non profundit. Rhetia, oppidum apud Veronam, vbi celebratissimum vinum nascitur, ibi *veraccia* vocatur, sed nescio an cum brutio contendere possit, omnium optimum & celebratissimum.

De vitis descriptione. CAP. VI.

SED vitis figuram, Theophrasto describente, adæmus. Vitis arbor est, simpliciter caudice assurgēs, ramosa, nodosa, furculosa, nec facile dissolubilis. Cortex multiplici tunica cingitur, qui radicis speciem gerit, qui humore, & nervo constat. Medulla carnosæ. Flagellis longè, lateque vagantibus, sarmentis lata fronde lasciuientibus, aliquatenus scissa, longis pediculis pendente, carnosæ, nervosæ, corticosæque, & tremula. Sed caduca. Ad Elephantidem verò, & circa Memphim, Delam, & Tylum quoque indecidua. Flore sanguineo, qui fructum ambit. Fructus ex pluribus acinis acervatus aquosus. Seminibus tunica clausis. Exceptis quibusdam vitibus, quæ ad fructum peruenire nequeunt, sed ad florem vsque perueniunt. Ramiuli, qui nuper proueniunt, nodosiores & tactu asperrimi sunt, vt enim nodus in cæteris, ita gemma in vite, & geniculum in arundine, minimum enim in iis internodium interiacet, si continuo ramos succidas purgesve, excelsa prouenit, si relinquant, brevis assurgit. Auctu facilis, quia natura humida, solutaque est. Brevis eius vita tractus, diurna enim perpetuaque fœturæ solutione, natura exhausta fathescit, quoniam vis omnis assumitur, quod & in animalium genere patet, nam quæ plura pariunt, celerius consenescent, & pereunt. Radices habet tenues. Prolem sursum versus procreandi vim obtinet. Ex supernis partibus nascitur, fructificat ex nouello, & si **40** aliquando ex caudice fœrificat, ex rei temeritate potius euenit. Amplexi caulis est, semper enim cui adnita ut quærit, vitam enim super aliud ducit, si peda-

mentum desit, humi repit. Dedit ei Natura capillamenta quadā, quasi manū-
sculas, quibus præsidia applicet, vel se aduoluar palis. Varro ex Theophrasto:
Ad Elephantinē vites non amittunt folia. Propter eandem causam vitēs
sunt biferæ apud mare Smyrnæ. Parit capreolum. Is est coliculus nitens in-
tortus, vt cincinnus, is enim vites vt teneat, serpit ad locū capiendum, ex quo à
capiendo capreolus dictus. Cicero ita depingit: Vitis natura caduca est, nisi
fulta sit ad terram fertur, eadē vt se erigat, clauiculis suis, quasi manibus quic-
quid est nacta complectitur, quam serpentem multiplici lapsu & erratico, fer-
ro amputans coercesit ars agrorum, ne in omnes partes nimia fundatur. I-
taque ineunte vere, in iis, quæ relicta sunt, existit tanquam ad articulos sar-
mentorū ea quæ gemma dicitur: à qua oriens vna se ostendit, quæ & succo
terræ, & calore solis augefcens, primò est peracerba gustu, deinde maturata
dulcescit, vestitaq; pampinis, nec modico tēpore caret, & nimios solis defen-
dit ardores. Quæ quid potest esse tū fructu latius, tū aspectu pulchrius: Plinius
ab his: Folio longo pediculo innixo. Sola bis parturit, quū primū emittit vna,
iterū quūm digerit. Statim ingermine floret, pro peratq; in eo, sed matu-
rescit tardē. Cortex membranaceus, qui spontē rumpatur. Succus fructuum
aquosus. Natura sublimitatis auida, vites arboribus nubunt, maritasq; com-
plexæ, atq; per ramos earum procacibus brachiis geniculato cursu scandentes,
cacumina æquā, in tantū sublimēs, vt vindemiator auctoratus rogum, ac tu-
mulum excipiat. Nullo fine crescunt, diuelliq; aut auelli nequeūt. Villas, & do-
mos ambiri singularū palmitibus, ac sequacibus loris Valerius Cornelius exi-
stimauit: subdiales inambulationes vmbrosis pergulis opacat vna vitis Romæ.

De cælo vitibus conuenienti. CAP. VII.

N Vn c idoneū vitibus cælū eligemus. Theophrastus loca vitibus deter-
minare haudquaquā facile esse dicit: nā & differētijs ratione Solis ascen-
dentis, vel occidētis, vel mediū cælum tenentis vel aliquāliter se habentis sci-
re nimirum condecet, tam ex toto, quā in iis, quæ genus idem confortiuntur,
Cato, Quia infinita sunt vitū genera, vnicuiq; suū cælū tribuit. Locus, qui
ostentus Soli, amineo minusculo, & gemino euganeo & heluolo minusculo
tribuat. Si crassus, aut nebulosior, ibi amineū maius, aut murgentinū, aut a-
piciū leucanū serito. Varro vineis collinas tribuit. Columella inquit. Vitis, etsi
omni penē regione, & omni declinatione mūdi, nisi tantū glaciali, vel perfer-
uida curæ mortaliū respōdet, etsi tā felix campis, quā collibus prouenit, & in
densa non minus, quā in resoluta terra, gracili, pingui, sicca, vliginosaq; refert
ramen cuius generis, aut quo habitu vitē pro regionis statu colere cēteas, neq;
enim omni cælo, solōve cultus idē, neq; est idē stirpis eius genus, sed suū cuiq;
regioni magis, aut minus aptū esse docet vsus. Exploratū habebit prudēs agri-
cola. Genus vitis habile cāpo, quod nebulas, pruīnam, cæli siccitatem ventosq;
patitur. Pingui agro dabit gracilē vitē, nec nimis fecundam, macroferacē,
densa terræ vehementem, multaq; materie frondentem, resoluta & lato so-
lora-

lorari fermen-
& angustis fre-
do, nebulosq;
tutis præcur-
floreant, & m-
quog; & tumul-
rursus calido, v-
nii, aut contin-
dinosis, quæ du-
serena regio om-
lerius decidunt
sum desiderat,
ferenitibus o-
Et alibi ex opi-
de meridie,
meridianam ce-
Nec

Democritus
ei subiectas vin-
cipit. Frigidis lo-
stantur austris,
vel Fauonio: fer-
Plinius à Colum-
ant. Virgilius ad-
plutibus meridi-
cipi posse. Ad so-
lertia est. in Afr-
quoniam ipsa m-
septentriones
30 prober. Nec de-
italia magna ex-
Multum ratio-
te Hetruria co-
excipere, prou-
vt auferat tec-
rat. Democri-
loci ad vitem
mari excurrer-
Plerisque vide-
40 dem ob nebulas
exurgunt rubig-

lo rari sarmenti, humido loco fructus non teneri, & amplioris acini, sed callosi, & angusti frequentisq; vinaces, sicco contribui diuersa natura semina. Frigido, nebulosoq; duorum generum vites aptabit, seu præcoques, quarum frugum maturitas præcurrit hyemem, seu firmi, duriq; acini, quarum inter caligines vites deflorescunt, & mox gelicidius ac pruinis, ut alia, caloribus mitescunt. Ventoso quoq; & tumultuoso statu cæli fidentes easdem tenaces, & duri acini committer, rursus calido, vberiores, tenerioresq; concreder. Sicco destinabit eas, quæ pluuibus, aut continuis roribus putrescunt: roscido quæ siccitatibus laborant, gradinosi, quæ duris foliis latisq; sunt, quo melius protegant fructum. Placida & serena regio omnes recipit, sed commodissimè eam, cuius vel vites, vel acini celerius decidunt. At si voto eligendum vineis cælum, neq; glaciale, neq; estuosum desiderat, calido tamen porius, quàm frigido letatur, imbribus magis, quàm serenitatibus offenditur, per flatu modico leniq; gaudet, procellis obnoxia est. Et alibi ex opinione Sæternæ refert: Vineæ solis ortum spectabit, mox deinde meridiem, tum occasum. Sed Tremellius Scrofa præcipuam positionem meridianam censet. Virgilius de industria occasum repudiavit:

Næve tibi ad solem vergant vinea cadentem.

Democritus & Mago laudant cæli plagam septentrionalē, quia existimant ei subiectas vineas feracissimas fieri: sed bonitate vini superantur. Sed ipse præcipit. Frigidis locis vinea meridiano subiiciantur, tepidis orienti, si non instantur austro, euroque. Si prædictis ventis obnoxie fuerint, melius Aquiloni, vel Favonio: feruentibus regionibus, ut Ægypto, & Numidia vni septentrioni. Plinius à Columella hæc habet: Vinearum ratio est, quas in horas spectare debeant. Virgilius ad occasum feri damnavit. Aliqui sic maluerunt quàm in exortu. A pluribus meridiem probari aduerto, nec arbitror perpetuum quicquid in hoc præcipi posse. Ad soli naturam, ad loci ingenium, ad cæli cuiusq; mores dirigenda solertia est. In Africa meridiem spectare vineas, & si viti inutile, colono salubre est, quoniam ipsa meridianæ subiacet plagæ, quapropter qui ibi in occasum, aut septentriones cõseret, optimè miscebit solū cælo, quū Virgilius occasum improbet. Nec de septentrione relinqui dubitatio videtur. Atqui in Cisalpina Italia magna ex parte vineis ita positis, compertum est nullas esse fertiliores. Multum rationis obtinet venti. In Narbonensi provincia, atq; Liguria & parte Hetruriæ contra Circiū ferere imperitia existimatur, eundemq; obliquum excipere, providentia: is namq; effates ibi temperat, sed tanta plerumq; violentia, ut auferat tecta. Palladius in Ianuario, & Februario Columellæ præcepta recitat. Democritus præter ea, quæ Columella dixerat, hoc habet noui, Maritimi loci ad vitem apti sunt, tum ob caliditatem, tum ob humiditatem, quæ latenter è mari excurrentes plantas nutrit. Sed & venti marini vitibus sunt commodissimi. Plerisque videtur vicinum fluvium non esse habendum, multo magis paludem ob nebulas, & ob frigidam auram. Inde enim assidue respirant, simulque exurgunt rubigines, vitem & fata obledentes. Scire expedit, quod quævis unq;

vites à ventis eiusmodi laxi consueuerant nebula, & rubigine, hæ arboribus maritate amplius non laxentur. Quintilii non spernenda dicunt: Concauæ regiones multum vinum faciunt, sed vitiosum, altæ verò melius, nimirum cocto fructu à vento, & alio aëris temperamento, & maxime à Solis potentia. Sol si multum calefecerit, validius, potentius & dulcius vinum facit. Luna sola vuas maturas facit, calida, & humida existens. Multa insolatione, & persolatione opus est, quo durabilius fiat vinum, & citius ad vigorem perueniat. Ex calidis regionibus durabilis vinum, & cruditatem aliquam habentibus, exoletum, & infirmum. Si vitis paucas vuas produxerit, potentius producit vinum, utpote alimento, & viribus omnibus in fructum illum absumptis. Virgilius 10 colles vineas amare cecinit,

Bacchus amat colles.

Quicquid ex physiognomonia vitis de cælo ei conuenienti conici potest, optime à Columella exaratum est. Frigido, & nebuloso, quæ hyemem celeri maturitate præueniunt, quæ duris acinis, inter caligines securius florent, ventoso stabiles & tenaces, calido grani tenerioris, & humidi, sicco ea, quæ pluuias ferre non possunt.

De soli qualitate vitibus conuenienti. CAP. VIII.

QUOT genera telluris, tot vitium genera affirmat Theophrastus, quæ si secundum naturam seruntur, frugifera prodeunt, quum præter naturam, facile sterilesunt. Serit enim solo sitienti, & solido vites solidas, tam generis nigri, quàm candidi, sed ex toto ferè nigrum solidius est. Solo autem pluuiuo solutas committit. Dignosci densæ atque solutæ suis possunt medullis, quas in abscissis nouellis palmitibus scrutari oportet. Habet enim, quæ soluta est, plus medullæ, quàm ligni, contra quæ densa, plus ligni, quàm medullæ. Quod utraq; solo illi conueniat, his rationibus constat: quibus enim plus inest medullæ, his meatus ampli, multiq; sunt, quibus autè minus, his angusti, & pauci, quo fit ut minus alimenti desideret, quæ densa corpore constant, & simul humorem ad æstare seruare facile possint, sol enim ob densitatem haud æquè potest educere. Quum igitur tam exigua detractio fiat, radices quantum 30 satis sit, ad fructificandum suppeditant, solutæ autem illæ, quum detractio largè, accessio parce ob telluris siccitate magatur, palmites imbecilles, fructusq; imperfectos progenerant. At agro pluuiuo genus id conuenientissimum est, utpote, quod copiam alimenti largam desideret, & quamuis multum adimatur humoris, tamen quò sol magis educit, eò vis plus & in amplitudine proficit, & in fecunditate: pabulo enim abundat, idque exuperat, facillimèq; percoquit. Solum præterse iccirco vitibus optimum habetur, quia non modo facile multumq; pingue, sed etiam humidum sit. Vitis enim plurimam desiderat aquam, eo quod in suo fructu humoris plurimum habeat, & imbribus certè vi sui humoris maxime resistere potest. Sin autem ager, neque an- 40 dus

das neq; pluuius
que densa sint, n
modum est, & ac
aqua cælestis in
alimenti desider
ob hæ eadem fo
cile putrescere p
itaque attrahere
eodem dicit, soli
das planis gaude

At

Qui

Qu

Des

Feli

Est

Hic

Suff

Qu

Et b

Qu

Nec

Illu

Den

Sals

Ne

Columella e

tolerare vitem,

gelatas reddit

40 repore euocat

Nimiam siccita

necare, aut scab

non sobbere, n

netret eadem

imbrem, ac fo

neri, læt luxu

opus esse. Al

bi gracile vit

mentē multa

40 loco sciet nō

gusti, frequen

10 dus neq; pluuius sit, sed medium teneat, media conferenda sunt, id est, quæ neque densa sunt, neq; soluta. Et alibi. Prætenſe, & arenaceum vitibus percommodum est, & ad summam quod solutum, leue, tenue, atque humidum, ita ut aqua cœlestis intestino humori valeat permisceri. Vitis namq; largam copiam alimenti desiderat, quia calida, laxa, humida, & fœcundissima est, forsitan & ob hæc eadem fœcundissima. Ad hæc radices humidatum plantarum haud facile putrescere possunt, quemadmodum illarum quæ suapte natura siccescunt, itaque attrahere, & resistere, & transmittere nimirum valent. Aliisq; in locis eadem dicit, solidas spissasq; vites loca montana amare, solutas verò & humidas planis gaudere. Virgilius agrum describit vitibus aptum:

*At quæ pinguis humus, dulciq; vligine lata,
Quiq; frequens herbis, & fertilis vberè campus,
Qualem sæpè cana montis sub valle soleus
Despicere, huc summis liquuntur rupibus amnes,
Felicemq; trahunt limum, quique editus Austro,
Et felicem curuis inuisam pascit aratris,
Hic tibi præualidas olim, multoq; fluentes
Sufficiet Baccho vites: hic fertilis vna.*

20 *Quæ tenuem exhalat nebulam fumosq; volucres,
Et bibit humorem, & cum vult ex se ipsa remittit,
Quaq; suo viridi semper se gramine vestit,
Nec scabie, & salsa ladit rubigine ferrum.
Illa tibi letis intexet vitibus ulmos:*

*Densa magis Cereri, rarissima quaq; Lyao.
Salsa autem tellus & quæ perhibetur amara,
Nec Baccho genus, aut pomis sua nomina seruat.*

Columella ex Græcini sententia decernit nimium calidum solū non posse tolerare vitem, quia inuitit, neq; prægelidum, quoniā velut stupentes & congelatas reddit radices: neq; humidum, quoniā quum se promittit vites, modico tepore euocāt humorem terræ iueto maiore, qui putrefacit deposita semina. Nimiam siccitatem destituere plantas naturali alimento dicit, aut in totum necare, aut scabras & retorridas facere. Perdensam humum cœlestes aquas non sorbere, nec persflari, perrūpi, & præbere rimas, quibus sol ad radices penetret, eademq; clausa semina comprimere, & strangulare: rarā transmittere imbrem, ac sole & vento siccati, grauē cultura non vincibilē, leuem vix sustineri, latā luxuria, macram ieiunio laborare, sed inter has medio temperamēto opus esse. Alibi habet, quæ ex Theophrastō excepit. Pingui, & vberi agro dabit gracile vitem, nec natura nimis fœcundā, macro feracem, terræ dēsa vehementē multaq; materia frondentē, resoluta & lato solo rarifarmēti, humido 40 loco sciet nō rectē mandari fructus teneri, & amplioris acini, sed callosi, & angusti, frequentisq; vinacci. Sicco diuersa naturæ semina cōtribui. Cellus igitur

tur ita eligit. Nec densum nimis, nec resolutū, soluto tamē propius solum, nec exile, nec latissimū, proximū tamen vberi. Nec campestre, nec præceps, simile tamen edito cāpo. Nec siccum nec viginosum, modicē tamen roscidū, quod fontibus non in summo, non in profundo terræ scaturiat, sed vt vicinū radicibus humorē subministret. Eumq; nec amarū nec salsum, ne saporē vini corrūpat. Et alibi, Locis pinguibus planis & humidis, præcoques vites serito, raris acinis breuibus nodis imbecillas: nam tali generi vitū eiusmodi ager aptus est. Locis aridis, & macris, & siccis vitem serere, natura feracē, & validam crebrisq; acinis conuenit. Quod si pingui agro validas vites deposueris, pampinis magis luxuriabuntur, & qualemcunq; fructū tulerint, ad maturitatē non producēt. Rursus imbecille exili agro celeriter deficient, exiguumq; fructū dabunt. Paladius id noui addit: Tosus & alia duriora, vbi gelu relaxantur, & solibus, pulcherrimas vineas ferunt, refrigeratis astate radicibus, & humore detento. Sed & soluta glareā, & calculosus ager, & mobiles lapides (si tamen hæc omnia glebis se pinguibus miscuerint) & silex, cui terra superposita est, quia frigidus est, & humoris tenax, radices astate siccare non patiuntur. Item loca, ad quæ decuminiibus terra decurrit, vel valles, quas fluminū saturabit aggestio, sed hoc in iis locis, quæ gelu, & nebulis infecta esse non possunt. Argillosa terra comoda est, argilla autē sola grauiter inimica Niger sabulo, & rubēs utilis est, sed cui fortis terra permixta est. Carbunculus nisi stercoretur, macras vineas reddit. In rubrica difficiliter comprehendunt, quāuis postea nutriantur. Sed hoc genus terræ operibus inimicū, quia paruo humore nimis madescit, & paruo sole nimis durefcit. Maximē vtile solum, quod inter omnes nimietates temperamentum tenebit. Optimam terram Florentinus probat, quæ nigra, non densa, nec glutinosa, humida, dulcis aqua: nam talis terra susceptum imbrem transmittit, nec in superficie detinet: aqua in superficie detenta putrefacit stirpes. In prædicta terra alba vitis plantanda, quia copiosiore alimento è terra indiget, solida, densaq; existens, & agrè nutritibilis. Argillosa terra nisi valdè tenuis fuerit, & in rimas laxata, vites albas suscipit, sed arida, tenui, & arenosa terræ eiusmodi vites non conueniunt, sed quæ densos habent acinos, & albam medullā, vt plurimum nigra vna talis existit, bonū, & multum, & durabile vinum producens, contrario modo habens ad albas natura agrè nutritibilis. Humidas vites in squallidis, frigidis, aridisq; locis plantabis, siccas in humidis, vt quod vitibus deest, soli natura expleatur, & cætera habet, quæ ex Columella diximus. Eadem quoq; Plinius. Nec erit necesse nobis physiognomiā tradere vitū, vt quali terra delectetur cognoscā, quū vbertimè à Columella tractatū sit, & Theophrastus. densioris ligni vites solidū solū, laxioris verò humidū expetere & similia.

Quid vinea, & quot eius species. CAP. IX.

IAM ad ferendi modum deuentum est, sed dicere prius oportet, quid vinea, & quot eius species. Vineam dicimus locum, in quo multitudo vitū constituta est: Vinerum vero locum vineis abundantem. Columella inquit: Cui vinea

ta fa

ta facere cordi
vineæ species
in Hispania, alia
quibus stat, ped
gara. lugorū ge
in Brundisino,
recta, vt in agro
iugata, vt in Ital
dum arundinet
sun, vt in M. diol
vnum robustum
diuturnior, ter
colligatas, dim
tius transire po
etis vitibus sit
pedamentorum
sine iugo minime
vuis, vt in Asia,
facta vinea mi
tini in Italia. V
provincialium
daminiibus ad
lant. Mox, quæ
materis ligatis
vitium. Plinius
tibus, aut per se
iugo, aut comp
eius quoque in
damini in op
pellat. Melior
& afflatum m
occationi, b
peritica, aut ar
pluviata cop
nas partes, te

VITIS
tur. Th
ait, quia ex v
40 quam nil pe

ta facere cordi est, faciat vitarium, ex quo possit agrum vineis vestire. Varro vinearum species recenset: Vinearum multarum species, alia humilis, & sine radicis, ut in Hispania, alia sublimis, quæ appellatur iugata, ut pleræque in Italia. Sublimis, quibus stat, pedamenta dicuntur, quæ transversa iunguntur, iuga & inde iugata. Iugorum genera quatuor, pertica ut in Falerno, arundo ut Arpino, restes, ut in Brundusino, vites, ut in Mediolanensi agro. Iugationis species duæ, una directa, ut in agro Canusino, altera compluviata, in longitudinem & latitudinem iugata, ut in Italia pleræque. Primum genus iugorum est pertica, quæ fit salicta, secundum arundineta, tertium iunceta, quartum arbuta, ubi traduces vitium fieri possunt, ut Mediolanenses faciunt in arboribus. Pedamentum quatuor generum, unum robustum, fit è quercu, vel iunipero, alterum est pertica, melior è dura, quia diuturnior, tertium in horum subsidium mittit arundinetum, aliquot enim libris colligatas, dimittunt in tubulos fictiles cum fundo pertuso, qua humor aduentitius transire possit. Quartum est nativum, ubi ex arboribus in arbores traductis vitibus fit vinea. Vinearum altitudinis modus, longitudo hominis. Interualla pedamentorum, qua boues victi arare possint. Vinearum minus sumptuosa, quæ sine iugo ministrat vinum Cuius genera duo, unum in quo terra cubilia præbet viti, ut in Asia, alterum, quo vitis è terra sustollitur bipedalibus furcillis, quas facta vindemia, reducunt hybernatum in tecta, ut alio anno viti possint, ut Reatini in Italia. Vbi terra humida, altius vitis tollenda est. Columella de cultura provincialium vinearum ait: vites vel breui crure per se stant, deinde quæ pedamentis adnixæ, singulis iugis imponuntur, quas rustici canteriaras appellant. Mox, quæ defixis arundinibus circumvinctæ per statumina calamorum materiis ligatis in orbiculos, gyrosque flectuntur. Ultima est conditio stratarum vitium. Plinius ab Varrone: Vinearum quinque generum. Sparsis per terram palmitibus, aut per se vite subrecta, vel cum adminiculo sine iugo, aut pedata simplici iugo, aut compluviata quadruplici. Quæ pedata ratio erit, eadem intelligitur eius quoque, in qua sine adminiculo vitis per se stabit, id enim non fit, nisi pedamentum inopia. Simplicis iugo constat porrecto ordine, quem canterium appellant. Melior ea vinea, quando sibi ipsa non obumbrat, assiduoque sole coquitur, & afflatum magis sentit, & celerius rorem dimittit. Pampinationi quoque, & occationi, omnique operi facilius. Super cætera de flore scit utilius. Iugum fit pertica, aut arundine, aut crine, funiculove, ut in Hispania, Brundusioque. Compluviata copiosior vino, dicta à cauis adium compluviis. Diuiditur in quaternas partes, totidem iugis.

Quod modis nascantur vites, & de earum satione. CAP. X.

VITIS primò semine nascitur, omne enim quod semine fert, è semine nascitur. Theophrastus hunc sationis modum improbat: nam omnino degenerare ait, quia ex vite nobili, ignobilis nascitur, & sæpè diuersa genere exit, nonnunquam nil penitus urbanum, sed planè sylvestre provenit, & adeò quandoque,

vt fructum perficere minimè queat. Quædam fructum ne compilare quidem valent, sed ad florem vsq; tantummodo veniunt. Ab eo Plinius: Ex semine autem quanquã dissimili ea quoq;, quæ & aliis modis feruntur, vt vites. Nascitur & auulsione. Idem, Et aliud genus simile natura mōstrauit, auulsq; arboribus stolones vixere. Quo in genere & cum perna sua auellūtur, partemq; aliquam è matris quoq; corpore auferūt secum fimbriato corpore, & hoc modo plantatur viris. Nascitur quoq; ex surculo. Quæ ex supernis partibus nascuntur (inquit Theophrastus) paucissima sunt, quemadmodum quæ ex palmitibus vitis proueniunt: ista enim nec ex prora, sed ex palmitibus exeūt. Impossibile enim est ex mediis nasci, quũ eiusmodi partes mediæ exuccæ, lignosæq; sint, & aspe-
 10 ræ, cōtra verò facilè, quæ summe, teneræ humectæq; sint, ceu palmes & crada. A quo Plinius: Vitibus media sicciora, & è summa parte conceptus, idè illinc surculi petuntur. Plinius: Virium numerosior satus. Primũ omnium nil feritur ex his, nisi inutile, & deputatum in sarmento, vt videbimus in sequenti.

De vitis & malleoli electione & quid malleolus. CAP. XI.

DIXIMVS vitẽ ex superiori surculo optimè generari, & hic modo tutior, vltiorq; nunc de vitis, & malleoli electione differemus. Ex Columel-
 la doctrina duplex electio facienda est, & vitis, ex qua semina perantur, eiusq; partiũ, quæ genitales, & maximè fertiles: & malleoli. Vitis, cuius progeniẽ studemus submittere, fœcũda non tantũ eò existimari debet, quòd uas cōplu-
 20 res exigit, potest enim id ex trunci vastitate, & palmitũ frequentia euenire, nec ferax, quòd in singulis sarmentis singulæ vuæ conspiciantur, sed si per vnum-
 quemq; pampinũ maior uarũ numerus depēdeat, si ex singulis gemmis compluribus materiis cū fructu germinet, si deniq; etiã è duro virgam cum aliqui-
 bus racemis citet, si etiã nepotum fructu grauida sit, ea destinari debet legendo malleolo. Nec item ancipitem habeat floris euentũ, ne difficulter acinis in-
 grandescāt, ne aut præcoquem, aut seræ maturitatis fructum afferat: nam illa volucris, hæc tempestatibus hyemis infestatur. Nec vitis ipsa vna cōprobe-
 tur vindemia: nam vel anni prouentu, vel aliis causis etiã infœcũda poterit se-
 mel exhibere. Sed pluriũ emeritis annorũ stipendiis indubitata fides cōsti-
 30 tuatur. Nec tamẽ vltra quadrienniũ talis extenditur inquisitio: nam id tempus stirpium omnium generositatẽ declarat, quo sol in eandẽ partem signiferi per
 eosdem numeros redit, per quos cursus sui principium cœperat, quem circui-
 tum meatus dierum integrorum mille quadringentorum sexaginta vnus, & m-
 uatẽ vocant studiosi rerum cœlestium. Ex hac, fœcundissima stirpe legen-
 dum censemus malleolum. Malleolus est nouellus palmes innatus prioris an-
 ni flagello, cognominatusque à similitudine rei, quod in ea parte, quæ decidit-
 tur ex vetere sarmento, prominens vtriusque malleoli speciem præbet. Nunc
 ex ea vitis parte palmites legamus, qui futuram fœcunditatem promittant.
 Non igitur ex extrema eius parte, quam caput vitis appellant, eligendum est
 40 sarmentum.

sa mentum, qu-
 nim accidit nō e-
 liquas trunci par-
 vltimum peruen-
 Nec in cruce vic-
 co alitur. Media
 ceptus, illinc à se-
 numerosoq; fœc-
 rius degenerat, q-
 10 deponatur, siue
 quum esset in eg-
 men quæ attulit
 ribilium sine fœ-
 vllam generand-
 nec nisi fœcund-
 at densitas gem-
 qui floruerint,
 Quintili aliqua
 tes iam perfectur-
 10 & multis oculis p-
 plantationis ex ip-
 ratis: nam illæ inf-
 aut parum quide-
 partibus accipien-
 oculos, & contra
 lidum, oculis den-
 Sarmentum

SATIONIS
 30 Senig Plinius
 multo postea nec
 portet, ne extra
 diutius in secco
 scant. Alibi doc-
 se ait: Quod si
 stodire succum
 scinas, vtriusq; te-
 seruare plantas
 ra substrata, & r-
 40 gener luto obli-

sa mentum, quod in eo productissimo vuarum numerus conspiciatur: id enim accidit nō ex palmitis ingenita fertilitate, sed loci opportunitate, quia reliquas trunci partes alimentum, quod à solo ministratur, transcurrit, dum ad vltimum perueniat, quod quum peruenierit, ibi consistit, atque consumitur. Nec in crure vicino radicibus, quia terræ proximum integro atq; illibato succo alitur. Mediæ partes macerrimæ, quia transcurrit hinc parte aliqua interceptus, illinc à se tractus humor. Sarmentum igitur, quod mediæ vite situm, numerosoq; fœtu benignitatem suam ostendit, eligatur: hoc translaturum rarius degenerat, quum ex deteriore statu meliorem sortitur: siue empassinato deponatur, siue trunco inseratur, longioribus satiatur alimentis, quàm prius, quum esset in egeno. Ex humerosi igitur partibus vitis semina eligamus, tamen quæ attulisse fructū antea animaduenerimus: nam illud quod loco sterili latum sine fructu processit, fallacem fœcunditatis imaginem præfert, nec ullam generandi vim possidet. Plinius ad hæc: Serere è pampinariis sterile est, nec nisi fœcundo oportet. Quæ raros habent nodos, infœcundæ indicantur, at densitas gemmarum fertilitatis indicium est. Quidam seri verant nisi eos, qui floruerint, surculos. A Columella Palladius in Februario & Octobri. Quintilii aliqua addunt, ob id præcepta huc afferenda duximus. Quando vitæ iam perfectum reddiderint fructum, contemplari oportet quæ fructifere, & multis oculis præditæ sunt, & nulla clade affectæ, eas notare, vt tempore plantationis ex ipsis plantas accipiamus. Neq; ex nouellis vitibus neq; inueteratis: nam illæ infirmæ, & hæ infrugifere, sed ex eis, quæ in suo vigore existunt. aut parum quidem ultra excesserunt. Sarmenta non ex summis, neq; infernis partibus accipienda, sed mediæ vite. Quod latum, ferulaceum, raros habens oculos, & contractas radices, abiiciendum: sumendum rotundum, laue, solidum, oculis densum, & nouas gemmas plurimas habens.

Sarmenta non colligenda, nisi tempore plantationis, & quomodo transferenda. CAP. XII.

SATIONIS tempore sarmenta colligenda esse præceperunt maiores. Ait enim Plinius, surculos inferi eodem die, quo deputentur, vtilissimum, si multo postea necesse sit serere, custoditos, vt præcepimus, cauere vtiq; oportet, ne extra positi sole inarescant, ventōve, aut frigore hebetentur. Qui diutius in sicco fuerint, priusquam serantur, in aqua pluribus diebus reuifescant. Alibi docens inferendos surculos decisos à matre, diutius custodiri posse ait: Quod si longius afferantur pomorum calami, rapo infixas optimè custodire succum arbitrantur, seruariq; inter duos imbrices, iuxta riuos, vel piscinas, vtrinq; terra obstructos. Quintilii hoc modo docent: Quod si diutius seruare plantas necesse sit, in dolio humorem non habente deponantur, terra substrata, & rursus iniecta, vt vnde quaq; terra fruuantur. Dolium verò diligenter luto oblinire oportet, vt neq; ventus, neq; aer inspirare possit. Hocce-

nim modo etiam ad duos menses illa sa manebunt sarmenta ad plantas dele-
cta. At verò quæ ex multa locorum distantia exportantur sarmenta, quidā in
scyllam imposita, aut in bulbos cibarios, viridia conferuant. Quæ autem tem-
pore lesa sunt, aut aridiora facta, in aquam per diem, ac noctem cōiecta plan-
tato. Si verò aridior sit terra, etiam sana sarmenta rigare melius est, atque ita
plantare. Animaduertendum autem, ne sarmenta, quæ plantabimus, ante
plantationem germen emittant, talia enim corrumpentur.

*De pastinatione, sulcis, & scrobibus, quibus vinea po-
nuntur. CAP. XIII.*

POST malleoli electionem, docendum quomodo ponantur. Columel-
latribus modis feri dixit, optimè in pastinato, proximè in sulco, nouissi-
mè in scrobe. De pastinatione dicemus. Primum ex omni siue arbutuuo, si-
ue syluestri loco, quem vineis destinauerimus, omnis frutex, vel arbor, sub-
moueri debet, ne fossorem morentur, vel pastinatum solum molibus im-
primatur, aut exportantium truncos ingressu proculcet. Multum refert su-
spensissimum esse pastinatum, & vestigio quoque inuiolatum, ut mota aqua-
liter humus, nouelli seminis radicibus, in quamcumque partem prorepse-
rint, molliter cedat, & tenero, velut nutritio sine recipiat, celsæstque ad-
mittat imbres, ut suis viribus ad educandam prolem conspiret. Campes-
trus locus altè duos pedes, & semissem infodiendus, accliuus regio tres, præruptior
collis in quatuor pedes verrendus, quoniam quum à superiore parte in in-
feriorem detrahatur humus, vix iustum pastinationi præbet regestum, nisi
multo editiorem ripam, quàm in plano feceris. Depressis vallibus minus al-
tè duobus pedibus deponi vineam non placet: nam præstat non confere-
re, quàm in summa terra suspendere. Primum autem prædicti operis ex-
ordium est, æqualiter linea posita rectis lateribus perpetuam fossam edu-
cere, & post tergum motam humum componere, atque in tantum deprime-
re, donec altitudinis mensuram datam ceperit, tum per omne spatium gra-
dus æqualiter mouenda linea est: obtinendumque ut eadem latitudo in imo
reddatur, quæ cæpta in summo mox sulcum vacuari, ac spatium crudi soli
cum immota iam terra committi, monendo necubi scamna omittantur.
Ad hoc opus exigendum quadam machina utitur. At qui pastinationis huius
impensam reformidat, sed aliqua tamen parte pastinationem imitari studet,
paribus alternis omissis spatiis ternum pedum latitudinis sulcos dirigunt, fo-
diuntque, & exaltant in tres pedes, ac per latera fossarum vitem, vel mal-
leolum disponunt. Auarius quidem dupondio, & dodrante altum sulcum, la-
tum pedum quinque faciunt, deinde ter tanto amplius spatium crudum relin-
quunt: atque ita sequentem sulcum infodiunt, quod quum per definitum vine-
is locum fecerint, in lateribus sulcorum viuiradices, vel malleolos erigunt,
confitis compluribus inter ordinaria semina malleolis, quos postquam con-
ualuerint, crudo solo, quod emissum est, transversis scrobibus ppagent. Qui-
bus

bus verò mose
duos in altitudi-
los vtriusque iuxta
curvatos erigunt
mo cetera coeq
scamnis, damp
est vineas colen-
fossore terra ve
ximur: sin bub

10 Aliqui per deno-
ra transuersis, &
terra humida at
multis collecti
dem censuerit,
dem anno terra
tem siccum &
defodere satius
possis, tunc pro-
ptis, ac seruatis
10 portet: nam illi
siccus humectat
& pastinato. Su-
partem. Altiud
debet, extratura
be ima sulcis, fra-
tetea puluimatis
cipiant: è diuers
titudinis, ad com-
nū pedum distig-
30 cardine, quor d
quinto quoque p
nato nec nisi vi
colles sulcos ag
contineantur
ne vitium scro-
nescunt, & fru-
& astate exun-
tum effodere
non plus pene
40 plantaueris, in
quatuor pedes

bus verò mos est scrobibus deponere, ferè per tres longitudinis pedes, per quæ duos in altitudinē canato solo, quantum latitudo ferramenti patitur, malleolos vtrinque iuxta latera fossarum consternunt, & aduersis scrobium frontibus, curuatos erigunt, duabusque gemmis supra terram eminere passi, reposita humo cetera cogquant, quæ faciunt in eadem linea, intermissis totidem pedum scamnis, dum peragunt ordinem: tum deinde relicto spatio, prout cuique mos est vineas colenti, vel aratro, vel bidente peragantes ordinem insistant. Et si fossore terra versetur, minimū est quinque pedum interordinium, septem maximum: sin bubus & aratro, minimū est septem pedum, satis amplum decem.

- 10 Aliqui per denos pedes vitem in quincuncē disponunt, vt noualium more terra transuersis, & aduersis sulcis, pscindatur. Idque in lato solo faciendum, sed in terra humida amplas, & profundas scrobes faciendas verat Theophrastus, ne multis collectis aquis putrescat planta. Et si pluuius ager sit, ne faciendas quidem censuerit, sed adactis paxillis aditum parare furculo demittendo, nec eodem anno terram aggerendam neque postero, vt sole humus assicceretur. Sin autem siccum & squallentem colis, contra agendum est, si fieri possit, in scrobes defodere satius est, vt omni ex parte aquam suscipiat. Sed si minus facere ita possis, tunc profundissimas fossas arboribus circumducere, fossæ nanque exceptis, ac seruatis aquis æstus arceunt. Cetera ad hanc normam præparasse oportet: nam illud verissimum est, culturæ interesse: humidus ager siccandus, siccus humectandus. A quo Plinius: Vineæ tribus scribitur modis, sulco, scrobe, & pastinato. Sulco latitudo pale satis est, scrobibus ternorum pedum in quaque partem. Altitudo in quocunque genere tripedalis, ideo nec vitis minor transferri debet, extatura etiamnum duobus gemmis. Emolliri terram minutis in scrobe ima sulcis, si moque misceri necessarium. Cliuosa altiores possunt scrobes, præterea puluinitis à deuexitate labris: quæ ex his longiores fient, vt vites binas accipiant: è diuerso alia locabuntur. Vineas limitari decumano xvi pedum latitudinis, ad contrarios vehiculorum transitus, aliisque transuersis limitibus denum pedum distinguere per media iugera. Aut si maior modus sit, totidem pedum cardine, quot decumano limitari, semper verò quinquenis semitari, hoc est, vt 30 quinto quoque palo singula iugo pagina includatur. Solo spisso non nisi repastinato nec nisi viuiradice feri, tenero, & soluto vel malleoli sulco vel scrobe. In colles sulcos agere transuersos melius, quam pastinare, vt de flumina paliseorum contineantur. Florentino autem videtur, non minus quatuor pedum altitudine vitium scrobes faciendos esse; quæ enim in superficie plantatæ sunt, cito senescunt, & fructum corrumpunt, modicum alimentum in modica terra sortitæ, & æstate exuruntur. Oportet igitur in quantum calor penetrat solis, in tantum effodere, & plantare, ultra autem prædictam mensuram solis, calorem non plus penetrare affirmant, nisi fissuras terra habeat, si minus profundè plantaueris, inutiles vites, & cito senescentes habebis. Scito igitur usque ad 40 quatuor pedes effossam terram nutricem plantarum esse, inferiorem esse

sterilem. Sed effossionem pedum altitudinis non est improbanda. Id tamen non omittetur ex Columella: iugerum repastinabitur in altitudinem pedum trium operis octoginta, sulcum ternum pedum, duorum altum, & longum septuaginta, vna opera effodit, scrobes ternarios, id est, quoquoersum pedum trium vna opera facit x v i i i, vel si cui cordi est laxius vites ponere, scrobes quaternarios, id est, quoquoersum pedum quaternum vna opera x i i facit, vbi bipedaneos quoquoersum vna opera x x effodit.

De tempore ferendi malleoli. CAP. XIII.

NUNC docenda est ratio plantandi ad tempora secundum earum naturam. Ex Theophrasti doctrina. Si in humida, & frigida regione seres, facito ante vernum æquinoctium, subeunt enim calor, & siccitas. Si in sicca & calida, post solstitium: imminet enim pluuia, quare plus proficient. Aliarum rationes ad hanc normam institues. Virgilius vere præcipit melius, sed probabilius autumno:

Optima vinetis satio, cum vere rubenti

Candida venit auis, longis inuisa colubris:

Prima vel autumnus sub frigora, cum rapidus sol

Nondum hyemem contingit equis, iam præterit æstas,

Vere tument terra, & genitalia semina poscunt.

Columella ex Theophrasto excipit: Opus conferendæ vineæ vere, vel autumno. Vere melius, si aut pluuia aut frigidus status cæli est, aut ager pinguis, aut campestris, & vlginosa planities: rursus autumno si sicca, si calida est æris qualitas, si exilis, atq; aridus campus, si macer, præruptusve collis. Vernæque positionis dies ferè quadraginta sunt ab idibus Februarii vsq; in æquinoctium, rursus autumnalis ab idibus Octobris in cal. Decembris. Ab eo Plinius: Aquoso cælo, vel sicco solo, malleolos ferere autumno, nisi si tractus ratio mutarit, siccus enim & calidus autumno poscit feri, humidus frigidusque etiam veris exitu. In arido solo viuira dix quoq; frustra feritur. Male & in siccis malleolus nisi post imbrem: at in riguis vel frondens vitis, & vsq; ad solstitium rectè, vt in Hispania. Cassianus hæc habet: Quidam vere inchoante conferunt, Fauonio tamen spirante. Quidam non statim veris principio, sed vbi ad germinationem spectant plantæ, alii post vindemiam plantant, quum folia vitibus defluunt, alii inchoante vere. Ipse autem experientia edoctus in locis non irriguis autumno plantandam vitem: tunc enim sarmenta post vindemiam ab onere racemorum liberata, propriam vim temperantia, & à glacie nondum male affecta citius terræ coalescunt, & natura tunc magis radices nutriente. Ratio cur locis nō irriguis autūno plantant: quo inopiam rigationis imber per totam hyemem delapsus expleat. Sed post æquinoctium vernum non est plantanda vitis. Lunarem quoq; rationem in consuetudine obseruandam indicarunt maiores. Columella: Plantaria facito ab exoriente, & à decima Lu-

na,

et, & à vigesima
quartam vites
plantare consue-
verò in confesse-
ter. Sotio verò
quaquam planta-
bus apparet, quæ
Anatolius verò
on inter illanes
ter tamen Luna
inseruntur. Ne
plantatione ne
qui vterque no-
regminis. Veru
ritus diem: nan-
tionis die vtiliss

DE malleoli
dam totu
10 lenas partit
probat, assenti
probauerunt, &
partem, siue qu
quia cacumine
pampinus intra
vel sterilis, vel
gebant, vt pars
ex veteri mater
ximasque radi
30 superior pars r
quæ quicquid
scitur materia
sed nouella se
valenter cres-
guntur, raro
capite, ne pa-
ramentum b
batur multis
tequā depon
40 curuum, & c

na, & à vigesima. Anatolius, Multi ex veteribus affirmant à prima Luna vsq; ad quartam vites plantandas, aliqui verò in omnibus eius augescens diebus plantare consulunt, alii augescente ipsa plantandum minimè censent. Hoc verò in confesso est, quòd Luna sub terra existente depangere vites oportet. Sotion verò ait, In illunibus diebus, hoc est prima & secunda die, vites nequaquam plantandas esse, itemq; reliquas arbores priusquam luna hominibus apparet, quæ enim his diebus plantata sunt, omnia non comprehendunt. Anatolius verò etiam desinente Luna plantauit, nec pœnituit. Verùm Sotion inter illanes dies etiam vigesimam nonam, & trigesimam locat. Oportet tamen Luna deficiente sarmenta accipere, tum quæ plantantur, tum quæ inferuntur. Nec omittendum quod Columella & Plinius non omittunt, in plantatione ne semina exarescant, immodicum ventum, solemq; vitare, qui vterque non incommodè arcetur obiectu vestis, aut cuiuslibet densi regminis. Veruntamen præstat eligere sationi silentis, vel certè placidi spiritus diem: nam sol ymbraculis facillè depellitur. Plinius, Quiescere ventos sationis die vtilissimum. Pleriq; austros optant, Cato abdicat.

Malleoli quomodo ponendi. CAP. XV.

DE malleoli positione non minima inter maiores disceptatio fuit. Quidam totum flagellum, vt erat matri detractum, per gemmas quinas, vel 20 senas partiti complures taleolas terræ mandauerunt, quod Columella minimè probat, assentiturq; his, qui eam partem quæ est iuncta cum vetere sarmento probauerunt, & sagittam repudiauunt. Sagittam vocat nouissimam furculi partem, siue quia longius recessit à matre, & quasi emicuit, atq; prosiluit, seu quia cacumine attenuata prædicti telis speciem gerit. Ratio est quia fecundus pampinus intra quintam, aut sextam gemmam fructu exuberat: reliqua pars vel sterilis, vel perexiguos ostendit racemos. Alii nouellum sarmentum pangebant, vt pars aliqua ei veteris hæreret. Sed id damnavit vsus: nam quicquid ex veteri materia elictum est, obrutum, celerrimè humore putrescebat, proximasque radices teneras, & vix dum prorumpentes vitio suo enecabat, vnde 30 superior pars retorrescebat. Iulius Atticus, & Cornelius Celsus Safernæ sequuti quicquid residui fuit ex vetere palma per ipsam commissuram, qua nascitur materia noua, resecant, atq; cum suo capitulo sarmentum deprimunt. sed nouella semina cum vetere sarmento deposita cito comprehendunt, & valenter crescunt, sed celeriter senescunt, at quæ sine vetere sarmento panguntur, tardius conualescunt, sed tardius deficiunt. Iulius Atticus prætorro capite, ne pastinum effugiat, semen demergit. Pastinum vocant agricolæ feramentum bifurcum, quo semina panguntur. Idq; etiam à Columella improbat multis rationibus. Primum quòd omnis stirps integra, & inuiolata antequàm deponatur melius prouenit, quàm quæ verata, & infracta. Deinde re- 40 curuum, & sursum spectans demersum, quum tempestiuum eximitur, repu-

gnat obluctanti fossori, & prærupitur, præruptum maiorem partem radicem cum amittit. Præterea si secunda pars infra quintam, vel sextam gemmā est, qui malleolum contorquet, secundam partem consumit, merisq; oculi non materiam, sed radices creant, gemmæ eacumini proximæ pampini pullulant, vel steriles vel minus feraces. Demum plurimam interest, ut ea parte quæ est à matre decissus malleolus coalescat, & cicatricem ducat: sin minus, per apertam vitis medullam humo trahitur, qui truncum cauat, unde formicis latebræ parantur, quæ vitium crura putrefaciunt. Quare optima ratio recti malleoli, cuius imum caput confertum angustis ferramenti faucibus deprimitur, nam citius coalescit, & cicatricem obducit. In scrobibus frontibus curuatos erigunt, 10 ræ fossarum consternunt, & aduersis scrobibus frontibus curuatos erigunt, duabusq; gemmis supra terram eminere passim repōita humo cetera corquāt. Longitudo quæ debet esse malleoli, parum certa est, quoniam si crebras gemmas habet, breuior faciendus, seu raras, longior, attamen nec maior pede, nec dodrante minor esse debet: hic ne per summa terræ sitiat astatibus, ille ne depressus altius, quā adoleuerit, exemptionem difficile præbeat. Sed hæc in plano: nam in cliuosis ubi terra decurrit, potest palmipedalis deponi. Vallis & vli- 20 ginosi campi situ serimus etiā trigemmem, qui est paulo minor dodrante, longior vtique semipede. Et alibi idem docens: Virgam malleolarem, non amplius, quàm sex gemmarū esse cōuenit, ita tamen si breuia internodia habeat, imam 20 partem, quam demissurus es, iuxta nodū, ne gemmam ladas, rotūda plaga amputato, tum rectum defigito, ne minus quatuor gemmæ abscondantur. A quo eadem refert Palladius in Februario. Et Plinius: Solebat capitulatus vtrinq; & duro furculus feri, postea auelli cum sua calce, nec est aliud viuacius, tertiu gemmas adiectum expeditius sine calce, propter quod sagittæ vocantur, quā intortipanguntur, idem quā recisi, nec intorti trigemmes. Plures autem ex eodem furculo hoc modo fiunt. Sagittas ferere minus utile, quoniam in transferendo facile rumpitur, quod intortum fuit. Seruntur pedali, nō breuiiores longitudi- 30 ne, quinque, sexq; nodorum. Pauciores tribus gemmis in hac mensura esse non poterūt. Quintilius admonent illā partem potiore esse ad plantationem, quæ vni vsq; ad septem oculos iuncta est, aliud autē inutile. Quare non recte faciunt quidam, longiora sarmenta in duas, aut tres partes secātes, atq; ita plantantes. Nos in Surrentino tractu vineas sic instituere solemus. Ad agri longitudinem longos ducimus scrobes, quatuor pedum profunditatis, & latitudinis, interuallum inter vtrosq; solidū octo pedū relinquimus. Idq; post vindemiam agimus. At Ianuario, vel Martio mensibus, binos malleolos eligimus, & imum solum scrobis per semipedem effodimus, & dextro scrobis latere infigimus, & per latitudinem scrobis prosternendo, ad sinistram latus erigimus. Mox bipedali spatio antegradendo, denuo imum solum effodimus & terram super malleolos iam prostratos iniicimus, & cooperimus, & aduersa frōtis parte bi- 40 nos alios infigimus, & ad dextram erigimus, idq; dum scrobs cōpleatur, & sic semib-

semiobrutos re-
circa malleolos
mus, ac binis o-
um intactos ma-
pastinando. D
oculis parcinus
bunt, aurum
ternos quatern

Quid fa-

10 P RÆSTA
nostris ma-
iuxta latera fol-
singuli non ex-
a statis propul-

In-

Ha-

Qu-

V-

20 Idemq; Po-
bus in f. roben-
hoc per hyemē
ac per æstatē v-
tis committit
inferre censet,
rā bene pastin-
ber. Plinius er-
cessariū duci-
res stercore b-

30 abducos nō
contusa, mag-
fractum sit &
Hæc enim ad-
runt. Quidā
ciunt, tales e-
dam vrinan-
lum in singu-
rā ad alba m-
citius enim
40 ponendi, de-
cul. emus, &

semiobrutos relinimus vsque ad Martii calcem, vt aquam combibat. Tunc circa malleolos solum excauamus, & commouemus, & ad summum æquamus, ac binis oculis supra terram relictis, reliquum recidimus, ac per triennium intactos malleolos relinimus, non nisi constitutis temporibus solum pastinando. Deinde tertio anno viticulas omnes recidimus, non nisi duobus oculis parcimus, rustici castrare dicunt. Eo anno oblongos palmites procreabunt, autumno excauamus solum vsq; ad imum, & malleolos propagamus, ternos quaternosve palo adiungendo & colligando.

Quid faciendum ad celerem vitium radicationem. CAP. XVI.

PRÆSTAT enim vt posita semina celeriter radificentur. Ad id non pauca nostris maioribus adinuenta sunt experimenta. Prodidit Mago Pœnus iuxta latera fossarum paruos lapides disponere plantandis vitiradicibus, qui singuli non excedant quinquelibrale pondus. Hos aquas hyemis & vapores æstatis propulsare radicibus; quem sequutus Virgilius sic præcipit,

Aut lapidem bibulum, aut squallentes infode conchas.

Inter enim labentur aqua, tenuisq; subibit

Halitus, atq; animos tollent sata, iamq; reperti

Qui saxo super, atq; ingentis pondere testa

Virgerent: hoc effusus munimine ad imbres.

Idemq; Pœnus auctor probat vinacea permista stercorei depositis seminibus in scrobem vites mouere, quod illa prouocent, & eliciant nouas radiceulas, hoc per hyemē frigentem, & humidū scrobibus inferre calorē tempestiuum, ac per æstatē virentibus alimentū, & humorem præbere: si verò solum, cui vitis committitur, videtur exile, longius accersitam pinguem humum scrobibus inferre censet, vel malleolū amputatum statim fimo bubulo linito, tum in terrā benè pastinatā, & stercoreatam defigito. Palladius refert, quē Columella haberet. Plinius emolliri terrā iubet minus in scrobe ima sulcis, fimoq; misceri necessariū duci. Quintiliū à Magone, Qui vitē plantant, summas sarmentorū partes stercore bubulo liquido prælinūt: aiunt enim reptilia & vermiculos odore abductos nō accedere. Oportet autem in omnibus plantis quercinē glandis contusa, magnitudinem fabæ, & eruū fractum & semel molitū, ita vt solum fractum sit & diuisum, simul miscere, & plantarum locos inde conspergere. Hæc enim ad radicationem, & ad vini vetustatem, & ad fertilitatem conferunt. Quidam leguminum paleas maximè fabarum, vnā cum plantis coniiciunt, tales enim per hyemem calefaciūt, & ferarum nocumenta arcent. Quidam vrinam iniiciunt. Oportet autem & vinaceorum terrefactorum pugillum in singulos scrobes iniicere, ad nigra genera albarum vuarū vinacea, contrā ad alba nigrarum. Licet rectum plantare sarmentum, præstat obliquum: citius enim radicanter obliqua, sed res aut quatuor lapides manuales circumponendi, deinde adiacēte aggere adobruēdi, vt vnā cū stercore equaliter conculemus, & obseruemus, ne quē oculum iuxta terrā excæcemus, deinde alios

Lapides imponemus conculcato, magnitudine prioribus pares. Stercus igitur simul iniectum fouet, & firmat plantam. Vinacea citius radicē spargere faciunt. Lapides autem prohibent ne spatiosa terre amplitudo illabatur, & stare verò radices perfrigerant. Sotio enim cedria quā minima summam plantæ sedem, ac basim illinere iubet: nam hæc putrescere non finit, & reptilia adrepere prohibet suo odore.

Quòd in vinea diuersa sint vitium genera plantanda, eaq; distinguere ponenda. CAP. XVII.

PRVDENTIS est agricolæ, refert Columella, diuersa vitium genera in vinea deponere: non enim vnquam tam temperatus erit annus, quin nexet 10 aliquid vitis genus: nā siue siccus erit, quod humore perficit, cōtristatur, seu pluuius, quod siccitatibus gaudet, seu pruinosis quod non est patiens vredinis, seu feruens, quod vapores non substinet: si igitur vnum seuerimus, quū id acciderit tota vindemia priuabimur, at si varii generis vineta fecerimus, aliquid ex iis inuiolatū erit quod fructum proferat. Non tamen ea de causa nos cōpellamur ad multas varietates, sed sat erit per quatuor, vel ad summū quinq; genera vindemię fortunam experiri. Præterea per species digerendę vites in proprios hortos, cuius rei faciendę nos vtilitas multis de causis compellere potest. Primum quòd ad omnem vitæ rationē prudentem delectant impensus ea, quæ propriis generibus distinguuntur, quā quæ passim, velut abiecta, & quodam 20 ceruo confusa sunt. Deinde quū in agrum quis constitum venerit, summa cum voluptate miratur, quū illinc biturice, hinc paresiis heluolę respondent, illinc arcelanę, rursum illinc spioniæ, basilicęq; cōueniant, vel generis albi, vel flauentis, acrutili, vel purpureo nitore micantis, vndiq; versicoloribus pomis grauidus collucet autūnus. Sed hæc quāuis plurimum delectent, vtilitas tamen vincit voluptatē. Diuersę stirpes non pariter de florescunt, sed ad maturitatem simul pueniunt, quā ob causam qui separata generibus vineta non habet, aut serum fructū cum præcoque eleuet necesse est, quę res acorē facit, aut si maturitatē serotini expectet, amittat præcoquem vindemiā, præ populationibus volu- 30 crum, pluuiis, ac ventis lacescita dilabitur. Si verò cuiusq; generis fructum aueat, quū diuersę notę sint, melioris gustus ab deteriore corrūpitur, cōfususq; in vnū multarum sapor, vetustatis impatiēs fit, atq; necessitas cogit agricolam multi annonā expedire, quū plurimū pretio accedat, si venditio in annū vel in æstatē differri possit. Generū separatio hanc cōmoditatem habet, quod vinitor suā cuiq; putationem reddet, quū scit cuius sit notæ hortus, quod in vinetis nō confemineis obseruari difficile est, quia putatio administratur, quādo vitis folium nō gerat, multumq; interest plures aut pauciores materias submittat. Quin etiā quā cœli partē vnūquodq; genus vineti spectet plurimū refert, neq; enim omnis calido statu, nec frigido letatur, sed proprietas in vitibus, vt alia Meridie, alię Septētrione gaudeat, alię oriētis, vel occidentis tēperamento. Has 40 igitur differēcias seruāt, quo locorū situ, qui genera per hortos separant. Illam quoq;

quoque non exi-
rem sumptum na-
& quæ nondum
pariter vetus, atq;
operas quanto
stus cuiusq; gen-
silicus, siue spioni-
per potus nobilic-
tinere non possis,
lem fructumq; m-
eiusdem naturæ v-
peiore la datur. N-
serotinis leguntur
calcentur, multo
ralem aduersus se-
dixit, qui tria, aut
omnia simul com-
enim ad vnum ali-
porter fusim, se-
vitiis factum pl-
Februario.

FVI T vitis mai-
quidem nulla
tur, per gulis suste-
præcidatur, mult-
pereat. Quare non
oia dñi

Latitiam, & la-
leolis consita nor-
sumptum refugie-
ma, iniuriæ maxin-
re sua consumitur
le robur accepit,
stē perceperit, ad
sis recreari possit
conflictionis form-
tis, vq; in Octob-
omnesq; herbas,
in summum reici-

quoque non exiguam sequitur utilitatem, quod laborem vindemiae, & minorem sumptum patitur: nam quæ maturefcere incipiunt, tempestiue leguntur, & quæ nondum maturitatem ceperunt vix, sine dispendio differuntur. Nec pariter vetus, atq; tempestius fructus præcipitat vindemiam, cogitq; plures operas quantocunq; pretio conducere. Iam & illud magnæ dotis est posse gustum cuiusq; generis non mistum, sed merum condere, siue bituricus, siue basilicus, siue spionius, quæ genera sic diuisa, quia nil interuenit diuersæ naturæ, per potus nobilitantur. Quare vtilissima est generum dispositio, quam si obtinere non possis, secunda est ratio, vt conseras vites, quæ saporem consimilem fructumq; maturitatis eiusdem præbeant. Ad hæc Florētinus, Quia non eiusdem naturæ vites, oportet harum misturâ deuitare, vt ne melius ammixto peiore lædatur. Nihil enim adeo vinum obla dit, vt quum præcoces vix cum serotinis leguntur. Omnium verò maximè obseruandum, ne alba cum nigris calcantur, multo melius si non simul calcantur. Habent enim quandam naturalem aduersus sese contrariam affectionem. Didymus consultissimè facere dixit, qui tria, aut quatuor vitium genera separatim in vinea plantant, aut enim omnia simul comprehendunt, aut non simul omnia spem frustrabuntur. Et enim ad vnum aliquod genus animum conuertere non est tutum. Neque oportet fusim, sed singula genera separatim plantare: nam vinum ex diuersis vitibus factum plurimam differentiam habet. Hæc eadem Palladius habet in Februario.

De nouella vinea fosiōe. CAP. XVIII.

FVI T vitis maioribus nostris non lætitiæ solum, sed laboris symbolum, siquidem nulla arborum maiori indiget cura, vt nisi diligentissimè excolatur, pergulis sustentetur, palis, vel arboribus mariteretur, falce singulis annis præcidatur, multo denique labore custodiatur, breui admodum tempore pereat. Quare non imperite dixit Hesiodus,

οἷα δὲ νόστος δῶκε' αὐτὸς πόσι χαρμὰς, καὶ ἀγχοί.

Lætitiā, & laborem hominibus simul Bacchum dare. Vnde vinea iā maleolis consita non debet eam agricola, antequā pubescat, destituere, annum sumptum refugiens, vt disertissimus Columella monet. Res est tenera, infirma, iniuriæ maximè impatiens, quæ plerunque nimio labore, & nimia vbertate sua consumitur. Quum tamen aliquatenus se confirmauit, & veluti iuvenile robur accepit, negligentiam sustinet, nouella dura adolescit, nisi omnia iuste perceperit, ad maciem redigitur, & sic intabescit, vt nullis deinceps impensis recreari possit. Igitur summa cura, quasi infantium membra à primo die conscriptionis formanda, ne impensa in cassum recidat. Ex kalendis igitur Martiis, vsq; in Octobres, trigesimo quoq; die nouella vineta confodere oportet, omnesq; herbas, & præcipuè gramina extirpare, quæ nisi manu eligantur, & in summum reiiciantur, quantulacunque parte adobruta, reuiuiscunt, & vites

ita perirunt, vt scabra atq; retorrida fiant. Quæ ab eo excipiens Palladius, in Martio mense commemorat: ac puluerationem vocat. Martio enim mēsi nos solidum inter ordines positum crebris fossionibus resoluiamus, & in puluerem redigimus. Theophrastus verno tempore pastinari quàm altissimè iubet, vt spiritus abunde permistus pabulum præbeat, quippe aer quoque alimentum præstare potest.

De malleolis pampinatione facienda.

CAP. XIX.

OPTIMUM est malleolum sic formare ab initio, vt frequenti pampinatione superuacua detrahatur, nec patiamur plus quàm in vnam materiam vires, & omne alimentum conferre: primo tamen bini pampini submittuntur, vt sit alter subsidio, si alter fortè deciderit. Quum deinde paululum induruerit virgæ, tum deteriores singulæ detrahuntur, ac ne quæ relicta sunt ventorum procellis decutiantur, molli & laxo vinculo adurgentes subsequi conueniet, dum clauiculis suis, quasi quibusdam manibus adminicula comprehendant. Pampinationis tempestiuitas ea est, dum teneri palmites sunt, vt leui tactu digiti decutiantur: nam si vehementius induruerint, aut maiore nisu conuellendi, aut falce deputandi, quod vitrumque vitandum est, alterum quia lacerat, alterum quia matrem sauciat, quod in immatura adhuc stipe fieri est noxium, nam a stiuis caloribus impressum vulnus, latius inarescit, ita vt non minimam partem de ipso matris corpore enecet: vnde si duris caulibus falcem adhibere necesse est, si paululum ab ipsa matre recidendi, & velut resces relinquiendi, qui caloris iniuriam excipiant, eatenus, qua nascuntur à latere palmitis: ultra enim non serpit vaporis violentia. In malleolo eadem ratio pampinandi: si eo velimus vt adminiculo, in longitudinem eliciamus materiam. At si bino vti velimus, quum ad vnum pampinum redegeris, & ipse excesserit pedalem longitudinem, decacuminare conuenit, vt in ceruicem confirmetur, & fiat robustior. Palladius à Columella Augusto mense frigidis locis vineam pampinari debere dicit, ac siccis obumbrari potius vua, ne vi solis areseat. Magnus Theophrastus, Resecari plantas breui relicto palmitate præstat ubique, vt radices vires incrementa que capiant. Tempus tamen putandi ferè idem omnibus statuunt, sub ipsam scilicet germinationem, vt planta plena humoris protinus exiccet, vt germen optimè prodeat: quippe putationem ipsam non fructus, sed germinis gratia faciunt, autumnalem verò fructui præparant, vt dicemus. Cassianus in Maio mense pampinationem vult perfici, prominentes nouellarum vitium turiones auferri, & si quid in supernis partibus præterea excreuerit. Vno enim turione contentam esse nouam vitem conuenire.

De nouella vinea ablaqueatione. CAP. XX.

SEQUENS

SEQUENS
Octobris prius
opertas ostendit
si passus est con
parte terreni rac
in modum æstu
quire quicquid
dum est. Sed mi
ria truncum rad

10 quæ ex pluuiis co
noua vulnera pe
dice vnius digiti
cum defendunt
quenda: sin vi
verò prægelida
stercoris, aut in
bus infundes, an
bit primo quinq
ennio intermitte

20 10
Sive malleol
Malleolorum
bus syluere, n
media ratio seque
milluram veteris
germinet. Virgil

At
Par
Pal
Ipsa
Car

A BLAQ
nam virg
Anno s cundo
canda sarmen
duro coguntur
nam, vel duas

SEQVENS verò tempus ampliorem curam deposcit: nam post idus Octobris priusquam frigora innadant, vitis ablaqueanda est quod opus ad-
 opertas ostendit æstivas radículas, easque prudens agricola ferro decedit: nam
 si passus est conualescere, inferiores deficiunt, atque enenit, vt vinea summa
 parte terreni radices agat, quæ & frigore infestentur, & caloribus maiorem
 in modum æstuent, ac vehementer sitire matrem in ortu caniculæ cogant.
 quare quicquid intra sesquipedem natum est, quum ablaqueaueris reciden-
 dum est. Sed minime applicandum ferramentum ipsi matri, quoniam si iux-
 tra truncum radices præcideris, aut ex cicatrice plures nascentur, aut aqua,
 quæ ex pluuiis consistit in lacusculis ablaqueationis, brumæ congelationibus
 noua vulnera peruret, & ad medullam penetrabit, vnde recidere ab ipso co-
 dice vnius digiti spatio conueniet, sic non amplius pullulant, & à noxa trun-
 cum defendunt. Postea si hyems in ea regione placida, patens vitis relin-
 quenda: sin violentior, ante idus Decembris prædicti lacusculi æquandi. Si
 verò prægelida frigora regionem infestabunt, aliquid fimi, vel columbini
 stercoreis, aut in hunc usum præparatæ veteris vrinæ senos sestarios radici-
 bus infundes, antequam adobruas. Ablaqueare omnibus autumnis oportet
 bit primo quinquennio, dum vitis conualescat, vbi truncus adoleuerit, tri-
 ennio intermittenda est. Quæ iisdem verbis in Octobri recenset Palladius.

De nouella vineæ refecatione. CAP. XXI.

SIVE malleolum, siue vitiradicem conserueris, censet Columella, primi anni
 malleolorum formare incrementa, non pati vitem superuacuis frondi-
 bus syluescere, nec in tantum coercere, vt totam superficiem amputemus: sed
 media ratio sequenda est, vt annotato superioris anni pollice, supra ipsam com-
 missuram veteris sarmenti vnam, vel duas gemmas relinquamus, ex quibus
 germinet. Virgilius ad id:

*At dum prima noris adolescit frondibus atas,
 Parcendum teneris, & dum se laus ad auras
 Palmes agit, laxis per purum immissus habenis,
 Ipsa acies falcis nondum tentanda sed vncis
 Cerpenda manibus frondes, interq; legenda.*

De nouella vitis putatione. CAP. XXII.

ABLAQUEATIONEM sequitur talis putatio, vt à primo anno ad v-
 nam virgulam reducendam dicat Columella, nec recidendam totam.
 Anno secundo expleto, quia vel intererunt vites in totum recisa, vel infæ-
 cunda sarmenta producant, quæ amputato capite, velut pampinaria de-
 duro coguntur exire, propterea iuxta commissuram veteris sarmenti v-
 nam, vel duas gemmas censemus relinquendas, quod in viticula fortior.

seruandum. Sed nec verno tempore omnibus regionibus melior putatio est, nam vbi cœlum frigidum est, ea sine dubio eligenda est. Vbi verò aprica loca sunt, mollesque hyemes, optima, & maximè naturalis est autumnalis. Putatio fieri non debet secundum articulum, ne reformidet oculus, sed medio ferè internodio ea plaga obliqua falce fit, ne si transversa fuerit cicatrix, cœlestem superincidentem aquā contineat. Sed nec ad eam partem, qua est gemma, verum ad posteriorem declinatur, vt in terram potius deuexa, quàm in germen delachrymet: nam defluens humor cæcat oculum, nec patitur frō descendere. Eadem ab eo Damageron.

De vite formanda. CAP. XXIII.

DE vitis formatione hæc affert Theophrastus. Vitis verò subtus circum sua crura instituenda, formandaque est. Nam si vndique laevis, expoliataque sit, melior fecundiorque euadet. Nec difficulter possit ita formari, si quis non eos reliquerit palmites, qui per pulchrè excurrerint, sed illos qui aptissimi ad formationem destinata constituerint, quippe singulas gemmas singulis reliquisse abundè est. At si nec istud cerè fieri possit, quia scilicet vitis non per eandem tulerit partem, gemmæ profus internæ tollendæ sunt, vt ad exteræ alimentum excurrens, vitem scindat in brachia: semper enim ad partem viuam, atque capacem perfuitur. Quamobrem pro voluntate vitem formare facillè est. Sed hoc in agro humecto, atque frugali: sicco enim, squalenti-
que palmites, qui optimè profuierint, reliquisse necessarium. Quum enim siccus ieiunusque sit, nunquam alios facillè profert: quapropter factum impetum conspectari satius est. Quin & afflatuum ratione rescidisse decet, nec preter naturam quicquam est enitendum.

Quomodo plantanda, & alliganda sit nouella vinea.

CAP. XXIIII.

PVTATIONEM sequitur pedanda vineæ cura. Verum hic annus nōdum vehementem palum, aut ridicam desiderat, itaque arundines binas singulis vitibus applicabimus, quibus adnectantur singulæ transversæ perticæ in imam partem ordinis, quod genus iugicaterium vocant: refert enim vt paulum infra curuationem vitis prorepens pampinus statim apprehendat, & in transversa potius, quàm in edita se fundat, atque cauterio subnixus, facilius ventos sustineat iugum intra quartum pedem conuenit alleuari, dum se vinea corroboret, in pedationem. Deinde sequitur alligator, cuius officiū, vt rectam vitem producat in iugum, quæ si iuxta palum posita est, obseruet qui adnectit, ne in alliganda materia flexum pali sequatur. Recta arundo stirpi adiungenda, ita per crebra retinacula in iugum producenda. Nouella vinea quam lentissimò nectenda vinculo est, quia si viminibus salicis, aut vlnis ligaueris, incre-
scens vitis se ipsam præcidit, optima est genista, iuncus, vlua & arundinum fo-
lia

lia in vmbra sic-
ticam adiungit
cunq; vitem vult
xillo alligare opo-
ret, aut quatuor
to humeralem p-

SATIONIS

10 Sicut radix, inqu-
& cetera temp-
maturius, ex qu-
liam rationem
potius, quàm ca-
cilles, humor ni-
comprehendit
constituere vol-
vitæ positurus
fidem non hab-
adhibuerit dilig-
10 liciter nostros
regionis. Igitur
cere seminari-
arbutis occupa-
etiam quasi ab-
ruleris de humi-
campetres, &
mili loco facer-
quosum agrum
destinaueris p-
30 dinis habet plu-
lio iugerum ag-
dum iugeri co-
Vel si eodem
bus pedibus
Columella,
stirpes celer-
mum locum
fit idonea tra-
rem, quàm e-

llia in umbra siccata. A quo eadem Palladius in Martio mēse. Damageron per-
ticam adiungit corticem non habentem. In cortice enim cantharides, & quæ-
cunq; vitem vastare solent subtergrediuntur. Ipsam verò plantam extantā pa-
xillo alligare oportet. Viti enim perfectæ sex annorum putationem in hume-
ros ter, aut quater iuxta facultatē plantæ adhibere oportet, & vnicuiq; sarmē-
to humeralem paxillum apponere, qui sarmentum, & racemos ferre queat.

De vituario constituendo. CAP. XXV.

SATIONIS alterum genus est viuiradicis: plurimis enim diebus præstat vi-
uiradix, inquit Columella, minus enim interit, quum & calorem & frigus,
10 & ceteras tempestates propter firmitatē facilius sustineat, deinde adolescit
maturius, ex quo euenit, vt celerius quoq; sit tempestiua ædendis fructibus. A-
liam rationem addit Theophrastus, quod viuiradices solo pluuio deponendas
potius, quàm cetera semina censent. Radices enim quas illa dimiserit imbe-
cilles, humor nimirum putrefacit, viuiradices verò solidiores sunt, statimque
comprehendunt, vt impunè valeant perdurare. Vnde qui vineā, vel arbutum
constituere völet, seminaria prius facere debebit, sic enim sciet, cuius generis
vitam positurus sit: nam quæ pretio parata disponitur, certam generositatis
fidem non habet, quoniam dubium est, an is qui vendidit, legendis seminibus
adhibuerit diligentiam, tum etiam quod ex longinquo petitur, parum fami-
20 liariter nostro solo venit, propter quod difficilior conualescit alienum exteræ
regionis. Igitur eodem agro, quo vitam dispositorus es, vel certè vicino fa-
cere seminarium, idque multum refert loci natura. Nam si colles vineis, vel
arbutis occupaturus es, prouidendum est, vt siccissimo loco fiat seminarium,
etiam quasi ab incunabulis vitis exiguo assuescat humori, aliter quum trans-
tuleris de humido in aridum locum, viduata pristino alimento deficiet: at si
campestres, & vliginosos agros possidebis, proderit quoque seminarium si-
mili loco facere, & vitam largo consuescere humori: nam exilis, quum in a-
quosum agrum transfertur, putrescit. Ipsum autem agrum, quem seminario
destinaueris planum, succosum, sat erit bipalio vertere, ea repastinatio altitu-
30 dinis habet plus sesquipede, minus tamen quàm duos pedes. Eiusmodi bipa-
lio iugerum agri vertitur operis quinquaginta. Collem autem & cliuum mo-
dum iugeri continetrem duobus pedibus altè repastinabis operis sexaginta.
Vel si eodem loco, quo vineam ordinaturus es, facere völes seminarium, tri-
bus pedibus altè repastinabis iugerum operis octoginta. Iubetque alibi idem
Columella, seminario latissimum locum non destinandum, nam si depositæ
stirpes celeriter prosiliunt, si transferantur retorrescunt. Rursus nec tenuissi-
mum locum, quoniam malleolorum pars maior perit, & quæ superest, tarde
fit idonea translationi, & prudentis est colonipotius ex deteriori in melio-
rem, quàm ex meliore in deteriorem transferre. Ergo mediocris ager vituario

Plin. 17.

21.

est aptissimus. Sic in pastinato agro tripedaneis relictis spatiis, per quæ semina excolantur, in singulis ordinibus, qui duenos quadraginta pedes obtinent, sexcenteni malleoli pangendi sunt. Is numerus consumat per totum iugerum seminum millia quatuor, & viginti. Bithyni, Didymo auctore, plantaria vocant, ubi plantæ præfaginantur. In profunditatem non minorem pede poni debere, & ut faciliè per ligonem refodiantur, & semper à sole calefiant. Quod superfluum est in augescere per manum auferre oportet, (stuporem enim inducit ferri contactus,) quò vitis in crassitudinem crescat. Quidam secundo, aut tertio anno transplantant, sed triennales generosiores. Plantaria rigare non opus est, nisi & ipsas vites rigare velis. Omnia enim quæ in plantario fiunt, & in eadem vinea facere oportet. A Columella Palladius in Februario trāsferunt. Plinius: subtilitas parsimoniarum compendia inuenit, quum vinea in pastinato seritur, obiter seminarium faciendi, ut viuiradix loco suo, & malleolus qui trāsferatur, inter vites ordine seratur. Quæ ratio in iugero circiter xvi m. viuiradicum donat. Interest autem biennium fructus, quo tardius in satō prouenit, quàm in translato.

De viuiradicibus transferendis, plantandisq. CAP. XXVI.

Nunc viuiradices transferre, & plantare docebimus, & à scrobibus incipimus. In macro solo quinque pedibus inter ordines omisis, mediocri senis, in pingui verò septennum pedum spatia danda sunt, quo largiora vacent intersualla. Hæc in quincuncem vinearum metatio expeditissima ratione conficitur, quippe linea per totidem pedes, quorū destinaueris, inter ordiniorum spatiis, purpura, vel quolibet alio conspicuo colore insuitur, eaque sic denotata per repastinatum intenditur, & iuxta purpuram calamus defigitur, atque ita paribus spatiis ordines diriguntur, quod deinde quum est factum, fossor insequitur, scrobemque alternis omisis per ordinem spatiis à calamo ad proximum calamum non minus altum, quàm duos pedes, & semissem plaris locis refodit, accliuibus in dupondium & dodrātem: præcipitibus etiam in tres pedes in hanc mensuram scrobibus depressis viuiradices ita deponuntur, ut à media scrobe singulæ, & in diuersum sternantur, & contrariis frontibus fossarum ad calamos erigantur. Satoris officium est eodem momento, si fieri possit, quo serere velit, de seminario transferre plantam diligenter exemptam, & integram, deinde eam totam expurare, & ad vnā materiam firmissimam reducere, nodosque & cicatrices alleuare, si quæ radices laborauerint, eas amputare: sic deinde curuatam deponere, ne duarū vitium radices implicantur: id vitabitur per imum solum iuxta diuersa latera fossarum dispositis paucis lapidibus, circæpondo quinque. Quum semina depones imum scrobem bidentibus fodito, mollemque reddito. Vitē, quam ponis, fac ut ad Orientem spectet, adminiculo religata. Mago Carthaginensis adiicit, ut semina ita deponantur, ne proinus tota scrobs terra repleatur, sed dimidia pars sequente biennio

V
nio paulatim accrescentis locis vitibus
endum: nam in
cat, quare villi
henderint, post
lis, post paucos
me ad opertas
in scrobe supin
moq; applicetur
no noxia est, & non
non eadem vit
cium seri debet
& feruidum p
germen effun
rando, serendi
nio non inept
crassas, neque
teræ, id est ten
arescant timen
tandæ sint vit

Sept
Didymus di
præstare ab his
pote quæ radi
transplantatio
aut tertio anno
menle transpla
ladius quæ C

De vineis

30 Iam vinea
In earum pl
cta, lugata pl
cilior eius cul
excesserit po
impedanda
dali spatio r
mina circū
que protegi
prius paxille
40 sustineat. St

nio paulatim adæquetur: sic enim cogit vitem radices deorsum agere. Sed id
 ficcis locis vtiliter fit, vliginosis verò, aut vbi cæli status imbifer, minimè faci-
 endum: nam in scrobibus nimius humor consistens imbecillia tunc semina ne-
 cat, quare vtilius erit, deposita stirpe scrobes repleri, & quum semina compre-
 henderint, post æquinoctium autumnale ablaqueari, recisis in summo radicu-
 lis, post paucos dies adobui. Locis verò vbi cæli clementia permittit, tota hye-
 me ad operras radices relinquere conueniet. Id præcipuè obseruandum est, ne
 in scrobe supina vitis deponatur, sed ab imo vsq; recta materies erigatur, cala-
 moq; applicetur, nã si in alueo recumbet, quãdo ablaqueatur, vulneribus ob-
 noxia est, & nonnunquam præciditur. Tempora ferendi docet Theophrastus,
 non eadem vtrique solo reddi. Pluuium enim & frigidum, paulò ante æquino-
 ctium feri debet, quippe tunc siccissimum atque calidissimum est: sicculosum
 & feruidum post solstitium. Id enim quò amplius imbrem senserit, eò melius
 germen effundet. Reliquis omnibus ad normam eorum temporum mode-
 rando, ferendi tempus accommodabitur. Addit: Crassitudo plantarũ solo plu-
 uio non ineptè decernitur, viribus enim maximè opus est, sed squallenti neq;
 crassas, neque nimium tenues statuere debes: altera namque ne putrescãt, al-
 tera, id est tenues, atque imbecilles, ne priusquam cœperint germinare, ex-
 arecant timendum est. Hesiodus, & ab eo Virgilius Lunæ dies in quibus plan-
 tandæ sint vites, adiiciunt,

Septima post decimam felix, & ponere vites.

Didymus differentiam ponit inter viuiradices, & sarmenta. Viuiradices hoc
 præstare ab his, quæ à sarmento videntur, quod viuiradices auctiores sunt, vt-
 pote quæ radices egerunt, malleoli verò radicationem expectant. Præterea
 transplantatio meliorem fructum & vberiore facit. Viuiradices secundo,
 aut tertio anno fructifera, malleoli vix tertio, aut quarto anno. Et Februario
 mense transplantandas non anniculas, sed duorum, aut trium annorum. Pal-
 ladius quæ à Columella exceptit, in Februario habet.

De vinearum generibus, & primum de iugata. CAP. XXVII.

30 I AM vineam constituimus, nunc de singulis eius speciebus. Diximus vi-
 nearum plura genera: sed in vsu tria sunt, iugata, humi proiecta & subre-
 cta. Iugata plus aeris recipit, alius fert fructum, æqualius concoquit, sed diffi-
 cilior eius cultus. De ea ita præcipit Columella, Quum mensem trigessimum
 excesserit posita vinea, id est tertio autumno, vehementioribus statuminibus
 impedanda est, idq; non fortuito, siue prope truncum defigitur palus, sed pe-
 dali spatio recedendum est, ne radicem vulneret. & fossor ab omni parte se-
 mina circumfodiat, eo modo, vt Aquilonum excipiat violentiam, vitem-
 que protegat: siue medio interord nio pangatur, vel defodiendus est, vel
 prius paxillo perforato solo altius adigendus, quo facilius & iugum, & fructum
 40 sustineat. Statuminibus iuga sunt alliganda, vel saligneis perticis, vel complu-

ribus quasi fasciculis arundinum connectuntur, ne pandantur onere fructuum: nam binæ iam materia singulis seminibus submittendæ erunt, nisi gracilitas vitis angustiorē putationem desiderabit, cuius vnus palmes, & paucorum oculorum erit relinquendus. Arundines conuersis cacuminibus vincienda, vt æqualis crassitudo iugi sit, & quum iugum in fascem pluribus arundinibus alterna cacuminum vice ordinatum est, ferè quinquennii præbet vsum. Sunt qui non iugum in stellam decussari, sed simplici ordine contenti sunt: verum stabilior est vinea & oneri samentorum, & fructui ferendo, quæ ex vtraque parte iugo deuincta pari libramento, velut anchoris distinctur, quàm quæ simplici canterio stipatur. Potest tamen vinea si non lata, nec fructuosa, & cælum non procellolum, vni iugo contenta esse, sed vbi magna vis pluuiarum, vbi præcipitibus cliuis præsidia vitis desiderat, ibi quasi quadrato agmine circumfirmanda. Calidis, & siccis locis in omnem partem iugum porrigendum, vt prorepentes vndique pampini iungantur, & condensati cameræ more, sitientem terram obumbrent. Contrà frigidis, & pruinosis regionibus simplices ordines instituendi: nam sic facilius insolatur humus, fructus percoquitur, perflatum salubriorem habet, flosiores liberius iactant bidentes, melius custoditur, & commodius à vindemiatore legitur. Neq; est alia ratio putationis, aut ceteræ culturæ, quàm quæ primi biennii. Nam & autumnalis ablaqueatio sedulo facienda, nec minus vacanti bus palis propagines applicandæ. Hoc opus nunquam intermittendum, neque enim quæ feruntur, immortalia esse possunt, attamen eorum æternitati sic consulimus, vt demortuis seminibus alia substituamus, quinetiam crebras fissiones danda, pampinationes sæpe adhibenda, neque enim satis est semel tota ætate viti frondem superuacua detrachere. Decutienda etiam sunt omnia, quæ infra trunci caput germinauerint. Item si oculi singuli sub iugo binos pampinos emisierint, quamuis largos fructus ostendant, detrahendi sunt eis singuli palmites. Post quadragesimum & alterum mensem instituenda est putatio, vt submissi pluribus flagellis vitis in stellam diuidatur. Sed putatoris officium est pedali ferè spatium circa iugum vitem compescere, vt è capite quicquid tenerum est, per brachia emissum prouocetur, & per iugum inflexum præcipitetur, ad eam mensuram, quæ terram contingere non possit. Sed modus pro viribus trunci seruandus, ne plures palmites submittantur, quàm quibus vitis sufficere queat. Prædicta ætas læto solo, truncoque tres materias, raro quatuor desiderat, quæ per totidem partes ab alligatore diuidi debent. Iugum à terra leuandum est quatuor pedum humillimum, septem celsissimum. In nouellis seminibus vitandum: sed per longam annorum seriem ad hanc altitudinem vitis perducenda est. Si solum humidius, cælum, & venti placidiores, altius attollendum iugum, nam fructus à terra summotus minus putrescit, & hoc modo perflat ventis, qui nebulam & rorem adficcant, & ad deflorescendum, & vini bonitatem conferunt. Verum exilis terra, accliuus & torrens aestu, vel procellis obnoxia,

obnoxia, humi
nea pedum qu
editiora iuga co
minia didi. etc.

PVTATIO
ditur nouell
festinatione piri
ferum exeat tot
10 tota sit foetus. T
maturè illas rec
lia dimittere cel
germinationem
liorelcunt, & fr
humore, fructus
peratum agrum
maturè amputar
culi obrundantur
omnia plurimum
10 gna ex parte, & p
molti oculi exca
permittit in ea re
dum idus Octob
pluuiæ præcesser
feriorem putatio
mis violentiam d
exiguo possessio
valentissimam
Quin etiam per
30 autumnum depu
teriz, quanto ser
Vna
Et alibi:
A
Hy
Oc
Ex
Tun
An
40 Pamphilus in

obnoxia, humiliter iugum poscit. At si cuncta ex voto, iusta altitudo vinearum pedum quinque. Sed vites melioris saporis mustum præbent, quæ in editiora iuga consurgunt. Quæ Plinius & Palladius habent, à Columella omnia didicere.

De tempore putationis. CAP. XXVIII.

PUTATIO necessaria vitibus est, tum recenter enatis, tum perfectis: receditur nouella, ut vires concipiat, & intra se pascit, suffecturas oneri, aliâ festinatione pariendi gracilis, ac emucida, ne cohibeatur castigatione tali, in fœtum exeat tota. Nihil auidius nascitur, ac nisi ad pariendum vires seruentur, tota fit fœtus. Theophrastus de putationis tempore hæc habet. Alii sunt, qui maturè illas recidere iubent, quæ in solo sicco, & calido, quum primò sua folia dimittere cessauere; quæ in frigido, & pluuio positæ sunt, has paulò ante germinationem. Ratio quia in solo sitiente, humorem suum seruantes, meliorescunt, & fructum vini suauioris progenerant, quæ in frigido sunt, emisso humore, fructus fit incorruptior, & vini suauioris efficiens. Medium & temperatum agrum obtinentibus medium tempus statuitur. Sed non desunt, qui maturè amputari præcipiant, quòd palmites crassiores efficiantur, & nulli oculi obtundantur, & si tempus serenum contingat, plagæ siccantur. Quæ omnia plurimum profunt; nam hyberno tempore gemmæ pereunt frigore magna ex parte, & plagæ vi siccæ rumpuntur. Vere lachryma fluit, & permulti oculi excæcantur. Columella ita determinat: Si mitis, ac temperata permittit in ea regione, quam colimus, cœli clementia, facta vindemia secundum idus Octobris auspiciari putationem placet, quum tamen æquinoctiales pluuie præcesserint, & samenta iustam maturitatem ceperint: nam siccitas feriores putationem facit. Sin autem cœli status frigidus & pruinosis hyemis violentiam denunciat, in idus Februarii hanc curam differemus. Sed id in exiguo possessionis modo. at ubi raris vastitas temporis electionem neget, valentissimam vineti partem frigoribus, macerrimam vere, vel autumnò. Quin etiam per brumam meridiano axi oppositas vites, Aquiloni per ver, & autumnum deputari conueniet. Sed quanto maturius detonsa sunt, plus materia, quanto serius, plus fructus afferunt. Hesiodus Lunæ dies addit,

Vnaq; post decimam felix incidere vites.

Et alibi:

*Adum sex decies sol ardens occidit undis,
Hybernū post solstitium sacrosq; relinquens
Oceani fluctus sublimi Arcturus olympo
Exoritur, primumq; cupit splendescere sydus,
Tunc vites incide; noui neque nuncia veris
Antiquos iterans quaestus precedat hirundo.*

Pamphilus inchoat à Februario & Martio, à decima quinta Februarii, vsq;

ad vigesimam Martii. Alii post viademiā, attonfione sarmentorum vitem exonerari dicentes, & non vere lachrymantem alimentum perdere. Quæ in autumnō putatæ, vere citius germinant, & si ver frigidum & pruinofum, aduruntur. Quapropter frigidioribus locis vites præsecant, non amputant, vere postmodum putant. Putationem mane exoriri conuenit, vbi pruina à sole dissoluta, & sarmentum tepefactum. Palladius quæ habet ex his exceperit.

De vineaticæ falcis figura. C A P. XXIX.

VINEATICÆ falcis figura est, ut capulo pars proxima, quæ rectam gerit aciem, culter ob similitudinem nominetur, quæ flectitur, sinus, quæ à flexu procurrit, scalprum, quæ deinde adunca est, rostrum appellatur, cui superposita semiformis Lunæ species, securis dicitur, eiusq; velut apex pronus imminens, mucro vocatur. Harum partium quæq; suis muneribus fungitur: nam quum in aduersum pressa manu defecare quid vinitor debet, cultro vititur, quum autem retrahere, sinu, quum adleuare, scalpro, quum incauare, rostro, quum ictu cadere, securi, quum in angusto aliquid expurgare, inucrone. Maior pars operis in vinea ductim potius, quàm celsim facienda est: nam ea plaga, quæ sic efficitur, vno vestigio alleuatur, prius enim putator applicat ferrum, atq; ita, quæ destinauit præcidit: qui ea sim vitem petit, si frustratus est, pluribus ictibus vitem vulnerat: tutior igitur putatio, quæ ductu falcis, non ictu conficitur. Insuper duro, tenuissimo, & acutissimo ferramento opus est exequendum, hebes falx putatorem moratur, plus laboris, & minus operis affert, & plagæ asperæ, & inæquales vitem lacerant: nam non vno, sed sæpius repetito ictu res transigitur & accidit, quod præcidi debet, perfringitur, sic vitis laniata, & scabra putrescit: quare monendus putator prolixet aciem ferri, ac nouacula similem reddat.

Quæ vniuersè & peculiariter ad vitium putationem attinent.

C A P. XXX.

NO s vniuersè primò, deinde particulariter putationem aggrediemur. Theophrasti doctrinam afferemus omnium principis, & præceptoris. Vitibus, inquit, perfectis, primum ac summum putatio dabitur: quippe quum bene vitis putatur, germen & fructum melius affert, & diutius perennat. Omnes vites culturæ ingenium, modum & rationem exposcunt. Differentiam verò quam in operibus locorum ratio facit, cum in omnibus constat, tum in putatione. Quidam igitur determinarunt locis æstuosis, & siccis vites refecari ad breuem palmitem, ita enim fecundiores redduntur, quia vberius alere possunt; contra in humidis atq; succosis locis vitēs, quæ natura humidæ, ad longum, quia summa potius parte fructificant. Quidam in vniuersum de omnibus statuunt, non agri ratione, sed generum qualitarumq; iubetq; obseruari medullam in abscissis palmitibus: nam si multum medullæ habent, mul-

tos breuesq; pal-
dine longè fructu-
gerant, pauciores
vbiq; quo minus
dulla ita capi on-
spondeat. Profr-
palmites imbeci-
palmes recisus se-
dulla: creati vua-
10 argumentòq; vi-
annotinis protu-
& nouellas min-
carnem, & vina-
quidem medull-
in intima parte
cipue in putatio-
rem annum ma-
nam quicquid e-
quum sit per qu-
20 chia, quæ septen-
tibus frigidibus
infra cultos sub-
plures palmites
tiantur fructum
putatione differ-
accipit. Modum
vniuersum: illa p-
mentis circa cru-
diligenter refec-
30 mes internatus
rabit ab inferiori-
bella expurgabi-
cat cicatricem,
nam retedinem
de aridus, fissi-
est, quod & n-
affert. Si multa
Plagæ, quas i-
citius conuale-
40 quam fundunt
lata, vetera, ma-

tos breuesq; palmites relinqui oportet, vt vitis breuitate alere possit, multitu-
 dine longè fructificet: sin autem parum medullæ multum palmitis anniculi
 gerant, pauciores quidem, sed longiores palmites relinquendi, eoq; longiores
 vbiq; quo minus inest medullæ. Mensura palmitum semper ad rationem me-
 dullæ ita capi omnino debet, vt palmiti amplectenti, medulla in latitudine re-
 spondeat. Prorsus si medulla partem maiorem celsuræ occupet, fructus vberes,
 palmites imbecilles creari, propter alimenti tenuitatem existimant, contrā si
 palines recisus solidus, & iuuenili corpore constet, parum fructus, à parua me-
 dulla: creari vnam à medulla, & palmitem à palmitē amplectente medullam:
 10 argumento q; vitē ipsam potissimo esse. Germina enim omnia, quæ nouellæ
 annotinis protulerunt brachiis, fructu carere propter exiguitatem medullæ,
 & nouellas minus fructificare, quàm veteres, scilicet eadem de causa, quum
 carnem, & vinaceum medulla progeneret. Sed hoc minus verum apparet, si-
 quidem medulla detracta creetur caro, vinaceum nequeat generari, nisi forte
 in intima parte medulla detracta sic fiat. Columella autem: Vinitor tria præ-
 cipuè in putatione custodiat, primum vt fructui consulat, deinde vt in sequen-
 tem annum materias hinc eligat, tum etiam vt stirpi perennitatem acquirat:
 nam quicquid ex his omittitur, magnum affert domino dispendium. Vitis,
 quum sit per quatuor diuisa partes, totidē cæli regiones aspicit: eaigitur bra-
 20 chia, quæ septentrioni obiecta sunt, paucissimas plagas accipiant, ne ingruen-
 tibus frigoribus cicatrices inurantur. Itaq; vna materia iugo proxima, & vnus
 infra cultos submitendus erit, qui vitē in annum reuocet. At per meridiem
 plures palmites submittantur, qui æstiuis feruoribus matrem opacent, nec pa-
 tiantur fructum inarescere. Orientis, atque occidentis haud magna est in
 putatione differentia, quoniam solem pari horarum numero sub vtroq; axe
 accipit. Modum materiarum distabit humi atq; ipsius plantæ latitit. Hæc in
 vniuersum: illa per partes custodienda sunt. Igitur ab imo vitis, quasi à funda-
 mentis circa crus dolabra terra dimouenda est, & si soboles radicibus adheret,
 diligenter refecanda. Truncus deinde circumspiciendus, ne aut pāpinarius pal-
 30 mes internatus, aut furunculus relinquatur, nisi si iugo superiecta vitis deside-
 rabit ab inferiore parte reuocari. Si trunci pars, sole aut aquis peraruit, dola-
 bella expurgabis quicquid emortuum est viuo tenus, vt à viridi codice du-
 cat cicatricem, mox plagam terra, quam prius amurea madefeceris linies,
 nam teredinem, formicamq; prohibet, solem & pluuias arcet. Cortex dein-
 de aridus, fissusq; per summa trunci dependens, corpore tenuis delibrandus
 est, quod & melius vitis sordibus liberata conualescit, & minus vino facis
 affert. Si muscus comprimit, ferro eradendus est. Hæc de ima vitis parte.
 Plagæ, quas in duro vitis accipit, obliquæ, & rotundæ fieri debent, nam
 citius conualescunt, & quandiu cicatricem non obduxerint, commodius a-
 40 quam fundunt, transfusa plus humoris excipiunt, & continent. Sarmen-
 tata, vetera, male nata, contorta, deorsum spectantia recidito, nouella, &

fructuaria recta submittito, brachia tenera, & viridia seruato. Vngues custodam annos refecato. In quatuor pedes supra terram vitem elatam totidem brachiis composito, quorum singula spectent decussati iugi partes, tum vel vnum flagellum, si maior vitis erit, vel duo, si plenior, brachio cuiq; submittito, eaq; iugo superposita precipitato. Sed meminisse oportet, ne in eadem linea, vnoq; latere brachii esse duas materias, pluresve patiamur: nam id maximè vitem infestat, vbi non omnis pars brachii pari vice laborat, atq; equa portione succum proli sua dispensat, sed ab vno latere exugitur. Vocatur etiam focaneus palmes, qui solet in bifurco medius prorepere. nominis ratio, quod inter duo brachia enatus, veluti fauces obsidet, atq; vtriusq; alimenta praripit, amputandus igitur, priusquam corroboretur. si tamen roboratus, vt alterum brachium affligerit, illud tollitur, & focaneus summittitur. Igitur caput vitis pendens infra iugum constituto, vnde se pandant quatuor brachia in quibus quotannis vitis renouetur, amputatis veteribus, & submissis nouis palmitibus, quarum electus scire faciendus. Nam si magna materiarum facultas, putator custodiat, ne aut proximas duro id est ab trunco, & capite vitis relinquat, aut rursus extremas: nam ille exiguum fructum præbent, hæc vitem exhauriunt; se nimio fœtu onerantes, & se extendentes. Quare medio in brachio commodissimè palma submittentur, quæ nec spem vindemiæ destituant, nec emacient stirpem. Subsidiarius idemq; custos in pollicem refecari non debet, quum palma ex quibus fructus sperantur, idoneo loco sitæ sunt: nam vbi ligaueris eas, & in terram spectantes flexeris, infra vinculum materias exprimes. At si longius, & à vitis capite emicuerit, & in aliena iugorum compluuiâ brachiis proreperit, custodem validum, iuxta truncum duorum articulorum, vel trium relinquemus, ex quo proximo anno citata materia formetur in brachium. Sed in summittendo custode hæc maximè sunt obseruanda. Primum ne resupina cœlum, sed prona plaga terram spectet, sic gelidius se ipsa protegit, & sole: deinde ne sagitta, sed vngulis similis fiat refectio, nam illa celerius emoritur, hæc tardius reformidat. Maximè vitandum est, ne custos iuxta articulum recidatur: nam plurimum officit, quoniam secundum plagam gemma posita, frigore, & astu laborat, igitur medio internodio palmes attondetur deuexè, ne lachryma obcæcet oculum. Si refecis facultas non erit furunculum remittamus, si neq; is reperitur, saucianda ferro est vitis, ex ea parte qua pampinum elicere studemus. Palmites quos vindemiæ præparamus, clauiculis & nepotibus liberandi. Quicquid è trunco processit, eraditur, quo celerius obducat cicatricem. Quicquid è tenero processit, parcius detonderetur, quum coniunctam gerat ab latere gemmam. Materiarum longitudini difficile est modum imponere, sunt qui in tantum prouocant, vt precipitata per iugum nequeat terram cōtingere. Sed prius vitis habitus conspiciendus, nam si robustus, ampliores materias sustinet: deinde soli pinguedinem, quæ nisi adest, proceribus flagellis emaciatam necat. Longitudo palmitum

mitum non men
iora internodia
vbi spilla, multu
præterea vinito
gos fructus, par
perandum. Palla

SECVNDVM
se dicit Theo
10 reliquisse, quæ
vitis naturam. C
sent, quæ fruct
sum palmitem i
dem parte coact
& vitis conuale
nem aggredi, qu
fecto est, tunc e
pestiue recipiun
nare conuenit,
10 gescere solet, qu
dula iam constit
Vineam quam b
ria, quæ fructu
peditor sit, tum
deceperit, pro
Ante dies decen
peruacuenatur
deceperit, dunt
entur, demutil
30 urantur, suo si
ferre dixit: ita
eiudem experi
sarmenrum fr
plus germinu
incipit, folia
maturecant,
do maturum
ginta diebus a
re detractis, q
40 tate relinquer

mitum non mensura, verum gemmarum numero aestimabitur, nam si maiora internodia, eo usque materiam producere licet, dum terram contingat: at ubi spissa, multis palmitibus virefcit, numero soque fœtu exuberat. Consideret præterea vinitor, proximi anni magna necne, fuerit vindemia: nam post largos fructus, parcendum est vitibus, ideo angustè putandum, post exiguos imperandum. Palladius quæ à Columella excepit, Februario mense habet.

De pampinatione. CAP. XXXI.

SECVNDVM & quodammodo putationi proximum pampinationem esse dicit Theophrastus. Enimvero in hac etiam scire necessarium quam reliquisse, quæve detraxisse conducat, tam ad fructuum rationem, quam ad vitis naturam. Quum vites germinant, omnia quæ fructu carent detrabi censent, quæ fructum gestant demutilari, quum vva floret, ut nec vitis ad abscissum palmitem incrementum compellat, & quantum alimenti super sit, in eadem parte coactum vvam augeat. Semper ex recisione quærendum, id est, ut & vitis conualescat, & fructus copia consequatur. Iustum igitur pampinationem aggredi, quum fructus incipit provenire, mox vinea confodienda profectò est, tunc enim fructus novus, & recens editum germen, sarculum tempestivè recipiunt, quum maxime augeri contendunt. Post hæc iterum pampinare convenit, antequam florere incipiant: interim enim pendula racemi augescere solet, quia nondum acina constiterant, post ubi defloerint, vva pendula iam constitit, acina consistere, atque augeri incipiunt. A quo Columella. Vineam quàm benè putare, tam diligenter pampinare utile est, nam & materiæ, quæ fructum habent, melius conalescunt, & putatio sequentis anni expeditior fit, tum & vitis minus cicatricosa, quoniam id, ex quo viride & tenerum decerpitur, protinus conalescit. Super hæc quoque melius vva maturescunt. Ante dies decem, quàm vinea florere incipit, pampinatam habeto, quicquid superuacui enatum fuerit tollito, quod in cacumine, aut in brachiis erit, decerpito, duntaxat quæ vvam non habebunt. Cacumina virgarum, ne acciderentur, demutilato. Vvas, quæ meridiem, aut occidentem spectabunt, ne amurantur, suo sibi pampino regito. Sotio germina adhuc tenera oportet auferre dixit: ita enim perspirationem viti exhibebis: pampinatio fit, eiusdem experientia est putare, & pampinare, quæ propriè oportet aliquando sarmentum fructum habens auferunt, & non habens linunt. A recenti vite plus germinum auferendum est, ne grauetur. Quum caliditas solis hebescere incipit, folia auferre oportet, quo omnes racemi à sole calefiant, & percocti maturefiant. Paxamus addit: Vites quæ fructum putrefaciunt, & vix aliquando maturum reddunt, ob terræ humiditatem, & foliorum densitatem, triginta diebus ante vindemiam præpurgare oportet, foliis ex obliquo & à latere detractis, quo inspirantes venti vvam refrigerent. Verum folia in summitate relinquenda sunt, quo aduersus excellentem æstus vigorem protegentia.

foli in summo vitibus incumbenti vimbram obiciant. Simultus imber in autumno fiat, ut intumescerent acini valde auferant, etiam folia circa verticem tollenda sunt, ne vinum acescat. Plinius, Pampinatio verna in confesso est, ab idibus Maiis intra dies x, utiq; antequam flores incipiat, & eam infra iugum debere fieri. De sequente variant sententiæ: Quum defloruerit, aliqui pampinandum putant, alii sub ipsa maturitate. Sed de his præcepta Catonis decernent. Sed Cato hæc habet. Vbi vinea frondere cœperit, pampinato. Vbi vna varia fieri cœperit, vites subligato, pampinatoq;.

Depropagatione. CAP. XXII.

PROFAGATIONVM tria genera, inquit Columella. Vnum, quo virga edita à matre sulco committitur; alteru, quo ipsa mater prosternitur, atq; in plures palos per suas virgas diuiditur: tertium, quo vitis scinditur in duas, vel tres partes, si diuersis ordinibus diducenda est. Hoc genus tardissimè conualescit, quia vitis diuisa medullam amittit. Si virgam à matre in terram deprimere voles, scrobem quoquoersum quatuor pedum facito ita, ut propago non lædatur alterius radicibus. Deinde quatuor gemmas, quæ in imum scrobem perueniant, relinquito, ut ex iis radices citentur, reliquam partem, quæ continens matri est, abradito, ne superuacua sarmenta procreet; diuersæ autem, quæ supra terram extare debent, ne passus fueris plus, quàm duas aut tres gemmas habere: reliquas quæ in terram absconduntur, exceptis quatuor imis, fac abradas, ne in summo radices creet. Hoc modo tertio anno à matre separabitur. Sin autem ipsam vitem sternere voles, iuxta radicem ita, ne ipsam lædas, curiosè fodito, & vitem supplantato, ne radicem abrumpas. Quum eam straueris, & videris quousq; possis pertingere, sulcum vnum facies, in quem vitem dimittas, deinde ex sulco, quasi ramos fossarum facies, per quos uti quæq; virga postulauerit propagetur, atq; ita terra adoperies. Sin autem vitis exiguum materiem habebit, & in diuersos ordines diducenda erit, neq; aliter potuerit palos, ad quos perducitur, pertingere, quàm ut diffluat, curabis ut quàm acutissima falce ab ea parte, quæ bifurca est, findas, & eodem ferro acuto plagam emendes, sicubi inæqualiter findi videbitur, sic diducta poterit in plures ordines diuidi. Non inutilis est etiam illa propagatio, quam ipse reperit, si quando in ordinem vitis deest, neq; est ram proceram virga, quæ quum in imum scrobem demissa fuerit, retorqueri, & erigi supra terram possit. Breuitatem ne reformidaueris, sed qualemcunq; virgam, cuius cacumen in imum scrobem peruenit, deprimito, & obruito, deinde gemmas, quæ secundum ipsam matrem sunt, submittito, ut materias à superiore parte citent. Tum demum post triennium à matre amputato, & ad suum palum eam partem, quam à matre præcideris, reducito, & caput vitis facito. Propaginis scrobem ne minus triennio paulatim completo, summas radices præcidito, crebro fodito. Præsidarii malleoli hoc modo propagantur. Ex ordinaria

ordinaria vite in
bi supra terram
summersa per
materiam, quæ
quente deinde a
totas vires matri
suis radicibus ali
missa est, & id q
ditur, & scrobis
10 radices deorsum
progerminet. T
Octobr. in Idus
si vere id fecerit
destitutus lang
pedali altitudin
deflectens in scro
tipartem supra
velut ab vberem
agar à duabus m
10 cile ferunt, & v
connutita, tri
Februario recita
us hoc libro rece

QUUM nig
re videtur
Motus enim pe
herbam euellere
30 tari, nulla ratio
fuerant, cucum
mirum videtur
citata humo v
re tulit: & qui
titer mollior
omnia cū ad
lumbella autem
uenit religare
sic vberior pul
40 fuisse, qui Ce

ordinaria vite in alterum palum mergus est attrahendus. Mergi genus est, vbi supra terram iuxta suum adminiculum vitis curuatur, atque ex alto scrobe summersa perducitur ad vacantem palum. Tum ex arcu vehementem citat materiam, quæ protinus applicata suo pedamento ad iugum euocatur. Sequente deinde anno infecatur superior pars curuaturæ usque ad medullam, ne totas vires matris propagatum flagellum ad se trahat, & ut paulatim condiscat suis radicibus ali. Bima deinde præciditur, proximè palmam, quæ ex arcu submissa est, & id quod à matre abscissum recens erit, confestim altè circumfoditur, & scrobiculo facto, ad imum solum præciditur, adobruiturque, ut & radices deorsum agat, nec ex propinquo diligenter in summa terra resectum progerminet. Tempus autem idoneum hunc mergum amputandi ab idibus Octobr. in Idus Nouembr. ut hybernis mensibus suas radices confirmet: nam si vere id fecerimus, quo gemmare palmites incipiunt, matris alimento subito destitutus languescit. Anatolius aporygem palmitem sic propagat. Scrobem pedali altitudine effodit, ipsumque sarmentum inclinatum non decidens, sed deflectens in scrobem imponit, & aggregata effossa terra conspicuam sarmenti partem supra terram eminere sinit, ita ut altera ipsius pars viti coniuncta, velut ab vberè alimentum trahat, altera verò in terra nutriatur, & sic radices agat à duabus matribus coaltum. Quæ hoc modo plantata erunt, fructum facile ferunt, & vberriam proueniunt, utpote maternis, & propriis radicibus connutrita, triennio transplantantur. Palladius quæ à Columella habet, in Februario recitat. Caro vites in quasilis propagat, quam rationem quia sapius hoc libro recensuimus, hic conticendam duximus.

De puluere vitibus excitando.

CAP. XXXIII.

QUVM nigrescere vva incipit primis temporibus Theophrastus damna re videtur pulueris excitationem, quousque ad maturitatem perueniat. Motus enim percoquendi, motu altero auocatur, vetaturque, qua de causa nec herbam euellendam per id temporis censeat: At verò inutilem, noxiàmve putari, nulla ratio est. Vfus enim, & quod in aliis fieri solet, utilem esse planè confirmant, cucumeres namque puluere occultati nutriuntur & meliores fiunt, sed mirum videtur, quò pulvis aridus sit, quomodo nutrire possit. Ratio est, quia citata humo vaporati cuiusdam aëris alimentum reddatur, ut de solo vaporoso retulit: & quia fructus obiectus puluere, defendatur à solis feruore, & quia leuiter molliterque, siccescens, amplius à vite attrahere pabulum possit, quippe hæc omnia cum ad copiam alimentum, tum ad facultatē coquendi nimirum adiuuant. Columella autē: post pāpinationem pubescens, & quasi adolescentē fructum conuenit religare, foliisque omnibus nudare, rursus & crebris fossionibus implere: nam fit vberior puluerationibus. Nec inficiatur maiores tribus fossuris contentos fuisse, quò Celsus, & Atticus tres esse in vite motus dixerint, seu potius in omni

furculo naturales, vnum, quo germinet, alterum, quo floreat, tertium, quo maturefcat, hos ergo motus censent fossionibus concitari. Nō enim natura quod vult satis efficit, nisi eam labore, & studio iuueris. Alibi verò: Simulatq; vna variari cœperit, fodito tertiam fossuram, & quum iam maturefcat, ante meridiem prius, quàm calere incipiet, & quum defuerit post meridiem, fodito, puluerēq; excitato, ea res & à sole, & à nebula maximè vuā defendit. Finis autem fodiendi nullus est: nam quanto sapius foderis, tanto vberiores fructum reperies. Plinius: Sunt qui puluere quoq; vuas ali iudicēt, pubescentesque puluerent, & vitium arborumq; radicibus aspergant, quod certum est Narbonensi prouincię, & vindemias certius sic eo coqui, quia plus puluis ibi, quàm sol confert. Cassianus Iulio mense vites fodit: nam puluis maximè vuam maturam reddit & magnam, quapropter vitis iuxta viam sita vberiores & pleniores fert fructum, propter excitatum à prætereuntibus puluerem, & solē vitium illę fossione non indigent. Virgilius,

Sollicitanda tamen tellus, puluisq; mouendus.

De per se stantis vinea cultura, & brachiata & capitata.

CAP. XXXIII.

Nunc ad alias vinearum species transeamus. Vitis, quæ sine adminiculo suis viribus consistit, solutiore terræ scrobe, densiore sulco ponenda est. scrobes & sulci plurimum profunt, si in temperatis locis ante annum fiant. At si ieiuno, & exili agro semina deponentur, sub ipsum tempus sationis scrobs aut sulcus faciendus. Scrobs in longitudinem, altitudinemque defossus tripedaneus abundè est, latitudine tamen bipedanea, vel si quatuor pedum spatia inter ordines relicturi sumus, cōmodius habemus eandem quoque uersus dare mensuram scrobibus, non amplius tamen, quàm in tres pedes altitudinis depressis. Cæterum quatuor angulis semina applicabuntur, subiecta minuta terra, & ita scrobes adobruentur. Si aratro vineas culturi sumus laxiora interordinia relinquenda, si bidentibus, angustiora, sed neq; spatiosiora, quàm decem pedum, neq; contractiora, quàm quatuor. Multi ordines ita disponunt, ut per rectam lineam binos pedes, aut plurimum ternos inter semina relinquunt. Transuersa rursus laxiora spatia faciant, per quæ vel fossor, vel arator incedat. Depositam ergo stirpem formare sic conuenit, ut vitis sine pedamine consistat. Adminiculum teneræ viti contribuemus, quod vel infantiam eius tueatur, producatque usque in sesquipedem. Quum deinde robur accepit, sine adiumento consistere valens, aut capitis, aut brachiorum incrementis adolescit (nam duæ species huius culturæ sunt) alii capitatas vineas, alii brachiatas magis probant. Brachiata ita componitur, à summa parte, qua decisa nouella vitis est, quicquid iuxta cicatricem citauerit, conseruatur, & in quatuor brachia pedalis mensuræ diuiditur, ita ut in omnem partem cœli singula aspiciant. Sed hæc brachia non statim primo anno iam procera submittuntur, ne oneretur exilitas vitis, sed compluribus putationibus

tionibus in prædam cornua pro in orbem diffundantur tantum differt, nūm gemmarum In vinea, quam cumentum detrah hoc in lætis locis modi vinea arat sine vlla extantia crure & cornibus tura brachiatis, de germinauerit bulcus non pot nator, superuacua velut in coronam repant, & alimen & fossori præbe calidis vuæ cont regetibus sub or Si vitem in se co composita specie in se requiescat. mas singulis sarn fodito, vel si latè antebrum am ab dices prosequi v vnius digitū m quoq; anno ma fuisse conuenie les ablaqueatio astate sapissim que foditur, tri post ablaqueat aliorum pecor nem idoneum iusculum; ex pr nam eas adure num pro eo su iam valent, & v venit. In terra at

tionibus in prædictam mensuram educuntur, deinde ex brachiis, quasi quædam cornua prominentia relinqui oportet, atque ita totam vitem omni parte in orbem diffundi. Putationis autem ratio eadem, quæ in iugatis vitibus, vno tantum differt, quod pro materiis longioribus pollices quaternum, aut quinum gemmarum relinquuntur, pro custodibus autem bigemmes reseces fiunt. In vinea, quam capitata diximus, iuxta ipsam matrem usque ad corpus samentum detrahatur, una, aut altera gemma relicta, quæ trunco adhæreat, sed hoc in laetis locis fieri potest, ubi vis terræ fructum & materias præbet. Eiusmodi vinea aratris excolitur, detrahunt enim vitibus brachia, quod ipsa capita sine vlla extantia, neque aratro, neque bubus obnoxia sunt: nam in brachiatis, crure & cornibus bouum ramuli vitium plerunque defringuntur. Sed hæc cultura brachiatis, & capitis vitibus, antequam gemmæ, adhibetur, quum deinde germinauerint, fossor insequitur, ac bidentibus eas partes subigit, quas bubulus non potuit perungere. Mox ubi materias vitis exigit, sequitur pampinator, superuacuos abscindit & fructuarios submittit, qui quum induruerunt, velut in coronam religantur. Hoc duabus fit causis, una ne libero excursu prorepant, & alimenta pampini absumant, altera ut religata vitis aditum bubulco & fossori præbeat. Pampinandi modus, ut opacis locis æstate vitis nudetur, locis calidis vix contegantur, si defint frondes, adnectis muniantur. In Bætica vites tegetibus sub ortu caniculæ obumbrantur. Libro de arboribus multa addit. Si vitem in se consistere voles, in orbem quam rectissime formetur: nam sic composita speciosa erit, & minus laborat, quum vndique æquilibrio stabilita in se requiescat. Sat erit quum primò brachia submittentur, singulas gemmas singulis samentis relinqui, ne onere grauetur, post vineam bidentibus fodito, vel si latè disposita sit, aratro. Ab Idibus Octobr. ablaqueare incipito, ante brumam ablaqueatam habeto. Post brumam vitem ne colito, nisi eas radices prosequi velis, quæ in ablaqueatione apparebunt, sed ita reseces, ut instar vnius digiti à matre relinquantur. Peracta ablaqueatione ante brumam tertio quoque anno macerati stercoreis, ne minus binis sextariis, ad radices vitium posuisse conueniet. Post brumam ante æquinoctium vernum octauo Cal. Aprilis ablaqueationem adæquato. Post idus Aprilis terram ad vitem aggerato, æstate sapissime occato. Iugerum vineæ quinque operis ablaqueatur, quinque foditur, tribus occatur, quatuor putatur, sex alligatur. Anatolius iubet post ablaqueationem stercoreare, bubulo aut ouillo, aut suillo stercore, aut aliorum pecorū. Columbinum calidissimum existens ad celerem germinationem idoneum, sed vino incommodum. Singulis vitibus quatuor heminas cuiuscumque ex prædictis, paulò longius à trunco, nec nudis radicibus iniiciendum, nam eas adurerent. Si stercore deerit, paleæ fabarum aliorumque leguminum pro eo succedent, nam contra glaciem, & reptilia profunt. Vinacea etiam valent, & vetus vrina. Si glacies concreverit, etiam circa trūcos stercore conuenit. In terra arenosa stercore ouillo aut caprino, vtemur, in argillosa bubulo.

De prostrata vinea cultura, & characata. CAP. XXXV.

SUPEREST prostrata vinea cultura, quæ, ut Columella inquit, nisi violentissimo cœli statu suscipi non debet: nam & difficilem laborem colonis exhibet, nec vnquam generosi saporis vinum præbet. Bipedaneis ergo scrobibus malleolus deponitur, qui quum germinauerit, ad vnâ materiam reuocatur, ea que primo anno compescitur in duas gemmas, sequere deinde quum palmites profudit, vnus summittitur, cæteri decutiuntur: at ille, qui summiffus est, quum fructum edidit, in eam longitudinem deputatur, ut iacens non excedat interordinii spatium: nec magna est putationis differentia cubantis, & stantis rectæ vineæ, nisi quod iacenti viti breuiiores materiæ summitti debent, refecet quoque angustius in modum furuncolorum relinqui, sed post putationem, quam vtique autumno in eiusmodi vinea fieri oportet, ut vitis tota deflectatur in alterum interordinium, atque ita pars ea, quæ fuerat occupata, vel foditur, vel aratur, & quum exculta est, eandem vitem recipit, ut altera quoque pars excoli possit. De pampinatione talis vineæ parum inter auctores conuenit, alii negant esse nutandi vitem, quod melius contra iniuriam ventorum ferarumque fructum abscondat. Aliis placet parcius pampinari, ut & vitis non in totum superuacuis frondibus oneretur, & tamen fructum vestire, aut protegere possit. In characatis vineis prolixos palmites, quasi propagines summo solo adobruunt, deinde rursus ad arundinem erigunt, & in fructum summittunt, idque simplici ex causa, quod existiment plus alimenti terram præbere fructuariis flagellis: & post vindemiam, velut inutilia decidunt, & à stirpe summovent: sed ipse præcipit easdem virgas à matre præcisas, sicubi demortuis vitibus ordines vacent, aut si quis nouellam vineam instituit, pro viuiradice ponere, quoniam ea pars, quæ fuerat obruta, radices habet, quæ deposita confestim comprehendet. Palladius habet, quæ à Columella exceptit.

De ratione pedaminum, & viminum. CAP. XXXVI.

IAM vineæ pedaminum, iugorum, & viminum tradenda ratio est, hæc enim quasi quædam dotes vineis ante præparantur, quibus si deficitur agricola, causam faciendi vineta non habet, quum omnia, quæ sunt necessaria, quæenda sint extra fundum. earum enim comparatio molestissima, translatio hyberno tempore iniquissima, quare castaneta, saliceta, arundineta, & vimina consulo conferenda sunt. Viminalium singula iugera, quinque & vigenis iugeribus ligandæ vineæ sufficere possunt, arundineti singula iugera vigenis iugandis, castaneti iugerum totidem pedandis, quot arundineti iugandis, quorum factionum rationes iam suis locis reditæ sunt, & superfluum puto huc afferre. Per arida loca, quæ id genus virgultorum non recipiunt, genistam postulant, eius quum sit satis firmum, tum & lentissimum est vinculum. Seritur autem semine, quod quum est natum, vel deferitur bima viuiradix, vel relicta quum id tempus

V
tempus excessi
Cætera vincula
cessariam exigunt
habilis. Potest &
stanea decidit
tractatus, per
Esculus & fura
putrescit, la sum
persica, corylus,
10 Didymus paxillo
ram depangimur
sibi ipsi faciant

IOA

PC



Et alibi:

Et

Pop

30

tempus excessit, omnibus annis more segetum iuxta terram demeti potest. Cætera vincula quali sunt ex rubo, maiorem operam, sed in egeno tamen necessariam exigunt. Castanea roboribus proxima est, & ideo stabiliendis vineis habilis. Potest & quercus simili ratione feri, verum biennio tardius, quàm castanea deciditur. Castanea pedamentis omnibus præfertur à Plinio, facilitate tractatus, perdurandi peruicacia & regerminatione cædua, vel salice latior. Esculus cæsuræ triennio senior, nimis morosa nasci, hoc pedamentum minime putrescit, læsuræque maximè fruticat. Præter hæc sunt cædua fraxinus, laurus, persica, corylus, malus, sed tardius nascuntur. Sambucus firmissima ad palum.
 10 Didymus paxillorum supernas partes feruenti pice illinit, non eas, quas in terram depangimus. Stent perticæ rectæ, neque inflectantur, vt nec vites similes sibi ipsis faciant.

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER OCTAVVS

SIVE

ARBVSTVM.

PRO OE MIVM.



20 A mad eam vineæ speciem deuentum est, quæ viuo innitiur pedamento, eamque arbuſtum veteres vocarunt. Res proxima, cognataque, ob id post vineam de arbuſto dicemus. Ita vites arboribus maritantur, vt feminæ viris, & arbores vitibus orbatæ, viduæ dicuntur. Horatius,

*Ergo aut adulta vitibus propagine,
 Altas maritat populos.*

Et alibi:

*Et vitem viduas ducit ad arbores
 Populos.*

Maritantur enim vites arboribus, non tam ut fructus edant, quam ut eos edant meliores: nisi enim arboribus sublimarentur, humi repentes, longè deteriores vuas, & fatuas ederent, nullum saporem habentes, sero quæ ad maturitatem peruenirent. At arboribus maritæ, ab aëre perflantur, fouentur quæ à sole, quare nobilia vina non nisi arbutis gigni longo tempore decretum est. Sunt enim arbores eo ingenio, ut nisi propè satas quasdam habeant, & occulta quadam fortasse vi se mutuo adiuuantes sterilecant, ut vitibus contingere videmus, quæ arboribus indigent ad nobiliores fructus edendos. Vites natura sublimitatis avidæ, nullo fine crescunt, ut per arborum ramos scandentes cacumina æquant, in tantum sublimes, ut vindemiator autoratus rogum ac tumulum excipiat. Miratum altitudinem earum Aricia ferunt legatum Regis Pyrrhi Cyneam, facetè luisse in austeriorem gustum vini, meritò matrem eius pendere in tam alta cruce. Cato arbutum octauum locum tribuit, congruit quæ cum octauo nostra villæ libro. Fundum suburbanum arbutum maximè conuenit habere, ut ligna, & virgæ salicti venire possint, & lucrum domino fiat, qui utatur. Tradit Plinius arbuti rationem mirum in modum damnatam Safernæ patri, filio quæ, celebratam Scrofa, vetustissimis post Catonem, peritissimis quæ, ac ne à Scrofa quidem, nisi vni Italiæ concessam, quum tam longo indicetur æuo, nobilia vina non nisi in arbutis gigni, & in his quoque laudatiora summis, sicut vberiora imis: adeò excelitate proficitur. Nihil ibi malleolis, atque pastinatione opus est, nulla fodiendi impendia, utpote quum arbuti ratio hac peculiari dote præstet, quod in eodem solo feri fruges, & vitibus prodest. Super quæ quod vindicans se altitudo, non, ut in vinea, ad arcendas animalium iniurias, pariete, vel sepe, vel fossarum utique impendio muniri se cogat. Florentinus Græcus de arbutum loquens, Arboreæ vites omnibus commodiores sunt: nam & melius, diuturnius, & dulcius vinum efficiunt: & ex interuallis positæ, terram in ipsis quarto quoque anno seminari permittunt.

Quid sit arbutum & arbores arbutine. CAP. I.

LOCA vitiferis arboribus confita veteres arbuta vocarunt. Alii intelligunt per arbutum arbores in aciem dispositas ad vites sustentandas. Sed Caliodorus Iureconsultus in titulo de Terminis moto fruticosas arbores intelligit, ex arbore vna arbutum facere. Quod arboribus maritari vites desiderant, ostendit earum physiognomonia. Videmus enim tam esse sublimitatis avidas, ut in magnam altitudinem exeant, ut sæpe ex se domorum tecta scandant: nullum finem ascendendi habent. Dedit quoque videmus eis Naturam capreolos, quos clauiculas & pampinos vocamus, Græci helicas, Varro codiculos, viuentes intortos ut cincinnati, à capiendis dictos, quoniam ad locum capiendum sursum versus serpent, ex his altissimis arboribus maritandæ, & sic nobilissimum vinum ferunt. Quod si eis non dederis quibus fulciantur adminicula, improbo reptatu per arua vagantur, succum quæ terræ passim bibentes, ignobile vinum ferunt.

V
ferunt. Sed arbutum
vitem videtur al
plerisque repudiat
atum, id enim de
vitem commodi
risque soli generit
bus gratissima ef
latur vltimus, re
quæ salix à plerisque
arbores difficili
stat. Plinius has re
dem, artinia, deir
non plerisque frax
padana Italia præ
cu arbutum agro
nit: Non omnes
quæcunque vnam
bent contractas,
brent. Sunt autem
in Bithynia vitem
am, quæ & multi
to quoque anno se
stantius vinum in

Diff
VETERVM
res primas
præferant, Colu
detur reicienda
leuissima, etiam
30 è grauiissimis, ne
noxiam esse non
confitemur, quæ
pericentia man
& vuas ab vlt
etiam post vin
pensa, copiosa
sis, vltro citro
sobolem pullu
tiat, ut aratur
40 cinia macresce

ferunt. Sed arbutiuas arbores, quæ sint, indicat Columella: Opulus maximè vitem videtur alere: sed quia raram, neq; idoneam frondem pecori præbet, à plerisq; repudiata est, immò Gallico arbusto peridonea, quod vocatur rumpotinum, id enim desiderat arborem humilem, nec frondosam. Vlmus, quòd & vitem commodissimè patiat, & iucundissimum pabulum bubus afferat, variisq; soli generib; proveniat, à plerisq; feritur. At fraxinus, quia capris, & ouibus gratissima est, nec inutilis bobus, locis asperis, nec montosis, quibus minus latatur ulmus, rectè feritur. Quin etià cornus & carpinus, & ornus, nonnunc quæ salix à plerisq; in hoc ipsum disponitur, sed salix nisi aquosis locis, ubi aliæ arbores difficilius comprehendunt, ponenda non est, quia vini saporem infestat. Plinius has recèset: Prima omnium ulmus, excepta, propter nimiam frondem, attinia, deinde populus nigra eadem de causa minus densa folio: nò spernunt pleriq; fraxinū, sicumq; & etià oleam, si non sit umbrosa ramis. Transpadana Italia præter supradicta, cornu, populo, tilia, acere, orno, carpino, quercu arbutat agros, Venetia salice propter viginem soli. Florentinus has decernit: Non omnes arbores vitibus arboreis supponere, & adiungere oportet, sed quæcunq; vnā radicem habent, velut est alba populus, aut quæ radices habent contractas, & comam non valde profundam, ut ne penitus vitem obumbrant. Sunt autem eiusmodi ulmi, populi nigra, fraxini, aceres. Cognouitq; in Bithynia vitem arboream ceraso delectari, & maximè escariam, & amineam, quæ & multi fructus, & multi vini causa existit. At terram hanc etiam quarto quoq; anno seminare licet & non solum vitem non offendi, sed etiam præstantius vinum inde fore promittunt.

Differentia inter ulmum, & populum. CAP. II.

VETERVM & neotericorum calculis sancitum est inter arbutiuas arbores primas partes ulmum & populum sibi vindicare, sunt qui ulmum præferant, Columella nigram populum ab arbusto abdicat, nobis autem videtur reiicienda ulmus, recipienda verò populus. Plinio ulmi umbra videtur leuissima, etiam nutrienda quæcunq; opacat, sed Attico hæc quoque videtur è grauiissimis, nec dubitat Plinius, si emittantur in ramos: contracta verò ulmi noxiam esse non arbitratur. Sed profectò quæ id dixerit ratione, facile nescire confitemur, quum omnibus agricolis in confesso sit, & quotidiana nobis experientia manifestum, ulmorum umbram non nutricem, sed nouercam esse; & uas ab ulmorum frondibus opacatas, nunquam maturitatem recipere, etiam post vindemiam. Folia ramulosa fert, densa, breui, firmoq; pediculo appensa, copiosa, nullis ventis mobilia, auctu morosa, radicibus prælongis, crassiss, vltro citroque vagantibus, validis ut macerias & muros terebrent, densam sobolem pullulantibus, ut locum, in quo crescat, radicibus compleat, & irretiat, ut aratrum remoretur, ut multo alimento quo indigeat, omnes in suavicia macrescere, & arescere cogat. Obuiam quamque arborem radicibus

circundat, & strangulat. Sæpius videre contigit vitem nulla de causa exarescentem, tunc ablaqueatam ab vlni radicibus complexam, obstrictam, strangulatamque conspeximus, & securi radicibus præcisus aliquando conualuit. Infelices illi, fruique dici possunt complexus viri, quibus obstricta vxor præsecatur. Nimia zelotypia vxor demacatur, non alitur. Prædensa, callosaque etiam sua fronde ventos arcet, qui & alere, & maturare solent fructus. Contra verò ad vitem alendam, idonea & egregia omnia populus habet. Fronde leui, parua, longo pediculo, eodemque ventis omnibus semper ludenti, mobilissima, vt non solum nullam vmbra facere dici possit, sed crebro iactu solem temperet. Vnde soli, & ventis omnibus semper prostrata, suaque per brachia repens, ad cælum pergit. Radice breui, gracili, nuda, nec repullulante, paucoque indiget nutrimento, vt vxori non succipiat. Alias rationes omittimus, ne prolixius euagemur, quam par sit. Igitur omnibus consulendum iudicauimus, nunquam nisi vbi necessitas cogit, in montuosis arbutum ex vlmis confecti debere.

De agro arbutis idoneo eligendo. CAP. III.

ET si ager vineis aptus idem & arbutis idoneus censeatur, tamen est ali-
quid arboribus indulgendum, quibus arbutum constituatur. Virgilius,

*Qua tenuem exhalat nebulam fumosq; volucres,
Et bibit humorem, & quum vult ex se ipsa remittit:
Quæq; suo viridi semper se gramine vestit,
Nec scabie, & salsa ledit rubigine ferrum:
Illa tibi latis intextet vitibus vlmus.*

Columella præcipit locis pinguibus conferendam vlmum, vel etiam mediocribus, sed asperis, & stuculosis neque opulus, neque vlmus tam idonea, quam ornus, & fraxini: Florentinus verò Græcus, Arboreas vites in campestri, & concauo, & plano loco plantandas ostendit. Meminisse enim semper, & peculiariter obseruare oportere, quod humilibus vitibus illa terra aptior est, quæ in obliquis, leniter accliuibus, altioribus, & siccioribus locis existit: hæc enim æstatem leniorem habebit, probeque perflabitur. In campestri verò plana que, & humida terra, arboreas vites plantare oportet: & calidioribus locis, vbi venti non valde vehementes sunt, & ipsas in arboribus eleuatas, placide perflantes nutriunt. In frigidis locis, & ventosis arboreas vitis læduntur.

Conferendarum arborum ratio in arbutto. CAP. IV.

QUOMODO autem arbores in quincuncem ordinatæ in arbutto dispositæ erunt, iam quarto libro demonstrauimus: & quam plurimis in locis in Neapolitanis agris nostra manu confite elegantissime visuntur. Interual-
la verò arboribus concedenda ex soli qualitate, & cultura perdiscuntur. Sed à
maiori

maioribus ediscuntur, sequuntur in quincuncem interual-
lis loquuntur pedes, exili verò Arbutum inter ipsas arbores, & dabunt. Segetes nius: Interual-
ga, frondem quæ mittenda aliqua cubitorum quincuncem in his spatii arbutum malus punica, plantare licet, & hoc falsum expone Plinio autem vites seri non videntur infestat, & dicitur. Linea purpura, vel quæ tum intenditur, ordines diriguntur, arbutum constitutum quatuor pedum vlmum, opus fraxinus locum deponatur, seminario igitur, num tempus, arbutum, & cetera scribitur quibusdam placet, altitudines terni vnde pullos, & fraxinæ tenit, hoc est, si fieri possit, vt solent in medio fieri

maioribus edificamus. Varro de formæ cultura hæc dicit, quæ specie fiant venustiora, sequi, ut maiore quoque fructu sint: ut qui habent arbusta, si sata sunt in quincuncem, propter ordines, atque intervalla modica. Columella de intervallis loquitur: si frumentis consulendum, vberi solo intra quadraginta pedes, exili verò, ubi nihil feritur, intra viginti arbores disponantur. Et alibi: Arbustum inter quadragenos pedes dispositum esse convenit: sic enim & ipsæ arbores, & appositæ vites melius conualescunt, fructumque meliorem dabunt. Segeres enim, quæ in eo erunt, minus umbra laborabunt. Ab eo Plinius: Intervallum iustum arborum, si aretur solum, quadragenique pedes interga, frondemque, in latera vicini: si non aretur hoc, in omnes partes. Nec ommittenda aliqua, quæ Florentinus Græcus habet. Ordines habeant intervalla cubitorum quindecim: ita enim & melius vinum erit, & copiosius. Cæterum in his spatiis arbores fructiferæ paucarum radicum plantari præcipit: velut est malus punica, malus quæcunque, & cotonea: oleam etiam in his intervallis plantare licet, & si à quibusdam improbetur. Quidam ficum interserunt: sed hoc falsum experientia convincitur, quapropter præstat foris circumplantare. Plinio autem videtur ficorum levis umbra, quamvis sparsa, ideoque & inter vites feri non verat. Sed hoc falsum est, nam præ longis, crassissimisque radicibus infestat, & densiori latiorum foliorum umbra. Quincuncialis ordo sic instituitur. Linea per totidem pedes, quot destinaveris inter ordiniorum spaciis purpura, vel quolibet alio colore insignitur, eaque sic denotata, per repastinatum intenditur, & iuxta purpuram calamus defigitur, atque ita paribus spatiis ordines diriguntur. Signatis igitur locis, in quibus arbores plantandæ, qui arbustum constituere velit, ante annum quam deponat arbores, scrobes faciat quatuor pedum quoquo versus, deinde circa Calen. Martias in eandem scrobem vlmum, opulum, vel fraxinum deponat, ut si vlmus defecerit, opulus, vel fraxinus locum obtineat. Si autem vtraque vixerit, altera eximatur, & alio loco deponatur, sed vlmus autumnni tempore melius, quam vere disponitur. E seminario igitur, ubi translationi idonea est, ex eo tempore autumnni usque in verum tempus, antequam radix vلمي delibretur, quo terra imbris permaduerit, rectè feritur. Plinius: In arbustum quinquennes vلمي transferuntur, aut (ut quibusdam placet) quæ vicenum pedum esse cœperunt, fuleo, qui novenarius dicitur, altitudine pedum trium, pari latitudine, & eo amplius, circa positas pedes terni undique è solido adaggerantur. Arulas id vocant in Campania. Populos, & fraxinos, quia festinantius germinant, disponi quoque maturius convenit, hoc est ab Idibus Febr. plantis & ipsas nascentes. Præfodere scrobes ante (si fieri posset) tanto, donec pingui cespite obducantur. Mago ante annum iubet, ut solem pluviasque combibant, aut si id conditio largita non sit, ignes in medio fieri ante menses duos, nec nisi post imbres in his feri.

ARBUSTIVÆ arboris formationem augustissimè Columella recenset, à quo omnes exceperunt, nec quicquam addendum, vel demendum iudicamus. Quamcumque arborem seueris, eam biennio proximo putare non oportet. Postea verò si vlmus exiguum incrementum recipit, verno tempore antequam librum demittat, decacuminanda est iuxta ramulum, qui videbitur esse nitidissimus, ita tamen vti supra eum trunco stirpem dodrantalem relinquas, ad quam ductus & applicatus ramus deligetur, & correptus cacumen arbori praebeat. Deinde stirpem post annum præcidi, & alleuari oportet. Quod si nullum ramum arbor idoneum habuerit, sat erit nouem pedes à terra relinquere, & superiorem partem detruncari, vt noua virgæ quas emisserit, ab iniuria pecoris sint tutæ. Sed si fieri poterit, vno ictu arborem præcidi, si minus, ferrâ defecari, & plagam falce alleuari oportebit, eamque plagam luto paleato contegi, ne sole, aut pluuiis infestetur. Post annum, aut biennium, quum enati ramuli rectè conualuerint, superuacuos deputari, & idoneos in ordinem demitteri conueniet. Quum iam adolescere incipient, falce formandi, & tabulata instituenda sunt (sic vocant ramos & truncos prominentes) eosque vel propriis ferro compescunt, vel longius promittunt, vt vites laxius diffundantur. Hoc in solo pingui, illud melius in gracili. Tabulata inter se minus ternis pedibus absint, atque informantur, ne superior ramus in eadem linea sit, quam inferior: nam demissum ex eo palmitem germinantem inferior atteret, & fructum decutiet. Igitur nouellam vlmum sic formare conueniet: Loco pingui octo pedes à terra sine ramo relinquendi, vel in aruo gracili septem pedes, supra quod spatium deinde per circuitum in tres partes arbor diuidenda est, ac tribus lateribus singuli ramuli submittendi; primo tabulato assignentur, mox de ternis pedibus superpositis, alii ramuli submittendi sunt, ita ne in eisdem lineis, quibus in superiore, positi sint. In eademque ratione vsque in cacumen ordinanda erit arbor, atque in frondatione cauendum, ne aut prolixiores pollices fiant, qui ex amputatis virgis relinquuntur, aut rursus ita alleuentur, ne ipse truncus lædatur, aut delibretur: nam parum gaudet vlmus, quæ in corpus nudatur: vitandumque ne de duabus plagis vna fiat, quum talem cicatricem non faciliè cortex comprehendat. Arboris autem perpetua cultura est, non solum ante diligenter eadem disponere, sed etiam truncum circumfodere, & quicquid frondis enatum fuerit alternis annis aut ferro amputare, aut astringere, ne a multa vmbra viti noceat. Quum deinde arbor vetustatem fuerit adeptæ, propter ramum vulnerabitur, ita vt excaueretur vsque in medullam, qua sit exitus humori, quem ex superiore parte cõceperit. Plinius ab eo. Et vlmus detruncata à media in ramorum scamna digeritur, nulla fere x x pedū altiore arbore. Tabulata earū ab octauo pede altitudinis dilatantur in collibus, siccisque agris: à x ii in cæpestribus, & humidis. Meridianū solem spectare palmites debent.

bent. Rami à p
virgultorum ba
arbores excre
omnis vistera

I A u formata
tequam ex to
mum maritauer
necabit, ita sibi p

boris maritanda

leni terra, totid
aur minimum q
tio: nam si radi
rit, incremento
facito, vt pluui
binæ vites, quo
deponendæ, cau
sicca serantur. C

nos admoneat,

20 dum in semina

stent, cui abren

neq; pragoldus,

tes post a quino

retram, quæ ara

mnes explicem

subacta operiam

mo si robe depo

arborem erigi,

mina septentrio

30 perato celsi fat

bram patiantur

tis, denas sæpè a

validas inimicu

be necessarium

hoc modo vite

pellatas transfe

ganres, & radie

ram imponunt

plantat, deinde

40 niatur & marit

bent. Rami à projectu digitorum modo subrigi, tonsili in his tenuium quoq; virgultorum barba, ne obumbrent. Florentinus in bona terra vt arbutiuar arbores excrecant permittit, verum in tenui à pedibus octonis abscindit, ne omnis vis terræ in arbores absumatur.

Quomodo vites arboribus maritandæ. CAP. VI.

IAM formatæ arbori vitem adiungemus, quam, vt Columella inquit, antequam ex toto arbor praualescat, conferere conuenit. At si teneram vltimum maritaueris, nouam sufferet: si vetustam vitem applicueris, coniugem necabit, ita sibi pares esse ætate, & viribus arbores, vitesq; conuenit. Sed arboris maritandæ causa, scrobs viuiradici fieri debet, latus pedes duos, altus leni terra, totidem pedum, graui, dupondio, & dodrante, longus pedes sex, aut minimum quinq; Absit autem hæc ab arbore ne minus selquipedali spatium: nam si radicibus vltimi iunxeris, malè vitis comprehendet, & quum tenuerit, incremento arboris opprimeretur. Hunc scrobem si res permittit, autumno facito, vt pluuiis & gelicidiis maceretur. Circa vernum deinde æquinoctium binæ vites, quo celerius vltimum vestiant, pedem inter se distantes scrobibus deponendæ, cauendumq; ne aut septentrionalibus ventis, aut rorulentæ, sed sicca serantur. Quum de seminario eximuntur, rubrica notetur vna pars, quæ nos adimoneat, ne aliter vites constituamus, vel arbores, quàm quemadmodum in seminario steterint. Plurimum enim refert, vt eam partem cæli spectent, cui ab tenero consueuerunt. Melius autem locis apricis, vbi cæli status neq; pragelidus, neq; nimium pluuius est, autumnii tempore & arbores, & vites post æquinoctium deponuntur. Sed ex ira conferendæ sunt, vt summam terram, quæ aratro subacta sit, semipedem altè substernamus, radicesque omnes explicemus, & depositas stercoremus (vt ipse existimat) si minus, terra subacta operiamus, & circum calcemus, ipsum seminis codicem. Vites in vltimo scrobe deponi oportet, materiasq; earum per scrobem porrigi, deinde ad arborem erigi, & ab iniuriâ pecoris caueis emuniti. Locis autem feruidis semina septentrionali parte arbori applicanda sunt, locis frigidis à meridie, temperato cæli statu, aut ab oriente, aut ab occidente, ne toto die solem, aut umbram patiantur. Plinius ab eo aliqua addens: Singulis arboribus iam plantatis, denas sæpè adnutriunt vites, damnato agricola minus ternis. Maritare nisi validas inimicum, enecante veloci vitium incremento. Serere tripedaneo scrobe necessarium, distantes inter se arboremque singulis pedibus. Florentinus hoc modo vitem deponendam censet: Alii radicas plantas, viuiradices appellatas transferentes ponunt, alii perfectam fermè vitem floridam perpur-gantes, & radicibus extrahentes cum propria terra in fossam iuxta arborem sitam imponunt. Deponit autem aliter. Spatio trium cubitorum ab arbore plantat, deinde vbi probè coalita haferit, vt iam sufficiens sit, quo arbori vniatur & maritetur, (quod ex crassitudine indicatur) totam prostratam, & de-

fossam arbori adiungit, pedis spatio ab arboris radice, reliquo palmitē libero relicto, & quosunque oculos relictos esse contingit, eos omnes vngue ademptos excæcat, quo vnum aut alterum germen in summa parte relictum vberius augeat, quod deinde vbi auctum fuerit, sensim arbori adiungere, vt in ea conquiescat, conuenit. Quandoquidē verò contingit vitem arboris truncō circulariter adhaerentem, ac circumscritam hocq; modo in altum ascendentem, temporis progressu comprimi & quodāmodo suffocari propter vnitionem, quam ad ipsum truncum habet, pleriq; in Bithynia inter vitem, & arborem cuneum inferunt, atq; vbi hoc modo vitem ab arbore dispararunt, fecerunt & torulum ipsi viti subornant, in quo requiescat.

De arbutina vitis putatione. CAP. VII.

IAM ad putationem deuentum est, difficillimam cultus vitis partem. Columella vtilissimè putat primo quoque tempore falcem vitibus admouere, nec superuacuis sarmentis pati syluescere, sed eam quoq; quæ primo submittitur, materiem ferro coercendam censet vsq; in alteram, vel tertiam gemmam, quo robustiores palmites agant, qui quum primum tabulatum apprehenderint, proxima putatione disponentur, omnibus annis alioquin in superius tabulatum excitabitur relicta semper vna materia, quæ applicata truncō cacumen arboris spectet. Iamque viti constituta certa lex ab agricolis imponitur: plerique imatubulata materiis frequentant vberiorē fructum, & magis facilem cultum sequentes. At qui bonitati vini student, in summas arbores vitem promouent, vt quæq; materia se deuectæ in celsissimum quæque ramum extendunt, sic vt summa vitis summam arborem sequatur, id est, vt duo palmites extremi truncō arboris applicentur, qui cacumen eius spectent, & prout quisque ramus conualuit, vitem accipiat. Plenioribus ramis plures palmites alius ab alio separati imponantur, gracilioribus pauciores. Vitis nouella tribus toris ad arborem religetur, vno, qui est in crure arboris, à terra quatuor pedibus distans, altero, qui summa parte vitem capit, tertio, qui mediam vitem complectitur. Torum imum imponi tum oportet, quum vires viti adimit: interdum enim necessarius habetur, quum aut arbor sine ramis truncata est, aut vitis præualens in luxuriam euagatur. Cætera putationis ratio talis est, vt veteres palmites, quibus proximi anni fructus pependit, omnes recidantur, moui, circumcisus vndique capreolis, & nepotibus, qui ex his nati sunt, amputati committantur, & si lata vitis est, vltimi potius palmites per cacumina ramorum præcipitentur, si gracilis, truncō proximis, si mediocris, mediis, quoniam vltimus palmes plurimum fructum affert, proximus nimium, vitemque exhaurit, atque attenuat. Maximè prodest vitibus omnibus annis resolui: nam & commodius enodantur, & refrigerantur, quum alio loco alligatæ sunt, minusque læduntur, & melius conualescunt. Atque ipsos palmites ita tabulatis

super-

superponi conuenit, quæ non confribulam est, viti alligatum superius tendit, ea genera sunt, altera que frondem siniculo palmitis lant, cuius vt se gemmas religant. Quum deinde arborum m teneriores tran quam enim quum partem aliquam duas, vel tres prout vestiat. Viti loco natus est, vt tes pampinarii v subarantur: pampinus loco aliquam gemmam validiorem materiam hornotis virgis sed plurimum materiam cacumen supermen id genus co torqueat, deinde in torseris, lata her, quamuis fructu. Alterum est gatum, dependereat, etiam si dicitur: nam pampinus qui inter duoterrimum esse inter quæ natura & luxuriosam fructu oneretur multa fronde co

superponi conuenit, vt à tertiâ gemma, vel quâta religati dependeant, eos-
 que non constringi, ne sarmentum vimine præcidatur. Quod si ita longè ta-
 bulatum est, vt materia parum commodè in id perducipossit, palmitē ipsum
 viti alligatum supra tertiâ gemmâ religabimus. Hoc ideo fieri præcipit,
 quia quæ pars palmitis præcipitata est, fructu induitur: at quæ vinculo adnexa
 sursum tendit, ea materias sequente anno præbet. Sed ipsorum palmitum duo
 genera sunt, alterum quod ex duro prouenit, quod quia primo anno plerun-
 que frondem sine fructu affert, pampinarium vocant, alterum, quod ex an-
 niculo palmitē procreatur, quod, quia protinus creat, fructuarium appel-
 lant, cuius vt semper habeamus copiam in vinea, palmitis partes ad tres
 gemmas religandæ sunt, vt quicquid intra vinculum est, materias exigat.
 Quum deinde annis, & robore vitis conualuit, traduces in proximam quam-
 que arborem mittendæ, easque post biennium amputare, simulatque alias
 teneriores transmittere conuenit: nam vetustate vitem fatigant: nonnun-
 quam enim quum arborem totam vitis comprehendere nequit, ex vsu fuit
 partem aliquam eius deflexâ terræ immergere, & rursus ad eandem arborem
 duas, vel tres propagines excitare, quò pluribus vitibus circumuenta celeri-
 us vestiatur. Viti nouellæ pampinarium dimitti non oportet, nisi necessario
 loco natus est, vt viduum ramum mariter: veteribus vitibus loco nati palmi-
 tes pampinarij viles sunt, & plerique ad tertiâ gemmâ resecti optimè
 subarittantur: nam in sequenti anno materias fundunt. Quisquis autem
 pampinus loco natus in exputando, vel alligando fractus est, modo vt a-
 liquam gemmâ habuerit, extolli non oportet, quoniam proximo anno vel
 validiorem materiam ex vna creabit. Præcipientes palmites dicuntur, qui de
 hornotinis virgis enati in duro alligantur, hi plurimum fructum afferunt,
 sed plurimum matri nocent. Itaque nisi extremis ramis, aut si vitis arbo-
 ris cacumen superauerit, præcipitari palmitem non oportet. Quod si ta-
 men id genus colis propter fructum summittere quis velit, palmitem in-
 torqueat, deinde alliget, & præcipitet, nam & post eum locum, quem
 intorseris, latam materiam citabit, & præcipitata minus virium in se tra-
 het, quamuis fructu exhuberet. Præcipitem verò plus anno pati non oportet.
 Alterum est genus palmitis, quod de nouello nascitur, & in tenero alli-
 gatum dependet (materiam vocant) ea & fructum, & noua flagella bene pro-
 creat, etiam si ex vno capite duæ virgæ summittantur, tamen vtraque materia
 dicitur: nam pampinarius quam vim habeat, supra docuimus. Focaneus est,
 qui inter duo brachia, velut in furea de medio nascitur, eum colem de-
 terrimum esse comperit, quod neque fructum ferat, & vtraque brachia,
 inter quæ natus est, attenuet, itaque tollendus est. Plerique vitem validam,
 & luxuriosam falsò crediderunt feraciorem fieri, si multis palmitibus sub-
 missis oneretur: nam ex pluribus virgis plures pampinos creat, & quum se-
 multa si onde cooperit, peius defloret, nebulasq; & rores diutius continet.

omnemq; vnam perdit. Validam ergo vitem in ramos diducere censet, & traducibus dispergere, atq; diradiare, ceterosq; vinearios colles præcipitare, & si nimis luxuriabitur, solutas materies relinquere, ea ratione vitem feraciorem facere. Sed ut densum arbutum commendabile fructu, & decorum est, sic ubi vetustate rarefcit, pariter inutile, & inuensum est. Quod ne fiat diligentis patrisfamilias est primam quamq; arborem senio confectam rollere, ut in eius locum nouellam restituere vitem queat, nec tam viuira dice frequentare, quam ex proximo propagare. Plinius ab eo, & ab usu sui temporis de arbuti putatione hæc retulit: Vires spectare Aquilonem debent ipsæ: Palmires autem earum ad meridiem. Non est festinandum ad putationem nouellæ, sed primò in circulos materies colligenda, nec nisi validæ putatio admouenda. Seriora ferè anno ad fructum arbuta, quam vitis iugata. Sunt qui omnino putari vetant, priusquam arborum longitudinem equauerint. Prima falce sex pedes à terra recidatur flagello infra relicto, & nasci coacto in curuatione materia. Tres ei gemmæ non amplius deputato super sint. Ex his emissi palmites proximo anno imis inferantur scammis, ac per singulos annos ad superiora scandant, relicto semper duramento in singulis tabularis, & emissario vno, qui subeat vsq; quo placuerit. De cetero putatione omni flagella, quæ proximè tulerint, recidantur: noua, circumcisis vndiq; capreolis, spargantur in tabularis. Est quorundam impericia, sub ramo vinculo suspendendi, suffocantium iniuria, quando contineri debet vimine, non arctari. Quin immo etiam quibus salices super sint, molliore hoc vinculo facere malunt, iunco, cypero, vlua. Liberam quoque vinculo per aliquot dies vagari, & inconditam spargi atq; in terra, quam per totum annum spectauerit, recumbere. Namq; ut veterina à iugo, & canes à cursu volutatio iuuat, ita tum & vitium porrigi lumbos. Arbor quoq; ipsa gaudet a si duo leuata onere, similis respiranti. Nihil est in opere naturæ, quod non exemplo dierum & noctium aliquas vices feriarum velit. Ob id protinus à vindemia putari & lassas etiamnum fructu ædito improbatur, ut putatæ rursus alligentur alio loco: namq; orbita vinculi sentitur vexatione non dubia. Palladius nil, nisi quæ Columella.

De arbutto Gallico. C A P. VIII.

EST & alterum arbuti genus, authore Columella, quod rumpotinum vocatur. Id desiderat arborem humilem, nec frondosam, cui rei maxime videtur idonea opulus. Potest & vlmus sic disponi, ut adhuc tenera decacuminetur, ne altitudinem quindecim pedum excedat: nam ferè ita constitutum rumpotinetum animaduertit, ut ad octo pedes locis sicci, & diuosis, ad duodecim locis planis, & vliginosis tabulata disponantur. Plerunq; autem ea arbor in tres ramos diuisitur, quibus singulis ab viraq; parte complura brachia summittuntur, tum omnes penè virgæ, ne vmbrent eo tempore, quo vitis putatur, baraduntur. Arboribus rumpotinis, si frumentum non inferitur, in v-

tramq;

namq; partem v
in alteram partem
simili ratione atq;
ponantur, ut ead
traduces omnibu
teres decidantur.
ligetur. Quum d
neatur. Hoc gen
& circumfodiunt

ET si superio
loquuti fuer
ter loqui: & pri
um, quod scribit
omnibus locis, ac
habeat humoris,
quod vere nimius
giata. Varro à Th
Luna silenti, pos
tera est, quando
rinus infitionis te
ciditur vitis, hum
glutinosum remi
tionem, ita enim
demiam infitione
tationem habet.
bribus in Calend
firmat. Eoque
mentis alendis f
30 moris, & siccio
mere id permitt
vitem compreh
cipiendam sit.
hibetur, quod
corticem mou
pentibus iam
ter mouent, n
plagam inurer
nò dissimilis e
mauerit inferen

tramq; partem viginti pedum spatia interueniunt, at si segetibus indulgetur, in alteram partem quadraginta pedes, in altera viginti relinquuntur. Cætera simili ratione atq; arbusco Italico administratur, vt vites longis scrobibus deponantur, vt eadem diligentia curentur, atque in ramis deducantur, vt noui traduces omnibus annis inter se ex arboribus proximis connectantur, & veteres decidantur. Si tradux traducem non contingat, media virga inter eas deligetur. Quum deinde fructus pondere vigeat, subiectis adminiculis sustineatur. Hoc genus arbusci, cæteraq; omnes arbores, quanto altius arantur, & circumfodiuntur, maiore fructu exuberant.

De vitium insitione. CAP. IX.

ET si superiori nostro libro de insitione, satis superq; in vniuersum de ea loquuti fuerimus, lubet hoc loco & decet de vitium insitione singulariter loqui: & primo dicamus quo tempore inferenda sit vitis. Tempus idoneum, quod scribit Theophrastus, est vere, autumno & caniculæ exortu. Neq; omnibus locis, ac generibus idē. In sicco, macro loco, & argilloso, quod minus habeat humoris, verum tempus idoneum. In terra bona & pingui, autumno, quod vere nimius humor: quam sationem quidam metiuntur ferē diebus triginta. Varro à Theophrasto desumit. Cato hæc habet: Vitē inferi oportet Luna silenti, post meridiem sine vento Austro. Vitis insitio vna per ver: altera est, quando vna floret, ea optima est. Plinius quæ Cato recitat. Florentinus insitionis tempus vere determinat, glacie iam cessante, quando dum inciditur vitis, humorem neque multum, neque aquosum, neque crassum, & glutinosum remittit. At Luna desinente sarmenta decidere oportet ad insitionem, ita enim robustiora sunt. Quidam non solum vere, sed & post vindemiam insitionem faciunt: tunc enim vitis densiorem impetum, ac concitatiorem habet. Tempus inferendi Iulius Atticus tradidit à Calen. Nouembribus in Calendas Iunias, quo ad posse custodiri surculum sine germine, affirmat. Eoque debemus intelligere nullam partem anni excipi, si sit sarmentis alendis facultas. Sed Columella in aliis stirpium generibus, quæ firmioris, & siccioris libri sunt, posse id fieri concedit, in vitibus verò nimis temere id permissum, non quod ignoret brumæ temporibus aliquando in firmam vitem comprehendere, sed quod quid certa ratione plerumq; proueniat præcipiendum sit. Idem per brumam negat rectè putari vitem: quod merito prohibetur, quod frigoribus omnis surculus rigore torpet, nec propter gelicidia corticem mouet, vt cicatricem consanet. Verior itaque ratio est inferendi tepentibus iam diebus, post hyemem, quum & gemmas, & corticem naturaliter mouent, nec frigus ingruit, quod possit aut surculum insitum, aut fissuræ plagam inurere. Permisit tamen festinatibus autumno vitem inferere, quia nō dissimilis est eius aëris qualitas vernæ. Sed quocunq; quis tempore destinauerit inferere, non aliam sciat esse curam surculis explorandis, quàm quæ

tradita est, quum de malleolis eligendis præcepit, quos ubi generosos, fœcundos, & quàm maturissimos viti detraxerit, diem quoq; tepidum, silentemq; à ventis eligat. Tum consideret furculum teretem, solidiq; corporis, nec fungosæ medullæ, crebris etiam gemmis, & breuib; internodiis, nam plurimum interest non esse longum sarmentū, quod inferatur, & rursus plures oculos, quibus egerminet, inelle. Itaq; si sunt longa internodia, necesse est ad vnam, vel summum duas gemmas recidere furculum, ne proceriorem faciamus, quàm ut tempestates, & ventos, & imbres immobilis pati possit. Sed insitiones tradamus. Cato tres vitis insitiones tradit. Præcisam, per contactum, & trebrationem. Sed quæ per rescissionem, frequentior est, & omnibus agricolis cognita, de ea prius edisseremus. Ita igitur inquit. Vitem sic inserito: Præcidito quam infereseamq; per mediam diffindito per medullam, eò furculos præacutos arcito, quos inferes, medullam cum medulla composito. Plinius isdem verbis refert. Sed quod à Catone & Plinio edocetur falsum est, nam si medullam insiti cum medulla vitis coniunges, non comprehendet insitus furculus: nam ut diximus, medulla vitalis pars non est, sed cortex. Sed modus à Columella edocetur. Reciditur vitis plerunq; supra terram, nonnunquam tamen & infra, quo loco magis solida est, atq; enodis. Quum itaque iuxta terram insita est, furculus adobruitur cacuminae tenus, at quum editior est à terra, fissura diligenter subactò lato linitur, atque superposito musco ligatur, quod & calores, & pluvias arceat. Temperatur ita furculus, ut calamo non absimilis coagmentet fissuram, sub qua nodus in vite desideratur, qui quasi alliget eam fissuram, nec rimam patiatur ultra procedere. Is nodus etiam si quatuor digitis à rescissione abfuerit, illigari tamen eum prius, quàm vitis findatur, conveniet, ne quum scalpro factum fuerit iter furculo, plus iusto plaga hiet. Calamus autem non amplius tribus digitis debet alleuari æqualiter ex ea parte, qua raditur, ut sit levis, eaque rasura ita deducitur, ut medullam contingat vno latere, atque altero, paulò ultra corticem distringatur, figureturque in speciem cunei, sic ut ab ima parte acutus furculus, latere altero sit tenuior, atque altero plenior, perque tenuiorem partem insertus, eo latere ardeatur, quo est plenior, & utrinque fissuram contingat. nam nisi cortex cortici sic applicetur, ut nullo loco transluceat, nequis coalescere. Vinculi genus ad insitionem non vnum est. Alii viminibus adstringunt, nonnulli circumdant libro fissuram, plurimi ligant iunco, quod est aptissimum: nam vimen, quum inaruit, penetrat & infecat corticem, propter quod molliora vincula magis probamus, quæ quum circumuenere truncum, adactis arundineis cuneolis arctantur. Sed antiquissimum est, & ante hæc ablaqueari vitem, radicesque summas, vel soboles amputari, & post hæc adobruere truncum, isque quum comprehendit aliam rursus exigit coram: nam sæpius pampinandus est, quum germinat, frequentiusque detrahenda sunt soboles.

soboles, quæ à la fundit, subligantur tener pampinæ propter penuriam, de falcem maturatio, ut ubi nullus alter ita recidatur ex duro. Putandum verò plaga trunci ducimoris quoque m diebus prælecanatur. A quo Varronimius est humilipaulò infra, quare possit. Referunt vitem inferere v sarmentum sulcis dis altitudinem 10 Quidam verò in alto inseritur tas cogat in alto fundo, præparatum est, profaciunt. Sarmentis oculis, maximè tres. Si verò tereto plures, quàm enim post principio verò firmius contentia. Neque sed post sectionem, prius tamen facta sunt, inferenda firmius utique verum fructuosa: quæ veteri qualata, cito inferuntur 40 tem à terra accedunt, ad duorum

soboles, quæ à lateribus, radicibusque prærepunt, tum quod ex insito profundit, subligandum, ne vento furculus motus labefacteretur, aut explante-
 tur tener pampinus, qui quum excreuit, nepotibus orbandus est, nisi si pro-
 pter penuriam, & caluitium loci sumitur in propagines. Autumno deinde
 de falcem maturis palmitibus admouet, sed putationis insitis custoditur ea
 ratio, vt vbi nulla desideratur propago, vnus furculus euocetur in iugum,
 alter ita recidatur, vt adæquetur plaga trunco, sic tamen ne quid rada-
 tur ex duro. Pampinandum non aliter est, quàm in nouella viuiradice.
 Putandum verò sic, vt vsque ad quartum annum parcius imperetur, dum
 10 plaga trunci ducat cicatricem. Theophrastus hæc addit: In insitione hu-
 moris quoque modus obseruari oportet, qua de causa vitem aliquot antea
 diebus præsecant, vt lachryma effluat, neque putrescat, neque vermicule-
 tur. A quo Varro: Vitæ triduo antequam inserant, desecant, vt qui in ea
 nimius est humor, defluat ante, quàm inseratur, at in qua inserunt, in ea
 paulò infra, quàm insitum est, incidunt, vnde humor aduenticius efflu-
 re possit. Referemus quæ Florentinus habet, nam aliquid noui dicit. Qui
 vitæ inserere velit, crassum truncum deligat, qui vnum atque alterum
 sarmentum suscipere queat. Quidam igitur in terra inserunt, ad sempe-
 dis altitudinem descendentes, & ferè in vitis fundo insitionem faciunt.
 20 Quidam verò in planitie inserunt, id quod optimum existit, quod verò
 in alto inseritur, difficulter coalescit à ventis agitatū. Si autem neces-
 sitas cogat in alto insitionem facere propter leuitatem existentem in pro-
 fundo, præparatum palum habeto, quo ad ipsum deliges, quod in alto
 insitum est, propter ventos. Quidam etiam in humeros trunci insitionem
 faciunt. Sarmenta ad insitionem accipienda sunt rotunda, solida, densis
 oculis, maximè ex brachiis. Sufficiunt autem sarmento oculi duo, aut
 tres. Si verò terra obruatur, tres, aut quatuor. Cæterum ab vno sarmen-
 to plures, quàm duos furculos secare ad insitionem non conuenit. Quod
 enim post primos septem oculos superest, sterile & inutile existit. At
 30 verò firmitus coalescent noua sarmenta, perysini sarmenti partem ha-
 bentia. Neque verò statim vt ablata sunt à vitæ, sarmenta inferemus,
 sed post sectionem obtecta plaga in dolio deponemus, vt ne transpi-
 rent, prius tamen quàm germen fundere incipiant, & dum adhuc clau-
 sa sint, inferemus. Quæ igitur ad terram ad ipsum vitis fundum inferimus,
 firmitus vtique inferentur, eleuata simul terra ad ipsorum enutritionem,
 verum fructum tardiorē reddent, velut alia in terra plantata sarmen-
 ta: quæ verò in altiore parte insita sunt, difficulter coalescent, à ventis
 quassata, citius tamen fructum producent, oportet autem ea, quæ in al-
 to inseruntur, esse leuia & plana, crassitudine pollicari. Aspretudinem au-
 40 tem à ferrâ acuta falce læuigare expedit. Porò sarmentum quod inferendum
 est, ad duorum & dimidii digiti longitudinem ex vna parte deradere oportet,

quemadmodum formatos videmus calamos scriptorios, ita ut ex vna parte medulla illa sa appareat, ex altera vero ipse cortex. Deponendum est autem farmentum totum, quatenus derasum est, ut ne quod inter truncum & farmentum medium est, hier, explendumque argilla: prohibebitur ita humor, & is, qui in ipso est, humor custodietur. Ceterum pars trunci post plagam liganda est vinculo simplici, sed infracto, deinde luto glutinoso illinenda. Quidam etiam bubulum sterus ad lurum ammiscent. Quæ igitur hoc modo insita sunt, eorum vinculum aqua per spongiam irrigamus sub crepusculum vespertinum in æstatis maximè vigore. Vbi autem iam germinans quatuor digitorum fuerit, ridicam iuxta defigere oportet, & alligare, ut à ventis sit securitas. Quum germen auctum fuerit, vinculum falce dissiccare conuenit, ut à coarctatione liberetur, & humor ex trunco in farmentum distribuatur. Plinius Catonis verba recitat, id ex suo adiicit: Ut gemmascere incipiet, legatur calamus, nec plus quam binis ab initio emineat oculis, vltimo vimine alligatus, binaque circumcidatur acie à duabus partibus, ut inde potius distillet humor, qui maximè vires infestat. Deinde quum equaluerint flagella pedes binos, vinculum insitum incidatur, vbertati crassitudine permessa. Satiæ plantæ si syluestrium radicibus inferuntur, degenerant in feritatem. Reliqua cælo constant. Aptissima insitis siccas: huius enim remedium, appositis fictilibus vasis, modicus humor per cinerem distillat.

De aliera vitis insitione. CAP. X.

ALTERA insitionis species à Catone apponitur. Si vitis vitem contingat, vitis vtriusque latus alterum præadito oblique, & inter se medullâ cum medulla libro colligato. Plinius eisdem verbis recitat. Si inter se vites contingant, vtriusque in obliquum latere contrario adraso, iunctis medullis colligari. Sed quid vterque dicat, ignoro: nisi id docere voluerint, quod Varro docet, non in vite solum, sed aliis arboribus. Ex arbore, à qua quis vult habere furculum, in eam, quam inferere vult, ramulum traducit, & in eius ramo præciso, ac diffisso implicat: tum ramuli locus, qui contigit ex vtraque parte, qua fissuram intrat, falce extenuatur, ita ut ex vna parte, quod cælum visurum est, corticem cum cortice ex æquatum habeat. Eius autem ramuli, quem inferet, cacumen ut directum sit ad cælum, curat: postero anno quum comprehendit, unde propagatum est, ab altera arbore præcidit. Sed hunc insitionis modum replicat Columella libro de arboribus, & nos exactissimè docuimus libro de insitione.

De insitione per terebrationem. CAP. XI.

TERTIA Catonis insitio est: Terebravit, quam inferes pertūdito, eò duos furculos vitigineos, quod genus esse voles, insertos obliquos arcito

ad medullam, facitoque, ut medulla medullam coniungas, arcitoque ea, quæ terebraueris, alterum ex altera parte. Eos furculos facito sint longi pedes binos, eos in terram demittito, replicatoque ad vitis caput, viti que vinculis alligato, medios in terram defigito, terra que operito. Hæc omnia luto oblinito, alligatoque, integitoque ad eundem modum, tanquam oleas. Id exactius docet Columella. Primo ex vicino fructuosissimam oportet considerare vitem, ex qua (velut traducem inhaerentem matri) palmitem attrahas, & per foramen transmittas. Hæc enim tutior, & certior est insitio: quoniam & si proximo vere non comprehendit, sequente certe, quum increuit, coniungi cogitur, & mox à matre reciditur, atque ita superficies insitæ vitis usque ad receptum furculum obtruncatur. Huius traducis si non est facultas, tum detractum viti quam recentissimum eligitur sarmentum, & leuiter circumrasum, ut cortex tantum detrahatur, aptatur foramini, atque ita luto circumlinitur resecta vitis, ut totus truncus alieni generis viti seruiat, quod quidem non fit in traduce, quia à materno sustinetur vberem dum inoleseat. Sed aliud est ferramentum, quo priores vitem perforabant, aliud, quod ipse vsu nunc magis aptum comperit: nam antiqua terebra, quam solam veteres agricolæ nouerant, scobem faciebat, perurebatque eam partem, quam perforauerat, deusta porro rarè reuirescebat, vel cum priore coalescebat, in ea que nec insitus furculus comprehendebat, tum etiam scobis nunquam sic eximebatur, ut non inhaereret foramini: ea porro interuentu suo prohibebat corpus furculi corpori vitis applicari. Ipse terebram, quam Gallicam dicit, ad hanc insitionem commentus, longè habiliorè, vtilioremque comperit; nam sic excavat truncum, ne foramen inurat, quippe non scobem, sed ramenta facit, quibus exemptis, plaga leuis relinquitur, quæ facilius omni parte sedentem furculum contingat, nulla interueniente lanugine, quam excitabat antiqua terebra. Igitur secundum vernum & quinoctium perfectam vitium insitionem habeto, locisque aridis, & siccis nigram vitem inferito, humidis albam. Plinius ab utroque: Tertium genus est terebrare vitem in obliquum ad medullam, calamosque addere longos pedes binos, atque ita ligatum insitum, intritaque illitum operire terra, calamis subrectis. Nostra aras correxit, ut Gallica vteretur terebra, quæ excavat, nec vrit, quoniam adusio omnis hebetat. Didymus: Optima mihi videtur insitio per terebrationem, neque enim vitis in qua insitio fit, interim ociosa manet, sed similiter fert fructum, & sarmentum coaltum simul augebit, vite nihil offensa ex terebratione, neque compressa ex coarctatione. Fit insitio per terebrationem hoc modo: Truncum vitis terebra Gallica appellata perforato, & praestantioris in proximo sitæ vitis ramum attractum in foramen immittito, non ab antiqua matre decisum: sic enim sarmentum viuet, tum à veteri parente nutritum, tum viti, quæ ipsum suscepit, coaltum & concretum. Intra duorum verò annorum spatium sarmentum impositum vnietur, tunc ipsum post cicatricem inductam sarmentum decidere oportet, quod adhuc ex veteri matre detinetur, & trun-

cum vitis, in quam insitio facta est, quantum supra terebrationem extat, ferrā desecare, vt de cætero sarmentum in solum principalis vitis pars existat.

De vitis insitione per insolationem. CAP. XII.

MODVS, quem retulimus, ab antiquis magnopere celebratus, inanis & puerilis est nostris tēporibus, quum nemo tam sit agricolationis ignarus, qui eo vti velit, quum alii & præstantiores habeantur. Quod ad vitis medullam peruenturus sit furculus inferendus, vana est animaduersio: nam sufficit corticem cum cortice ex æquatum habeat, & si hoc modo vites comprehendant, non satis proficiunt. Sed qui nouellos palmites inferunt, scilicet præcis, & discissis per medullam, furculum eiusdem magnitudinis adigentes, vt vndique furculi cortex matris cortici insideat, & circumligantes, frustra laborant: nam imbecilla viti coalitus furculus nunquam proficiet. Sed nos a statis tempore inoculationem in vitibus satis feliciter vsurpauimus. Insitionis per inoculationem maiores non meminere. Nouellis igitur vitibus, vel nouellis vetularum palmitibus, scilicet biennialibus, nitidissima in parte, in qua præcipua cernatur hilaritas, cultro linea per transversum secetur, à cuius medio per internodii longitudinem descendat altera linea, ita vt ferè vltra corticem non descendat plaga, inde summa cultri acie cortex à ligno delibretur, inde ex nouello palmite circumrasa scutula eximatur diligenti manus libramēto, cum sua gemma: & in hiulcam incisā vitis partem intrudatur, digitorum compressu densata compage, vt vndique nouus cortex ligno adhæreat, inde fasciis vltimis restringes, vt vnio fiat, ne humore, aut aere intrusus pereat. Sic felix cōprehendet, & germinabit.

Vt vna complura acinorum genera habeat. CAP. XIII.

THEOPHRASTVS libro de plantarum causis declarat exemplum de vuarum diuersis in eadem vite coloribus. Inquit enim. Vt eadē vitis candidas ferat, & nigras vuas, & in eademq; vua acina alia nigra, alia candida cohareant, Duo sarmenta diuersi coloris vuas ferentia superiori parte contundunt ab latere, deinde coniungunt qua parte hiant, quaq; communicari succus potest, & sic alligata defigunt, sic ex utroq; compages vna coagmentatur. Ratio est, quod omne viuum cum viuo sociabile sit, & maximè quæ societatem generis habent, cum colluxata in naturam confluunt vnica, sed vtrumque per se alimentum sine confusione transmittit, itaque fit, vt fructus reddatur varius, prout vtrique conueniat. Quod etiam flumini faciunt inuicem concurrentes Cephissus, & Melas in Bæotia: feruat enim vterque suum meatum, in his tamen nec inuicem alimenta iunguntur, sed æquè distantia deriuantur, & perfluunt. Columella verò hoc tali ratione efficit, quod vuas tales creat, in quibus varii generis, colorisq; reperiuntur acini. Quatuor, vel quinque, siue etiam plures voles, virgas diuersi generis sumito, easq; diligenter & equaliter compositas

V
postas colligato
aliquantum ext
in scrobē deinde
mas agant. Qu
ita iam vnitate
debentur coisse
aggerato, ita vt
les duos optimo
posuimus. Ab hi
leoli vehementi
babuli cruris, v
mis: humescunt
ita, radix liberè
nos. Sed hucul
ra sunt. Vt vitis
debere iusserun
vriusque inter
do reddere poss
mida terra curat
20 men noua fron
ficies per plura
cum superioribu
rentia, eaq; su
perueniat, nequ
iungere oportet
se mutuo contin
gere sarmenta cu
atq; ita plantare
germen producit
30 noxam ex contr
atque longo ter
colē ex omnibu
Nos vicinarum
sunt gemma di
coniungimus
bertatem dehi
nascatur: & eo
modo addimur
tundos, sed co
40 dos habeat.

positas colligato, deinde in fistilem tubulum vel cornu arctè inferito, ita vt aliquantum extent ab ytraque parte, easque partes, quæ extabunt resoluïto, in scrobè deinde imposito & terra stercoreata obruito, & rigato donec gemmas agant. Quum inter se virgæ cohaerint, post biennium aut triennium, facta iam vnitate dissolues tubulum, & circa medium ferè crus, vbi maximè videbuntur coisse, vitem serra præcidito, & plagam leuato, terramq; minutam aggerato, ita vt tribus digitis altè plagam operiat. Ex eo codice, quū egerit colles duos optimos submitto, reliquos deiicito, sic vix nascuntur, quales proposuimus. Ab his Plinius: Est & luxuriosa ratio vites inferèdi, vt quatuor maleoli vehementi vinculo colligentur in parte luxuriosa, atque ita vel per ossa bubuli cruris, vel per colla fistilia traiecti obruantur binis eminentibus gemmis: humescunt hoc modo, recisiq; palmitem emittunt. Postea fistula fracta, radix liberè capit vires, vnamq; fert, & omnium corporum suorum acinos. Sed hucusque vana, & impossibilia dicta sunt, quæ Palladius affert veriora sunt. Vt vitis botryones & albos afferre possit, & nigros: Græci hoc fieri debere iusserunt. Si vicinæ sunt vites, nigra & alba, quum putantur, sarmenta vtriusque inter se diuisa sic iunges, vt medios vtriusque generis oculos equando reddere possis vnitati. Tunc papyro ligabis stricto, & molliatque humida terra curabis adlinire, & interiectis ternis diebus adquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Hinc exempto tempore si libuerit, genus efficias per plura sarmenta. Hic modus est verus, & à me expertus. Didymus cum superioribus errat. Accipienda sunt duo sarmenta diuersi generis differentia, eaque findenda per medium, cum animaduersione ne in oculos fissura perueniat, neque quicquam de medulla excidat, atque ita alteri alterum adiungere oportet, & adglutinare, vt oculi coincidant, & quantum possibile est se mutuo contingant, vt duo oculi quasi vnus fiat. Inde verò validè constringere sarmenta cum papyro oportet, & scylla integere, aut glutinosissima terra, atq; ita plantare, & interiectis tribus diebus, aut quinque irrigare, vsquequo germen producant. Quæ Theophrastus affert valdè ridicula sunt, virgæ enim

30 noxam ex confusione recipiunt, vt interire potius, quàm viuere condiscant: atque longo temporis interuallo opus est, vt concipiant, vniantur, secentur, & colè ex omnibus emittant. Columella & Didymi ratio eodè morbo laborat. Nos vicinarum vitū duo farmēta eligimus, alba nigreue vix, & vbi cohaerere sunt gemmæ diuidimus, vt tertia ferè oculi pars remaneat, sic æqua labra labris coniungimus rectè abrafo, ac leuato vulnere, vinculo arctè constricto, ne libertatem dehiscendi habeant, & obseruato vt ex duabus gemmis vnus colis nascatur: & eodem anno vix eiusmodi proferet: hoc farmētum alteri eodem modo addimus variū generis, sic vix botryonem efficiemus, vt non solum rotundos, sed corniculatos acinos, eosdem alios albos, alios nigros, alios multifi-

40 dos habeat.

De laostaphylo, & vna myrta. C A P. XIII.

NON est silentio prætereundum, quod de vitis & oleæ naturali cōcordia Africanus Florentini testimonio fretus posteritatis memoriæ mādauit, scribens oleam, si viti inferatur, non vuas modò sed & oliuas quoque parere. Addit se vidisse hanc arborem apud Marium Maximum, qui quum fructum eius degustasset negauit vnquam se quippiam comesse, quod magis oleam, vnamque resiperet, tam exactè simul vtriusq; sapor linguæ representabatur. Nasci huiusmodi arbores in Libya, gentiliq; voce vbolima nominari. Perticæ subiiciendæ sunt, quæ possint brachiorum onus fulcire. Si verò alio modo quouis inferantur, longuriis non erit opus. Ergo propter terram vitem terrebramus, & oleæ ramulum imponimus, simul vt à vite dulcedinem, simul vt ab humo vernaculum, alliciat nutrimentum, vt tandem eius iucundiore cibo fruamur. Postremo si non dum ferentis viticulæ sarmenta fructuaria transferantur, misturam progenitorum seruabunt. Porro fructus à promiscua parentum conditione inistoris vtriusque nomen adoptauit, elæostaphylos Græcis, quasi dicatur vuolea nominatus. Docet & Tarentinus monstrosam vitis infitionem, promittens vuam fieri posse, quæ in imo suo fundo myrti baccas habeat. Id autem fieri si in myrtum arborem ipsa vitis sarmenta inferas, sic fiet vua myrto mista.

Quomodo vitem præcocem, & serotinam efficiamus. CAP. XV.

FIT etiam infitione, vt præcox vua nascatur. Præcocem vuam nigra vitis, vt Tarentinus monet, creabit in vere, si cerasus inferatur, si quidem eodè tempore feret vuam, quo cerasus arbor sua mala gerit. Eadem Florétinus, & Pamphilus tradidere. Fit & aliis artibus. Celerrimè idem vitem germinare promittit, si trito nitro & aqua, vt mellis crassitudo contrahatur, permistis post putationem protinus gemmantes oculi largè linantur, germina intra septem dies citabit. Præcocem itidem fieri tradidit, si dulces vinacei, hoc est nō calcati, cum plantulis abundè coniiciantur; aut quum panguntur, scrobiculis accumulentur. Serotina efficitur vitis, eodem authore, si racemos, qui primum nati fuerint, auferes, rursus enim alii pro ipsis nascentur. Insuper & plantæ multam curam habeto: iterum enim racemos producet, qui maturi facti, serotini erūt.

Quomodo vua vinaceis vacuafiat. CAP. XVI.

QUAMQVE semen naturæ opus proximius sit, nos fructus, inquit Theophrastus, qui nucleo vacant, præcipuè quarimus quoad possumus, & tales vt fiant operam damus, vt quum vuas sine vinaceis nasci molimur, quod euenit detracta medulla palmitis, qua vinaceum gignitur. Columella, vt vuæ sine vinaceis nascentur, ita docet. Malleolum scindito ita ne gemmæ laedantur, medullamque omnem eradito, tum demum in se compositum colligato, sic ne gemas allidas, atq; ita stercorata terra deponito & rigato, quum coles agere coeperit, sæpe & altè refodito. Adulta vitis tales vuas sine vinaceis creabit. Ab eis Plinius: In alio genere inuentu nouitio finditur malleolus, medullaq; erasa

VI
in se colligantur
leolus in terra fin
foditurque sæpi
promittit, quum
nasci. Sine gratis
hac ratione. Sarm
tum findi deber
partis iterum cog
ciendum, humic
tum fuerit excisu
facilius compreh
rum in ipsa parer
& adlixo adligat
vel succum suffu
transactis diebus
mina. A quo Pall
Hinc efficitur, vt
vnum omnium
per artem succe
latebit in terra,
genter ex calpra,
deponere. Vincu
terra esse ponend
excisum est, intra
mnia comprehen
tum fructiferum
la excavant non
xuplurim, quod
ad sapæ pingued
nouant, donec
puto nisi ex fice
maior copia, &
pulpam aptus e
ex humidiora
stercoracione
etuum fiunt
ri acino, omni
Sunt tamen a
acinos. Et apu
40 mis lignis care

in se colligantur ipsi caules, ita ut gemmis parcatur omnimodo. Tum maleolus in terra fimo mista feritur, & quum spargere cœperit caules, deceditur, foditurque sapius. Talis vuae acinos nihil intus ligni habituros Columella promittit, quum viuere semina ipsa perquam mirum sit, & medulla adempta nasci. Sine granis interioribus vvas arte nasci posse Democritus Græcus docuit hac ratione. Sarmentum quod est obruendum, quantum latebit in terra, tantum findi debet omni sublata medulla, ac diligenter exculpta membra diuisæ partis iterum cogi, & vinculo constricta deponi. Vinculum papyro iubent faciendum, humidoque solo figendum. Aliqui reuinctum sarmentum quantum fuerit excisum intra scillæ bulbum demergunt, cuius beneficio sata omnia facilius comprehendere confirmant. Alii iam putatæ vitis fructiferum sarmentum in ipsa parente non diuisum, sublata medulla quam altè possunt excuât, & adfixo adligant calamo, ne possit inuerti: tum in foramen Cyrenaicum lac, vel succum suffundunt ex aqua ad sapæ spissitudinem resolutum. Hoc idem transactis diebus octonis renouant, & tantisper dum vitis nouella pariat germina. A quo Palladius: Est pulchra species vuæ, quæ granis interioribus caret. Hinc efficitur, ut summa iucunditate sine impedimento forberi possit, velut vnum omnium corpus vuarum. Fit autem Græcis authoribus hac ratione per artem succedente natura. Sarmentum quod obruendum est, quantum latebit in terra, tantum findere debemus, & medulla omni sublata, ac diligenter exculpta, membra iterum diuisæ partis adunare, & vinculo constricta deponere. Vinculum tamen papyro asserunt esse faciendum, & sic in humida terra esse ponendum. Diligentius quidam sarmentum reuinctum, quantum excisum est, intra scillæ bulbum demergunt, cuius beneficio asserunt sata omnia comprehendere posse facilius. Alii tempore quo vites putant, sarmentum fructiferum putatæ vitis in ipsa vite, quam possunt de alto sublata medulla excuant non diuisum, & calamo affixo alligant, ne possit inuerti. Tunc *κρυπταίνον*, quod Græci sic appellant, in excauata parte suffundunt, ex aqua prius ad sapæ pinguedinem resolutum, & hoc transactis octonis diebus semper renouant, donec vitis germina nouella procedant. Sed lignum in fructibus non puto nisi ex siccitate gigni, argumento quod siccis temporibus gigartorum maior copia, & magnitudo. Crassior enim succus ab anni squallore minus ad pulpam aptus est, accessio verò ad pulpam fit ex fusiori liquidiorique materia, ex humidiori aëris constitutione proueniente: Ob id ex fossione, irrigatione, stercoratione, calidæ aquæ affusione, ut diximus alibi, testæ, & gigarta fructuum sunt minora. Sed ex abstractione medullæ quod fiat vva sine interiori acino, omnino falsum: nam omniariam periclitantibus falsum occurrit. Sunt tamen apud nos vuæ, quas Corinthiacas dicimus, hæc pusillos continent acinos. Et apud Orientales legimus vvas grandissimos acinos habentes internis lignis carere. Sed medullæ abstractione factas esse non credimus.

DICEMVS de vite medicata, scilicet theriaca, purgatoria, & vnguenta rīa, alteriusq; efficacīa, vt lubitum fuerit. Plinius, Mira est vitīū natura saporem alienum in se trahendi: qualē & salicum redolent Patavī orū in palustribus vindemiæ. Sic & helleborum feritur in Thaso, aut cucumis sylvester, aut scamonea, quod vinum phthorium vocant, quoniam abortus facit. Scribit Florentinus animalia venenum eiuculantia frequenter agricolas infestare, vt viperā, phalangia, serpentes, mures aranei venenū iaculantes, & scorpii etiam si domestici fuerint, & persuasos esse agricolas oportere vitē theriacā ad omnes horum animalium morsus sufficientem curationem præstare. Non solum enim vinum vitis theriacā commorū dolorē sedat, sed ex eadem acetum, & vva ipsa, atque vva passa: foliorum etiam & sarmentorū vstorum cinis morsui impositus, dolorem sedat, & hominē servat. Vitē theriacā ita fieri docet. Sarmentum, quod pangendum est, trium digitorum spatīo in ima parte findatur, & sublata medulla theriacę medicamē addatur, tunc terrā manderetur vinculo papyri diligenter adstrictum. Aliqui eadem sarmenta iam antidoto satiata intra scyllæ bulbū recondunt, & terris supradicta ratione committunt. Aliqui medicamentum, vt combibant radices vitis, infundunt. Sanē sarmentum si de hac vite sumatur ad transferendum, aut inserendum, potentiam materni medicaminis non tenebit, processūq; temporis ad sciriciā vim expirabit. Ex his Palladius: Thyriacā vitē sic facies, cuius iste profectus est, vt vinum eius, vel acerum, vel vva, vel sarmentorum cinis proficiat cōtra morsus omnium bestiarum. Fit autē sic. Sarmentum quod pangendum est, trium digitorum spatīo in ima parte findatur, & sublata medulla, ad eius vitē theriacā medicamē addatur. Tunc terrā manderetur vinculo diligēter adstrictum. Aliqui eadem sarmenta iam medicamine satiata, intra squillæ bulbū recondunt, terrisq; prædicta ratione committunt. Aliqui antidoti eius affusione radices vitis infundunt. Sanē sarmentum, si de hac vite sumatur ad transferendum, potentiam materni medicaminis non tenebit. Oportebit autē thyriacā affusione assidua vim succi senescentis iterare. Possumus & vitē purgatoriam facere sic ex Catonis doctrina. Vinum si voles concinnare, vt aluum bonam faciat, secundum vindemiā, vbi vites ablaqueantur, quantum putabis virei satis esse vini, tot vites ablaqueato & signato, earum radices circumfarris, & purgato. Veratri radices in pila contundito, eas radices ponito circum vitē, & his sterens vetus & veterem cinerem & duas partes terræ circum addito. Radicibus vitis terram insuper iniicito. Hoc vinum seorsum legito. Si voles servare in vetustatem, ad alium mouendam servato, nec commisceas cum cetero vino. De eo vino cyathum sumito, & demisceto aqua, & bibito ante cœnam. Sine periculo alium mouebit. Et alibi. Vites quum ablaqueabuntur, signato rubrica, ne admisceas cum cetero vino. Tres fasci- 40 culos veratri circumponito circum radices, & terram insuper iniicito. Per

vinda-

V
vindemiam de l
teram potionem
culo. Ab eo Plin
fato, Cato doce
circo modo, qu
subdens. Sed v
ri vva velis, qu
dictum, odorife
ripurat idem si
10 vel inferantur.

1
N Vnde de v
qui omni
culatione. Atti
nequeant, prop
nim ista pabulu
tur, quasi detrac
nimia nutrimen
redditur. Depa
20 per totam a sta
menta superini
Adde suffosion
atque frigorib
mentum dimin
tis articulation
sis, aut tereio in
ter adgerminat
tibus morbus p
minibus ablati
30 turæ imperiti
hæc Palladius
riant, & paup
tare pressus
circum fossa
des inserunt
tam materi
sunt. Si ver
geremus, &
tem perfrige
40 rores statim

vindemiam de his vitibus quod delegeris, seorsum seruato, cyathum in cæteram potionem indito, aluum mouebit, & postridie perpurgabit sine periculo. Ab eo Plinius, Fieri elleboriten ex veratro nigro circa radices vitium facto, Cato docet. Sic fit & scammonites. Florentinus purgatoriam vitem facit eo modo, quo & theriacen fecerat, scilicet veratrum in fissum sarmentum subdens. Sed vnguentariam vitem facere docet Paxamus, si odoratam fieri vuam velis, quæ suauitate locum impleat: in fissa sarmenta, modo quo supra dictum, odoriferum omne quod velis vuam olere, coniici poterit. Melius fieri putat idem si odore prius imbuta sarmenta macerentur, quàm pangantur, vel inferantur.

De vitium morbis, & medelis. CAP. XVIII.

Nunc de vitium morbis, & medelis dicemus: Theophrastum sequemur, qui omnium primus, & morbos, & medelas descripsit. Et primò de articulatione. Articulatio accidit vitibus ex nimietate, & quæcunque fructificare nequeant, propter luxuriam germinis, eodem proculdubio pertinent. Nec enim ista pabulum excoquere possunt, sed ad germinandum vis tota conuertitur, quasi detracta fluxu rapido nimii alimenti. Remediū esse potest, vel quum nimia nutrimenti vbertas detrahitur, vel quum arbor firmior, atq; robustior redditur. Depampinatio quoque vitium & prægrandium foliorum contortio per totam æstatem identidem facit. Item resectio summarum radicum & sarmenta superiniecta, & demissa propagines eodem proculdubio pertinent. Adde suffossiones, & ablaqueationes, quibus radices deteguntur, vt flatibus, atque frigorebus assuescant, cauendo ne quid paxillus officiat, hæc omnia alimētum diminuunt, viresq; augent. Aliam quoq; addit morbi rationem. Vitis articulatio venit, aut flatu ablatis germinibus, aut imperitia culturæ concisus, aut tertio in supinum excisus. Sic enim humor largus collectus, vehementer ad germinandum excurrit, ita vt nil queat fructificare. Plinius ab eo: Vitis morbus peculiaris articulatio tribus de causis. Vnā vi tempestatum germinibus ablatis, altera, vt notauit Theophrastus, in supinum excisus, tertia, culturæ imperitia laxis: omnes enim earum iniuriæ in articulis sentiuntur. Ad hæc Palladius: Locis calidis, & apricis, vites, quæ fructu carent, fronde luxuriant, & pauperiem fœtum compensant vbertate foliorum. Nouembri putare pressius conuenit, frigidis verò mense Februario. Si permanebit hoc vitium, circumfossas arena fluuiali, vel cinere debemus aggerare. Quidam lapides inferunt inter flexuosa radicum. Sotion Græcus: Effundentes se in multam materiem vites, breuius præsecare oportet, sarmentis enim priuata quiescunt. Si verò adhuc non cessent, facta pastinatione, harenam fluuialem aggeremus, & modicum cinerem. Alii circum radices lapides ponunt, quo vitem perfrigerent. Accidit & roratio, cuius gemina causa est, aut enim quod rores statim post florem inciderint, aut quod exuperantia fuerit. Quod si ita

fit, aerem dixerim in profluvio floris humidiorē, velut eruginem procreare: exuperantia verò quasi auocare dimouereque alimentum videtur. Itaque utraque de causa defluere acina, quæq; permanere potuerint esse exigua, ratio est. Hæc Theophrastus. Plinius ab eo: Siderationis genus est vitibus deflorescentibus roratio. Aut cum acini priusquā crescant, decoquuntur in callum. Sorion hoc affert remedium. Vites rhyadas Græcis appellatas, Latinis defluæ, sine fluxa vocari possunt, à defluxu, quasi fructum non continentes, ex foliis cognoscēs subalbidis, & subarefactis, sarmentis latis, mollibus & in lori modum tractabilibus. Medeberis igitur cinere, aceto acerrimo subacto illinens stirpes, & irrorans, quæ in ambitu sunt trunci. Ipsæ enim vites cinere liquido facto respergendæ sunt. Quidam verò marinam aquam radicibus affundunt, alii racemorum summas partes auferunt. Est quoque vuarum morbus cratæbus vocatus à Theophrasto. Hoc animal est erugini simile, nascitur quum tempore humido, residente humore, Sol acrior consequutus inusserit, quod etiam pampinis accidere constat. Plinius: Sunt & eadē causa nascentes & erucæ, dirum animal, eroduntque frondem, aliæ florem, ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc animal tempore humido, & lento. Fir aliud ex eodem, si sol acrior infecutus inussit ipsam vitium, ideoque mutauit. Africanus ad erucas, pediculos, & ad glaciem hoc affert remediū. Vrsino adipe corticem illinito, & vitis pedunculos non producet, aut adipe vrsino falces vngito nemine sciente, quibus vites putaturus es, sic neque pedunculi, neque glacies vitem iniuria afficient. Aut falces oleo, in quo allium contritum sit, illinito. Si verò erucas, quæ in rosis reperiuntur, in oleo coxeris & inde falces illeueris, neque ab alio animalculo, neque à pruina vitis iniuriam perpetietur. Aut adipe hircino, aut sanguine ranarum falces inungito. Aut coticulacinerum cum oleo perlita falces acuito, vitis sarmenta vsta, & vitis lachryma permista cum vino in mediam vineam deponito, & vermes non enascentur. Pessimum est vitibus, si dum florent, impluerit. Defluunt enim flores & fructus, causa imbecillitatis. Plinius à Theophrasto: Pessimum est inter omnia quum deflorescentem vitem percussit imber, quoniam simul defluit fructus. Theophrastus, Caudicis fissionem citra iacturam substinet, & corticis quoque detractionem citra noxam patitur, quod arborum plerisque exitiale est: sed non principis illius, atque vitalis, verum externi, & qui plerunque subnascente nouo decidit. Ratio est quod partes disiectas celerrimè comprimunt, & coagulant, atque renaci compage constat. Sed dimutilatione nouella vitis maxime interit, et si quid tenellum, imbecillum, atque rectifluum sit. Hæc enim istis moriendi causam donant. Ex his primis germinibus nihil amplius germinatur, sed protinus ipse germinandi fluxus cessat, extinguiturque, quasi vitis excæcata & manca quodammodo fuerit. Principiū enim & validissimū & infirmissimū est, non tamen modo eodem: nam vitem fertilem admodum germinibus esse, germinationes sequentis temporis latissimè indicant. Plinius ab eo: Intereunt pleraque fistula stirpe:

stirpe, excepta vitis
lam iuber affundit
vix credi par est. &
tur truncum in ci
radicum crassitu
ca ad medietatem
sura oculum fori
Palladius: Vites,
roboris sui avertit
10 Si hoc minus pro
vulnus impressum
ta plagæ excilio p
ctum ostendunt
scant vix, in are
dinem acini habi
ter, ac lotio vere
Hæc materis cin
vel quibus fructu
cinerem sarment
20 latamine refoue
cus: Quum acini
omnem arefcent
vicina arefcentia
Præstantior autem
racemo illa, elad
linatur. Quidam
ma conspergunt.
ipsa vitis diuturni
rent, prius in are
30 & vrina verusta
stuosas vites Co
dum, aceto acti
eo Plinius: Si ve
ni. Damageron
misto ad trunc
bus affusa. Qui
unt terra adiac
minauerint, de
commodiorem
40 mocritus hoc al
neo siadito, lapi

Stirpe, excepta vite. Idem si vites sint lachrymosæ, earum radicibus aquam sal-
 sam iubet affundi. Sotion Græcus: Vites lachrymam emittentes, quantum
 vix credi par est, & in totum corpus vitis non distributam abiiciunt. Falce igitur
 truncum incidemus, & exulcerabimus, sinu in ipso facto, si nil profuerit,
 radicum crassitudinem exculpemus, aut aliquo modo ulcerabimus: & amur-
 ca ad medietatem cocta, ac perfrigerata, plagas illinimus. Subrectum verò cē-
 suræ oculum foris inungemus: quod multo melius esse experimento constat.
 Palladius: Vites, quæ lachrymarum nimietate tabescunt, & deplorando vim
 roboris sui auertunt à fructu, trunco earum lacerato, Græci sinum fieri iubent.
 10 Si hoc minus proderit, radicum robur pingue rescindi, vt afferat medicinam,
 vulnus impressum, tunc insulsa amurca ad medietatem decocta, & refrigera-
 ta plagæ exciso perlinetur, & sub hac acetum acre fundatur. At si quæ fru-
 ctum ostendunt vites ad maturitatem non perducunt, sed prius quàm mite-
 scant vix, inarescunt, hoc modo emendabuntur. Quum scipiones amplitu-
 dinem acini habuerint, radice tenus vitem præcidito, plagam acri aceto pari-
 ter, ac lotio veteri permista terra linito, eodemq; radices rigato, sæpe fodito.
 Hæc materias citant, vixq; succum perferunt. Ab eo Palladius: Agras vites,
 vel quibus fructus arescit, circumfodies, & vrinam veterem suffundes. Item
 cinerem sarmenti, vel quercus aceto mistum subiice, aut incisas circa terram
 20 lætamine refoueto, & quæ germinant fortiora dimitte. Vindanionius Græ-
 cus: Quum acinus racemi erui magnitudinem inde prius siccari incipit, tunc
 omnem arescentem racemi partem deradito, & à sana, siue potius à saniore
 vicina arescenti adimito: indeq; cæsuras cinere acrisimo aceto misto linito.
 Præstantior autem cinis est sarmentitius. Sic enim quæ ægrotatura erant in
 racemo illita, cladem ampliorem evitabunt. Truncus autem vitis similiter ob-
 linatur. Quidam & infernas stirpis partes circa radices vrina veteri, & acerrima
 conspergunt. Ex hac enim medela non solum fructus seruabitur, sed &
 ipsa vitis diuturnitatem recipiet. Ab his Plinius: Quod si fructum non matu-
 rent, prius inarescentem præcisarum ad radices plagam, fibrasq; aceto acris,
 30 & vrina vetusta madefacere iubent, atq; eo luto obruere, sæpe fodere. In fru-
 ctuosas vites Columella ita fœcundas facit. Vires quum exiguum dant fru-
 ctum, aceto acris cum cinere rigato, ipsumq; codicem eodem cinere linito. Ab
 eo Plinius: Si verò fertiles non sunt, aceto acris subacto cinere rigari, atq; obli-
 ni. Damageron, Aegrotantē vitem cinere sarmenticio, aut quercino cū aceto
 misto ad truncum consperso curabis. Valdè prodest & vrina hominis radici-
 bus affusa. Quidam ægrotas vites excidunt iuxta terram, deinde leniter obru-
 unt terra adiacente, modico stercore ipsi ammixto: & quum turiones eger-
 minauerint, debiles quidam extirpant, generosos sinunt, & sequenti anno,
 commodiorem ex relictis eligentes, reliquos tollunt. Sterilibus vitibus De-
 40 mocritus hoc affert remedium: Truncum scalpro, aut ferra, vel quercino cu-
 neo findito, lapidem in fissuram indito, vt partes trunci inuicem disparentur,

& in ipsum vrinam humanam veterem infundito ad mensuram heminarum quatuor, ita ut eam sensim omni trunco circumfundas, ut etiam radices inde perfusa in integrum restituantur. Deinde iniice stercus terra mistum: oportet tamen eos, qui lapidem in truncum imponunt defodere, & vertere ea, quæ sunt circa radicem. Id in autumno facito. Sunt etiam quædam vites quæ fructum recens productum putrefaciunt, priusquam racemiconnutriantur, & maturescant. Talibus igitur medeberis portulacæ folio. Alii autem polentam portulacæ ammistam trunco circumlinunt. Alii portulacæ dimidiam racemi partem illinunt. Quidam cineris veteris heminas quatuor radicibus iniiciunt, aut etiam arenam. Palladius ad id: Vitis cuius fructus humore putrescit, per latera pampinanda est ante vigesimum vindemiæ diem, & sola fronsilla seruanda est, quæ in summitate posita solem nimium defendit à vertice. Vites quoque algore intereunt, hoc quidem est quo deprehenditur soli vitium, quoniam non euenit nisi in frigido: itaque per hyemem cæli rigorem probamus, non soli. Ne igitur rubigo vineam vexet, docet Columella palearum acervos inter ordines verno tempore positos habere in vinea. Quum frigus contra temporis consuetudinem intellexeris, omnes acervos incendito, ita fumus nebulam, & rubiginem remouebit. Diophanes, ne à pruina & rubigine vites lædantur, docet ita: Stercus aridum per diuersa spatia in vinea deponito secundum vineti ventum, ubi incumbentem pruinam videris, stercus succendito, fumus inde elatus pruinam disperget. Quæ verò à pruina aduruntur vites, tardius putare oportet, quum ad germen fundendum concitantur, sic enim tardius efflorescunt. Hippuris vitis tardius germinat, ob id credita est minus pruinam curare calido iam sole existente. Quidam fabam in vineis serunt, & vites à pruina illas futuras putant. At si contigerit vites à pruina lædi, incidenda sunt, & valdè breuiter præsecandæ, ut vis earum permaneat: nam & sequenti anno priorem fructum reddent. Alii miricæ cinerem in vinea ventilant, nam oculis cinis insidens, illabentem pruinam pellit. Aliud affert Berytius. Simul ut videris rubiginem in aëre congregari, statim bovis cornu sinistrum vnà cum bubulo stercore vrito, & fumum multum per ambitum arui, secundum ventum facito, quo ventus omnem fumum ad rubiginem ferat, nam disperget. Apuleius tradit trium cancrorum vstorum cum bubulo stercore, aut paleis, aut stercore caprino, fumum sufficienter iuuare. Si verò anticipet rubigo, damnum refarcies hoc modo: Cucumerum sylvestrium, aut colocynthidis radices, aut folia contundito, & aqua macerato, indeque apprehensa à rubigine irrorato ante solis exortum. Idem facit cinis ficulneus, aut quercinus maceratus, & irroratus. Prodit Apuleius: Si lauri ramulos in aruum proieceris, transire in ipsos rubiginis noxam. Nosse operæ pretium est, quod pleniluniis omnia rubigine afficiuntur, præcipuè frumentum, propterea quod tunc Luna calidissima,

lidissima, & hum
concilium vrunt
spargentes. Qu
cæ pellis circump
terra conleminet
re. Plinius, Simil
decoctos in crassi
phuris quarra, sub
capita, ac sub braci
fumo huius mixtu
non minus auxiliu
addita modò aq
contra animalia
secundum ædifici
lunam obseruab
tiii, vel tauri, & n
pellatur: id ferè
falces quibus vin
vel si pellem fib
10 pelle aciem dete
uocem appellan
falces, quum sin
guine vrsino liniu
dat, iubet Colum
linea circumlini,
mica non exeder
brica, ac pice liqu
vnum locum con
nus contra besti
30 infestantes, aut
dum ventu suffi
aut eboris fero
pili sufficu. Alii
& oleu coquunt
Alii alio trito
de corè, in qua
animalia sterc
bitu respergun
nos, nò paucior
40 sub diuum exp
volderis, hac ag

lidissima, & humida, noctuque fructus putrefacit. Quidam silurum piscem concisum vrunt secundum ventum, per omnem regionis partem odorem spargentes. Quin & per naturam contraria affectione resistit, si in cribro phocæ pellis circumponatur, perforeturq; ita vt per cribrum semen excutiat, & terra conseminetur. Idemq; grandinem cadere non sinit naturali proprietate. Plinius, Simili modo ne conuoluolus fiat in vinea, amurcæ congios duos decoctos in crassitudinem mellis, rursus cum bituminis tertia parte, & sulphuris quarta, sub dio coqui iubent, ne excandescat sub tecto. Hoc vites circa capita, ac sub brachiis vngi, ita non fore conuoluolum. Quidam contenti sunt fumo huius mixturæ suffire vineas secundo flatu continuo triduo. Plerique non minus auxilii, & alimenti arbitrantur, in vrina, quàm Cato in amurcæ, addita modò aquæ pari portione, quoniam per se noceat. Nunc remedia contra animalia describemus. Contra forices id assertit Columella, Vites quæ secundum ædificia sunt, à foricibus, vel muribus infestantur. Id ne fiat plenam lunam obseruabimus, quum erit in signo Leonis vel scorpionis, vel sagittarii, vel tauri, & noctu ad Lunam putabimus. Genus est animalis, volucra appellatur: id ferè prærodit teneros adhuc pampinos, & vuas, quod ne fiat, falces quibus vineam putaueris, peracta putatione sanguine vrsino linito, vel si pellem fibri habueris in ipsa putatione, quoties falcem acueris, ea pelle aciem detergito, atque ita putare incipito. Plinius ab eo: Alii voluocem appellant animal prærodens pubescentes vuas, quod ne accidat, falces, quum sint exacuræ, fibrina pelle detergent, atq; ita putant. Aut sanguine vrsino liniri volunt post putationem easdem. Ne formica vitem ascendat, iubet Columella lupinum teri, & cum fratribus misceri, eoq; imam vitem linea circumlini, vel bitumen cum oleo coqui, eo quoq; imas vites tangi: formicæ non exedent. Plinius: Sunt arborum pestes & formicæ. Has abigunt rubrica, ac pice liquida perunctis caudicibus. Nec non & pisce suspenso iuxta in vnum locum congregant. Aut lupino trito cum oleo radices linunt. Africanus contra bestiolas vites vastantes hæc docet: Enecabuntur vermes vitem infestantes, aut vineam sua habitatione egram reddentes, fimo bubulo secundum ventum suffito. Quidam galbanum, aut cornu cerui, aut vngues caprinos, aut eboris scrobem, aut liliæ radicem in vinea suffiunt. Fugabis etiam muliebris pili suffitu. Alii pæoniam, vel personariam suffientes. Alii succum cyrenaicum, & oleum coquunt & truncos vitium illinunt, à fundo paulo superius initio facto. Alii allio trito vites illinunt contra erucas. Alii cantharides oleo macerant, inde cotè, in qua falces exacuunt, illinunt contra easdem. Quidam contra maiora animalia stercore canino vrina veteri macerato, ac dissoluto, omnia per ambitum respergunt. Democritus: caneros fluuiales plurimos, aut paguros marinos, non pauciores quàm decem in vas fictile cum aqua indito, & addito operculo sub diuum exponito, vt ad decem dies insolentur. Deinde quæcunq; illa esse volueris, hac aqua conspergito, idq; alternis diebus, donec adoleuerint, & mi-

haberis rei efficaciam. Plinius: Contra vespas remedio est oleo aspergi ex ore vuas. Tradunt succo cucumeris sylvestris tactis radicibus vitium, non attingi vuas ab auibus. Vuæ flores in cibis edere gallinacei, vuas non attingunt. Vites cæsas bidente curare docet Palladius: Quum vitis bidente læditur, aut ferro, plagam, si terræ iuncta est, adline stercore ouillo, vel caprino, tunc terra mista circumfossa ligare curato. Si in radice læsa est, operiens liquidum latamen admisce. Eadem Cassianus Græcus.

De vitis inimicitia cum brassica, & aliis. CAP. XIX.

BRASSICA & laurus vitem offendunt, succoq; suo & odore deteriorem faciunt, nam & eam allicere, & olfacere dicunt, quamobrem cum germen iis propius accesserit, auersum retrograditur, inimicum fugiens odorem. Ideo Androcides sapientia clarus brassicam aduersari vino, ac ebrietatem arceret hoc prodidit exemplo, quod vitis etiam viua brassicæ fugetur odore, vt ex Theophrasto habetur. Plinius sylvestrem brassicam vino inimicissimam prædicat, quam præcipue vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Beryrius scribit, Maxime cauere homines debent brassicam inter vites ferere, velut natura siccam, & naturaliter contrariam affectionem aduersus vitem habentem. Si autem contingat complantata esse ex propinquo vitem & brassicam, vitis ipsa augescens, vbi brassicæ appropinquat, non amplius directe procedit, sed retrouertitur, contrariam affectionem ad brassicam habens. Inquit Timæus, Athenæo referente, vineam, in qua brassica nascitur, vinum exilius proferre. Odit præterea maxime corylum. tubente Virgilio,

Nève inter vites corylos fere.

A quo Plinius: Vitis odit corylum, & ni procul absit, tristis, & ægra. Odit & cupressum, vt diximus in eius capite.

Prognostica ad cognoscendas vini vbertates, vel caritates ante vindemiam. CAP. XX.

INTER Democriti scita connumeratur illud, vt qui cognosci possit ante vindemiam futuram vini vbertatem, & bonitatem, vel contrà prauitatem hoc modo. Acinum, hoc est, vuam particularem de racemo leniter per digitos detrahito: si quidem igitur quiddam exilierit, vbertatem ostendit. Quidam si multum frumenti progenit, etiam liquidum fructum abundaturum pollicentur. Cæterum vinum bonum, & potens futurum coniectamus, si per vernum tempus imbres plures fiant. Idem futurum indicant imbres oborti, quum erui magnitudinem vuam haber, & adhuc acerba existit. At verò quæ ad ipsum vindemiæ tempus oboritur pluuia, non solum aquosum, sed & deprauatum vinum vt vappam faciet. Plinius. Vinearum conceptus Vergiliarum exortu incipit, ad v i idus Maii. Aliud hoc quatrimum est, quod neque rore sordere velint, exhorrent enim frigidum sydus Arcturi postridie occidens,

cidens, & multo
la exoritur vesp
incidat. Equid
canis ortum post
vapore constat
um nocet ad
xvi calend. Aug
usque ad x calen

Maturitatis

INSTANTE v
celebrandæ su

Dum

Syrin

Erro

Tunc

Perb

Pana

Dehi

M

20 Varro vuas leg

minale, & Vergili

as ploribus regio

sunt. Quidam qu

tempelluam esse

animaduertissent

rascent: quæ om

sunt accideret pro

rare maturitate

inde æstimaren

30 genera vuarum

Sed hoc modo i

ris vinacea, quæ

nigra fuerint: n

in media acino

que ipse non p

Græcus adhuc

li ante maturi

ali tardius vin

stantem, sed d

40 habebunt. Ce

cidens, & multo minus plenilunium incidere. IIII nonas Iunii, iterum aquila exoritur vesperi, decretorio die florentibus vitibus, si plenilunium in eum incidat. Equidem & solstitium VII calendas Iulii in simili causa duxerim, & canis ortum post dies à solstitio XXXIII. Sed interlunio accidente, quoniam vapore constat culpa, aciniq; præcoquantur in callum. Rursus plenilunium nocet ad IIII nonas Iulii, quum Ægypto canicula exoritur, vel certè XVI calend. Aug. quum Italix. Item XIII calen. Aug. quum aquila occidit, usque ad X calen. eiusdem.

Maturitatis vuarum tempus quomodo cognoscatur. (CAP. XXI.)

INSTANTE vuarum maturitate, docendum est quo tempore vindemix celebranda sint. Canit Hesiodus,

*Dum tamen in media cœli statione refulget
Syrus, Orionq; loco splendet eodem,
Et rosea Arcturi cernit Pallantias astrum:
Tunc vas tenero abscindens de corpore matrum,
Per bis quinque dies tepido sub sole iacentes
Pande. Dies etiam mollescant quinque sub umbra.
Dehinc torque, & capiant vegetes incunda Lyæi
Munera.*

20 Varro vas legere, & vindemiam facere iubet inter æquinoctium autumnale, & Vergiliarum occasum. Columella calendis Octobris fieri vindemias pluribus regionibus inquit: Vuarum maturitatem alii aliter interpretati sunt. Quidam quum vidissent partem aliquam vuarum virefcere, crediderunt tempestivam esse vindemiam. Quidam quum coloratas, & perlucas vas animaduertissent, nonnulli etiam quum pampinos, ac folia decidere considerassent: quæ omnia fallacia sunt, quoniam immaturis vuis omnia eadem possunt accidere propter intemperiem solis, & anni. Itaq; nonnulli gustu explorare maturitatem tentauerunt, vr siue dulcis esset sapor vuae, siue acidus, exinde æstimarent: sed & hæc ipsa res habet aliquam fallaciam: nam quædam genera vuarum nunquam dulcedinem capiunt propter austeritatem nimiam. Sed hoc modo ipsa naturalis maturitas consideratur: scilicet, quum expresseris vinacea, quæ acinis celantur, si iam infuscata, & nonnulla propemodum nigra fuerint: nam nulla res colorẽ illum afferre potest, nisi maturitas, quum in media acinorum parte sint, vr à sole estuante & ventis protegantur, humorq; ipse non patitur ea percoqui, aut infuscari, nisi suapte natura. Diophanes Græcus adhuc: Non facile est cognoscere, quando vindemiandum sit: nam alii ante maturitatem vas legentes, infirmum, & non perenne vinum faciunt: alii tardius vindemiantes, non solum vitem lædunt, ultra tempus onus gestantem, sed & si grando, & glacies oboriretur, iniuriæ expositum vinum habebunt. Cognoscitur igitur opportunum tempus visu, & gustu, aliisque

notis à veteribus proditis. Democritus & Africanus sex tantum dies & non plures rectè permanere uiam maturam tradunt. Si igitur vinaceus non amplius viridis pellucet, sed nigricans, uiam maturam esse significat. Alii acinos premunt, & si vinaceus exilierit nudus, citra omnem caruncula circum se complexum, maturas ad vindemiam esse uas indicant. Si uerò profuerit vinaceus partem carnum secum trahens, maturas negant. Quidam quod passa fieri incipiat, maturam conieciunt. Alii hoc modo: Vbi densissimus est racemus, inde acinum vnum eximunt, & post vnum, aut alterum diem racemum respiciunt, & contemplantur. Si in eadem figura permanserit locus, velut vicinis, & iuxta sitis acinis, nullum augmentum capientibus, vindemiam accelerant. Si uerò exempti acini locum minorem factum viderint, velut circumfritis acinis auctis, vindemiam inhibent, donec augmentum progressum fecerit. Zoroaster uerò addit, quod vindemiare oportet Luna existente in Cancro, aut Leone, aut libra, scorpione, capricorno, aut aquario. Diligenterque prouidendum ut desinente ipsa, & sub terra existente uuarum collectionem absoluiamus. Plinius, iustum vindemiæ tempus ab æquinoctio ad Vergiliarum occasum dies XLIII. Multa calcari debere quum Luna sub terra, x i calend. Septemb. Cæsaris & Assyriæ stella, quæ vindemiator appellatur, exoriri mane incipit, vindemiæ maturitatem promittens. Eius argumentum erunt acini colore mutari. Vindemiam antiqui nunquam existimauere maturam ante æquinoctium: iam passim rapi cerno. Quamobrem & huius tempora notis, argumentisq; signantur. Leges ita se habent. Uiam calidam ne legito, hoc est in eius siccitate, ac nisi imber interuenerit. Hanc ne legito rorulentam, hoc est, si ros nocturnus fuerit, nec prius quàm sole discutatur. Vindemiare incipito quum ad palmitem pampinus procumbere cœperit, aut quum exempto acino ex densitate interuallum non compleri apparuerit, acinum non augeri. Acino plurimum refert, si contingat crescente Luna vindemiare.

De vindemia faciendâ. CAP. XXII.

C A T O, Columella, Varro, ceteriq; multa vasa præparari iubent ante vindemiam, sed quia aliena sunt ab his, quæ nostris temporibus habemus, superuacuum duximus recensere. Didymus torcularia viginti diebus ante vindemiam aperienda esse dicit, quo persentur, & transpirent, aqua marina respargenda, suffumigandaq;. Apuleius: Qui corbibus præfecti sunt, folia eligant, & si quis racemus acerbis, aut acidus afferatur. Oportet & calcantes, si quid cophinis præfectos fefellerit, eligere: nam folia cum uis contrita, vinum magis astringens, & corruptibile faciunt. Ex acerbis, & siccis racemis detrimentum accedit. Iniectas in torcular uas, statim pedibus conterant, qui ad hoc destinati sunt, omnesq; acinos æqualiter concutâtes, vinacea extrahant, quo plurima liquoris pars in subtorcularios lacus defluere possit, & ubi ite-

rum

tum calcantur dil-
cea, sub lignum p-
sunt. Si valde hum-
disparari compo-
bene lotis: neq; in-
tur, & exeant, &
calcatore induti,
thure, vel aliquo
videas à quo gene-
10 cor multo ante co-
gis aprica, prius d-
solum legitur ad
foram vinarium
ut condatur. Q-
sub prælum, ut l-
Quam desit sub-
munt, & rursus,
expressum est fer-

L

10 A V A R R O
li in doli co-
cina, ac pro vino
tum vini vno die
derato, & totidē
expressum erit, a
confundito, & p-
die pedibus pro-
aut doliis, aut an-
autem seruatur
30 qua faciebat, &
facit: Vinacea
indenda, ac po-
sue ruralibus: in
tis præbent. Q-
cular, & lacus
expurgare, &
& proinde fru-
quod signum
que Greci deu-
40 tamen inter v-

tum calcantur discedant: & quum calida, & non valdè humecta fuerint vinacea, sub lignum præli imponant: calida enim, & mollia existentia fluidiora sunt. Si valdè humida superponantur, necesse est onere imposito disrumpi, ac disparari composita. Ingredi autem calcatores oportet torcularios pedibus benè lotis: neq; in torculari quicquam edant vel bibant, neq; sapè ingrediantur, & exeant, & si qua necessitas abeundi fiat, nudis pedibus ne abeant. Sint calcatores induti, oburgentes sudores. Bonus odor in torculario sit oportet ex thure, vel aliquo alio suffumigio. Varro vindemiam ita fieri oportere dicit, ut videas à quo genere vuarum, & à quo loco vineti incipias legere, nam & præcox multo ante coquitur, quo prior legenda, & quæ pars arbuti, ac vineæ magis aprica, prius debet descendere de vite. In vindemiam diligentius vva non solum legitur ad bibendum, sed eligitur ad edendum. Itaq; lectius deferretur in forum vinarium, vnde in dolium inane veniat, electa in secretam corbulam, ut condatur. Quæ calcatæ vva erunt, earum scopi cum folliculis subiiciendi sub prælum, ut si quid reliqui habeant musti, exprimatur in eundem lacum. Quum desit sub prælo fluere, quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt, & rursus, quum expressum, circumcisitum appellant, ac seorsum quod expressum est servant, quod resipit ferrum.

Lora optima quomodo fiat. CAP. XXIII.

AVARRONE docetur lora quomodo fiat. Expressi acinorum folliculi in dolia conciliuntur, eoq; aqua additur, ea vocatur lora, quod lora acina, ac pro vino operariis datur hyeme. Columella expressius docet. Quantum vini vno die feceris, eius partem decimam quot metretas efficiat considerato, & totidè metretas aquæ dulcis in vinacea, sed quibus vnus diei vinum expressum erit, addito. Eodem & spumas defrui, siue sapæ, & sæcem ex lacu confundito, & permisceto, eamq; intritâ macerari vna nocte finito, postero die pedibus proculcato, & sic permistâ prælo subiicito. Quod deinde fluxerit, aut dolus, aut amphoris condito, & quum deferbuerit, obturato. Commodius autem seruatur in amphoris. Hanc loram Columella suus patruus ex vetere aqua faciebat, & nonnunquam plus biennio innoxiam seruabat. Anatolius ita facit: Vinacea post musti defluxum è vestigio deiicienda sunt, & in dolia indenda, ac postea conculcanda, etenim fax ex his non iniucundus potus fit ruralibus: ipsa quæ deinde remanentia vinacea abundans alimentum brutis præbent. Oportet autem statim, ut vinacea ex torculari ablata sunt, & torcular, & lacus subtorcularios euertere, & aqua marina, aut muria per spongiam expurgare, & suffumigare: humor enim remanens omnino corruptus acescit, & proinde fructum, qui sequenti die calcatur, corrumpit, & culicem gignit, quod signum est vini in yappam peruersi. Plinius. Non possunt iure dici vina, quæ Græci deuterias appellant, Cato & nos loram, maceratis aqua vinaceis, sed tamen inter vina operaria numerantur. Tria eorum genera. Decima parte

aqua addita, quæ multum expressa sit, & ita die ac nocte madefactis vinaceis, rursus prælo subiectis. Alterum quomodo Græci faciunt, tertia parte eius quod expressum sit addita aqua, expressoq; decocto ad tertias partes. Tertium est fecibus vinum expressum, quod fecatum Caro appellat. Nulli ex his plus quàm anno vsus.

Quomodo mustum in dolia condendum. CAP. XXIII.

POST perfectam vuarum calcaturam, quomodo mustum in doliis condendum sit, docet Diophanes. Dolia ante vini infusionem meraca muria per spongiam emundare oportet, & thure suffumigare. Oportet neque valde plena facere, neq; nimium vacua, sed coniicere quantum verisimile est mustum effervescentes augmentum facere posse, ut ne superfundatur, & ut spuma vsq; ad labia eleuata, quod solum est impurum expuat. Purgandum est consequenter mustum in doliis ad dies quindecim, & tum manibus, tum scyphis spuma auferenda, & si quid aliud superfluum fuerit: purgamenta verò omnia extra locum, in quo dolia sita sunt, exportentur, & valde procul reiciantur. Si enim in vicino manserint, culices ex ipsis corruptis enascuntur, & malus fætor exciratur, quæ ambo vinum in vappam conuertunt: quare bonum odorem in torcularibus, & cellis viniis procurandum. Florentinus ne vinum superfundatur, hoc adinuenit: Coronam ex pulegio, aut calamintha, aut origano ad colla vavorum circumponit. Quidam interna doliolorum labra caseo bubulo perlinunt, cohibet enim intro musti ipsius feruorem. Docet Democritus mustum, quod per pluuias frequentes imbecillitatem contraxit, crebro imbre perfusa vua, quod probari ipsius gustu poterit, sic curari debere. Statim atq; primum efferverit mustum, in noua dolia transferunt, in fundo enim sedit suo pondere feculentum omne & aquosum, atque in metretas decem vini tres salis heminas adijciunt. Vel mustum decoquunt, donec pars eius vigesima possit absumi. Melius fieri dicunt si centesima gypsi pars adijciatur. Lacedæmonii eo vsque decoquunt, donec vini quinta pars pereat, & quarto anno vsibus ministrant.

Quomodo vina elutrianda. CAP. XXV.

VINUM elutriari oportet, Zoroastræ doctrina, borealibus ventis spirantibus, nequaquam verò australibus, infirmiora vere, fortiora æstare. Quæ verò in squallidis locis nata sunt, post hyemale solstitium. Vinum plenilunio in alia vasa transfusum acescit. Nolle oportet: vinum à fece, unde alimentum habet, liberatum, tenuiorum partium, & imbecillius redditur. Prouidendum est hyeme calefiat, æstare frigescat. Inter mæstruo quum Luna silet, elutrianda vina. Sotio in prælunaribus maxime diebus, hoc est prima, & secunda die priusquam Luna hominibus appareat, transfusionem fieri tradit. Obseruari præterea exortus syderum, & emerfus, in iis enim fecem moueri volunt. Item quum rosa floret, aut germinat vitis, qua frons

dumc

V
dente consilium
vinum expendere
& validius, atq; du
mis valis faucibus
vappam, quod fun

Princ

In me

Vasa non ad su
so spirito strangul
10 terre in vasa, in qu
mustum.

Pro

TRANSFUSUM

quatur, ac di
mentum sumend
inimodi quippiam
gat, permansu un
numq; barundini
men olfaciunt, ve
rit vinum consue
stant, & ex sapore
vase vinum accipi
stica concipiunt. I
stant, & tale vinu
gnum, si aquosus,
rum spirit, securita
te flore conficere
tit, si glutinosus,
30 significat. Si tel

implexum vinde
catur mustum, at
deprehendes, d
multo austeru
rabile. Tactu et
contra diurnu
culum doli sic
Si acceri multi o
ro. Alii manus in
uertendi enim

dente consulunt sapientes, præsertim Hesiodus, aperto dolio, summū imumq; vinum expendendum: quod medias tenet dolii partes, seruādum utpote quod & validius, atq; durabilius, ac vetustatis patiens existimetur. Quod enim summis vasīs faucibus relidet, aëris consuetudine vires exhauriente, degenerat in vappam, quod fundo sedit, fecis vicinitate vitiatur. Quod ita cecinit Hesiodus,

Principio vasis saturum, & sine esse iubemus,

In medio parcum.

Vasa non ad summum vsq; labrum replenda, sed faucibus tenus, ne occluso spiritu strangulentur, coercitaq; suspiret aura. Addit Plinius. Vinum transferre in vasa, in quibus acetum fuerat, melius, quàm in ea, in quibus dulce, aut mulsum.

Prognostica vinorum durabilium, peruertendorum.

CAP. XXV.

TRANSFUSO in dolia vino, monet Africanus, fex ipsa in dolio relinquitur, ac diligenter dolium cooperiatur, frequenterq; olfactu experimentum sumendum est, an aliqua transmutatio fecum fiat, ut si culices, aut eiusmodi quippiam gignatur, id signum vinum corruptum iri; si nil tale contingat, permansurum. Alii pertusam harundinem ad faeces vsq; dimittunt, supernumq; harundinis foramen digito magno obturāt, mox ablato digito per foramen olfaciunt, vel aliquid facis exungunt, & ex facis qualitate quale futurū erit vinum coniciunt. Alii parum de vino feruefaciunt, & refrigeratum gustant, & ex sapore de cætero quale vinum futurum sit iudicant, verū de medio vase vinum accipiendum ad experimentum. Alii ex operculis vasorum prognostica concipiunt. Detecto enim dolio, humiditatem ipsius in harentem degustant, & tale vinum fore coniectant: nam si vinosus est sapor, optimi vini signum, si aquosus, peruersum. Alii à sapore auspicantur præfagia: nam si austerrum spicit, securitatem indicat, si molle, contrarium. Licet idem ex supernatante flore conicere. Si mollis, latus, & purpurei coloris, securius vinum promittit, si glutinosus, reprobi signum: si niger, imbecille: albus diuturnum vinum significat. Si tela araneæ contextus, acoris indicium. Rursus si serpentem viti implexum vindemiæ tempore videbis, vinum acidum expectabis. Si dum calcatur mustum, aut in dolia conditur, crassum & glutinosum fuerit, quod tactu deprehendes, durabilius vinum erit: si tenue, facile peruersum. Vinum in musto austerrum, perenne, & in posterum iucundum fore, dulce verò non durabile. Tactu etiam cognoscēs, vas tactu calidum, non firmum vinum, frigidum, contraditurnius. Vinum gustu calidum, vel frigidum idem ostendit. Operculum dolii siccum, firmissimum vinum indicat, si humidum, peruersionem. Si aceti mulsi odorem habebit, transuolari ostendit, vas talis odoris causam scito. Alii manus in vinum immergunt, usque exiccatis ex odore coniciunt: peruertendi enim vini acidior olfactus. Alii super harenam vinum coniciunt,

& percolant, si non transmutabitur, probatissimum habent. Vina quia per-
nerti solent in solstitiis, & vite germen fundere: ob id eo tempore probationis
talia experimenta sumunt. Alii laminas ex plumbo, stanno, vel ære faciunt lon-
gitudine, & latitudine trium digitorum, & deterfas operculo doli adglutinant, &
opercula doliis obdunt, & post quadagesimū diem aperiunt, si laminas puras
reperient, vinum dulce, odoratum, & sanum iudicant, at si plumbæa albescen-
tem, in cerussæ speciem, si stanneam, nigrescentem, si æneam, in bullas erum-
pentes, non sanum. Alii polentam ammiscent, & ubi defecerit, gustant. Alii a-
pii semen, hordei furfures, lauri folia, vitis nigræ sarmenta in efferuescens &
bulliens vinum iniiciunt, & refrigeratum gustant: & hoc modo experimetur
capiunt. Plinius. In vitium inclinantis vini experimentum est laminæ plum-
bæa mutatus in eo colos. Flos vini candidus probatur, rubeus triste signum est,
si non is colos vini sit. Item vasa incalescentia operculave sudantia. Quod cele-
riter florere cœperit, odoremq; trahere, non fore diuturnum.

De tempore, & modo gustandi vinum. CAP. XXVI.

SVNT & fraudes œnopolatarum, quæ peruersum vinū optimum gustatibus
demonstrare possunt, nō quod ipsi eiusmodi imposturas aliis faciamus, sed
ne per tales circumueniamur & ne ab eis fallamur, eas nos docet Florentinus.
Qui borealibus ventis flantibus vina degustant, qualia sint non cognoscunt,
quia tunc incommota manent. Sed experti œnopræ Austro spirante gustant,
quia austro vinū commouet, & quale sit arguit. leiuus vinū ne gustet, tunc e-
nim gustus est hebes, neq; à crapula id degustandū. Oportet gustantem, neq;
acres, neq; salos cibos, qui comedentis gustū immutant, præsumpisse: sed pau-
cissimum cibum, eumq; nondum concoxisse. Emptoribus borea spirante, vi-
nū ad gustandum exhibeto. Alii emptoribus imposituri, doliū nouum habent,
quod optimo, vetere, ac odoratissimo vino replent, & ita fallunt gustāres, pu-
tantes odoris fragrantiam contēti vini esse, quū in doliū diutius ea qualitas in-
hareat. Caupones caseum, & nuces exhibent potantibus, quo exactus sensus
gustus corrumpatur. Zoroaster syderū exortu doliā aperiri nō debere admo-
net, tunc enim motus fit vini, & non cōuenit ipsum cōrectare. Et si in die do-
lium aperies, soli vmbrosū aliquod oppones, ne splendor vino illabatur. Si no-
ctū, necessitate urgente, doliū aperturus, aduersum lumē Lunæ iridē excipies.
Laborat vinū, ut Paxamus tradit, occasu Pleiadum, itē bruma, vel quū flore vi-
tis exuitur, & stiuo solstitio, vel exortu Canicula. Sentiunt vitia, quū cœlum
incendio flagrat, quū etiā nimio frigore riger, quū vehementer inceserunt
pluuiæ, item quū duro tonitru cōcutitur aut violentis coruscat fulgetris. Pli-
nius. Bruma aperiri verant, nisi sereno die: verant Austro flante plenave Luna.

Quomodo mustum dulce toto anno habeamus. CAP. XXVII.

MVSTVM vt semper dulce, & tanquam recens toto anno permaneat, sic
facito. In amphoram mustum indito, & corticem oppicato, demittito
in piscinā, post trigessimū diem eximito, totum annum mustum erit. Cato,

Vel

Vel antequam pr
mustum in amph
quam aqua intro
phoram mergit
vsq; in annū dulc
prochyma dictu
in vas intus, & ext
perculo diligenti
manet. Diutius p
10 teū per triginta d
stū erit. Si quis et
Alii in vetus vas
in puteū impon
infodiunt. Alii si
vas non picatū n
deponūt. Experi
etiam per bienni
dulce vini Colur
ridiano tēpore c
20 sum, de lacu tolli
stā nec plus vne
suave, firmum, &
demā sarmentu
bens sol humore
facimus. In torqu
to ex vite abstrah
gari incipiūt, coll
sub eodē meridia
insequenti ē noct
30 liis conditū mu
valde oculus co
diem opercula d
relictis, qua &
quinq; doliā de
vinumq; est qu
quoniā feruen
lacu protinus
etiamnum ali
& in ea maxim
40 torro. Ab aliis

An v

Vel antequam prælo vinacea subiiciantur de lacu quàm recētissimum addito mustum in amphoram nouam, eamq; oblinito, & picato diligenter, ne quicquam aquæ introire possit. Tunc in piscinam frigidā, & dulcis aquæ totā amphoram mergito, ita ne qua pars extet, dein post quadraginta dies eximito, & vsq; in annū dulce permanebit. Hęc Columella à Florentino Græco. Mustum prochyma dictum Græcis, quod sponte distillat antequā calcetur, eodem die in vas intus, & extrā picatum conde, vt ad medietatē vas repleatur, & addito operculo diligenter obline gypso. Ad multū enim tempus mustum dulce permanet. Diutius permanebit, si vas per pelliculā obturatū, & conclusum in puteū per triginta dies dimittatur, propterea quod nō efferuescit, & semper mustū erit. Si quis etiā leniter vvas calcauerit, vt nō prematur, hoc ipsum habebit. Alii in vetus vas à vetere vino mustum infundunt. Alii vas intra & extra picatū in puteū imponunt, vt labra tantū superemineant. Alii in humidā arenam vas infodiunt. Alii super vas vinaceis obrutū harenā humidam accumulānt. Alii in vas non picatū mustum condunt, & nitro Alexandrino tuso adiecto in vmbra deponūt. Experimentū suprā descriptū probauimus, & verū inuenimus, immo etiam per biennū sub aqua latuit, & optimū repperimus. Alio quoq; artificio dulce vinū Columella facit. Vvas legito, in sole triduū expadito, quarto die meridiano tēpore calidas vvas procucato, mustū lixiuium, antequā prælo sit pressum, de lacu tollito, quū deferbuerit in sextarios quinquaginta irim benè pinxitā nec plus vncię pondere addito. Vinū à fęribus eliquatū diffundito: hoc erit suaue, firum, & corpori salubre. Didymus ita facit. Triginta diebus antē vindemiā sarmentum ferens botros in torquēt, omniaq; folia auferunt, quo illa bēns sol humorē consumat, & vinū dulce facit, quemadmodū per cocturā nos facimus. Intorquent sarmenta nimirum, vt racemos ab humiditate, & alimento ex vite abstrahant. Alii postquā racemos foliis denudarunt, & vva iā corrugari incipiūt, collectas racematim ad solem exponūt, donec passę fuerint, post sub eodē meridiano sole sublatis in torcular transferunt, & reliquam diem ac insequentē noctem siccant, & sub diluculū calcant, vel iā expressum, & in doliis conditū mustum, per triduū deoperta relinquūt, mox opercula addunt nō valdē osculis congruentia, sed virgis interpositis superpendētia: post quintum diem opercula exacte obdanda, cinere aqua subactō illita, paruis foraminulis relictis, quæ & post septimum diem claudantur. Et si dulcius quæris, ad dies quinque dolia deoperta siniro, mox opercula addito. Plinius Mediū inter dulcia vinumq; est quod Græci aigleuces vocat, hoc est semper mustū. Id euenit cura, quoniā feruere prohibetur: sic appellant musti in vina transitū. Ergo mergūt ē lacu protinus in aqua cados, donec bruma transeat & cōsuetudo fiat algēdi. Est etiamnum aliud genus eius per se, quod vocat dulce Narbonensis prouincia, & in ea maximē Vocōtii. Asseruatur eius gratia vva diutius in vite pediculo in torto. Ab aliis ipse palmes inciditur in medullā, ab aliis vva torretur in regulis.

An vinum habeat ammistam aquam. CAP. XXVIII.

ina quia per
e probationis
re faciūt lon
d glutinant, &
aminas puras
beā abescen
bullas erum
stant. Alii a
feruescens &
xperimentum
aminæ plum
te signum est,
ia. Quod cele

VI.
um gustatibus
s faciamus, sed
Florentinus.
n cognoscunt,
rante gustant, 20
gustet, tunc e
stantem, neq;
sisse: sed pau
a spirante, vi
ouum habent,
r gustares, pu
ea qualitas in
exactus sensus
debere admo
Et si in die do
labatur. Si no
ridē excipies.
el quū flore vi
quū cælum
ter inceserunt
et fulgetris. Pl
plenave Luna.
XVII.
permaneat, sic
ato, demittito 40
tum erit. Cato,
Vel

PYRA sylvestria, hoc est crudissima Sorion in mustum conicit, & si aquam habuerit, ad fundum merguntur. Democritus verò inquit. Si scire cupis emptor, si nullam mistionis fraudem vinum experitur, mala, aut pyra sylvestria, aut locustam, aut cicadam in vas mittito, quod si supernatauerint fluitantia, meri sinceri que putat indicium, si demergantur, aquam contineri. Aliqui arundinem, papyrum, fœnum, lignum, aut aliquid sarmentosum oleo illitum dolio mandant, deinde extrahentes considerant, si oleo guttula aquæ stillatim congestæ cohereant, quod si deprehendatur, aquam contineri certum est. Vel si in ollam nouam antea nullo perfusam humore biduo vinum adhibeatur, ea mistam aquam extillabit. Alii calefactum vinum sub dio in nouum mittunt fictile, si aquam habeat degenerat in acetum. Alii in uitam calcem vinum iniiciunt, si sincerum est, hanc cogit: si in aquosum, diffundit. Porro si in sartagine feruens oleum capientem vinum aquam habens funditur, obstrepet, & bullans exiliet. Alii spongia oleo imbura spiraculum vasis obturant, & inuertunt, si aqua insit, a spongia manans effluet. Africanus in dolium vini liquidum alumen infundebat, & penicillo oleo peruncto dolii spiraculum operculabat, per quod inclinatum sola profluebat aqua. Ad hæc Cato: Si voles scire in vinum aqua addita sit nec ne, vasculum facio de materia hederacea. Vinum id, quod putabis aquam habere, eodem mittito. Si habebit aquam, vinum effluet, aqua manebit, nam non continet vinum vas hederaceum. A quo Plinius: Ederæ mira proditur natura ad experienda vina. Si vas fiat ex ligno eius, vina transfluere, ac remanere aquam, si qua fuerit mixta. Sed hoc falsum est, nam quum experiremur, aqua effluit, vinum remanet. Sed lignum viride sit oportet. At quomodo à vino aqua separetur, in Naturali Magia longius exequuti sumus.

De defruto coquendo. CAP. XXIX.

VASA, quibus defrutum coquitur, aut sapa, plumbea potius, quàm ænea esse debent: nam in coctura æruginem remittunt ænea, & medicaminis saporem vitiant. Odores qui cum defruto apti sunt coquantur, iris, fœnum græcum, scœnum. Harum singulæ libræ in defrutarium quod ceperit multi amphoras nonaginta, quum iam deferbuerit & expurgatum erit, tum adiaci debent. Deinde si natura tenue mustum erit, quum ad tertiam partem fuerit decoctum, ignis subtrahendus est, & fornax aqua refrigeranda. Quanto plus decoquitur (si modo non adurit) melius, & spissius erit. Plinius: Decoquitur mustum vsque ad tertiam partem mensuræ. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutum vocamus. Omnia in adulterium mellis excogitata. Ipsa quoque defruta ac sapa coquunt quum sit cœlum sine Luna, hoc est in syderis eius coitu, neque alio die coqui iubent. Præterea plumbeis vasis non æreis, nucibus iuglandibus additis: eas enim fumum excipere. Campaniæ nobilissima exposita sub dio in cadis verberari Sole, Luna, imbre ventis aptissimum videtur.

Tempus

Tempus defrutum
ris diebus, aut ante
lultri, nec nisi è ma
garur vas, adultu
mi sextarios v 11,
spu maneris, sapa

MVLTA sunt
ea tantum.
lumella affert rem
dum vt quum vua
tur, mustum in co
tem decimā adiac
refruxerit, in vasa
ti nihil fiet. Meli
lius si nil aquæ ad
tuleris, & si in sex
refruxerit. Multu
absumito, aut ere
quidem acris vin
autem de gypso r
acescere non per
est Tarentinus, m
lium demergatur,
triduum inueniet
num robur resum
Alii lactis caprini
dies elutriant. De
crebris coruscant
30 stes, ferru oper
turaru discordia
quibusdā in locis
pæq; nomen ac
tiosa face segre
tedas accensas
ferrum candet
alii cinerem sa
aliā domum tr
ab humiditate
40 cinu vrant, &
cocto, sapa, def

Tempus defrutum coquendi, noctu silente Luna, aut si interdiu plena, ceteris diebus, aut ante exortū Lunæ, aut post occasum. Ne de nouella vire, aut palustri, nec nisi è matura vua, nec nisi foliis despumandum, quia si ligno contingatur vas, adustū ac fumosum fieri putant. Leontius sapam docet. Musti optimi sextarios *v i l*, vini optimi sextarios centum, si ad tertias decoxeris, & despumaueris, sapam egregiam parabis.

Remedia ad vina. CAP. XXX.

MVLTA sunt apud antiquos rei rusticæ scriptores ad vina remedia, nos ea tantum, quæ ad vsum nostri tēporis esse possunt, huc afferemus. Columella affert remedia acscentis vini. In quo agro vinū acescere solet, curandum vt quum vuam legeris, & calcaueris, priusquā vinacea torculis exprimantur, mustum in corbem defundas, & aquæ dulcis puteanæ ex eodem agro partem decimā adicias, & coquas, donec aqua quā adieceris, decocta sit. Quum refrixerit, in vasa defundas, operias, & oblinas, ita diutius durabit, & detrimenti nihil fiet. Melius erit, si aquam pluribus annis seruata addideris: longè melius si nil aquæ addideris, & decimam musti decoxeris, frigidumq; in vas transfuleris, & si in sextarios *v i l* multi heminā gypsi miscueris, postquā decoctum refrixerit. Mustum reliquum, quod è vinaceis fuerit expressum, primo tēpore absumito, aut græ cōmutato. E Frontonis doctrina: Gypsum iniectū à principio quidem acius vinū facit, progressu temporis acre quidem transpirat. Vtilitas autem de gypso resurgens ad multū tempus perseuerat, durabile vinū facit, & acescere non permittit. Vino quod acorem quandam iam concepit, vt author est Tarentinus, medetur ollula aquæ bonæ plena, quæ diligenter operata in dolum demergatur, modica tamen respiratione relicta dolum occludatur. Post triduum inuenietur ab acore vinum sese recollegisse, & aquam olere, si pristinum robur resumpserit. Quare vsq; quod vinū perfectè conualescat, hoc facito. Alii lactis caprini quinquagesimam partē infundunt, & integunt, post quinque dies elutriant. Diximus suprà vina laborare, quū cælum tonitru cōcutitur, aut crebris coruscat fulgetris. Arcere tonitrus, & fulguris noxam credidit Zoroastres, ferrū operculis doliōrū superpositū. Alii ad motos lauri ramulos cæca naturarū discordia vinū ab huiusmodi iniuria vindicare scripserunt. Vitiū musto quibusdā in locis iterū sponte feruere, qua calamitate iterū deperit sapor, vappæq; nomen acquirit. Docet Fronton: vinū peruersum in vappā, si à propria vitiola face segregetur, & super vini boni facē fundatur, diuturnū erit. Quidam tedas accensas in musto extinguunt, & vinū transmutari non permittunt. Alii ferrum candens. Quidam cedri fructū, & gallas tostas, alii thus poricū vstu n, alii cinerem sarmentorū vino iniiciunt. Alii in vasa recentia transfundunt, & in aliā domum transferunt; si à caliditate laesa sunt, in frigidos locos deponunt, si ab humiditate & frigiditate, in calidos & siccos. Alii fructum, aut lignū quercinū vtunt, & cinerem in vinū mittunt, alii nucleos oliuarum combustos vino cocto, sapa, defruto extinguunt, & rulos in vinū diffundunt. Sal tostus iniectus

vinum in vappam abire prohibet, impedit autē feruorem vltra quā cōuenis extendere, & spumam vberiore superstare. Ob id Plinius: Vinorū medicaminis tanta cura est, vt cinere apud quosdam instaurantur. Sed cinerem ē vitis farmentis, aut quercu praeferunt. Quum & marinam aquam eiusdē rei gratia ex alto peti iubent, seruatiq; ab æquinoctio verno, aut certē nocte solstitio & Aquilone flante hauriri, vel si circa vindemiam hauriatur, coqui. Ob id vt diurnius vinum fiat, idem Fronto amygdalas dulces in vinum nigrum coniicit, vel vnam passam sua sponte in vite factam, exempto vinaceo, cum harena madafacta musto, aut sapa, vel vitis radices, oleum stillaricum cum sapa infusum, veratrum nigrum & album modicē inditum, cicer nigrum, modicē tostum & molitum, sapa, lini semen musto ammistū, picem brutiam, contusam, & percribrum excussam, pinus resinam, & alumen scissum. Turbulentiā vini confestim residere promittit Anatolius, si decoctē ad tertias amurca singulas heminas in singulas vini metretas quis infundat. Fronto tradit argillam postquā vina deferbuerūt immisam ipsū purgare deferentē secum turbidum ad fecē, atq; id magis tostam. Itē candida ouorū tria in vas coniecta, vt spumescāt, conturbato, adiicitoq; salem album, & vini partem, atq; emolito, donec quā albisfima euadāt, deinde vino vas impleto, & in doliū sic diffundito ac reponito. Si situm oleat vinū, aut asperginē sentiat, iubet Apuleius tædas pingues igni flantes in doliū coniici, & accensas in vino restingui. Alii candentem testā immergunt. Alii vas continens aquam obruunt, & post triduū liberari vitio expერიuntur. Alii apii semen, & folia intingunt, alii recentis casei serū permiscēt. Salignum lignū vino inditum omnem nequitiam tollit. A serpente immisum virus, vt Democrito placet, ferreus anulus elicit. Sed aliud ad id affert Columella praestantius. Si quod animal in mustum ceciderit, & interierit, vti serpens, aut mus, sorēxve, ne mali odoris vitium faciat, ita vt repertum corpus fuerit id igne aduratur, cinisq; eius in vas, quod deciderat, frigidus infundatur, atque rutabulo ligneo permisceatur, ea res erit remedio. Sotion remedium affert, quod vinum florem non habeat. O Enanthem siccata in vinum inspergito, aut farinam erui, vbi verò infra secesserint flos & farina, vinū in aliud vas transfundito. Columella monet, Si vinum florere incipiet, sapius curare oportebit, ne os eius pessum eat, & saporem vitiet. Si qua vina erunt duriora aut minus bona, quod agri vitio, aut tempestate sit factum, sumito faciem boni vini, & pamestacito, & in sole arefacito, & coquito in igne, postea terito, & pondo quadrante in amphoris singulis infricato, & oblinito, bonum fiet.

Varii acetum conficiendi modi. CAP. XXXI.

SEDES expostulat, vt quomodo acetum fiat differamus ex vino, atque non ex vino commentitium multis modis. Est acetum vini vitium, quod ad luxuriam cessit hominibus, tot ad vsus expetitur, vt sine eo vita mitior exigi non posset. Acetum subito sic fieri Cassianus ex Varrone promittit, si tusam betam radicem

V
radicem in vinum
pristinum statum
concupere tradit
tur. Pyrethrum
factum reliquar
minis radicibus,
carbonibus in eo
vratur. Diu suum
cōfundantur. Si
feruescens intum
cetū Sotion doce
tu confluxit vnā
superst. Alii men
discoquunt, dū t
sticantundē mis
cetū promittit A
tā, & ad ipsam aqu
mistā in vase repo
metretā ammisc
ficientē supering
relinquit. Fir cō
refactū hordeū in
rē concipit. Alii si
& citiorā malore
tur, vt in aceti vice
stiaq; aqua fluuial
commadefactas
culneū acetum it
vini, ideoq; & ac
turissima legen
in terrā decidit,
ibi finitur ferme
aceti diligenter
cerimini aceti vs
humido loco p
scent, & subin
tabescere, don
is saccis percol
spurcitiam exi
miculos, aliā
Pyra syluestri

radicem in vinum cōieceris, post horas tres in acetum degenerabit. Quod si in pristinum statum restitui voles, brassicæ radicē indidisse satis est. Mirū acorem concipere tradit Sotion, si aridi vinacei, aut pauci vix acerbæ acini demittantur. Pyrethrum infusum acorem supra modum accendit, si cū vna parte feruifacium reliquæ miscueris. Acerrimum idem fieri putat, & suaue, vetustis graminis radicibus, aut immerso lactis sero, aut cinere querno, aut candentibus carbonibus in eo restinctis, aut si ciceribus, testisve igni fragrantibus acetum vratur. Diu suum acorem tueri refert Apuleius, si fabæ cū citrii mali succo vasi cōfundantur. Si scire vis acetum an aquam habeat, iniecto alumine si tanquā
 20 feruescens intumuerit aquam continere, Apuleius existimat. Dulce sic fieri acētū Sotion docet, quo post triginta dies quis vtatur: Musti quod vuarū calcatu confluxit vnā metretam in duas aceti addūt, simulq; coquūt vt triens modo superfit. Alii mensurā musti duplam, aquæ potabilis triplā ad aceti vnā partem discoquunt, dū totius modi dimidiū restet. Alii acerrimi aceti amphorā & musti tantundē miscunt, pice vase oblito, & post idē tempus vtuntur. Duplicari acētū promittit Africanus, si conspicuā mensuram aceti acceperis, velut metretā, & ad ipsam aquæ marinæ ad dimidia coctæ metretā vnā adieceris, & permista in vase reposueris. Quidam ordeum macerāt, & percolāt, & ex cremore metretā ammiscēt, & simul agitant, & salis torrefacti adhuc calentis partē sufficientē superingerunt, quo facto vasi operculū obdunt, ipsumq; ad dies octo relinquūt. Fit cōmentitiū ex non vino, hoc modo: Persica mala mollia, & torrefactū hordeū in vase mistim cōputrescere sinunt: expressus fisco succus, acorē concipit. Alii sine vino ita acētū cōfingunt. Fici veteres & torridū ordeum, & citriorū malorum interna caro crebrius subacta, cōturbataq; colis exprimūt, vt in aceti vicem succus cedat. Alii marinā aquam, & gypsum coquūt, admistaq; aqua fluuiali percolant in aceti vsum. Alii ex ficibus, quas in arboribus commadefactas in aquā coniciunt cōputrescereq; sinunt, acētū efficiunt. Ficulneū acetum ita exactius docet Columella. Sunt quadā regiones, in quibus vini, ideoq; & aceti penuria est. Itaq; hoc eodē tempore ficus viridis quā maturissima legenda est, vtiq; etiam si iam pluuiæ inceserint, & propter imbrem in terrā decidit, quæ quum sublecta est, in dolium vel in amphoras conditur, & ibi sinitur fermentari: deinde quum exacuit, & remisit liquorem quicquid est aceti diligenter colatur, & in vasa bene olida diffunditur. Hoc primæ notæ acerrimi aceti vsum præbet, nec vnquam situm, aut mucorem contrahit, si non humido loco positum est. Sunt qui multitudini studentes, aquam ficis permiscunt, & subinde maturissimas ficus recentes adiciant, & patiantur in eo iure tabescere, donec satis acris aceti sapor fiat. Postea in iunceis fiscellis, vel sparteis saccis percolant, liquatumq; acētū interuefaciunt, dum spumam & omnem spurcitiam eximant, rum torridi salis aliquid adiciunt, quæ res prohibet vermiculos, aliæve innasci animalia. Acetum de pyris ita componit Palladius:
 40 Pyra syluestria vel asperi generis matura in cumulo referuantur per triduum.

Deinde mittitur in vasculo cui fontanea, aut pluuias aqua miscetur, & operum vas per triginta dies relinquitur, ac subinde quantum sublatum fuerit acceri ad vsum, tantum redditur aqua ad reparationem. Plinius, Vasa mellaria, aut fauos lauare aqua præcipiunt, & hac decocta fieri saluberrimum acetum.

Quomodo citra vnam vinum fiat. CAP. XXXII.

SORTION: Myrti, & corni recens fructus molitus, & expressus vinū facit. similiter vinū faciunt grana mali punici pura expressa, ablati his, quæ in medio granorum existunt. Quidam & à viridibus ficibus vinum faciunt, explentes ipsis dimidiam vasis partem, ac reliquam aqua pura superfusa complentes, assidueq; ex gustu experimētum sumunt: quum enim vinosus apparuerit sapor, excolato vtuntur. Fit etiam potus è frumēto & ordeo, quo maximè vtuntur barbari. Fit ex olyra & auena parata, fit ex panico & milio. ex Berytio. Palladius ex pyris vinum fieri dicit, si confusa, & sacco rarissimo condita ponderibus comprimantur, ac prælo. Hyeme durat, sed prima astate acescit. Februario mense, & Octobri, ex omnibus pomis vina conficit. Plinius Indos vinum ex palmis exprimere dicit. Cariora maximè celebrantur & cibo prædè, sed & succo vberissima, ex quib. præcipua vina Oriēti, iniqua capiti, vnde poma nomen.

Quomodo vinum album fuscum facias, & vicissim nigrum album. CAP. XXXIII.

IN album colorem nigrum mutari vinum asserit Cassianus ex Varrone, si falsis sordidi drachmas octo in decem heminis vini nigri miscueris. Idem contingere dixit, si serum lactis vino infuderis. Si quis vitis albæ sarmenta vsserit, cineremq; in vas indiderit, & commoto probè vino, ad dies quadraginta fuerit, vinum album erit. Contra verò album reddetur nigrum, cinere sarmentorum nigrorum in ipsum coniecto. Palladius in Octobri ex his. In album colorem vina fusca mutari asserunt, si ex faba lomentum factum vino quis adiciat, vel ouorum trium lagenæ infundat alborem, diuq; cōmoueat, sequenti die candidū reperiri: quod si ex asina pisa lomentum adiciatur, eadem die posse mutari. Vitis quoq; hanc esse naturā, vt alba vel nigra si redigantur in cinerem, vinoq; adiciantur, ei vnamquamq; formam sui coloris imponere, vt ex nigra fuscū, cādidum verò reddatur ex alba, ea ratione scilicet, vt combusti sarmenti cineris modii vnus mensurā mittatur in dolium, quod habebit amphoras decem, & triduo sic relictum post operietur, ac lutetur. Album vel (si ita visum fuerit) nigrum reperiri quadraginta diebus exactis.

Quomodo vine in sua vite vsq; ad ver permancant. CAP. XXXIV.

SERVANTVR & vine in sua vite, & à vite collectæ. Asserit Berytius vine in sparente seruari vsq; ad veris initia, si loco vmbroso scrobē siccæ altitudine binum cubitorum, & missō sabulone ad minicula figis, quib. intorques assidue sarmentum fructibus plena, & illa vis vis alligabis vt solū non contingat, & cooperies, vt imber eò penetrare nō possit. Itē Parentino docēte, vine in vite si diu

seruare.

seruare volueris, vasculis clausis fictilib⁹, ab ima parte pertusis, diligēter à summo rectas suspēde: sic in longā seruantur ætatem. Sed id exactius docet Columella. Nihil est tamen certius, quā vasa fictilia facere, quæ singulas vuas laxè recipiant. Ea debent quatuor ansas habere, quibus illigata viti dependeant, itemq; opercula eorum sic formari, vt media diuisa sint, vt quum suspensa vasa singulas vuas receperint, ex vtroq; latere apppositi operculi duæ partes coeant, & contegant vuas: & hæc vasa, & opercula extrinsecus & intra diligenter picata esse debebunt. Deinde quum contexerunt vuas, luto paleato multo adoperiri, sed vuæ dependentes à matre sic in pultarios condi debebunt, ne quæ partes vasa contingant. Tempus autem quo includi debent, id ferè est, quo adhuc siccitatibus, & sereno cœlo crassa, variaq; sunt acina. Plinius, Est duracina sine vllis vasis in vite seruabilis: tanta est contra frigora, æstus, tempestatesq; firmitas. Durant vuæ per hyemem pensili concameratæ modo. Palladius, Vt vuam serues in vite vsq; ad veris initia: Circa ipsam vitem, quæ fructu plena est, loco vmbroso scrobem defodies altitudine trium pedum, latitudine duorum, & mittis sabulonem, & ibi calamos figis, in quibus retorques assidue sarmenta fructibus plena, & illæsis botryonibus alligabis, vt solum non contingant, & cooperies, vt imber eò penetrare non possit. Quæ huc vsq; recitauimus maiorum adiumenta fuere, quæ difficilis operationis incommodaq; sunt. Nos nostro inuento vsque ad Maium, & Iunium menses adseruauimus integri, vt vnâ vetus vuæ & recens, vno, eodemq; palmitre viseretur. Vitium, quæ prope domum consistat sunt, quum iam vindemiarum tempus recessit, sarmenta, flagella, flexilia per fenestram in contactum intorqueamus, ac domicili laquearibus, genistæ iuncis, qui loci vicem expleant, diligenter alligamus, vt immota permaneant, sed aptè vt fenestra referari, & claudi possint: hoc modo frigoris tyrannidem, & sauitiam antevertendo, ab auiibus custodiendo, ne eis depascantur, quum venti & gelicidia sauiant, fenestras claudito, tepido, & sereno cœlo eas aperito, idq; vsq; ad ver. Quum iam vitis noua germina & frondes ostendit, eam aperto cœlo crede, & tepidis foliis apicari finito, iam noua pullulante, vtramq; eodem palmitre habebis. Nobis etiam aliter licuit idem facere. Putationis tempore iam aduentante, eligito bina sarmenta in vite, quæ certam spem fructus pariundi spondeant, desecato cacumina vtriusque, duos vel tres oculos relinquendo, ne tamen à sua matre reseces, ea per creracei vasculi pertusum fundum traducito, ac vbi paululum supra vasis ora extabunt, repleto vas terra. Et si certius ac citius quoad fieri poterit id agere concupieris, æstate vas aqua plenum supra id accommodato, vt per laneam linguam paulatim, & continuo aquam in vas instiller, sic radices vegetius iniiciet, & induet se in frondes & fructus. A vindemiis sub vase sarmenta absconde, & in contactam domum feras, loco sicco, & tempestatibus tuto, videlicet cellis vinariis. Fenestras retibus obregito, ne aues eas deuorent, hyeme serenis diebus apicari finito: vbi gelicidia horrent, in calidio-

tribus locis adseruato, & vsq; ad Augustum seruabis, vt simul vno palmitre, & noua & vetus vua vigeat, colore, & vigore seruatis.

De variis vuarum condituris. CAP. XXXV.

CATO amineas maiusculas, & minusculas, & apicias condit in ollis, ollas in vinaceis. Eadem in sapa, & multo rectè condi dicit. Quas suspendas duracinas, amineas maiores, & stantianas opportunissimas esse. Columella ita seruat. Vuas bumastos, duracinas, & purpureas quum defecueris à vite, continuo pediculos earum impicato dura pice: deinde labellum fictile nouum impleto paleis, quàm siccissimis cribratis, vt sine puluere sint, & ita vuas superponito, tum labello altero adoperito, & circumlito luto paleato, atq; ita in tabulato siccissimo cõposita labra paleis siccis obruito. Omnis autè vua sine noxa seruari potest, si luna decresciente, & sereno cœlo post horam quartâ, quâ iam insolata est, neccoris quicquam habet, viti detrahatur, sed ignis in proximo decumano fiat, vt pix ferueat, in qua pediculi vuarum statim demittantur. In dolium benè picatû defruti amphoram conicito, deinde transuersos fustes spisse arctato, ita vt defrutum non contingant, tum superponito fictiles nouas patinas, & in his sic vuam disponito, vt altera alteram non contingat, tû opercula patinis imposito & linito. Deinde alterum tabulatum & tertium, & quamdiu magnitudo patitur dolii, similiter instruito, & eadè ratione vuas componito, deinde picatum operculum dolii defruto largè linito, & impositû cinere obturato. Nonnulli adiecto defruto contenti sunt transuersas perticas arctare, & in his vuas ita suspendere, ne defrutum contingant, deinde operculû impositum oblinire. Quidam vuas in vmbra refrigerant, & dolia noua sine pice in sole siccant, fursures ordeaceos adiciunt, & vuas ita superponunt, vt altera alteram non comprimat, tum generis eiusdem fursures infundunt, & alterum tabulatum vuarum eodem modo collocant, idq; faciunt vsq; dum dolium alternis fursuribus, & vuis compleant, mox opercula imposita linunt, & vuas siccissimo & frigidissimo tabulato reponunt. Quidam eadem ratione arida populnea, vel abiegna scrobe virides vuas custodiunt. Nonnulli sicco flore gypsi obruunt vuas, quas non nimium maturas vitibus detraxerunt. Alii forficibus si qua sunt vitiosa grana ex vuis amputant, atque horreo suspendunt, in quo triticum suppositum est. Sed hæc ratio rugosa facit acina, & tam dulcia, vt passa. Vel ex ea creta, ex qua fiunt amphoræ, lata vasa in modum patinarum fieri iubeant, eaquæ intrinsecus, & extrinsecus crassè picati, tum vuas picatis pediculis in prædictis patinis separatim cuiusque generis ita componi, ne vuæ inter se contingerent, posthæc opercula superponi, & oblini crasso gypso, tum pice sic picati ne quis humor transire possit. Totâ deinde vasa in aqua fontana, vel cisternina, ponderibus impositis mergi, nec vllam partem earum pati extare sic optimè seruatur. Sed quum est exemplum, nisi eo die consumatur, acescit. Illud præcipiendum ne eodem loco mala

& vuæ componi
modi balitæ acin
mnibus regionib
conueniunt. Qu
vel quinta hora,
guntur, in cratib
tur acina, & quum
mittuntur, oper
lio substernunt
interculari poss
olla eodem mo
perculo cinere d
cipit decrescen
roribus. Similit
vt Luna infra te
corruptioribus
ximissentiant. Fa
culis seorsum, ita
possit, maximè l
matur, & mures
ning, aut relique
eo genere præce
fectum particul
spargere, vel sus
malunt in picatis
li, vel milii farin
adlit, in murian
paleis seruunt.
mox in sole sic
30 protinus susper
optimo sit oper
re seruari volun
sub dio refriger
lidos acinos bal
perueniat aqua
do, solem dici
Vinosa reperie
in tabulatis cul
ipsum vuæ, sus
40 cerptæ. In doli
culo, integræ,

& vuar componantur, nec malorum odor ad eas possit peruenire: nam huiusmodi halitu acina corrumpuntur. Sed rationes, quas retulimus, non omnes omnibus regionibus aptæ sunt, sed pro conditione locorū, & vuarum aliæ aliis conueniunt. Quibusdā in locis sereno cœlo, quū iam sol rorem sustulit, quarta vel quinta hora, Luna decrescēte, & sub terris existente, modicē maturæ leguntur, in cratibus separatim ponuntur, sub rectum referuntur, arida tolluntur acina, & quum paulū sub vmbra refrixerint, ternę aut quaternę in ollas demittuntur, opercula pice obturantur, ne humorē transmittant, vinacea in doliō substernuntur; & deorsum versus spectantes ollæ cōponuntur distantes, vt interculari possint vinacea, quę vbi conspissata primū tabulatum fecerūt, aliæ ollæ eodem modo componantur vsq; ad summum labrum, & superposito operculo cinere doliū linitur. Didymus vuas defecari à vite ad hunc vsum præcipit decrescēte Luna post horam quartam, cœlo sereno aut discussis à ventororibus. Similiter deligi è locis siccioribus ante perfectam maturitatē, addito vt Luna infra terrā sit, vuas cum malleolo sarmenti sui duro, demptis forcipibus corruptioribus acinis tabidis, & adhuc pubescentibus, sic ne vitium tabis proximi sentiant. Falcis acie citra violentiam secari, & illius pice igni resoluta surculis seorsum, ita ne se contingere possint, pauimento substratis paleis, si fieri possit, maximè lupinorum, collocari, si quidē & duriores, & sicciores eæ existimatur, & mures infestos abigunt. Sin defint lupinorū paleę, fabagineę aut eruineę, aut reliquorū leguminum inuicē substituuntur. Ordeaceę in frumentaceo genere præcellunt. Si desiderentur, scēnū quā siccissimū in minutas dissectum particulas substernitur. Simili ratione frondosos palmites pauimento spargere, vel suspendi conuenit. Alii vuas suprà paululum obruunt. Sunt qui malunt in picatis capsis vuas in scobe, ramentisve siccis piceæ, abietis, populi, vel milii farinare condere. Alii in marinam aquam feruentem, aut si non adsit, in muriam, permisto vino macerantes immergunt, & ita ordeaceis paleis seruant. Quidam in cinere vitigineo, vel ficulneo lixiuo tingunt, mox in sole siccant, tum inuolutas paleis stipant. Sunt qui in granariis
30 protinus suspendi iubeant, quibus frumentum vannis agitatur, quoniam optimo sit operimento puluis insidens pensilibus: ita longissimo tempore seruari volunt. Alia custodiendi ratio. Aquam ad tertias incoctam mox sub dio refrigeratam in doliū picatum fundunt, postea maturas vuas, solidos acinos habentes, detractis putribus & immaturis obruunt ita, vt superueniat aqua, nec fluerent, gyplatoq; diligenter operculo, vas loco frigido, solem diē non admittente, quo etiam nullus succendatur ignis, reponitur. Vinosa reperietur aqua, fallendæ laborantium siti non inutilis. Pensiles quoq; in tabulatis custodiantur. Alii mustum habentibus doliis, dum ne contingant ipsum vuar, suspendunt: quo genere tales remanent, quales à vite fuerint decerptæ. In doliō quoque picato exclusa omni aura, gyplato diligenter operculo, integræ, quæ nulla in parte senserunt offensam, appenduntur. Simili

modolita figulino luto, sic subacta, ut mellis referat crassitudinem, intinctæ pondeant, & ad usum eluantur. Item portulacæ succo illitæ pensiles diu custodiuntur. In solidum annum uas seruabis, si ante vindemias paulo lectas aqua calida alumen continente demerferis, & protinus raptas sustuleris. Seruantur etiam in melle. Palladius hæc in vniuersum. Vvas quas seruare volumus, legamus illas, neq; acerbitate rigidas, neq; maturitate defluentes, sed quibus est & granum luce penetrabili splendidum, & tactus cum molli iucunditate callolus. Si quas sunt corruptæ vel vitiosæ refecemus, nec patiamur interesse, quibus inexpugnabilis acerbitas contra blandimenta æstui caloris induit. Tunc incisos botryonum tenaces, calida pice oportet ambiri, atque ita in loco sicco, frigido, & obscuro, sine luminis irruptione suspendi.

Vua passa faciendæ ratio. CAP. XXXVI.

APATIENTIA nomen acinis datur passis. Ita facere docet Florentinus passam vuam. Melioris acini, dulcis, & lucidi pediculos vuarum in parente torqueri, & ut sponte inarescant pati, deinde sublatas in umbra suspendi, constrictasq; substratis pampinis algore sicco frigentibus componi, & impleto vase operculari, statimq; loco sicco, quem nullus fumus infestet, recondi. Columella. Albæ, dulcissimi saporis, maximis acinis, nec spissis, Luna decrecente, sereno & sicco cælo discussis roribus leguntur, & paulisper sic, ne inter se pondere suo pressæ possent collidi, in sabulas porriguntur. Deinde in aheno, vel olla fictili noua, lixiuium cineris sarmenti calefieri conuenit, quæ quum feruebit, exiguum olei quàm optimi adici, atque permisceri. Deinde vvas pro magnitudine binas aut ternas inter se colligatas, in ahenum feruens demitti, & exiguum pati, dum decolorentur, nec rursus committendum, ut excoquantur, nam quadam moderatione, temperamentoq; opus est. Exemptæ dein in crate, rarius quàm ut altera alteram contingat, disponuntur, & post tres horas vnaquæq; sic tamen ne eodem vestigio cohæreant, conuertitur, ne in humorem, qui defluerit, vitietur: noctibus contegi debent ut à rore vel pluuia tutæ sint. Quum modicè tamen aruerint, in vasa noua, sine pice operculata, & gypsata recluduntur. Quidam vuam passam foliis ficulneis inuoluunt, & assiccant, alii foliis virgineis, nonnulli plataninis semivietas vvas contegunt, & ita in amphoras contegunt. Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo quem cremauerint cinere lixiuium faciant, deinde in sexarios decem lixiuæ salis tres cyathos, & olei cyathum adiciant, tum adhibito igne calefaciant, & cætera eodem modo administrent.

De vitis materie. CAP. XXXVII.

NE de eius materie tacendum est. Theophrastus hæc de eius materie habet. Vitis lenta materies, qua de causa scuta ex ea facere solent. Icta enim protinus plagam contrahit. Sed quæ minus fructificat, solidior est. Plinius.

V
mis. Iouis simul
in corruptum. Ita
neis columnis ite
vna Cypria, ut fer
est ligno vlli are
De simulacro Di
tianus ter consul
quam mutatum,

IOA
10 P C

H



30
eonsiglaſſe vi
sè contextis to
coronatis, ſin
ſpiritus reſou
& ſubinde ſo
pars corporis
30 At ſi quis hoc
to ſuburbano
Plinius hortis

nius. Iouis simulacrum in vrbe Populonia ex vna conspicimus vite, tot ævis incorruptum. Item Massiliæ pateram: Metaponti templum Iunonis vitiginis columnis stetit. Etiamnum scalis tectum Ephesiæ Dianæ scanditur vite vna Cypria, vt ferunt, quoniam ibi ad præcipuam amplitudinem exeunt. Nec est ligno vlli æternior natura. Verùm ista ex syluestribus facta crediderim. De simulacro Dianæ Ephesiæ ambigitur. Cateri ex ebено esse tradunt. Mutianus ter consul, ex his qui proximè viso eo scripsere, vitigineum, & nunquam mutatum, septies restituto templo.

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER NONVS.

SIVE

HORTVS CORONARIVS.

P R O O E M I V M.



RVSTO vix egredientis flores ex proximo coronario horto miris suis illecebris visum, olfactumque ceperunt odoris effluui, & inenarrabili colorum varietate. En hortum referamus, ingredimini hilares, licet spatari, & eius iucunditate frui. Nullibi enim maior, quàm ex aspectu, odore, & viribus nostri animi recreatio accedit: flores enim tam vario colorum ornatu lasciuiens natura depinxit, vt nulla in re tam magno suæ fertilitatis gaudio eousque luisse videatur. Nec maius ornamentum ex vllis quàm vniuersi artificiosè contextis topiariis, aliisve operibus, hortis accedit, quantum ex odoratis coronariis, sine quibus horti gratia, & amœnitate destituuntur. Eorum odore spiritus refouetur, torpens animus exhilaratur, collapsæ vires redintegrantur, & subinde somnus conciliatur. Omitto medices materiæ vtilitatem, vt nulla pars corporis male affecta sit, quin ex floribus remedium adhiberi nequeat. At si quis hoc munus agricolis minimè conuenire dicat, nōne Cato in horto suburbano coronamentorum omne genus conferi debere præcipit? Et Plinius hortis coronamenta conuenire scribit, quibus apes depascantur, præ-

cipui quæstus, compendiūq; Decebat quippe Campanum hominem antho-
logico scribere, quum antiquitas Ægyptum terrarum omnium accommoda-
tissimā vnguentis habuerit, & Campaniam rosarum copia celebrauerit. Sed
quem seruaturi sumus ordinē, pronunciemus. In arbusto & vinea de vite dixi-
mus, media inter herbas & arbores, vt pote frutice, sed medii inter frutices &
herbas suffrutices sunt: vocat autem Theophrastus coronarios flores suffrutice-
ces: id tertium est ex generibus, in quæ principio plantas digessimus. Hortus
hic herbas coronarias, & flores cōtinebit, dicemusq; de corollis, quæ ex his ne-
ctuntur. Nos de floribus primò, post de herbis. Sed flores vel odorati, & hi ver-
ni, vt rosa, liliū, leucoiū, viola, narcissus: vel æstiu, vt iasmes, & flos caryophyl-
lorū odore, vel hybernū, vt crocus. Vel inodori & verni, vt hyacinthus, chalta,
gladiolus, helyochrysus, vel æstiu, vt cyanus, lychnes, & amarantus, vel autu-
mnalis vt anemone, petilius, vel hybernū vt cyclaminus, hederā, cilia, spina,
ægyptia. Herbe vel odorata, vt abrotonum, serpillum, amaracus, sisymbrium,
heleniū, trifolium, baccaris, libanotis, melissophyllon, conira, lauandula, vel
inodorata, vt hederā. Sed floralia ingrediamur, & primum coronas nectamus.

De corollis, earum usu, & inuentoribus. C A P. I.

COROLLAS breuiter attingemus: esset enim friuolum amplam de iis su-
scipere tractationem, quum ab Athenæo, & aliis satis amplè tractatum
sit: post de floribus, quæ digna videbūtur, memorabimus. Tenuioribus corol-
lis vtebantur antiqui, strophia appellantes, vnde nata strophiodia. Quū vei dē
floribus fierent serra, à serendo seruiæ appellabantur: paulatimque & Romæ
coronæ subrepsit appellatio, corollis inter initia propter gracilitatem nomi-
natis, mox & corollariis. Hæc Plinius. Sunt qui coronas à choro dictas putent,
licet aspiratione careat, siue quod honorent eos, quibus imponantur. Aucto-
rem & inuentorem coronæ lanum biformem Græci prædicant, eaq; in Græ-
cia factitatum à Stephano primum afferunt, ob id & nomen serts datū vt ste-
phani vocarentur. Oleagineis coronis ministri triumphantium donabantur,
quod Minerva dea belli esset, & olea præfesset. Obsidionalis corona è gramine
erat viridi, ex eo loco decerpto in quo erant inclusi, dabatur Imperatori, qui
liberauerat obsidione hostibus obsessos, & magnæ autoritatis fuit. Ciui-
ciligna fuit, frondem habens perennem. Hanc dabant testem vitæ, salutisque
percepte ciui, à quo liberatus fuerat in prælio: è fronde quernatexebatur, quo-
niam antiquissimus cibus ex quercu capi erat foliis. Myrtea corona Papyri-
us vsus est, quod Sardos in campis myrtis superafler. Ouantis etiam myrtea ea-
rat, quæ gerebant Imperatores, qui urbem ouantes introirer, quum bella sine
sanguine cōfecta erant. Transiere deinde ad rosarias, eoq; luxuria processit, vt
non esset gratia nisi mero folio. Laudatissima habebantur, quæ ex folio nardi
resterentur. Mos tamen antiquis inoleuit, vt post cænā circumferrentur con-
uuiis, sed aut hederā, aut lauro, aut herbarum floribus versicolore commisto
strigebantur: quas ludicras, & puellares vocabant. Liber vini repletor, quod me-
dicamentum

dicata entū sua
derā suis virib;
ronari debacch
frigore temule
capita à capitis g
caput occupari
ra florū nardib;
ratur, quia si flor
euadat vapor. S
10 xios haultus rep
ris flores, odor
expirant enim
totū corporib;
conciliata tran
inferuntur, ve
Verū quæ flo
Gracis in mōp
feriunt. Carter
flore, aliz foli
20 teus. Item rho
in coronas ad
næ earum obri
lissophyllon, &
antiquitus fact
ximè foliis bre
re folio, quo vi
reo, in iis colo
pleriq; coroll
cilient, & car
30 ripateticus, v
capitis à vini
se, quod eā lig
derent, tēpor
quod tempore

Ar qua
set, teiecer
adeat Athe

De h

dicamentū suauissimum simul, & vehementissimum adinuenisset, fertur hederā suis viribus huic repugnātem, in honorem ac pretium adduxisse, eaq; coronari debacchantes edocuisse, quo minus vini noxam sentirent, hederā suo frigore temulentiam restringente. Iuglandē ē coronamenti abdicarunt, quā caput à capitis grauitate propter odoris virus dicitur. In cœnis quum merum caput occuparit, arcemq; sensuum obsederit, hominē conturbat, cui mitis aura florum naribus hausta succurrit, caputq; ab ebrietate propugnaculi vice tutatur, quia si flores calida præditi sunt natura, laxant spiracula, quibus vinosus euadat vapor. Si frigidis ut rosīs violisq; coronę struuntur, astringēti sua vi noxios halitus repellunt, & capitis grauitatem corrigunt. Ligustri, croci, & baccharis flores, odore somnos alliciunt, & ad placidam quietem potos perducunt: expirant enim lenem auram, ac blandum odoris effluuiam, quo in temulentorum corporibus inęqualitates obortę sensim dissipantur, & excoquantur, ut conciliata tranquillitate crapula retundatur. Sic flores bifariam coronamētis inseruntur, vel ut capitis grauitatē abigant, aut somnum placidum accersant. Verū quę floribus concinnatę, ceruici colloq; tanquam penfiles gestantur, Græcis *umbupides* appellantur, hinc odores naribus rapti, suo calore cerebrum feriunt. Cæterū coronarum, quę sola varietate placent, duo genera: nam alię flore, alię folio constant. Florem dixerim gemitas: nanq; in iis decerpitur luteus. Item rhododendrō. In vepribus nascitur cyclaminū, cuius flos colossinus in coronas admittitur. Folia smilacis, & hederę se coronamenti dedere, coronę earum obtinent principatum. In coronamenta folio venere cunilago, meliophyllon, & meliorō, quod fertulam Campanam vocant. Coronas ex hac antiquitus factitatas indicium est nomen fertulę, quod occupauit: placet maximē foliis breuib; & pinguiſſimis. Folio coronat trifolium asphaltiō maiore folio, quo vtuntur coronarii, vtūtur hederę foliis, corymbis, & flore purpureo, in iis colos tantū delectat, odor abest. Helichrysi flore immortali aureo se plerofq; coronare Theophrastus scribit, ut gratiam ineant, & vitę gloriā concilient, & cætera quę longi esset laboris describere. Aristoteles & Ariston Peripateticus, vterq; libro amatoriorū secundo scribit, ob dolorē & grauitatem capitis à vini potu molestam, vinculū quoduis tēporibus antiquos admouisse, quod eā ligaturā prodesse crederēt, posteros autē ut quidpiam ornatus adderent, tēporibus quod cōpotationis oblectamentū est, coronas excogitasse, quod tempora, & frontem vinciri ad vini noxam conducatur. Adid Anacreon,

Superciliis ex apio corollas superimposuimus,

Latumq; Baccho festum, & conuiuium celebranimus.

At quę odore caput feriunt, & quicquid grauare, aut opplere alioqui posset, reiecerunt, ut ex lauro & amataco. Sed hæc sufficiant, si quis plura volet, adeat Athenæum libro decimoquinto.

De Flora dea, & floralia quomodo celebrarentur. CAP. II.

BBb 2

LACTANTIUS Firmianus refert Floram ex arte meretricia magnas opes sibi comparasse, & populum Romanum heredem scripsisse, certamque pecuniam reliquisse, ex cuius annuo fœnore suus natalis celebraretur, ludorum editione, quos floralia nuncupauerunt. Quod quum senatui nō satis decorum immò flagitiosum potius videretur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudendæ rei dignitas quædam adderetur. Vnde deam esse sinxerunt, quæ floribus præsser, eamq; oportere placari, ut fruges cum arboribus benè, prospereq; florent. Ouidius nobiliori fictione prosequutus est in Fastis, non ignobilem nympham dicit, Clorim vocatam, à Zephyro vim passam, quam duxit, hæc à viro dotis loco id muneris accepit, ut supra flores potestatem haberet. Floralia igitur in honorem Floræ celebrantur, ut arbores optime efflorescerent, deflorescerentq;, & ad iustam fructus magnitudinem accederet. Instituta autem fuere urbis anno sextodecimo ex Sibyllæ oraculis, & quarto Calendas Maii fiebant. Ouidius,

Exit & in Maiæ festum florale Calendas.

Hanc verò diem Varro determinat, sole partem quartam decimam possidente. Ergo si in hoc quadriduum plenilunium inciderit, quæ florescunt la di necesse est. Ob id Varro in limine statim de re rustica sui libri Robigum, & Floram adueneratur, quibus propitiis rubigo frumenta non corrumpat, & omnia tempestiuè florent.

Qui locus, quod cælum & solum horto deputetur. CAP. III.

IN suburbano horto Cato genus omne coronamentorum seri iussit. Florentinus locum intra domesticam habitationem, si id fieri commodè potest, deligere debet, aut si id nō detur, ex propinquo, ut non solum oculis spectantium intra ædes iucunditas hauriatur, sed etiā ambiens aer ex fragrantia plantarum infectus, salubrem habitationem, ac totam possessionem reddat. Ipsæ verò plantæ non inordinatæ, neq; mixtæ plantentur, tanquam sanè, quod aiunt, plantarum diuersitas decorem inducat, sed secundū genera separatim singulæ plantæ ponantur, ne minora à potentioribus superentur, aut etiam alimento priuentur. Nos areas interstinguere solemus, ut ex quadrangulis areis in rotundas, ex rotundis rursus in angulares, & ex iis in alias progressus detur, quæ neq; totæ rotundæ, neq; rectis lineis concludantur. Theophrastus libro de causis, de cælo loquens floribus coronariis cōuenienti, ait. Quæ siccaneis tractibus, quibus placidior arridet aura, suauiora, odoratioraq; profiliunt: quippe quum exhausta humoris parte quadam, calor melius suo fungitur munere, reliquias concoctui cedentes perficit. Siccitas enim non parum odori suffragatur, eoq; spectant odorata, cuius rei fidem facit, quod æstiuosis regionibus, meliora odorum genera proueniunt. In Ægypto flores, cæteraq; coronamenta omnium ferè deterrima gignuntur, quia cælū caliginosum, & roscidum habeatur, in quo nullus penè odor contrahi potest, quippe coquendi

abest

abest facultas: proueniunt, nō maximè rosa, & cælo puro, sitientur & annus aridus, non imbruius, & aque, & flatus, & opacis tractibus immiscens. odor. 10 syluestrius aridus, magis, atq; magis, riis loquens quicquid enantha, & vi huiusmodi plerumque, quæ prægerminant, rat violam, quia

Degenerat

COMMUNE est semine quod flammula, elium, scuntur & auulsi, portet. Abrotanum dimittunt, tate, acoreq; suo, que erumpere videntur, alia propinqua, que oleribus. Quæ rosas non solum, que passus, atq; ex toto inopimus, imbecillia reddunt, more: quæ resiliunt

QUONIAM in coronis libro amoris Regem imponitur, plantarum, quæ igniculum, y

abest facultas: aridis longè melius excoquitur. Quæ verò circa Cyrenam proueniunt, non nisi ratione siccitatis odorata consistunt, tum cetera, tum vel maximè rosa, & crocum. Ager enim tenuis, siccus, nec nimio fœuore flagrans, cœlo puro, sitienti quæ lustratus, odoribus creandis aptissimus iudicatur. Videtur & annus ad bonam olentiam referre, quum scilicet talis aut talis incesse-rit, non imbrium, squalorum quæ; tantum ratione, sed etiam quum tempus certum, & aquæ, & flatus, & in totum cœli commodè mutationes accesserint. Quæ dilutis, & opacis tractibus degunt, in odora percipiuntur: etenim humor sese largius immiscens, odorem obtundit, & eius hebetat acrimoniam. Caterum genus syluestrium aridius cernitur, ieiuniore donatum habitu, nec silens à flatu, sed magis, atque magis auræ patens, hinc feruentior natura. Et tandem de coronariis loquens quibusdam: Quæ locis circumseptis, apricis quæ continentur, ut ænantha, & viola nigra, & alia quædam assidue florere videntur. Locis enim huiusmodi pleraque exeunt, quæ alibi nasci nequeunt, & fructum eadem afferunt, quum cetera generis eiusdem aliis locis afferre nequeant, & præfloreant, & prægerminant prius, quam reliqua. Varro apricis locis hortum locat, ubi ferat violam, quia ea omnia sole nutricantur.

Degeneratione, & cultu florum coronariorum. CAP. III.

COMMONIS plantarum generatio ex semine est, nam quæ semen ferunt, ex semine quoque nasci oportet. Ex semine exeunt viola, Iouis flos, iphyum, flammula, elium: nam & ipsa, & eorum radices ligno nimirum constant. Nascentur & auulsione, sed quod auellitur, radices, aut stipitis aliquid habere oportet. Abrotonum, sisymbrium, serpillum radices è germinibus suis quamprimum dimittunt, non secus ac hedera. Abrotonum lignosum est: verum spissitate, acoreque suo seruati aliquantulum temporis potest, nam hæc defixa quoque erumpere valent. Communis coronariorum cultus rigatio, stercoreatio, & farcitio, alia propria generatim habentur, ut purgatio in coronariis pariter, atque oleribus. Quippe serpillum obarescit, nisi purgetur, sisymbrium, & cetera. Rosas non solum præcidunt, verum adurunt, desinunt enim florere, syluestresque pastus fecunditate, nisi ita tractentur. Intempestiuu imbres pessimi, atque ex toto inopportuni, qui circa floris exortum accesserint, omnia nanque imbecillia redduntur, pereunt, deciduntque: partim rubigine, partim nimio humore: quæ resistere poterunt, deterius florent.

Derosa. CAP. V.

QUONIAM rosa inter flores facile principatum obtinet, eiusque nimius in coronis est usus, cogit me, ut ab ea initium auspicemur. Achilles Tacijs libro amorum Leucippes, & Clitophonis ait, Si floribus Iuppiter vellet Regem imponere, rosa quippe regnum inter flores obtineret, terræ est ornatus, plantarum lumen, oculus florum, prati iubar, pulchritudo coruscans, amoris igniculum, veneris conciliatrix. Anacreon Poeta Græcus:

<i>Rosa, flos odorg, diuūm,</i>	<i>Eadem decens coronis:</i>
<i>Hominum rosa est voluptas,</i>	<i>Et expetita mensis,</i>
<i>Decus illa gratiarum,</i>	<i>Solennibusq, Bacchi.</i>
<i>Florente amoris hora.</i>	<i>Rosis quid absq, fiat?</i>
<i>Rosa suauum Diones,</i>	<i>Aurora nonne fertur</i>
<i>Rosa opus laborq, vatum,</i>	<i>Rosea manu decora?</i>
<i>Et amica planta Musis.</i>	<i>Roseisq, nonne nympha</i>
<i>Est grata colligenti,</i>	<i>Spectabiles lacertis?</i>
<i>Licet ante spina pungat</i>	<i>Rosicolor ipsa Cypris,</i>
<i>Mordacibus rubetis.</i>	<i>Vocitata nonne doctis?</i>
<i>Est grata eam fouenti</i>	<i>Quid plura? nonne multis</i>
<i>Manu subinde molli,</i>	<i>Medicina certa morbis? &c.</i>

Rosam antiqui Veneri dicarunt: nam ea considerata tum venustatis, tum amoris symbolum ostendit, quod omnium in se amores trahat, omniumq; sibi animos conciliet. Poeta:

Ros vnus, color vnus, & vnum mane, duorum.
Syderis & floris est domina vna Venus.
Forſan & vnus odor: sed celsior ille per auras
Diffatur, spirat proximus iste magis.
Communis Paphia dea syderis, & dea floris,
Præcipit vnius muricis esse habitum.

Philosophi ille veteres, qui rerū omnium originem altius perſcrutati ſunt, odorem, coloremq; illum à Veneris ipſius ſtella proficiſci autumant, & Maro Venerem ſemper ore loqui roſeo dixit. Fingunt Poetæ Gratiæ eſſe tres, ex Libero patre progenitas, quarū in Elide, atq; in foro templum fuit, & illarum ſimulacrū, cuius vultus, manus, & pedes ex cādido marmore fuerunt, veſtimēta autem aurea. Harum vna ſola roſam tenebat, media talum, tertia myrti ramum, hoc modo effigiatæ, quòd roſa & myrtus Veneri dicatæ ſunt. Præterea vt quemadmodum roſa breui tēpore durat, ocyus floret, ocyſſimè marceſcit, ſic homines admoneantur formam & veneream voluptatem cito perire. Rubet etiam, pungitq; ſic & libido ipſa verecundiæ opprobrio erubeſcit, acutoq; ſtimulatur aculeo. Philoſtratus Cupidini, non eius matri donauit, quem tota facie æmulari videtur. Primū enim paruo tempore permanet, & recens ſemper ſit oportet temporis non ſentiens ſenium; ita Cupido recens, atq; ſemper iuuenis, mollisq; eſt. Coma eius aurea eſt: nam & roſa aureum quid in ſoſculo habet. Pro ſpinis roſæ, iaculum fert, pro foliis alas, pro facibus fulgorem. Roſam multiplex comitatur fabula, non niſi candidam per initio fuiſſe, mox vulnerato Veneris pede, dum Adoni di opem ſatura præcipiti curſu per dūmeta rapitur, adrubuiſſe. Alii ſanguine Cupidinis, vt Auſonius. Græci admirandam illam pulchritudinem, odorisq; ſuauitatem à Venere contributam ſingunt, quādo deām Adonidis amore captam Mars deperibat, qui zelotypus, Adonidis

donidis morte
 Venus reſcens g
 tur ſubidiū allat
 eius ſpinis tranſi
 riam, in ruborem
 rum conuiſio la
 la concuſſa ſub
 reddidiſſe. Roſa
 cinere Poetæ.

10 Illa q
 G
 Affi

Ambroſius
 culum oſtendit
 curarum ſtimu
 vallata eſt, & ſol
 ſic hilaritati. Qu
 riſque andrix p
 10 cecimus roſam
 ſtercore, ſuo od
 critus apud Ab
 tā venetiſci ſcor
 pente ſeruari co
 apes ex roſis mo
 Roſam Græ
 redundantiā
 quod odoris eſt
 bus vocari eui
 30 Duplicē roſ
 ſidentem habet
 excoſtioni trib
 ma deſinit, par
 Serenis diebus
 admoſa. Sicc
 rata quodam
 ſum quidem
 odorem ſine
 Naſcitur ſpin
 40 cortice, quo
 rub. ſcens deſ

donidis morte initam consuetudinem solutum iri sperans, Adonim interfecit. Venus resciscens gestum facinus, dum omni studio, diligentiaque propere fertur subsidium allatura, in rosæ frutices irruens, pedem nullo munitum sandalio eius spinis transfigit, ita rosæ pristinum candorem, in profusi cruoris memoriam, in ruborem conuertit. Alii aliter fabulantur. Cupidinem quum in deorum conuiuio lasciuie saltationibus indulgeret, pateram nectaris plenam alæ concussu subuertisse, nectar inde folum humi florem rosæ rubicundum reddidisse. Rosam prius albam mox icto Veneris pede aspergine tinctam cecinere Poetæ.

Illa quidem studiosa suum defendere Adonin,

Gradiuus stricto quem petit ense ferox.

Affixit duris vestigia caca rosetis,

Albaq; diuino picta cruore rosa est.

Ambrosius dum de rosâ philosophatur, spinam tanquam humanæ vitæ speculum ostentare dicit, quæ etsi summam suauitatem præ se ferat, finitimis curarum stimulis sæpè compungitur, ut amarescere videatur, vitæ elegantia vallata est, & sollicitudinibus quibusdam obsepta, ut tristitia semper adiuncta sit hilaritati. Quare non illepide Catullus Venerem, quæ iucunditatis, hilaritatisque auctrix præcipua habetur, spinosas ait in pectore curas ferere. Nec reticebimus rosam sordidissimum animal scarabeum, cui res plurimum est cum stercore, suo odore enecare, ut tradidit ex Aristotele Cassianus. Ob id Democritus apud Absyrtum, rosæ radicem, torquis modo, seu alio quouis modo portatâ beneficii scorpionis esse amuletum dicit. Tarantius apud eundem ictos à serpente feruari contendit, qui rosæ radicem amuleti vice gestauerint. Palladius apes ex rosis mel colligere dixit, quod à Varrone excepit.

Rosam Græci *ῥόδον* vocant, ὅτι ἐν ῥοῖμα πολὺ τὸ ὀσμὴς ἀφίησι, quod ingentem odoris redundantiam difflet, authore in Symposis Plutarcho, aut *ἔνθ' ὅτι ῥοῖς ὀδωδής*, quod odoris effluxum emittat. Timachides in cœnis scribit rosam ab Arcadibus vocari *ῥομφαλον*, id est odoratam. Latinis, & Italis rosa.

30 Duplicè rosæ florem Theophrastus esse inquit, quum in flore aliū florem infidentem habeat. Flos tantum odore iucundus, reliquæ partes ignauæ, quod excoctioni tribuendum est. Nouissima inter vernos flores erumpit, ita prima desinit, parum enim temporis durat eius prouentus. Semen fert sub flore. Serenis diebus lecta, odoratior. Recens longè redolet, sicca non nisi propius admotâ. Sicca suum odorem tuetur, dum deficiat penitus. Ratio quod indurata quodammodo proprii caloris inopia halitum efflare nequit, nam aduersum quidem vnguentarii eas quoque aliquatenus siccare consueuerunt, ut odorem sinceriores relinquunt. Urbana odoratior. Plinius ita describit: Nascitur spina verius quàm frutice. Germinat omnis primo inclusa granoso
40 cortice, quo mox intumescente, & in virides alabastris fastigiato paulatim rubescens dehiscit, a se se pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos

Descriptio.

apices. Longè olet recens, sicca propius. Dubitat Aristoteles cur rosa suavius olent, quibus umbilicus asper, quàm quibus levis. An quòd suavius olent, quæ modum consequuta sunt suæ naturæ? rosa autem spinosa natura est, suavissimè ideo olent, quod magis secundum naturam constiterint. Nos ita describimus. Flammeo colore rutilat rosa virgineis genis, & malis concolor. Pars, quæ calycem ambit, aperta rosa in quinque pinnulas finditur, globulus in ima rosæ parte solidus, quem si aperueris lanugine quadam refertum reperiēs, foliis & floribus substratum, ceu basis totam rosam sustinens. Capillamentum quod subtile est veluti filum, florum fulcrum est.

Genera.

Eius genera quamplurima. Nos primò in sylvestrem partiemur, & satiuam. 10
Sylvestres, Theophrasto authore, ex toto asperiores tum virgis, tum foliis, odore, colore, & magnitudine superantur. Plinius *κνύποδον* vocat, tale nomen adeptū, quòd canis rabidi moribus auxilio sit. Alterum genus est rubi, in quo rosa nascitur. Gignit pilulam castaneæ similem, præcipuo remedio calculosis. Insanabilis ad hosce annos fuit rabidi canis morius, pauporem aquæ, potusque omnis afferens odium. Nuper cuiusdam militantis in prætorio mater vidit in quiete, ut radicem sylvestris rosæ, quam cynorhodon vocant, blanditæ sibi aspectu pridie in fruteto, mitteret filio bibendam. In Lacetania res gerebatur, Hispaniæ proxima parte, casu accidit, ut milite à morfu canis incipiente aquas expauescere, superueniret epistola orantis, ut pareret religioni, seruatusque est 20
ex insperato, & postea quisquis auxilium tērauit. Aliās apud authores vna medicina cynorhodi erat, spōgiolæ, quæ in mediis spinis eius nascitur, cinere cum melle allopecias capitis expleri. Nos has spongiolas in sylvestri rosa Baroli Apulici vidimus, magnitudine castaneæ, villosas, colore in fuluo rufescentes, nascuntur vere. Satiui permulta genera, quæ odore, colore, & magnitudine, foliorum numero, asperitate, & lauitate differunt. Inter celeberrima rosarum genera Plinius Campanā præfert, quæ præcox est. Apud nos Cāpanos *rosa canina* vulgò dicta est, dicta canina quod horridis spinis atmetur. Vniuerso nostro tractu præclara, præcoci partu ceteras antecellit, Aprili florens, quinis senisve foliis, cuius pars ima scabra, suauissimi odoris indicium. Athenæus ex 30
Theophrasto, suavius olere sribit, quibus folia quina, & scaber est cortex inferior. Proxima trachinia, minus rubens, inquit Plinius. Neapoli vulgus *rose maiatice* dicit & *incarnate*, quod sint candore, & rubore cōfusa, & Maio floreat, nobilitate dictis proxima. Malū quod sub flore gerit magis rotundum, eique duodena folia. Milesia sera est, cuius ardentissimus colos, nec excedens duodena folia, ut ex Plinio habemus. Hanc affirmare ausim, quam *incarnata nera* vocamus, quæ in purpura sanguinea saturatè punicat, vltimo Maio efflorescens, duodenorum foliorum. Celebratur prænestina, quæ nouissimè definit, Plinius dixit. Neapolitanis *damaścena* vocata, ceterarū odoratissima, germinatu postrema, continuò & diutius floret, & hyeme tepidioribus locis bi- 40
feta, foliis circiter viginti, ex rubro candicantibus, ramorum proceritate ceteras

ceteras superans
chamæcerasum
odoratissima aq
ad albas transean
tifolias dicant, q
sunt, numerosis
neus fert eadē. P
cipatu negauit ce
dines, nec odore
folia, & vulgò *ro*
oriuntur, ut alia
gnitudinis. Herc
num foliorum.
gio Alia, ex qua
tifolias odore, co
vitreis organis p
insidens rosis in
pebris instillatus
eius dolorem seu
tractu lultret, tri
sis. Inter has meo
sine odore præte
schi odore, quæ
non ambigo Pl
fert, ad estate vlt
spinis & virgis sy
sunt vna coheret
infignes sine m
galindie persica
fo quum è minuti
bilissimi odoris
roscæ crocei colo
ris in odori.
Rosas cœl
Plinius, ut lib
thagine Hips
rator, ob id q
tenuis, nec ni
gypto minus
fo tibus longè d
O

cæteras superans: nam surgit crassiss & lignosis virgis, vt ea sit, cui Athenæus chamæcerasum similem arborem dicat. Apud nos celeberrima. Elicitur ex ea odoratissima aqua vitreis organis. Huic dicit Theophrastus plura folia. Nunc ad albas transeamus. Theophrastus rosas esse ait numerosiore folio, quas centifolias dicant, quæ ex Philippis in Græcia à Pangeo monte vicino translatae sunt, numerosis foliis, sed paruis, nec odore, nec specie commendabiles. Athenæus fert eadē. Plinius in Cāpania Italiæ esse ait, & Cæpio Tiberii Cæsaris principatu negauit centifoliam in coronis addi, præterquā extremos veluti ad cardines, nec odore, nec specie probabile. Apud nos Campanos copiosa est centifolia, & vulgò *rosa a cento frondi* dicimus: sed folia interiora parua sunt, ita enim oriuntur, vt alia intus, alia extra emicent, non iucundi odoris, nec amplæ magnitudinis. Herodotus in Macedonia in Mediæ hortis dicit rosas esse sexagenum foliorum. Alabandica vilior, albicantibus foliis ex Plinio. Est Alabanda regio Asiæ, ex qua aduecta fuere. Nos *rosa bianca* vulgò vocamus, similes centifoliis odore, coloreq; sed vicinis circiter foliis. Vtimur ex ea stillatitia aqua vitreis organis pro morbis oculorum: quia frigidior. Didymus. Ros ille, qui insidens rosis inuenitur hæere, munda pinna lectus, & specillo genarum palpebris instillatus, oculorum lippitudini medetur. Zoroaster anno toto oculos eius dolorem sentire negat, qui calyces ante, quàm in flores explicentur, leuiter tacta lustrat, tribusq; earum alabastrulis visum detergat, relictis in pariete rosis. Inter has media magnitudine autumnalis, quam coroneolā vocant. Omnes sine odore præter coroneolā, Plinius dixit. Hanc Neapolitani ab insigni moschi odore, quem redolet, *rosa moscatella* dicunt, ita strenuè olet, vt caput feriat: non ambigo Plinii coroneolam esse, nā pauca & mediæ magnitudinis folia affert, ab æstate vsq; ad hyemem, & interdū tota hyeme floret. Odoratissima est, spinis & virgis syluestrem quodāmodo rosam æmulari videtur. Rosæ plurimæ sunt vna cohærentes. Inter cæteras arborefcit. Sunt præterea alui subductione insignes sine molestia. Nostri pharmacopœi persicas vocant, nam in Camolanga Indiæ persicas vocant. Nescio cur Matthiolus hanc Plinii spineolam vocet, quum è minutissimis dicat. Nos hanc etiam centifoliam habemus, & spectabilissimi odoris, valentius mouet aluum, & diutius floret. Sunt & apud nos rosæ crocei coloris, eiusdem cum reliquis floris, sed planta odoris medicati, floribus odorati.

Rosas cœlo gaudere calido, & meridionalibus partibus exposito tradidit Colum. Plinius, vt libero sole fruantur, sic enim & germine, & floribus luxuriant. Carthagine Hispaniæ præcox tota hyeme visitur. Locis siccis quàm humidis odorator, ob id quæ apud Cyrenam proueniunt, odoratiores sunt: ager enim ille tenuis, nec nimium feruidus, aëre puro, siccitq; ambitus. Contra quæ in Ægypto minus odorata, quia cœlum rosçidū, & caliginosum est. Præterea montibus longè deteriores emergunt. Ex Theophrasto. Nicander ex Athenæo,

Operisq; principio precibus Themidem Oleniam venerare:

*Alendas deinde rosas celestibus dimitte pluuio,
Semper illa augetur foliis circumcirca comantibus,
Post Olenum secundas tenet Megara Nisea: at nec Phaselis,
Nec Leucophrys improbanda, si cui placet earum situs:
Prouenit & optime rosa ad Magnetis aquas Maandri.*

Æthlius Saurius in libro de iis, quæ Sami pulchra & rara sunt, præter cætera rosas biferas nasci scripsit. Polybius, Lusitania rosas non minus, quàm trimestrispatio durare. In Pestlo Calabrię oppido, aëre placido, benignoque, bis florent rosæ. Virgilius,

— biferiq; rosaria Pestl.

Solum.

Seri nec pinguibus vult, nec argillofis locis, nec riguis, contenta raris, proprieque ruderatum agrum amat, ex Plinio. In suburbano horto rosam Cato feri præcepit, ut possint illic venundari, decerpta enim non patiunt moram, quoniam subito marcescat.

Satio.

Nasci ex semine dixit Theophrastus, quod flori subditum suo in malo cneceum, vel acanaceum lanugine quadam obductum gerit, ut primis seminibus proximum sit, sed tardè perficitur. Palladius, Semine ponuntur rosa. Semina autem rosarum non putemus medios flosculos esse aurei coloris, quos rosæ ferunt, sed baccas nutiunt, quas in breuissimi pyri similitudinem plenas seminibus post vindemiam reddunt maturas, quarum tamè maturitas ex colore fusco, & mollicie poterit aestimari, quæ sulco breuissimo, aut serobibus ponenda sunt. Plinius, Proueniunt tardissimè semine, quod in ipso cortice est, sub ipso flore opertum lanugine. Sed apud nos nemo est, qui rosam semine serat, quod raro & sine colore nascitur, ut syluestris penè videatur. Seritur & conciso caule ex Theophrasto, ut gramen. Varro ita docet. Rosa conciditur radicitus in virgulas palmares, & obruitur, hæc eadem postea transfertur facta viui ra dix. Plinius. Surculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, post Vergiliarum occasum sata, dein per Fauonium translata, pedibus interuallis, crebroque circumfossa. Didymus. Alii in palmares taleolas cum suis radicibus in scabulis modum cubitali interuallo deponunt, & crebris irrigationibus, & stercore iuuant. Nicander secundo libro Georgicorum suorum,

Præterea rosa spinis armata excisa germina.

Terra tumulis insige, ad duos palmos aperta via:

Palladius ita exactius docet: Si indigus plantarum volueris ex paucis virgulis habere copiosa, Februario mense, sed locis calidis & apricis, atque maritimis Nouembri, quaternorum digitorum surculos gemmantes cum geniculis suis debetis excidere, & in modum propaginis sternere, & stercore ac irrigationibus adiuuare. Vbi anni ætatem compleuerint, pedis spatium inter se transferre disinctos, atque ita solum, quod huic generi deputabis, implere. Seritur ex Plinio ocellis radices, ut harundo. Alio item modo Didymus. Nonnulli ut maiorem odoris fragrantiam adiscant, intertextas iis coronas simul

ad

adobruunt. The-
rio mense rosari
Quintili plantar
cibus seruntur.
vel quatuor digi-
tantur, calidis
rio, sed quæ Ma-
runt, hic parient
rantur nam hoc
10 germina sobole
Rosa vita quæ
nis syluestris eu-
scit, flos senescit
phraito. Plinius
quoque, ut vitis
recita, nec adust
esse, iterumque se-
Foditur autem
fodiri ante Cal-
20 perennat. Palla-
re circumfodiu-
Florentinus
tam, eodem quo-
cere velis in am-
sunt mense Mar-
indicamus, ut in
flore alba simul
videlicet diuisi-
scemtem in ser-
30 idque videtur Pl-
simis virgis qui-
Didymus au-
Et calida in fun-
se rosas adere
demque cura
idem efficitur
sibus plantar
dicem scrobe
phraistis odo-
40 ris, cuius ratio
doris ad sit, q

adobruunt. Theophrastus caule toto propagato nasci dixit. Palladius, Februario mense rosaria quæ rara sunt, possunt virgarum ducta propagine reparari. Quintilii plantant Februario mense, augescente Luna. Apud nos viuiradicibus seruntur. Post quinquennium à quo plantatæ fuerint pastino trium vel quatuor digitorum altitudine sub terra inciduntur, & viuiradices plantantur, calidis locis, Septembri, vel Octobri, frigidis Februario vel Martio, sed quæ Martio plantaueris rosas producent, nam quod alibi conceperint, hic parient. Sed loca quibus rosas excideris, iniectis stramentis comburantur: nam hoc modo radicum reliquæ luxuriosius repullulabunt, & densius germina sobolescent.

Rosæ vita quinquennium est, non recisæ, nec adustæ: relicta pluribus annis sylvestris euadit, & priorem gratiam exuit, eo enim modo vegeta iuuenescit, flos senescit, deterior transferendo pulchriorē rosam effundit, ex Theophrasto. Plinius: Omnis autem adustione, atq; recisione proficit, translatione quoq; ut vitis optimè ocysimeq; prouenit. Rosæ & quinquennium perfert, nec recisæ, nec adustæ, illo enim modo iuuenescit. Rosaria à Fauonio fossa oportet esse, iterumq; solstitio. Et id agendum, ut intra id tempus purgata, ac pura sint. Fodiuntur altius quàm fruges, leuius quàm vites. Columella, Omnibus annis fodiri ante Calen. Mart. & interputari oportet: hoc modo culta multis annis perennat. Palladius, Februario mense, si qua sunt antiqua rosaria, hoc tempore circumfodiuntur sarculis, vel dolabris, & ariditas vniuersa reciditur.

Florentinus est author florem rosæ inoculationis modo cortici mali inficere, eodem quo malus tempore, partus suos excludere. At si maturius producere velis in amygdalæ corticem, idem experieris. Rosæ inuicem inoculari possunt mense Martio, & Aprili, & in sylvestres optimè apprehendunt. Fieri posse indicamus, ut in eodem furculo alba simul, & rubra rosæ emergat, & in eodem flore alba simul & rubra folia nascantur, eo artificio, quo perlica fieri diximus, videlicet diuisis oculis, & simul coalitis. Moscatulam in sylvestrem septibus nascentem inseruimus, & optimè concepit, nam florem illa in odorum producit: idq; videtur Plinius intellexisse: vnum genus inseritur pallidæ spinosæ longissimis virgis quinquifoliæ, quæ è Græcis altera est.

Didymus author est. Præcox emerget rosæ, si pedali scrobe ab radice facta calida infundatur. Democritus fruticem bis in die rigatum Ianuario mense rosas ædere promittit. Præterea si fistilibus, & cophinis plantaueris, eademque cura eas digneris, quali cucumeres, & cucurbitas tractare solemus, idem efficies. Et si velis sine temporis intercapedine eis frui, singulis mensibus plantato, & stercoreato. Plinius: Qui præcocem faciunt, pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt, germinare incipiente calyce. Theophrastus odoratiores prouenire ait, si capas vel alia iuxta eas plantaue-
ris, cuius rationem libro de causis reddidit: nam aut quantum illis mali odoris adsit, detrahunt, quum vnumquodque resimili; alatur. attrahitque

sibi cognatum, aut quod sua caliditate, edacitateq; locū exiecat: nam siccis locis omnia odoratiora proueniunt. Odoratiores fieri rosas Didymus affirmat, quibus allia propè fuerint confita. Palladius, si rosam temporius habere uolueris, duobus palmis ab ea in gyrum fodies, & aqua calida bis rigabis in die. Nos rosam bruma hoc modo nacti sumus, vel non multo ante. Plātam ipsam dum in eo est, vt erumpat in flores, amoue loco, atq; in alium transfer, modò non incommodum: nam rosa calycem non aperit nisi prius cōfirmetur. Sunt & sexcenta ferè lenocinia rosarum ad colorem, odorem, magnitudinem, & foliorum numerum demutandum, quæ toto hoc opere in aliis docuimus.

Consuetudo.

Rosas nondū patefactas seruare docet Palladius, si in canna viridi stāte fissas recludas, & fissurā coire patiaris, eoq; tēpore cannā recidas, quo rosas virides habere uolueris. Aliqui olla rudi conditas, ac benè munitas sub dio obruūt, ac ita reseruant. Quæ ex Didymo exceperit. Quidam rosas conseruant recentes, calycibus in viridem plantam harundinem fissam immisiss, & harundine leniter per papyrum obligata, vt perspirare possit. Alii vt diu seruentur, ordeum dum in herba est, cum radicibus euulsū, in fictile non picatum demitti, rosamque priusquam dehiscens se pandat, operiri præcipiunt. Alii virentem ordeis segetem paulo loco sternunt, & rosas ipsas recondunt. Conseruabis etiam recentes & in vigore, si ipsas in amurcam immiseris, ita vt liquor eis supernatet.

De lilio. CAP. VI.

LILIVM rosa nobilitate proximum, eiusq; flos etiam in coronis venit, & vt coronā elegantius contexamus, purpureis aderunt lilia mista rosis. Perhibent Græci Iunonis lacte natum, resperla terra: nam Herculem, quē ex Alcmena Iuppiter sustulerat, quum vellet immortalitati donare, dormientis Iunonis vberibus clam admoovit, & quum lacte se repleisset, post suctum digressus, mamma copiosè profluxit: quod in cœlo à puero perfusum est, galaxiam, id est lacteam viam, quod humi respersum, florem liliū, lacteo colore nitentem creauit. Fuit antiquitus pulchritudinis symbolum: siue formam, siue colorem, aut odorem contemplare. Susas Persiæ urbē, vbi hyberna regia erat, ob amœnam & mitissimam cœli plagam, id nomen adeptam tradunt, quod Persarum lingua liliū significet. quāuis Stephanus à multitudine liliorum ita dictū scripserit. Nicander in alexipharmacis ait liliū Veneri inuisum, quoddē de forma, & candore ausum sit secum certare: hinc mediis eius foliis fœda probra obiecit, id est deformem illic rudentis asini clauam, id est genitalia crescere fecit.

Quoniam Diua colos hic placet, at in floris medio turpe

Armamentum rudentis asini prominet, quod membrum dicitur.

Quærit Aristoteles cur aliqua germinare possint non terra cōtenta, sed abscessa, euulsa, vel condita, vt caules liliorum. An quod alimentum in se continent? crescere autem vnumquodque potest, non eò, quodd in se continet alimentum, sed quodd decoctum iam & digestum illud pabulum est. Continent i-

gitur

gitur vel antea
pas ad id adest,
Græcis uolunt,
odoris effluuiū
& Iunonis rosam
colore visenda e
nomina recense

Lilia

Am

Idemq; scribi
vocant ambrosi
lilium vocant,
tollatur, & regi
Simplici liliū
lis caulibus lilia
Parte postrema
dus detractus g
cum quoddam
violam. Caules

ad germen exci
quod permirun
terdum cubitor
re emaculati can
se laxantibus, eff
mine, stantibus
staminis, differe
noluum vocat
rem tantum res
Surgit apud nos

tibus, carnosiss
res emicant in ta
compacti, sed r
ce bulbacea, è q
Theophrasti
finere audiuit.
non nisi album
Laudatissim
Phaselide. Qu
Non nisi pin
Plinius omni
mat. Vere post

gitur vel antehac alimentum, sed augeritum duntaxat incipiunt, quum tem-
pus ad id adest, cuius opera res illa effici potest.

Græcis *κείνον*, planta *κεκωνία* dicitur. Dioscorides *κείνον* quasi *ποιῶν* ob diuini *Nomen*.
odoris effluuium. Nicæder Aphrodites charma, id est Veneris volupe. Vocant
& Iunonis rosam, è cuius lacte effuso, vt diximus, lactea via in athere, candido
colore visenda est. Græci etiam *αἶθος αἶθρον*, id est florum florem vocant. Alia
nomina recenset Nicander.

Lilia, quæ leria vocant alii Poetæ:

Ambrosiam alii, multi Veneris oblectamentum.

- 10 Idemq; scribit apud Coos è capite statuæ Alexandri enatam fuisse, quam
vocant ambrosiam, vt Carystus etiam suis commentariis memorat. Latini
lilium vocant, alii regium florem, quod sua proceritate supra alios flores at-
tollatur, & regia quadam celsitudine, & maiestate præstare videatur.

Simplici lilium caudice assurgere dixit Theophrastus, raro duplici, singu-
lis caulibus lilia modo singula, modo plura sustinentibus, quod & rarius est.
Parte postrema florescit. Radice copiosa, carnosâ, orbiculatâq; adhæret. Fru-
ctus detractus germinat, & lilium reddit, verum minus. Facit & lachryma cæ-
cum quoddam confluuium, quod etiam ferunt. Vere, exit paulò post albam
violam. Caules plantis abscissi seruare suum vitale principium possunt, ita vt

- 20 ad germen excitandum mouere se valeant. Adde: eius caules solstitiis florent,
quod permirum est. Plinius ita describit. Nulli florum excelsitas maior, in-
terdum cubitorum ternum, languida semper ceruice, & oneri suo impar. Flo-
re emaculati candoris, foliis striatis, & ab angustis in latitudinem paulatim
se laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo, & se-
mine, stantibus in medio crocis. Ita odor, colorq; duplex, & alius calycis, alius
staminis, differentia angusta. Est & flos non dissimilis illi in herba, quam con-
uoluolum vocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, cando-
rem tantum referens, ac veluti naturæ rudimentum, lilia facere condiscens.
Surgit apud nos recto, cubitali, vel bicubitali caule. Foliis pallido vitore niten-
tibus, carnosâ, & secundum longitudinem striatis. In cuius summitate flo-
res emicant intraminati candoris, blandi, & concupiti odoris, senis foliolis
compacti, sed repandi. Fibra, vel crocea stamina è medio educuntur, radi-
ce bulbacea, è quamplurimis nucleolis squamatim compacta.

Theophrastus liliorum genera variari dixit: nam & purpurea lilia non de-
finere audiuit. Plinius, Est & rubens lilium, quod Græci *crinon* vocant. Nos
non nisi album vidimus.

Laudatissimum Plinius ait esse in Antiochia, & Laodicea Syriæ, mox in
Phaselide. Quartum locum obtinere in Italia nascens.

Non nisi pingue, & stercoreatum solum mihi exposcere videtur.

- 40 Plinius omnibus modis seri dixit, sicut rosa. Vnde & semine plantari affir-
mat. Vere post foliorum delapsum, vasculum oblongum remittit, pomi figu-

ra, simile prorsus illi, quod in aristolochia, in quo quædam videntur semina. Id confirmare videtur Anatolius: nam dum lilia purpurea facere docet, ait, Cauliculos ipsorum accipies, supra fumum suspēdes, sic remittēt ex cauliculis bulbos quosdam, quos plantabis. Seritur & caule conciso, ut rosa, & ut gramen exit. Et ut rosa etiam propagatur ex Theophrasto. Fitque hoc modo. Prius quàm dehiscens se pandat, propagetur caulis in terram diligenter ne à bulbo diuellatur, & unusquisq; ex nodis bulbos remittet. Est & peculiaris generatio, quæ fit è lachryma sua, quum id quod defluxit, sole exaruerit, ut olusatrum, cæco quodam confluio, ex Theophrasto. Cuius rationem reddit libro de causis. Lachryma enim caulibus planè respōdet. Nihil enim aliud, quàm quod illarum quoq; fœcundum principiū coactum esse oportet: nō enim sine calore, humoreq; generatio talis cōsequitur. Sed cur non omnes lachrymæ vim obtineant eandē, fit quod non omnes eandē vim sortiantur. Plinius ab eo: Seritur amplius & lachryma sua, ut hipposelinum. Seritur & bulbis suis: nihilq; est fœcundius vna radice quinquagenos sepe emittente bulbos. Varro inter Vergiliarum occasum & brumam illud serit. Palladius Februatio ponit. Bulbi à matre subtracti, atq; in alios digesti ordines, noua liliæ formabunt.

Cultus.

Bulbos, qui positi sunt, Februario mense summa cum diligentia sarriemus, ne oculos circa radicem nascentes, & minores bulbos sauciemus. Ex Palladio.

Ars.

Anatolius purpurea lilia facere docet. Deni, vel duodeni eorū scapi in fasces vel scopas vnā colligati, dum floruerint, fumo suspenduntur, qui radiculos, vel bulbos inibi iaciūt, quumq; pangendi tēpus appetuerit, in fœce nigri vini macerātur, dum infecti colorē purpureum cōtraxerint, eoq; intinctu affatim saturētur: mox scrobiculis deponūtur, effusa largius fœce, & ita flores nascentur purpurei. Plinius ab eo. Inuenta est & in his ratio inserēdi, monstrificis hominum ingeniis. Colligantur namq; mense Iulio scapi arescentes, liliaq; suspendūtur in fumo. Dein nudantibus se nodulis in fœce nigri vini vel Græci, mense Martio macerantur, ut colorē percipiant, atq; ita in scrobiculis seruntur, hec minis fœcis circūfusus. Sic fiunt purpurea lilia, mirumq; ita tingi aliquid, ut nascatur infectum. Rubra fieri lilia confirmat Florentinus, si inter cortices cinnabaris infundatur, hac tamen obseruatione, ne bulbi quouis modo vulnerentur. Et si quemuis alium colorem ebiberint, par erit eum referre, quo delibuta fuerant lilia. Cæterum ut vicissim, & variis temporibus flores pariant lilia, bulbi ita seruntur, ut aliqui duodecim digitorum altitudine obruantur, alii octo tantum, alii quatuor duntaxat profunditate mergantur, sic diuersis diebus dabunt lilia. Quod & in aliis floribus fieri pollicetur.

Cōditura.

Lilia, ut idem Anatolius testatur reliquit, totum annum viridia durabunt, si quum occlusa silent, nec dum patentia dehiscunt decerpta, nouis si cilibus nō picatis, indito diligenter operculo, recondantur: sic clausa perpetuum annum vegeta manebunt. Sed ut intermedio tempore ad vsum promuntur, statim ad solem producta, quum senserint eius calorem, aperta panduntur.

De

ANTIQUA
illa, de
curantibus con
quum eius esse
prum celare cup
flore eiuſdem
exprimens: nam
scit, ut bos, cād
10 Græcis *λευκί
lea & purpurea,
Latini violam, q
ri possunt, ab lo
Neapolitanis
ut diximus, de l
dixeris. Ad han
gilius vixit Neap*

Al
Nam quum
10 rustica compar
ligustri flos est
stirurus, caduc
grā, ad coronas
flos fuerit. Sub
violam intellexit
in quo alii, erro
fles sunt, quas
dem coloris. Id
Sum

10 Sed nescio c
distorqueant, q
thum dixerint,
esse, auihore in
cinio loquatur
quentis, quod
versus, quos a
Vi
Sed
Quum The
40 ut mox videbin
tio, & Virgiliu

ANTIQVVS post rosam, & lilium proximus honos violis fuit, ideo post illa, de violis tractabimus. Nec solum coronamentis, sed etiam aluearia curantibus conueniunt. Putant Græci Io puellam, quam Iuppiter adamabat, quum eius esset compressu grauida, ne à Iunone probris incesceretur, cum stuprum celare cuperet, ab eo in iuuenem mutatam fuisse. Terra Ioui gratulans, florem eiusdem nominis bouis pabulum fuisse dicitur, puellæ conditionem exprimens: nam viola ruffa, vt virgo pudore perfunditur, purpurea putrascit, vt bos, cædida candicat, vt in sydus relata, atq; vt fecunda humi germinat.

10 Græcis λευκοία, & si nomine ipso albam violam significat, pro lutea, carulea & purpurea, siue nigra semper capitur. Columella candida leucoia dixit. Latini violam, quasi vitulam, detrita t littera Græca imitatione appellasse videri possunt, ab Io vitula, siue vacca in illum florem conuersa, sic etiam vaccinia. Neapolitanis *sior di vacca* & *sior vaccino*, in quo etiam nomine prisca fabulæ, vt diximus, de Io in vaccam mutata relucet vestigia, quasi vaccinum florem dixeris. Ad hanc fabulam, & vulgare nomen Virgilianus Corydon (nam Virgilius vixit Neapoli, & mortuus est) allusit, vocando hos flores vaccinia:

Alba sinistra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

Nam quum se negligi ab Alexi videret, (nam fuscus erat) facta amatoria, & rustica comparatione inter duos fibres ligustrum album, & vaccinia nigra, ait, ligustri flos ersi albus, pastoribus intactus, arescere incipiens, ac humore destitutus, caducus labitur, vnde vilissimus habetur. Contrà vaccinia, & si nigra, ad coronas texendas, decerpuntur, & in pretio habentur, vt coronarius flos fuerit. Subscribit nostro iudicio Seruius grammaticus, nam per vaccinia violas intellexit, quas purpurei coloris esse constat. Sed ne aliquis in eundem, in quo alii, errorem impingat, scito violarum duo esse genera, aliæ enim sessiles sunt, quas posterius describemus, aliæ autem leucoi: utraq; enim eiusdem coloris. Idemq; expressit Virgilius,

Sunt & viola nigra, & vaccinia nigra.

30 Sed nescio cur Hermolaus, & eum sequutus Ruellius Serui opinionem distorqueant, quum ipse vaccinia purpureas violas esse dicat, ipsi verò iacinthum dixerint, conanturque persuadere Romanorum vaccinum iacinthum esse, authore in spuris nominibus Dioscoride: quum ignorent de quo vaccinio loquatur Dioscorides, ac Plinii testimonium adferant de vaccinio loquentis, quod seratur ad ancupia, & ad vestes seruorum tingendas. Theocriti versus, quos alii adducunt, contra eos sunt,

*Viola nigra est, & inscriptus iacinthus,
Sed tamen in coronis in primis leguntur.*

40 Quum Theocritus de poetico iacintho loquatur lilii forma, & inscriptio, vt mox videbimus, non de Dioscoridis iacintho loquitur de quo est contentio, & Virgilius Theocritum imitatus est, non interpretatus.

Descriptio.

Theophrastus ita depingit: Suffrutex leucoion est, lignosis nimirum radicibus surgens, flore odoris iucundi, reliquis partibus ignavis, cuius rationem in rosis reddidimus. Florum prima ver nunciantium, tepentibus verò locis, ante exactam hyemem emicat. Vita ei longissima à trimatu est, ab eo enim tempore senectam sentiens degenerat, ac incanos senio fert flores. Cæterum debilius odor ut fugax, ita celeriter evanescit, ut leucoia, viridia enim à longe gratum odorem iaculantur, sicca non nisi propius admota. Ratio quia iam durata vernaculi caloris inopia, halitum efflare nequeunt. Apud nos cubitali profilit altitudine, ramosa: folio molli, canescente, & potius à foliorum canitie, & cineritio colore leucoion dictum, quàm à floribus albis. Flore quadrifolio, semine foliaceo, quod tenuibus quidem, sed quincuncialibus siliquis continetur. Inter duo tegmina siliquarum sepimentum aliud habet, separatq; hinc inde semina, ne se inuicem contingant. Post triennium senescit, & desciscit in flores, albis lineis interlitos, post dimidiatos albos, demum pallescentes.

Genera.

Theophrastus genus variari liquido dixit. Dioscorides quatuor genera facit, sola florum diuersitate inter se differentia, quoniam candidum, luteum, purpureum & cæruleum fert florem. Purpureum & album genus simile est, frondibus & arbore, tamq; sunt visu grata, ut à mulieribus in stictilibus fenestris alantur, omniumq; manibus verno tempore versentur. Luteo verò folia oblongiora, numerosiora, & nigricantia, ut flos odorata. Plinius sylvestres & sativas dixit. Earum plura genera, purpureæ, luteæ, albæ. Sed sativas maxima autoritas luteis. Genera ius Tusculana, & quæ marina appellantur, folio aliquanto latiore, sed minus odorato. In totum verò sine odore, minutoq; folio calathiana, munus autumnii, cæteræ veris. Apud nos lutea maceris, & muris ædificiorum familiaris hæret, licet quoque hortis vbique altis, habitu & statura humiliore, viridiores folio, flore minore, vehementi tam spirat odore, ut caput feriat. Cærulea quæ sit apud quemquam non constat. Plinius eius non meminit, neq; Paulus, neque Aetius, qui Dioscoridem transcribunt, nisi pro cæruleo colorem intellexerit, maximè purpureum, ut ad cæruleum vergat, nam inter purpurea genus est gratissimum coloris ad cæruleum vergentis.

Cælum.

Cælum apricum desiderat, nam locis tenuibus & admodum sitientibus, ubi cælum vehementer feruet, minus odorata sentitur, quum nimium resicceatur. Montibus longè deteriores proueniunt Theophrasti autoritate. Varro aprico loco feri præcepit.

Solum.

Pingue querant solum, & repastinatum, ex Columella.

Satio.

Semine feri Theophrastus dixit, quum eorum radices nimium lignosæ sint. Tempus ferendi ut plurimum, autumnus. Hæc enim primum feri nimirum properant, cæterum vere etiam ferantur. Leucoion, ut Tarentinus scribit, purpureum, luteum, rubrum post idus Martias plantantur, & post calen. Martias albu, sulcis feritur, transfertur à Ianuario, usque ad idus Februarias. Columella

mella ita ferere d
stinatam minima
nas scrobiculis pe
violæ sicut oleru
Theophrastus è l
las, aliæ suffrut
Columella col
tur, ut interdum

De le

NON est, ut
à Dioscori
tribuet, & suff
apud Theophr
Septimo enim li
florere post nar
Habet enim hoc
bulbos prodeur
incurum, in qu
odorem referen
punt, in quibus
prilis calce tabes
& ubi clementi
cis. Matthiolus

VOLENTES
bemus, &
re crapulam, &
Sed Athenæus
hementi odore
30 de hac sessili, au
quod vehemen
& suauis, sed bre
esse, quàm illor
rectores volu
feruere fac
& inde manib
ratâ, & ex ea
Theophras
orgicis 100 dict
40 muneris deder

mella ita ferere docet. Violam qui facturus est, terram stercoreatam, & repa-
stinatam minimum alte pedem in puluinos redigat, atque ita plantas hornoti-
nas scrobiculis pedibus factis ante cal. Mar. dispositas habeat. Semen autem
violæ sicut olerum in arceis duobus temporibus feritur, vere, vel autumno.
Theophrastus è supernis etiam partibus nasci scripsit, vt silymbrium, serpil-
lus, aliæ suffrutices.

Columellæ coli eodem modo, quo & cætera olera, vt runcetur, vt sarrisa. *Cultura.*
tur, vt interdum etiam rigeretur, scribit.

De leucoio altero bulbaceo Theophrasti. CAP. VIII.

NON est, vt putat doctissimus Fuchsius diuersum Theophrasti leucoion
à Dioscorideo, & à communi, quum Dioscorides lignosas radices ei
tribuerit, & suffruticem dixerit, & Theophrastus bulbaceas: nam duplex est
apud Theophrastum leucoii genus, & lignosas radices habens, & bulbaceas.
Septimo enim libro inter bulbacea bulbacei leucoii meminit, & libro sexto
florere post narcissum dixit bulbi florem, quem quidam coronariis inserunt.
Habet enim hoc folia porro similia, tenuiora tamen & molliora, & radice
bulbosa prodeuntia, pediculum etiam profert dodrantalem, tenuem, ac ferè
incuruum, in quo candidus flos est, in medio croceus, purpurearum violarum
odorem referens, quo decedente capitula nucis auellanae quantitate erum-
punt, in quibus semen sinapi haud dissimile continetur. Februario floret, A-
prilis calce tabescit, ac semen capitulis ostendit. Emicat vbi cælum apricum,
& vbi clementius fuerit, citius floret, prouenit enim syluosis & vmbrosis lo-
cis. Matthioli inter narcissi species locat.

De viola. CAP. IX.

VIOLE nigra in coronis audissimè expetuntur, vt ab Theophrasto ha-
bemus, & eum imitato Athenæo, tū sua pulchritudine, tum suavi odo-
re crapulam, & capitis grauitatem corollis impositis, olfactuque discutiunt.
Sed Athenæus in comperationibus inutilem è violis coronam dicit, quòd ve-
hementi odore caput feriat, vt etiam ex lauro, & amaraco. At Athenæus non
de hac sessili, aut nigra viola, sed de leucoio loquutus est, & præsertim luteo,
quod vehementissimè olet. Icesius leucoia præstantissimum odorem iacere,
& suauē, sed breuissimo tempore, & idem de viola nigra dicit, sed huius odorem
esse, quàm illorū gratiorem. Vitruuius docens purpureū colorē facere, quum
rectores volunt silaticum imitari, violā aridam coniicientes, cum aqua con-
feruescere faciunt ad ignē, deinde quum est temperatum cōiiciunt in linteum,
& inde manibus exprimentes recipiunt in mortarium aquam ex violis colo-
ratā, & ex ea eretriā infundentes, & eam terentes, efficiunt lilis attici colorem.

Theophrastus *μελάγιον* vocat à nigricante purpuræ colore. Nicander in Ge-
orgicis *ἰον* dictam Græcis putat, quod quædam Nymphæ Ionæ Ioui primum
muneri dederint. Versus sunt:

Nomen.

*Ionides nympha puram ac renidentem corollam Ioni
Texere, quum cuperent, in Pisa hortis,
Et terra flores peperit: tum autem Ion cum canibus venatus,
Suorum membrorum sordes abluebat in Alpheo,
Ad vesperam cum Iaconibus nymphis dormiturus.*

Plinius folas Græco nomine à cæteris discerni dicit, appellatas ia, vt ab his ianthina vestis. Columella sarranas violas vocat, vnde sarrana purpura. Latini violas dicunt, vulgus quia ramis caret, sessiles, siue loripedes vocat. Itali viole.

Descriptio. Theophrastus violas ita describit. Humilis est, latiore folio, statim ab radice multa exeunte, sineramis, perpetuo virens. Flos eius duplex: nam in flore alterum florem medium insidentem gerit. Floret post vitifloram ante iacinthum. Odorem longinque halat, propius hebescit, cuius rationem reddit libro de causis, quòd ad remotiorem locum merus odor, sincerusque defertur: manant enim à cæteris partibus herbæ nonnulla, quæ permeare longius nequeunt, quòd terrena, crassioreque constent natura. Vetustate flores fiunt inolidi. Ratio est, quum debilius odor fugax sit, ita celerrime euanescit, ac vernaculi caloris inopia halitum efflare nequeunt. Flos olet, planta minimè. Aristoteles in problematis quærit, cur odores aliquorum florum, & suffimentorum è proximo minus suaves spirant. An quòd portio terrena vnà cum odore se defert, quæ vt in proximo mista vim hebetat, sic in longinquo purior defertur? Hinc etiam flores contusi suum odorem amittunt. Nicander humi iacentes vocat.

— Humi iacentes violæ,

Quas colligebat atra Proserpina.

Dioscorides, Folio minore, tenuiore, nigriorique, quàm hedera. Stylus à radice medius prosilgit, & in eo flosculus, suauiter olens, purpureus. Flore bipericli. Plinius. Floret primò viola alba, postea quæ appellatur purpurea. Ex his verò quæ sponte apricis, & macris locis proueniunt, purpureæ, latiore folio, statim ab radice carnosa exeunt. Sed Plinius perperam ab radice carnosa Theophrastum interpretatus est, nam de foliis non de radice protulit. Addimus nos. Semen minutum in folliculis, vasculisque rotundis, extrema ferè æstate producens.

Genera. Syluestres specie, nec aliam generum differentiam nouit Theophrastus, immo quòd syluestriores, eò odore præstantiores: nam quum odor ex humiditate, & siccitate exoriatur, quumque viola non multum alimenti desideret, quum satis ex se habeat, his locis moderatur: quam obrem genus satium suæ alimonie copiam excoquere nequit, & hinc fit vt cinerem alii congerant, alii respergant. Vidimus ex his luteas, pallidasque.

Solum.

Colum.

Opacis & asperis Dioscorides nasci dixit. Odoratissimæ quæ apud Cyrenem nascuntur, Theophrastus dixit, & pròinde illic vnguentum suauissimum

mum

nam faciunt. Montibus longè deteriores exeunt. Athenæus ab eo. Præstantissima odore Cýrenis, quam obrem suauissimum illic vnguentum, & eximius odor.

Tarentinus post idus Martias, & calendas Maias plantari iubet. Nascitur vitis modo è supernis, quasi è puppi dicas, non prora: ex Theophrasto.

Quæ locis apricis, & circumseptis satæ sunt, assidue ferunt, & si certo genere colatur, perpetuo viret, & toto anno ferre sponder. Theophrastus. Adificimus nos: si fictilibus vasculis colatur, hyemes, æstusque vitabimus, ferenis diebus hyeme soli ostendendo, æstu umbra, & aquationibus adiuvando, quantum fieri possit. Varro in fundo violaria facere non esse utile dixit, ideo quod necesse est à terra ad ea obruenda puluinos fieri, quos irrigationes, & pluviæ, & tempestates abluunt, & agrum faciunt minorem. Tradit idem Theophrastus violas iuxta cape, vel allium satas fragrantiores fieri, cuius rationem reddidit in rosis. Plutarchus ubi ea recitat commoda, & utilitates, quas ex inimicis consequi possumus, dicit nos fieri vigilantiores ad vitia declinanda, & ardentiores ad capeflendam virtutem & illustriores, atque id violas capis infitas optime hieroglyphico demonstrare posse.

De viola flammea. CAP. X.

MEMINIT & alterius violæ coronariæ, flammeæ dictæ, Theophrastus: flores namque tricolori elegantia variegatos profert, ut venustas eorum oculos longe alliciat, blandiaturque.

Theophrasto φλόξ, & φλόγιον dicitur, Theodorus flammeam vertit. Plinio quoque phlox dicitur. Italis *viola di tre colori*. Aliqui iaceam vocant.

Theophrastus vere nonnunquam cum viola alba, vel post lilium exire dixit, sylvestris duntaxat, nam cæteris omnibus, quibus coronarii utuntur, longè præcurrit. Plurimum durat. Sine odore. Plinius, Colore tantum placet Iovis flos, odor abest, sicut & illi, qui Græcè phlox vocatur. Florum prima viola alba, post purpurea, postea flammea, quæ phlox vocatur. Nos hanc violam putamus esse, quæ in flore triplicem colorem ostendit, candidum, luteum, & caruleum, videturque non potuisse decentiori vocabulo à Theophrasto nominari, quàm flammea, quum in lucernæ sive lignorum flamma, terni eiusmodi colores conspiciantur, caruleus in imo, luteus in medio, candidus vel rufus in cacumine, ut & in iride cælesti. Sunt ei folia oblôga, modicè per ambitum serrata, caulis angulosus, geniculatus, flores longiusculis pediculis pendentes, triplici colore donati, radiculis fibrosis, plurimum florens durat.

Theophrasto sylvestris tantum, ex Plinio. Apud nos duo videntur genera: alterum maius, alterum minus, in cuius flore bini conspiciuntur colores, caruleus, & candidus, aut luteus, & candidus.

Seritur semine ex Theophrasto: & colitur, ut cætera quæ diximus.

ANTE QVAM È violis discedamus, de iasme dicemus, et si odoris & similitudinis non nihil nancisci videtur, nomen tamen odoratam violam resonat, & si veteribus frutex hic ut arbitror fuerit incognitus, volumus tamen in coronatio hoc nostro horto: eleganter vireat, & latè loca suo suavisimo odore repleat. Frutex hic harundineos parietes, hortorumque testudines, & concameratos sinus topiario opere conuestit: hic apibus gratissimum fert florem, quum ad eum avidissimè aduolent apum examina: hic vnguentariis sua odoris iucunditate maximè est expetitus & oleo conficiendo, & odore chirothecis conciliando.

Nomen. Quamquam Græcis indictum existimetur, Græcam tamen eius nomen videtur originem subolere: iasmes, quasi odoratam violam dicas. Sunt qui dicant iosmenon, apiariam, quod eius flos apibus gratissimus existat. Mauritanii zambac eorum lingua dicunt, & ieseminum. Neapolitani has voces imitantes *gelsomino* vocant.

Descriptio. Frutex attollitur sambuci caudice, sed procero, flagellis sequaci lentitia flexibilibus, foliis septem ex vno pediculo prodeuntibus, in viridi nigricantibus, oblongis, in mucronem sed languidum illico properantibus, lentisci magnitudine rosacei, sed angustioribus, floribus in caulium summitate racematim prodeuntibus, candidis, quaternis, quinis, vel senis foliolis constantibus, præcipuè suauitatis, Maio, & Iunio florentibus.

Genera. Duo primum iasmes fastigia, sylvestre & satium. Sylvestre tria etiam genera continet, colore differentia, alba, lutea, & cærulea: alba passim conspicua, lutea habemus, sed inodora, & dissimili frutice nascentia, cærulea videre non contigit, et si Babylonico agro, & Aegypto, & in oriente vulgaria esse dicant. Satium florem longè maiorem habet & diuiniore odoris, Augusto, Septembri, & interdum tota hyeme placida florens.

Calum. Calidos, & amœnos tractus amat.

Solum. Solum pingue, & humidum, proinde æstate rigationibus, hyeme siccitate foueri debet.

Satio. Semine non nascitur: nam non perficit, sed suis plantis seritur: nam fecundissimè sibi oleoscit. Seritur & propagine, nam prælongis suis caulibus sustinere non valet, nec ut vitis clauiculas, aut hedera radículas habet, quibus alteri hereat, vel amplexetur, unde caducus prorepat, & ubi terram attingit, ibi rubi more radicatur. Vel prosternitur planta: more vitis, & post annum, ubi radices iniecerit, transplantatur. Serendi tempora vere, & autumno. Sylvestre seritur suis flagellis vel taleolis, melius tamen si in calce aliquid veteris inhaerit.

Institio. Satium in sylvestre inseritur fuso ligno, mense Martio, & optimè apprehendit. Nos Iulio, & Iunio inoculamus, in eodem anno comprehendit & 40
flores.

flores fert. Sunt qui in vitabulam inferi dicant. Nobis non successit. Luteum dicunt procreatum ex insitu genistæ, à nobis multifariam probatum est, & lusi experientia.

De flore caryophyllorum odoris. CAP. XII.

Nunc de eo flore noster erit sermo, qui ab insigni caryophyllorum odore à nostris caryophylli dicuntur: quum illius veterum nemo, quod sciam, meminerit: etsi sylvestres in montibus & sylvis latè florescant, vnde dubitatur vtrū illis fuerit incognitus. Nos inter coronarios flores reposuimus, quum rosis pulchritudine, amplitudine, & varietate inferiores minime videri possint, immò cum eis de principatu vsque ad victoriam certent. Rosa ad marcescentiam concitè properat, longissima enim decerpæ dies mora, venerem, decusque facile deperdens, huic diuturnior mora, supra triduum vita, vigorque durat, aliquibus præterea magnitudo tanta inest, vt orbis vtramque manum compleat. Superat & colorum varietate. Sunt albi, rubore misti, nudam carnem referentes, *incarnati* dicuntur. Sunt vermiculati, qui candidi sanguineis venis distinguantur, rufi, vinei, dilutius purpurascens, aut intensiore virore nitentes, sunt & punctorum purpureorum aspergine versicolores. Sunt quibus foliorum luxuriam calyces capere nequeant, at à latere rumpantur. Et cum cæteris floribus menses sua, vel sesquimensura sit duratio, ii vernas, æstivas, autumnales & hybernas coronas replent, nec nisi sesquimense silent. Et si nostra ætas coronarum usum aboleuit, nunc manibus omnium ferè iuuenum, & magnatum continuo gestantur, neque viridaria, vel in fenestris edium hortuli pensiles, vel scitilia vasa visuntur, quæ his non scateant.

Recentiores ab insigni, & suauicaryophyllorum odore, quem halant, caryophyllos dicunt, Fuchsius veronicam alteram Plinii vocat, alii cantabricam.

Caulibus assurgit sesquipedalibus, teretibus, geniculatis, foliis ex singulis geniculis binis, porraceis, oblongis, angustis, incuruis, & per extremum mucronatis, colore caesis, floribus omnium speciosissimis, caryophyllorum odoratu, sed longè odoratissimo, calathis teretibus, longiusculis, orbiculo superiore denticulatis, à quo quina, senave folia prodeunt, lente quidem fimbriata, & interdum vicena: geminis vtrinque emicantibus stamineis apicibus, radice promissa, simplici & geniculata, semine in calathis minimo.

Species primum duæ, sativa vna, altera voluntaria & fera. Hæc maceris familiaris, vel petreis montosis, sponte natura crescit, cuius species duæ colore discernuntur, candidis & purpureis floribus, parvis, oblongis, per ambitum magis dissectis, in odoris, in calycis medio sui complexa caruleos apices, nec à sativa nisi feritate dissidens. Vidi Neapoli, & vasculis colui, quinis foliolis, adò dissectis, vt capillacea viderentur: in foliorum umbilico varietas incundissima colorum conspicua, ex auro, cæruleo, albo, & purpurascens, vt pavonum petala, & caudæ colorata. Caulis iunceus, folia, & genicula, vt sylvestrem habi-

tum referret. Modici, sed suavis odoris. Sativa licet à priore oriunda, cultura diligentia latius affurgit, colorum varietate diuersificatur. Flos enim alter cocco rutilat, alius saturatus nitet purpura, alius emaculato blanditur colore, alius versicolori variegatur mistura. Est & in foliis differentia, nam alii constant leuiter fimbriatis, alii profundioribus incisuris crenantur, alii paucioribus, alii numerosa foliorum serie stipantur, vt quum fuerint prorsus explicata radiantem orbem concinnent. Sunt & trifero prouentu, vt qui flores continuo gerant. Præterea quorundam flos mirabili cultura ratione, dehiscente alabaistro, in ipso staminum loco alterum alabastrum ostendit, pandentem se paulo post in florem, cauliculo priore consenscente. Apuliæ Baroli vi-

Cælum. Cælum gaudet aprico, & sole illustrari, vnde et si locis à frigore tutis seruetur, hyeme tamen si frigida, continuè profert flores.

Solum. Et solum pingue, vel fimo saturatum, & humidis, vel continuis rigationibus adiutum amat.

Satio. Semine feritur. Calidissimis locis, vt in Apulia semen perficit exiguum, nigrum, oblongis in vasculis clausum. Sed ad agrestem naturam redit, & mirabiles diuersitates efficit. Si seras rubrum, album producit, & vermiculatum, vel eodem in palmitum album, rubrum, & mistum florem. Sed frequentius auulsiōne feritur. Mulieres enim (muliebre est opus) ineunte autumno vel vere, sobolem à radice copiosam, in patulis fistilibus, vel turbinibus cadorem in terram pingui latamine saturatam pangunt, & quum hyemis gelicidia increverint, recondunt sub tecta, quum sol illuxerit, vel cælum serenat, reuocant in apertum, & illuc sinunt apricari. Si pluuia inceserit, cælestem pluuiam haurire sinunt, vnde cellis vinariis & fruticare, & flores interdum parere potest. Qui in arcis pangunt, per hyemis frigora latamine muniunt, quo ab iniuria gelantis cæli seruari possint.

Cultus. Maximis astibus aqua saturari, frigoribus verò fimo oportet. Sæpius diuellere, & plantare: nam si diutius steterit, vt de violis leucois dixit Theophrastus, degenerat, & syluester euadit, continuò flores minores profert, minus odoratos, & ex rubro, interlitos albis venis, demum ex toto albescentes.

Ars. Refert Matthioli seminibus diuersorum florum simul constrictis effici posse, vt versicolores nascantur, sed id sine doctrina, & experientia scripsit, fieri enim non posse demonstrauimus. Facilius id fieri potest, radicibus dimidiatis, & sub terra propagatis, donec vniantur. Et hoc modo factum est, vt anno vno florem candidum, altero purpureum, tertio colorum varietate promiscuum, & quod mirabilius videtur, ramulus idem nigrum, rufum, & vermiculatum proferat florem. Oligores factis stylo foraminibus in radicibus Indicos cariophyllos adegisse creduntur, quo illorum odorem flores alliciant, & naribus representent, vt ex syluestri herba, & flore minus odoro nouitatis studiosi odoratum florem talilenocinio mentirentur. Vt hyeme continuò flores

flores promat,
noua promend

N Arcissus
puellis ma
peries in Græco
pha filius, sui co
quis propriam in
suam nesciret à
rem sui nominis
tem in tenui cor
ram, quæ anim
plexari arcissus
catus interit, q
narcissos carpe
Plutone. Coarg
serpinam multi
ladius narcissum
Theophrast

num vocant. Q
latione comple
tū cenfer, quod
odore enim est
narce dictum pu
Theophrastus o
de progressus, r
chus Corcyra
sum, tradit. Et
cit, quod scilicet
Apuleius au
rat suo semine.

Plura sunt
multopla no
descriptione. N
foritur, vt cre
lium. Ter flor
cundo median
ptat, fructum
quod non an
large emittens
non est squam

flores promat, æstate germina decutunt, dum calyculos ostendunt, sic enim noua promendo, seram maturitatem vsque ad hyemem retardant.

De narcisso. CAP XIII.

NARCISVS fert florem pulchrum, & odoratum, quem dat coronis, puellis maximè expetitur, quo se coronent. Narcissi fabulam talem reperies in Græcorum monumentis. Fuit & ipse Cephei amnis, & Liriopes nymphæ filius, sui corporis forma excellenti à multis nymphis fuit adamat: in aquis propriam imaginem conspiciens, ac sui amore irretitus, quum vmbra suam nesciret à se distinguere, eam amplexando perit, & contabuit, & in florem sui nominis conuersus est. Hoc inuolucro innuentes Poetæ adolescentem in tenui corporis fluxu vmbra propriam inspexisse, id est corporis vitam, quæ animæ idolum est, eam quum is perinde ac veram, puramque amplexari arctius festinasset, id est quum vitæ corporeæ totus inhaesisset, praefocatus interiit, quum animalem per inscitiam amisisset. Theocritus Europam narcissos carpentem cecinit. Proserpina etiam dum narcissos legeret, capitur à Plutone. Coarguit hanc fabulam Pamphilus Poeta vetustissimus, quum Proserpinam multis annis ante, quàm Narcissus esset, à Plutone raptam dicat. Paladius narcissum apibus gratum dixit.

Theophrastus *νάρκισσος*, & *λείριον* vocat: vt ipsemet testatur. Narcissum alii *lirium* vocant. Quod etiam Iulius Pollux annotauit: Et Homerum *lirii* appellatione complecti omne genus florum dixit. Plutarchus in Sympliciis ita dictū censet, quod neruos heberet, membrisq; torporem sensus sopiens afferat: odore enim est tam acuto, vt sapius odoratus, caput tentet ac feriat. Plinius à narce dictum putat, caput grauante, non à fabuloso puero illo. Athenæus ait, Theophrastus de plantarum historia dicit, narcissum etiam dici leirium: deinde progressus, tanquam inter se discrepent, vtrumq; seorsim nominat. Eumachus Corcyæus in Rhizotomico, & acacallidem, & crotalon vocari narcissum, tradit. Et Sophocles magnum deorum terrestrium coronamentum dicit, quod scilicet defuncti, & morte torpidi, torpido flore meritò coronentur. Apuleius *αὐτοφυῆς* vocat, id est à se ipso genitum, quum sese ipse propaget, & ferat suo semine. Latini narcissum vocant. Itali *narcisso*.

Plura sunt narcissi genera. Multa Theophrastus, multa Dioscorides, & multo plura nostra obseruant ætas. Ordine recensēbimus. Ex Theophrasti descriptione. Narcisso folium angustū, frequēs, & pingue, caulem tantū floris fortitur, vt crocum. Mirum quod caulis, & cum eo flos erumpit antequam folium. Ter floreudo, tria sætionum tempora demonstrat, primo primam, secundo mediam, tertio nouissimam. Quum senuerit, foliorum exortum incepat, fructumque inconspicuū parit, quia caulis cum suo flore emoritur, quod non antequam reflorescat cernitur. Germinat post scillam, folium largè emittens. Radix neque parua, neque magna, bulbo affinis, nisi quod non est squamata. Vere post leucoion, & phloga floret. Alterum ita describit.

Narcissus folium albucii habet, terræ proximum gerit, sed latius ut lilium, caulem sine folio herbaceum, in cacumine florem ferentem, in membrana, seu vasculo inclusum, ampliusculum, nigricantē, oblongum, qui decidens sponte germinat, præsertim defixus in terram manu. Seritur & radice ampla, carnosa, rotundaq;. Serotinus admodum, post Arcturum, & circa æquinoctium florens. Alibi habet. Narcisso folium angustum, frequens, & pingue. Huius serò florentis meminit Virgilius,

— Nec sera comantem

Narcissum, aut flexi tacuisse vimen acanthi.

Dioscorides tria genera descripsit, duo calycis colore differentia. Vni enim intus croceo, alteri purpureo. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis vacuus, & sine foliis, supra dodrantem attollitur, intus croceus, in quibusdam purpureus. Radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica, nigrum, longum. Cæteri porrum imitantur, atq; herbaceum virus olent. Purpurei narcissi meminit quoq; Virgilius, lutei Ovidius. Virgilius,

Pro molli viola, pro purpureo narcisso.

Ovidius,

*Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem
Inueniunt foliis medium cingentibus albis.*

Plinius à Theophrasto. In coronamentorum genere narcissus: nam ter floret, primoq; flore primam arationem ostendit, medio secundam, tertio nouissimam. In Italia floret post rosam. Narcissi alterum genus flore candido, calyce purpureo. Differentia à liliis hæc est, quòd narcissis folia in radice sunt. Tertio generi cætera eadem, calyx herbaceus. Omnes serotini: post arcturum enim florent, ac per æquinoctium autumnii. Croceus narcissus apud nos floret, adeò fragrantissime odore, ut sæpius odoratus caput feriat & tentet. Sed hic primò vere floret, non ter, ut dicit Theophrastus, nec possibile videtur, ut ter eodē caule florere possit. Sed verisimilius est, quòd ex circa agnascensibus bulbis variis temporibus florent, & vnus putetur.

Colum.

Solum.

Satio.

Dioscorides in montibus nasci dixit. Sed croceum & purpureum, Græci anydros vocāt, id est siccitate gaudentes, nos arenaceis & siccis locis vidimus. Sponte nascitur, & semine seritur, & qui legunt defigere eum solent. Nec simul eodem anno ex iisdem seminibus nascitur, sed partim anno primo, partim secundo. Radice etiam sata proueniunt, extra terram perdurant, ut quæ radice capitata constant, crassa carnosaq; & tunicata, & simul lentitiam quandam habente, denique carnis & succi bonitate vacare minimè debent, ut ad perdurandum valeant, ut lilium. Hæc Theophrastus. Didymus, Martio mensis viuiradix plantari debet, & transplantari.

Art.

Iactant se quamplurimi florum mangones olitores, culturæ lenociniis eiusmodi narcissos posse à pristina effigie deflectere, & in aliam mutare nouā, & visendam, in sitis bulbo seminibus quibusdam, atq; insertis pullulationibus, ut flores

flotes multiplici
da. Vnde nume
ra cancellis clau

CROCUM
desunt flor

Haud minus
ditus. Plinius, in
eum prius crapu
suo defluxu: her
capillamenti mi
merus laudat.

Lot.

Columella cr
la. Idem ab eo P
fabulata est anti
laci hædeta: vt
nis. Quod Ovi

10 Et

Eiusmodi po
vim croci. Vene
est vltus ad color

Græci xpoç
iusmodi sunt cro
xpia hanc, id est
mno Apollinis.

Crocum, ex

sto, ei tamen ad

30 fortitur, angust

do tempus acce

liaty m occasu,

poluit, quin & p

& croci natura

caulem rotun

caule impellit

radix quam fo

re stamina pro

terna, quater n

40 tota astate nu

florēs multiplices producant & foliosos, ad lusus & artis ostenta demonstranda. Vnde numerosissima nunc sunt narcissorum genera, vt non facillē scripturæ cancellis claudi queant.

Decroco. CAP. XIV.

CROCVM flos coronarius, sed ad hybernas coronas venit, tunc quum alii defunt flores. Idque etiam Athenæus annotauit ex Nicandro:

Acanthus.

Haud minus quàm populus, viuaces sunt, diuturnus etiam crocus, vere abditus. Plinius, in coronas venire scribit ad arcendam ebrietatem, & qui biberit eum prius crapulam non sentire, præterea somnum conciliare leui blandoque suo defluxu: herba vsus nusquā fuit in coronis, etenim folio angusto penè in capillamenti modum. Troianis temporibus iam erat honos ei, tres flores Homerus laudat.

Lotum roscidam, & crocum, & hyacinthum.

Columella crocum apud aluearia feri laudat, quòd coloret, & odoret mella. Idem ab eo Palladius, vt herba suauissimi odoris, & floris. Smilax virgo, vt fabulata est antiquitas, ob amorem iuuenis Croci mutata est in fruticem smilacis hæderæ, vt dicemus in hederæ Cilicia, & Crocus puer in florem sui nominis. Quod Ouidius testatur,

Et Crocon in paruos versum cum Smilace flores.

Eiusmodi poëtices philosophiæ inuolucrum nil aliud innuit nisi abditam vim croci, Venereis voluptatibus celebrem. Nostra verò tempestate præcipui est vsus ad coloranda coquinaria condimenta.

Græcis κρόκος dicitur, vel quod κρόκη fila, villosamque tramam significet, cuiusmodi sunt croci stamina, vnde & villi, & flocci κροκίδες dicuntur, vel κροκί τὸ ἐν κρῦς τὰ μέν, id est quòd frigore floreat, ex sententiâ scholiastæ in Callimachi hymno Apollinis. Latini crocum, Itali zaffarano.

Nomen.

Crocum, ex Theophrasti traditione, erumpit folio, etsi ceteris bulbis angustissimo, ei tamen ad vsq; capillamenti penè exilitatem. Cauliculo tamē floris, quem sortitur, angusto. Germine & flore serotino aut præmaturo, vtro scilicet modo tempus acceperis. Floret quippe autumnno statim primis imbribus, Vergiliarium occasu, qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florem obiter expellit, quin & prius. Subest radix multa carnosæ & pernicax. Plinius. Notabilis & croci natura, quod quum omnes herba folium primum emittant, mox in caulem rotundentur: in eo caulis prior intelligitur, quàm folium: flos quidem caule impellitur. Carnosæ radix betæ, at magis etiam nū croco: numerosiorq; radix quàm folium. Addimus, Foliatum crocum humi cubantibus foliis: cū flore stamina prodit aureo cruore virentia, flammeaq; crassiuscula in cacumine, terna, quaternave. Bruma spreis algoribus viret, vere crescit, deperditurque, tota æstate nullibi conspicua. Radice copiosa, viuacique.

Descriptio.

Crocus.

Croci duorum generū meminit Theophrastus, montani, & sativi. Sed prius hebes, posterius odoratum. Idemq; Crocum tam odoratum quam candidum, & spinosum, quæ carent odore. Præterea crocum agreste præstantius olere, quam vrbani. Plinius. Satiuum latius, maiusq; & nitidius, sed multò leuius degenerans, sed nec ubiq; sæcundum. Est & per se genus sativi blandissimum vulgò, quum sit medio candidum: dialeucon vocant. Montanum in Surrentinis collibus videre licuit autumno, præruptis locis, florem sine foliis gerentem, maiorem sativo, sed adeò frondes foris erant nigris maculis, lineis & liquoris asfabrè depictæ, vt nil gratius oculis occurri posset, sed in odorem.

Crocus.

Cælo puro, sitienti q; nec nimium feruido gaudet crocū, quæ ad odorem creandum aptissima sunt: ob id quod apud Cyrenam provenit odoratū consistit inter cetera: ex Theophrasto. Dioscorides optimū Coryceum dicit, è tractu Lyciæ cotermino. Terriū Lycium è monte Olympo, dein Egibus Ætoliæ. Cyrenaicum, & Centuripinum Siciliæ infirmius. Plinius ab eo. Non sæcundum Cyrenis, vbi semper flores laudatissimi. Prima nobilitas Cilicio, & ibi in Corico monte, dein Lycio, monte Olympo: mox Centuripino Siciliæ, aliqui Phlegæo secundum locum dedere: Virgilius Tmolūm Ciliciæ montem laudat,

— non ne vides croceos vt Tmolus odores.

Agrum siccum & tenuem laudat Theophrastus: nam crocum paruo alimento indiget, ob id Cyrenaicum ceteris laudatius. Agreste suavius redolet: nam & sativum suam excoquere alimoniam nequit, & hinc fit, vt cinerem alij congerant, alij respergant. Iuxta semitas & fontes latissimum nasci idem dixit, quando calcari gaudet, & atteri pede, sed temporibus nostris notissimū, & optimū crocum non solum regiones ad Meridiem, sed etiā ad Septentrionem sitæ abundè dant, vt Brutia tellus & Samnium: vt in Aquila Vestinorū vrbe.

Sativus.

Sativus ex Theophrasto radicibus fieri solet. Plinius, Seritur radicis bulbo. Sylvestre ferere in Italia minimè expedit, ad scrupula vsque singula arcis decoquentibus. Mucianus author est, in Lycia anno septimo, aut octavo transferri in locum subactum, atque ita degenerans renouari. Viret bruma, & colligitur. Palladius Februario mense sciendos bulbos monet, & ante satos faciendos. Nos autem hinc ita scriimus:

Tertio vel quarto à satione anno, quum iam bulbi perfectam maturitatem consequuti fuerint, à terra eruuntur, & æstate rota in horreis, vel calido loco reponuntur, substratis herbis, vel tabulis, ne soli humiditate corrumpantur. Deinde vltima Augusti parte, vel prima Septembris in sulcis, pedis intervallo, alter ab altero deponitur, altitudine non plus quatuor digitis sub terra, Maio, Iunio, & Iulio mensibus. Sarritionibus herba tollantur, repastinetur quæ terra, modò ne bulbi sauciantur, inde Augusti, vel Septembris fine herbis mudentur, vt flores facilius colligi possint: demum elapso triennio, vel quadriennio cohærentes bulbi, quibus caput extumuit, seorsum distincti separentur, vt subinde creare novam sobolem possint.

Florem

Florem tunc
magrato colore
quariduo relicto
& valis ad vsu
esse ait. Croci o
vsq; temporis sp
permixta est, ea
exhalatur, & ali
se ipsa recipiunt.
nu crepat, velut
tera probatio, si
vbiq; quod

De flo

Iam ad alter
Iam non od
altius, mox au
tiquitus nece
tium auspici
beant apes, vno
ci & fabulosi
tribus est florib
ita vt silens pub
cis pulchrè not
rūpere. Quo in
cintum pueru
Græcis vānū
nari dixit, vt in
Dioscorides
30 digito tenuior
rum plenam, r
terolam, pluri
flexis, caule læ
congesti am
comolam vno
purpura suau
Columella
caruleos hya
In Gallia
40 num tingitur

Florem tunc meti debere, Florentinus est author, quum media florum stam-
ina grato colore nitent, & nutant: detractis à medio flore capillis, triduo, aut
quadriduo resiccatis, cacumē croci repurgatur, & si quid albi ha sit detrahitur,
& vasis ad vsum reconditur. Diophanes in umbra siccandum, & refrigerandū
esse ait. Croci odor, ait Theophrastus, tam acris, & validus est, vt ad quoddam
vsq; temporis spatium odoratus reddatur: nā terrenæ parti vis quā dā aquosa
permixta est, eaq; siccatur, inueteraturq; vnā, & quantum aquosi humoris est,
exhalatur, & alimenti cessat actio, & quādam veluti concoctionis aliquid per
se ipsa recipiūt. Plinius. Adulteratur nil aequē. Probatio sinceri, si impolita ma-
nu crepat, velut fragile: humidum enim, quod euenit adulteratione, cedit. Al-
tera probatio, si manu prolata ad ora leuiter faciē, oculosq; mordeat. Optimū
vbicunq;, quod pinguisimū, & breuibus capillis, pessimū verō, qd sitū redolet.

De floribus non odoratis coronariis, & primum de hyacintho.

C A P. XV.

IAM ad alteram diuisionis partem deuentum est, scilicet florum coronario-
rum non odoratorum. Ordinē hunc sequemur, quod primo vernos, dein de
æstiuos, mox autumnales, & demum hybernos dicemus, vt etiam coronæ an-
tiquitus necēbātur, & in coronas à montibus petebantur. Ab hyacintho in-
itium auspicabimur. Palladius hyacinthum nutrire in hortis monet, quo ha-
beant apes, vnde mel colligant. Duplicis hyacinthi veteres meminere, histori-
ci & fabulosi: prius de historico siue medico, in sequenti de fabuloso. Vnus ex
tribus est floribus, quos laudat Homerus. Pueris illita radix, eos mangonizat,
ita vt silens pubertas non erumpat. A Dioscoride Plinius, Mangonicis venali-
ciis pulchrē nota, quæ è vino dulci illita, pubertatem coerct, & non patitur e-
rūpere. Quo inuolucro Poetæ Apollinem semper imberbē figurant, & Hy-
acinthum puerum, vt in sequenti capite declarabitur.

Græcis *ὑακινθός*, Latinis hyacinthus, Dioscorides Romanis vaccinium nomi-
nari dixit, vt in leucoio dictum. Neapolitanis, *cepolla seluaggia*.

Dioscorides ita pingit. Folia fert bulbi, caulem dodrantalem, leuem, minimo
30 digito tenuiorem, herbacei coloris, comam procumbentem purpureorū flo-
rum plenam, radice bulbacea. Theophrastus vere florere dixit cum violis, an-
te rosam, plurimumq; durare. Addimus. Prouenit foliis porraceis, in terrā re-
flexis, caule læui, albicante, quem à summo tenus numerosi flosculi, spicatim
congesti amiciunt, in tantillis pedicellis laudulæ flores imitantibus, supra
comosam umbellam, circinatam, deorsum nutantem efficientibus, ex violacea
purpura suauis rubore permixtam, capacea, quanta narcissi.

Columella duplex genus ponit, album & cæruleum, Nec non & niueos, &
cæruleos hyacinthos.

In Gallia eximie prouenire scripsit Plinius, hoc ibi pro cocco hygi.
40 num tingitur. Color nanque hyacinthinus non solum ex hoc fit hyacintho,

sed ē viola nigra, quæ syluestris hyacinthus quoque dicitur, vnde ianthinum potius, quàm hyacinthinum dicere conuenit.

Satio.

Non feritur, sed campestribus, & syluis sponte prouenit.

De hyacintho Poetarum. CAP. XVI.

FABVLOSVM hunc hyacinthum, quasi poeticum dicas, duplex fabula comitatur, luctum præferens eius, quem Apollo dilexerat, aut ex Aiæis cruore æditi, ita discurrentibus venis, vt literarum græcarum figura a legatur inscripta. Quum enim Aiæ suo se ferro traiecisset, è cruore natum hyacinthum asserunt, ac in foliorum medio cernatur, quarum prior ad Aiæcem, posterior ad hyacinthum pertinet. Quidius metamorphoseos decimo.

Ecce cruor, qui fusus humo signauerat herbas,

Desinit esse cruor, Tyriog, nitentior ostro

Flos oritur formamq, capit, quam lilia, si non

Purpureus colos his, argenteus esset in illis.

Non satis hoc Phæbo est, (is enim fuit author honoris)

Ipsæ suos gemitus foliis inscribit, & ai, ai,

Flos habet inscriptum funestaq, litera ducta est.

Pausanias in Atticis, florem, qui natus est, extincto Aiæ, apud Salaminam editum primò tradi refert, nec hyacinthum, sed florem literis hyacintho similem ex candido rubentem, ac lilio minore fuisse dicit. Idem author tradit eodem andalon dici florem apud Hermionenses, quem ipse hyacinthum interpretari videtur, eo flore coronatos festa, quæ cithonia vocant, agere. Hyacinthus enim puer, quum Apollini carissimus esset, & à Borea adamat, quumq, eum magis in Phæbum pronum Boreas videret, eum disco Phæbus cum puero luderet, discum iactum in eum retorfit, quo vulnere extinctus est: ex commiscratione demum ex humano cruore florem eiusdem nominis protulit. Narrat hanc fabulam Nicander in theriaca, & Ouidius,

Expulit ipse cruor: rubefactaq, sanguine tellus

Purpureo viridi genuit de cespite florem,

Qui prius OEbalio fuerat de vulnere natus.

Litera communis mediis pueroq, viroq,

Inscripta est foliis, hac nominis, illa querela.

Nomen.

Theocrito ἰακύνθος, Theophrasto ἰακύνθον. Virgilio, & Ouidio hyacinthus, Neapolitanis giglio seluaggio. Hunc puto lilium rubrum Plinio dici, quod Greci crinon vocant, alii eius florem cynorrhodon.

Descriptio.

Nos ita describimus. Caule assurgit procero, & folio lilio simili, sed angustiori, & nigriori, circa caulem multo, ante eius exortum nullo flore, summo caule copioso, lilii forma, diuisura & magnitudine, colore rubro ad crocum inclinante, multis exiguis, nigris, quasi punctulis literarum quarundam vel rudimentis resperfo, vt in floribus fabarum ferè similes conspiciuntur. Ra-

dice:

dice bulbosa, e
Qui funestas v
dunt, ininspiciat
in flore fabæ ex
literas vllas, sed
gilius, & Colum
pura in flauum
ferrugineos hya
cinthum à medi

16 Nun
Ac
Ero
Sed tamen in
Etp
Columella,
Syp
Vergilianus
Dic
Insc

10 Quod de Ai
bens lilium put
ferre dicit, herb
rusterni, aur qua
lore perquam cr
lars adnascenti
ueniunt, nisi du
ἰακύνθου nome
nem suam inter
Athenæo. Plin
30 bulbosam, atq;
elium vertit, al
exit. Cuius ver
culosum rosam

Q V M gl
tanis lit
natos flores à
lore. Palladius
mella, vocat iri
40 Theophrast

dicē bulbosa, ex multis nucleis coagmentata, vt lilii candidi, sed minore. Qui funestas verò literas inscriptas punctula illa inscripta non esse contendunt, ii inspiciant quāso Plinium, qui de faba loquens, literas etiam lugubres in flore fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit, in quo tamen flore non literas vllas, sed nigras tantum notulas inspicere licet: non temere igitur Virgilius, & Columella ferrugineum hyacinthum appellant, quum hilari purpura in flauum corusceret, vt ferrugo, quod idem Pausanias docet, & si Nonius ferrugineos hyacinthos caruleos interpretatus sit, ignorans poeticum hyacinthum à medico diuersum esse. Theocritus in epitaphio Dionis.

10 *Nunc hyacinthe loquantur tua litera, & plus ai, ai,
Accipe tuis foliis. Et suauē rubens hyacinthus,
Et viola nigra est, & inscriptus hyacinthus.*

Sed tamen in coronis in primis leguntur. Virgilius,
Et pinguem tedam, & ferrugineos hyacinthos.
Columella,

Syrpiculum ferrugineis cumulare hyacinthis.

Vergilianus Menalca obscurum ænigma proponens Damata, inquit,

*Dic quibus in terris nascuntur nomina Regum
Inscripti flores?*

20 Quod de Aiace, & Hyacintho, qui Regum filii fuerint, intelligit. Hoc rubens lilium puto à Dioscoride hemerocallida vocari. Caulem & folium lilii ferre dicit, herbacei coloris, vt porrum, florecenti caule per singulos exortus terni, aut quaterni erumpunt lilii diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquam croceo, radix magna atq; bulbosa. Notæ omnes præter ramulares adnascencias, ex quibus terni aut quaterni flores erumpunt, huic conueniunt, nisi duæ fuerint hemerocallides, vna apophyses, alia non habens. *ἡμεροκαλλίς* nomen apud Græcos traxisse videtur, quod flos fugax pulchritudinem suam interdū tueatur, nocte verò appetente, languidius efflaceat, ex Athenæo. Plinius addit, Pallidum ex viridi, & molle folium habet, radicem bulbosam, atq; odoratam. Sed Theophrasti hemerocallis, quam Theodorus elium vertit, alia est à prædicta, hæc & ramis & radice lignosa est, & semine exit. Cuius verba interpretans Plinius, ait: Hemerocalles folio coronat, surculosum rosæ modo.

De gladiolo. CAP. XVII.

Q V V gladiolus vere cum hyacintho floreat, & è syluestribus, & è montanis sit vterq; post hyacinthum de gladiolo subnectemus. Inter coronarios flores à Theophrasto annumeratur, purpureo enim is placet floris colore. Palladius eiusmodi florem serendum suadet, quod apes ex eo trahant mella, vocat iridem, vel gladiolum à foliorum similitudine.

40 Theophrastus *ἑρμιον*, & *φάσγανον* idem esse ait, Theodorus illud pugionem, *Nomen.*

hoc ens sem vertit, videturq; eodem autore id nominis nactum, quod gladii speciem foliis præbeat. Dioscorides *μαχαίρον* vocat, & à Romanis gladiolum dici, & si Theodorus pugionem verterit, & segetalem ab aliquibus dici, quod segetibus nascatur. Latinis gladiolus. Italis *gladiolo*.

Descriptio. Theophrastus ita pingit. In caulem nimirum assurgit. Folium ad ensis effigiem, unde ei nomen inditum. Floret cum viola nigra, sed uterque post anemonem, comitatus hyacinthis. Radice rotunda & sine cortice, capillata fibris, ut gethyum. Scolopendræ frequentes in eam herbam conueniunt, mirumque in modum gaudent huius consuetudine frui. Radix dulcis, decocta, & commanducata panificiis, si trita farina miscatur. Germen ab radice laterale producit, quod è semine hoc idem euentissimè facit. Dioscorides addit, quæ Theophrastus omiserat: ad clariorem illius delineationem, ait. Folia iridi similia, nisi minora, & angustiora viderentur, & in gladii speciem mucronata, nervosaque, in caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores in ordinem digesti inter se distant, rotundo semine, radicibus geminis, vna paruum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis, superna habitior, & aduolior. Matthioli Plinium notat à Dioscoride dissidentem, quum gladiolum palustrem dicat, quem segetalem Dioscorides dixerat, non animaduertens Plinium Dioscoridis xiphon, & Theophrasti phasganon, non cyperum describere, quem & gladiolum vocant Theophrastus & Dioscorides: decepti hominem vagum, & multis commune gladioli nomen.

Solum. In aruis nasci Dioscorides dixit, nos autem in copiosis Apuliæ segetibus frequentissimum obseruauimus, flore hilari, saturaque purpura rutilante: qui senis, septenisve foliis constat, ornithogali simili, sed minus repando, aut diuulso, ad vnâ partem verso: geminis bulbis radix constat, quorum superior habitior, & corpulentior interdum, interdumque inferior maior, fibrosa coma, villosa innolucro, fuscoque tecta.

De ænanthe. CAP. XVIII.

OENANTHEM à nostro orto coronario non exclusimus, quum Theophrastus à coronariis floribus non exclusit, vrbani, & verni. Sed ænanthes nomen vagum, nam & florem quoque labruscæ significat, quæ vnam suam ad maturitatem non producit, Dioscoride autore.

Nomen. Græcis *οινάνθη*, ut si vini florem dicas. Theodoro vitifloram vertere placuit ex Theophrasto. Odor germinantis ei vix, unde nomen, ut ex Plinio habemus. Latinis ænanthe.

Descriptio. Natura herbacea constat, flos ei candidus racematim coit, ut labruscæ, odor germinantis vix. Floret post narcissum, ante violam nigram, durare plurimum potest si florem auferas, nec sementescere sinas, nec solum desit aprium. Sicca odoratiores euadit, quod euenit, quum sit terrena & humore copiosa,

pliosa, unde sicca
tit. Oenanthe
dor ei germinan
mus, floribus ca
tis, suauiter qui
Nascitur, ut P
& circumseptum
germinabit, & fl
Idem obseruati

NUNC de
ranthus,
ripaulo post de
rui flores nunqu
nultatemque c
ad solis repercu
mem, cæteraque
tius retinent,
Rex Egypti ob
dat, non in eleg
stimationem &
fundant ex aur
rantho sepulch
listamulum inf
A Græcis, ut
aureus, quod a
quædam, imm
tueatur: & ob
ranthum voca
buat, quas trib
bendum ducit,
ymbis depene
Pœtæ *οινάνθη*
plicata. Sunt
Theodorus T
naus narrat,
men traxisse a
uerit. Latinis
Theophrasti
candidum, fru

pioſa, unde ſiccata odoratior redditur. Quæ habet Theophraſtus Plinius ver-
tit. O'Enanthe maximè durat, ſed hæc ſi diuulſa prohibeatur in ſemen ire, o-
dor ei germinantis vuæ. Nos in Apuliæ campis ſatis hilarè germinantem vidi-
mus, floribus candidis, exiguis, ſtellatis, in ſpicæ aut racemi modum conge-
ſtis, ſuauius quidem halantibus cuiusmodi ſilipendula, floret Maii initio.

Næſcitur, ut Plinius dixit, tepidis locis, at Theophraſtus, Si locum apricum,
& circumſeptum habuerit, cælum mite, & commodè temperatum, aſſiduè
germinabit, & flores pariet: & floridior euadet.

Idem obſeri ſemine dixit.

De helichryſo. C A P. XIX.

N V N C de helichryſo, ſine amarantho loquemur. Duplex enim eſt ama-
ranthus, luteus vnus, purpureus alter: dicemus primum de luteo, dictu-
ri paulo poſt de purpureo: vterque enim illud nomen ſibi adſciuit, quòd eo-
rū flores nunquam marceſcant. E ſylueſtribus floribus eſt, eximium decus, ve-
nuſtatemque corollis aſſerens, tum ſuis tuberibus ampulloſis auri fulgore
ad ſolis repercuſſum radiantibus, tum immortalis floris corymbo per hye-
mem, cæteraque anni tempora durante: nam exiccati aureum colorem diu-
tius retinent, ob id deos eis coronabant, quod diligentiffime Prolemæus
Rex Ægypti obſeruauit, Plinio auctore. Præterea veſtes odore commen-
dat, non ineleganti, & ab animalium noxiſtueretur, & eo flore coronatis exi-
ſtimationem & gloriam parere ſcripſit Theophraſtus, ſi vnguento ſe pro-
fundant ex auro apyro, id eſt ignem non experto. Philoſtratus & ama-
rantho ſepulturas quoque coronari ſolitas aſſumat, idque Theſſalos ad Achil-
liſtumulum inſtituiſſe.

A Græcis, ut Dioſcoride ἐλὶχρυſον, ab alijs ποσύνθεμον dici inuenio, quaſi flos
aureus, quod auream & coruſcam lucem intuentibus vibret. A nonnullis
ἀνδραεινός, immarceſcibilis, ſcilicet quòd diurnam gratiam floribus ſuis
tueatur: & ob id deorum ſimulachra coronet. Galenus, & Paulus ama-
ranthum vocant, Ἄγινετα chryſanthemon, quum huic eaſdem vires tri-
buat, quas tribuit Dioſcorides. Plinius à ſole nomen trahens ἐλὶχρυſος ſcri-
bendum ducit, quod ad ſolis repercuſſum aureæ lucis in orbem, veluti co-
rymbis dependentibus, ſplendeat. Theocritus, & Nicander vetuſtiſſimū
Poëtæ ἐλὶχρυſον vocant: κιστὸς ἐλὶχρύσω κεκοινισμένος, id eſt hedera helichryſo im-
plicata. Sunt qui ab ἑλει, palude, quam deamat, factum nomen exiſtiment.
Theodorus Theophraſtum verè do aureliam vocat ab aureo fulgore. Athe-
næus narrat, Themiftagoram Ephēſum in ſuo aureo libro ſcripſiſſe id no-
men traxiſſe ab Eliochryſe nympha, quæ hoc flore primum Dianam corona-
uerit. Latinis & Italis idem nomen.

Theophraſtus ita ſuum helichryſon delineat. Flos auri modo fulget, folium
candidum, fructus tenuis, & durus, radix tenuis ſummo terræ corio innixa.

Description.

Floret post violam nigram. Dioscorides addit folia angusta, ex interuallis abrotano similia, comam auream lucis in orbem, umbellam rotundam, aridis corymbis dependentibus, radicem exilem. Plinius. Ramulos candidos habet, folia subalbida abrotano similia: ad solis repercussum, auream lucis in orbem, veluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt, quæ omnia ex Dioscoride exceperit. Floret post violam nigram, & syluestribus heliochrysos. Heliochrysos florem habet auro similem, folium tenue, cauliculum quoque gracilem, sed durum. Hoc coronare se Magi, si & vnguenta sumantur ex auro, quod apyron vocant, ad gratiam quoque vitæ, gloriamq; pertinere arbitrantur: hæc ex Theophrasto. Apud nos abundè nascitur cubiti altitudine, foliis abrotani, per interualla digestis in caule, quem rectum, & solidum habet, umbella in cacumine aurea, millefolii, aut eupatorii Mesues, flores diutissimè vigent, & aridi etiam suum colorem seruant. Exucca herba, floresve, ob id decerpti longo tempore seruantur, odor non ingratus. Dioscorides in asperis, & torrentium alueis, & pratis nasci dixit, Plinius in frutetis. Nos in maceris, montibus lapidosis, arenosis, & siccis locis.

De bellio. CAP. XX.

PLINIUS inter coronarios flores bellii meminit, hybernis nascentis coronis, nam hyeme tota floret, & vere.

Nomen.

Græco nomine destituitur, quum Græcis videatur indictus. Plinius bellium vocat. Vulgus margaritas vocat: videntur enim glomeruli illi, è cauliculis dependentes, veluti vnionis, è mediis foliis.

Genus.

Genera multa: nam & sponte nascentia, & urbana. Urbanaq; in varias differentias partiuntur discrepantes colore, magnitudine, & foliorum numero, sine barbularum stipatu dense flore, in plerisq; puniceis & versicolores flosculi, siue flocci spectantur.

Descriptio.

Maiores bellis procerius assurgit, folio non admodum à minori diuerso, altioribus duntaxat crenaturis laciniato, coliculis tenuibus, furculosis, cubitum altis, flore à minori non dissimili, maiore, paucioribus tantum barbulis, & in vniuersum candidis, medium luteum orbem concinne cingentibus. Maio mense floret, quo etiam mense carpi debet. Minor hortensis, syluestri, præter florem, qui rubicundus est, per omnia similis. Constant verò flores ii, interdum simplici, interdum multiplici foliorum contextu. Primo vere apparet, & tota ferè æstate durat. Syluestris Plinio authore flore constat albo, aliquatenus rubente, quinquagenis ternis, interdum etiam quinquagenis quinis barbulis circinato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissimè serrato. Neq; obstat, quòd bellio florem luteum esse tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum, mediumque floris, quod sanè luteum est, respexit.

Solum.

Vterque in pratis nascitur.

Eiusmodi

Eiusmodi flo-
mine & irrigati-
tiores euadunt

Est flos, qui
tum odore,
horro decora, &
da, vnde is dicitur
condimentis in-
10 lieribus amica,
ter colant, nan-
uorum luteo in-
ctantesq; situ-
Dioscorides

santhemon, au-
didos & magni-
ut Virgilius, &
gulis mensum
chlam, id est

ostentant flore
d'ogni mese dicitur
trabantur, sub

Plinius ita de
dine. Vincit nu-
odore superatu-
cinit tinctum,

Columella
tum, umbone

30 diem buphras

Cal-
Dicit Plinius

folio inter car-
prius memine-
marinam, quæ
rant numeru-
tur, nam mar-
acuto est, ut c-
quam folia ei-
40 pellat latifolia

Eiusmodi flores annua, & frequenti transplantatione, frequenti læta-
mine & irrigatione, maiores, habitiores, duplicati, triplicatiq̃ue & elegan-
tiores euadunt.

Decaliba. CAP. XXI.

EST flos, quem posthac caltham dicemus, speciosus tum croceo colore,
tum odore, quamuis aliquantulum graui, non tamen ingrato, nulli non
horto decora, & inquilina, paucis coronariorū elegantia & speciositate secun-
da, vnde iis dotibus non immerito venit in coronamenta. Præterea cibo cedit,
condimentis inditur, gustu & odore non ingrato, acetariis immiscetur, mu-
lieribus amica, quod pensilibus hortulis, & testis eam ferant, & diligen-
ter colant, nam icteria fœdis coloribus vexatæ ea liberantur, & cymæ o-
uorum luteo in placentulis immistæ, mansæq̃, menses nimis fluentes, cun-
ctantesq̃ sistunt, impelluntq̃ue.

Dioscorides *χρυσάνθεμον* chaltham cognominate videtur, inquiens, chry-
santhemum, aut *καλθα*, nonnullis buphthalmos: Quia flores admodum splen-
didos & magnos ferat, magnos oculos, non bouis oculos vocat. Latini,
vt Virgilius, & Plinius caltham vocant. Vulgò vbique *calendula*, quod sin-
gulis mensium calendulis florere conspiciatur. Sunt qui caltham quasi ca-
chlam, id est hiantem & apertam dicant, alii à calathos, siue calyce, quem
ostendant flores. Neapolitani à Latina nomenclatione deducto nomine *flor*
d' ogni mese dicunt. Sunt qui solsequium putet, quod flores sub vesperam con-
trahantur, sub ortum pandantur.

Plinius ita describit. Proxima leucoio flauo caltha est concolori amplitu-
dine. Vincit numero foliorum marinam, quinque non excedentem. Eadem
odore superatur: est enim grauis caltha. Virgilius luteo colore eius florem ce-
cinit tinctum,

Mollia luteola pingit vaccinia caltha.

Columella aureum, luteumve colorem floris inspiciens, & orbem circina-
tum, vmbone in centro extante conspicuo, luminis, siue oculi magni in spe-
ciem buphthalmum videtur vocare:

Candida leucoia, & flauentia lumina calthæ.

Dicit Plinius, proxima violæ calatianæ, quam ipse odoratam, ac minuto
folio inter cæteras violas dixerat, concolori amplitudine: nam lutei leucoii
prius meminerat, & magnitudine calthæ consimilis: vincit numero foliorum
marinam, quinq̃ non excedentem, calthæ verò foliola circa vmbonem supe-
rant numerum duodenarium, & satius centenarium. Eadem odore supera-
tur, nam marina viola inter cæteras odorata est, & caltha tam odore graui, &
acuto est, vt caput feriat, non leuior ei, quam scopam regiam appellant, quam-
quam folia eius oleant, non flores: & ipse regiam scopam alibi sideritim ap-
pellat latifoliam, cuius folia si terantur, fœdi odoris dixit. Folio nempe cal-

tha surgit dilute virenti, multiplici, oblongo, aliquantulum lato, mollique
ut leucosii, nonnihil lanuginoso, caule folioso, striato, flore in summo co-
pioso, eleganti, eximio fulgore nitenti, amplum orbem effigianti, argu-
tis, minutulisque crenulis laciniato. Semine in singulis floribus copioso. Ra-
dice fibrosa, & parua. Floret Martio, Aprili, Maio, usque ad hyemem, & in-
terdum tota hyeme.

Genus.

Est genus duplex, sativum & sylvestre. Id passim nascitur. Sativum hortis
colitur, duplici, tripliciq; florum vallo cingitur, speciosiusq; est.

Cultus.

Culta altero, aut tertio anno, pluribus, aut habiuitibus floribus provenit,
ac numerosiore foliorum floris stipatu: nam fera passim in incultis arvis, &
ruderibus parua, & foliorum inops provenit.

De anemone. CAP. XXII.

OB floris praestantiam, elegantiamve antiquitas anemones florem co-
rollis dicavit. Fabulantur Poetae ex Adonidis cruore natum ab apro ex-
tincti, quod Ovidius expressit, & eo prior Nicander,

Sic fata cruorem

Nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo

Intumuit, sicut pluvio perlucida caelo

Surgere bulla solet, nec plena longior hora

Facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus,

Qualem quae lento celant sub cortice granum

Punica ferre solent, brevis est tamen usus in illo.

Namq; male haerentem, & nimia leuitate caducum

Excitant iidem, qui perslant omnia, venti.

Theocritus autem in bucolicis ex Veneris lachrymis Adonidem lugentis
prodiisse finxit, eiq; epitaphium dicantis, hoc carmine,

Quotq; cruoris agit guttas hic casus Adonis,

Tot Venus effudit lachrymas, quae singula flores

Cessante demittunt, lachryma pariunt anemonem;

Sed cruor ille rosam creat.

Hoc verborum figmento Poetae admonent, non esse pulchritudini fiden-
dum, nam sicut anemones flores vento excutuntur, ita venustas per Ado-
nidem figurata, fugax, ac breui tempore durans. Aegyptii anemones florem
pingunt, quoties hominum morbos intelligi volunt, ut ex Oro Apolline ha-
betur. Flos anemones pulcher est, etsi cum multis de venustate ceteris, ta-
men rosis comparari nequit. Extat antiquum proverbiu, Rosam cum a-
nemone confers; contra eos dictum, qui res magnas cum parvis comparare
velint. Nicander. Et anemonides fulgentes ipsae, antequam contrectentur,
splendidiore procul colore allicientes.

Nomen.

Graece ἀνέμων dicitur, ὅτι ἀνέμου, id est à vento: nam, ut Plinius in-
quit,

quit, flores nunquam se aperiunt, nisi vento spirante, vnde & nomen accepit. Theophrastus anemones genus λεμονίαν vocari dixit. Sofibius anemones à Spartianis phænidas vocari tradit. Græci etiam anemones, & papaveris folium platagonium vocant, ὅθεν πλάττων ἢ γρῶν ἢ χέν, id est, à sono, quæ collisafaciunt. Iis siquidem periclitabantur ecquid amasis suis forent grati, siquidem pollicis imponentes ea, indici mox collidebant, quod si perciperissent, amari se augurabantur, sin minus frustrati ingemiscebant. Latini anemone vocant. Theodorus vertendo Theophrastum fremium interpretatur. Itali vulgò *herba di vento* vocant, quia primo cuique, vt diximus, afflatui ventii flores pandat, & referet.

Plura sunt anemones genera, alia corollis, alia Medicinæ dicata. Quæ corollis dicata sunt, in duo genera diuidit Theophrastus. Vnum erumpit Autumno, primis imbribus post aphacam, cum croco, & cæteris hybernis. Aliud genus sylvestris anemones, quod limonium, siue palustre vocat, floret vere post narcissum, ante rosam. Edit florem suum haud multo post germen. Surgit à radice foliata. Et libro de causis. Quia natura herbacea & annua est, suæ debilitatis causa faciliè germinat, vnde verno tempore floret. Hæc Theophrasti descriptio nimis brevis, & concisa est, addemus Dioscorideam, quæ etsi fortasse non eandem anemonem describat,

nihilominus tamen minus in dignoscendis earum generibus, & agnatis non parum afferet lucis. Dioscorides duo eius genera tradit, sylvestre, & in cultis nascens, & huius plures sunt species. Satiuum alterum phœniceum florem profert, alterum candidum, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia, cæterum scissa tenuius, in terram inclinantur, cauliculi exiles, lanuginosi, in quibus flores, vt papaveris, & in medio capitula nigra, aut cærulea, radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, veluti geniculis quibusdam distincta. Sylvestris amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora, caput oblongius, flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capillamentis. Sed quia plerosque in errorem traxit similitudo,

& colorum florum cognatio inter argemonem, & erraticum papauer, quod rheda vocatur, verum earum Dioscorides affert discrimen. Papauer, & argemone, colore minus saturato spectantur, & vtraque serius floret. Est & succorum distinctio: nam argemone croceum, & acrimonia insignem, papauer verò lacteum, anemone nec vllum quidem illorum fundit. Præterea si flos anemones papaverino similis est, non tamen capitulum ostendit, quale papauer, sed velut recens asparagi caput fastigiatur. In argemone latiusculum superne capitulum, in errático papauere subangustum.

Dioscorides in aruis nasci dixit, nos in montibus, syluis, & frutetis vidimus. *Solum.*

De flore cyano. CAP. XXIII.

FFF 2

CYANVS flos quamquam inodorus, tum ob speciei formam, tum ob coloris gratiam, puellarum & rusticorum corollis inseritur, & hac etiā dote hortis feritur. Honorem; nomenq; dedit cæruleo colori. Si quis enim barbularum calycibus erutas ex candido oui liquore triuerit, in pingendis literis cæruleum colorem mentietur. Plinius, Flos iste & alii nō fuere in vſu Alexandri magni ætate, quoniam proximi à morte eius authores ſiluerunt de illis, quo manifestum eſt poſtea placuiſſe: à Græcis tamen repperitos quis dabit? non aliter Italia illorum nomina uſurpante.

Nomen. Κίανος Græcis ex græco cyaneo colore, nomen flori cyanus: ex Plinio. Blaptisæcula rutibus dicitur, quoniam ſecantibus, & metentibus officiat, reſuſa in occuſu eius ſalce, nam & ſeculam ſalcem veteres dixere: βράμην Græcis nocere eſt. Neapoli *ſior di liſo*.

Deſcriptio. Surgit caule bicubitali, anguloſo, lanuginoſo, folio oblongo, circa pediculum ſciſſo, acutis laciniis ſinuato, piloſo, acuminato, in viore albicanti, calyce ſquamis foris compacto ex aceroſis teſſillis nitidis, plurimis ſtipatibus cæruleis barbulis, flore inodoro, ſemine paruo, forma oblongo, leui, ſplendido, ſuperiori parte barbato, radice tenui, fibroſa. Floret Aprili, Maio, Iunio & Iulio mēſibus vnā cum frugibus. Plinius, Roſam cyanus excipit, cyanum amaranthus.

Genera. Huius diuerſitates inſigniores, hortenſis, & erratici. Hortenſis non diuerſus foliis, ſed maioribus, latioribus, flaccidis, minus laciniioſis, floribus maioribus, ſpecioſioribus, ſaturatiore cæruleo in purpuram vergentibus. Sylueſtris, ut diximus, cæruleis, ſenis ut plurimum foliolis conſtantibus. Hortenſis minor nituo conſpectu, & purpureo niter.

Calum. Frigidiusculis terris, importuno luxu ſegetes ubiq; necat.

Solum.

De aſtiuis floribus, & primum de amarantho purpureo.

CAP. XXIII.

SUCCESSVNT vernis floribus eſtini, qui mox dicentur. Quia poſt cyanum florer, ideo poſt eum amaranthi meminimus: eſt enim altera amaranthi ſpecies. Solo colore commendatur, quo nil gratius aſpectu cernitur, quādo & purpuræ Tyrias, Laconicæq; ſuo rutilanti nitore prouocet. Hac dote non ſolum hortis, ſed ſciſtilibus ſeritur, & fenestris aſſeruatur. Collectum & umbra, vel furni tepore ſiccatum, puellæ ad coronarios hyemis luſus recondunt, mirum poſtquā cuncti flores defecerunt, aqua madefactus reuiuſcit. Theſſali ad tumultū Achillis libamina, & expiationes quotiānis oraculi Dodonæi admonitione ferre iuſſi, quā omnia, quæ ſacrificio rite operādo neceſſaria eſſent, ex patrio ſolo aſportare cōſueſſent, coronas in ſuper amaranthinas primi omnium excogitauerūt, eaſq; ad ſacrū eiſmodi ferre ſanxerunt, ut ſi forte vēti nauem repuliſſent, aut alia quapiam de cauſa mora iniecta eſſet, coronæ tamen neque flaccidæ, neque deformes ſuſpenderentur. Egyptii ſi quem in offeſa valitudine vixiſſe corporis ad extremum uſq; dignitate, viribusq; ſeruatis hieroglyphicè

phicè denderat, quod minit

Græcis aqua

bilis diutius per

ceptus maxim

tura plures flor

mum, ageratur

mpuam Theop

thum, Neapoli

10 meſino dicunt, cu

Plinius ita de

rea veriſ, quā

autumnou. A

dine ſtriato, fo

bus & fibroſis,

Plures ſunt

uocat. Maior flo

cantribus, ſpicat

lo. Sunt & foli

ribus. Sed ex Pl

Gaudet de

HORTOR

res, ob id

flores aſcripti ſu

Venetis labro

Græcis λυγ

lychnis appell

gollypio parat

30 copia non dā

verbaſci & alia

meo colore, lu

noctuluceat,

lucernulam in

Theophras

ueſtris in om

la magnitudi

addeſus deli

ranta veterum

40 ſuſpecti ramul

phicè vendere voluissent, amaranthi corollam capiti eius imponere mose-
rat, quod minimè marcescat.

Græcis ἀμάραντος dicitur ἀπὸ τοῦ μὴ μαρῆναι ὀνεί, quod perennis, & immarcesci- Nomen.
bilis diutius perstet. Summa eius natura in nomine est, quia nō marcescat, de-
cerptus maximè afferuatur. Dioscorides eius nō meminit, et si hac nomencla-
tura plures flores immarcescibiles complexus sit, ut chrysocomen, heranthem-
um, ageratum, aliosque pertinacis coloris, & decoris flores. Putant aliqui
πορφύρεον Theophrasti esse, quam Plinius purpuram transtulit. Latini amaran-
thum, Neapolitani vulgò *sioruelluro* vocāt, quod ex coccineo serico, quod *cre-*
mesino dicunt, cum quo de coloris principatu certat, conformari videatur.

Plinius ita describit. Amarantho non dubie vincimur, est enim spica purpu- Descriptio.
rea veriùs, quàm flos aliquis, & ipse sine odore. Prouenit Augusto, durat in
autumnū. Addimus, Prouenit ferulaceo caule, subrubenti, cubitali altitu-
dine striato, foliis latis, acuminatis, mollibus, ocymo similibus, radicibus breui-
bus & fibrosis, semen spicis insidet, paruum, nigrum, nitens.

Plures sunt species. Vulgarior holosericum vellere, mollitie, ac nitore pro- Genera.
uocat. Maior floribus superna parte luxuriat multis pannulis, se mutuo impli-
cantibus, spicatim inflexis, obsoletiore coccino nitet, iucundissimo specacu-
lo. Sunt & foliis versicoloribus. Sunt & sanguineis, tæniatis & reticulatis flo-
ribus. Sed ex Plinio palma Alexandrino datur.

Gaudet decerpi, & quo frequentius legitur, lætius renascitur.

Cultus.

Delychnide. CAP. XXV.

HORTORVM, viridariorumque delicia sunt lectissimi lychnidum flo-
res, ob id à Theophrasto, Dioscoride, Plinio, cæterisque inter coronarios
flores ascripti sunt, sua elegantia illecebris. Amerias Rhizotomus lychnium è
Veneris labro natam putauit, quum à Vulcano compressa selauisset.

Græcis λυχνίς στεφανομακρή, quasi coronaria lychnis. Videtur ex argumento Nomen.
lychnis appellata, nempe λυχνίου Græcis lucerna dicitur, ἐλλύχνιον funiculus, qui è
gossypio paratur ad flammam nutriendam, quare quum antiquitus gossypii
30 copia non daretur, innumeris quarundam herbarum foliis, utpote lychnidis,
verbasci & aliarum utebantur. Sunt qui non à frondium tomento, sed à flam-
meo colore, lucido luculentoque dictas fuisse lychnides autument. Alii quod
noctu luceat, lychnidis nomen inditum. Theodorus in Theophrasti versione
lucernulam interpretatus est. Latinis lychnis coronaria dicitur.

Theophrastus ætate florere ait. Dioscorides: flore est albæ violæ simili, syl- Descriptio.
uestris in omnibus vi banæ similis. Plinius: nunquam excedens quina folia vio-
læ magnitudine, odore nullo. Nos clarioris descriptionis gratia notas aliquas
addemus delineando quandam herbam, quam veram lychnidem puramus, in-
ranta veterum scriptorum verborum caritate. Fruticosa herba, incaui caules,
40 surrecti ramuli, tomentosi, geniculis pluribus donati, folia angusta, mollia.

Flores in summo apice rosea purpura rutilantes, ac veluti flammea, ut igne micent aspectu oculorumque aciem perstringant. sed in odori. Radix fibrosa oblonga. Columella corymbem vocat.

Nunc veniat quamvis oculis inimica corymbe.

Nam & Dioscorides inter cetera eius nomina corymbion vocari testatur. *Culm.* Athenæus in Lemno, & Cypro gigni, itemque in Strôgile, Eryce, & Cytheris scribit. Eandem ex omnibus, quæ in Europa iucundius olent, vnguentis & odoribus solam immisceri. Optimam in Illyrico provenire, in locis editis, non procul à mari.

Culm. In hortis studiose culta adeo flores confectos, & ingeminatos fert, ut semine orbetur, exhausta pabulo in florum commodum absumpto. Sed quæ sponte oritur & negligitur, floribus oboletioribus minimis, semine donatur.

De malua rosea hortensi. CAP. XXVI.

EST maluæ genus hortense dictum, quod florum gratia feritur hortis, ut æstivas coronasnectere possit. Flores venustate rosis non cedunt, & si supereretur odor, de principatu certarent, nec fugax flos, sed diu vita, vigorque durat. Nunc de rosea, de aliis suo loco dicemus.

Nomen. Audio hortensem maluam, vel roseam vocari, quod flores rosei coloris elegantia, & similitudine ferat. Neapolitani *rose di Francia* vocant, fortasse quod illinc ad nos venerint.

Genus. Trifariam in nostris hortis variat, prima purpura saturata concolor, altera dilute rubet, tertia candida est, vel ex omnibus confusis coloratur. Est cui flos multiplicior, confertiorque structili foliorum serie aperitur.

Descriptio. Rosea malua in arboream proceritatem assurgit, cuius scapus tantamagnitudine crescit, ut baculi usum præbeat. Folia huic ampla, circinata rotunditatis, multis in ambitu segmentis. Caudex à medio usque ad verticem pulcherrimis floribus decoratur, breui admodum pediculo dependentibus. Capitula primum prosiliunt, breuibus innixa petiolis, in mucrone fastigiata, iisque paulatim intumescens, prægnantia florum involucria fathiscunt, in quibus dehiscences rosæ se pandunt, & explicantur in folia quina calycibus paucos apices complexis, qui lutei è mediis emicant, iisque decidentibus, erumpunt purpurea stamina. His foetus succrescit, multipliciter tunicatus, atque in umbilici formam numero semine coagmentatus, in quibus quum decussa sunt folia, reliquarum maluarum modo semina recluduntur. Floret Iulio, & Augusto.

Solum. Pingui, & irriguo solo, quale hortense, proveniunt.

Satio. Semine feritur, & si caulis post foeturam arescit, iterum vere rediuvius, ut semel sata pluribus annis perennet.

De floribus hyemalibus. & primum de cyclamino.

CAP. XXVII.

IAM dicuntur
terminatur.
celum clementi
coronato, & cor
eius colofino co
Præterit quum
rit sata, nil nocer
vinoque subactam
gunt, ad amato
da est. Pernicia
gatur, aduersum
Græcis vocatur
bitu circinato,
cularem dixerit
Theodorus ven
nis terræ rapum
ruber, quod in
beat intelligere
luminis clausur
10 piscatores terra
pere expetunt,
piscis cupiditate
factum testatur.
Theophrastu
rum. Colore nig
men rotundior
fraque albicant
eo purpureis, ro
ri possit. Pliniu
10 sine angulis, in
radice lata, ut r
nas admittitur.
dicitur, ubi præ
rem non ambig
Theophrastu
& maxime sub

ECORON
ronas texi
40 nio. Nostra
nectunt

IAM dicentur hyberni, ne corollis eo tempore defint flores, vel ne tēpus in-
 termittatur, habebimus & hyemales ipsos, & autumnales prorogatos, & si
 cœlum clementius sit, & locus aprius, vernos præcoces: sic perpetua florum
 coronatio, & contextus habebitur. A cyclamino incipiemus, & quū gratissimo
 eius colossino colore à fertis non excludatur, nec à nostris hortis excludemus.
 Præsertim quum iubeat Plinius in omnibus domibus ferendam, nam ubi fue-
 rit sata, nil nocere ei posse mala medicamenta. Præterea à terra erutā radicem,
 vinoq; subactam, digestamq; in pastillos sicca facis vini, qua macula abster-
 gūtur, ad amatoria valere author est Theophrastus, si in hoc ei fides adhiben-
 da est. Pernicialia sunt etiam brassicæ & vitis odia, nam ipsum olus quo vitis fu-
 gatur, aduersum cyclamino perarefcit.

Græcis κυκλάμινος, quasi sphaeritis dicitur, siue orbicularia, tum à folii am-
 bitu circinato, vel à circumacta orbis circinitate, & τὸ πρὸ κύκλου, vt ab orbe, orbi-
 cularem dixerint. Latinis vt Plinio cyclaminus, & tuber terræ dicitur, ob id
 Theodorus vertendo Theophrastum κυκλάμινον terræ tuber vertit. Roma-
 nis terræ rapum dicitur, quoniam in terra velut rapum extuberat, vel terræ
 tuber, quod in molem quandam intumeat, vel terræ vmbilicum, siue li-
 beat intelligere vmbilicum mediam animantis partem, siue extremam vo-
 luminis clausuram, quæ velut nodus opus finiebat. Appellare Campanos
 piscatores terræ venenum Plinius retulit: nam eius radicem pisces summo-
 pere expetunt, atque si contusam admista calce mari sparseris, aduolabunt
 pisces cupiditate mira, continuoq; exanimati fluitabunt, idq; coram se
 factum testatur.

Theophrastus terræ tuber olfactu odoratum dicit, gustu vehemēter ama-
 rum. Colore nigrum. Constat cortice, & carne. Folio muris auriculæ simili, ta-
 men rotundiori. Dioscorides tribuit ei folia hederæ varia, in quibus supra, in-
 fraq; albicant maculae. Caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in
 eo purpureis, rosarum effigie. Radice nigra, aliquantulum lata, vt rapum vide-
 ri possit, Plinius folia ferre minora, quam hederæ tradit nigriora, & tenuiora,
 sine angulis, in quibus albicant maculae, caule exiguo, inani, floribus purpureis,
 radice lata, vt rapum videri possit, cortice nigro. Flos eius colossinus, in coro-
 nas admittitur. Colossinus color, vt Straboni placet, à Colossis vrbe Troadis
 dicitur, ubi præcipua lanicii commendatio erat, quem purpureum esse colo-
 rem non ambigimus.

Theophrastus optimum in montibus nasci dixit, Dioscorides in vmbrosis
 & maxime sub arboribus. Plinius in vepribus.

De clematide daphnoide. CAP. XXVIII.

ECORONARIO genere est clematis, hybernas sua fronde & flore co-
 ronas texit: inopia florum aliquando supplet, semper virens, authore Pl-
 nio. Nostra ætate mulieres puellis, & puellulis virginibus funestas corollas
 nectunt.

A Græcis *κλινμυιδες* quin sint dictæ à viticulorum sarmentosa sobole, nullus est qui neget, *δαφνοειδης* à lauri forma foliorum. Plinius à Græcis chamædaphnem vocari dixit, quasi pumilam laurum. Ipse vincam peruinca vocat, quia obuia quæque vincit. Videturque ei alibi clematis Ægyptia dici, cognomine quòd Ægyptus hanc maximè gignat, quum ab aliis daphnoides, ab aliis polygonoides vocetur. Folio lauri, longa, tenuisq; Neapolitani vincam peruinca, & *triuencola* dicunt. In prouerbium vsque cessit, ita nominando eos, qui proceri & nigro sunt corpore, ut est apud Demetrium Phalcreum, tales enim ab eo Ægyptiæ clematides nominantur. Sed hæc alia est à Theophrasti, & Dioscoridis chamædaphne, similis laureolæ, quam & Plinius descripsit.

Genm.

Apud nos albo, & caruleo flore viret hyeme, hyacinthino, vel subpurpureo. Dioscorides hanc humi serpere dixit, viticulas spargere crassitudine iunci exiguas, folio lauri, figura & colore multo minore. Plinius. Semper viret. In modum lineæ foliis geniculatim circumdata. Topiaria herba. Sed ne in posterum non dignoscatur, aliqua nos addemus. Virgis repit viticulosis, flexilibus, caducis, humi sparsis, sed non obuias plantas irretientibus, foliis ligustri lauri facie, ex intervallis binis ex aduerso. Floribus violaceis, quinque distinctis foliolis, ex oblongo, & viridi calyculo se pendentibus, longisque innituntur pediculis. Radice numerosa, gracili, & albicanti. Floret incunte hyeme Nouembri, Decembri, & Febuario. Dioscorides, lato pinguique solo provenire, dixit, nobis in senticetis, & vmbrosis nemoribus passim obuia.

De hedera Cilicia. CAP. XXIX.

ESYLVESTRIVM genere in coronis flos venit smilacis, id est hedere Ciliciæ, ut Theophrastus inquit, Et Plinius. In coronamentis eorum corymbi obtinent principatum. Sed omnibus sacris, & coronis infauista, quoniam sit lugubris, virgine huius nominis propter amorem iuuenis Croci mutata in hunc fruticem. Id vulgus ignorans, plerumque sua festa polluebat, hederam existimando. Nam & Poetis, & Libero patri, aut Sileno, smilax iam pro hedera sacrabatur ab iis, qui omnino, quibus coronandi essent, ignorabant.

Meminit huius Ouidius,

Et Crocon in paruos versum cum Smilace flores.

Plinius ex ea fieri codicillos dicit, propriumque materiam esse, ut auribus admota, leuem sonum reddat. Ex hac corona, impari foliorum numero facta, aiunt capitis doloribus medicinam venire.

Nomen.

Theophrasto *σμιλαξ*, siue hedera cilicia. Dioscoridi *σμιλαξ πρᾶχλα*, id est smilax aspera, ab aculeis, quos habet. Galeno *σμιλαξ*. Plinius, Nicophoros cognominatur. Ecce Ciliciæ quidem primū profecta, sed in Græcia frequentior, quam vocant smilacem. Latinis smilax aspera.

Descriptio.

Ita describitur à Theophrasto. Amplexicaulis est, unde aliquid, cui incubat, querit, quod si deest, humi se proicit, atque humi caulis fit. Fructus aculeatus, & velut

& velut præho
non fructum sp
mos spinolos, v
nato quidem, se
no, & ubi pedicu
nuem habente, q
coacta in orbem
latus pampini
prodente, fructu
pendentibus, at
deunt. Acinis co
singulos. Nigri
sepiunt, quodq
mno, atq; rub
ficlimeni, sarm
dit ab imo ad su
maturi rubescu
Dentis genicul
anguloso, à ped
racemos labru
bus nucleos ter
Duo eius gen
uallibus opacis,
genus culta am
In opacis cor
asperis.

ESYLVES
in coron
nis addi, & me
medicamentis
Theophras
aculeis horre
Plinius Ag
Arbor to
magnitudin
impleat. Fru
galla. Flos al
qua de causa
arbores percu

& velut præhorridus (sed corruptus textus Theodorum errare coegit, quippe non fructum spinosum dicit, quem paulo post spinis carētem depingit, sed ramos spinosos, ut ex Dioscoride & Plinio corrigi potest) Folio in cacumine pinato quidem, sed in angulum depresso, nec tamen anguloso, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligatur, ferè madido, medium callum, spinæ modo tenuem habente, staminaq; nõ porrecta ex vno, ut in cæteris foliis, sed circa eum coacta in orbē ab annexu pediculi, ex quo & villus quidam gracilis, & conuolutus pampini modo emittitur, flore candido bene olente, verno tempore se prodente, fructu solani, aut melothri, etiamnum labruscæ racemis, ut hederæ, pendentibus, aut labruscæ potius, quoniam ab eodem pediculo acinorū prodeunt. Acinis color ruber, cōplexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis singulos. Nigri sunt nuclei, atq; duri. Peculiare habet racemi, q; latera caulium sepiunt, quodq; vnus omnium grandissimus propēdet summo caule, ut in rhamnō, atq; rubo. Hactenus ille. Dioscorides verò: Smilax aspera folia habet periclitament, sarmēta tenuia multa, rubi modo, aut paliuri aculeata, arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis, fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leuiter mordent. Radice dura crassaq;. Plinius. Densis geniculata caulibus, spinosa, fruticosa ramis, folio ederaceo paruo, non anguloso, à pediculo emittente pampinos. Flore candido olente lilium, fert racemos labruscæ modo, non hederæ, colore rubro, complexa acinis maioribus nucleos ternos, singulos minoribus, nigros, duosque.

Duo eius genera Plinius recenset, alterum immortalitati proximū, in conuallibus opacis, scandens arbores, comantibus acinorum corymbis, alterum genus culta amare, & in his gigni tradit.

In opacis conuallibus nasci dixit Plinius. Sed Dioscorides in palustribus, & asperis.

De spina AEgyptia. CAP. XXX.

ESYLVESTRIVM genere spinæ AEgyptiæ fructu, & ederæ ciliciæ flore in coronis utebantur antiquitus, ut ex Theophrasto habetur. Flos & coronis addi, & medicamentis petitus. A quo Plinius. Flos & coronis iucundus, & medicamentis utilis.

Theophrasto *ἀνδρῶς* est, eoq; nomen accepisse tradidit, quasi tota arbor aculeis horreat, excepto caudice. Dioscoridi *ἀνδρῶς ἀραβικὴ*, spina Arabica. Plinius AEgyptiam vocat.

Arbor tota, præterquā caudice, spinis horret, foliis ac germinibus aculeatis, magnitudine spectanda, ut cuius materies duodenum cubitorū proceritatem impleat. Fructū fert siliqua leguminū modo, quo incolæ coria perficiant vice gallæ. Flos aspectu pulcher, quo coronas nectant, ad medicamenta perutilis, qua de causā à medicis colligi solet. Ex ea tum sua sponte gummi profluit, tum arbore percussa. A cæsura protinus anno tertio resurgit. A quo Plinius. Acu-

G G g

leus spinarum in foliis, semen in siliquis, quo coria perficiuntur gallæ vice. *Men-*
nat ex ea gummi. Sed præcipua utilitas, quod cæsa anno tertio refurgit.

Genera.

Duū est generum, candida, & nigra. Candida imbecillior, faciliusque pu-
trefcēs nigra incorrupta, & in aquis durior: ob id vtilissima nauium costis, ven-
trisq; compagibus in fabrica. Plinius ab eo: Celebratur spina dumtaxat nigra,
quum incorrupta in aquis duret, ob id vtilissima nauium costis, candida facile
putrescit.

Calum.

Numerosa omnino arbor, ingenti sylua eius Thebaica præfectura, vbi olea
& quercus, & persea, loco non aquis fluuii riguo (distat enim plusquā trecentis
stadiis) sed suis fontibus, qui circa eū tractum permulti exiliunt. Ab eo Plinius
Circa Thebas hæc, vbi & quercus, & persica, & oliua, c c c à Nilo stadiis sylue-
stri tractu, & suis fontibus riguo. Dioscorides in aquis nasci scribit.

De herbis coronariis odoratis, & primum de abrotono. CAP. XXXI.

DIXIMVS de coronarum genere, quæ floribus texebantur, nunc ad aliud
genus deueniendum, quod scilicet solo folio coronat. Sunt enim suffru-
ticum quorundam rami, folia, & in totum vniuersa natura odorata. Et primo
in hortum nostrum abrotonum conferemus, tum ob sui odoris fragrantiam,
tum quod serpentes fuget, & efficacissimam esse herbam dicant contra omnia
veneficia, quibus coitus inhibetur, immo ramo puluinari subiecto, venerem
stimulari, & armariis sparsum, vestes à tineis vindicare.

Nomen.

Nomen *ἀβρότον* sibi apud Græcos usurpauit, vt Nicandri scholiastes te-
statur in theriacis, quod conspectum tenerum, vel delicatum habeat. Diosco-
rides à quibusdam thelyphthoron, & thelythamnon, & glycynancona dicit
appellari. Saneque videntur ii ad historiam, & vetus prouerbiū respicere.
Ea est huiusmodi. Lydorum gens in libidinem effusissima, fœminas inge-
nuas constuprare in hortis ad hoc flagitium quæ suis amœnitatibus, aliquan-
diu impune solita est. Demum Omphale mulier dominatione haud magno
negotio, effeminatis illis, & luxu diffluentibus, excussa imperitare cœpit ipsa,
& vbi eos cruciatibus variis affectos vltæ est, in vxores eorum defauit, inclu-
sas enim eas eisdem septis prostituit seruitutis, vnde viridario nomen glycys an-
con, & thelyphthori, & thelythamni vocabulo significatur, ceu fortasse abro-
tono confusus esset is locus. Sunt qui hanc herbam ab Abrotono fœmina in
hanc mutata nomen adsciuisse credant. Neapolitani *canfarata* vocant.

Descriptio.

Theophrasto furculosus frutex est, minutisq; foliis præditus, immortali virg-
coma. Radices rectas altasq; agit, & veluti vni stirps crassa scilicet illa radice, re-
liquis verò de illa exennibus spargitur, quod non sampso, neq; serpillio, neq;
silymbrio, neq; helenio datum est, summo terra radice leniter hæretibus, et si
radices omnes sint lignosæ, longè magis abrotoni, magnitudinis, siccitatis quo
causa. Semine abundat, nec inodoro. A vetustate odor acutius validiusque vi-
brat, non hebesceat, vt alii. Dioscorides. Fœmina quadam arboris specie fruti-
cans,

cans, candicat cir-
ferta est, comar-
dit, suauiter olet
altè descendens,
tercum fraxino,
Dioscorides g-
pestre vocauit, fo-

Altiolum admi-
tur. Miratur The-
to prædita sit, & apr-
sequitur, quod
contra frigus, tu-
doctæ gigni, & G-
Radice, & au-

quum lignosum
modo hederæ n-
felicius, quam fer-
semine diffi-
modum Adonia-

no fertur. Vbi verò
lidius. Plinius: S-
quog; non sine n-
te. Altiola enim
Iacere, riton vitis fr-
minio protulit. S-
est, qui totam ge-

ET si Colan-
quum sit qu-
quam olitoribu-
ridis, & Plinij co-
coronis quæ lita
herbas in horte
loco res dicant
la saporem præ-
tere iubet, vt a-

Græci *ἄβροτον*
ridis à serpend-
rā attinga, in il-
do dā ramulorum

canis, candicat circa ramulos, foliis seriphii modo minutim incisis. Floribus referta est, comatibus in summo fulgore auri corymbis, quod per æstatem prodit, suauiter olet cum grauitate quadam. Plinius ab his. Abrotono radix vna altè descendens, cæteris in summo terræ leniter hærens. Semē copiosum. Floret cum fraxino, acri odore.

Dioscorides genere distinxit, in marem, & fœminam. Plinius marem campestre vocauit, fœminam montanum, quod idem Nicander sentit. Genera.

Alfiosum admodum est, & frigus multum reformidat, ac sole nimio læditur. Miratur Theophrastus eiusmodi plantæ naturam, quæ quum calidiori vi prædita sit, & apricationem horret, & loca sole illustrata mirum in modum profequitur, quod non nisi in plantæ infirmitate collocauit, quum viribus tum contra frigus, tum aduersus æstum deficiat. Dioscorides plurimum in Cappadocia gigni, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli scribit. Cæl. Sol.

Radice, & auulsione facile germinat. Etiam cacumine suo se propagat, nam quum lignosum sit spissitate acoreq; suo, seruari aliquantum temporis potest, modo hederæ: nā hæc defixa quoq; nimirum erumpere valet, vnde dicto modo felicius, quàm seminio germinare prodidit Theophrastus. Æstate feritur, quū semine diffiulter exeat, eoq; prius in testis viuiradicis gratia deposito, in quē modum Adonidis hortulos pangebant. Nec sine negotio in plantaria transfertur. Vbi verò vegetū creuerit rutæ modo fruticat, sed surculosus, & squalidius. Plinius: Sentitur autem semine melius, quàm radice, aut surculo, semine quoq; non sine negotio plantaria transferunt, sic & adonium. Vtrunq; astate. Alfiosa enim admodum sunt, & sole tamen nimio læduntur, sed vbi conualluerit, ritu vitis fruticāt. Sed Plinius contra quàm dixerat Theophrastus de seminio protulit. Sed id potius librariorū incuriæ, quàm Plinio vitio vertendum est, qui totam germanam hanc Plinii lectionem multifario lapsu peruerterūt. Satius.

De serpillo. CAP. XXXII.

ET si Columella serpillum condimentario vsui notissimam herbam esse, quum sit quibusdam esculentis aptissima, & magis aluearia curantibus, quàm olitoribus studiosè cōseri dixerit, nos, qui Theophrasti placita, Dioscoridis, & Plinij consecramur, qui eius ramos, & folia odorata, & proinde folia coronis quæ sita dixerunt, non alienum putamus inter odoratas & coronarias herbas in horto nostro locum illi dare. Nec admodum referre arbitramur, quo loco res dicantur, dummodo quæ dicenda sunt, non ineptè dicantur. Columella saporem præcipuum post thymum serpillo melli tribuit. Varro serpillum ferere iubet, vt apes naturale pabulum habeant, & ab his Palladius eadē docet.

Græci *εῤῥυλλον*, Latini serpillum vocant à serpendo auctore Varrone. Dioscorides à serpendo nomē obtinuisse quoq; dicit, quoniā si qua eius particula terrā attingat, inibi radices dimittit, quod à Theophrasto excepit. Propriū quoddā ramulorum eius incrementum, quippe cum possit in quantā voluerit quifcūq; Nomen.

piam longitudinē trahi, adiecto illi pedamento aliquo, aut si prope sepes plantetur, aut ex altiore loco deorsum demittatur, præcipuè in puteis, in longum protrahuntur, ut serpente videatur. Neapolitani *serpollo*.

Descriptio.

Theophrastus cremium dicit, lignosum, immortali virens coma, utpote omnia, quæ angustiorib. foliis pinguib. & suaueolentibus cōstituuntur. Plantæ vniuersa odorata est, flos tamen inodorus. In agresti durus odor, & omnino expers dulcedinis. Ratio est, quia siccum plusquā modicū est, ob id acris odor ppter siccitatē: quum autem in vrbānum habitum traducitur, mollius redolet, moderationem autē causam tum odoris, tū coctionis existere nulli dubiū est. Semper nō nihil querit, cui caducū incubet, vitam enim apud aliud agit, quod si obtinere non valeat, humi se proiicit, atq; humicula fit. Radix ei lignosa, & multifida, sublimis, & retorrída, crescit in longitudinē. Dioscorides verò ita depingit: Serpillū hortense odore samsticum imitatur, folia & ramulos organi habet, sed candidiores: sin maceris multo procerius assurgit, serpit humi. Sylvestre zygis appellatur, non serpit, sed in altitudinem crescit, ramulos edēs tenuēs, surculosos, foliis refertos longioribus, quā rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucundè olent, gustanti acres. Dioscoridæ opinioni subscribit Aëtius. Plinius verò contra, Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinē increscit, quod sylvestri euenit in puteis maximè: pinguius voluntarium, & candidiotibus foliis, ramisq; Dioscorides nil aliud inter hortense, & voluntarium discrimē apposuit, nisi quod hortense sua cultu edomita feritate, horridiori deposita facie ad speciosiorē habitū se redegit, horti q; deliciis nimia humoris copia luxuriās, longè magis saturatū viret, sic fracto rigore pristino, delicatius factū per se stare nequit, sed vietum per terrā serpit. Voluntariū autem, quod vernaculus rigortutatur, minus humi reptabit. Nescio igitur qua ratione ductus Plinius serpillū dixerit in hortis se in altū attollere, sylvestre verò terrā lambere. Theophrastus in eo negauit discrimina, quā lignosa sint specie simplicia, neq; differentias aliquas fortiri posse, præterquā sylvestre, & vrbānū, odoratū, & minus odoratū, quod diuerso solo, & cælo, & cultu mangonio ascribendū est, & potius ex ferocium, quā vrbānorum genere esse, quum ipse serpillum comperisset in montibus satyria odorē referens, nec vehementissimum illum quidem, sed mollem atque gratum, idque ferentes ex montibus deferunt, ut apud Sicyonem fieri solet, atque etiam Athenis ex monte Himetto, apud alios verò in Thracia. Sed nobis in Gargano monte, & in fageto Surrentino, aliisque sylvestribus locis, tum etiam in hortis luxuriosissimè excultis serpillum semper serpens, nec vnquam in altū surrectum, ac per se stans vidimus.

Colum.

Montes plerunq; eo scatere dixit Theophrastus, sicut in Thracia, Sicyone ex suis montibus, Athenis, ex Himetto. Montes item, & plana omnia serpillum scatere. Ocimum præterea soli expositum in serpillum transire, folio nanque minus, odoreque vehementius redditur, quippe cum alimentum minus habeat, quæ sicca sunt. Columella, locum apicum desiderare.

Squalorem

Squalorem p
ram gaudet. Co
ut quod macerit
deraliter sentit.
foliis radículas a
us frondescere, &

Seminio com
runt qui tritum,
testatur. Colum
ladius Martio m
Varro à Fauoni
ferri, Theophr
ramos ferit: na
cus ac hedera.
properant, sed
radices agunt, n
vel propagine se
ra: reliquis flori
complectitur.
Transferent
nam nisi purget

FERT & thy
nio placere
ratamella reddi

Redditq; ei
auguriumq; m
te: si defloruer
30 re. Apissimum
molum non co
mella & Pallad
apissimum, stu
Græcis thy
quali thyemo
Theophr
stendi potest,
sus frutex, exi
purpureo flore
40 fructus dulcissi

Squalorem patitur, aqua ei modica satis facit, & fimo præcipue iumento-
rum gaudet. Columella ait solum neq; pingue, neq; stercoreatum desiderare,
ut quod macerrimo solo per se maritimis plerisq; regionibus nascatur. Nican-
der aliter sentit. Serpillum sese diffundit, viuaq; viginosam pascit humum,
foliis radículas agentibus innixum, nam magna ex parte serpit. Palladius lati-
us frondescere, si iuxta piscinam vel lacû, vel putei margines cõseratur, scribit.

Seminio comprehendere pertinaciter contendit Theophrastus: nam fue-
runt qui tritum, exiccatumq; solo crediderint, nullum tamen erupisse germen
testatur. Columella verò semine feri docuit, circa æquinoctium vernum. Pal-
ladius Martio mense serpillum feri plantis, & semine, sed vetustate meliori.
Varro à Fauonio vsq; ad Arcturi exortum rectè serpillum è seminario trans-
ferri, Theophrastus quoq; auulsione feri dixit. Deferentesq; ex his auulsos
ramos ferit: nam & radices è germinibus suis quamplurimas dimittit, non se-
cus ac hedera. Tempus ferendi autumnus: hoc enim tempore omnes id ferere
properant, sed vere etiam feritur. Propagatur ex semetipso. Nicander, Folia
radices agunt, nam magna ex parte terram lambit, & noua continuo sobole,
vel propagine sese radicat: Interpres concinne subdit, non aliter quàm hede-
ra: reliquis floribus sese quadam vertigine conuoluens adrepi, depascensq;
complectitur.

Transferendum id sapius censent, quo latius surgat, purgariq; oportet:
nam nisi purgetur, perarefcit.

Dethymo. C A P. XXXIII.

FERT & thymum ramos odoratos, quibus coronæ intorqueantur, ut Pli-
nio placere videtur. Fert & odoratos flores apibus gratissimos, unde odo-
rata mella reddit. Virgilius,

Redolentq; thymo fragrantia mella.

Redditq; eius sapor præcipui saporis mella. Florenti apes decerpunt flores,
auguriumq; mellis est, prouentum enim sperant apiarii, largè eo efflorescen-
te: si defloruerit, æstiuam mellatio minus proba sequetur, Theophrasto autho-
re. Aptissimum existimatur è thymo mel, coloris aurei, saporis gratissimi, thy-
mosum non coit, ex Plinio. Varro optimum mel è thymo fieri dicit, sic Colu-
mella & Palladius. Et condimentorum etiam gratia, quum sit condimentis
aptissimum, studiosè nostro horto conserendum venit.

Græcis *θύμος*, ab excitando, quod *θύειν* dicunt, nomen inuenit. Alii thymos, *Nomen*
quasi thymos, hoc est, sanguinem impellens. Latinis thymus. Italis, *timo*.

Theophrastus setò florere, nam circa æstiuum, scripsit. Semen nullum o-
stendi potest, sed floribus quodam permiscetur modo. Dioscorides. Surculo-
sus frutex, exilibus foliis multis, & angustis circumdatus: capitulis in acumine
purpureo flore referis. Percontatur Aristoteles, cur in solo Attico cæteri
fructus dulcissimi fiant, thymum inibi acerrimum? Diluit controuersiam,

quòdager ille tenuis, siccusq; est, quaq; in eo nascuntur, parum humoris possident, fructus, qui dulces sunt dulciores redduntur, qui verò sicci, sed minime dulces proueniunt, inopia sui humoris, retinent quantum suo conueniat generi. Sol dulcissimum, ac leuissimum eximit, quapropter qui superuacuo humore carent, acerrimi relinquuntur.

Genera.

Duo genera describit Theophrastus, candidū, & nigrum. Plinius candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & præfertur, nigrum floris nigri.

Colum.

Quòd flatus à mari peruenire nequit, illic nasci, durareq; posse omnino negant. Quade causa nec in Arcadia satureia & organum prouenire possunt, dixit Theophrastus. Vidimus ex Aristotele in Attico solo acerrimum prouenire. Athenæus optimū prouenire in Himetto scribit. In Gaditano freto transfigurari in lapidem. Plinius. Mellis Attici in toto orbe summa laus existimatur. Ergo translatum est ex Attica thymum, & vix flore satum. Sed alia ratione naturæ obstitit non durante Attico thymos nisi in afflatu maris. Erat quidē hæc opinio antiqua in omni thymo, ideoq; non nasci in Arcadia Palladius aprium agrum quærere dicit. Thymum è Thyna laudatur ab Hippocrate. Est autem, ut inquit Galenus, Thyna quidam in Thracia locus.

Solum.

Dioscorides gracili & petroso solo prouenire ait. Columella neque pinguem, neq; stercoreatum, sed macerimum solum diligere ait, utpote quod in maritimis regionibus reperitur. Plinius. Nunc provincia Narbonensi lapidei campi thymo scatent. Nos Garganum montem, & latos Apulia campos thymo optimo scaterere vidimus.

Satio.

Semine feritur. Sed thymi semen fallit, nec potest comprehendī, unde flore satò nascitur, qui tamen Athenis deportare desiderant, quærunt, atq; inveniunt. Thymū flosculis suis nascitur. Hæc Theophrastus. A quo Plinius. Semen thymi non potest deprehendi, cum origani perquam minutum, non tamen fallat. Sed quid interest occultasse id naturam? In flore ipso intelligitur, satòq; eo nascitur. Quid nō tentauere homines! Columella. Melius thymi nouellas plantas disponere, quæ quum subactò solo depressæ fuerint, ne tardè comprehendant, aridi thymi fruticem contundi oportet, atq; ita pinfito, pridie quàm volueris vri, aqua medicare, quæ, quum succum eius perceperit, depositis fruticibus infunditur, donec eos rectè confirmet. Palladius Septembri mense thymum ferit, sed melius plantis nasci, quamuis possit & semine.

De sisymbrio. CAP. XXXIIII.

SISYMBRIVM quum odorata sit planta, vniuersa suis foliis coronat, ut Theophrastus, & ab eo Dioscorides & Plinius docuerunt. Præterea eius sacumina, turionesque acetariis immiscentur, condimentis que & iuribus innotant, quamobrem alienum non videtur si nostro hoc in hortulo sibi locum vendicauerit.

Nomen.

Græci σισυμβρον, Damageron verò σισυμβρον dicunt. Latini sisymbrium. Pti-

tat Varro à Sisypho
xisse. Nonnulli
quam præfert. e
nibus suis bland
rius quòd sisymb
bitu concinne co
nauit. Itali sisymb
Et si Theophr
banū, aut syluest
syluestris, & latu
Cremium sisy
terre corio inni
Atqui ratio exig
idē etiam in odo
Dioscorides me
nius, Quod in sic
Addimus: folio
tenus purpurasc
to semper ambit
Syluestre Pliniu
gnitudine. Aqua
ait, iisdem locis q
da, adulta eruge
ima sui parte plu
nis citri frequent
emicat orbicular
exaucte sisymbriu
etiam accuratē in
Damageron,
30 quæ areas in opa
us, Sisymbrio ma
iis aunos ramos
Dioscorides in
cardaminam vo
Semine non
seuisse se inquit
fecisse affirman
semine dicit, &
doret, radices
40 hedera. Damag
dam oculum app

erat Varro à Sifymbrio, quæ fuit veteribus comædiis meretricula, nomen traxisse. Nonnulli coronam Veneris vocant. Vel quod ob odoris suauitatem, quam præfert, eo iuuentus, quæ amoribus gaudet, coronata, in comestationibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras commendaret, vel potius quod sifymbrii caulis, articulatum per internodia verticillato florum ambitu concinne coronetur, ab eleganti igitur corollarum venere nomen deriuauit. Itali *sifymbrio*.

Etsi Theophrastus simplex esse genere scripserit, quæ lignosum sit, nec vrbani, aut syluestre, odoratum, aut minus odoratum esse, libro ramen de causis syluestris, & satui meminit. Dioscorides aquatici, quod alii cardamina vocant.

Cremium sifymbrium est. Radice lignosa, multo fida, retorrida; summo terre corio innixa. Planta suauiter olet, flores inodori, vt omnibus contingit. Atqui ratio exigit, vt quod in cæteris quamquæ inodori odoratissimum est, idem etiam in odoratis sit odoratissimum. Hæc satui Theophrasti descriptio est. Dioscorides mentæ hortensis similitudine, dicit, odoratus, latiore folio. Plinius, Quod in sicco ortu, odoratum est, & inseritur coronis, angustiore folio. Addimus: folio serrato nigriore, & paulo rotundiore, caule quadrato, quadamtenus purpurascens. Flosculis internodia geniculatim cingentibus verticillato semper ambitu, reliquis mentæ emulatur, sed odorem acriusculum vibrat. Syluestre Plinius à quibusdā thymbræ appellari ait, pedali non amplius magnitudine. Aquaticum, quod alii cardamina vocant, Dioscorides riguis gaudere ait, iisdem locis quibus lion. Gustu nasturtium representat, folia primum rotunda, adulta erucæ modo finduntur. Addimus, Caule proflit cauo sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarum eamnis cirri frequentes sinuatim erumpunt, candido flore, folio inter initia quum emicat orbiculato, quum succreuit in erucæ folium laciniatum finditur, nec exactè sifymbrium aquaticum noueris, nisi iuuentam primam, deinde senectam accuratè inspexeris, quum folia mutant subinde faciem.

Damageron, Siri gaudet aprico, sole iugiter illustrato, arboribus expedito, quæ areas inopacent: nam latius prouenit, quum libero fruitur cælo. Plinius, Sifymbrio montes plerique scatur, sicut in Thracia, vbi aquæ deferunt ex iis auulsos ramos, feruntque.

Dioscorides inculto solo nasci scribit. Alterum verò sifymbrii genus, quod cardaminam vocant stagnorum vernacula, & laueris comes.

Semine non feritur: nam eo carere affirmant, sæpe enim exiccatum, tritumque; seuisse se inquit, sed nunquam germen erupisse, & huius quoque periculum se fecisse affirmant, unde natura è syluestrium genere esse. Sed Damageron feri semine dicit, & tertio anno fructum dare. Cacumine feri etiam Theophrastus docet, radices enim è germinibus suis quamprimum emittunt, non secus ac hedera. Damageron. Si quis à vertice radice, ex quo germen habet, quod quidam oculum appellant, plantent, eodem anno fructum producet.

Genera.

Descriptio.

Column.

Solum.

Satio.

humoris possi-
ccci, sed mini-
uo conueniat
ui superuacuo

ius candidum
ris nigri.

è omnino ne-
te possunt, di-
um proueni-

o freto trans-
laus existima-

. Sed alia ratio
Erat quæ hæc

Palladius apri-
ocrate. Est au-

la neque pin-
pote quod in

onensi lapidei
campos thy-

di, unde flore
atque; inueni-

nius. Semen
non tamen

lligitur, sæpe
hymnouellas

ardè compre-
pidie quam

depositis fru-
embri mensè

e.

s coronat, vt

Præterea eius
& iuribus in-

lo sibi locum

mbrium. Pu- 49
tat

Calim.

Continuò rigari oportet, sin aliter, obarescit, & continuo transferri debet, nam si olitor non excoluerit, sed neglectum omiserit, odore in mētā deficiet, specie verò in calamintā, ut permulta etiam, quæ cultu omisso in sylvestrem sortem redeunt: nam radices altius agit, in quam partem tota vis conuersa decumbit, eaque superiores partes spoliatae redduntur infirmiores, & illam odoris fragrantiam exuunt, quæ postquam exoleuit, reliquus odor elanguescens, edomitusque, proximè ad mentā accedit. Argumento est, quod agreste hysmbrium talem reddit odorem. Speciem tamē calamintæ accipit similem, omne namque in simile sibi quiddam mutatur, non in remotum penitus: quod ne eueniat, est apud agriculturæ consultos tradita ratio sapius transferendi, ut sibi novos natales quotannis adsciscat.

De sampfuco, siue amaraco. C A P. XXXV.

SAMPFUCUM sua perpetuo virens coma, & odore, quem tota planta suauissimum expirat, ceteras herbas antecedens, ad coronamenta quæ suum est, suisque ramis coronas intorquet Dioscoridis, & Plinii autoritate. Catullus etiam,

*Cingite tempora floribus
Suaueolentis amaraci.*

Poeta de amaraci umbra, cuius opacitate mollior fieret Ascanii somnus, hæc cecinit:

*At Venus Ascanio placidam per membra quietem
Irrigat, & fotum gremio dea tollit in altis
Idalia lucos, ubi mollis amaracus illum
Floribus, & dulci aspirans complectitur umbra.*

Amaracum comitatur hæc fabula. Amaracus Cynaræ Regis Cypri puer, dum ferret vnguenta, casu quodam lapsus, alabastrum confregit, qui quum nimio dolore confossus intabuisset, versus est in sampfucum. quæ herba ex eius nomine cœpta est amaracus appellari. Sed Athenæus autoritate Apollodori libro de vnguentis coronam ex amaraco compositionibus inutilem esse iudicauit, & quicquid grauare, & oppleri alioqui posset. Palladius apibus gratissimum dicit.

Nomen.

Græcis αμαρυγών, & αμαρυγών. Dioscorides scribit: sampfucum gens Sicula, & Cyzicena amaracum appellat. Diocles libro de medicamentis lethalibus scribit amaracum à quibusdam vocari sampfucum. Plinius. Amaracum Diocles Medicus, & Sicula gens appellauere, quod Ægyptus, & Syria sampfucum. Latini sampfucum, & amaracum. Veteres Poetae modo sampfucum, modo amaracum vocant. Sed contraria sunt sententia Galenus, & Paulus, & longè aliter de amaraco sentiunt, nam à sampfuco & viribus & natura dissidere. Sed hi amaracum pro parthenio assumunt, ut videre est in eorum scriptis. Itali maiorana, & persa.

Sampfucum

Sampfucum (sua)
Radix ei lignosa re
state, non omne
mollior iucundus
scens per quoddam
rem reddit. Vnā e
cessar accessio, &
fit, ut à suis decerp
acres habet odore
10 foliis calamintæ
maioranā, quam
lis, cādicans, & su
foliola penè rotu
exiguus, oblongis
obliquioli, ut in
Est apud nos m
or, odore præstan
phraiti sampfucu
Athenæus tra
10 eumque florem al
20 odoratissimum.
fuit, Poetae adul
alabastrum vng
sum, quam samp
Seritur semine
pere viuax, ex Th
rinus. Sampfucu
dum odorem ha

Den

30 V ENIT &
nam vocat
men herba ferre
breuissimis, ex
cebat: mellotru
ser quod coron
Et
Præterea m
bat Plinius. C
les æstus arcer
40 Græcis αμαρυγών

Sampfucum suffrutex est ex Theophrasto, & perpetua fronde comatur. *Descriptio.*
 Radix ei lignosa, retorrída, summo cespite leniter hærens, multifida. Floret æstate, non omnè, sed quod Phrygium cognominant. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus: quia terreno aquosa vis admiscetur, ad vetustatem exarescens per quoddam temporis spatium, validius odorem vibrat, & acrem odorem reddit. Vnà enim & quantum humoris aquosi est, exhalatur, & alimenti cessat accessio, & quædam veluti coctionis, aliquid per se ipsa recipiunt. Vnde fit, ut à suis decerpta arboribus odoratiora reddatur. A quo Plinius. Amaracus acres habet odores. Dioscorides autem, Herba est ramosa per terram repens, foliis calaminthæ tenuifoliæ hirsutis, & retorridis. Nos describemus nostram maioranā, quam verum sampfucum credimus. Maiorana suffrutex est humilis, cādicans, & suavis odoris, surculis tenuibus, in plures alas diuisis, circa quos foliola penè rotunda, incava, mollia. In summo flosculi candidi, pusilli, spicis exiguis, oblongis, & squamatis cāpactilibus, radicibus tenuibus. Ramuli tam obsequiosi, ut in quamcunq; volueris formam topiario opere, facile effigies. Est apud nos maior, & minor species. Sed minor est foliis, & ramulis tenuior, odore præstantior, nobis dicta *maiorana gentile*, æstate florens, puto Theophrasti sampfucum Phrygium, & Dioscoridis legitimum marum. *Genera.*

Athenæus tradit multos interpretari naucratice coronam ex amaraco, eumq; florem abundare in Ægypto. Plinius in Cypro laudatissimum esse, & odoratissimum. Et quia ex Cypro antiquitus amaracus ad vnguenta expetita fuit, Poëtæ adulati Cypro regi Cynaræ, fabulati sunt Amaracum puerum alabastrum vnguenti fregisse, præq; luctu intabuisse, & in amaracum versum, quam sampfucum Ægyptus & Syria dixerent. *Colum.*

Seritur semine & auulsione. Sed planta transferenda est viuiradix, magno pere viuax, ex Theophrasto. Plinius ab eo. Seritur semine, & ramo. Florentinus. Sampfucum ex semine seritur, & transplantatur Aprili, & Maio, iucundum odorem habens, & calidissimum. *Satio.*

De meliloto, siue fertula Campana. CAP. XXXVI.

VENIT & in coronamenta meliloton herba, quam fertulam campanam vocant, coronas enim ex hac antiquitus factitatas indicium est nomen herbæ fertulæ, quod occupauit, placetq; maxime foliis pinguisimis, atq; breuissimis, ex Plinio. Pherecrates in hominem, qui suauiter loqueretur, dicebat: melilotum loqueris; quod herba suauiter oleret. Cratinus etiam recenset quod coronaria esset herba.

Et hederæ floribus, meliloto circumsepiente caput.

Præterea maximè aluearia curantibus conuenit meliloton serere, scribebat Plinius. Coronas etiam texuerunt prisca, quibus caput redimendo febribus æstus arcerentur.

Græcis *μελίλον*, Latinis melilotus dicitur, & fertula Campana. Cato fertu. *Nomen.*

H H h

lam Campanicam vocat. Columella quum de fruti condimenta describit, eamdem nominat. Plinius, vt diximus, causam nominis reddit, quod ex hac antiquitus fierent coronæ. Melilotum dixerunt, quasi melitam lorum.

Descriptio. Postquam inaruerit vegetiorem odorem reddere tradidit Theophrastus. Dioscorides, Eius odor vicinus est croco, boni odoris. Plinius, foliis breuissimis & pinguisimis, odor eius croco vicinus & flos, ipsa caua: vbicunq; verò recens, nec candicans, & croco quàm simillima.

Fruticat ramosis cauliculis hinc inde deflexis, geniculis distinctis, vnde emicant folia in pediculis terna, flores lurei, pallidi, certa serie & modo, vt in securidica, semen fœnugræci in vaginulis contentum. Sunt & apud nos duæ aliæ species huic persimiles.

Colum. Dioscorides in Attica laudatissimā dicit, & Cizico, & Chalcedone natam: nasci & in Campania circa Nolam. Ab eo Plinius. Est in Campania Italiae laudatissima, Græcis in Sunio, mox Chalcidica, & Cretica.

Solum. Vbiq; verò asperis, & syluestribus nata. Melilotos vbiq; nascitur, ex Plinio.

De trifolio asphaltite. CAP. XXXVII.

FOLIO etiam coronare trifolium, Plinius dixit. Minyanthes vocant Græci, alii asphaltion maiore folio, quo vtuntur coronarii.

Nomen. Græci τριφυλλον. Dioscorides manianten, vel asphaltion vocat. Plinius dixit serpentes nunquā in trifolio aspici. Præterea celebratis authoribus contra omnia venena pro antidoto sufficere xxv grana eius, quod minyanthes ex eo appellauimus, tradi. Asphaltion etiam dici, quod folia vbi adoleuerint, bitumen oleant. τριφυλλον Nicandro dicitur in antidoto aduersus serpentes. Archigenes asphaltitin. Latini trifolium dicunt. Neapolitani *fasolara*.

Descriptio. Dioscorides ita illud delineat. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues nigras, vnde ramulares adnascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loco arbori similia: iis recentior enatis, ruta odor ineft, vbi autem adoleuerint, bitumen olent. Florem edit purpureum, sed quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera summitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Columella ita describit: Odore graui, nec ab simili bitumini, longis hirsutis foliis, caulem robustiorem, quàm pratense habet. Nicander in Theriacis ita de eo,

A tribus hinc dictam foliis, si sumptis herbam,
Non leue praesidium contra illa venena pararis,
Sunt, & qui minyanthes eam, sunt qui tripetelox.
Appellant, qualis loto est, apparet imago,
Et similem ruta, donec viget, edit odorem.
At flores vbi magna suos, adnataq; membra
Ceperit, ingratum solet eructare bitumen.

Colum.

Columellalo
et, immo mons
Vnde solo potu

TROIANI
dat, & inter

Quos
Lotu

Loti Theophr
Aon; Theophr
stat. Dioscoride
videtur dici, qua
rum lubescencia
oriatur. Latine
poli tripoli dicit
ad odoratam aq
Dioscorides h
ex genere trifoli
los, & folia è ge
bitiora, subpalli
Loti herba na

QVVM ram
natis her
Poeta lachrym
serpentis idu ex
in se medicâ fac
quumq; corpus
gratiam iis, ven
eidem pota in v
ro, quod eo trit
Hippocratis tes
la, per se stomac
modis austerit
quidq; dulci
bus modis, &
caryotis. Alio
pere aut thym
me lulia Augu
ras. Quum eiu

Columella locis confragosis nasci ait. Totus Neapolitanus tractus his sca- Solum
 zet, immo mons Neapoli imminens ab eiusmodi trifolio, Trifolinus dictus.
 Vnde solo potius tenui, & aprico gaudet.

De loto satina. CAP. XXXVIII.

TROIANTS temporibus erat honos floribus, quorū Homerus tres lau-
 dat, & inter herbas subnascētes deorū voluptati, lotos prima nominatur:

*Quos subter terra diuum procreauit nouam herbam,
 Lotumq; roscidam, crocum, & hyacinthum.*

Loti Theophrastus meminit inter herbas, quibus in vnguentis vterentur.
 10 **Λωτός** Theophrasto auctore, æquiucum nomen, formisq; pluribus con- Nomen
 stat. Dioscorides **λωτός ἡνσιος**, Latine lotus urbana. alibi trifolium vocat. **λωτός**
 videtur dici, quasi voluptas, à verbo **λω**, videturq; Homerus alluisse ad deo-
 rum lubescētiā, & vocat roscidum, vel quod paradisis, & lætioribus locis
 oriatur. Latine lotus urbana, ac trifolium dicitur. Hinc de flexo nomine Nea-
 poli *tripoli* dicitur, quasi odoratum trifolium. Hodie colitur, decerpiturq;
 ad odoratam aquam conficiendam ab vnguentariis.

Dioscorides hanc describens paucis contentus est. Est herba tota odorata, Descriptio
 ex genere trifolii, caule bicubitali, & foliato, odore eximio ac suauī. Pedicu-
 los, & folia è geniculis educta trifolii pratenſis, ambitu oblique dentata, ha-
 20 bitiora, subpallida: decerpta, & exiccata, etiam odorem retinet.

Loti herba non nisi post annum è suo semine nascitur.

Sativa.

De helenio. CAP. XXXIX.

QVVM rami & folia odorata sint helenio, iure à Theophrasto inter coro-
 natias herbas connumeratur, quæ folio coronat, itemq; Plinio. Narrant
 Poëtæ lachrymis Helenæ natum dum gubernatorem Canopum Hemorrhoi
 serpentis ictu exanimatum fleuisse. Celant sub hac fabula Poëtæ huius herbe
 in se medicā facultatem, quod & faueat formæ, cutem in facie incompram, reli-
 quumq; corpus perpetua venustate condecorans. Præterea eius vsu quādam
 gratiam iis, veneremq; conciliari putant. Attribuunt etiā hilaritatis effectum
 30 eidem potæ in vino, eumq; quæ habuerit nepenthes illud prædicatū ab Home-
 ro, quod eo tristitia omnis aboleatur. Animienim nubila præclare discutere ex
 Hippocratis testimonio creditur. Breuior his est, sed torosior, amariorq; inu-
 la, per se stomacho inimicissima, eadem dulcibus mixtis saluberrima. Pluribus
 modis austeritate victa gratiam inuenit: nanq; & in pollinē tunditur arida, li-
 quidoq; dulci temperatur, & decocta posca, aut asseruata, vel macerata pluri-
 bus modis, & tūc mista defruto, aut subacta melle, vniſve passis, aut pinguibus
 caryotis. Alio rursus modo coroneis malis, vel sorbis, aut prunis, aliquando pi-
 pere aut thymo variata, defectus præcipue stomachi excitat, illustrata maxi-
 me Iuliz Augustæ quotidiano cibo. Docet & alia Columella ad inulæ cōditu-
 40 ras. Quum eius radicē mense Octobri, (quo maximè matura est) è terra erue-

ris, aspero linteolo, vel etiam cilicio detergito quicquid harena inherebit, deinde acutissimo cultello summum eradito, & quæ plenior radícula fuerit, pro modo crassitudinis in duas, vel plures partes digiti longitudine, diffundito: deinde ex aceto modicè in cacabo a neo coquito, ita ne taleolæ inuri possint. Post hac in umbra triduo siccantur, & ita in fideliam picatam recondantur, adiecto passo, vel defruto, quod supernatet, spissamentoque cunilæ imposito contectū vas pelliculetur. Alia inulæ conditura. Quū radices eius raseris, taleolas, ut supra, facito, & in umbra triduo, vel etiā quatruiduo siccato, deinde siccatas in vasis sine pice, interiecta cunila, coniicito, cunila imposita, sex partibus acetæ una pars saporis misceatur cum hemina salis cocti, ut hoc iure maceretur taleolæ, donec quam minimum amaritudinis respiciant. Postea exēptē iterum siccantur per dies quinque in umbra, tum crassamentum vini faculentum, nec minus, si sit, mulsi, & utriusque eorum quartam partem boni defruti confundito in ollam, quæ quum inferbuerit, taleolas inulæ adiecto, & statim ab igne remoueto, ac rudicula lignea peragito, donec perfectè refrigescant. Postea transūdito in fideliam picatam, operculo tegito, tumque pelliculato. Tertia eiusdem inulæ conditura. Quum radículas diligenter eraseris, minutè conscissas in muria dura macerato, donec amaritudinem dimittat. Deinde effusa muria sorba quam optima, & maturissima semine detracto contere, & cum inula misce, tum siue passum, seu quā optimum defrutum adiecto, & vas obturato. Quidam quum 20 condierunt inulam, muriaque macerauerunt, exiccant, & malis cydoniis tritis, quæ in defruto, vel melle decoxerant, miscant, atque ita superfundunt passum, vel defrutum, & vas operculatum pelliculant.

Nomen.

Græcis *ἑλένιον* dicitur, Latinis helenium à luctu vel fatu Helenæ, vel quia in Helena insula laudatissimum. Columella inulam vocat. Neapolitani *enula campana*.

Cremium esse narrat Theophrastus, radice lignosa, retorrída, & multifida, summo terræ adherente. Ramis & folio odorato. Flore inodoro. Siccis locis acris redolet, mollius autē, quum in urbanū habitum traducitur. Dioscorides alterum helenium ita describit, quod Cratenas Medicus tradit. Herba est, cubitalibus ramulis, serpilli modo per humū repentibus, foliis lenticulæ circa ramulos, sed longioribus, crebris, radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassā, cortice nigro. Primū genus folia verbasci habet angustioris folii, asperiora, oblonga, caulem quibusdam in locis non emittit, radicem subalbidam, interdum subruffam, odoratam, subacrem, vegetam, magnam. Plinius de primo. Est succi prædulcis, radix est intus candida, & dulcis: breuior, torosior, amariorque quàm siser, per se stomacho inimica. Sed mendum in Dioscoride, quippe non verbasci angustii folii, sed platyphylli folia habet. Apud nos florem fert buphtalmi aureum, stellarum, fundente scapo recto in summo Iunio, & Iulio, tres aut quatuor cubitos, aut plus procero, radicis amplæ, & crassioris, odoratæ, carpum ferè æquantis. 40

Quum

Quum lignosa
olet. A Dioscoride
Primum genu
coque solo. Secu
to, & pastinato lo
Theophrastus
quiunt, sed nunqu
pagines liliorum,
da est, ut maiora c
nit, quoniam vast
est alius cultus ip
autem deponent
dius. Februatio n
ut calami, quos ab
acta, excitatis ad li
pedum spatio inter
oculis radice exci
terualis, nullave n

20 BACCARIS
non solum co

Cingit

Dioscorides for
Plurarchus Symp
blandum floris eff
liares, aspritudin
quillitas, crapula
perducit. Vestib
30 vnguentum fieri
Athenaus idem n
Dioscorides B
dita propter exim
multa alia, tum
ex qua ferta con
lis baccari.
Dioscorides i
& verbascum, ang
circa quem colicu
40 dicante, odorato

Quum lignosum sit simplex specie à Theophrasto ponitur. Agreste suauius Genera.
olet. A Dioscoride tria recensentur genera.

Primum genus à Dioscoride in montibus vmbrosis provenire dicitur, sic Solum.
coque solo. Secundum genus in Ægypto in maritimis collibus. Columella al-
to, & pastinato loco. Plinius in Helena insula laudatissimum.

Theophrastus semine carere ait, saepe enim exiccata, tritaque seruisse se in-
quiunt, sed nunquā germen erupisse. Dioscorides: è suis radicibus agnatæ pro-
pagines liliorum, aut ari modo feruntur. Columella, Quā rarissimè ponen-
da est, vt maiora capiat incrementa, trium verò intervallo pedum feri conue-
nit, quoniam vastos facit frutices, & radicibus vt oculus harundinis serpit, nec
est alius cultus ipsius, nisi vt sarritionibus herbæ tollantur. Commodissimè
autem deponentur prima parte Septembris, vel vltima Augusti parte. Palla-
dius. Februario mēse inula ponitur, quo canneta ponuntur. Seritur oculis, sic-
ut calami, quos abscindere, & terra leuiter debem⁹ obruere, terra fossa & sub-
acta, excitatis ad lineam puluinis, quibus eius oculos oportet infodere, trium
pedum spatio inter se separantur. Plinius, Superuacuum eius semen, quoniam
oculis radice excisis, vt harundo seritur, vere, & autumno, magnis seminum in-
teruallis, nullāve minus, quā ternorum pedum, quoniam spatiosè fruticat.

De baccari. CAP. XL.

20 **B**ACCARIS è coronario genere, vt Dioscorides testatur. Virgilius Maro
non solum coronariam stirpem, sed fascini depulsoariam scripsit.

— baccare frontem.

Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

Dioscorides somnum suo odore accerere scripsit, & Plinius. Cuius causam
Plutarchus Sympotiacorum tertio quærit. Causatur enim leuem auram, &
blandum floris effluuium, quo in temulentorum corporibus obortæ in aqua-
liates, aspritudinesque sensim dissipantur, & exteruntur, conciliaturq; tran-
quillitas, crapula retunditur, excoquiturq; vnde ad placidam quietem potos
perducit. Vestibus etiam odoris gratiam inserit, ex Plinio. Ex cuius radicibus
30 vnguentum fieri apud Aristophanem antiquus comedie author testis est, &
Athenæus idem memorat.

Dioscorides Βάκχαρι vocat, nos poti⁹ πίνχαρι putamus, nomen elatura in-
dita propter eximiam fragrantie gratiam cinnamomeæ radicis, ex qua cum
multa alia, tum vnguen conficiebatur. Et πίνχαρι apud Athenæum legitur,
ex qua ferta concinnabantur, qua tempora cingebantur. Latinis baccaris. Ita-
lis baccari.

Dioscorides ita delineat. Aspero fruticat folio, magnitudine inter violam
& verbascum, anguloso caule, iustam cubiti altitudinem ex æquāte, subscabro,
circa quem coliculi agnascens modo sobolis fundatur, flore in purpura can-
40 dicante, odorato. Radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cina-

momo proximus. Plinius. Radices tantum odorata, odor cinnamomo proximus. Nos apud Gatiliani fluminis pontem, via qua Romam itur, copiosissime fruticare vidimus. Erat enim foliis asperis, veluti lanuginosis, subrubenti caule, radice cariophyllata, odore balante præstantissimi & suauissimi cinnamomi.

Gracili solo, nec humido prorumpere scripsit Plinius à Dioscoride, qui squallidum, & asperum dixit.

De rosmarino coronario. CAP. XLI.

LIBANOTIS coronarius frutex non solum coronis acceptus, Dioscoride auctore, quum eius folia thus redoleant, sed & topiarius: nam apud nos hortorum areas tam eleganti conuexit opere, ut nullum non animal olitoris mangonio suffragante confingat. Præterea fictilibus vasis plantatur, ut folio, quo semper comatur, & odore suo ædium fenestras exornet. Expetitus etiam culinis, quum eo ad multa condimenta utantur. Præterea ad mellificia optimus: quippe Varro ex rosmarino apes mel spissum facere dixit: Columella idem scribit itemque Palladius. Libanotim hæc Græcorum fabula comitatur. Libanotim tradunt fuisse adolescentem Assyrium, deos studioissime colentem, quem inuidia mali homines peremerunt. Dolens eius vicem terra, in fruticem emortuo gentilis corpore transtulit, seruato priore eius ingenio, & desiderio, quod erga deos habuit. Hoc verborum inuolucro innuunt Græci thure nil esse diis gratius, unde thuriferis fruticum odoribus numinibus supplicandum Deumque thure nobis reconciliandum.

Nomen.

Græcis λιβανότης ῥοσμάρικη dicitur, quasi rosmarinus coronarius. Cassianus Græcus δένδρον λιβανόν vocat, quasi arborecentem, ad differentiam herbacei. Latinis libanotis coronaria accepto nomine à libani, siue thuris odore, quem redolet, adieciimus coronariam ad differentiam umbelliferarum libanotidum aliarum. Romani rosmarinum vocant. Neapolitani *rosmarino*.

Descriptio.

Dioscorides ita describit. Ramos emittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incaua, supernè virètia, grauitè odorata. Addimus nos. Flore caruleo, bis florens anno, vere & autumno. Semine atro, exili, refidet sub flore, calice triangulari, tria continens acina, quæ non ubique producit, sed Apuliæ vidimus.

Celum.

Gaudet cælo aprico, calido, vel temperato. Frigidis regionibus Meridiei exponatur.

Solum.

Solo leui, & sicco, vel sterili, & collibus maritimis gaudet: unde nomen rosmarini.

Satio.

Propagine, & auulsione feri narrat Plinius, quum semine careat. Democritus autem viuiradice, vel auulsis ramis in terra depactum, & humatum mense Martio. Sed ramulus biennalis, vel triennalis esse debet. Figatur solo, ac circum circa terra optimè calcetur, continuè aquationibus blandiatur, donec radicularum iniecisse noueris: idque Martio mense, quum germinare gestier. Po-

test

test & semine feri-
maturum fuerit, co-
solo, & in areolis di-
Martio mense, vel
ennat.

VENIT & in
demque apibu-
dent, ut ab eisdem
strum, & examen
pialtro. Idem Col-

Triana

Præterea sale,
Græcis μαλίσσιν
statione sibi usur-
thoritate. Palladi-
nam si naves consue-
Neapoli deflexo n-
Dioscorides ita
ra, tenuioraque, nec
fert flores albidos,
Duo apud nos ge-
tur, cimum odor-
hoc fortasse Pallad-
herbas enumerant

PSEUDONAT
ut flores omn-
vestibus iniecta, e-
posita ad varios od-
Primum genus
men sibi arrogauit
suauis spirent odor-
fit, cuius veteres
eruditè suspicari
neis, & hominum
Stirps est humi-
bitalis, aut longio-
40 gusta, colore ab y-

test & semine feri, quum semen habere compererimus. Iulio mense, quum maturum fuerit, colligitur, priusquam decadat, insolatur, inde altè pastinato solo, & in areolis diuiso feritur, leui terra superiniecta irrigando semper, idque Martio mense, vel Septembri. Cultu lætius luxuriat, adultior, & procerior perennat.

Demelissophyllo. CAP. XLII.

VENIT & in coronamenta folio melissophyllum, Plinii auctoritate, idemq; apibus gratissimum. Hoc enim flore mirum in modum gaudent, ut ab eisdem nomen acceperit. Varro ait. Apes maxime sequuntur apiastrum, & examen ubi volunt confidere, eum ramum, aliamve rem oblinunt apiastro. Idem Columella, Plinius, & Palladius. Virgilius item,

— in iussos sparge liquores,

Trita meliphyllo, & cerinthe ignobile gramen.

Præterea sale, oleo, & aceto condita in acetariis maxime expetitur.

Græcis *μελισσοφυλλον*, sine *μελισσοφυλλον*, siue melittena, id nomen ab apum delectatione sibi usurpasse ait Dioscorides. Apud Latinos apiastrum dici Plinii auctoritate. Palladius melissophyllum, & citraginem ab odoris similitudine scribit: nam si nates consulantur, citreum malum olent. Varro apiastrum: ab citro Neapoli deflexo nomine, *citrara* vulgò dicitur.

Dioscorides ita delineat. Cauliculi & folia ballotæ familia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec hirsuta ita spectarentur. Citreum malum olent. Addimus: fert flores albos, in verticillis copiosos.

Duo apud nos genera, in hortis vnum, in syluis alterum: quod hortis feritur, cimum odorem magis refert, alterum veluti ocimum citratum olet. De hoc fortasse Palladius intellexit, quum citraginem à melissophyllo distinxit, herbas enumerando, quibus apes delectarentur, Aprili, & Iunio.

Depseudonardo. CAP. XLIII.

PSEUDONARDVS odora stirps flore, & fronde, tanti odoris fragrantia, ut flores omnes, & herbas prouocet. Huius maximus apud nos vsus: nam vestibis iniecta, eas odore comendat, & cacumina manipulatim in scopis composita ad varios odorū vsus reponuntur. His dotibus nostro horto sereda venit.

Primum genus quia non minus, quam nardus suauis spirat odore, spicæ nomen sibi arrogauit, vulgò *sticados*. Alterum genus, quod folia, & flores minus suauis spirent odore, pseudonardum vocare libuit, quod genuina nardus non sit, cuius veteres scriptores meminerunt. Saliuncana esse Virgilianam multis eruditis suspicari placuit. Neapolitani *lauanda*, & *lauandula* vocant, quod balneis, & hominum lauacris expeteretur.

Stirps est humilis, virgas profert tenues, quadrangulares geniculatas, cubitales, aut longiores, flores circa singula genicula bina, carnosa, oblonga, angusta, colore ab utraq; parte languido in candidū vergente, perpetua canescēs

coma, in summo frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis refertis purpureis, radice lignosa, in fibras diuisa, exitu veris, Iunio, & Iulio mensibus spicatur.

Solum.
Satio.

Gaudet apricis, & petrosis.

Seritur viuiradicibus à matre diuulsis, Octobri ac Nouembri mēsis. Seritur & cacumine. Sed Martio mēse, terra circum optimè calcata, vetustate deteriorescit. Eius vita ad quatuor annos. Sed cespes in plures plantulas diuiditur, & singula quatuor pedum interuallo separatim plantantur.

De hedera. CAP. XLIII.

HEDERÆ folia in coronamenta venire, eiusque corymbi in his obtinēt principatum, ut author est Plinius. Placet corymbis & flore: nam odor abest. Ferunt primum omnium Liberum patrem coronam imposuisse capiti suo ex hedera. Cyllon Liberi patris fuisse adolescentem, & saltatorem Græcia confinxit, qui coram Deo tripudians, allisus terræ periit. Terra in Bacchi honorem in sui nominis fruticem conuertit. Germen è terra progressum vitem amplecti solet, modo quo adolescens Bacchum in tripudiis amplecti consueuerat. Hæc in tutelam Liberi patris putabatur esse, tū quia primus in Græciam ex Indis exportauit, tum quia, ut ille iuuenis semper, ita hæc semper virens, & sicut ille hominum mentes, ita hæc omnia illigat. Quærit Plutarchus, cur flamen dialis si hederam attigisset piaculum cōmisisset. An quod hederam tanquam sterilem, & hominibus inutilem, & propter fragilitatem adminiculo egentem, solum vmbra & viriditate oculos capientem non temere in ædibus aliæque innasci permiserunt? quippe quæ plantas complexa maximè noceret, nec solo extirpari facile possit, quo fit ut cœlestium templis penitus amoueatur, ut in æde Iunonis Athenis, ac Thebis in æde Veneris. Nocturnis verò Bacchanalibus adest, ut à Thyasis, & reliquis debacchanalibus abstinere: nā mulieres bacchicis furoribus correptæ, ad hederam feruntur, & manibus abreptam diuellunt, & dentibus lacerant, ut non omnino incredibilia dicere videantur, qui asserunt hederam, quod spiritum habeat, quo mentes in furorem concitet, & loco moueat, ebrietatem absque vino inducere, & hilares eos reddere, qui in furorem procliuēs fuerint. Andreas Medicus, quum aliquem fortè dolor capitis angeret, qui eius compressu leuatus fuit, vinculum intellexit esse doloris præsens auxilium. Hac igitur medicina opitulans, eorum, qui nimium bibissent, caput reuinciebat hederacea præcipuè corona, facie alioqui non inuenusta corymbis, & foliis virentibus frontem opacat, astrictionisque vehementiam patitur, & postremo refrigerat citra odoris grauitatem. Ob hæc rationem coronam illam vita Baccho dedicasse videtur, qui & potum inuenerrit, & malis inde nascentibus succurrat. Sunt & coronæ, quas tortiles Alexandrini vocant. Harum ita meminit Chæremou,

Hedere, narcissi, ter circumuoluto circulo

Torti-

Torti-
Hæc Athenæ
ædificauit, aut
chus in Onofrid
autem eundem c
se vidisse Osi
dum Bacchi face
ob historiam, tu
Bacchum pueru
Pharnutus ad he
sa, quibus signifi
ebriorum vox, q
quare thyrsus, c
enim, auctore l
significabatur: n
suo funguntur n
præterit, aut qu
tempestates imi
arate vitis frond
sus est, si cetiam
respondeant. In
pentium frigori
deracea corona
bat, non quia per
per laurum in sit
stiam peragili
hedera suapte vi
perrinat tamen
latim irrepens,
quis velit excel
darius, Poëtas la
tem labore pati
racea corona v
Phalangia
no. Harpæ aut
liones hedera
morbo non la
autem stirpen
Gracis nam
Sed aliquibus

Tortilium coronarum.

Hæc Athenæus. Ægyptii Bacchum hederam inuenisse assererebant, quare illi
 10 dēdicarunt, authore Diodoro Siculo, vocabantque illi chenofirin, vt Plutar-
 chus in Onofiride testis est. Hæc enim vox Ofiridis plantam denotat. Ofirim
 autem eundem cum Baccho esse multiprodiderūt. Lucius Apuleius in somnis
 se vidisse Ofiridis sacerdotes dicit, thyrsos, & hederam ferentes, quemadmo-
 dum Bacchi sacerdotes faciunt. Sunt qui dicāt hederam Baccho dicatam, cūm
 ob historiam, tum ob hederæ naturam. Ouidius in Fastis Nyfades nymphas
 Bacchum puerum (quarente nouerca) in cunis hederæ cooperuisse scribit.

- 20 Pharnutus ad hederæ naturam retulit. Frequentibus est enim articulis nodo-
 sa, quibus significet ebriosos vacillare, & titubare, & portatu faciles, vel quod
 ebriorum vox, quasi articulata sit, ac titubans, nec vno contextu intelligibilis,
 quare thyrsus, cuius mucro labente hederæ protegebatur, Baccho dicatus. Eo
 enim, authore Macrobio, furoris imperus patientiæ vinculo obligandos esse
 significabatur: nam hederæ vincendi naturam habet: ebriorum pedes parum
 suo funguntur munere. Alii contrariæ sunt opinionis, non quod ebrietatē re-
 præsentet, aut quod vino aduerferetur, vt Plutarchus narrat, verū quod ille anni
 tempestates imitatus sit: nam quū vitigineam coronam desideraret, & ex anni
 30 atate vitis frondibus vidua esset, hederæ faciē cœpit adornare, quæ vitis vice v-
 sus est, sic etiam quod viti similis sit, & corymborum baccæ vinearum botris
 respondeant. Inimica arbor satis omnibus, sepulchraq; ac muros rumpēs, ser-
 pentium frigori gratissima, vt mirum sit vllum honorē habitum ei. Est & he-
 deracea corona Poëtis ascripta, nam vnà cum lauro eorum coronam perficie-
 bat, non quia perpetuo virescens, diuturna eorum opera futura ostenderet, sed
 per laurum insitam ingenio vim ac facundiam, per hederam autem & indu-
 striam peruigili labore partam significare volebant, cuius rei indicium, quod
 hederæ suapte vi admodum imbecilla humi reperet, neq; se vnquā attolleret,
 pertinaci tamen labore, artificioq; peruincit, vt parietibus adhærescēs, & pau-
 latim irrepens, supra omne fastigium victrix euadat: vtroque enim opus est, si
 40 quis velit excellere, & nisi excelluerit nil proficiet. Eadem sententia fuit Pin-
 datus, Poëtæ lacte, & melle pasci, lac fecunditatem significare, mel autem ar-
 tem labore partam. Athenæus Antocabalos Iamborum Poëtæ vocat, hede-
 racea corona vti solitos. Virgilius ad id,

Pastores hederæ nascentem ornate Poetam.

Phalangium ceruis exitiale est, & ceruis medicina est hederæ adesa, ex Ælia-
 no. Harpæ aues, vt à nidis suis bestiolas adigant, hederam ingerunt. Vesperti-
 liones hederæ suffitu necantur. Apri in morbis sibi hederæ medentur. Agni
 morbo non laborant, si septem dierum curriculo hederæ pasti fuerint. Vitis
 autem stirpem prope terram aduersus cantharidas inungunt.

- 40 Græcis κισσός, vel κιστός dicitur, quo nomine sola rigens hederæ significatur. *Nomen.*
 Sed aliquibus videtur κισός potius dicta à porosa textura & innumeris spira-

culis peruia, quàm à puero Cirto saltante, vt fabulant Græci. Est & *κισσός* pumex, siue porosus lapis, quale Catoni cissymbion poculum. Dioscorides citharon, à corymbis, corymbia. *κισσόν* vt Pausanias tradit Bacchum appellant. Antiquissimi Athenienses *σ*, & *τ* promiscuo vsu utebantur, quare *κισσόν* & *κισσόν* protulerunt. Alii Dionysiam appellauere, quasi Bacchicam. Latini hederam, Pompeius dictam putat, quòd hæreat, id etiam Apuleius confirmat. Alii ab edendo, etenim vetustiores maceries suis radicatis propaginibus enecat, & exedit. Alii hederam, quod edita loca petat, & altè diuagetur, altiores parietes conscendens. Itali *edera*.

Gen. &
descriptio.

Quum difficile sit valde describere species omnes separatim, ideo secundum Theophrastum vnâ describemus. Edera multigena est, quædam humi repens, quædam se in altum extollens. Excelsarum genera plura, sed trina summa patefcunt, candida, nigra, & helix. Harum item species plures, quippe alia fructu candida, alia etiam foliis. Rursus fructum candidum ferentium, alia maiusculum, densum, & velut in globum circumactum fructum profert, quam corymbiam quidam vocarunt. Athenienses acharnicam riguant eam appellant. Habet nigra differentias, sed non in hunc modum conspicuas. Sed helix maximis differentiis discernitur, etenim foliis plurimum distat, cum paruitate, tum quòd angulata, concinnioraq; sint, cum hederâ rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant enim internodiorum longitudine, atq; etiâ sterilitate, quoniam fructum quædam non ferunt, quod non in hederam transfiguntur, vt quidam volunt, at verò si omnes hederascunt, vt aliis placet; atavis certè, dispositionisq;, non generis erit discrimen, quemadmodum pyri ad pyrastrum. Tamen eius quoq; folium multum ab hederâ distat, verum id rarum, & in paucis euenit, vt vetustate permutetur, ceu in populo alba, & crotone. Ergo elici plura genera, sed quæ conspectiora, summaque occurrunt, tria sunt: Herbacea ac virens, quæ plurima est, secunda candida, tertia versicolor, quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæque distare videtur, quippe herbacea quædam folio tenuiori, oblongiori, atque etiam densiori, quædam minus hæc omnia habens, & in versicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumque habitu diuersa, pari modo, & magnitudine, coloreve distant. Auctu perfacilis herbacea, inque plurimum venit: manifestam quæ hederescat affirmant, non tantum foliis, quæ maiora, latioraque habet, verum etiam germinibus, protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea verò crassiora, breuioraq;, ac hederâ, vt ferre semen incipit, germen sublime, rectumque edit. Est quidem vniuersa hederâ radice numerosa, densa, flexuosa, surculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipuè nigra, & inter candidas, quæ asperima, inimicissimaque habetur: quam obrem eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat, & exiccat, ablato alimento. Crassatur enim maiorem in modum, atq; arborescit in tantum, vt per se ipsa hederâ arbor fiat. At-

tamen

tamen ex maioribus
xerim) amplexu
Nam è geminis
risq; obrepit, quæ
exhaustiensq; ar
que potest. Hab
eis, alius veheme
alium aues mand
tam artem tant
ficiens, vt in ar
quamplurimum
Pinguia, dura, i
bet. Flore langu
bet, sed neq; p
mediis inculcatu
Plinius. Edera d
ditur mas corpor
dente. Vtriusq; a
cies horum gene
catur helix. Etia
tantum candida
nus, & grandior,
lenitū, cuius est
& semen nigrū, al
quam quidā Dio
bis. Quidam apu
rū erythranum,
niam folio maxi
quorū generum
tamen sterilitat
generis existim
vor manifestus
maximè insigni
riâ versicolor, q
nè digesta, det
nuioribus foli
hæc. Maiora q
didis alia sunt
bores autem n
dine augetur,
mammas exige

tamen ex maiore parte semper super aliud vitam degere solet, atq; (vt ita dixerim) amplexicaulis est, ita pro sua natura, vel quiddam eiusmodi illico gerit. Nam ē getminibus radículas assiduē inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria à natura exhibitis, atq; ita humorem auferens, exhauriensq; arefacit, & si inferius succidatur, nihilominus viuere, durareque potest. Habet aliud discrimen non mediocre in fructu: nam aliis dulcis, aliis vehementer amarus, tam in candida quàm in nigra, indicium quòd alium aues mandunt, alium minimè attingunt. Et si suffrutex sit, per adultam ætatem tantum sibi roboris vendicat, longitudine, crassitudineque proficiens, vt in arborem deficiat. Folia, quum primum pubescit, angulosa, quamplurimum in triangularem faciem exeuntia, vetustiori rotundantur. Pingua, dura, immortalis virore, longo pediculo, læuia superna parte habet. Flore lanugineo suo peculiari modo, etenim florem in toto fructu habet, sed neq; postremis insidentem, neque singulas partes ambientem, in mediis inculcatum, nisi fortè concerni nequeat propter lanuginem. Ab eo Plinius. Ederæ duo genera, prima, vt reliquarum mas, & femina. Maior traditur mas corpore, & folio duriore, ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusq; autem flos similis est rosæ syluestri, nisi quod caret odore. Species horum generum tres. Est enim candida, & nigra edera, tertiāq; quæ vocatur helix. Etiamnum hæ species diuiduntur in alias, quoniam est alia fructu tantum candida, alia & folio fructumq; candidū ferentium, aliis densus acinus, & grandior, racemis in orbem circūactis, qui vocantur corymbi. Item sellenitiū, cuius est minor acinus, sparsior racemus. Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrū, alii crocatum, cuius coronis poetæ vtuntur, foliis minus nigris, quam quidā Dionysiam, alii Bacchicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiānum duo genera huius faciunt, à colore acinorū erythranum, & chrysocarpū. Plurimas autem habet differentias helix, quoniam folio maximè distat. Parua sunt, & angulosa, concinnioraq; quum reliquorū generum simplicia sint. Distat & longitudine internodiorū, præcipuè tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc ætatis esse non generis existimant, primoq; helicem esse, fieri ederam vetustate. Horum error manifestus intelligitur, quoniam helicis plura genera reperiuntur, sed tria maximè insignia: Herbacea ac virēs, quæ plurima est, altera candido folio, tertiā versicolor, quæ Thracia vocatur. Etiamnum herbaceæ tenuiora folia in ordinē digesta, densioraq; In alio genere diuersa omnia. Et in versicolori, alia tenuioribus foliis, ac similiter ordinatis, densioribusq; In altera neglecta omnia hæc. Maiora quoq; ac minora sunt folia, macularūq; habitu distant, & in candidis alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem maximè herbacea. Arborea autem necat candida, omnemque succum auferendo, tanta crassitudine augetur, vt arbor ipsa fiat. Signa eius, folia maxima, atque latissima, mammas erigentis, quæ sunt cæteris inflexæ, racemi stantes, ac subrecti.

Et quamquam omnium hederarum generi radice & brachia, huic tamen maximè ramosa, ac robusta. Ab ea nigra, sed proprium albæ, quod inter media folia emittit brachia, vtrinque semper amplectens: hæc est & in muris, quamuis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis intercisa, viuit tamen duratq; & totidem initia radicum habet, quot brachia, quibus incolumis, & solida arbores fugit, ac strangulat. Est & in fructu differentia albæ nigraeq; edera, quoniam aliis tanta amaritudo acini, vt aues non attingant. Est & rigens hedera, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum, ob id vocata cissos. E diuerso nunquam nisi humi repens chamæcissos. Dioscorides: Hedera differentias multas sortitur, summæ autem genere tres. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix, candida fructum fert candidum, nigra nigrum, ac croci æmulum, quam vulgus dionysiam vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parua, angulosa & concinniora. Virgilius vtriusque hederæ, albæ nigrae meminit.

Candidior cygnis hedera formosior alba.

arque

— ederae pandunt vestigia nigra.

Colum.

Hedera, ex Theophrasto, calores odit, frigus adamat, quare feruidis minus potest provenire. In Asia hederam enasei negant, sed in India visam in monte, cui Mero nomen affirmant, quo Liberum patrem ortum fabulæ aiunt. Quæ de causa Alexander, quum ex India aliquando descenderet, coronatus & ipse, & exercitus ibat. Harpalus verò & in Media tantum locare eam contendit, ferendo sæpe in hortis Babylonis, & curiose colendo, sed nihil efficere potuit. Hæc enim nullo pacto viuere valebat, sicut reliqua, quæ aduecta de Græcia sunt, hospitari patiebantur. Hæc igitur ob cæli conditionem regio recusat. Ab eo Plinius. Edera iam dicitur in Asia nasci. Negauerat Theophrastus, nec in India, nisi in monte Mero. Quin & Harpalum omni modo laborasse, vt fereret eam in Medis, frustra. Alexandrum verò ob raritatem mira coronato exercitu, victorem ex India rediisse, exemplo Liberi patris, cuius dei nunc & adornant thyrsos, galeasq; etiam & scuta, in Thraciæ populis in solennibus sacris. In frigidis terris nasci cecinit Virgilius.

— arsceleratum exquirere frigus

Difficile est, picea tantum saxiq; nocentes

Interdum, aut hederae pandunt vestigia nigra.

Colum.

Cassianus aquosis agris gaudere dixit. Adreas apud Athenarum hederam citra cultum vbiuis copiosam provenire dixit.

Satis.

Cassianus plantari ante Calendas Nouembres, & à Calendis Martiis. Columella idibus Februarii, vel Calendis Maii feri oportere. Seritur & geniculis suis & ex his radices dimittunt, quum maximè omnium viuax sit, seu arborescens amplexu suo perstringat, seu in terra abdita ima subeat. Nam defixa quoque nimirum erumpere valet: spissitate, ac oreque suo seruati aliquantulum temporis potest. Longè ab arboribus feri debet, obest enim maximè sua vicinia:

nume-

numerosa enim
re, amplecti,
nam in multis
quando. Hæc
fabis florentibus
Seritur etiam pa
sepis muniment
hedera. At illæ v
ruitq; truncum
10 Hedera labor

Ass
E

Decoros dab
matorum ciner
didam, si terra
datur.

Theophrastu
nius. Calida bec
ligno, ignem q
10 vel foliorum fac
ror lauro, lauru
nec ne, vasculu
quam habere, e
nebit: nam n
ta mirapr
eius,

numerosa enim radice cohareret, multoque indiget alimento, quæ ascendere, amplecti, strangulare, atque irrepere apta est. Facilis est generationis, nam in multis creatur, & quod mirabilius, visam esse in cornibus cerui aliquando. Hæc Theophrastus. Plinius verò: Ac non in nouissimis cauetur, ne fabis florentibus attingatur hedera. Id enim noxium, & exitiale ei est tempus. Seritur etiam palo: ex qua satione insitio reperta est. Agricola sedulus casam sepis munimento cingens quo minus putrescerent fudes limen subdidit ex hedera. At illæ viuaci morfu apprehensæ, suam ex alieno fecere vitam, apparuitque truncum esse pro terra.

10 Hedera laborem omnem veretur, si Propertio credimus canenti:

Cultus.

*Aspice quos summittat humus formosa colores,
Et veniant hedera sponte sua melius.*

Decoros dabit corymbos, inquit Cassianus, si ternum conchyliorum crematorum cinere conspergatur, aut alumine rigetur. Nigra vertitur in candidam, si terra alba madens humore, octo dierum spatio radicibus infundatur.

Ars.

Theophrastus hederam calidam dicit, quod ex ea fiant ignaria. Ab eo Plinius. Calida hedera, & omnes, ex quibus ignaria fieri solent: teritur lignum ligno, ignemque concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis, fungi, 20 vel foliorum facillimè conceptum. Sed nihil hedera præstantius, quæ teratur lauro, laurumque terat. Cato. Si voles scire in vinum aqua addita sit, nec ne, vasculum facito de materia hederacea. Vinum id, quod putabis aquam habere, eodem mittito, si habebit aquam, vinum effluet, aqua manebit: nam non continet vinum vas hederaceum. Ab eo Plinius. Ederam mira proditur natura, ad experienda vina. Si vas fiat ex ligno eius, vina transfluere, ac remanere aquam, si qua fuerit mista. Sed id falsum diximus in Magia nostra naturali.

Materies.

IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

VILLAE

LIBER DECIMVS

SIVE

HORTVS OLITORIVS.

P R O E M I V M.



CORONARIO horto egressi, olitorium ingredimini, ibi enim cremia, & frutices inspexistis, hic herbacea conspicietis: nouissimum genus, in quod stirpes omnes, & terra nascētes principio digessimus. Licuit enim medio-criter agri. olationis rei imbuto simplicis cultus tractationē praemittere, ut quae multiplicis operationis foret, facilius perdisceretur, ne vestra delusa spectatione delapsi videremur. Olitoriam rem aggrediemur, sanè perquam dignam, cui strenuam seduli operā nauemus. Marcus ille antiquissimus Cato secundum locum tribuit horro irriguo, & si suo tempore vinum tanto pretio non fuisset, vni horro principē locum tribuisset. Cicero libro de senectute: Nō segetibus solū, & pratis, & vineis, & arbutis res rusticę laxae sunt, sed etiam hortis. Columella hortorum cultū insigniter neglectum fuisse quōdam veteribus agricolis narrat, suo tempore vel celeberrimū, siquidem quum par-cior apud priscos esset frugalitas, largior tamē pauperibus fuit vsus epularum, lactis copia, ferinaq; ac domesticarum pecudum carne, velut aqua, frumētōq; summis, atq; humillimis victum tolerātibus. Mox quū sequēs, & praecipue suaetas dapibus libidinosis sua pretia cōstituerit, cōneq; non naturalibus desider-iis, sed censibus aestimantur, plebeia paupertas sumnota à pretiosioribus ci-bis, ad vulgares cōpellitur. Plinii tempore statim faciebant iudicium nequam esse in domo matrem familias, (etenim haec cura foemina dicebatur) vbi indi-gens esset hortus. Horti maximē placebant, quia nō egerent igni parcerētq; ligno, expedita res, & parata semper, vnde & acetaria appellantur, facilia con-coqui, nec oneratura sensum cibo, & quae minimē accenderent desiderii pa-nis. Et si hortorum cultus diligentius Columella, quam maiores tradiderint, praecipendus fuit, quanto nobis copiosius pertractādus felici Campaniē solo, adulentissimoq; cōelo ortis erit? Vbi humi facilitate, cōeliq; placiditate her-
bae

bae sunt perenn
adeoq; lasciu
affidus vsus, &
mum acetaria o
neum genus, ru
remus. Sed priu

Qu

HORTI fi
herbarum

10 noi, Salustiani, l
lari numero pro

Felto Pompeio
nusquam nomi

herediū. Dicti
verō horti dicti

herba, quae ciba
antequam fruga

stus inter aspira

tus sine aspirari

10 aspiretur, fortal
erit circumscrip

do deducimus, q

to anno herbae o

quit Plinius, con

invidentiū effasc

horos tutele Ve

Veneremaduer

lia instituta. Ca

ro inter deos Sa

30 Grecis verō inte

animantium sit

reliquo, sicut p

in villa nō horti

producant, hor

generis fructu

num nascuntur

ri, quae genuer

ribus est, ut pu

cas, tum religio

40 cum depingunt

ba sunt perennis prouentus, restibilisq; feracitatis, sibiq; gradatim succedunt, adeoq; lasciuiur, vt idem olus ter, quater anno feratur, demeturq;. In quibus assiduus vsus, & esus multa adinuenit, nec parum multa inuenturus. Nos primum acetaria olera, post condimentaria, demum escaria, postremo cartilagineum genus, tum quod supra terram, tum quod sub terra conuascitur proferemus. Sed prius de cælo, solo, & remediis horti aliqua prædicturi.

Quid hortus, & de Priapo hortorum deo. C A P. I.

HORTI si plurali numero proferantur, non solum olerum, aliarumque herbarum, sed arborum quoque, conustum locum significat, vt horti Alcinoi, Salustiani, Luculliani, & Pompeiani. Fuit etiam eius significatio, & si singulari numero proferatur, adeo latissima, vt etiam omnis villa comprehendere, Festo Pompeio auctore. In duodecim tabulis legum nostrarum, inquit Plinius, nusquam nominatur villa, semper in significatione ea hortus. In horti vero heredium. Dicti horti sunt, quod ibi oriantur, qui arma capere possint. Ab aliis vero horti dicti, quod ibi olera nascerentur: olusq; dicitur Theophrasto omnis herba, quæ cibario vsui oritur. Alii ab alendo, quod oleribus alerentur homines antequam fruges repertæ essent. Varro nomen ab olla deducit. Nonius & Festus inter aspirata connumerant. Sed si etymologie rationem spectemus, ortus sine aspiratione scribendum esset, à doctioribus vero receptus vsus fecit, vt aspiraretur, fortasse ad differentiam participii ortus. Nobis vero olitorius hortus erit circumscriptus in villa locus, in quo olera deponimus, nomenq; ab oriendo deducimus, quod in hac villæ parte festinantius, & copiosius quam alibi toto anno herbarum oriantur. Sed de hortorum deo dicamus aliqua. Hanc rem, inquit Plinius, comitata est & religio quædam, hortosq; & forestarum contra inuidentium effascinationes dicari videmus. In remedio satyrica signa, quæquam hortos tutelæ Veneris assignante Plauto. M. Varro sui de re rustica libri initio Venerem adueneratur, cuius procuratio hortorum, quo nomine rustica vinaria instituta. Cæteri autem Priapum hortorum deum voluerunt, & si M. Varro inter deos Semones adnumeret, qui neque cælestes, neque terreni essent, à Grecis vero inter deos receptus, propter eam corporis partem, à qua omnium animantium sit ortus. Sed ratio cur hortorum præsidio Priapus fuerit, esse potest, quod sicut pars illa omnium fecundissima, & generationis causa existit, sic in villa nihil horis fecundius: nam & si ceteræ villæ partes semel quid annuatim producant, horti semper sunt perennes. Phurnutus ita eum depingit, vt omnis generis fructus in suo sinu gerat, quod fructuum indicet copiam, qui intra terre finem nascuntur, & ostenduntur. Deus dicitur, quod eius sit & seruare, & tueri, quæ genuerit. Falcem manuerit, cuius vsus in putandis vineis, & arboribus est, vt putatione omnia fertiliora reddantur. Egyptii, qui tum publicas, tum religiosas res non sine quadam naturali ratione figurant, aliter cum depingunt, dextra sceptrum gestantem, perinde ac si ab eo omnia terra

uariq; genita sint. Sinistra sui ipsius in hyphallum tenentem, quo semina humo alperfa in apertum mittat. Columella de eius effigie,

Sed truncum forte dolatum.

Arboris antiqua numen venerare in hyphalli:

Terribilis membri, medio qui semper in horto

Inguinibus puero, prae donis falce minetur.

Dicitur Græcis ἰδύπαιμος: nam παῖδος Priapus est, ἰδύς rectus, quasi columnam recti membri denotans. Item legitur,

Astans in guinibus columna nostris.

Apud Corinthios, ut Strabo refert, magna veneratione Priapus colebatur, nec in templo solum, sed in agrestibus locis, ubi caprarum pascua, & apum examina essent. Pausanias in Boëtiis dicit, Ægyptios hircum vocasse ob eam corporis partem, à qua omnium sit ortus. Orpheus eum protogonon vocat. Apud Lampfacum Priapo lætabilis victima asellus erat, vel quia, ut Ovidius in Fastis, Lotis pudicitia dum insidiatur Priapus, asini clamore excitata nympha, amatoris libido defecta est: vel quum, ut Higinius ait, inter asellum, & Priapum de virilis membri magnitudine ortum esset certamen, in eo superior fuerit asellus; vel, ut Lactantius, quum in hoc animali genitalis membri magnitudo enormis sit, nulla huic deo victima aptior poterat sacrificari: vel, ut ego auguror, asellus hortos ingrediens, teneras & nascentes herbas pedibus conculcando, & dentibus detruendo audivissimè depascitur, unde & hortorum populator, hortorum custodi deo immolabatur, ut capra Mineræ, deæ deuatatrix, & hircus Baccho vitium erosor: vel quod nudata carne caluaria asini medio horti defixa contra eorum effascinationes sit amuletum.

Quis locus hortis deputetur. C A P. II.

HORTI locum Græci pariter & Latini circa ædes eligunt, longè ab area. Cassianus. Horti constructio res per maximè necessaria in vita, constituereq; eum conuenit, & ad sanitatem, & ad vires à morbis rescindendas non procul ab ædibus, sed in vicinia, ut & delectationem ex aspectu capiamus, & iucunditatis ex odoris fragrantia participes simus. Situs non secundum ventum arearum, ne à tenuissimis palearum particulis inde allatis herbae perdantur. Columella locum prius conuenire dixit, si permittit agri situs, iuxta villam, præcipue pinguem, providendumq; ne hortus areae subiaceat, ne per trituras venti possint paleas, aut puluerem in eum perferre: nam utraq; sunt oleribus inimica. Ab eo Palladius: Hortus domui proximus esse debet, sterquilinio maximè subiectus, cuius succo sponte fecundetur. Ab area longè situs sit: nam puluerem palearum patitur inimicum.

Quale solum, & cælum hortos deceat. C A P. III.

POST loci electionem, sequitur soli, & cæli: & si nos singularis cuiusque herbae peculiare solum, cælumq; designabimus, lubet tamen in vniuersum

sum

sum aliqua præfata
dera enim radices
tellure suppeditat
suo de Agricultur
actu neq; resciet
ram. Quæ enim p
cillia reddit. Que
tur. Quæ hia sit, it
potest. Asperi are
idonei. Sed ita de
limi habere comp
etiam iudicabis,
Columella pingui
gnis dignosci, ca

Prim

Pingui

Qui

Aiq

Parti

Nam

Perp

Tum

Palm

Ach

Gama

Sed

Nec

Qu

M

Ne

Ter

Palladius, E

nera sunt in ele

Cælum verò ex

& temperatun

ris perueniunt

tur: contra qu

rum vilitatis e

omni tempore

40 sicis hyeme v

nullo modo pe

sum aliqua præfari. Theophrastus pingue solum oleribus conuenire dixit, olera enim radices in profundum non adigunt, vnde id sugunt, quod summa tellure suppeditatur, quod neq; exiguum, neq; exuatile esse debet. Cassianus suo de Agricultura libro terram describens oleribus aptam, probat eam, quæ æstu neq; resiccat, neq; magnis hiatibus rumpatur, neq; argillosam, vel asperam. Quæ enim per æstatem resiccat, implantata perdit, aut tenuia & imbecillia reddit. Quæ argillosa, si ex æquo sterco ei ammisceatur, vix idonea redditur. Quæ hiascit, inutilis penitus. Aspera neq; nutrire, neq; recipere quicquam potest. Asperi arenosiq; loci, qui multum limum recipiunt, pauci sunt oleribus idonei. Sed ita deprehendes aptam. Terram aqua dissolue, & laua, & si quid limi habere comperies commodam iudicabis, si plus aquæ, ineptam: eandem etiam iudicabis, si manibus, velut ceram emolliendo glutinosam comperies. Columella pingue solum oleribus tribuit, & quale oporteat esse, quibusque signis dignosci, carminibus elegantissime describit:

*Principio sedem numeroſo præbeat horto
Pinguis ager, putres glebas, reſolutaq; terga
Qui gerit, & foſſus graciles imitatur harenas.
Atque habilis natura ſoli, qua gramine lato
Parturit, & rutilas ebuli creat vnida baccas.
Nam neque ſicca placet, nec qua ſtagnata palude
Perpetitur querula ſemper conuita rana.
Tum, qua ſponte ſua frondosus educat vltimos,
Palmitibusq; feris latatur, & aſpera ſyluis
Achrados, aut pruni lapidoſis obruta pomis
Gaudet, & iniuſſi conſternitur vberè mali,
Sed negat helleboros, & noxia galbana ſucco,
Nec patitur taxos, nec ſtrenua toxica ſudat,
Quamuis ſemihominis veſano gramine fœta
Mandragore pariat flores, mœſtamq; cicutam,
Nec manibus mitis ferulas, nec cruribus aque,
Terga rubi, ſpinisq; ferat paliuron acutis.*

Palladius, Etsi terra omnis stercore mista horto conueniat, tamen hæc genera sunt in electione vitanda. Creta, quam argillam dicimus, atque rubrica. Cælum verò exoptat apertum, apricumq; arboribus liberum & omni umbra, & temperatum. Nam calidis, siccisq; locis herbæ æstate ad extremum ariditatis perueniunt, intereuntq; nisi assidua pluuia, vel aqua organis hausta rigentur: contra quæ locis frigidis, se sustinere non possunt. In locis vmbrosis parum vtilitatis excipimus: vnde temperatum cælum, vel calidum exposcunt, vt omni tempore conualeſcant. Humidis locis æstate valent, hyeme laborant, siccis hyeme valent, æstate peruruntur. Terram emendare possumus, cælum nullo modo permutare, ob id circa cœli electionem laborandum.

Quod horti locus oportet sit irriguus. CAP. IIII.

QUOD maximè refert in horti electione est, ut locus sit irriguus, qui adueniente riuo, dicit Columella, vel si non sit fluens aqua, fonte puteali possit irrigari. Sed ut certam perennitatis puteus habeat fidem, tum demum effodiendus est, quum sol vltimas partes virginis obtinebit, id est, mense Septembri ante æquinoctium autumnale, siquidem tum maximè explorantur vires fontium, quum ex longa siccitate æstatis, terra caret humore pluuiali. In suis verò carminibus,

*Vicini quoque sint amnes, quos incolæ durus
Attrahat auxilio semper sitientibus hortis,
Aut fons illachrymet putei non sede profunda,
Ne grauis haustus tendentibus ilia vellat.*

A quo Plinius, Hortos riguos maxime habendos, si contingat profluamne, si minus è puteo pertica, organisve pneumaticis, vel tollenonum haustu rigandos. Palladius. Felix positio est, cui leniter inclinata planities cursu aquæ fluentis per spatia discreta deriuat. Si fons desit, aut imprimendus est puteus, aut si nequeas hoc, piscina superius construenda est, ut illinc aquas pluuiæ conferente, hortus per æstiuos rigeretur ardores. Si hac omni facultate carueris, semper altius tribus, vel quatuor pedibus ad pastini similitudinem fodies hortulum, qui sic cultus negligat siccitates. Sed Vindanius locis aqua carentibus hortum tali artificio construit. Spatium terræ ad hortum electum, pedali, vel cubitali profunditate defodit, & ablata terra, regulas in effossum locum substernit, coniecit pinguem terram supra. Alii pro tegulis pauimentum tectorio opere inducunt, complanantque, tum terram supra, & stercus superiniiciunt: ambiatur etiam muris locus, ut nequaquam aqua ad rigandum affusa foras diffundi possit, deinde serunt, hyeme pluuiæ aqua contenti, æstate rigantes, neque enim æstate indigent humore, quum hyberna humiditas loco conseruetur, ne in vicinos locos delabatur. Alii duos faciunt hortos, hyemalem, qui ex pluuiis opem sentit, alterum æstiuum in loco vmbroso, ad Arctum verso. Theophrastus narrat olera omnia aquam diligere. Aquarum optimæ, quæ dulces, & frigida sunt, pessimæ quæ salis, & rarefactu difficiles notantur. Omnium optimæ, quas Iuppiter dederit: his enim animalia noxia interimi creduntur. Salis aquæ vitandæ sunt, quia deterius nutrire terrenas plantas queunt, quàm dulces, adurunt enim, augeri que prohibent. Quibusdam priuata naturæ oleribus, priuata alimenta exhibere par est, salis quæ humoribus iquantur, ut brassica, beta, ruta, eruca, quæ si salis aquis rigentur, meliora euadunt. Sed aquæ potabiles frigida idoneæ sunt, & haud exiguas sibi partes vendicant ad alimenta, & incrementa olerum, percoquant enim propter caloris circumobstantiam, & propter radicum refrigerationem: ob id olera his aquis rigata, meliora euadunt. Ex cœlestibus no-

Atuna,

Atuna, & aquil
me faciunt, & in
altera dora, & in
cumferant, ut in
iecto lino emoll
Rigandi hora ve
quo Plinius. Pec
nilæ, in salis aqu
teris dulcium aqu
10 potu suauissim
barum semina i
nascentes necat
aqua sole. Apu
tur, hæc enim p
lumbaria secun
tur modiolis, ut p
hoc frequentius
rentiam, demiss
pendentes, ut r
10 gentur inuerti,
faciunt quum se
sub castello, qu
tem, ut circa hor
partiantur ordi

OLERA OT
magis qu
ant: Hyberna
mum stipulari
30 me inarescat. F
dam inter fere
probe conficie
quum molum
bere, non fru
Graci: primu
occidit enim
binum, quod
num præferu
stare valens. S
40 re possunt, rec

Aeternæ, & aquiloniæ præstant, & ob eandem causam calidæ diffundunt, & humefaciunt, & insitum calorem debilitant. Aquarum mixtura utilis est, quum altera dura, & incocta, altera mollis & placida, vel si terrenam misturam secum ferant, ut in turbulentis, stercorosisq; humoribus. Aquæ contumacia iniecto lino emollitur, & putealis tenuitatem admiscens scatebris lutulentis. Rigandi hora vel matutina, vel vespertina, ne aqua feruescens sole officiat. A quo Plinius. Peculiaris medicina raphano (brassicam intelligit) betæ, rutæ, cunilæ, in salis aquis, & alioqui plurimum suavitati, & fertilitati conferunt, cæteris dulcium aquarum rigua profunt. Vtilissimè ex iis quæ frigidissimæ, & quæ potu suauissimæ. Minus viles è stagno, & quas elices inducunt, quoniam herbarum semina inuehunt. Præcipuè tamen imbres alunt: nam & bestiola in nascentes necantur. His hora rigandi matutina, atq; vespera, ne inferuescat aqua sole. Apud nos si non est altius attollenda aqua, tympanis olitores vtuntur, hæc enim per aperturas hauriunt aquas in ambitu, redduntq; eas per columbaria secundum axem. Si verò altius attollendæ sint, rotæ ambitu affiguntur modioli, ut pleni aqua, & in sublime elati, reddant aquas in castellum. Sed hoc frequentius organo vtimur. Inuoluitur sparteæ funis circa rotæ circumferentiam, demissaq; ad iunum purei collocantur in ea situla lignæ conualescentes, ut rotæ versatione attollantur in summum situlæ, quæ denuo cogentur inuertere, & infundere in castellum aquam quam extulerant. Id interdum faciunt quum solis feruore cessant ab opere. Vesperis verò ostiolum referant sub castello, quo referato subiectus canalis excipit aquam ex castello effluentem, ut circa hortum excernat. Alii deinde canaliculi excipiunt, & in arcas impartiuntur ordine collocati, tota nocte residente in areolis aqua.

De fimo oleribus idoneo. CAP. V.

OLERA omnia aquam, fimumq; concupiscere Theophrastus scripsit, & magis quæ infirmiora sunt, quum maiori, copiosiori q; alimento indigeant: Hyberna magis, quàm æstiuæ, ruta excepta, quæ fimi aspernatrice est. Fimum stipularium maxime laudat, iumentorum vitiosum purat, quod maxime inarescat. Fimum vnà cum satum intermixtum potissimum disponunt. Quidam inter serendum superiaciunt, & stercore humano inconcocto ad succum probe conficiendum vtuntur. Oleribus paratur succus simul à fimo, & ab aqua, quum multum humoris ab eis appetatur: volunt enim foliorum usum præbere, non fructum, quum folia tam elaborato succo non egeant, ut fructus. Græci: primum stercus oleribus optimum, cinis tenuissimus, & natura calidus, occidit enim pulices, & vermes, & eiusmodi bestiolas. Secundum columbinum, quod ipsum itidem bestias necare possit. Quidam columbino asinum præferunt, quod olera dulciora reddat. Optimum caprinum eadem præstare valens. Sed in carentiis alia etiam stercora, sed non recentia, in usum veniunt, reposita, recentia bestias gignunt: sint saltem annua, & ligonibus pertractata.

Ex his Fronto maximam iniuriam olitori fieri posse scribit, si asnerinum ster-
cus muria dissolutum, oleribus aspergatur. Columella optimum ster-
cus ad hortorum usum esse dicit, quia minimum herbarum creat, proximum vel
armenti, vel ouium, si sit anno maceratum: nam quod homines faciunt,
quantiuis habeatur excellentissimum, non tamen necesse est adhibere, nisi
aut nuda glareæ, aut sine vlllo robore solutissimæ arenæ, quum maior scilicet
vis alimenti desideretur. In carminibus tempus præsignat,

Post ubi Ryphea torpentia frigora brumæ

Candidus aprica Zephyrus relegauerit aura,

Sydere oq; polo cedit lyra mersa profundo,

Veris & aduentum nidis cantarit hirundo:

Rudere tum pingui, solido, vel stercore aselli,

Armentive fimo satur et ieiunia terre;

Ipse ferens olitor diductos pondere qualos.

Pabula nec pigeat fesso prabere nonali,

Immundis, quacunque vomit latrina, cloacis.

Pastinandi tempus, cultus, & seminum ortus. CAP. VI.

OR DINANDI, pastinandi que tempora duo dicit Columella, quoniam
duæ quoque sunt olerum sationes: nam & autumnus, & vere plurima se-
runtur, melius tamen vere riguis locis, quoniam & nascentis anni clementia
excipit prodeuntia semina, & sitis a statis restituitur fontibus. Curabimus ut
ager, quem vere conferi oportet, autumnus circa calendas Nouembris pasto-
netur. Quem deinde velimus autumnus instituere, mense Maio conuertemus,
ut aut hyemis frigoribus, aut aestiuis solibus, & gleba soluat, & radices her-
barum necentur, nec multo ante stercoreare debemus, & quum sationis ap-
propinquabit tempus, ante quintum diem exherbandus erit locus, stercorean-
dusq;, & ita diligenter fossione iterandus, ut fimo terra commisceatur. Igitur
solum, quod conferere vere destinauerimus, post autumnum patiemur effos-
sum iacere brumæ frigoribus, & pruinis inurendum. Quippe è contrario sicut
calor aestatis, ita vis frigoris excoquit terram, fermentatamq; resoluit. Palladi-
us ab eo: Serendi tempora, licet per menses certa signemus, tamen secundum
loci, & cæli naturam vnusquisq; custodiat. Frigidis locis autumnus satio cele-
rior fiat, verna verò tardior. Calidis autem regionibus & autumnalis serior fi-
eri potest, & verna maturior. Quæcumq; ferenda sunt, quum Luna crescit, se-
minentur: quæ secanda sunt, vel legenda, quum minuitur. Sementes horren-
simum, Theophrastus inquit, quibus feri singula solent, tres certè notantur. V-
na hyberna, altera aestiua, tertia quæ inter eas cadit post hybernū solstitium,
quas ita appellant, non ratione satus, sed ortus, vsusq;. Satus enim in cōtrariis
fermè temporibus consistit. Prima mense Iulio post aestiuum solstitium, quo
brassicam, radiculam, rapam, & quæ sementis postera vocant, ut beram, lastrum, 40

can,

cam, et ucam, lin-
da post brumam
gethyum, & atr-
cucumis, cucur-
sequamur varias
radice, auullion
generatio. E rad-
seruari ad fation
est aquosa, disso-
humor cohibeat
bit enim pars ter-
munimentum a
lentorem, diuini
pillumq;. Hæ na-
ocinum, & am-
sunt, germina fu-
mnia translata m-
guitudo extran-
bus depositis, qu-
10 quæ & mæy di-
lica. Lactuca qu-
la et uolos, atq; at-
cundus scilicet la-
sunt. In brassica fu-
pa terra coopert-
de industria faci-
humum eieceris
nius. Nascuntur
culo, ut ruta, or-
30 palmarum altitu-
rum verò quæ à
gethyi, scilla. F-
quidem omnia t-
in usum verò oc-
germinatione.
lescat: hoc & i-
rantq; in estate
De h-
N Vnc affe-
40 choribus d-

ram, erucam, sinapi, coriannum, anethum, & nasturtium ferere solent. Secunda post brumam mense Ianuario, qua seminant, defiguntq; porrum, apium, gethyum, & atriplicem. Tertia, quam æstiuam appellant mense Martio, qua cucumis, cucurbita, blitum, ocimum, portulaca, fatureia feruntur. Sed prosequamur varias earum generationes, ex eodem: & primò alia semine, alia ab radice, auulsione, & ramo oriuntur. E semine maximè generalis est omnium generatio. E radice allium, capra, bulbus, & capitata omnia. Sed oportet quæseruari ad sationem debent, vt earum interna humiditas pinguior sit: nam si est aquosa, dissoluitur, altera, vt tunicis muniatur, quarum præsidio intus humor cohibeatur, ne exhalet: nam quæ tenui cortice sunt, rugantur cito, abit enim pars tenuis. Exemplum rapi, & raphani, sed bulbus & scilla quum munimentum aliud à natura comparatum habeant, scilicet tunicas plures, & lentorem, diutius viuunt. Brassica auulsione nascitur, ruta, sisymbrium, serpillumq;. Hæ nanq; decisæ, & depactæ radices fundunt, adolescuntq;. Sed ocimum, & amaratum à summo recisâ panguntur, & si exuctioris naturæ sunt, germina fundunt, cultumq; suscipiunt, vt diu incolumia perennent. Omnia translata meliora, grandioraq; sunt: porrorum enim, radicumq; magnitudo ex translatione. Omnia autu faciliora, grandioraq; veniunt seminibus depositis, quàm fusim satis. Caule reciso omnia regerminant, exceptis quæ *Antigonay* dicuntur. Sed euidentissima & vîitata, ocimum, lactuca, & brassica. Lactuca quidem regerminatos caules suauiores affirmant, primos esse lactuosos, atq; amaros, vtpote minus concoctos, alii è contratio volunt, secundos scilicet lacte refertiores constare, sed dulciores sentiri, quandiu teneri sunt. In brassica suauiores regerminatos caules omnibus constat. Radix & rapa si terra cooperiantur, vsq; ad ætatem durant, & crescunt, quod olitores de industria faciunt, non enim regerminant, nec folia promunt, nisi aggestam humum eieceris, quod etiam in reliquis deprehendi facîle potest. Ab eo Plinius. Nascuntur omnia aut semine, aut auulsione. Quædam semine, & surculo, vt ruta, origanum, ocimum: præcidunt enim & hoc quum peruenit ad palmum altitudinis. Quædam & radice & semine, vt capra, allium, bulbi. Eorum verò quæ à radice nascuntur, radix & diuturna, & fruticosa est, vt bulbi, gethyi, scillæ: Fruticant alia & non capite, vt apium, beta. Caule reciso ferè quidem omnia regerminant, exceptis quæ non scabrum caulem habent. Et in vsum verò ocimum, raphanus, lactuca. Hanc enim suauiores putant à regerminatione. Raphanus vtiq; iucundior detractis foliis, antequam deculescat: hoc & in rapis. Nam & eadem direptis foliis cooperta terra crescunt, durantq; in æstate. Vtiq; meliora nascuntur acruatim sato semine, quàm sparso.

C A P. VII.

40

K K k 3

noxas, & contra innascentium animalium iniurias, indicabimus primò quomodo à cœli noxis tueantur. Grandini obuiam iri credidit Philostratus, si quis speculum incumbenti nubi ostendat. Vel si hyanæ, crocodili, aut phocæ pellem loco circumducas, eandemq; præ foribus domus suspendas. Vel si clauus multarum ædium per circulum regionis funiculis illigaueris. Vel si in domibus tauros statues ligneos. Vel si palustrem testudinem dextra manu supinam posueris, modica terra circum eam aggesta, ut se nequeat vertere, & abire. Sunt qui dicant hora sexta diei, vel noctis circumgestationem testudinis fieri oportere, & depositionem. Vel hippopotami pellis tegmina ad singulos horti terminos posita. Quæ valdè indecora opinor, vitanda, & non credenda, sed adscripsi, ne quid videar eorum præterisse, quæ veteres prodiderunt. Palladius contra grandinem etiam multa scribit. Panno roseo mola cooperitur. Item cruenta secures contra cœlum minaciter leuantur. Item horti spatium alba vite præcingitur. Vel noctua pennis patentibus extensa suffigitur. Vel ferramenta, quibus operandum est, sepo vnguntur vsino. Grandini creditur obuicare, si quis crocodili pellē, vel hyanæ, vel marini vituli per spatia possessionis circumferat, & in villā, aut cortis suspendat ingressu, quum malum viderit imminere. Item si palustrem testudinem dextra manu supinam ferens vineas perambulet, & reuersus eodem modo sicillam ponat in terra, & glebas dorſi eius obiciat curuaturæ, ne possit inuerti, sed supina permaneat. Hoc facto fertur spatium sic defensum nubes inimica transcurrere. Nonnulli vbi instare malum viderint, oblato speculo imaginem nubis accipiunt, & hoc remedio nubem (seu ut sibi obiecta displiceat, seu tanquam geminata alteri cedat) auertunt. Item vituli marini pellis in medio vinearum loco vni superiecta viticula, creditur contra imminens malum totius vineæ membra vestisse. Contra rubiginem hæc docentur à Columella in suis carminibus.

Hinc mala rubigo virides ne torreat herbas,

Sanguine lactentis catuli placatur, & extis.

Hinc caput Arcadici nudum cute fertur aselli

Tyrrhenus fixisse Tages in limite ruris.

Viq; Iouis magni prohiberet fulmina Tarchon,

Sape suas sedes percinxit viribus albis.

Hinc Amythaonius docuit quæ plurima Chiron,

Nocturnas crucibus volucres suspendit, & alius

Culminibus vetuit feralia carmina flere.

Anatolius, Omnia seminata rum hortensia, rum arualia ab omni bestia & integra, & illæsa conseruabis, si ipsa in succo cucumeris syluestris præmacerata seminaueris. Incorroſa autem manent olera in restu finis testam confeminata. Floribus euadet hortus, si loto tusa, & in aquam coniecta eum resperſeris, aut sænogræco in aqua trito sulcos irroraueris, aut aſini caluatiam in medium hortum deposueris. Palladius. Omnia semina horti, vel agri feruntur

tur ab omnibus
dicibus ante mac
ponenda est, v
qua spectant. Pl
dit, ne eò loci ful

Remed

Nunc ad b
Nerucis incip
bracteis innasce
10 timinectus. An
nerem triduo m
ea suffumigato.
Vel vrina & am
cum anetho coct
calceata, crinib
tum circumiens
tes suffumigato.
per hortum dispo
gionibus post pl
10 ruca; Græcè aure
frutices olerum
deciderint, non a
cum est facere,
macerata sunt. N
libro, qui Græcè
si mulier, quæ in
aream rer circum
In suis verò carm

Sed

Prof

Pall

Imma

Prof

Mo

Ar

Da

Fan

Leig

Sed

Ter

tur ab omnibus malis, ac monstrosis tuta seruati, si agrestis cucumeris tritis radicibus antè macerentur. Item equæ caluaria, sed non virginis, intra hortum ponenda est, vel etiam asinæ. Creduntur enim ea fecundare sua præsentia, quæ spectant. Philostratus etiam hippopotami pellem intra regionem defodit, ne eò loci fulmen cadat.

Remedia contra bestiolas horto innascentes. CAP. VIII.

NUNC ad bestiolas horticolas noster se conuertat sermo, & primò ab erucis incipiemus: maxima & vniuersalis olerum lues. Theophrastus brassicis innasce erucas dixit, quas humor collectus interimit, & fimus aceruatim iniectus. Anatolius Græcus ad eas fugandas hæc docet. Virigineum cinerem triduo macerato aqua, inde olera aspergito. Vel bitumine & sulphure ea suffumigato. Vel olerum semina ficulnei cineris lixiuio macerato, & serito. Vel vrina & amurca ex æquo mistis, vel alterius horti erucis exceptis, & aqua cum anetho coctis, & refrigeratis hortos irrorato. Vel menstruada mulier discalceata, crinibus passis, palliolo induta, nullo circa pudenda perizomate, hortum circumiens per medium egrediatur. Vel fungos sub nucis arbore nascentes suffumigato. Quin & vespertilionis stercore, & alii lignis suffitis, ut vapor per hortum dispergatur, erucæ necabuntur. Columella. Vbi verò apricis regionibus post pluuias noxia inceserunt animalia, quæ à nobis appellantur erucæ, Græcè autem *κλυται*, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorepunt. Id autem superuacuum est facere, si ante sationem semina, ut iam prædixi, succo herbæ sedi macerata sunt. Nihil enim sic medicatis nocent erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui Græcè inscribitur *περί ἀγρονομίας*, affirmat has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quæ in menstruis est, solutis crinibus, & nudo pede vnamquamq; aream ter circumeat, post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. In suis verò carminibus elegantissimè eadem docet,

*Sed ne dira nouas segetes animalia carpant,
Profuit interdum medicantem semina pingui
Palladia sine fruge salis conspergere amurca,
Innatæve laris nigra satiare fauilla.
Profuit & plantis latices infundere amaros
Marrubii, multoq; sedi contingere succo.
At si nulla valet medicina repellere pestem,
Dardania veniant artes, nudatæq; plantas
Fœmina, quæ iustis tum demum operata iuuenta
Leigbus obsceno manat pudibunda crinore,
Sed resoluta sinus, resoluto mœsta capillo,
Ter circum areolas, & sepem ducitur horti.*

*Quæ quum lustrauit gradieus (mirabile visu)
Non aliter quàm decussa pluit arbore nimbus
Veltereis mali, vel tecta cortice glandis,
Voluitur ad terram distorto corpore campe.*

Plinius. Raphano (brassicæ) innascuntur erucæ. Naporum medicina est, siliquas vnâ feri, sicut olerum cicer, arceat enim erucas. Quo si omisso iam nata sint, remedium absinthii succus decocti inspersus, & sedi, quam aizoum vocant. Semen olerum si succo eius madefactum seratur, olera nulli animalium obnoxia futura tradunt. In totum enim nec erucas, si palo imponantur in hortis ossa capitis ex equino genere sceminae duntaxat. Aduersus erucas & cancrum fluuiatilem in medio horto suspensum auxiliari narrant. Sunt qui sanguineis virgis tangat ea, quæ volunt his obnoxia esse. Palladius ex his. Contra erucas semina, quæ spargenda sunt, semper uiuæ succo madefiant, vel erucarum sanguine. Cicer intra olera propter multa portenta ferendum est. Aliqui cinerem defico super erucas spargunt. Item squillam, vel in horto ferunt, vel certe suspendunt. Aliqui mulierem menstruantem, nusquam cinctam, solutis capillis, nudis pedibus contra erucas, & cætera hortum faciunt circumire. Aliqui fluuiales canculos pluribus locis intra hortum clauis figunt. Campas fertur euincere, qui fusticulos allii sine capitibus per horti omne spatiû comburens nidorem locis pluribus excitari. Vel si ablatas de horto vicino campas excoquas aqua, & per horti uispatia vniuersa diffundas. Campas nonnulli ficulneo cinere prosequuntur: si permanserint, vrina bubula, & amurca æqualiter mista conferueant, & ubi refrixerint, olera omnia hoc imbre consperge. Contra pulices radicibus, Theophrastus docet remedium, ne noceant, interferere eruum. Sed ne nascantur, nullum remedium repertum est. Anatolius. Olera à pulicibus non corrodentur, si seminibus ipsorum parum erui in seminando ammisseris. Hoc rapis, & raphanis maximè conuenit. Alii erucam simul ferunt, vel plantant, & præsertim cum brassicis. Hæc nanque à pulicibus infestantur. Omnia hortensia semina, & arualia ab omni bestia illata seruabis, si ipsa in succo syluestris cucumeris præmacerata seminaueris. In corrosa manent olera in testudinis testam conseminata. Palladius. Acre acetum succo iusquiami mistum fertur olerum pulices necare, si spargas. Vel amurca per pavementum frequenter aspersa, vel cimino agresti cum aqua trito. Vel si cucumeris agrestis semen aqua resolutum sæpè infundas, vel aquam lupinorû pilotri austeritatibus iunctâ. Contra culices hæc habet Columella. Qui æstate feret, caueat, ne propter siccitates culex adhuc terrena folia prorepentia, consumat. Id quoque vitetur, puluis etiam, qui supra cameram inuenitur, vel etiam fuligo, quæ supra focos tectis in hæret, colligi debet, deinde pridie, quàm satio fiat, commisceri cum seminibus, & aqua conspergi, ut tota nocte succum trahant: nam sic macerata postero die rectè seruntur. Palladius. Culices galbano infuso fugantur, aut sulphure. Contra culices, vel amurcam

amurcam recentem
horros ignis præ
tur. Gt colices i
sic mali punici fun
appellata, ex The
timinectus. In du
stercorè. Quam
Diophanes ut bla
lomi recentem, st
10 nim ipsum prælo
gabis, & sic appre
perq; in ipso deg
cant animalia, q
occisi plenum so
Post bidum rep
ceris genus om
larum quoque gen
priuatim animal
se. Contra formi
10 fugabis, quæ res
regmina cum sty
liter origano & l
intereunt, si succo
syluestris cucum
lentum rogam. N
formica exurant
formicas, si in h
niunt, omne ho
abiges, si origan
30 Item cochlearu
nus Tyro in libr
tra formicas, n
monstrauit, lin
sed efficacissim
tere crudo in
dis locustis, v
custrum neb
& præteritun
infiterint, nil
40 uestribus in m
militer præterit

amurcam recentem, vel ex cameris fuliginem spargimus. Infestant & culices
 hortos rignos præcipuè, si sint arbusculæ aliquæ. Hi galbano accenso fugan-
 tur. Git culices suffitu necat. Fumus crematorum lupinorum culices necat,
 sic mali punici fumus. Nascuntur lactucis, & porris, aliisq; pluribus porricidæ
 appellata, ex Theophrasto. Has humor collectus interimit, & fimus acerua-
 tim iniectus. Industria enim bestiola condens sese, vt in stramento quiescit in
 stercore. Quamobrem venari facile est, aliter nulla venandi datur facultas.
 Diophanes vt blattæ necentur, hæc affert experimenta. Ventriculum ouil-
 lum recentem, stercore plenum, illorumq; defodito in superficie, inuenies e-
 nim ipsum prasocurridibus refertum. Si iterum idem feceris, omnes congre-
 gabis, & sic apprehensas perdes. Est enim stercoris amans animalculum, sem-
 perq; in ipso degēs, hoc modo facile capitur. Palladius, *μεγρονοειδης* Græci vo-
 cant animalia, quæ solent hortis nocere: ergo ventriculum veruecis statim
 occisi plenum sordibus suis, spatio, quò abundant, leuiter debebis operire.
 Post biduum reperies ibi animalia ipsa congesta. Hoc quum bis vel tertio fe-
 ceris genus omne quod nocebit, extingues. Plinius ex Theophrasto. Bestio-
 larum quoq; genera in nascuntur raphano, eruca, & vermiculi. Porro verò
 priuatim animalia, quæ facillimè stercore iniecto capiuntur, condentia in id
 se. Contra formicas Diophanes his vtitur. Si formicas captas vlleris, reliquas
 fugabis, quæ res experimento constat. E cauernis suis expelles, si cochlearum
 tegmina cum styrace vlleris, & contusas in agmen ipsarum consperferis. Simi-
 liter origano & sulphure tritis, & circum aceruos ipsarum asperfis. Penitus
 intereunt, si succum cyrenaicum oleo dissolutum ipsis affuderis. Vel radice
 syluestris cucumeris suffumigata, aut siluro maxime Alexandrino suffito ad
 lentum rogam. Vna formica sublata, aliæ vltro relinquunt latebram. Quod si
 formicæ exurantur, aliæ odore ipsarum diffugient. Palladius ab eo: Contra
 formicas, si in horto habent foramen, cor noctuæ admoueamus, si foris ve-
 niunt, omne horti spatium, cinere, aut cretæ candore, signemus. Formicas
 abiges, si origano & sulphure tritis foramen asperges. Hoc & apibus nocet.
 Item cochlearum vacuas testas si vlleris, & eo cinere foramen inculces. Sabi-
 nus Tyro in libro Cepuricon, quem Mæcenati dicauit, Plinio referente, con-
 tra formicas, non minimum horum exitium, si non sint rigui, remedium
 monstrauit, limum marinum, aut cinerem, obturandis earum foraminibus,
 sed efficacissimè heliotropio herba necantur. Quidam & aquam dilutam la-
 tere crudo inimicam eis putant. Multa quidem veteribus prodita sunt arcen-
 dis locustis, verum selecta, expeditioraq; ex Democrito describemus. Si lo-
 cutus tur nebula accedat, omnes intus maneat inconspicui, & delirescentes,
 & præteribunt regionem. Si verò antequam hoc sit obseruatum, derepente
 insiterint, nihil omnino contingent, si lupinis amaris aut cucumeribus syl-
 uestribus in mutia feruefactis conspergantur, nam è vestigio moriuntur. Si-
 militer præteribunt regionem, si captas vespertiones ex sublimibus regionis

arboribus suspendis. Si autem captas locustas videris, ab odore vertigine afficiuntur, & partim moriuntur, partim demissis alis venatorem expectant, & à sole corrumpuntur. Fugabis locustas, si confecto ex ipsis garo, scrobes effoderis, eosq; garo resperferis, antequam præteribit dies, si accesseris reperies ipsas in scrobibus somno oppressas, ut facile perimas. Nihil omnino continget locusta ex eis, quæ absinthio, aut porro, aut centaurea, aqua tritis resperferis. Palladius ex eo. Opinio Græcorum est, si nubes locustarum repente surrexerint, latentibus intra tecta cunctis hominibus eam posse transire, quod si inobservantes homines sub aëre deprehendant, nulli fructuum noceri, si continuo omnes ad tecta confugiunt. Pelli etiam dicuntur, amari lupini vel agrestis cucumeris aqua decocta, si muricæ mista fundatur. Existimant aliqui locustas fugari posse, si aliquæ ex eis vrantur in medio. Nunc autem contra quadrupedes grandioraque animalia remedia ex Græcis scribemus, quæ orto noxam inferre possunt. Contra rurales mures admonet Apuleius bubulo felle semina illinere, ut ipsa non contingant mures. Melius autem diebus canicularibus cicuta semen cum veratro, & polenta: aut sylvestris cucumeris, aut hyoscyami, aut amygdalarum amararum, & veratri nigri pares portiones contusas polentæ miscere, & oleo subigere, & cauernis murium apponere: nam his degustatis moriuntur. In Bithynia rhododaphnes folia in foramina obdunt, quo mures prodire gestientes, illa dentibus contingant: ex contactu enim necantur. Palladius ab eo. Apuleius aduersus agrestes mures asserit semina bubulo felle maceranda, antequam spargas. Nonnulli rhododaphnis foliis aditus eorum claudunt, qui ros his, dum in exitu nituntur, intereunt. Mures verò, qui hortis, & domibus oberrant, Paxamo authore, ita necabis: Veratro cum polenta obiecto, vel sylvestris cucumeris semine cum veratro nigro, & colocynthide, & polenta: vel suffitu calcanthi, origani, apii seminis, & nigellæ. Si quercinum cinerem cauernæ apposueris, incinerati scabie infestantur, intereuntq; Ferri scobe fermento admista degustata moriuntur. Si excæcare libeat, tithymalum contusum cum polenta ac mulso mistam appone: nam ubi ederint, obcæcabuntur. Idem describunt Anatolius, & Tarentinus. Rubi radice cum butyro, pane, & caseo mista, gustata pereunt. Quidam veratrum album, & cynocrambes corticem tustum cribratumq; cum polentis, & ouis, & lacte in massam redigunt, eamq; cauernis ipforum immittunt. Hamatitæ lapidis, & viridis myricæ suffitu fugantur. Anatolius, & Didymus in peluim æream amurcam infundere iubent, noctuq; media domo reponere, & ibi congregabuntur. Palladius ab eis. Mures si amurcam spissam patinæ infuderis, & in domo nocte posueris, adhærebunt. Item necabuntur si helleboro nigro caseum, vel panes, vel adipem, vel polentam permisceas, & offeras. Et agrestis cucumeris, & colocyntidis suffusio sic nocebit. Mures rusticos si quercino cinere aditus eorum satures, attractu frequenti scabies occupabit, ac perimet. Talpas sic perdit Sotion. Veratrum album, & cynocrambes corticem con-

VI
cundito, cribrat
massas cogito
ipsum paleas, ce
accomodato, &
flato, & fumus
des. Palladius ab
rari iubent, vel
cum sulphure su
ramenta talparu
to feruari, in cuiu
possit accipere
pas vel fugere
moniac, & fr
zer discurrunt,
Vel vna capra e
de cætero non
fugare docet, s
pum, sulphur,
ueris, aceto aff
to runt, si absint
plantaueris. Al
co herbæ draco
phani, & si gust
cet cerui adeps
quile, aut milui
herbam aqua t
mentis inueter
tur, tu extrafi
fugantur, &
jo mus galbanu
stra noxia pro
bus libet noc
vel matinos,
vasculo in aqu
tur. Postea
bus peractis

De
Sed ad ol
Exigunt, &
40 duntur, & la

condito, cribrato, & cum polenta & ouis, in vino & lacte rigato, & subacta, in
massas cogito, & ipsarum cauernis immittito. Vel vas angustum capito, & in
ipsum paleas, cedriam, & sulphur iniicito, & os in cauernam, vbi habitat talpa
accomodato, & alia foramina obtura, ne fumus egrediatur, quo facto insus-
flato, & fumus talpas omnes suffocabit, idem facito in aliis, & omnes disper-
des. Palladius ab eo. Talpas Græci hoc genere persequuntur. Nucem perfo-
rari iubent, vel aliquod pomi genus soliditatis eiusdem. Ibi paleas & ceram
cum sulphure sufficienter includi, tunc omnes paruulos aditus, & reliqua spi-
ramenta talparum diligenter obstrui, vnum foramen, quod amplum sit, re-
seruari, in cuius aditu nucem intus incensam sic poni, vt ab vna parte flatus
possit accipere, quos ab alia parte diffundat. Sic impletis fumo cuniculis, tal-
pas vel fugere protinus, vel necari. Contra mustelas Didymus vritur sale am-
moniaco, & frumento simul commacerato, eisq; iuxta locum, vbi frequen-
ter discurrent, disseminatis: nam aut his comestis morientur aut fugabuntur.
Vel vna capra ex eis, caudam, aut testiculos amputato, viuenteq; dimittito,
de cætero non amplius ipsas repertum iri in ea regione. Florentinus serpentes
fugare docet, si laferis succum, nigellam, & galbanum, cerui cornu, hyssopum,
sulphur, pyrethrum, peucedanum, & ungulas caprarum miscueris, tri-
ueris, aceto affuderis, & factis pilulis fumum excitaueris. Nec in regione e-
runt, si absinthium, artemisiā, aut abrotonum circa prædium, aut villam
plantaueris. Abiguntur etiam suffitu radicis lilii. Tarentinus ait, oblitum suc-
co herbæ dracontæ serpentem non accedere, neq; oblitos succo seminis ra-
phani, & si gustauerint tantum nulla iniuria affici. Non accedit serpens vbi ia-
cet cerui adeps, centaureæ radix, gagares lapis, aut dictamnium herba, aut a-
quilæ, aut milui sterces; eadem cum styrace suffita reptilia abigunt. Tribulum
herbam aqua terito, & ipsum cauernæ indito, & fugabis ipsos. Si dolia à salsa-
mentis inueterata circum prædium defodiantur, omne reptile in ipsa illabe-
tur, tu extra fines exures. Palladius ab eo. Serpentes propè omni austeritate
fugantur, & nocentes spiritus innocentia fumi graueolentis exagitat. Vra-
mus galbanum, vel cerui cornua, radices lilii, capræ ungulas, hoc genere mon-
stra noxia prohibentur. Democritusq; asserit, neq; arboribus, neq; satis qui-
buslibet noceri posse à quibuscunque bestiis, si fluuiatiles canctos plurimos,
vel marinos, quos Græci *παρρησ* nominant, non minus quàm decem fistili
vasculo in aqua missos tegas, & sub dio statuas, vt decem diebus sole vaporen-
tur. Postea quæcunque volueris illæsa esse, ea aqua perfundas, & octonis die-
bus peractis hoc reperas, donec solidè quæ optaueris adolefcent.

De herbis acetariis dictis, & primò de lactuca. CAP. IX.

SED ad olerum historias transeundum, ex quibus aliqua sunt, quæ coqui
exigunt, Theophrasto authore, vt caulis, beta, rumex: alia quæ cruda man-
duntur, & sale, oleo, & aceto condiuntur, cœnæq; initio apponuntur; ab ali-

quibus acetarias herbas dictas audio: nam ad cibi appetentiam concitandam, herbis, radicibus, sale, oleo, & aceto guttatim instillato antiquos vfos fuisse, testis est Plinius, de portulaca loquens. Stomachum, inquit, in acetariis sumpta corroborat. Et si suos hortos prisci acetaria vocabant, non ab aceto, ut quidam rati, sed ab accipiendo, quasi acceptaria, ut diximus. Nos acetaria olera vocabimus, quæ aceto, & oleo condita, cruda manderi solemus, & ab his incipiemus, & primo à lactuca, omnium optima, quæ in acetariis paratur. Galenus cæteris oleribus præferri ait, nec vllum quidem melioris succi inueniri, explodendamq; eorum censet opinionem, qui vitio vertunt, quod in huius oleris laudem cedere debeat, quum copiosum gignat sanguinem, nec improbum. Manditur cruda & cocta, garo, oleo, & aceto condita. Plinius. Est quidem natura omnibus refrigeratrix, & ideo æstate grata, stomacho fastidium auferunt, cibiq; appetentiam faciunt. Diuus certe Augustus lactuca conseruatus in agritudine fertur, prudentia Musæ Medici, quum priores cauere. Religione nunc omni caret, in tantum recepta commendatione, ut seruari etiam in alienos menses eas oximelite repertum sit. Sanguinem quoq; augere creditur. Ob id Columella in suo hortulo,

*Iamq; saluari properet lactuca sapore,
Tristia quæ releuat longi fastidia morbi.*

Columella ita condit. Lactuca caules ab imo depurgatos vsq; ad tenera folia in alueo salire oportet, diemq; & noctem finire, dum muriam remittant, deinde muria eluere, expressosq; cratibus pandere, dum assiccescant, tum substernere anethum aridum, fœniculum, rutæ aliquid & porri concidere, & miscere, tum siccatos coliculos ita componere, ut faseoli virides integri interponantur, quos antea die, ac nocte muria macerare oportebit, & assiccatos cum fasciculis lactucarum condi, & superfundii ius, quod sit aceti duarum partium atque vnius muria, deinde arido spissamento fœniculi sic comprimi, ut ius supernatet, & sape ius suffundere nec pati sitire salgama. Platina & alio modo condit. Prohibet & lactuca ebrietatem, ob id succurrit ex historia vetustatis admiratio, siquidem ad eandem auertendam institutum, ut lactucis non cœnæ præmio vescerentur, sicut ad conciliandam appetentiam nostra tempestate faciunt omnes, sed in fine, quoniam insita frigida retundat ebrietatem, quod ex Athenæo patet tertio libro, & ex Martialis disticho:

Clandere quæ cœnas lactuca solebat auorum,

Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Lactucis quoq; continue vscientes hebetiores in venerem fiunt. Nican- der Colophonius memoriæ scriptum reliquit, Adonidem Myrrha filium, quum lactucam deuorasset, ab apro fuisse interemptum. Addidit Callima- chus, Venerem eum sub lactuca condidisse. Quibus verborum inuolucris in- nuunt Poëtæ eorum concubitus elangescere, pigerrimosq; in coitum fieri, qui hoc olere continuo vescantur. Quare Eubolus graui conuitio coniugem

inceste-

VI
incestebat, quæ
eundi facultas
nos, ideoq; ferali
manducabant. I
chras ab amante
rum inde nata vi
lari, ex Plinio.

Ob varias eius
cos. Theophrasti
10 siculneo foret, v
Nicanter Colop
ptos Brenthin
apud Phrygios
am iuvæ, in dici
tur. Palladius ita
lactis copiam me

Lactuca com
cipariter & Lati
lo, & ubi conflun
lacte copioso, ad
superne multica
des: Sylvestris la
graciliora, & asp
pora, candor cau
vestrem lactucan
Saturæ genera tri
ricaulis lactuca:
conica, cui foliu
est. Inter latas

30 nonnulli vranu
lis, adeo ut hosti
ius herbaceo, &
rundi caulis. Ter
verba transcribe
crescant, nece
Alii colore, &
men mense lan
li. Diligentiore
cas: longiora hi
40 les. Est etiam mu
soporiferi. Colu

m concitandam,
quos vfos fuisse,
in acetariis sum-
ab aceto, vt qui-
os acetaria olera-
us, & ab his in-
is paratur. Ga-
succi inueniri,
, quod in huius
em, nec impro-
Plinius. Est qui-
bacho fastidium
laetuca conser-
riores cauerent,
ne, vt seruaret-
in quoq; augere

incedebat, quæ mensis lactucam obrulisset, simul quod hac emarcescit co-
eundi facultas, simul quod emortuum Adonim sub hac abdidisse fertur Ve-
nus, ideoq; feralibus epulis dicata, quare priores ob religionem minimè com-
manducabant. Illud adiicit Cratinus Phaona inter lactucas absconditum pul-
chras ab amante Venere. Tantus fuit lactucis honos, vt cognomina proce-
rum inde nata videamus, Lactucinosq; in Valeria familia non puduisse appel-
lari, ex Plinio.

Ob varias eius vtilitates, vsusq; multa obtinuit lactuca nomina apud Græ-
cos. Theophrasto *ἡρίδαξ*, & *ἡρίδακιν* dicitur, *ἡρίδα* πα *ἡρίδα* fortasse, quod folio
ficulneo foret, vt pote lactis non experte. Athenæus Atticis sic dici testatur.
Nicander Colophonius libro secundo de linguis lactucam asserit apud Cy-
prius Brenthin appellari. Pamphilus ab Hipponacte *ἡρίδακιν* dici. Clitarchus
apud Phrygios sic etiam nominari. Ibicus Pythagoricus lactucam caule vidu-
am *ἡρίδα* dici, quasi spadoniam, & à mulieribus *ἡρίδα*. Latinis lactuca dici-
tur. Palladius ita dici asserit, quod lactis abundantiæ exhuberet. Apuleius quod
lactis copiam mulieribus commanducata augeat. Italis *lattuca*.

Laetuca complura discrimina, nos primo in syluestrem, & satiuam, vt Græ-
ci pariter & Latini, diducimus. Sylvestris, Theophrasto authore, folio pusil-
lo, & vbi consummatum est, aculeato, caule breuiori, candidioreque satiuo,
lacte copioso, acri, medicatoq; , quod carpitur per messes, radice breuiori, &
supernè multicaulis, quàm satiuæ, sponte nascens in aruis. Ab eo Dioscori-
des: Sylvestris lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia,
graciliora, & asperiora, amaro gustu, & lacteo succo. Tandem sylvestrium
notæ, candor caulis, cubitalis magnitudo, thyrsos, & foliis scabritia. Hanc syl-
uestrem lactucam circi (accipitris genus) suis nidis propter blattas imponunt.
Satiuæ genera tria monstrauere Græci: Theophrasto *παπύρακος ἡρίδακιν*, la-
ticaulis lactuca: *τρογγυλόκαυλος ἡρίδακιν*, rotundi caulis lactuca, & *λακωνική*, la-
conica, cui folium carduo simile, & recta, ampla, & à caule minimè brachiata
est. Inter latas adeò quædam laticaulis fiunt, vt pro valuis hortorum hisce
nonnulli vtantur. A quo Plinius. Lactucæ genera tria fecere. Vnum laticau-
lis, adeo vt hostilia olitoria ex his factitari prodiderint. Folium his paulo ma-
ius herbaceo, & angustissimum, vt alibi consumpto incremento. Alterum ro-
tundi caulis. Tertium sessile, quod laconicon vocant. Athenæus Theophrasti
verba transcribens, non scolymi folia habere dicit, sed crispa, recta, quæ faciliè
crescant, nec repullulent ex thyrsos. Latini aliter genera diuiserunt. Plinius.
Alii colore, & tempore satius genera discreuere. Esse enim nigras, quarum se-
men mense Ianuario seratur, albas, quarum Martio, rubentes, quarum Apri-
li. Diligentiores plura genera faciunt, purpureas, crispas, Cappadocas, Græ-
cas: longiora his folia, caulesq; lati, præterea longi, & angusti, intubis simi-
les. Est etiamnum alia distinctio, atræ, quæ meconis vocatur, à copia lactis
soporiferi. Columella complura esse lactucæ genera dicit, quæ suo quoque

Nomina.

Genera.

funt. Nican-
yræ filium,
dicit Callima-
chus uolueris in-
coitum fieri, 40
tio coniugem
incede-

tempore serio oportet: eatum, quæ fusci & veluti purpurei, aut etiam viridis coloris, & crispis foliis, ut cæciliana, mense Ianuario rectè differitur. At cappadocia, quæ pallido & pexo, densoq; folio viret, mense Februario, quæ deinde candida est, & crispissimi foliis, ut in pronvincia Bætica, finibus Gaditani municipii, mense Martio rectè pangitur. Est & Cyprii generis ex albo rubicunda, leui & tenerimo folio, quæ in idibus Aprilis commodè disponitur. In suis carminibus:

*Altera crebra viret, fusco nitet altera crine,
Virag, Cæcili de nomine dicta Metelli.
Tertia, quæ spisso, sed puro vertice paller.
Hæc sua Cappadoca seruat cognomina gentis.
Et mea quam generant Taribesi litore Gades,
Candida vibrato discrimine, candida thyrso est.
Cypri item Paphio quam pingui nutrit in aruo,
Punica de pexa coma, sed lactea crure est.*

Neapoli complura habemus lactuca genera, sed laticaulis, ex qua olitoria hostiola facituri prodidit Theophrastus, & Plinius, folio paulò maiori herbaceo, angustissimo, & alibi consumpto incremento nostris in regionibus non visitur. Laconica Theophrasti folio scolymi, recta, amplaque, nec à caulibus brachiata, quam Athenæus crispam dicit, quæ faciliè crescat, nec ex caule repullulet, quamq; Plinius sessilem dicat, Columella viridis coloris, & crispis foliis Cæciliam vocat, & quæ Ianuario feratur; apud nos *mortarella* dicitur, & à radicis breuitate, qua innititur, *pie de corta* etiam. Denso est folio, ac veluti crispo, sessilis, foliis in orbem conuolutis. Seritur Ianuarii fine, transfertur Martio, secatur Aprilis. Id habet peculiare, quod radice tenuis alias lactuculas proferat. De hac etiam Plinius. Rotundam ac minimæ radicis, latis foliis, astylida, quidam eunuchion vocant. Columella fusco quæ viret altera crine, fusco ac veluti purpureo, etiam cæcilia dicta, quæ Ianuario feritur. Plinius purpuream dicit, maximæ radicis, ac cæciliam vocari. Apud nos *inconocchiata* dicitur, quæ & si Ianuario seri posset, nos ne quo desit lactuca tempore Augusto hanc serimus, terra pluuiis madefacta, transferimus Decembri, serimus Martio, & irriguis hortis, vbi helice aquas exhaurimus. Iunio serimus, ut transferamus Augusto, secemusque Decembri. Hæc germana iam dicta videtur, ut vtraque cæcilia dici possit. Cappadoca, pallido, pexo, densoq; virens folio, feritur Februario, nos à Cappadocum corrupto nomine *cappuccia* dicimus, quasi capitata, propter foliorum glomum conuulutorum, atque in festipatorum, quasi multæ tunicæ mutuo appressæ essent: insidet humi, sessilis vocata: albo, pexo, densoque folio viret, pexo scilicet, quod in medio extuberantia quædam habeat, in modum pexi panni, quam *frisatum* vulgò dicimus. Circumuoluuntur folia in globum brassicæ capitatæ modo, vel humari capitis instar extuberat. Serimus hanc Augusto, transferimus Decembri, secamus

secamus Martio, ca vero candida. Stus nouille, quæ Plinius, Et ecce quæ cæcilia vocatur, foliis lebes Neapoli habet Hispani aduectæ, diffima, tenerimè transfertur, nisi velle ex albo rubi disponitur, quam ad admirationem laram ferit. Aliud Maio eo velsimum maioribus cæteris non clauditur. Ligetram adaggerant. Et si prætereun nullum olus frequemus. Perfectis foliis. Breui innititurum iis, quæ in latetipem maximè. Caule albicanti, sessilifol. In cuius cæciliis, oblongum, in aculeis, nescunt amarores. Columella apud rum copia est, pergitur. Plinius albi Smyrna nasci scribit. Palladius amantucas scripsit. Semine feritio ex prima sensatione. Quumcis, & maritimæ, hyeme non debet, maiorem quæ diximus, suoc

secamus Martio, semine est nigro, frigoribus obstat, semel anno feritur. Beticæ verò candida, crispissimi folii, quæ Martio feritur. Videtur hanc Theophrastus nouisse, quum dixerit, Nigrarum candida dulcissima, & tenerima est. Et Plinius, Et ecce quum maxime cœpit irrepere satius admodum probata, quæ cilicia vocatur, folio cappadocæ, nisi crispum, latiusq; esset. Has maximè celebres Neapoli habemus, vulgò dictas *lattuca crespa di S. Girolamo*, quam ex Hispaniis aduectam dicunt. Folio est crispo, & per ambitum laciniato, candidissima, tenerima, ac omnium dulcissima perhibetur. Seritur toto anno, nō transfertur, nisi vt semen afferat, magnatum cœnis apponitur. Cypria Columellæ ex albo rubicunda, leui & tenerimo folio, quæ Aprilis idibus commodè disponitur, quam Plinius rubetem vocat. Hæ Neapoli raro visuntur, foliis vsq; ad admirationem rubicundis, & rubeis maculis distinctis, quam ex Cypro adlatam ferūt. Aliud est apud nos genus satis nobile, quod *maiatico* dicimus, quia Maio eo vescimur. Seritur Ianuario, transfertur Martio, semine nigro, foliis maioribus cæteris, viridioribusq; in oui modum conglobatis, capite patulo, non clauditur. Ligatur vinclis cacumen, sic candidior, & tenerior efficitur, terram adaggerando ad cacumen vsque.

Et si prætereunda fuisset hortensis, & esculentæ lactucæ descriptio, quum nullum olus frequentius, aut notius eo fuerit, è Theophrasto tamen adducemus. Perfectis foliis caulem profert, primo blandum, processu spinis horridulum. Breui innititur radice, breui tum ea, quæ recta deorsum mittenda est, tum iis, quæ in latus porrigi solent: fibris tantum cohæret, quamobrem vni stirpem maximè dici conuenit. Semen lanugine occultitur. Addimus nos. Caule albicanti, sesquicubitali, recto, lacte turgente, foliato, in summo alis diuiso. In cuius cacumine flores copiosi, pusilli, luteoli, Iunio mense efflorescentes, postmodum in pappos abeuntes, atque subinde semen proferentes, oblongum, in acutum desinens, colore tum albo, tum nigro. Folia quum senescunt amarorem contrahunt.

Columella aprico cœli, & calido statu gaudere dixit, & locis quibus aquarum copia est, penè toto anno feri posse. Hyeme non æquè commodè dispergitur. Plinius albas maximè hyemem tolerare. Diocles optimas lactucas in Smyrna nasci scripsit, Athenæo auctore. Neapoli toto anno feritur.

Palladius amare solum subactum, pingue, humidum, & stercoreatum lactucas scripsit.

Semine feri Theophrastus scripsit post æstiuum solstitium, mense Iulio ex prima semine, quarto die à semine erumpit. Columella de eius satione. Quum sex foliorum erit, transferri debet. Locis quidem apricis, & maritimis optimè autumno ponitur, mediterraneis & frigidis contrà, hyeme non æquè commodè dispergitur, sed huius radix fimo liniri debet, maioremq; copiam desiderat aquæ, sicq; fit tenetioris folii. Genera, quæ diximus, suo quoq; tempore feri oportet. Aprico cœli statu (vt diximus)

& ubi aquarum copia est toto penè anno feri potest. Duobus anni temporibus feri potest, autumno, & vere, vel circa calendas Septembris, vel melius ante calendas Martias Februario feruntur. Locis verò siccis, aut tepidis, quales sunt Calabria, & Apulia maritima, possunt circa idus Ianuarias terræ committi. Plinius. Seruntur lactuca toto anno latis, & riguis, stercoreatisq; binis mensibus inter semen, plantamq; & maturitatem. Legitimum tamen à Bruma semen iacere, plantam Fauonio transferre, aut semen Fauonio, plantam æquinoctio verno. Palladius, Mense Ianuario lactuca ferenda est, vel Decembri, ut planta eius Februario transferatur. Itemq; Februario feritur, ut possit Aprilimense transferri. Sed certum est eam toto anno bene feri, si locus sit latus, stercoreatus, irriguus. Antequam pangatur, radices eius reseceamus æqualiter, & liquido fimo linamus. Vel quæ iam pactæ sunt, nudatæ laramen accipiant. Inter has herba manu euellenda est, non sarculo. Latior fit, si rara ponatur.

Ari.

Sed ad paratum accedamus, videamusq; quomodo teneritudo acquiratur, propter quam olera experuntur. Theophrastus vstratissimum esse ait caulium decerptionem, suauioresq; haberi, qui coercitis primis, nouo pullulatu prodierunt. Priores illos lactuosos, & insuaves esse, utpote minus concoctos, è contrario secundos lacte referriores constare, suauioresq; sentiri, quandiu teneri. Cuius rationem libro de causis assignat: teneritatem humoris copia, & bona habitudine prouenire: bona enim habitudo propter mollitiem partem ex humiditate: acrimonia enim, & siccitas, & si alia lactuosi humoris qualitas sit, diluitur concoctione, alimentoq;. Validior facta radix caulium attritione plus attrahit, unde superioribus suppeditatur, & ex concoctrice facultate non solum mansum, sed præcoctum foliis alimentum ministratur. Palladius: Si vitio loci, vel temporis, vel seminis citò lactuca durecit, planra eius auulsa, & biduo posita teneritudinem consequetur. Aristoxenus Cyrenæus à patria desciscens philosophia, heluo easit, qui quo deliciis, ac profuso luxui magis indulgeret, natas in hortis lactucas vespere mulso vino rigabat, eoq; dum satis ebibissent, satiabat potu, ut post idie quum illuxisset, placentas virides à terra missas habere se vendicaret, ex Athenæo. Ut sessilis fiat, & quodammodo se in latitudinem diffundat, aliqua sunt antiquorum experimenta. Columella, quo tardius caulem faciat, quum aliquod incrementum lactuca habuerit, exiguam testam media parte accipiat, eo quasi onere coercita, in latitudinem se diffundit. Plinius. Seri etiam radices illitas fimo refert, & repleti ablaqueata humo. Quidam & aliter amplitudinem augent, recisis quum ad semipedem excreuerint, fimoq; fuillo recenti illitis. Palladius. Latior fit si rara ponatur, vel quum producere incipiet caulem, eo leniter inciso, gleba ponatur, aut testa. Sessile fieri, nec caulem promere, sed conuolutis vnâ foliis in globum extuberare, vel in orbem circumagi vult Florentinus Græcus, si translata radix, ubi ad palmi altitudinem adoleuerit, ablaqueata bubulo

V
bubulo simore
mentum peruen
fictilis non picat
tum capestat. C
quenter asperga
Palladius. Cand
minis albi, si are
inresecencia foli
tur, si citius seme
10 ce, ut lactuca oc
ant, Græcus aut
stercus accipies
eiusdem generis
nes, & profun
strato, inde tenu
rit, continuò ste
gentia adhibere
duobus, tribus
scent, eaq; hinc
10 multiplici form
Item multis sen
subtiliter excava
immiseris, & tu
demerferis. Rap
pariter emergere
tur. Auglia lact
dibus sarculo po
adliniunt. Sic ol
Theophrast
30 lectus interim
tas esse, quæ la
interfectrices. I
plus limaces, &
D E intub
car, qua
cellia, & senec
mi, & si suauit
alio intubos, se
40 latem corporis

bubulo fimo recenti oblinatur, & aggere congesto rigetur, dumq; ad incrementum peruenerit, erumpens germen acie ferri præscindatur, demum testæ fictilis non picata imponatur, ne in longitudinem, sed latitudinem augmentum capeſſat. Candidæ etiam ab eodem fieri purantur, si fluminis arena frequenter aspergatur in medias, & collectis ipsa foliis alligentur. Eadem ab eo Palladius. Candorem verò putat Plinius contingere iis duntaxat, quæ sint seminis albi, si arena de littore à primo incremento congeratur in medias, atq; incrementa folia contra ipsas religuntur. Odoratam fieri Florentinus pollicetur, si citius semen impositum vnâ seratur. Sed quomodo vnâ, eademq; radice, vt lactuca ocimum, apium, eruca, & alia olerum genera diuersa proueniunt, Græcus author Didymus ita scriptum reliquit. Caprinum, aut ouillum stercus accipies, & perforabis, & industriè euacuabis, sic antedicta, vel alia eiusdem generis semina, vel quæcunque velis in euacuata parte impones, & profundè non minus duorum pedum depones, stercore raro substrato, inde tenui terra aggesta, sensim aqua rigabis, & ubi semen enatum fuerit, continuò sterçus sparges, & quum in caulem excreuerit, multo plus diligentia adhibeto, nasceturq; lactuca prædictis seminibus simul concreta. Alii duobus, tribusve horum pecorum stercorebus contusis prædicta semina miscent, eaq; linteo deligata obruunt, & reliquam adhibent diligentiam. Sic multiplici forma, varioq; sapore tibi lactuca comparabitur. A quo Palladius: Item multis seminibus condita nascetur, si caprini stercoreis baccam subula subtiliter excaueris, & in ea semen lactucæ, nasturtii, ocimi, erucæ, radici immiseris, & tunc inuolutam fimo baccam, terra optimè culta breui scrobe demerſeris. Raphanus nititur in radicem, cætera semina in summo, lactuca pariter emergere profiliunt, singulorum sapore seruato. Alii hoc ita assequuntur. Auulsa lactucæ folia carpunt, quæ radicibus iuncta sunt, & in eisdem gradibus surculo punctis, præter raphanum semina supradicta deponunt, ac fimo adliniunt. Sic obruta iterum lactuca prædictorū seminum caulibus ambietur.

Theophrastus lactucis erucas, & vermiculos innasce dicit, quos humor collectus interimit, fimoq; acervatim iniectus. Statts apud Athenarum ait blattas esse, quæ lactucas erodant, ob id thridacnedas dictas, quasi lactucarum interfectrices. Plinius ab eo: Nascuntur lactucis vermiculi, & eruca, hoc amplius limaces, & cochleæ.

*Insectar.
remedia.*

De intubaceis, & primo de feri. CAP. X.

DE intubaceis, siue cicoreaceis loquemur. Theophrastus intubacea vocat, quæ intubis folio proxima sunt, vt intubus aphaca, andriaula, porcellia, & senecio. Sunt enim intubi, Galeno authore, lactucis facultate proximi, & si suauitate desciscant. Plinius neq; ex eodem genere posse dici, neq; ex alio intubos, sed caule non minus gratos scribit. Sunt enim insignes ob singularem corporibus salubritatem, quam præbent, nobisq; hyemalibus acetariis

olera subministrant. Et si fortasse hyemis inclementia nobis deneget, eorum salgamum docet Columella, eodemque modo, ut diximus in lactuca.

Nomen.

Theophrasto *κνίχην* dicitur, etsi hoc nomine totum genus complecti videtur, tamen ex descriptione, ut inferius videbimus, potius sylvestre genus intelligit. Dioscorides, quæ omnes postea sequuti sunt, *κνίχην* sylvestre intelligit, satium verò genus *σέρην* vocat. Galenus nomine Latinogræco conflato intybolachana, id est intybolera vocat. E Latinis Varro herbam dicit, quæ seris vocatur, quod quum seridis natura agrestis videretur, ut mitior fieret, hortis ferebatur, quod verbum etiam à Græco *σέρην* manauit. Dixit, serunt herbam, quæ seris dicitur. Columella genus videtur intyba vocare, dicens: Per arua extirpemus rubos, virgulta, iuncos, alia per ver euellamus, ut intyba. Pro satiuo verò: Alia pabula conserantur, ut trifolium, fœnum græcum, sed præcipue genus intubi quam Græci *σέρην* appellant. Plinius domesticum intuborum genus serim appellat, sylvestre ambugiam, & in Ægypto cichorium dici. Intubæ autem à cauo tubæ specie caule videtur aliquibus nomen accommodatum, unde cichorii nomen notius in Ægypto, unde deinde in Græciam, post in cæteras nationes commigravit. Horatius cichorea nominat:

Cichorea, leuesq; malua.

Genus.

Theophrastus genera non distinxit. Dioscoridis textus, in quo genera separantur, etsi aliquibus mendosus, mancusque videtur, nobis tamen integer, & accommodatus, & adamussim intuborum generibus, quæ passim cōspiciuntur, respondens. Inquit enim. Seris duum generum est, Sylvestre vnum, hortense alterum, sylvestre picris, & cichorion vocatur vnum, alterum verò satium, quod latioribus foliis constat, & stomacho, quam hortense vtilius. Hortense in duas item species digeritur: vna folio latiore prodit, lactucæ simillima, alia angustiore, & amaro. Sylvestris stomacho vtilior. De sylvestri in sequenti dicemus, nunc de hortensi. Est enim vtrique Neapolitanis hortis notissima. De intubis Plinius: Erraticum apud nos quidam ambugiam appellauere, in Ægypto cichorium vocant, quod sylvestre sit, satium autem serim, quod est minus, & venosius. Seris & ipsa lactucæ simillima duorum generum est, sylvestris melior, nigra ista, & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior. Vocauit satium, quod non nisi humana ope, cultuue provenit, erraticum, quod sponte, & libere sub nulla olitoris lege vagatur, & errat.

Descriptio.

Hortensis seris lactucæ similis amplo surgit folio, candido, teneroque, in ambitu crispo, ac fibrato, caule cæteris maiore, crassioreque, frequentibus furculis brachiato, venoso, torulis prominentibus, & latioribus interueniis. Flos in ramusculis cæruleus: olitoris industria in hortis mitigata, gratoris est amatoris. Hæc à diminuto seridis nomine seriola dici cœpit: inde corrupto Neapolitanis nomine, *Scarola* dicitur, utimur hybernis mensis ad acetaria. Angustifolia dicta, angustiori est folio, sapore aliquantisper amaro, iam dicta non dissimili, apud nos *scarola ischiana* dicta, colore nigrior, & præcior est:

nam

nam æstate pro
melior, nigra ista
pore, sed salubri
& formas pertr

Columella: e
finet. Sed Plini
Palladius. Au
maritimis sum

Castianus lu
10 prembritan
plantatur serot
potest. Ecin ho

Int
Palladius me

rea his planior a
tuor foliorum
satione seruatu

nus. Seruntur
20 nio seruntur,
mixta, acetariis
cantur, inde per
ctobri secantur.

Columella d
faciat, quum ali
cipiat, eo quasi
amarorem intu

re nam quæ de
ne trademus, q
30 ho hortis obrun

dunt, & in tota
pius accidat in
obruos candi

berna seruenc
cta summam
quo alimentu

summam con
mento profic
sumptu conte
40 ferè nusquam

nam æstate prouenit. Hanc putat Plinium descripsisse, quum dixit, Syluestris melior, nigra ista, & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior, sed deterior non sapore, sed salubritate, quum amarior sit. Sed non amplius generum discrimina, & formas pertractemus, sed ad eorum culturam veniamus.

Columella: eadem ratio lactuæ, & intubi, nisi quod hyemem magis sub- *Calum.*
stinet. Sed Plinius hyemis impatientiores dixit.

Palladius. Amant humores, & terram solutam. Arenosis, & salis locis, atq; *solum.*
maritimis summa proueniunt.

Cassianus Iulio mense feri dixit intybum, & Augusto ferotinum, & Se- *salia.*
ptembri transplantatur, brumale Octobri transplantatur, Nouembri trans-
plantatur ferotinum. Columella. Frigidis regionibus proximo autumno feri
potest. Et in hortulo, vere:

— Torpenti gratia palato

Intuba.

Palladius mense Octobri ferenda esse intyba dixit, ut seruiant hyeme. A-
rea his planior apparetur, ne radices eorum, terra fugiente, nudentur. Qua-
tuor foliorum transferantur ad locum stercoreatum. Aprili intyba secunda
satione feruntur, quibus utamur æstate. Aliqui Martio ferunt ad æstatem. Plini-
nius. Seruntur verno plantæ eorum, ultimo vere transferuntur. Neapoli Iu-
nio seruntur, decimo die decerpuntur frondes teneræ, ut aliis herbis im-
mixtæ, acetariis veniant. Transferuntur Augusto, Septembri, & Octobri se-
cantur, inde perarescunt. Vel seruntur Iulio, transferuntur Septembri, & O-
ctobri secantur.

Columella de lactuca loquens, eadem de intubo docet. Quo tardius caulem *Ars.*
faciat, quum aliquod incrementum habuerit, exiguum testam media parte ac-
cipiat, eo quasi onere coercitum, in latitudinem se diffundit. Theophrastus ut
amarorem intuba exuant, salis aquis rigari iubet, vel salis locis conferi debe-
re: nam quæ de brassica præceperat, eadem intubis convenire dixit, cuius ratio-
nem trademus, quum de brassica loquemur. Oligores nostri terra, vel sabulo in
hortis obruunt, hoc enim artificio mitius in modum albescunt, & tenerissimi eu-
dunt, & in totam hyemem asseruantur. Hoc artificium casus edocuit, quum sa-
pius accidat in campestribus, pluviiis, & fluminum inundationibus terra arenave
obruos candidissimos euadere, omniq; ex parte exui amaritudine. Ut ad hy-
berna seruentur acetaria, quum sua folia fuderint, & velut in orbem circuma-
cta summam tenui ligamento vinciuntur, & fictili vasculo harente semper,
quo alimentum sugant radice, conduntur, ita & candorem, & teneritudinem
summam contrahunt, & magnam amaroris partem exiunt. Sic ergo & incre-
mento proficientes intubi hybernant, donec ad usum promantur. Alii leniori
sumptu contenti, terra duntaxat obruunt. Alii stramentis solis operiunt, iam
ferè nusquam non inualuit hac hyemandi ratio.

De sylvestri intubo. CAP. XI.

NUNC ad alteram intubi speciem. Plinius dicit succo totius cum oleo perunctos, fauorabiles fieri, & quæ velint facilius impetrare. Eius flos nubo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper compressus, interdum dehiscens. Platina. Patinis vere caules, astate folia, hyemeradices benè lotas, & excavatas intus propter amaritudinem, & duritiem, sale, oleo & aceto conditas donat, & cum passulis decoctas, vel aliquid defruti, vel cinnamomi triti, quantumvis modici insparsi.

Nomen.

Plinius in Ægypto cichorium dici, vel erraticum intubum, propter singularem salubritatem dicit, aliqui chreston appellant, alii pancration, quasi omnia complectens bona. A Latinis ambugia, quod etiam confirmat Celsus. Neapolicicorea.

Genera.

Theophrasto cichorium duum est generum, sativum unum, aliud sponte nascens *mexis* dictum, gustu amarum, unde nomen accepit. Dioscorides: Seris duum generum, sativa una, sylvestris altera, quæ picris, & cichorion vocatur. Sed Plinius erraticum intubum in duo genera diuersa diuisit. Sylvestre hedipnoida dictum, latioris folii, & cichorium.

Descriptio.

Theophrastus ita describit: Annuo constat folio, radice foliata, folio humi procumbente. Ineunte vere caulem, florémve simul edit, florumq; proventus. Germinat post Vergilias, etsi cæterarum specierum caules simplices, minoresve sint, citamen magnus, multisq; surculis brachiatus, ad vincum quoque lentus, ac frangi contumax: qua de causa ad vincula vtuntur, radice quoq; germen laterale mittit, cuius prolixitate pertinaciter emoritur: decerpitis enim, quæ ad vsum cibarium capi solent, reliquum rursus generationis capit principium. Euenit autem, vt pars eius alia, atq; alia floreat, idq; assidue fit vsq; ad autumnum, quanquam durus caulis esse videatur. Fert & siliquam, in qua semen per extremas caulium partes. Picris vere florere incipit, nec secus hyeme tota, vereq; toto perseverat, insignis amaroris, unde nomen adeptum. Annuo foliatu & caulibus à radice, germinat post Vergilias. Caulis simplex, & minor, quàm intubis. Ineunte vere tum florem, tum caulem emittit. A quo Plinius: Intubus nascitur post Vergilias, floret particulatim, radix ei lenta, quare etiam ad vincula vtuntur illa. Sed quæ de caule dixerat Theophrastus, de radice transtulit Plinius, nescio an rectè. Cichorium circa terram folia habet, germinantia ab radice post Vergilias. Picris toto florens anno.

De chondrilla. CAP. XII.

INTER intubacea meminit Theophrastus chondrilla. Dioscorides tam similem esse cichoreo dixit, vt nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronunciarint. Galenus lactuce similem facit, vt eodem capite vtriusq; meminerit. Non minus quàm intuba acetaritis intromittitur, & si amarior sit. Mures agrestes à serpentibus laesos hanc esse dicit Plinius.

Theo-

40

Theophrasto
serim appellant
dam, tuberculo
ramulis ostenda

Theophrasto
nat post Vergili
nem ingustabili
& flore nouo. C

re dicit; per om
culo fabæ. Galen

ferta, aliqui cu
Apud nos ea fre

umq; nitidorum
radices non disp

est, qui ambigua
tamen altera est
summo flos lute

lamenta pleraq;
pleni. Planta &
Dioscorides i

10

DVm olerum
apponit, quæ

imitetur. Aphac
uersum sit, ambi

nis, non præter
quippe & legum

apponitur. In sa
30 De aphaca ha

minat post Verg
perat flos eius, s

inde alius subna
Flos luteus est.

intubi post Ver
ca cum croco et

uentus proroga
phrasto historia

inde marcescete
40 Amara est. Ex m

Theophrasto *χενδράς*, Dioscoridi *χενδρίαν* dicitur, quam aliqui cichoriū, alii *Nomen.* ferim appellant. Apud Græcos nomen ab euentu inuenit, quod callum quen-
dam, tuberculo fabæ similem, & gummi, quod Græci *χένδρον* nominant, imis
ramulis ostendat. Latini, vt Plinius & alii, chondrillam vocant.

Theophrastus ita describit. Annuo constat folio, ab radice foliata, germi- *Description.*
nat post Vergiliās. Caule simplici, minori quàm intubo, propter amaritudi-
nem ingustabili succo radicibus, lacteo, copioso, & acri. Ineunte vere, caule
& flore nouo. Dioscorides folium, caulem, flosculum cichorio similem ede-
re dicit; per omnia intubo tenuior est. E ramulis mastichen fundit, tuber-
culo fabæ. Galenus: Citius in caulem assurgit lactuca, lento quodam succo re-
ferta, alioqui cuiusmodi est tithymallorum, non tamen acer, perinde vtille.
Apud nos ea frequentissimè scatent arua, nec nisi exilitate foliorum, cauli-
umq; nitidorum elegantia à syluestri cichorio differre videtur: nam flores &
radices non dispares habet, ob id seridi subalternam atque simillimam nemo
est, qui ambigat. Duæ à Dioscoride & Plinio recensentur species, apud nos
tamen altera est bulbosa. Folio syluestris seridis diuisura, caule nudo, cuius
summo flos luteus, in pappos euanescent. Radicibus vel imo cauli subsunt fi-
lamenta pleraq; , quibus per plures bulbuli appensi sunt, pellucidi, albi, succi
pleni. Planta & bulbi lacte referti.

20 Dioscorides in terrosiss & cultis nasci dixit.

Solum.

De aphaca Theophrasti, sine Plinii hedypnoide.

C A P. XIII.

DV M olerum meminit Theophrastus inter intuborum genera aphacam
apponit, quā aphacæ folia & vniuersus habitus planè syluestre intubum
imitetur. Aphaca etiam inter legumina ab eodem annumeratur, quod an di-
uersum sit, ambigit Hermolaus. Nos ne aliis ansam etiam dubitandi præbea-
mus, non prætereundum duximus manifestare aphacæ nomen vagum esse,
quippe & leguminum generi à Dioscoride, Plinio, & ab ipso Theophrasto
apponitur. In segete de eo describemus, si Deus votis fauerit.

30 De aphaca hæc Theophrastus. Annuo constat folio, ab radice foliata. Ger- *Description.*
minat post Vergiliās, sicut cichoracea omnia, amaritudine ingustabili. Pro-
perat flos eius, sed celerrimè euanescit, & in lanugineos pappos soluitur, de-
inde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme rota, & vere vsq; ad æstatem.
Flos luteus est. Et alibi. Imbribus statim primis ab æquinoctio germinat, sed
intubi post Vergiliās, vere ineunte, tam caulem, quàm florem mittunt. Apha-
ca cum croco erumpit, vt senecio, cæteraq; hyberna, & singulis floribus pro-
uentus prorogant suos, vt onocichlis, cichorea, & plantago. Plinius à Theo-
phrasto historiam aphaces describens ait. Nascitur æquinoctio aphace, & sub-
inde marcescēte flore emittit alium, tota hyeme, totoq; vere vsq; ad æstatem.

40 Amara est. Ex mitioribus paulo spinosis aphace est, anthemis, phillantes, &

M M m 3

anemone. Diuturnior ei flos per partes florens, ut ocimum, heliotropium, & onocichles. Sed nescio cur Plinius, Hermolaus, & Ruellius, & hos sequuti spinarum meminerint, quum nil apud Theophrastum, ex quo ipsi exceperunt, usquam reperiatur. Nos vulgarem herbam *leonis dentem* dictam & Theophrasti aphacam iudicamus, & Plinii hedypnoidem, etsi Plinius (ut frequentissimus ei mos) de utraq; verba fecerit, cum aphacam ex Theophrasto exceperit, quæ fuerit ignorauerit. Plinius de hedypnoide. Et sylvestre cichoriigenus, alii hedypnoida vocant, latioris folii. Nam foliorum ortus, positus, numerus, caulis, & flores sylvestris cichorii speciem imitatur. Differt quoddam huic omnia maiora, folia albidiora, latiora, & lenius laciniata, totique cauli adnata, papposi globi longe maiores, succo amaro turget radix. Foliis namque constat circa radices humi accubantibus, denticulatis, serræ instar effictis, cauliculis diductioribus, concavis, lævibus, enodibus, lacteq; prægnantibus. Primis imbribus germinat, eiusque flos properat, flore luteo, stipantibus in circumfoliolis coronato, specioso, odoratoque, qui senescens in auram raptim fertur. Floret particulatim, tota hyeme & vere caulem & florem mittit, radice lactescente, & amara.

Nomen.

Græcis ἀφάκη dicitur, Latinis, Plinio auctore, aphace, eodemque hedypnois, haud dubie alia ratione, quam quia suauiter halet, & somnum conciliet, & si durior sit ab odore interpretatio, quod præter alias feridis species odorem spirat. Dens leonis, quod eius folium denticulatum sit.

De senecione. CAP. XIII.

ETIAM inter intubacea Theophrastus senecionem commemorat, nec non raro nos in acetariis vescimur.

Nomen.

Græcis νηξέριον: Dioscorides id nomen sibi vendicasse ait, quoniam flores capillorum ritu vere canescunt. Et Græci nominum compositione tempus simul quo floret, & moris mox deflorētis euentum indicare voluerunt, ut quo tempore quærenda, quibusve notis requirenda esset, noscerent omnes. A Latinis senecio, Plinio auctore, erigeron à nostris vocatur. senecio, Græci hoc nomen dederunt, quia vere senescat.

Descriptio.

Theophrasti descriptio. Vere caulem & florem emittit. Germinat post aphacem, & crocum. Diutius floret in annuorum genere, cuius rationem libro de causis reddidit. Nonnulla in germinando, flore quoque plus temporis protrahunt, ut in annuorum genere senecio: patet ea de causa, quod mediocritatem quandam alimenti obtrineat. Dioscorides: Cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, per extremitates erucæ modo laciniatis, minoribus multo. Flos luteus, qui breui digestus evanescit in lanugines. Radice superuacua. Plinius: Herba est triflaginis specie, & mollitia, caulibus subrubentibus, caput eius numerosa, diuiditur lanugine (qualis est spina) inter diuisuras exeunte. Quare Callimachus acanthida appellat. Alii erucæ foliis esse dixerunt, alii roboris, sed minoribus multo, radice alii superuacua.

Æstus

Æstus quoque
staurat novos,
Dioscorides
& muris. Mihi

ESTVR & sc
apponat He
noti essent. Che
sentiens. Galen
10 di, quum perfe
nos hyeme eo in
pit, quum recen
diuis propinqu
ideo eis subiung
Græcis νηξέ
dat, ad multa v
quo nomine eti
de auctore. Ap
deficit æstu, ha
10 ne mutuo. Co
dissecti vultus n
cant, quod velut
Theophrastus
molorum proue
le cubitali, inani
tenuis eleuante
intus cauo, sed q
mo melinos.

30 Sonchus albi
10 diximus vesi p
strius & spinosus
sunt sunt.
Cultis & incu

DXTMYS
Derucam su
temperet. Plini
in cibo, ut nimio

Æstus quoq; ac frigoris patiens: ob id qualibet ferè Luna flores luteos in- *Calum.*
staurat nouos, qui in pappos breui abeunt.

Dioscorides in maceris, & circum oppida nasci scripsit. Plinius in tegulis, *Solum.*
& muris. Mihi videtur in quavis regionis, & soli conditione gigni.

De soncho. CAP. XV.

EST VR & sonchos, inquit Plinius, vt quem Theseo apud Callimachum
apponat Hecale. Vterque albus & niger, lactucæ similes ambo, nisi spi-
noli essent. Cheemporus nigro prohibet vesci, vt morbos facièrè, de albo con-
sentiens. Galenus refert, quum tenera frondet, syluestrium olerum more e-
10 di, quum perfectè autem adoleuerit, aculeari, & tunc cibis respui. Vtimur
nos hyeme eo in aceratis, optimè enim olei, salis, & aceti condituram reci-
pit, quum recentior viret. Lactucis similes essent, nisi spinis horrent: ita en-
diuii propinqua, vt multi putent spinosam endiuia esse sonchum asperam,
ideo eis subiungimus.

Græcis *σῶγχος* dicitur, *ὡς τὸ σῶν χεῖν*, quia salubrem succum de se fun-
dat, ad multa vtilissimum. Alii *σῶγχος*, quasi *σῶμφος* ab inanitate caulium,
quo nomine etiam sylvestris cicerbita nuncupatur à Romanis, Dioscori-
de auctore. Apuleio lactuca leporaria dicitur, quod quum leporis animus
deficit æstu, hac sibi soleat mederi. Latini sonchum vocant, à Græcis nomi-
10 ne mutuato. Columella cicerbitam vocat. Plerique lactucinam vocant, quod
dissecti vultus multum eructat lactei liquoris. Neapolitani *cardoucello* vo-
cant, quod veluti paruus carduus spinosis foliis inhorrescat.

Theophrastus spinosis foliis acanaceis similibus dixit, caule foliato, cum ra- *Descriptio.*
mulorum prouentu floscellus emergit, caule vt cnicum. Dioscorides, Cau-
le cubitali, inani, interdum rubente, foliis in ambitu per interualla dissectis,
tenerius esculentum, dissectus copioso diffluit lacte. Plinius, caule cubitali,
intus cauo, sed qui fractus copioso manet lacte. Omnes flores gerunt in sum-
mo melinos.

Sonchus albus & niger, albus, qui è lacte nitet: nigro Cheemporus, vt *Genera.*
30 diximus vesci prohibet. Dioscorides in duo genera dirimit, alterum sylue-
strius & spinosus, alterum tenerius, esculentumque quæ nobis obuia pas-
sim sunt.

Cultis & incultis locis, segetibus, vinetis, & hortis frequentissimus. *Solum.*

De eruca. CAP. XVI.

DIXIMVS de soncho, sequitur de eruca, præcipit enim Galenus non esse
erucam sine lactuca edendâ, vt immodico calori additus aliorum excessum
temperet. Plinius: Eruca diuersa est, quàm lactuca natura, iccirco iungitur illi
in cibo, vt nimio frigori par feruor immixtus, temperamentum aquet. Proinde

raro lactucas sine eruca edimus in acetariis, eiusq; semine utimur in condiendis obsoniis, ut Dioscorides ait, idq; ut diutius perennet, aceto, lacte ve maceratum in pastillos digeritur. Simulanda venerinata videtur, quod Martialis hoc carmine demonstrat,

— Et Venerem renocans eruca morantem.

Et Columella in suo hortulo Priapo vicinam ferendā ostendit, his versibus.

Et quæ frugifero seritur vicina Priapo,

Excitet ut Veneri tardos eruca maritos.

Ovidius eruca abstinendum præcepit iis, qui ab amore desciscere cupiunt:

Nec minus erucas in beo vitare salaces.

Frontonis extat sententia olera omnia in vniuersum iuuari, quibus vicina fata fuerit eruca.

Nomen.

Græcis *ἐρύαις*, & *ἐρύαιον* dicta, quasi iuribus gratam dixeris. Plinius dicit: Tanta est condiendis obsoniis suauitas. Latini erucam dicunt, quod erodat, & profecto si degustaueris eam, os & linguam satis acriter vellicabit. Alii sic nominatam putant, quod vrendi licentiam sibi nanciscatur, quasi vracam dixeris, vine versa. Nec desunt, qui quod edendo maximè sit, efucam primo dictam velint, dein facta s in r mutatione, erucam dictam contendunt. Italici *ruochetta*.

Genera.

Et si Theophrastus generis diuersitatem in ea neget, tamen Dioscoridis testimonio in satiuam & sylvestrem diuisa est. Apud nos duæ sunt species, communis vna, gentilis altera vocata, vel hispanica, & maior.

Descriptio.

Theophrastus, Non nisi lignosa radice, & semine ad perdurandum firmo. Nos sic describimus. Satiua surgit in hortis bipedali thyrsu, foliis longis, in profundas, sed rariores crenas laciniatis, gustu præter modum acri, & amarissimo. Floribus in cacumine pallidis. Floret Martio, semine rapitio, vel sinapitio, in corniculis concluso, radice alba. Gentilis folio sisymbrii, semine nigro, floribus luteis, in condimentis lautior, & ad venerem vegetior extat. Sylvestris foliis domesticis angustioribus, & frequentioribus laciniatis, gustu acriori, sapidiori; cauliculis numerosis, floribus luteis, paululum odoratis, florens autumno, corniculis sursum spectantibus, in vniuersa planta numerosis.

Cælum.

Plinius, Frigorum contemptrix. Dioscorides, Sylvestris Hybericæ familiaris, nobis familiarissima, & præsertim in maritimis.

Solum.

Palladius, Locis, quibus volueris erucam ferere, nil moreris. Apud nos satiuam pingui solo seritur, sylvestris errat in siccis, aridisve locis.

Satio.

Theophrastus à satione tertio die erumpere dixit, esseq; è prima semente, videlicet hyberna, quæ Iulio mense seritur. Columella posse vere, & autumno conseri dixit, nec est alius cultus, quàm ut stercoretur, & runcetur. Palladius. Locis, & mensibus, quibus volueris ferere, nil moreris. Satiuas nos Augusto ferimus, prima floret, Aprili perit. Sylvestris semel fata, septenis annis durat.

Theo-

Theophrastus
melio rem enad
Anatolus, Si

P O s t eruca
pi, & eruca
leo, & aceto para
magnam acrim
amplecterentur
adhibuisse, præ
luxus prolapso
narium emunct
iam pridem fue
Tusculanis erad
proverbio fertur
miquè torpores
tu eos fugari, ad

Græcè *ἐρύαις*
cor, & in synop
dictum pu
acrimonia, & ig
oculorum pupil
motum conti
nant, Latini co
quunt à sinapi,
Plinius: Nascu
gnificatio pro
Negat Theo
rum dicit, m
nigri.

Quod et si n
men propter g
scorides, & P
pedali, tenui
piofo, in rub
sapore, Junio
caulescat, foli
unt oblonga,
mini firmitate

Theophrastus libro de causis ait, salis aquis irrigatam longè dulciorem, & Ars.
meliozem euadere.

Anatolus, Si cum brassicis feris, eas à pulicibus liberabis.

Insect. re-
media.

De nasturtio. CAP. XVII.

POST erucam, nasturtium subiungemus. Dioscorides eius naturam sina-
pi, & erucæ simillimam dixit. Eo nos cœnam inchoare solemus, sale, o-
leo, & aceto parato, iucundo sapore, sed acri: sed pinguibus iusculis incoctum,
magnam acrimoniæ partem deponit. Persas, quum principio frugalitatem
amplecterentur, negat Xenophon, & Strabo post eum, quicquam ad panem
adhibuisse, præter nasturtium cum sale, mox aucto imperio in genus omne
luxus prolapsos esse. Idque effecisse, quo magis ab excreatione sputi, mucoso
narium emunctu, & lotii profusione se vindicarent, quibus maximè noxiis
iam pridem fuerunt opportuni. Sic & apud Plutarchum, & Ciceronem in
Tusculanis traditur, eo vescentibus vegetiores inesse spiritus, sensusq; Vnde
proverbio fertur, nasturtium esse mandendum inertibus, ut eos excitet, ani-
miq; torpores fuget. Optabile olus contra serpentes. Tradit Sestius, suffi-
tu eos fugari, ad quod videtur alluisse Columella in hortulo,

Spargantur cecis nasturtia dira colubris.

Græcè καρδαμὸν dictum arbitrantur nonnulli καρδίας, quod foueat **Nomen.**
cor, & in syncope illa, quam cardiacam vocant, plurimum valeat. Alii καρ-
δαμὸν dictum putant, quod caput edomet: nam mentis aciem obsidens sua
acrimonia, & ignea vi feriens caput tenet. Sunt qui καρδία τὸ κράς μῆνιν, quod
oculorum pupillas coeuntibus unà palpebris abscondat, lumina enim ad
motum conuiuere subinde cogit, è quo euentu καρδαμὸν verbum decli-
nant, Latini conuiuere dicunt. Hippocrates, & Galenus sandition dici in-
quiunt à sinapi, quod sandition dicitur à similitudine. Latini nasturtium vocant.
Plinius: Nasturtium nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris si-
gnificatio proverbio id vocabulum usurpauit, veluti torporem excitantis.

Negat Theophrastus generis diuersitatem habere. Plinius duorum gene-
rum dicit, mire vnum, ferum alterum. Prioris ratio duplex, albi scilicet, &
nigri. **Genera.**

Quod etsi manifestius sit, quàm ut representari flagitet, volumus ta-
men propter generum differentias eius picturam, quam Theophrastus, Dio-
scorides, & Plinius parui fecere, ostentare. Satiùs cauliculo assurgit sesqui-
pedali, tenui, folio paruo, laciniato, flore albo, semine per ramorum latera co-
pioso, in rubeum nigricante, folliculis orbicularibus, pressisq; contento, acri
sapore, Iunio floret, sequenti tempore semine prægnans, sed antequam ex-
caulescat, folia modice lata, diuisaq; habet, quum caulem ediderit, folia fi-
unt oblonga, digiti longitudinem æquantia. Theophrastus maximam eius se-
mini firmitatem tribuit. **Descriptio.**

Culm.

Palladius nasturtium cælo, quali placebit, feri posse dixit. Dioscorides optimum Babylonicum tradit. Antiphanes, Athenæo auctore, Milesium. Iulius etiam Pollux Mileti laudatissimum nasci. Plinius in Arabia miræ magnitudinis nasci. Summis feruoribus, vel etiam brumæ rigoribus spreis crescit, quare tam hyemæ, quàm æstate facillimè prorumpit.

Solum.

Palladius ferit etiam solo qualicunque, simum non desiderat, humorem quamuis diligit, etiam deesse non curat.

Satio.

Theophrastus è prima semine esse tradit, mense Iulio post æstium solstitium. Nascitur quinto die. Sed è veteri semine celerius. Columella primo vere ferendum in hortulo tradit,

— Paruo discrimine sulci

Spargitur.

Palladius Ianuario & omni tempore ponendum tradit, & nasci ex veteri semine celerius. Si cum lactuca feratur, nasci egregiè: Septembri, locis temperatis, & calidis. Plinius, æstate vel hyemæ facillime nasci. Nos Neapoli Ianuario, Februario, & Martio ponimus. Sic etiam Augusto, & Septembri. Nascitur etiam hyemæ, sed nisi à frigore defendatur, exarescit, vel nisi adultum fuerit. Rarius hyemæ feritur, ut radix coerceatur frigore, & densius pullulet, vere spissius. Quæ Martio feruntur cito pereunt. Si eius semen lacte pridie maceraueris, dulcius nasci ferunt.

De charephylllo. CAP. XVIII.

CHAREPHYLLON à nobis studiosissimè colitur, omnesq; horti eo sca-
rent, ne acetariis desit, omnesq; eo quotidie vescuntur, non solum cru-
do, sed iuribus incocto, magna stomachi iucunditate: appetentiam inducit, &
cibi fastidium dissipat, odorato & quodam amariufculo sapore, vix sensibili,
maximo est oblectamento. Sic enim aliis oleribus additum, ea gratiora red-
dit. Aetius. Estur cum aceto.

Nomen.

A multis gingidium existimatur, Ciliciæ, Syriæque vernaculum, ac eo-
romine in Græciam, & Latium venisse, postmodum in omnes orbis tra-
ctus commigrasse: nouoque in Græciam, & Latium aduentu, pristinam ap-
pellationem obsoleuisse, & charephyllon dici cœptum, dein Graia voce & La-
tina coalescentibus in vnum nomen, charefolium, quod luxuriosa foliorum
fecunditate, & largiore coma gaudeat. Columellæ charephyllon, Plinio ca-
rephyllum, Palladio carefolium. Neapolitani *cerefolio*.

Descriptio.

Columellæ ait quod è largo foliati gauderet, & breui caule contentum es-
set, & velut herba paria secum faciente, quæ quod à cauliculo dempserit, fron-
dium vberitate compeniet. Breue nominavit in hortulo,

Iam breue charephyllum.

Nos ita depingimus. Herba est tenera & fragilis, quinis ab vno pediculo fo-
lis per ambitum incis: sed incisura ita efformata sunt, ut foliola etiam qui-

na efformat,
lis cubitalibus,
in summo caul-
triantur cornicu-
cacumine acule-
candida, subam-

Palladius fol-
Columella e-

vere. Vnde vel

10 Februatio ferit

mitti. Chareph-

loco: nam si re-

da, suaq; de sed-

dus. Apud nos

diem, post men-

semen affert, &

Sed semel satum

20 P IMPINEL

condimen

odore: pedibus

ei aculatur, & m-

ac lota in parina

aceto conditi:

gratia, non solu-

hortis studioso-

ciliter, sapore,

febres exitiale

Si diuinare

30 bibinella verti

pud nos id non

quod foliorum

guisora aliqu-

dolore exigat

Theophras-

tago, quæ neq;

florculus lanu-

similem dixit

multum dista-

40 nops, alopecu-

VILLÆ LIBER DECIMVS.

na efforment, & hæc item alia, vt in staphilino, & multis videre est. Ramulis cubitalibus, pinguibus, subrufescentibus, inanibus geniculatis, vmbellam in summo caule gerit, albis floscellis ornata, ex quibus tenuia, rectaque oriantur cornicula, plura ex vno pediculo prodeuntia, pilosa, rufescentia, & in cacumine aculeata, in quibus semen longiusculum, nigrum, radice parua, candida, subamara.

Palladius solum humidum, & stercoreatum desiderare dixit.

Salum.

Columella ex iis esse, quæ possunt duobus temporibus feri, autumno, & vere. Vnde vel circa calendas Septembris, vel melius ante calendas Martias

satia.

10 Februario feritur. Locis siccis aut tepidis possunt circa idus Ianuarias terræ committi. Chærephylum circa calendas Octobris obrui oportet non frigidissimo loco: nam si regio sæuas habet hyemes, post idus Februarias semine differenda, suaq; de sede partienda. Plinius quæ habet à Columella excepit, sic & Palladius. Apud nos Augusto feritur, & Decembri: nascitur post quintūdecimum diem, post mensem purgatur herbis, & laramine inspergitur. Martio, & Aprili semen affert, & interit: qui Martio ferunt, tribus solis mensibus vescuuntur eo. Sed semel satum in hortis pluribus annis restibili fecunditate reuiuiscit.

Depimpinella. CAP. XIX.

20 **P**IMPINELLA nobis vulgò dicta estur quotidie in acetariis, non solum condimentum optimè recipiens, sed ea commendans iucundo peponum odore: pedibus quoq; calcatu nobilis, quo pressa peponum odorem naribus eiacularur, & mira quadam iucunditate recreat. Platina ita condit, Collecta ac lota in patinam, ac suomet caule, si tenera est, reponi debet, sale, oleo, & aceto conditi: si præduri fuerint caules, folia tantum sumuntur. Vnde & cibi gratia, non solum quæ opacis locis, ac pratis nascitur colligimus, sed etiam in hortis studiosè colimus. Poculis etiam iniicere solemus, vt gratiam eis conciliet, sapore, & odore, & magnæ commendationis dotibus ad venena, vel febres exitiales.

Si diuinare licet, Theophrasto *Spina* est, nam eius interpres Theodorus

Nomen.

30 bibinella vertit. Dioscoridi *σινδών* *αγρίη*, quam Cratenas heracliam vocat. Apud nos id nominis adepta pimpinellæ, bibinellæ, pampinulæ, bipennulæ, quod foliorum binis ordinibus, pinnatim, plumatim, digestis videatur. Sanguisorba aliquibus dicta, quod vulneribus iniecta, spicula, & sanguinem sine dolore exigit, & internis externisq; sanguinis eruptionibus opituletur.

Theophrastus spicatam dicit, vt cynops, alopecuros, ornoglosson, siue plantago, quæ neq; spicam, neq; acutam, neque aristam gerunt, sed his aristæ loco flosculus lanuginosus exit, & his similem facit. Nos à plantaginis spica, cui similem dixit bibinellam, conicere possumus, à bibinella vulgari nostra non multum distare. Plinius ab eo: Aliud rursus spicatorum genus est, ex quo cynops, alopecuros, stelephuros, quam ortyga vocant, alii plantaginè; & thryal-

Descriptio.

lis alopecuros spicam habet mollem, & lanugine densam non dissimilem vulpium caudis. Proximum eis stelephuros, nisi quod illa particularim florer. Dioscorides suam sideritim tertiam, vineis & maceris nascentē dicit, foliis ab una radice multis, coriandro similibus, circa coliculos dodrātales, leues, teneros, subcādidos, & subrubicundos, flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento huius ea vis est, vt quamuis recenti vulneri imposta sanguinem supprimat. Nostra *pimpinella* ramulis nascitur à radice foliosis sesquipedalibus multis foliolis & quis spatiolis, binis ex aduerso positis, ambitu crenatis, pilosis. Thyrsuli quoq; rotundis flosculorum glomerulis micant ex caesio candicantibus, quibus elapsis mori fructum exprimunt, radice crassa, longa, subpurpurea. Sed si quis hanc descriptionem Dioscorideæ repugnare dixerit, quippe cum coriandri foliola non rotunda & crenata, sed ferulacea sint, ei respondendum duximus, coriandro recenter enato, foliola verē nostra *pimpinella* vocata esse similia, & si coliculi duri sint, id accidit in senecta, at in iuuenta mollia sunt, teneraque.

Genera. Genera plura sunt, duo præcipua, maius, & minus, maius caule, folio, thyrsi, & omnibus maius.

Solum. Frequentissima ruri, & domi, quæ pensilibus hortulis colatur, & incultis, aridis, & squallidis collibus, & marginibus nascatur.

De buglossa. CAP. XX.

NUNC quæ hortis vulgarissima feritur describemus buglossam, cibo gratissima, quum & flos acetariis spargatur, & folium tenerum, quod proprium odorem suboleat, vetustiora verò folia quotidianis obsoniis peculiarem habent gratiam. Platinae condimentum apposuius. Conditur cruda, & elixa. Crudam benè lotam, & expressam, reticulo ad id aptè facto, cum nepeta, menta, & petroselino in patinam indes, sale & oleum insperges, inuoluesq; quoad oleū imbibat, & remollescat eius asperitas, acetum postmodum infundes, & conuiuiis statim appones: coctam, expressa aqua in patinam indes, sale, oleo, & aceto conditam conuiuiis appones. Sunt qui huic aspergant modicum cinnamomi, vel piperis benè triti, & cribrati.

Nomen. Dioscoridi *βουγλωσσος* dicitur, quod bubulas linguas imitetur. Plinius euphrosynum vocari dicit, quod ei sit præcipuum, quod in vinum deiecta, animi voluptates auger. Plutarchus symposiaca primo: Alii buglossam admiscunt vino, quod herbis huiusmodi consentaneum sit, latitiam conuiuiis, & beneuolentiam coalescere. Ex Latinis Cato bubulam linguam vocat. Plinius buglosson, quod boum linguis similis sit. Neapolitani *borraginem*, quasi bonam dicās, versa & peruersa voce ex buglossa.

Genera. Genera duo satiuā: nam altera caruleum florem, altera candidum profert: sed caruleum in Apulia in purpureum, & rubrum vertitur, nimii caloris vi, quod idem euenit, si in acetariis aliquantisper immoratum fuerit.

Apud

Apud omnes
grem borragi
sum habere, nig
uicenna. Est her
& rami eius aspi
quæ est in coral
sunt radices pin
sit plebecula qu
dis, hirsutis, in fo
cubitali pingui,
stellatis, quinis
nigro striato, ra
Dioscorides
actum humidu
plantamus, qui
ritur.

Riguis in loci
te fruamur. Vel
que foliorum el
dant, colligantur
bimaturuerint,
ne hyeme gelu a
gora se tuentur.

CRITHMO
Ceruleum, co
stres herbas esse
rustica illa Hec
que potius oble
30 pud Plutarchum
sust hortis consti
num æquinoctiu
conspersa biduo
ferint humoris,
uantur, & pond
quod est mistur
aridi, quod est p
tur, ita vt herbas
Sed Columella
40 libri capite tercio

Apud omnes constat veterum Græcorum *βούλαρον*, & Arabum, esse vulgarem borraginem. Dioscorides verbasco similem facit, folium in terra sparsum habere, nigrius, asperum, bubulcas imitans linguas, Iulio mense colligi. Auicenna, Est herba lata lingua bouis, habens folium almaru, ad tactum aspera, & rami eius asperi sicut pedes locustarum, oportet autē vt illa administretur, quæ est in corasceni, crassa habens folia, super quorū faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum, & pilorum exeuntium ab ea. Addimus nos, & si notior sit plebeculæ quouis olusculo. Nasctur foliis in cespite stratis, laeis, subrotundis, hirsutis, in foliis eminentibus bullis, ac tenuissimis aculeis armatis, caule cubitali pingui, concauo, aculeis vbique scatente, & ramis brachiato, floribus stellatis, quinis foliolis caruleo purpuraque nitentibus. Floret Martio, semine nigro striato, radice alba, tenera, pollicari crassitudine, gustu subdulci, & lento.

Dioscorides campestribus, & sabulosis locis nasci scripsit. Nos pingue, subactum humidum solum in hortis damus, & vinearum, hortorumque torulis plantamus, quibus semel fata importuna fecunditate luxuriat, & ex seipsa feritur.

Riguis in locis toto anno feri potest. Semine feritur Aprili, & Maio, vt astate fruamur. Vel Augusto, & Septembri pro hyeme. Transplantatur, quū quinque foliorum esse cœperit, ac melius Octobri, ac Nouembri. Semina ne decedant, colligantur immatura, ac triduo in fasces colligatæ resiccentur sole, vbi maturuerint, substratis linteis decutiantur: & biennio semen asseruatur: ne hyeme gelu adurantur, latamen aspergatur, hoc munimento aduersus frigora se tuentur.

De bati, seu crithmo. CAP. XXI.

CRITHMONESCÆ, & condituræ aptam protulit Dioscorides: est enim crudum, coctumve olus, asseruaturque in muria. Plinius inter eas syluestres herbas esse scribit, quæ eduntur. Hanc certè apud Callimachum apponit rustica illa Hecale, speciesque est batis hortensis. Herba sponte nascens, eaque potius oblectamentum, quam cibus. Hecale vetula Theseo apposuit apud Plutarchum. Nos in acetariis frequenter vtimur, & ad quotidianos usus horris confita continuo spectatur. Columella sic condiri docet, circa verum æquinoctium. Battis, & eius coliculus in alueos componuntur, & sale conspersa biduo sub umbra, dum confident, reponuntur, donec tantum remiserint humoris, vt suo sibi iure abluui possint, sin minus, superfusa dura muria lauantur, & pondere imposito exprimuntur. Tum suo vase conduntur: & ius quod est mistum aceti duabus partibus & tertia muria, infunditur, sceniculiq; aridi, quod est per vindemiam proximo anno lectum, spissamentum imponitur, ita vt herbas deprimat, & ius vsque ad summum labrum fideliter perueniat. Sed Columella marine batis condituram edocuit, non satiuæ: nam duodecimi libri capite tertio decimo, olus cordum, quod quidam satiuam batim appellat,

muria nō condiri docuit. Sic Dioscorides & Plinius quū in muria olus seruandū prodiderūt, de marina bati loquuti sunt, nec satia vllā rationē habuerūt.

Nomen.

Dioscorides *κρίθιον*, seu potius, vt aliqui, *κρίθαριον*, vocat. Nomen à feminis figura Græci dixerūt: habent enim crithamum semen intus tritici, vel hordei figura, quod vocatur *κρίθην*, vel detortū *ἀπὸ τῆς κρίθιδος*, à secernendo vocabulum, quod rupto seminis inuolucro cerealem formam nucleus ostendat, excussisq; statu seminibus à paleis, aceribusq; secernatur. Latini batim appellant, ex aduerso emendicata à Græcis appellatione, qui baton accessibilem dicunt: nā batis marina in scopulis, & inaccessis crepidinibus emicat. Ex aduerso igitur ab accessu nomen batis adinuenit. Lucius Columella satiaū batim olus cordū appellauit, quasi serotinum olus, quod non nisi serò admodum appropinquante vindemia conditur. contra ceterorum morem, quæ appetente lunio ante seminis maturitatem à salgamariis reponūtur. Plinius scenum cordū, quod non præcoci, sed serotino partu in lucē editum esset, vocat. Plinio etiam crethmos dicitur, & à quibusdam appellari asparagum gallicam satiam dixit. Neapoli *critamo*, *finocchio marino*, & *herba di san Piero*.

Genera.

Plinius duplicem batim nominat, hortensem & marinā, sic etiam & syluestrem alibi: an pro marina syluestrem posuerit, ambigo. Sed quæ marina oriunda est litoribus, apud nos in hortis cultu mitigata feritate toros conuestit.

Descriptio.

Marinā Dioscorides ita depingit. Herbula fruticosa, & vndiq; foliosa ad cubiti altitudinē fere ascendens. Foliis pinguibus numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus. Sed potius legendum *παχύτεροις*, non *μακρύτεροις*. Non sunt enim crithamo folia latiora, quàm portulacæ, sed crassiora, & longiora, salso gustu, flore cādido, semine ceulibanotidis, odorato, molli, rotundō, & quod siccatū rumpitur. Habet intus tritici modo nucleū, radicibus digiti crassitudine, tribus, vel quatuor, grati & iucundi odoris. A quo Plinius: Caulis vnus, palmū altus, semen ferens odoratū ceulibanotidis, rotundū, siccatū rumpitur, habet intus nucleū candidum, quē aliqui cacin vocant. Folia pingua albicant, veluti oliuæ, crassiora, & salso gustu. Radices digiti crassitudine tres, aut quatuor.

Celum.

Hippocrates batim Æthiopiam laudauit. Dioscorides nasci in petrosis, & maritimis dixit, quod ab eo etiam Plinius recensuit.

De cappari. CAP. XXII

VT I M V R & quidē frequentissimē in hybernis acetiariis cappari. Paulus vsum eius cōmendauit ex oleo, & sale, quod appetētiā inuitet, & ciborū fastidiū discutiat. Vnde primus mensis sumitur, & ceteris dapibus præponi solet. Dioscorides non solū floribus, & fructibus, sed etiā nouellis turionibus homines vesci scripsit. Quod etiā nostris temporibus obseruatur. Columella eius conditura proponit. Verno tempore capparim in vsum colligi, & reponi oportebit, & seruari hac cōditura: aceti duabus partibus & tertiā drachmæ mure: sed quā plurimis diebus sub tecto seruari, dū flaccescat, inde in vasa cōdi, deinde ius quod supra se ipsum est, infundi. At Platina quomodo cōdiatur mēsis edo-

cet.

cer. Inde cappari
diu fines, donec
centē, inq; eam
fom in patinis re
tā huic edulio ad
faciat. In Apulia
copiosum sal sit d
alternis vicibus s
nuntur, bis ierve

10 Græcis *καππάριον*
staphylen. Latin
turis. Itali vocan

Theophrasto
spargit. Germani
diuturnior. Foli
ticofus, & humil
uncis, hamatisq;
tūdo, quo fatisc
oblonga extuber

20 u rubicunda, ra
vocat florem, qu
excluso flore gl
petitur. Palladius
cenna fructum c

Plinius cauend
Africū gingiu in
li vomitus tacit, s
apparet in textu
num mouere digi

30 regio non esset
quū inter cetera
neta visuntur, m
vis emittit, quā
vel ab aceto, qu

Plinius Ægypt
rabia, longē est
fertur, optimun
porius calidum,

Theophrastu
40 exire videtur, qu
apud montuola,

cer. Inde capparim in cacabū aque non feruentis, sed apprimè calidā: vbi tandiu fines, donec abundantè salsedinem dimiserit. Transferto inde in aquā recentē, inq; eam tandiu finito, quoad refrigerat, inde postremo auferes, expressum in patinas repones, infundesq; oleū, & acetum non multū. Sunt qui mentā huic edulio addant, nec incongruè quidē, vt & ad voluptatē, & valetudinem faciat. In Apulia aliter condiuntur. Primo in feruentem aquam coniciunt, vbi copiosum sal sit dissolutum, inde eximunt, vt siccescant. Siccos in vasa condiūt, alternis vicibus sale, & floribus nondum patefactis. Porro quum mēsis apponuntur, bis tēve aquis abluunt, vt salsuginem eximant, vel aceto seruant.

10 Græcis κάπραις. Plinius, Capparim quidam cynosbaton vocāt, alii opheo- *Nomen.*
staphylen. Latinis cappar, Columellæ cappar, Palladio cappar dicitur, & in-
turis. Itali vocant *cappari*.

Theophrasto vni stirps. Folium & caulem horridulū ac spinosum humilem *Descriptio.*
spargit. Germen & flos estate, folium ad Vergilias vsq; viger, non annuus, sed
diuturnior. Folium iuxta caulem. Ramis aculeigera. Dioscorides, Frutex est sen-
ticosus, & humilis in orbē proserpit, ramis in rubi modum aculeatis, spinis ad-
uncis, hamatisq;. Folio mali coronæ circinato, horriduloq;, fructu oleæ ro-
tūdo, quo fathiscente emicat flos candidus, qui postquam excreuit decedit, glās
oblonga extuberat, quæ aperta grana acinis puniceorum similia ostentat, par-
ua rubicunda, radice lignosa multiplici, magna que. Sed Dioscorides fructum
vocat florem, qui adhuc clausus, non in folia dehiscens, quū fructus id sit, quod
excluso flore glandis figura oblonga depromitur. Sed flos præcipuè cibus ex-
petitur. Palladius æstate florere ait, & arescere sub occasu Vergiliarum. Aui-
cenna fructum cucumeri assimilat.

Plinius cauenda eius peregrina genera dicit. Siquidē Arabicū pestilens est, *Genera.*
Africū gingiuis inimicum, Marmaricum vuluis, & omnium in stationibus. Apu-
liū vomitus facit, stomachū & aluum mouet, Italicum innocentius est: vbi clare
apparet in textu mendū subesse, vbi Apulum vomitū facere, & stomachū & al-
uum mouere dicit, quū alibi Italicum innocentius esse dicat, ac si Apulia Italicæ
regio non esset, præferim quum experientiam huic refragari: quidē constet,
quū inter ceteras Italiæ regiones Apulia in hoc genere præcellat. Sed duo ge-
nera visuntur, maius, minusve, minus verò in prima cōmendatione est, & plu-
ris emitur, quàm maius, quia palato gratius est, nisi sapor asciticius sit à muria,
vel ab aceto, quod quum paucioris carnis sit, penitus subit conditura.

Plinius Egyptium cōmendat, Galenus, qui in locis calidis nascitur, vt in A- *Celum.*
rabia, longè est acrior Pergameno. Egyptium, quod nobis ex Alexandria de-
fertur, optimum est. In Cypro plurimum prouenit. Apud nos in Apulia, vnde
potius calidum, quàm feruidum, aut frigidum cælum flagitare videtur.

Theophrastus gaudere arenaceis, atq; tenuibus dixit, ultis haudquaquam *Solum.*
exire videtur, quum apud oppida, & loca plana proueniat, non laferpitii modo
apud montuosa, hoc minus verè putarunt. Plinius ab eo: Sabulosis familiaris.

simum. Dioscorides tenui solo, asperisque locis, in insulis, & iuxta rudera nasei. Columella sicum locum querere. Palladius ab eo, loco sicco, & gracili. Sed in oris Tyrrheni, & Adriatici maris vberi prouentu futicit, & in planis Apulie aequoreis capis. In noualibus sponte prouenit, & optimi soli ibi est signum. Videtur tandem omni solo prouenire, melius sicco, quam humido, & parietibus saxosisque locis.

Satio.

Theophrastus, In cultis hospitari nequit, immo deterius cultu nascitur. Aristoteles in problematibus, huius rationem reddit, cur capparis locis prouenire cultis haud facile possit. Multi nanque tentarunt, & translata radice, & semine, spatio, quum apud nonnullos, commodior capparis sit, quam rosa, sed tamen nil efficere valuerunt: quid ergo causæ sit, ut cultis nesciat hospitari, inculta & auia prosequatur, & maximè sepulchris adhæreat? Igitur de hoc ceterisque generis eiusdem accepisse illud oportet, quod non omnia eadem ex materia consistere solent, aut augeri, sed sunt quæ ex aliorum corruptione, & principio consistant, & post augeantur, ut pedunculi, & pili corrupto alimento, aut aliqua alia labe corporis prodeunt. Ergo ut in corpore nonnulla excremento proueniunt alimenti, quod certe cruditas est, & ubi naturæ vires superare non queunt, abscedunt quidem in vesicam, vel aluum, quæ in promptu maximè sunt, aliqua verò animal producant: itaque in senectute, & morbis hæc augentur. Sic in terra alia concocto alimento, & consistunt, & augentur, alia excrementis, aduersaque concretionem oriuntur. Culturæ autem officii est, ut concoquat, reddatque efficax alimentum, quo genus mite, urbanumque fructuum consistit. Quæ igitur mitigatione, informationeque huiusmodi creantur, hæc urbani vocabulo significamus, eo quod solertia hominis educata quasi eruditaque meliora euadant: quæ autem cura adhibita mitescere nequeunt, aut etiam aduerso habitu loci sui generis prodeunt, hæc sylvestria sunt, & rustica, cultisque viuere nesciunt: cultus enim dum ea melioribus instituere moribus contendit, deprauat, atque peruertit, quippe quum à sua natura desciscere nequeant, quæ orta sunt ex corruptione, quo in genere capparis quoque profectum est. Columella: Leuissimo cultu, aut nullo contenta est. Quippe quæ res etiam in desertis agris citra rustici operam conualescit, plurimisque prouinciis sua sponte noualibus nascitur, sed quibus locis eius inopia est, si serenda fuerit, locus debet interea circumdari fossula, quæ repleatur lapidibus, & calce, vel punico luto, ut sit quasi quadam lorica, ne possint eam prærumpere prædicti seminis frutices, qui ferè per totum agrum vagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tantum incommodum est (subinde enim possunt extirpari) quantum quod noxium virus habent, succoque suo sterile solum reddunt. Seritur viroque æquinoctio. Palladius: Septembri seritur capparis, latè serpit, succo suo terris nocet. Serendum est ergo, ne procedat vterius circumueniente fossato, vel luto structis parietibus, herbas sponte persequitur. Plinius, Capparis seritur siccis maximè, area in defossu cauata, tipisque vndique

V
vndique circum
scere. Apud nos
fructibus affert
donec siccescant
liculi sati, ubi ra
me sicci caules se
spernari dixerint
mos fructus att

10 C O R O N O
Dioscorid
tur, ob id hortis
Theophrast
pellatione dona
ronopum vocat
herba stella voca
nite, quippe astr
bus videre est.
beat, cornu cer
10 Theophrast
genus, et si ab H
numeretur. Id ap
capite descriptio
cinnabimus. D
fissis foliis psillio
nances prima
ta hirsutis, holo
cem habet ten
cus mare. Plin
30 culeatarum ca
vocat. Nos h
longa, angusta
nicum vngues
cylindro æqua
spica plantagi
Dioscorid
locis. Apulie
gnum habent
Serimus A
40 Martium. Ser

undique circumstructis lapide, alias euagatur per agros, & cogit solum sterile-
fcere. Apud nos seritur semine Martio, Aprili, Maio, & Septembri, quod suis
fructibus affert. Vbi maturuerint aperiuntur, tunc decerpuntur, insolanturq;
donec siccescant. Seritur etiam radicibus suis, vel germinibus radicatis, & cau-
liculi sati, vbi radices conceperint, sequenti anno transplantari possunt. Hy-
eme sicci caules secantur super terram, vt vere latius assurgant. Et si cultum a-
spernari dixerint Aristoteles & Theophrastus, vidimus satos, & cultos opti-
mos fructus attulisse, & longe minus agrestibus noxios.

De coronopo. CAP. XXIII.

10 **C**ORONOPVM inter intubacea recenset Theophrastus, & inter annuas.
Dioscorides in olere coqui dicit. Nobis frequentissima in acetariis offer-
tur, ob id hortis serimus.

Theophrasto κορωνόπος, sed Galeno, Aëtio, & Tralliano κορωνόδος Græca ap-
pellatione donata, quod cornicis pedis effigiem repræsentent folia. Latini co-
ronopum vocant. Theodorus Theophrastum vertendo silaginem vertit. Itali
herba stella vocant, videturq; hodierni æui nomen antiquo, & spurio conue-
nire, quippe astrion ab aliquibus dicebatur, vt in spuris Dioscoridis nomini-
bus videre est. Vulgus etiam quod variè dissectū ceruini cornu imaginem ha-
beat, cornu ceruinum vocant.

20 Theophrasto coronopus à radice foliata, amara, vt vniuersum intuborum
genus, etsi ab Hermolao, & aliis inter aculeatas, Theophrasti autoritate an-
numeretur. Id apud eum nusquam reperietur. Dioscorides & si exactam in suo
capite descriptionem non apponat, ex aliis herbis, quibus assimilauit, eam con-
cinnabimus. Dicit enim. Coronopus oblonga herbula est, per terram strata,
fissis foliis psillio non dissimilibus, non ita hirsutis, sed breuioribus, aut cata-
nances primæ, sed non ita longis, aut minoris sesamoidis, sed maioribus, nec ita
hirsutis, holestio proximis, cui & viticulas similes habet, aut gramine. Radi-
cem habet tenuem, astringentem, provenit in aggeribus, locis incultis, & se-
cus mare. Plinius hæc habet: Coronopus oblonga herbula est cum fissuris: a-
culeatarum caules per terram serpunt aliquarum, vt eius, quam coronopum
vocat. Nos herbam apud nos vulgò dictam stella ita depingimus. Folia fert
longa, angusta, hirsuta, pingua, humi sparsa, vtrinque fissâ, laciniata, verè cor-
nicum ungues, aut ceruinum cornu præferentia, ita inter se coherentia, vt
cylindro æquata dixeris, in stellæ modum radiantia, caule, thyrsulo, flore, &
spica plantagini simili, radice vnica, numerosis adnatis capillamentis.

Dioscorides in aggeribus provenire dicit, ac protrititis itineribus, incultisque
locis. Apuliæ campi hac herba virent, ac pro segetibus triticeis optimi soli si-
gnum habent.

Serimus Augusto, ac fimo operimus, carpitur Septembri, Octobri vsq; ad
Martium. Seritur etiam Martio, Aprili florēt, Iunio profert semen.

PLINIVS portulacam in acetariis sumptam stomachum corroborare auctor est. Nos in acetariis tota æstate utimur, esitamusq; tenellas cymas. Famosum est quod hæc mediam sanat, id est dentibus, qui stupore quodam obtorpescunt, remedio est, qui scilicet ab austervis, & acidis nascatur. Cuius causam Galenus reddit. Dentes namque acrium occursum præficcari exasperantur, ita ut citra noxam atterendis cibis adhiberi nequeant, solidiorisque cuiusque commercio concipiant dolorem, lentore quo sese ab siccorum iniuria vindicabant exucto. Nanque sicca nullo interiecto humoris nexu durius sese collidunt, unde sensus exasperationis noxiæ contrahitur. Damnum ergo saluarii lentoris, qui velut siccorum pignus intercedebat, glutinoso portulacæ succo quamoptimè refarcitur. Aristoteles dicit id fieri à lento humore portulacæ, qui à corpore educit acorem, quippe qui affinitate quadam coniungi valeat, argumento saporis, quem acidulum reddit. Sal verò macerat, liquefacitque, atque ita acorem quoque extrudit. Alexander Aphrodisæus hoc portulacæ munus cæcis rerum facultatibus delitescentibusve causis acceptum refert. Quoniam, inquit, modo stupori dentibus à frigidis fructibus adseito, portulaca, quæ frigida est, medebitur, quum contracta vitia non consimilibus, sed contrariis abiguntur? Columella ita condit, sunt quædam herbæ, quas appropinquante vindemia ita condies, ut portulaca: Diligenter purgatur, & sub umbra expanditur, deinde quarto die in fundis fideliarum subternitur, & componitur, acetoq; infuso, iterum sal superponitur. Platina in acetariis ita parat: Portulaca benè lota, secretaque à præduro caule in patinam reponitur cum capaminutariim concisa: sale, oleo, & aceto conditur. Sunt qui ad illius frigiditatem comprimendam, piper tritum, ac cinnamomum inspergant.

Nomen. Græcis αἰσπάρην, Latinis ferè omnibus portulacæ nomine vocatur. Italici portulacellana.

Genera. Portulaca in duas species distribuitur, in sativam, & spontaneam. utriusque meminit Dioscorides, sativæ in peplio, & suo capite: sylvestris in sempervivuo tertio.

Descriptio. Theophrastus brevi radice inniti dixit, tum quæ in profundum descendit tum quæ è latere porrigitur. Dioscorides, etsi peculiari descriptione non dignatus fuerit, aliis tamen assimilando qualis sit patefecit. Portulaca capeæ similis est, sed albidiora folia habet, similis telephio caule & foliis. Folia similia helioscopio tithymalo habet, sed crassiora, minusque rotunda. Folia tam similia peplio, ut sylvestrem aliqui portulacam appellent. Etiam terrestri tribulo, sed viticulis crassioribus, vel tertio sempervivuo, quæ similitudine sylvestrem portulacam vocaverunt. Sic etiam crithamo, sed minora, brevioraque. Nostra autem sativæ teretibus viticulis, latis, carnosiss, succulentis, humi reptantibus luxuriat, lentè in puniceum vergentibus, foliis albicantibus quadam tenui aspergine

V
aspergine ciner
ret lunio, & lu
gustu acidior
teram non noll
Aperto, apri
Pinguè solu
siccatibus de
portet. Colum
Hu

10 Sylvestris se
Theophras
quarto, aut qui
cipuè Aprilis, M
semel sata fuer
nec unquam d

N E cabiis
tidie expl
gratiam inire,
20 test oleo cond
intingendis suc
iorem sibi vend
cum pane, & si
tentiam induca
Dioscoridis
test anceps vo
nant, & quod
quod ab ea su
tientibus exug
30 ori repræsent

Duo apud n
Dioscorides
guo & sylvest
acri, in caule, se
& pinnatis, ca
vescenti, sem
que Minoris
Vbi que pr
locis, ut in coll

aspergine cinerea, gustu subfulso, flore pusillo, semine in theculis nigro. Floret Iunio, & Iulio. Sylvestris duplo minor, duntaxat tota rubentibus ramulis, gustu acidior, folio turbinatiore tam priori consimilis, ut qui vnam norit, alteram non nosse non possit.

Aperto, apricoque cœlo gaudet, sub humido moritur.

Pingue solum, & latamine saturatum exoptat, & præcipuè humidū: nam siccitatibus deficit: unde æstiuis ardoribus continuis siccitatibus blandiri oportet. Columella in suo hortulo.

Colum.

Solum.

Humidaq; andrachne sitientes protegit antes.

10 Sylvestris squallidioribus locis, vinetis glareosis, & viarum fratis reptat.

Theophrastus ex æstiuasemente protulit, quam tertiam vocat, celerrimè quarto, aut quinto die à satū erumpit. Apud nos omni tēpore feritur, sed præcipuè Aprili, Maio, & Iunio. Optimè feritur inter caules, capas, & porros, ubi semel sata fuerit, semine per maturitatem caduco, ipsa seferente, perennis est, nec vnquam deficit, densius sata, pusilla fit.

Sabia.

De oxalide. CAP. XXIII.

NE cabiis remouenda herba est, quam oxalida vocant, quum nobis quotidie exploratum sit in acetariis mansam crudam magnam cum palato gratiam inire, suo enim sapore sal, & acetum refert, unde in acetariis solo potest oleo condiri, quin plerunque iuribus incocta optimè sapit, & in carnibus intingendis succo viridi acamentum subministrat, nec aliud in obsoniis maiorem sibi vendicat auctoritatem. Platina illotam prima etiam statim mensa cum pane, & sine alio condimento concedit, æstate præsertim, ut cibi appetentiam inducat.

Dioscoridis est ὄζανις, αἰαζουεῖς & ὀξυμήλον, oxalis dicta, quasi acetosa, sed potest anceps vocabuli ὄζα significatio trahi, & quod folia in mucronem defendant, & quod acidum saporem recipiat. Romani rumicem appellant, forsan quod ab ea succus non aliter atque mamma, quam rumen veteres dixere, à sitientibus exugisoleat. Vulgares nostri *acetosella* vocant, quod gratum acorem ori repræsentet.

Nomen.

20 Duo apud nos nascuntur genera, maius, minusve.

Genera.

Dioscorides lapathi species describendo suam oxalim ita pingit. Folia exiguo & sylvestri rumici similia, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Nos sic: foliis ima base lunatis, & pinnatis, caule striato succulento, colore rubello, radice fibrosa ex croco fluorescenti, semine anguloso, acuto, quod foliaceo vestitur inuolucro, copiosoque. Minori folia longè minora.

Descriptio.

Vbique pratis, & hortis, quolibet anni tempore viget, sed siccis præcipue locis, vi in collibus, & quibusvis squallidis, & macilentis.

Cael. Sol.

OXALIS iam dicta oxym in mentem reuocauit. Hæc tum sapore, seu leui acramento placet, tum quod stomachum recreet: nam à Plinio dis- soluto stomacho dari scriptum est, non minus, quàm prædicta acetariis expeti- tur, admisceturque. Hæc futura prænumcia est tempestatis, siquidem ea im- minente, surrigitur contra eam, tanquam tempestati colluctatura, quod sæ- pissimè obseruauimus. Obseruatum etiam à plerisque doctiorum, quod hu- ius herbæ copiosi flores crebros illius anni imbres, & aquarum inundationes portendant, sic pauci siccitatem. Sic Plinius de prateni trifolio dixit, in horre- scere tempestatibus folio, & etiam nos obseruauimus.

Nomen.

A Græcis ὄζυς, & Latinis dicta est, Plinio authore, quod acido sapore dona- ta sit, aliquibus oxytriphylon, nō ab acutie foliorum, sed potius aciditate. No- bistrifoglio acetoso, & alleluia.

Descriptio.

Plinius tenera folia habere dixit. Pusilla herba est, longis tamen pediculis iuncis, glabris, tenerisque, quibus singulis in extremitate tria insunt folia, quæ cordis figuram referunt, acidula. Flos quiuis foliolis stellatus luteus, nonnun- quam cædidus, simplici stylo inter folia profliens, semen rufum in oblongiu- sculis thecis, quod ubi maturuerit, sponte, vel leui tactu aperitur theca, & lon- giusculè proicit, etiam cum strepitu, non sine admiratione. Radix ima fibrosa, summa, squamatis loricata, rufa, floret Maio mense.

Cæl. Sol.

Opaca, umbrosa que sequitur.

Derapunculo. CAP. XXVI.

NUNC de rapunculo dicemus, cuius folia, & præcipuè radices in acetariis diuitem lautarum que mensarum veniunt, & ieiuniis quadragenæ ex- pectatissimæ. Sunt enim eius radices longè quouis rapo, raphano que delica- tiores, suauiores que.

Nomen.

Recentiores rapunculum, vel rapunculum vocant, siue quod putarint eandem, vel congenerem, siue quia figura, vel esu napulam, vel rapulam præ- se ferat radix, quia oblongula, & in medio sui nonnihil ventricosa.

Descriptio.

Herbula viret folio oblongo humi accubante, ubi excaulescit, longiori, an- gustiori, & hirsutiori, cauliculis gracilibus, cubitalibus, & pluribus ab una radi- ce prodeuntibus. Flore quatuor foliolis conformato, purpurascente, ad cæru- leum vergente, campanulæ effigie. Semine in oblongis thecis pusillo. Radice pollicis longitudine, alba, tenera, crassiuscula, in media ipsius parte subdulci. Hyeme folia virent, vere exit in caulem, Maio floret, & subinde fert semen. Radix hyeme eruitur ad acetaria, æstate lignescit.

Cælum.

Tepidum cælum exoptare videtur, quale Neapolitanum, in Apulia ubi fer- uet, non nascitur.

Solum.

Solum gracile & solum, & suspensum sequitur, ob id in syluosis, & sepi- bus

bus reperitur, ita compactius, siue viridis coloris, & Seritur semine, & piunt vere. Se- ve radices, reman-

COMMEN- acum dicu-

10 pe non modo, o- omnes alias her- diosissimeq; in-

Græcis ὄζυς, &

simæ, per similitu-

odorem doleat, &

Apud nos herba

Dioscorides se-

akerum caulibus

alis sursum spect-

20 tes, nullius in m-

istimauerit, non

sui odoris iucund-

stram acum molis-

cis exceptit: Folis

nuioribus, pilosis

ter quæ & in eac-

Geranion ali my-

le breuiori, rotu-

ranium, vel si ma-

ciles, rubentes, h-

unt myrrhides, at

stigma flores, in q-

cus longitudine

Calido, temp-

tioribus folis lu-

Primis autum-

perit, laramine se-

ac subinde perare

aliberaueris.

bus reperitur, in quo radices in profundum agit: in plano vbi solum durius, & compactius, si nascitur, quum in profundum teneræ radices subire nequeant, viridis coloris, & duriusculæ fiunt.

Seritur semine, & optime prouenit, sic etiam oculi circa radicem sati con-
cipiunt vere. Semel sata diutius perennat, nam ad esum extirpatæ, abruptæ-
ve radices, remanentes fibrillæ, etiam frondes, & caules egerunt.

De acumoscata. CAP. XXVII.

COMMENDATISSIMA inter acetarias herbas illa est, quam muscatam
acum dicunt, geranii speciem odoratam illam à Plinio descriptam: quip-
pe non modo, olei, aceti q; optimè recipit condimentum, sapidaque est, sed
omnes alias herbas suo moschi odore fragrantès reddit, audivissimè editur, stu-
diosissime q; in hortis seritur, alitur q;.

Græcis *περὶ γένος* à gruini capitis imagine, quæ summo eius capitulo est aptis-
sima, per similitudinē dictum. Ab aliis acus moschata, quod & insigni moschi
odore redoleat, & acuto longiori mucrone in vertice acus modo inhorrescat.
Apud nos *herba moschata* à moschi odore, vnde illi princeps nomenclatura.

Dioscorides secundam geranii speciem describens, hæc habet. Geranium
alterum caulibus minutis, & pusillis sesquipedalibus, foliis maluæ in summis
alis sursum spectantia gruum capitula insunt cum suis rostris, aut canini den-
tes, nullius in medicina vsus. Quam etsi alienam à medicina Dioscorides ex-
istimaucrit, non tamen inficiatur edi posse ab iis, qui gulæ indulgent, quum
sui odoris iucunditate in acetariis expectatur, etsi quoduis potius, quàm no-
stram acum moschatam exprimere videtur. Subdit Plinius, quæ etiam à Græ-
cis excepit: Foliis candidioribus, paulò quàm maluæ minoribus, caulibus te-
nuioribus, pilosis, ramosis ex interuallis binum palmorum, & in iis foliis, in-
ter quæ & in cacuminibus capitula insunt gruum. Sed nostri sic eam tradunt.
Geranium alii myrrhim appellant, similis est cicutæ, foliis minutioribus, & cau-
le breuiori, rotundo, saporis & odoris iucundi. Nos eam ita describimus. Ge-
ranium, vel si mauis gruaria, è radice exigua cauliculos profert complures, gra-
ciles, rubentes, hirsutos, præcipuè adultos, è caule medio apice tenus folia exe-
unt myrrhidis, aut cicutæ, positu tanacetii, in plumam deducta, in caulium fa-
stigiis flores, in quorum summo capitula ciconiæ, vel gruum cum rostellis a-
cus longitudine emicant, in quibus semen occultitur.

Calido, temperatoque cælo emicat, locis omnibus obuia, sed in hortis la-
tioribus foliis luxuriat.

Primis autumnii imbribus vsq; ad Februarium seritur, quum adolēscere cœ-
perit, latamine suffunditur, herbisq; nocentibus liberatur. Fructificat Maio
ac subinde perarefcit. Suo semine se ipsa serit, vt vix semel sata amplius locum
caliberaueris.

SVNT ferulæ cibo, & coronis commendabiles. Nobis veris initio prima ferulæ germina, quæ ouiluteum referunt, sub cineribus excocta, charta prius, vel linteo madefactis inuoluta, mox pipere, sale, oleo, & aceto conspersa gratissimo sunt cibo. Ad hæc Plinius: Ferulæ caules pomum est, eduntur decocti, commendanturq; multo ac melle, stomacho vtilis, pluries sumpti capitis dolorem faciunt. Dioscorides muria caules cōdi scripsit. Columella eius docet condituram. Circa vernum æquinoctium colligito ferulas cum coliculo silentes, & hac conditura seruato, aceri duas partes, & tertiam duræ muria misces, ferulam quæ legeris sub tecto exponito, dum floccescat, deinde folia, & corticem omnem folliculorum detrahito. Caules si fuerint pollicis crassiores, arundine secato, & in duas partes diuidito: ipsos quoque flores, ne sint immodici, partiri oportebit, atq; ita in vasa condi, deinde ius, quod supra scriptum est infundi, & paucas radículas laferis, quod Græci *σκληρον* vocant, adiectas, ita spissamento aridi fœniculi contegi, vt superueniat ius. In hortulo verò dixit,

*Tempore non alio vili quog, salgama merce
Capparis, & tristes inula, ferulæq, minaces
Plantantur.*

Plinius coronarios vti ferulis & corymbis, & ignem optimè ferulis asseruari tradidit. Vnde quod Prometheus primum extractum è silice ignem ferulis excepit, ansam præbuit Poëtis fingendi, ferulam Phœbi rotis admouisse, & accensam terris apportasse. Sunt qui arborum censui ascribendam censeant, quod temporis processu lignescat. Propterea Clearchus inter luforias questiones, quas Latini scirpos, Græci gryphos, & anigmata vocant, ferulam dicit esse lignum, & non lignum, sicut pumicem lapidem, non lapidem, noctuam volucrem, non volucrem. Athenæo auctore. Plinius. Ferulæ sunt asinis gratissimo pabulo, cæteris verò iumentis præsentaneo veneno, qua de caula id animal Libero patri assignatur, cui & ferula. Ferulæ Libero patri assignatur, de qua re alii alias referunt causas. Eusebius in præparatione euangelica *κροφύρον* Bacchum appellat, id est, feruligerum, rationemq; docet, quod homines potu in furorem aguntur, ac se inuicem ferunt, vt se mutuis vulneribus confodiant; ferulis vtuntur, quarum ictus lentus, sed non latalis est. Plutarchus in Symposio aliam assignat rationem, ferulam, & obliuionem Baccho dari, ceu vel parum conueniat, errorum inter pocula deinceps comminisci: aut si qua in parte peccatum sit, puerilis, & levis reprehensio sufficiat, quum & pueri ferula castigentur. Alii dicunt quod ferula Baccho apriissima sit, vt infirmos ebrietate pedes leui hoc pedamento regant ebrii. Fuit & antiquitus ferula imperii nota. Leuis enim huius arboris ictus est, vt magis seueritate, quàm fustium atrocitate formidabiles sint ii, quibus Regum instar sceptrum conce-

VI
conceduntur, na
pædaggorum i
Ferulæ

Plinius. Ferula
untur. Salpa pisci
nisi ferula verber
Græcis *κροφύρον*,
la dicitur, à feren
pocrates non mi
io iam plattiga voca
Theophrastus
geniculata, à gen
multifida, capill
sunt, caulem am
rum. Germinat v
singulari profunde
genere est. Sed in
scunt altitudine,
cubitorum, folia
ria ascribit, quoniam

tem vice fungosa
nibus exuentia fo
eadem, quæ aneth
stata facilius bacul
Theophrastus
eo, quod commun
ne, leuitem genu
vt nonnulli putat
re sentitur, præter
nem finditur cacu
bus flos semenq;
caule diuiditur in
propè infinitas sp
in modis similibus
Calidis nascitur
squalidis, cellis
uent soles.

L
EST & elegan
dam draco dicitur

conceduntur, nam legibus asperiores, sed pœna mitiores sint oportet. Fuit & pœdagogorum insigne. Martialis,

Ferula minaces sceptrapadagogorum.

Plinius. Ferulæ natura murænis infestissima est, tactæ siquidem ea moriuntur. Salpa piscis aliquibus obscenus dictus, qui nunquam percoqui possit, nisi ferula verberatus.

Græcis *ῥαβδίζ*, quasi virgultum, vel batillum, aut thyrsus. Sic Latinis ferula dicitur, à ferendo, quòd illius caules senibus pedes, ac scipiones essent. Hippocrates non minus à feriendo, quàm à ferendo dictam videri voluit, qui etiam iam *plastiga* vocauit. *Italica ferola.*

Theophrastus ita describit. Ferula grandis admodum surgit, vnicaulis & geniculata, à genibus coliculi, & folia alternatim exeunt, mollia, grandia, multifida, capillamenti modo extenuata, maxima, ut quæq; terræ proxima sunt, caulem amplectentia, ut arundines, flores lutei, semen anethi obscurum. Germinat vere, primum folio, tum caule, qui ei annotinus est, radice singulari profunda. Eius teneritudo processu transit in lignum. In fruticum genere est. Sed inter fortunatas insulas Norion est, in qua ferulæ tanta crescunt altitudine, ut arbores fiant. Dioscorides: Ferula caulem affert ternum cubitorum, folia sceniculi longe asperiora, & latiora. Plinius arborum generi ascribit, quoniam lignum loco corticis habet, hoc est forinfecus. Ligni autem vice fungosam medullam, ut sambuci. Geniculatis nodata scapis. Agnibus exeuntia folia maxima, ut quæq; terræ proxima sunt: cæterum natura eadem, quæ anetho, & fructui similis. Nulli fruticum leuitas maior, ob id gestata facilius baculorum usum senectuti præber.

Theophrastus ferulaceum genus in plures spargi species dixit, sed prius de eo, quod commune omnium constat dicendum est, scilicet ferula, & ferulagine, seu idem genus ambobus, differens magnitudine tantum, seu alterum sit, ut nonnulli putarunt. Ergo natura earum, quæ conspici possit, consimilis certè sentitur, præterquam ratione magnitudinis. Ferula assurgens in altitudinem finditur cacumine, inque stipites quosdam haud magnos dispergitur, quibus flos semenque insidet. Ferulago autem humilis est. Plinius: Quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, scæmina putatur. Dum Apuliæ essem, multas, & propè infinitas species enumeraui, magnitudine, colore, semine, folio & huiusmodi similibus differentia.

Calidis nascitur locis: ideo Apulia ferularum maximè ferax. Præterea squalidis, cellis, præruptisque saxorum maritimis sinibus, ubi æstiu feruent soles.

De dracone hortensi dicto. CAP. XXIX.

EST & elegantioribus nostris olitoribus non incognita herbulæ quædam draco dicta, acetatiss gratissima, quæ si sale, oleo, & aceto condidatur,

nec sal nec acetum exigere videtur, quum vtriusq; saporem referat. Hanc antiquis incognitam dicunt, sed admirabili quodam modo olitoribus inuentam.

Nomen. Draco nomen. Sunt qui putent tarchon Simeonis Sethi, vel Avicennæ, vel corrupto à tarchone nomine, vel quod acuto sapore linguam vellicet.

Descriptio. Pusilla herba. Folia angusta, crassiuscula, cuspidata, flosculi lutei in ramulis sparsi, caules cubitales, semen exiguum, & euanidum nigrum, radices humi reptantes graminis modo. Sapor aceti, & salis gustum linguam comburendo praefert.

Satis. Quia semen euanidum, & non genitabile, propagatur radice, in varias partes diuisa. Habetur ex Hermolao doctissimo viro semine lini, raphani, scillæ bulbis incluso, & in terram obruto nasci. Alii semine inferto cuiusdam capaceæ, & tuberose radici, si quis in afflatu maritimo, & natalibus squillæ non auulsæ inferat. Vel si in raphano, aut cape foraminulo facto adigatur lini semen. Sed id verum sit nec ne, arguere non ausim, quum vniuersa Italia id pro certo persuasum sit. Nos quum sapius huius periculum fecerimus, & amicos nostros, vt idem experirentur hortaremur, sæpè luit experientia, & optato voto frustrati sumus: nam & capis, & alliis, & scillis geminum linum prognatum vidimus, nihil de scilla habentem.

De herbis condimentariis, & primò de apiis, ac de hortensio. CAP. XXX.

IAM escarias herbas, siue quæ coctæ siue quæ crudæ edantur, aggrediemur, sed prius de herbis aliquot condimentariis dicemus, quæ ad obsonia condienda, gulæ irritamenta: ab apio exorsi incipiemus. Plinius: Gratia apio vulgo est: nanq; & rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ verba quid nisi vulgare nostrum petroselinum indicant: quum nobis olerum omnium familiarissimum in ciborum condimentis perpetuo habeatur. Ideo merito tacita coniectura potius, quàm certa vlla figuræ expressione verum antiquorum apium existimatur. Præterea pisces in piscina ægrotantes viridi, apio recreantur. Honos ipsi in Achaia coronare victores sacri certaminis Nemeæ. Cæterum nil æquè suauitatem oris commendare prodiderunt Græci, si ab iis estur, quibus anima fœtet, iisq; grauis halitus tadium emendare. Addiderunt meritorias mulieres apium comesse, vt graue virus odoris abigant, oraq; sua iucundiotem expirent auram, ex Florentino in Geoponicis Græcis. Apii coliculos seruare docet Columella conditura, quæ aceti partes duas, & tertiam duræ muriæ recipiat. Verum apud eruditos nil aliud terra erutum in maiorum sententiarum varietate est. Chrysippus, & Dionysius ad cibum admittendum non esse: immo nefas: nam id defunctorum epulis feralibus dicatum esse dicunt. Plutarchus est author sepulchra apio coronari, vnde vetus illud adagium de apio, de iis, qui profligata valetudine vtuntur.

Theocri.

Theocritus
videm selinon
minierint, ore
nisi nostrum
stri solo, in
à formidando
mitiales fieri,
Chrysippus, &

Theophrastus
rens, & si reliqu
uenienter assurg
vocatut Radix
criora. Caulam
por itaq; neg; in
lentæ, dulcesq;
dæ, vt in gramin
profundum agn
tum, vbi radices
scorides etsi vid

si sui libri capitib
minus, folio ang
mile, & folio ba
nii, sed angustio
le. Ab eo Pliniu
rate prouenit. F
tar. Semine nud
lata, diuisaq; ac
renuia, digiti lo
ter striato, foli

30 & quo min uti
Chrysippus
sapore acri, & f
culos gignente
pingunt. Per r
minus crispis,
diori, & long
stiens air: Sati
re. Item caule
purpureus, ali
40 te quarto. Ap
aliud folio spiss

Theocrisus *σέλινον εὐοδμον*, id est, selinum odoratum vocat. Theophrastus i- *Nomen.*
 ridem selinon vrbani. Dioscorides hortense. quum autem cæterorum me-
 minerint, oreoselini, eleoselini, & hipposelini, per hortense, & vrbani, non
 nisi nostrum peculiare petroselinū intelligi voluerunt. Nomen *σέλινον*, à palu-
 stri solo, in quo sapius prouenire solet, deducunt. Videtur tamen posse deduci
 à formidando lunatico effectu, quem accersit esu. In puerperis ab eo cibo co-
 mitiales fieri, qui vbera infantes hauserint, dicunt. Latini apium, & apius, sic
 Chrysippus, & Dionysius, Plinio auctore. Itali, *petroselino*, *petroselo*.

Theophrastus ita apium depingit. Suffrutex est, cacumine perpetuo vi- *Descriptio.*
 10 rens, & si reliquarum frondium iacturam faciat. Perfectis foliis, caulis con-
 uenienter assurgit, folio scisso per extrema, mespilo simili (quæ vulgò *azarolo*
 vocatur) Radix carnosæ, dulcis, grataque palato est, folia sicciora, veluti a-
 criora. Causam reddit. Quia superior pars nimis sicca, inferior roscida est, sa-
 por itaque neque in nimio humore, neque in siccitate residet, ita fit, ut radices escu-
 lentæ, dulcesque sint, superiores verò partes siccitatis causa insuaues, & insipi-
 dæ, ut in gramine, & reliquis eiusdem generis videre est. E radice, quæ in
 profundum agitur, & quæ crassa, è lateribus mittit ut beta. Vnde semel sa-
 tum, ubi radices iniecit, restibili fecunditate folia, caulesque producit. Dio-
 scorides etsi videtur suo peculiari capite descriptionem omisisse, aliis tamen
 20 sui libri capitibus optimè repræsentat. Apium est hipposelino, & eleoselino
 minus, folio angustiori, radix cruda, coctave estur. Folium habet laserpitio si-
 mile, & folio buni, scilicet, quæ proxima sunt radici, vel caucalidis, vel smyr-
 nii, sed angustiora, minusque pingua, & eiusdem caulem, semen siso simi-
 le. Ab eo Plinius. Sapius parit, semel satum pluribus annis restibili fecundi-
 tate prouenit. Fruticat, sed non capite. Proprium ei, quod colorem immu-
 tata, diuisaque, ac postquam caulem edidit, folia mutat, satis enim oblonga, &
 tenuia, digiti longitudinem æquantia habet. Caule cubitali, concauo, tenui-
 ter striato, foliis tripartito dissectis, oris leniusculè laciniatis, flosculo candido,
 30 & quo minutiolem haud temere reperias.

Chrysippus fœminam esse dicit crispioribus foliis, & duris, & crasso caule, *Genera.*
 sapore acri, & feruido. Dionysius marem nigriorem, breuioris radice, vermi-
 culos gignentem. Plinio auctore. Quibus verbis vulgare nostrum apium de-
 pingunt. Per marem enim vulgare petroselinum descripserunt, quod foliis
 minus crispis, caule minus crasso, sapore dulciori, nec tam feruido, colore albi-
 diori, & longiori radice. Plinius satiui huius apii differentias enumerare ge-
 stiens ait: Satiui autem differentia in folio denso, crispo, aut latiore, aut laui-
 ore. Item caule lentiore, & crassiore: & caulis aliorum candidus est, aliorum
 purpureus, aliorum varius. Quæ verba è Theophrasto excepit libri sept. capi-
 40 te quarto. Apiorum tum in foliis, tum in caulibus discrimen utique constat,
 aliud folio spisso, crispo, densoque, aliud rariori, latiori que, cauleque maiori.

Horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris. Verum ad summam: eiusmodi omne sylvestri proximum est. Theophrastus non fati-
 ui, ut ipse putat, sed apiorum omnium differentias notat, videlicet eleoselini,
 hipposelini, cæterorumq; Dioscorides sylvestris apii meminit, secundo dauci
 generi assimilando. Apud nos duo vulgaris petroselini genera sunt: maius,
 quod *petroselino di catalogna* dicimus, & vulgare minus.

Colum.

Locis calidis, & frigidis feri potest, dummodo iugis adsit humor, cuius ri-
 gatu facilius animatur, quamvis etiam in siccitate nasci non denegat.

Solum.

Columella. Secundum fontem commodissime ponitur, quia præcipue a-
 qua latatur. Palladius: Terra quali volueris, dummodo ibi sit humor, quam-
 vis nasci, si necesse sit, & in siccitate non denegat.

Satio.

Theophrastus è seminibus secundæ sationis esse dicit, quæ post brumam Ia-
 nuario mense fit. Columella: Eius optima satio post idus Maias, vsq; ad solsti-
 rium, nam desiderat teporem. Possis quoq; plantis serere, nec minus semine.
 Palladius, Locis calidis, & frigidis Aprili, & propè omnibus mensibus à primo
 vere vsq; ad autumnū feratur extremum. Plinius dicit ab equinoctio verno se-
 ri. Theophrastus: quinquagesimo à satio die, vel quàm celerimè quadragesi-
 mo, prouentu omnium difficillimum proditur. Sed è veteri semine celerius
 prouenit. A bimatu fructificat. Recipit in rigationibus salsam aquam. Vnde
 Aristoteles in problematis quarit, cur aquam salsam apium recipit, porrum
 recusat. An quod alterius radix imbecilla, alterius valida est? Impatibilibus
 autem, quod validius. Plinius. Omnium difficillimum nascitur apium, qua-
 dragesimo enim die quàm celerimè, quinquagesimo maiore ex parte emer-
 git. Ex vetere semine celerius prouenit.

Arri.

Grandius nascitur apium paxillo seminibus; quàm fusim satis, ex Theo-
 phrasto. Præterea ut in radices crescat, Quum transfertur palo cauerna facta
 tantæ crassitudinis, quantæ ipsum fieri volueris, ingesto fimo, apium adigas:
 radix enim totum locum implere faciliè poterit. Facta nanque scrobe, ad-
 acto palo, totum spatium illud replebit radix, & fiet etiam, ut si qua figuræ
 species in ipso sit vacuo, radicis partibus subeuntibus communicetur. Do-
 cet etiam aliter, quomodo communicetur cum radicibus etiam germinum
 magnitudo. In linteolo plura semina colligata mandari terræ iubet, illa o-
 mnia coalescere in naturam vnā: sic radices, & germina ampliora eua-
 dent. Idem diximus de palmis in pomario, quæ res minime contemnenda,
 si vera esset. Cuius rationem assignat: plus enim valent quæ plura, atque
 ex his omnibus natura vna coalescit. Florentinus ab eo, magnum nasci a-
 pium suadet, si quantum seminis possis tribus digitis comprehendere, ve-
 rusto linteolo deligaueris, inde stercore inuoluto ligabis. Columella: Si
 quis velit id latifolium facere, quantum seminis possint tres digitis compre-
 hendere, raro linteolo illiger, & ita in areolas dispositum religer. Palla-
 dius. Apios maiores facies, si semen, quantum tribus digitis comprehendere
 potest.

potest, linteolo
 germen capitis v
 tam esse deprehe
 rata potius nasc
 aliud commentu
 ristoteles in prob
 imæ panicum vi
 ces mira magnit
 pabulum attrah
 dicem contentu
 qui incrementu
 mira capere inc
 poni iubent, m
 hibetur, cohibe
 germinibus deb
 cesse erit. Cacher
 sitate habet, qui
 & retenta, & ca
 mentum. Sed q
 20 *ex geros*, quod he
 ne, & Nicandro
 calidum, neq; sic
 ex Dioscoride in
 apium fieri tradi
 citipari apium po
 terra enim coet
 crispæ frondis si
 expoliaturq;
 fieri crispum, q
 30 luto cylindro
 areas nascentes
 Plinius: Semir
 tur cylindro. Fi
 positi vasis for
 tū quum prob
 cer, liberatete
 itaq; ambiens
 do & generia
 40 *N* Vn c ad
 specie el

potest, linteolo ratiore clausuris, & breui fossa obrueris, ita omnium seminum germen capitis vnius soliditate necetur. Sed tantorum virorum pace hoc falsum esse deprehendimus tum ratione, tum experientia: plura enim & separata potius nascuntur, quàm ex omnibus vnum, vt superius diximus. Extat & aliud commentum radices augescendi, ab antiquis edoctum. Quærit enim Aristoteles in problematis, cur si quis apium radice tenuis circumfodiat, partiq; imæ panicum vndiq; ingerat, deinde terram accumulēt, itaq; irriget: radices mira magnitudine adolescent. An quod natura panici fungosa, & calida pabulum attrahit, conceptumq; non sursum transmitti patitur? sed inter radicem contentum calore sibi indito concoquit, vt radices amplissimum sequi incrementum necesse sit. Theophrastus ab eo: Qui volunt apii radicem mira capere incrementa, circumfodiunt radicem tenuis, in id vacuū *καρχύμιον* poni iubent, mox terram accumulāt: ne quicquā ad germina distribuatur, prohibetur, cohibeturq; obiectu insperæ terræ, vnde pars ea, quæ frondibus, & germinibus debebatur, radicibus absorbitur, sic maior sequatur accretio necesse erit. Cachryllū calidum densumq; est, magnumq; emolumentum à densitate habet, quia attrahit, & retinet caliditatis ratione: materia igitur attracta, & retenta, & calore concocta, superiores partes defraudando sequitur incrementum. Sed quid *καρχύμιον* significet, speculemur. *καρχύμιον* diminutum est *καρχύμιον*, quod hordeum significat, Pollucis & Suidæ autoritate, ex Aristophane, & Nicandro. Alii suffriētum hordeum interpretantur. Sed hordeum neq; calidum, neq; siccum est, & Aristoteles panici raritate iuvari dixit. Est & *καρχύμιον* ex Dioscoride in libanotide, qui maximè calidus est. Florentinus longè maius apium fieri tradit, si ablaqueatis radicibus, paleas adieceris, & ligaueris. Idem crispari apium pollicetur, si satum paulito solo cylindrum superuoluatur, sub terra enim coercitum, non habet quo se diffundat. Columella: Si quis apium crispæ frondis fieri maluerit, semen eius inditum pile, & saligno palo pinstitutum, expoliaturq; similiter in linteolis ligatū obruet, potest & citra hanc operam fieri crispum, qualitercūq; satū, si quum est natum, incrementum eius superuoluto cylindro coerceatur. Palladius: Crispi fiunt, si ante tundantur, vel si super areas nascentes aliqua pondera volutentur, aut pedibus proculcentur enata. Plinius: Semina paululū in pila pulsato, crispū sic putant fieri, aut si satū calcetur cylindro. Figurā quoq; sic induet nouā, authore Theophrasto, & circumpositi vasis formā imitabitur. Quod ideo propterea euenit, quia nutrimentū quum prohibetur, arceturq; à vase circūueniente, fertur ad id, quod aduocet, libertatemq; luxuriādi concedit. Fit enim veluti riuuli cuiusdā deductio, itaq; ambientis vasis figuram circumplectitur. Euenit hoc idem quodammodo & generi animalium in magnitudine, paruitate, breuitate, & longitudine.

De palustri apio, & capitato. CAP. XXXI.

40 **N**UNC ad aliam apii speciem deueniemus, scilicet palustrem. Ex ipsius specie est eleoselinum, inquit Palladius.

Nomen.

Theophrasto ἐλεοσέλινον, Dioscoridi ἐλεοσέλινον, quasi ἑλεος σενόμενον, hoc est, paludibus impulsum. Alii ὀδρόσελινον, quasi humentium aluminum. Homerus ἐλεόπρεπον, quod paludibus gaudeat, ibiq; latius exurgat. Latini helcoselinum vocant, authore Plinio, & palustre apium. Gaza confuso nomine paludapium vertit. Neapolitani *aocio*, & *apio*, ab apio detorto nomine.

Descriptio.

Theophrastus, Folio raro, nec hirsuto, simili apio sapore, figura, & odore. Folium frugifero rosmarino adsimile, sed multo minus. Dioscorides, satiuo grandius. Plinius: vno folio, nec hirsuto. Palladius helioselinon molli folio, & caule tenero. Hoc apium Chrysippi, & Dionysii consiliis à cibis abdicatum puto, tum quod ingrati saporis, odorisve sit, tum quia epilepticum paroxysmum exciter, & aciei obsit.

Solum.

Dioscorides in humidis nasci dixit, Palladius in lacunis. Plinius idem, sed Theophrastus apud aqua ductus pulchrius prouenire.

Genera.

Sed aliud est eiusdem speciei apium capitatum dictum, quod in hortis oppidi sanctæ Agathæ, item Theano, & aliis Apuliæ locis inuenitur à natura donatum, antiquis inuisum indictumq; quod crassa, quam possidet, radice rotunda, globosaq; hominis ferè caput æquet. Ipsa dulcissima, odorata, grataq; admodum palato est, fouedo stomacho, ac habitu oris commendando apprimè commendata. Eius satio hæc est. Ineunte Ianuario spargitur semē. Februarii medio pullulat è terra, quadraginta diebus incrementum sument, circa Martii calcē transferunt, solo altè ad sesquipedem pastinato, cribrata terra, ac stercoreata, distet alterum ab altero sesquipede. Transacta hyeme effert Martii initio, postea enim excaulescit, lignescitq; radix, aliis locis translatum degenerat, nil à vulgari apio nisi magna ac rotunda radice instar capitis distat.

De hipposelino, sive olusatro. C A P. XXXII.

EX apii genere hipposelinon est. Radix cruda, coctave vefcendo est. Columella eius condituram docet, Olusatrum quum legeris subsecato, exponito dum flaccescat: dein folia, & corticem omnem folliculorū detrahit. Caulis si fuerint pollice crassiores arundine secato, & in duas partes diuidito, sic & flores, & in vase condito, dein ius, quod est mistum duabus partibus aceti & vna muræ, infunditur, & sceniculi aridi spissamentum imponito, vt herbas deprimat. Idq; circa vernum æquinoctium antequam de folliculo exeat, vel prius quàm colicolum agat, radicem exerito Ianuario, vel Februario, & defricato, ne quid terreni habeat. in aceto & sale composito, post mensem corticem abiicito, & medullam concisam in fictilem coniecit, & adiecit ius ex sapia, vel defruti duabus partibus, & aceti vna. Sumito mentam, & vnam passam, & capam aridam exigua, eamq; cum torrido satre ex exiguo melle subterito. Quum vti voles, suo iure ponito, & oleum adiecit.

Nomen.

Theophrastus ἵπποσέλινον à magnitudine vocat: Græci enim magnis rebus ἵππο præponere solent, adeo vt nil aliud Latinis sit, nisi grande apium.

V
apium Theodo
equum significa
cis μελάν
vni, & πωσ
petroselinon vo
vocant: videtur q
tro virore nigrel
politani *alejano* v
cedonia.
10 Theophrastus
foliis proximum
do raphani agit,
uo ampliore.
rham esse affir
ctura fiat. Radix
bus respondent:
apio diximus. Co
dixeris. Lachrym
obrem quum qu
10 prouenire putat
& ad pellendos c
ba Theophrasti
mille eleoselino el
cum eius qui coll
radices habet liba
phrasto exepit:
scribens, Theo
stolones que mu
guia & robusta.
10 in luteum langu
tudo, simili bras
myrtha lata alter
det gulam transi
vri: æ angustis, s
transcribit, ita D
Smyrnum caul
quorum à sinu
quadam actimo
orbicularis, vt an
40 Radix quoq; odo
get, intrus pallidus

aprium. Theodorus vertendo Theophrasto equapium vertit, nam *ἵππος* etiam equum significat, sed aptius magnapium dixisset. Ex hoc Nicander in Theriacis *μεγάλον σέλινον* vocauit. Sed Dioscorides Theophrasti *ἵπποσέλινον* vocat *σμάρινον*, *ἢ πῶ σμάρινον* à myrrha, quam odore æquiparat, & ab olitoribus Ciliciæ petroselinon vocati, & Romæ *ἀλάτρυ* dici. Latini olus atrum, & olus pullum vocant: videturque atrioleis nomen iccirco sibi arrogasse, quod eius folia atro virore nigrescant. Plinius olusatrum, quod hipposelinon vocant. Neapolitani *alefano* vulgo ab Alexandria, corrupto nomine, vel *macedonio* à Macedonia.

10 10 Theophrastus ita suum hipposelinum describit. Hipposelinon palustri apio *Descriptio.* foliis proximum est. Sed hirsutum, caule grandi constat. radicem crassam, inodo raphani agit, sed atram. fructum quoque atrum producit, magnitudine etuo ampliore. Lachryma ex eo myrrhæ similis defluit, quidā in totum myrrham esse affirmant. Folium ei cacumine perpetuum viret, et si reliquorum iactura fiat. Radix dulcis carnosa, grataq; palato est, sed reliqua minime radicibus respondent: nam folia sicciora, acrioraq; sunt, cuius rationem in hortensi apio diximus. Cortex crassus, & extricabilis, vt raphanus, sed betæ proximum dixeris. Lachrymam in radice habet, quam myrrhæ similem esse cōstat, quamobrem quum quidam hinc nasci myrrham vidissent, hipposelinum apud se provenire putarunt. Vnde referunt ad vrinæ difficultates ex vino dulci albo, & ad pellendos calculos valere. Plinius hipposelinū describens suo more verba Theophrasti mutuatus, vertendo peruertendoq; inquit. Hipposelinum simile eleoselino est, myrrhæ naturæ est, è lachryma sui caudicis nascitur; succum eius qui colligunt, myrrha sporem habere dicunt. myrrha sata natum, radices habet libanotidis, nil à thure differentes. Quæ vltima verba à Theophrasto excepit: vt videbimus in eleoselino. Dioscorides suum smyrnion describens, Theophrasti hipposelinum manifestat. Hoc caulem habet apii, stolonesque multos, folia latiora, & ad terram infracta, quadantenus pingua & robusta, iucundi odoris, cum quadam acrimonia, medicatq;. Colore in luteum languescere, capitibus caulium orbiculatis, vt anethi, semine rotundo, simili brassicæ, nigro, gustu aspero, æmulante myrrham tam proxime, vt myrrha sata alterū quoq; nascatur. Radix quoq; odorata, mollis, succosa, mordet gulam transitu, cortex eius foris niger, intus viridis, & subalbidus. Medetur vrinæ angustis, semen renum & vesicæ vitis prodest. Plinius ita à Dioscoride transcribit, ita Dioscoridi smyrnion, & Theophrasti hipposelinum depingit. Smyrnium caulem habet apii, folia latiora, & maxime circa stolones multos, quorum à sinu exiliunt pingua, ad terram infracta, odore medicato, & cum quadam acrimonia iucundo, colore in luteum languescere, capitibus caulium orbiculatis, vt anethi semine rotundo, nigro, quod arefcit, incipiente æstate. Radix quoq; odorata, gustu acri mordet, succosa, mollis, cortex eius foris niger, intus pallidus, odor myrrhæ habet qualitatem, vnde & nomen. Palladius:

dat, olerū generis. Vt apium radix cruda, coctāve estur. Folia autem cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus præparantur. Cruda muria condiuntur.

In vmbrosis & palustribus nasci idemmet testatur.

Solum.

De oreoselino. CAP. XXXIII.

MEMINERVNT veteres Græci oreoselini, & Latini, sed quānam fuerit herba, verentur doctiores suam proferre sententiam.

Græci, vt Theophrastus, & Dioscorides *ὀρεοσέλινον* vocant, sed non hallucinari oportet oreoselinum esse petroselinum, quod in saxis nascatur: nam aliud est in Macedonia proveniens. Theodorus Gaza Theophrastum vertendo, conficto nomine montapium vertit. Palladius petroselinon vocat. Plinius Græcè oreoselinum.

Nomen.

Theophrastus oreoselinon maioribus differentiis distare dixit, folio namque cicuta constar, radice tenui, caule anethi, minutorique, datur in vino austero gratia menstruorum. Dioscorides verò. Caule est dodrante alto, ab radice tenui exeunte, per cuius ambitum rami & capitula cicute, sed multo tenuiora, semine cumini oblongo, acri & odorato, tenui. Semine, ac radice in vino potis menses trahit. Plinius: Oreoselinum cicuta foliis, radice tenui, semine anethi, minutiore tamen.

Descriptio.

20 Nascitur in petrosifis, & mōtibz ex Dioscoride. In locis asperis, ex Palladio.

De petroselino Macedonico. CAP. XXXV.

DIOSCORIDES etiam Macedonicum petroselinum commemorat. Apud nos quia cœptum est coli, summoq; studio illius culturæ indulgent, apponemus.

Πετροσέλινον Macedonicum Dioscorides vocat, quod Latine saxatile apium sonat, vel petrapium dici posset. Plinius à Dioscoride, Alio genere petroselinon quidam appellant in saxis natum.

Nomen.

Dioscorides cumini semine, odoratiore, sapore acri, aroma olente esse dicit. Quod apud nos habetur, perparum à domestico distare videtur, folia confimilia, aut potius pimpinellæ iam dictæ, crispatis oris, & argutioribus incisuris. Caule tenui, vmbellæ albicantes, semine tenui, pusillo, & evanido: nam satum non nascitur, ferunt è Macedonia accersitum semen.

Descriptio.

Plinius post petroselini mentionem, ait. Addidere quidam buselinon, differens breuitate caulis à satiuo, & radice colore rusto, eiusdem effectus.

Genera.

Nascitur in Macedonia præruptis crepidinibus, ex Dioscoride.

Loc.

De fœniculo. CAP. XXXVI.

POST APIA de fœniculo dicemus. Alexis in lebetes inter condimentarias herbas fœniculi meminit, ex Athenæo. Plinius: Fœniculum quum inaruit,

ad condimenta plurima. Condimentis que propè omnibus inferitur, oxyportis etiam aptissimè. Quin & panis crustis subditur. Etiam fœniculum serpentes nobilitauere, gustatu senectam exuendo, oculorumque aciem eius succo reficiendo. Vnde intellectum est, homini quoque caliginem eo præcipuè releuari. Anguis hyberno situ membrana corporis obducta, fœniculi succo impedimentum illud exuit, nitidusque vernat. Exuit autem à capite primum nec celerius quàm vno die, ac nocte replicans, vt extra fiat membrana, quod fuerat intus. Idem hyberna latebra visu obscurato, maratro herba se affricans, oculos vngit ac refouet. Eadem Nicander exordio theriacæ: Quo tempore relicta arefcentium squamarum senectute torpidius, ac segnius ingrediens, vernaque tempestate cauum suum fugiens, hebetibus oculis cernit. verum depastus fœniculi comosos ramos, celeriter visus aciem recuperat. Galenus, Fœniculi assiduus in obsoniis vsus apud nos: in hoc reponunt, nō secus ac piperitum, ac terebinthum condientes, vt in totum annum vsui sit, quemadmodum & capas, & rapas, & alia eiusmodi, quædam in solo aceto, alia in oxalme asseruantes. Veteres quum fœniculum legissent, sub tectum exponebant, dum flaccesceret, deinde folia, & corticem omnem detrahebant. Caules si fuissent pollice crassiores, arundine secabant, & in duas partes diuidebant, ipsosque flores, ne essent immodici, partiri & diduci oportebat, atque ita in vasa conditi, tū ius, quod erat mistum duabus partibus aceti & vna muriæ, infundebatur, paucas radices laseris adiciebant, & spissamento contegebant, vt ius superueniret. Hac ex Columellæ placitis. Platina tum semine, tum caule pro conditura obsoniorum, tum crudo, tum cocto vitur.

Nomen.

Græcis *μαράβρον* doctissimi quidam dictum volunt, quod emaridi, & arenis fœniculi ad condienda obsonia commodissimus sit vsus, & à Græcis Latini, quod sicut fœnum arefactum in hyemes, & marcidum reponatur, fœniculum dixerunt. Alii quod satum maximo cum fœnore semen reddat, dictum volunt. Itali *finocchio*.

Descriptio.

Theophrastus ita depingit. Suffrutex est è ferulaceo genere, & neruiculi. Folio thapsiæ simili, strictiori tamè, suaueolenti, dulci. Semine nudo. A quo Plinius. È ferulaceo genere fœniculum perquam simile thapsiæ, semine nudo. Dioscorides variis in capitibus suam descriptionem reposuit. Folia seseli Massiliensi similia habet. Semen ligustico simile. Folia dauco Cretico, sed maiori, & crassiori. Caule elaphobosci, dauco primo simili. Addimus nos. Satium hominis plerūq; proceritatem superat, caule geniculato, fungosa intus medulla, læui exterius cortice, & herbaceo, folio abrotini, sed longiori, mollioriq; iucundo odore. Umbella rotunda, ampla, lutea, in orbem radiatim circinata, in qua semen. Radice longa, candida, odorata.

Genera.

Sylvestre fœniculum Theophrastus & Dioscorides *ἡπρωμαράβρον* vocant, Gaza vertendo Theophrastum equifœniculum vocat. Nicander metri causa *ἡπρωμαράβρον* vocat, quasi equinum fœniculum dixeris. Galenus *ἀγρίον μαράβρον*,
 8ρον,

V
 400, id est sylvestre
 tem semen cach
 nere sylvestre, q
 ribus, gustu acci
 pulia cuique obi
 exili & angustio
 aliud genus hipp
 tiuū anethi folio
 Palladius loco
 nasci dixit in cal
 affurgit, in siccis
 pue in squalidis
 non perinde ful
 Palladius pri
 imbris ferim
 quantulum, qu
 qua satis fuerin
 scere sinunt, ind
 timurq; iis in ac
 denuò pastina
 secantur Marti
 riuntur, ac lara
 semen afferunt,
 à decimo die, ea
 secantur, & iteru
 do vsque ad sext
 Sylvestre Aug
 lanuario, Febr
 vbi vnum desit
 30 Si bubalo
 ficibus indunt
 dulciorem sua
 P O s t fœ
 test, figur
 tis nasci refer
 anethum in c
 tiq;os etiam
 ad somnum co
 40 Græcis *μαράβρον*

ἄσπov, id est sylvestre fœniculum. Dioscorides ita pingit: Magnum est, fert autem semen cachri simile, cuius radix iucundè olet. Plinius ab eo: Est in hoc genere sylvestre, quod alii hippomarathron, alii myrsineum vocant, foliis maioribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. In Apulia cuique obuium. Dioscorides aliud tradit hippomarathri genus, longo, exili & angusto folio, semine corianni, rotundo, acri, odorato. Plinius: Diocles & aliud genus hippomarathri tradit, longo & angusto folio, semine coriandri. Satiuū anethi folio, semine dulci. Sylvestre semine acri, hippomarathri feruido.

Palladius loco aprico, & modice saxoso nasci dicit. Plinius hippomarathron *Cal. sd.* nasci dicit in calidis, & saxosis. Sed satium pinguibus locis melius, & latius assurgit, in siccis ægrius. Sylvestre omne sustinet cœlum, & solum, & præcipuè in squalidis, & siccis, & arenosis. Respuir argillaceum. Satium hyemes non perinde sustinet, vt vulgarius & sylvestrius.

Palladius primo vere, vel Februario fœniculum serit. Nos primis autumnus imbris ferimus sulcis, à quinto decimo nascitur die: quum adoleuerit aliquantulum, quod in sulcis abundat, alio transplantamus, relinquendo in sulcis quæ satis fuerint, hæc citius spicam, illa ferius proferunt. Viginti diebus adlescere sinunt, inde fodiuntur, ac latamine saturantur. Nouembri secantur, vt *Satio.* timurq; iis in acetatibus & ferculis, à sectione quinto decimo die pullulant, tunc denuò passinantur, mox aque humo cooperiuntur, ac latamine, sic secundo secantur Martio, & à duodecimo die repullulant, rursusq; fodiuntur, cooperiuntur, ac latamine teguntur. Aprili umbellas proferunt, sic Maio, & Iunio semen afferunt, si quadrima fuerint. Sin minus, tertio secantur, & repullulant à decimo die, eandem operam impendendo. Septembri denuò profundibus secantur, & iterum umbellam proferunt. Sic anno bis floreunt, & hoc modo vsque ad sextum annum durat. Sed olitores tertio anno radicitus euellunt. Sylvestre Augusto serimus, nullam denique curam adhibendo secamus illud Ianuario, Februario, & Martio: sed Augusto, & Septembri fert umbellas, & vbi vnum desinit, alterum incipit, sic omni tempore hæc flores habemus.

Am. Si bubulo latamine operiuntur, dulciora ferunt semina. Alii semen aridis ficibus indunt, feruntque, vel si eius semina mulso, vel lacte macerata sint, dulciorem suauioremq; proferre fructum referunt.

De anetho. CAP. XXXI.

POST fœniculum de anetho scribemus, cui & cognatum genus videri potest, figura & dote, Athenæus etiā Alexis autoritate in lebetes condimentis nasci refert. Plinius etiam culinis nasci. Ideo & nos in nostro hortoseremus anethum in condimentario vsu magnopere quæstum. Galenus in conuiuiis antiquos etiam vsos fuisse coronis ex eo concinnatis, humidis adhuc, & roscidis, ad somnum conciliandum refert.

Am. Græcis *ἄννητον* quasi *ἀνὴν* dicunt, quod cibi appetentiam excitet, & *ἀνθη* Nomina.

coitus est veneris, quem eius esus lacessit, at plurimus vsus genituram hebetat. Latinis anethum. Italis aneto.

Descriptio. Theophrastus. Lignosa radice nascitur, non adeo prolixa, neque multis subnixa fibris, multicaule, ramosum, quapropter pars superior, non pro ratione inferioris extrat, semine nudo, succo suaueolenti. Semen ferula simile, sed minus, & modo ferula laterales caules flores & fructus ferunt. Plinius ab eo: Anethum semine nudo. Dioscorides, etsi ut omnibus noti suam figuram neglexerit, quum alias plantas illi assimilauerit, exactam eius delineationem apposuit. Anethum cauliculum habet ligustici, capitulum seseli Ethiopico simile, & umbellam seseli Marsiliensi, aut dauco tertio, & semen, aut titbymalo helioscopio, vel orbiculata caulium capita, ut smyrnium, umbellam elaphobosci. Semen & florem bunii. Nos verò: Tantopere fœniculo simile, ut ipsum olitorem, & pharmacopœum interdum deludat, nisi odor consulatur. Caule sesquicubitali assurgit, exilitate folii in staminis penè modum extenuata, flosculo luteo, astate florens, sapore ingrato, colore obscurius virente.

Genera. Theophrasto vnistirps, cui generum diuersitas non est. Plinius ab eo, Genere singulari.

Cal. sol. Palladius omnem cœli statum pati dixit, sed tepidiori latatur, sic omne solum.

Satio. Theophrastus è prima satione anethum esse dixit, post brumam mense Maio. Quarto profilit à satu die. Plinius ab eo: Quarto die à satu profilit. Columella: Seri potest vere, & autumnò. Circa Calendas Octobris obrui potest non frigidissimo loco: nam si regio sæuas habet hyemes, post idus Februarias semine differendum est, suaq; de sede partiendum. Palladius, Locis temperatis & calidis autumnò feritur. Locis frigidis Februario. Rigitur, si se imber abstineat, seratur rarius. Alii semen eius non obruunt, opinantes, quod à nulla aue tangatur. Martio etiam feritur. Plinius: Alio comitatu à quinoctio autumnò feritur anethum.

De aniso. C A P. XXXVIII.

ANISVM anetho simile esse vberimapatet authorum lectione. Plinius 3^o culinis anisum nasci scripsit, crudum, decoctum, virens, aridum, panis etiam crustis inferioribus subditum. Ægyptium ligustici vicem prabet in condimentis. Omnibus tandem quæ cõdiuntur, quæq; intringuntur desideratum, quin ipsum odoris halitum iucundiores facit, foetoremq; tollit manducatum matutinis cum smyrneo, & melle exiguo, mox vino colluto, insomnia leuat suspensum in puluino, ut dormientes olfaciant, appetentiam ciborum præstat, quando id quoque inter artificia delitiæ fecere, ex quo labor desit cibos poscere. A Pythagora inter pauca laudatum. Corripi etiam comitali morbo negat in manu tenentes. Ideo quamplurimum domi ferendum. Platina in tertiam menta commodius edi memorat.

Theo.

Theophrastus
nicum, & hoc
borum præstat,
ve. Vnde & Lati
num vocat. Neap

Ab antiquis p
scribemus. Caule
Folium vbi prim
florem candidum

odorata est. Iuni

Dioscorides la

datissimum Cre

re videtur, & qu

Palladius locu

Apuli nigrum, te

Palladius Feb

Martio locis lati

tur & stercore. l

Solum nouale fa

possideat. Terra

tur. Tertio Ianua

Agriugerum m

lat, quod sedulo

siam germinare

tur terra, & sine il

deleat: nam adeo

saram imber acco

debile, & imbe

Vbi fuerit enat

bus secare: nam

io, & Iunio plu

est. Quum ias

los ligant, ibiqu

& excutitur len

combuitur.

S B I V N G

henzus in

quens, condim

bibentium, aut

Theophrastus & Nicander in Theriacis *ἀνίσον* vocant. Dioscorides *ἀνίσον*, *anison* nomen
 nicetum, & hoc vocatur anethi, vt diximus, modo, quoniam appetentiam ci-
 borum præstat, vel *ἀνίσον*, quia laxat flatuosas tensiones, externas, internas-
 ve. Vnde & Latinis anisum, & anesum dicitur. Auicenna fœniculum roma-
 num vocat. Neapolitanis Græco, & Latino nomine cognitum, *aniso*.

Ab antiquis prætermissa delineatio ob vulgarem eius notitiam. Nos ita de-
 scribemus. Caulem fert striatum, rotundum, multisque ramulis brachiatum. *Descriptio.*
 Folium vbi primum nascitur, rotundum, sed deinceps apii modo dissectum,
 florem candidum, muscarium fœniculi, totaque herba aut aliter, quàm semen
 odorata est. Iunio ac Iulio mensibus floret, & semine prægnans est.

Dioscorides laudat primò Creticum, mox Ægyptium. A quo Plinius: Lau-
 datissimum Creticum, proximum Ægyptium. Ob id calidum cœlum opta-
 re videtur, & quippe Apulia anisum vberimè producit, & optimum. *Cœlum.*

Palladius locum bene subactum querere scripsit, & cui latamen admisceas. *Solum.*
 Apuli nigrum, tenerum, & optimè subactum quatere dicunt.

Palladius Februario feri, & quod satum est, herbis purgari assidue docet. *Satio.*

Martio locis lætioribus melius prouenit, itemque cæteris, si humore iue-
 tur & stercore. In Apulia, vbi feracissimè prouenit, ita satum obseruauimus.

Solum nouale faciunt, & optimè subigunt, quum radices paruas, & delicatas

possideat. Terra primùm Decembris sine scinditur, post decimum diem iterat-

tur. Tertio Ianuarii sine interfecatur. Quarto Februarii initio aratur, & feritur.

Agri iugerum modii partem octauam seminis exposcit. A vigesimo die pullu-

lat, quod sedulo animaduertendum erit, aliqua eorū semina è terra eruendo,

si iam get minare inceperit, id est si iam dum radículas egerit, tunc iterum ara-

tur terra, & sine illius læsione, vt omnes penitus enascentes herbas euellat, &

deleat: nam adeò tenella stirps est, vt minima quæque herba eam necet. Si post

satam imber accesserit, destruitur: nam humi superficiem incrustat: quumque

debile, & imbecille eius germen crustam penetrare nequeat, inarescit illicò.

Vbi fuerit enatum post mensem, oportet herbas omnes denuo acutis falcibus

secare: nam si eas eruis radicitus, possunt & illius radices conuelli. Si Ma-

io, & Iunio pluit, & inde calor insequetur, eum necat: nam infirmissimum

est. Quum iam perfectè semen maturuerit, colligunt, in fasces & manipu-

los ligant, ibique relinquunt. Vbi optimè siccatum fuerit, defertur in aream,

& excutitur semen: nam si in cumulos accommodabis, facillimè putrescit, &

combuitur.

De cumino. CAP. XXXIX.

SVBIUNGEMVS aniso cuminum, quum vtrique par satio conueniat. A-
 thenrus inter condimentarias herbas connumerat. Plinius de cumino lo-
 quens, condimètorum omnium fastidijs cuminum amicissimū (Dioscorides:
 bibentium, aut perunctorum colorem mutat in pallorem) omneque pallorē bi-

bentibus gignit. Ita certe ferunt Portii Latronis clari inter magistros dicendū adfectatores similitudinem coloris studiis contracti imitatos, & paulo antē Iulium Vindicem adfertorem illum à Nerone libertatis, captatione testamenti sic lenocinatum. Platina ait. Hoc hypocrita vtuntur, eius enim nimius vsus pallorem inducit.

Nomen. Græci *κύνιον* vocant. Sunt qui putent à *κύω* verbo manasse, quasi pragnans, tanta est enim feracitatis inter oleracea, vt etiam maledictis fatum vberimè luxuriet. Latini cuminum. Palladius ciminum. Italicimino.

Genera. Theophrastus pluribus constare generibus dixit. Dioscorides & satium & sylvestre descripsit. Satium origatum, sed multo magis Æthiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Ægyptium, reliqua sequuntur, sylvestre vnum & alterum satiuo non dissimile. Auicenna aliud Carmen nigri coloris, aliud Persicum quod est fortius Scemio, aliud Scemium citrini coloris. Vrbani inuenitur omnibus locis, & ex omnibus aliud sylvestre, aliud domesticum.

Descriptio. Theophrastus. Radice penitus exigua. Semen oblongum, canaliculatum, nudum adhaerens, vnde facile exiceatur: nā vbi planè accreuerit, defluit, & lubricū procidit. Omniū fecundissimū est olerum, cuius rationē assignat libro de *causis*. Ratio, quod quæ exigua sunt, facilius suum finē consequuntur. quod etiā facile fit, sepius fieri potest, facilitas enim propiores habet fines principiis suis: & quæ inbecillia sunt, paratiora, & obtemperantia ad opus sunt, & ab externis facilius patiuntur, scilicet aëre ambiente: vnde & tot auxiliis adiuta, aeris, & seminis exiguitate, nuditateq; multū operis expediunt. Præterea vnico caule coherent, robusto & non lignoso, ab vna radice in plures ramos diffuso, nec frondibus offuso, ne quod fructui deberetur, multum opera & materię auferat. Accedit his radicum bona habitudo, ne sui succi cupida, auara, & tenax sit, sed succum seminibus satis large dispensando ministrat, quod in bulbaceis, & ferulaceis non euenit. Plinius ab eo. Nascitur in summa tellure vix harena, & in sublimè tendens. Est autem vnicaule, radice bulbo simili. Semen angustum, & canaliculatum. Dioscorides ait sylvestre cum in frutice paruo esse, dodran-
30
rasi caule, ac tenui, quarernis, aut quinis foliis, renuibis, veluti serratis, & gingidii diuisura. In eacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acetosum, gustu satiuo acriore. Aliud sylvestre satiuo non dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen melanthio simile. Nascuntur apud nos omnia genera.

Celura. Dioscorides in Æthiopia, Ægypto, Galatia, Asia, Cilicia, Terentia, & plerique aliis tractibus nasci scripsit. Sylvestre in collibus. Plinius calidis maximè locis. Auicenna in Carmania, Persia, Scemia, & apud Nabatheos.

Scilum. Plinius non nisi solo gracili nasci voluit. Palladius locis latioribus melius provenire, itemq; ceteris, si humore iuuentur, & stercore, loco bene subacto, 40
& cui latamen admisceas.

Theo-

Theophrastus
re serendo opor
eo: Cuminum q
tur, dici possunt
trius Phalereus
tionibus, conui
bruario etiam ser
dio vere serendu

Theophrastus
10
10
Eam perit. Plin
re purgetur. Alia
scitur ab radice c
dorū latius in leg

SERITVR in
Sioqui in mon
dem eloiuucunda
Nec solum apibu
modo saturiam
20
30
in condimentari
similis effectus, &
xit, ac tertii meriti
batur, nunc his de
Theophrastus
thymbram thym
thyma vocauerit,
re iam vocant. O

Sunt
Sime

30
Sed an thymb
dant male distin
vt omne nubilum
mellam cunila ge
lam thymbram v
comprobabimus
do, ait regionem
aut origani, aut
intelligens pro th
dictione illa, vel, q
ex eodem Colum

Theophrastus: Peculiare de cumino dicunt, imprecari nanq; & maledice-
re serendo oportere affirmant, quo latius, copiosiusq; proueniat. Plinius ab
eo: Cuminum qui serunt, precatur ne exeat: qua ratione & qui male precan-
tur, dici possunt cuminum serere. Eo verò vsus prouerbio Sophron, & Deme-
trius Phalereus scribit: *κύννον ἐκείρειν*. Sed in Sympotiacis Plutarchus impreca-
tionibus, conuitiisq; feri cuminum approbat. Palladius benè feri scribit. Fe-
bruario etiam feritur, & quod satum est herbis purgatur assidue. Plinius me-
dio vere serendum esse dicit.

Satio.

Theophrastus. Peculiares omnino morbi scabies, & falsilago, quibus affe-
ctum perit. Plinius non idem subtrahit: Et necatur cyminū ab imo dorso nisi
repurgetur. Alias priuatim cumini morbus scabies. Theophrastus: Quod na-
scitur ab radice cumino hamodorum vocatur. Sed quæ herba fuerit hamo-
dorū latius in segete suo capite differemus, quare illuc lectorem remittimus.

Morbi.

De satureia. CAP. XL.

SERITVR in hortis satureia, vt cibis gratior sit ad obsonia condienda: a-
lioqui in montibus medicinæ vtilior nascitur. Columella satureiam viri-
dem esui iucundam, nec aridam inutilem ad pulmentaria condienda dixit.
Nec solum apibus gratissimam, sed etiam medicamentosam, & quo ferula, eo
modo satureiam cunilam condiri docet. A quo Plinius: Est & satureia dicta
in condimentario genere, origano æmula, nusquam vtrumq; additur, quippe
similis effectus, & apum gratia feritur. Palladius apum gratia feri oportere di-
xit, ac tertii meriti mella conficere. Vnde si prius asperis, saxosisq; locis nasce-
batur, nunc his dotibus nostro hoc horto conferenda venit.

Theophrasto ὁ θυμβρα, & ὁ θυμβρον dicitur. Dioscoridi θυμβρα. Galenus
thymbram thymorum nomine fuisse complexam videtur, quum pluraliter
thyma vocauerit, nec alibi inter simplicia thymbræ meminerit. Latini satu-
reiam vocant. Ouidius,

Nomen.

Sunt qui precipiant herbas satureia necentes

Sumere.

Sed an thymbra sit satureia apud Latinos, quum pleriq; doctiores confun-
dant malè distincta veterum scriptorum thymbræ, & satureiæ nomina: nos
vt omne nubilum discutiamus, latius euagari cogemur. Duo sunt apud Colu-
mellam cunilæ genera, transmarina vna, nostras altera: transmarinam cuni-
lam thymbram vocat, nostratem verò satureiam dicit, vt suis autoritatibus
comprobabimus. Librini capite quarto, pabulationes apibus destinan-
do, ait regionem fecundam oportere esse exigui fruticis, & maxime thymi,
aut origani, aut thymbræ, vel nostratis cunilæ, quam satureiam rustici vocant,
intelligens pro thymbra transmarina cunilam, & à nostrate cunila distinguens
dictione illa, vel, quæ est distinctiua coniunctio. Hanc nostram opinionem
ex eodem Columella demonstrabimus, quippe libro vndecimo, capite tercio

ait: Thymum, & transmarina cunila, & serpillum, sicut priore libro iam retuli, magis aluearia curantibus, quàm olitoribus studiosè conferuntur. Præterea loco prius citato ex lib. 9. cap. 4. paulò inferius, vbi frutices apibus desinabat, reddens notas mellis ait: Thymo deinde proxima thymbra, serpillumq; & origanū. Tertiæ notæ, sed adhuc generosæ, marinus ros, & nostras cunila, quam dixi satireiam. Demonstrans maximè distare pro mellis notis thymbram, siue transmarinam cunilam, à nostrate cunila, siue satireia. In hortulo (quod clariùs considerari non potest) eam manifestissimè distinxit:

Et satireia thymi referens, thymbræq; saporem.

In condituris etiam herbarum, vt vtræq; distingueret cunilas, vocat cunilam satireiā primò, & paulò post. Hac conditura potest commodè satireia viridis, & æquè viridis cunila seruari: vbi pro viridi cunila transmarinā intelligit thymbrā. Hanc etiam distinctionē Palladius annotauit: Quippe à Columella transcribēs mellis notas, secundi meriti, ait, thymbra, tertii meriti satireia: & in Februario mense tum satireie, tū cunilæ separatim sationes descripsit. Distinxit etiam Plinius ab vtroq; transcribens. Thymbram verò, quæ sit cunila: hæc apud nos habet vocabulum & aliud, satireia dicta in condimentario genere. Q. Serenus satireiam thymbræ speciem dicit, & thymbram non absolutè sed cephalotem thymbram dici. Thymbra natalis soli retinet appellationem: est enim (si Stephano credimus) Thymbra oppidum, in quo templum Apollinis 20 sacrum, à quo Thymbræi retinet cognomē. Ager enim erat antiquo Illo proximis, & Thymbræus fluuius, qui per eum in Scamandrum fluebat, ab Apollinis Thymbræi templo quinquaginta stadiis distabat, qui ager thymbra scatebat, si Seruio credimus. Satireia nomē à Satyris traxisse memoratur, quum satireia vsque marcescentes coitus stimulet. Vnde Martialis,

Improba nec prosunt, nec satireia tibi.

Itali santoreggia. Neapolitani satireia.

Genera.

Theophrastus satireiam in vrbānam & syluestrem discrevit, syluestre vicinam vrbāne, præterquam quod foliis minoribus, caulibusq; scabriusculis constat, & succo potissimum acriori, vehementiori q; Dioscorides item sylvestris & satiuæ meminit. Satiua sylvestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam in cibos recepta est. A quo Paulus: Sylvestris thymo similis, satiuā viribus signauior, esuiq; cibario gravior. Plinius in satiuam, & syluestrem discrevit. Quæ sunt & sylvestria, eadem in satiuis ficiora intelliguntur, & acutiora: sunt autem acres cunilæ.

Descriptio.

Acri succo Theophrasto describitur. Semine fecundo, eoq; ad perdurandum firmo. Ab eo Plinius. Acri succo. Semine ad perdurandū firmo. Describitur nos. Oritur eleganti aspectu, virgultis exilibus, sarmentosis, lignosis, foliolis crebris, & angustis, spicam in summo gerentibus, copiosis flosculis intertextam, & obsoleta purpura albicantibus, gustu acri, & odore. Sylvestris aspectu sculcula, nigricantibus foliis, floribus in purpura dilutis, primò herbaceis.

Locum

Locum satireia nascitur, illic nasci, du venire non pote pote maritimis r

Montes exop

lioremq; compe

sicca, acris, & am

fœminatq; C

neq; stercoratum

10 regionibus nasci

tum exoptat.

Satureia latet

tur. Ex veteri se

Difficile nangu

foritan magis re

naturum facile, b

tur. Columella,

pina intermiscen

& plantis circa a

20 sius curanda sit. l

Februario seritu

dis, Martio seratu

seritur. Plinius:

Tyro in libro Cep

Dioscorides di

le capitula habet

lus quod supra th

git in Gargano m

similabatur, qui

30 complicare, sap

P O s t satire

nascitur etia

lentis apta. Clar

bani cedro vsq

Gris cis dactum

sum, vel d's m d n

& hyssopum. Ita

Duo Dioscori

Dioscorides hy

la non trochoides

Locum satireia querit, quo flatus à mari perueniant: nam si eo destitua- *Colum.*
tur, illic nasci, durareq; posse negat Theophrastus, qua de causa in Arcadia pro-
uenire non potest. Columella: Transmarina cunila apricum locum poscit, ut
pote maritimis regionibus. Palladius loco aprico, vel melius mari proximo.

Montes exoptare satireiam prodidit Theophrastus, ibiq; gratâ odore mol- *Solum.*
lioremq; competiri. Et libro de causis, cultu deteriolem multo reddi, ut quæ
sicca, acris, & amara sit, vsuq; medicaminis præstet: hortis verò hebetatur, ef-
fœminaturq;. Columella suam transmarinam cunilam locum, neq; pinguem,
neq; stercoreatum querere scribit, ut quæ macerrimo solo, maritimisq; plerūq;
regionibus nascatur. Ab eo Palladius, Locum neq; pinguem, neq; stercorea-
tum exoptat.

Satureia satio est ex æstiu semente ait. Theophrastus. Vnde Martio feri- *Satio.*
tur. Ex veteri semine celerius, ad exeundum plusquam triginta dies dantur.
Difficile nanque germinat, humorem enim habeat aptum, & non minus, sed
forsitan magis temperiem ad agendum, ac patiendum oportet, quod germi-
naturum facile, beneq; sit. Plinius ab eo: Cunila quidem post xxx dies nasci-
tur. Columella, Calēdis Februarii satireia semen spargere conuenit, cum ce-
pina intermiscendum, ut eam quoq; habeamus. Transmarina cunila & semine
& plantis circa æquinoctium vernum feritur, cæterum viuacior est, ut impen-
sus curanda sit. Palladius: Cum cepulla mista feminatur Februario. Cunila ex
Februario feritur, & colitur eo more, quo allium vel cepulla. Sed locis frigi-
dis, Martio feratur satireia, & cunila. Nouembri etiam, & Decembri, cunila
feritur. Plinius: Ferro quoq; non expedit tangi cunilam, auctor est Sabinus
Tyro in libro Cepuricon, quem Mæcenati dicauit.

Dioscorides dicit epithymum esse florem è thymo duriore, satireia simi- *Epithym.*
le, capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Pau-
lus quod supra thymbram nascitur epithymbram vocat. Nobis videre conti-
git in Gargano monte Apuliæ supra thymum durius, sed potius thymbræ af-
similabatur, quidpiam citrorum, modo comarum ramos, crebro volumine
complicare, sæpenumero purpurascens.

De hyssopo. CAP. XLI.

POST satireiam de hyssopo dicemus, ei valde affimili, hortensi herba, quæ
nascitur etiam culinis, condimentario vsu nota, est enim aliquibus escu-
lentis apta. Clara Salomonis sapientissimi nomine, qui cuncta disseruit à Li-
bani cedro vsq; ad hyssopum de pariete enascentem.

Græcis ὕσσωπος, & ὕσσωπον, quasi ὕσσωπον ὁππότεν ὄψα, impluens oculos, aut vi- *Nomen.*
sum, vel ἡς πνέοντι, quia raucam vocem pulmonemq; iuuat. Latinis hyssopus,
& hyssopum. Itali *hyssopo.*

Duo Dioscorides hyssopi tradit genera, montanum & hortense. *Genera.*

Dioscorides hyssopo non dissimile origanum heracleoricū dicit, sed umbel- *Descriptio.*
lā non trochoides, id est circinatam turbinatāve, qualis hyssopo, quin potius

umbellis veluti diuisum, aut disparatum, & in extremis virgis semen nondensum: ac paulo post onitidem origanum describens ait. Candidiorem folio, & hyssopo similiorem, quàm heracleotico. Coma item corymborum specie chrysocomæ simili. Ex his patet vulgare hyssopum non esse legitimum Dioscoridis, sed Hebræorum. Plinius ei improprie baccas tribuit. Verùm apud nos nascentem ita describimus. Frutex à radice prodeuntibus pluribus furculis lignosis, sesquipedalibus, foliis oblongis, circumquaque caulem per intervalla vestientibus, duris, odoratis, umbellam fert circinatam, turbinatamq;,, densam & congestam ex multis floribus purpureis, quibus maturescenibus semina frequentiglomeratione coniunguntur in corymbi æmulationem: initio ris saporis, & acrimoniæ, quàm Hebræorum.

Celum. Hippocrati præfertur Cilicinum, sed è Tauro monte, dein Pamphilium, & Smyrneum. Archigeni Creticum commendatur ex Galeno. Dioscoridi Cilicum, ex his videtur calidum locum desiderare.

Solum. Solum neq; pingue, neque stercoreatum desiderat. Visitur enim in cauib; & maceris nati.

Satio. Seritur semine, & plantis circa verum æquinoctium, quæ ubi comprehenderunt, viuaciores, quàm vt sequentem hyemem reformident.

De origano. CAP. XLII.

DICEMVS de origano, quum & sapore etiam dictam cunilam imitetur auctore Plinio. Alexis in excubiis, Athenæo auctore, inter condimentarias herbas connumeravit. Idemq; ab Antiphane. A Theophrasto inter olera numeratur. A Plinio inter coronarios frutices. Columella gratissimum apibus dicit, reddereq; ue saporis præcipui mella post thymum. Palladius item, atq; secundi meriti mella conficere. Pernicialia, inquit Plinius, brassicæ & vitis odia, ipsumq; olus, quo vitis fugatur, aduersum cyclamino & origano perarefcit. Origanum ciconiam depalsi, & ea contra venenosa animalia pugnatutam muniti ait. Cassianus Græcus, ex delectis Græcorum placitis scribit, Testudo si à serpentum esu ægrotat, origanum superingressa, sana redditur. Aristophanes in ranis, ὁ ὀρίανον βλέπειν, pro torvis oculis intueri, sumptum à planta eiusdem nominis, quæ intuentibus torua & inamabilis videtur. Quarrit Aristoteles in Problematis quanam causa sit, quod organus musto iniecta, vinum dulce efficiat. Duas enim heminas iniectisse in amphoram satis sit. An quod tollit, quantum est in musto, aquabundum, & sæculentum, sua siccitate in se ipsa recipiens, quibus scilicet saporem, confici austerum censemus? Argumento quod vina si quid aquæ habent sibi illatum, minus mollia redduntur, atq; si diutius stare in face sinantur, itidem fiet, & quum vinum dulce molimur, vnas multum temporis soli exponimus, vt sol quantum sit dilutum auferat, & reliquum decoquat, hoc autem idem facere vel origanus potest, quippe quæ sit & sicca, & calida.

Theo-

Theophrasto
id est, à m
deat, editisq; nat
staturab; vnde
Theodorus Grac
algeo, vnde p
minime refriger
riligere vlt
Plato acutissimu
vis sunt, Athenæ
lumella & Pallad
ganum Dioscori
minit, inter quon

Et quæ

Diocles etiam
aco Conilon que
cunila. Alterum
sequita ætas ab

Theophrastu
lum semen, can
venise nominauit
caulibusq; scabri
condatur. Diosco
stre, & tragorig
sticulis, nigri &
alterius enim nu
Theophrastot
plura habet gen
iam in tria gene

Sua origan
tali vires coma
des Heracleoti
specie orbiculat
denso. Omnis
rymbos habet
pillo, aut origa
inuenitur, & l
tenuibus foliis
minibus cadon
goriganum sim

Theophrasto *ὀρίανον*, & *ὀρίανος*, appellationemq; apud Græcos inuenit *Notum.*
ὄρος, id est, à monte, & *ῥανος*, quod gaudium significat, quod montosis gau-
 deat, editisq; natalibus. Herodianus quod visum exacuat, nomen duxisse te-
 statur ab *ὄρει* videre, & *ῥανος* clarifico, quod tradant scriptores visum illustrare.
 Theodorus Grammaticus nomen ex aduerso datum putauit ab *ῥιζῶ*, quod est
 algeo, vnde *ῥιζανον*, & adscita o principe litera *ὀρίανον* confectum nomen, quod
 minimè refrigeret, quum calida dote præditum sit. Alexandrides origanus vi-
 rili genere vsus est, Aristophanes muliebri, quem omnes Attici sequuntur, &
 Plato acutissimum origanum dixit. Epicharmus, & Amypsias neutro genere
 10 vsi sunt, Athenæo autore. Ita & Latini promiscuo genere vsurpant. Co-
 lumella & Palladius & Plinius origanum dixere. Alii origanus. Sylvestre ori-
 ganum Dioscorides panacem Heracleum, & cunilam à quibusdam vocari me-
 minit, inter quos Nicander Colophonius,

— *Panaceamq; cunilam,*

Et quam iam Heraclion origanon inde vocarunt.

Diocles etiam cunilam, vt vetustissimus fatetur interpret. Petricus in Ophi-
 aco Conilon quendam hominem herbam inuenisse tradidit, inde nomen ei
 cunilæ. Alterum genus onopetalium vocat, quod asinis pabulo gratum sit:
 sequuta ætas ab eo onitum appellauit. Itali vocant *origano*.

20 Theophrastus duo eius constituit genera, nigrum & candidum, priori nul-
 lum semen, candido perquam minutum. Genus sylvestre esse indicauit & ar-
 uense nominauit, aspectu vicinum vrbani, præterquã quod foliis minoribus,
 canibusq; scabrioribus constet, & succo potissimum acriori vehementiori-
 30 condatur. Dioscorides quatuor eius genera dicit: Heracleoticum, onitis, sylue-
 stre, & tragoriganum. Plinius quum superiori capite duo cneori genera con-
 stituisset, nigri & candidi, subdidit totidem origano in coronamentis species,
 alterius enim nullum semen; id autẽ cui odor est, Creticum vocatur. Quod ex
 Theophrasto transtulit, hoc autem ex Dioscoride: Origanum in medicina
 plura habet genera, onitin, prasion, tragoriganum, heracleoticum, quod et-
 iam in tria genera subdiuidit, latifolium, tenuifolium, & medium.

30 Suam origanum describens Theophrastus, hæc habet. Suffrutex est immor-
 tali vitens coma, & si reliqua decidant. Fœcundũ semine, acrisucco. Dioscori-
 des Heracleoticũ folia habet hyssopo non dissimilia. Umbella, quẽ nõ in rotæ
 specie orbiculata, sed veluti multifida, semine in multis virgis haudquaquam
 denso. Onitis candidiori folio, hyssopo similior, semen veluti coniunctos co-
 40 rymbos habet, vis inefficacior priori. Tragoriganũ tenuis frutex, sylvestri ser-
 pillo, aut origano, similis folio, & ramulis, quibusdã in locis lætius, virentiusq;
 inuenitur, & leuioribus foliis satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac
 tenuibus foliis, quod prasum vocauere. Plinius à Theophrasto: Folia à cacu-
 minibus cadunt. A Dioscoride: Onitin appellant non dissimile hyssopo: tra-
 goriganum simile est serpillo sylvestri. Heraclium quoq; tria genera habet,

nigrius, latioribus foliis, glutinosum. Alterū exilioribus mollibusq; sampſu-
cho non diffimile, quod aliqui prasion vocauerunt. Tertium inter hec medium.

Celium.

Non erumpit, Theophrastus ait, quò flatus à mari non accedit, ideo mini-
mè fruticat in Arcadia. Plato acutissimū ex Arcadia origanum dixit, ex Arhe-
nēo. Antiphanes origanum Tenedi laudauit, ex eodem. Dioscorides opti-
mū esse Cilicum, Cretense, Smyrneum, & in Chio, Chooq; proueniens. Pli-
nius optimum Creticum, proximum Smyrneum, dein Heracleoticum.

Solum.

Palladius loca aspera, & saxosa quarere dixit. Nos semper gracili solo vidi-
mus.

Satio.

Theophrastus origanum semine feri dixit, sed germinatu contumax: à satū
enim non ante trigelimum diem emicat. E veteri semine celerius exit. Defi-
xus etiam humi furculus comprehendit, transfertur quum ad vnum pal-
mum, vel plus altitudinis venerit, dimidio abscisso. Difficile germinat: hu-
morem enim habet aptum, & non minus, sed forsitan magis temperiem ad
agendum, ac patiendum habere oportet, quod germinaturum facile, beneq;
sit. Ab eo Plinius: Nascitur satum post trigelimum diem, è veteri semine ce-
lerius prouenit. Surculo etiam seritur: præcidunt enim & hoc, quum ad pal-
mum peruenerit altitudinis. Palladius: Seritur ante æquinoctium autumna-
le, rigari & stercoreari, donec coalescat, oportet. Mense Martio transferri po-
test. Octobri etiam seritur. Tradunt olitores nostri neglectam sampſuchum
in origanum degenerare, frutice serpilli humi reptante, foliis sampſuchi, flo-
re purpureo in umbella cineritia.

De ocimo. CAP. XLIII.

CHRYSIPPVS ocimum grauitè increpuit, vt Plinius est author. Capra
id aspernari, hominibus quoq; fugiendum censet. Adiciunt quidam tri-
tum si operiatur lapide, scorpionem gignere: commanducatum & in sole po-
situm vermes afferre. Alii verò, si eo die feriatur quispiam à scorpione, quo e-
derit ocimum, sanari non posse. Quin immo tradunt aliqui manipulo ocimi,
cum cancris decem marinis, vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones
à proximo omnes. Florentinus Græcus, Argumentum malignitatis eius esse
capram, eius noxâ satis testari, quod quum cæteris omnibus pabulis auide ve-
scatur, hoc vno cognoscitur abstinere. Mansum autem, & in sole expositum,
scorpiones gignere, tantamq; esse cum eo scæminatum discordiam, vt si pultario
subiectum sit integrum cum radice ocimum, nec mulier id sciat, futurum, vt
cibo manus nō admoliarur, priusquam subductum fuerit. Dioscorides ab ali-
quibus scribi ait, ocimum cōmanducatum, & in sole positū, vermiculos creare;
atq; Afros adicere, si feriatur à scorpione qui ocimum ederit, nullo conficta-
ri dolore. Galenus commentum esse ait, si fictili nouo tritum operiatur, breui
præsertim in solatu, scorpionem gignere: sed hoc tam abesse à vero, vt nil tam
sit repugnet. Sed quod Græci dicunt, nigrum habere naturali proprietate cum
fœminis.

fœminis contro
herbarum nulla
illis colatur, qua
rum hortulis, ta
minore admittat
omnes moueat,
tissimum dicit. I
mentis, viridi &
Nollem ancep

10 mumenim duo
est, & pabulum,
cè, Varro tam oc
ctum Græco voc
à celeritate prou
mat, quod omni
dieq; a quo satur
bendum censeant
flagro, hæc enim
plurimi sequerent
lamq; exaratic
consonantē scrib
Helschinus à rece
apud Italos hodie
nibus gestari dign
Columella ozimu
Hæc habet The
mo, quæ descend
omnium radiceu
surgit, folio cor
10 mō parte inferi
quemadmodum
bus alia. Semine
perdudandum in
dix, floret partic
men cortice obde
meq; ocimum.
dimus nos: Ped
folio mercurial
verticillatim cau
40 & Iulio floret, d
Eti ex corrup

ſceminis controuerſiam, res prorsus digna riſu eſt, quum naturali proprietate herbarum nulla ſceminis magis placeat, quum res non ſit, quæ tantopere ab illis colatur, quàm ocimum, nec qua ſigulinis vaſculis, & penſilibus fenestra- rum hortulis, tanto amore oblectentur. Narrat Plutarchus de eo rem non minore admiratione dignam, quod ſuccinum leuiſſima quæq; & quiſquilias omnes moueat, & alliciat, ſolos ocimi ſurculos à ſe abiiciat. Varro apibus gra- tiſſimum dicit. Inter olera horrenſia colitur, & in cibis in acetariis, & condi- mentis, viridi & ſicco continuò vtimur.

Nollem anceps huius ocimi nominis dictio tyronum animos diuexet: oci- *Nomen.* mum enim duo ſignificat, hortenſem herbam, de qua in præſentiarum ſermo eſt, & pabulum, de quo in paſcuis dicemus. Theophrastus ὄκυμον vocat Græ- cè, Varro tam ocimum genus pabuli, quàm ocimum hortenſe vult ab ὄκως di- ctum Græco vocabulo, quod valet, citò. Plinius verò: Varro appellatum vult à celeritate proueniendi, à Græco, quod ὄκως dicunt. Pompeius idem confir- mat, quod omnium eorum, quæ in hortis naſcuntur, celerimè proueniat, dicq; à quo ſatum eſt, tertio erumpat. Sunt & viri non indocti, qui per z ſcri- bendum cenſeant, ozimum, dictumq; à Græco vocabulo putant ὄζω, quod eſt ſtagro, hæc enim herba ſagrantiffimi eſt odoris. quam opinionem fortalle plurimi ſequerentur, niſi Plinii, Dioſcoridis, cæterorumq; antiqui excuſſi, ca- lamòq; exarati codices caſtigatiſſimi aperte refragarentur, vbi per ſecundam conſonantē ſcribitur. Sotion Græcus, μισόδωλον vocat, ab illo ſceminarum odio. Heſchius à recentioribus Græcis βασιλικόν dici ait, quaſi regium, quod nomen apud Italos hodie uſurpatur ab inſigni odore, quòd regia domo, & regiis ma- nibus geſtari dignum ſit. Latini variis authoritatibus addicti, variè ſcribunt. Columella ozimum dicit, Palladius ocymum, Plinius ocimum. Itali baſilico.

Hæc habet Theophrastus de ocimi deſcriptione. Radix data eſt vna oci- *Deſcriptio.* mo, quæ deſcendit in altitudinem craſſa, cætera à lateribus exiles, & prolixa, omnium radicum lignoſiſſima. Foliiſ iam perfectis, caulis conuenienter af- ſurgit, folio corchorum æmulatur. Floret contra quàm cæterum olus, pri- mò parte inferiore, demum ſuperiore, quo ſicv̄t diutius quoque floreat, quemadmodum faba, & inter herbas heliotropium, & quædam de ſylueſtri- bus alia. Semine ſcæcundiſſimo, difficileq; exiccatur, cortice obducto, ad perdurandum infirmo. Sub cane albefeit. A quo Plinius: Surculosa ocimo ra- dix, floret particulatim & ab imò incipit, qua de cauſa diutiſſimè floret. Se- men cortice obductum, quæ in cortice ſunt, difficillime marceſcunt, maxi- meq; ocimum. Ad perdurandum infirmum eſt. Sub canis ortu palleſcit. Ad- dimus nos: Pedali ocimum altitudine proſilit, ſurculolum, rotundis ramulis, folio mercurialis, parietaria, ſed minori, & diluti viroris, floſculo & calyculis verticillatim caulem ambientibus, ſemine pullo, rotundo, odoratoq;: Iunio, & Iulio floret, dein ſemen producit.

Etià ex corrupto Theophrasti textu, Theodorus plura ei genera eſſe vertat, *Genia.*

negat tamen in eo generis diuersitatem. Quod Plinius ab eo trāscribens confirmat. Singula genera sunt ocimo, vbi cunq; idem semper est, neq; aliud alio melius vnquam. Neq; Dioscorides generum distinctionē apposuit. Sed Neapolitani plura obtinent genera. Est genus vnum foliis magnis, longis, & crassis, alterum ramis, & foliis longè minoribus, cuius duæ species, odore differentes: vna communis odoris, altera mali citrii, ad eò simili, vt vulgus *citratum* vocitet, non vt Matthiolus, quod folia eius cum mali citrii foliis similitudinē habeant. Postremum foliis minimis, & angustis, sed odore & viribus cetera superas: vulgus basilicum nobile, & *gariophyllum* vocat. Alterum est magnum foliis rubeis maculis notatum. Vltimum genus iam pridem Constantinopoli aduectum, cuius folia, tota q; planta quadruplo maiora, gariophylli cum citro confusa iucunditate. Studiosè in Neapolitanis hortis nuper feri cœpit. Omnium varietates etiam mulierculis notissimæ.

Cœlum.

Cœlo gaudet tepido: nam si sole continuò illustretur Theophrasto auctore, in serpillum transit, cuius rationem in libro de causis reddidit. In solationis causa vehementius exiccatur, vnd folii magnitudo decrescit, ac populante calore, alimenti inopia flagrantius redditur, quippe quum alimentū minus habeant, quæ sicca sunt. Sed eiusmodi mutationes ita euenire putandum, vt aliquid similitudinis faciant non vt omnino speciem exprimant alienam. Palladius autem narrat Martialem rem miram de ocimo affirmare, quod modo purpureos, modo albos flores, modo roseos pariat, & si ex eo semine frequenter seratur, quod simul atque solo creditum est, aqua calida perfuderis, modo in serpillum, modo in sisymbrium abire solitum. Plinius verò senectæ in serpillum degenerare dixit.

Solum.

Columella profcissum, rigumq; solum exoptare in hortulo cecinit,

Tum quoq; profcisso, rigumq; inspersa nouali

Ocuma comprimate & grauib; densate cylindris.

Satio.

Semine prodire scripsit Theophrastus. Item tertio die à sātū provenire, & ætate prodire, quod et si siccum & lignosum sit, attamen ante feruentes dies, vt perdurare atq; perfici possit, minime valet, cuius causa debilitas est. Ex æstiva semente est, ideo Martio seritur, estq; ex iis quæ per ætatem feri mos est, quod ex imbecillitate celeriter augetur, & hyemem nequeunt tolerare, vel quod sicca sint, ceu ocimum, vel quod frigida, humidaq; vt cucumis, & portulaca. Plinius latius, & copiosius provenire ait, si cum maledictis seratur, vt fortasse Persius hoc senariolo huc alluserit,

Quum bene discincto cantauerit ocima verne.

Vnde adagio confirmatum est, vt qui alicuius famam proscindere, & tenerimam venenilabem affigere conatur, ii ocima serere dicatur. Columella: Semine seritur post idus Maias vsq; in solstitium: nam teporem desiderat, cuius semen obrutum diligenter inculcatur pauculo, vel cylindro: nam si terram suspensam relinquant, plerumq; corrumpitur, quod etiam suo hortulo docuit,

Ocuma

Ab eo Plinius:

provenit: nam id

venerit, dimidio

pro parte superna

difficilius exiccat

rat, & tortum, &

edicitur enim & b

mine alicuius tan

difficilius crescit

Vni ocimo aq

tutinis rigentur.

ne aqua feruescat

expedit, auctor e

mella: Ocimum v

tus alias, quàm v

Caule reciso r

res esse caules reg

le reciso ferè quid

nus, laetuca. Han

mè feri dicunt, q

semen perfundi. E

ti aqua aspersum.

imbre acciti in spe

quum seueris, aq

friculosa est, qu

quam panno adu

robanchem, vel

capreolum vnu

aliquem capesit,

cans, vt paucis di

obuoluat tota, v

ser. Fuchsius ex

Sub Canis or

neccat, degenerat

ET inter herba

Egium. Plinius

*Ozima comprimite & granibus densate cylindris,
Exurat sata ne resoluti pulueris astus,
Paruulus aut pulex irrepens dente laceffat,
Neu formica rapax populari semina possit.*

Ab eo Plinius: Sato pautitur terra. Theophrastus, Germine nec nō ocimum
prouenit: nam id quoque transfertur, quum ad palmum, aut plus altitudinis
venerit, dimidioq; abscisso. Proximum inter olera ocimum est, hoc enim seri
pro parte superna optimè potest, quamquam lignosum admodum sit, sed quia
difficilius exiccare possit, eo prouenit, quamobrem & longum tempus perdu-
rat, & tortum, & dimidiatum regerminat. Plinius ab eo: Prouenit furculo, præ-
ciditur enim & hoc, quum peruenit ad palmum altitudinis. Incuruatoq; cacu-
mine alicuius rami, quum attigerit terram, statim radicitur ocimum, nisi quod
difficilius crescit.

Vni ocimo aquam in meridie dari iubet Theophrastus, quum cetera ma-
tutinis rigentur. A quo Plinius: Omnibus hora rigandi matutina, atq; vespera,
ne aqua feruescat sole, ocimum tum etiam à meridie. Ferro etiam tãgere non
expedit, author est Sabinus Tiro in Cepurico, quem Macenati dicauit. Colu-
mella: Ocimum vbi satum est, sua sede immotum permanet: neq; est eius cul-
tus alius, quàm vt stercoreatum runcetur.

Caulereciso regerminat. Vtitatum euidentissimumq; in ocimo suauio-
res esse caules regerminatos: cuius rationem reddidimus. Ab eo Plinius: Cau-
lereciso ferè quidem omnia regerminant. Est in vsu verò ocimum, thapha-
nus, lactuca. Hanc etiam suauiozem putant à regerminatione. Parilibus opti-
mè feri dicunt, quidam & autumnò, iubentq; quum hyeme feratur, aceto
semen perfundi. Etiam satum celerrimè erumpere putant, inter initia feruen-
ti aqua aspersum. Palladius: Octobri mense feratur, citiusq; nasci dixit, si leui
imbre aceti inspergatur infusum. Et si Aprili feratur, cito nasci dicitur, si statim
quum seueris, aqua calida perfundas. Nos autem quia eius natura admodum
friculosa est, quod facile à sole patitur, nisi perpetuo rigetur, igitur è pelui a-
quam panno aduoluto deducimus continua distillatione. Mulieres nostra o-
robanchem, vel vt rectius loquar, linobanchem ferunt, enatam decerpunt, ac
capreolum vnum inter virètem ocimum proiciunt, qui facile furculum illius
aliquem capessit, ac se in torquet, inibi q; crescit, crebro volumine se impli-
cans, vt paucis diebus longè ocimum superet, & fictilia vascula, in quibus est,
obuoluat tota, vt nil speciosius videri possit. Rectè id epiocimum dici pos-
set. Fuchsius ex eodem genere tria genera nata recenset.

Sub Canis ortu pallefcit, quasi morbum sentiens, ex Theophrasto. Facile se
necat, degeneratq; in serpillum.

Depulegio. CAP. XLIII.

ET inter herbas, quæ condimentario vsui inserviunt, adnumeratur pule-
gium. Plinius, Dignior corona vertigini è pulegio, quàm è rosa: nam & ca-

pitis dolores imposita dicitur leuare: quin & olfactu capita tueri contra nimum frigus, æstusve: nec æstare eos, qui duos è pulegio furculos impositos auribus è sole habeant. Mirum de eo tradunt veteres, quòd ipsa solstitii die etiam à planta abscissi ramuli floreat. Quod percontatur Aristoteles in problematibus: Cur pulegium, lirium, & cæpe suspensa florent solstitii tempore? An inest crudum in his alimētum, quod ut hyeme concoqui ex frigore nequit, sic solstitio ex calore concoquens, auget? Vtrum quia influxu carent assiduo, breui marcescunt? etenim, quæ nullum alendi initium, nullum influxū assiduum habent, intereunt exiccanturque: quæ de causa accidit apud Scythas, ut frumentum diu in terra maneat propter copiam niuis, & ubi emerferit, celeriter crescat. Theophrastus, Pulegiū siccum omnino sentitur, verūm quamuis ita sit, principium tamē quoddam eiusmodi habeat necesse est, quod vnā cum aeris mutatione, alterationeque moueatur. Mirum præterea, quod non remissa, sed potius intenta sæuitia temporis germinare incipiat, nisi fortè dies halcyonides suffecturas putaueris: nam ad imbecillorum exiguorumque mutationem, vel quantumlibet tēporis satis sit. Plinius ab eo: Pulegii natura sapius dicta est, in carnariis reflorescens. Et alibi. Miratur hoc, qui non meminerit ipso brumali die pulegium in carnariis florere, adeo nihil occultum esse natura voluit, & ferendi hoc igitur dedit signum. Sed parum videtur inter Aristotelem & Theophrastum, & Plinium conuenire: quum ille bruma florere tradat, immò brumali die suspensum florem edere fateatur, contra illi solstitio florem facere, quod fortasse in causa esse potest, ut biferum sit pulegiū, & quod bruma præcoci partu florem non fudit, ob calorem solstitio protulerit, sed qui brumali tempore mittitur flos, prioris autumnii redūdante tunc alimonia profilit, brumam ostensurus. nam utroque tempore floret.

Nomen.

Theophrasto βληχὸν, & βληχός, Theodorus blichon vertit, Dioscorides γληχόν, & blechona dictum aliquibus vult, quia dū floret, gustatum à pecoribus, balatum extorquet. A quo Plinius: Gustatum à pecore, caprisve, balatū concitat. Vnde quidam Græci literas mutantes, blechon vocauerunt. Latini pulegium vocant, quia Plinio autore, eius flos recens incensus, pulices odore necat. Itali puleggio.

Descriptio.

Cretensi dictamno Theophrastus folia similia reddere ait. A quo Dioscorides, Dictamno Cretensi similia pulegii folia, sed minora. Plinius: pulegii color mentastri. Addimus nos: Fruticosum assurgit, subitali altitudine, surculis hirsutis, rubicantibus, per interualla purpureo flore coronatis. Radix illi gracilis, & capillata, quæ humi serpat. Tota planta gustu acris, ac non sine quadam amaritudine. Iulio, & Augusto floret.

Genera.

Dioscorides sariui pulegii meminit, & sylvestris in calaminta, vel secundam ipsius speciem facit. Plinius sariuum à sexu diuinit in marem & feminam: mas flore candido, femina purpureo, sylvestri origano simile, sed foliis minutionibus.

Proue-

Prouenit culti
poscit, solet enim
Seritur vere iu

P O s t pulegiū
gio, hæc quoque
nepitamque ad re
piæ affinitas. Men
odor animi ex
10 mentis, & acertari
mentis peculiare
Pilum scribit Min
Proserpinæ iouid

Femina

Persepe

Julius Pollux: M
dimenatratat. T
fuit, appellatam vi
Plutone Proserpi
est, dictitans, si in
Ceres Persephone
deformauit. Hinc
à se mentulam non
seorides enim & P
guletur, eadem vi
fari. Quærit Ariste
belli tempore non
solet, & absumere
Silymbrium quon

A Theophrasto
tur, nomenque ab
parto esset concolo
humilibusque locis
non quod mentem
Plinius inquit, su
vocaretur, vnde ve

Dioscorides in
hoc mentastrum a
rum inter se differe
beuti caule, & flore

Prouenit cultis & aquosis locis. Arenosum potius, quàm pingue solum ex- *Cal. Sol.*
poscit, solet enim in montosis exurgere.

Seritur vere suo semine, transplantatur tenerū, & sic optimè apprehendit. *Satio.*

Dementia. C A P. XLV.

POST pulegium mentam trademus, & nepitam. Plinius. Congruit pule-
gio. hæc quoque seruantur simili genere, mentam dico pulegiumque, &
nepitam: atque ad recreandos animi defectus magna cum pulegio mētæ, & ne-
pitæ affinitas. Menta grato mētas odore percurrit, & in rusticis dapibus. Ipsius
odor animum excitat, & sapor auiditatem in cibis. Ideo & apud nos in condi-
mentis, & acetiariis familiarissima. Dioscorides vtilem in summo, & in condi-
mentis peculiarem gratiam habere dixit. Strabo in Achaia montem esse iuxta
Pilum scribit Mintham nomine, è Plutonis pellice in hanc herbam conuersa.
Proserpinæ inuidia: quæ vocabatur à quibuldam hedyosmos. Quidius,

Femineos artus in olentes vertere mentas

Persephone licuit.

Iulius Pollux: Minthe Peloponēsi mōs, in eo nemus Plutoni sacrū, vbi con-
dimenta tractat. Tradit Oppiani interpres Mintham à Menta, quæ nymp̄ha
fuit, appellatam videri, Cocyci filiam fuisse tradit, quæ vbi audiuiſſet amari à
Plutone Proserpinam, indignata eo nomine constanter illi se præponere ausa
est, dicitans, si inferos peteret, inimiciter interfecturam. Quo puellæ tumore
Ceres Persephones mater indignata, Mintham exculcans, in malam herbam
deformauit. Hinc Pluto donum amoris petēti virile membrū tradidit, quod
à se mentulam nominauit. Sed cur Poetæ id confinxerint, sciscitemur. Dio-
scorides enim & Plinius tradunt mentam efficere, vt lac in caseum non coa-
guletur, eadem vi resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia den-
fari. Querit Aristoteles in Problematis, cur in adagium venerit, mentam
belli tempore non edendam, nec ferendam. Quoniam inquit refrigerare
solet, & absumere genituram. id quod fortitudini, & ferocitati contrarium est.
Sisybrium quonam pacto mutaretur in mentam, diximus in coronariis.

A Theophrasto *μνθῆ* dicitur, à Dioscoride *ἡδυοσμός*, ac si suauis odor dicere-
tur, nomenque ab odoris flagrantia inuenit. Aliqui dicunt *μνθῆ*, dictam, quod
μνθῆ esset concolor, aut quia hirsuta, est enim *μνθῆ* lanugo, quæ in sterquiliniis
humētibusque locis visitur, vt hirsuties illa quæ in nepita videtur. Latinis menta,
non quod mentem percellat, quum odore oblectet: nam menthæ nomen, vt
Plinius inquit, suauitas odoris apud Græcos mutauit, quum alioqui mintha
vocaretur, vnde veteres nostri nomen declinauerunt. Itali *menta*.

Dioscorides in duo genera diuisit, in satium, & syluestre, illud mentam, *Genera.*
hoc mentastrum appellans. Satiæ mentæ apud nos plura sunt genera, sed pa-
rum inter se differentia. Vna crispioribus, & breuioribus constat foliis, alia ru-
benti caule, & flore, alia verò albicante.

Descriptio.

Theophrastus odoratum olus vocat, quod perinde in ea siccitas, acrimonia & acerbitas insit. Addimus nos, etsi notior sit, quam representari digna sit. Herba cubitalibus flagellis, lanugine pubescentibus, folio sisymbrii, longiori, molli, semper odorato, flos circa calyculorum fastigia spicatur. Floret Iunio, Iulio, & Augusto, inde profert semen, nigrum perexiguum, ut grana sabuli. Mentastrum ita Dioscorides depingit. Hirsutius est folio, & prorsus maiore, quam sisymbrio, grauioris odoris. Plinius: Differt specie foliorum, quasi figura ocimi, pulegii colore, propter quod quidam sylvestre pulegium vocat. Nos autem sic: Ut à menta mentastrum defluxit nomen, sic sylvestriore habitu, rudiore, grauioreque odore, degenerasse videtur mentastrum, foliis maioribus, hispidioribus.

Cœlum.

Palladius aprium locum desiderare scribit, substatinet quodcunque cœlum. Sed melius calidum, nam frigido læditur, & pallescit.

Solum.

Columella dulcem viginem desiderare dixit, quam obrem optimè iuxta fontem feritur. Palladius nec pingue, nec stercoreatū solum amare. Sed id mihi absurdum videtur, quum longe maius incrementum latamine capiat, & latius virescat.

Satio.

Sunt qui mentham semine carere putent. Sape enim exiccatam tritamque feruisse inquirunt: sed nunquam semen erupisse, ex Theophrasto. Nos autem è mentha semen collegimus, illudque Martio mense seruimus, sed à mentha degenerauit, quippe pusillam, & degenerem mentham produxit, quæ odore tam verè nepitam amulabatur, ut vnumquenque fefellerit, qui non inspecta stirpe, odore nasum consuleret, quod mihi omnibusque mirum fuit. Columella sequitur: Cui fortè semina de fecerint, licet de noualibus sylvestre mentham colligere, atque in uersis cacuminibus disponere, quæ res feritatem detrahit, & edomitam reddit. Quod nos experti sumus, optimè enim apprehendit, sed nil de feritate deposuit, ut eadem cum parente fuerit. Palladius, Aprili feri posse monet radice, vel planta. Februario plantis vel radicibus loco humido, vel circa aquas Octobri. Plinius. Ab æquinoctio verno feritur menta planta, vel si nondum germinat, spogia. Minus hæc humido gaudet. Genus eius mentastrum, & hoc propagatur, ut vitis, vel si in uersi rami feruntur. Semel sata, diutina durat ætate. Nos hic cacuminibus ferimus Martio, optimèque apprehendit, facillimè enim propagatur. Semel satum locum vix poteris extirpare: nam serpendo radices è locis diuersis pullulat, ut rectè in hortulo Columella,

Plantantur nec non serpentiagramina mentha.

Cultus.

Plinius: Ferro tangi non vult, auctoritate Sabini Tyrii in Cepurico. Triennio senescit, unde radices in seipsas reflectemus, perit cespes: sed post triennium suffodiantur, & disponantur in optimum, cultum, & stercoreatū solum.

De calamintha. C A P. XLVI.

Nomen.

DIXIMVS de mentha, sequitur de calamintha eius specie. Theophrasto καλαμίνθη, Nicandro καλαμίνθον dicitur, quasi bonam, & vilem

vilem mentham
rioreque habiue
sa mentha. Vene
moniam ab Hom
caram. Latini, au
Theriaci, Rom
Italimēta, vulg
prætenam si vult
humo, qua reside
Dioscoridi tri
capite de sampsu
& latifoliam.
Dioscorides
tem incana, forc
penle feruentia,
milia alibi scribit
odore cæteris sua
ridis supra mem
simile est, sed m
lore ipsum emul
superuacua, nob
quentissimè visi
& ramis maiorib
Dioscorides in
Nicander illis
Non opus est

ALEXIS
nit. M. V
30 feruari putat. Id
A Theophr
cimum putor
Itali corianni.
Theophrast
tradit. Nos Me
Nudo semina
ortu nascitur. E
nit. Folia fert d
mious, angustio
40 theni, adiantu.

utilem mentham diceret, quum elegantiore aspectu, odoreq; delatatione, hilarioraq; habitu esset, quam mentha. Alii à *καλα*, id est ligno dicunt, quasi lignosa mentha. Veterem Græciam ceatā appellasse author est Strabo, & Lacedæmoniam ab Homero cetoesiam nō à magnitudine, sed à calaminthe copia vocatam. Latini, authore Dioscoride, nepetam vocant, & Andromachus in sua Theriaca, Romana voce nepetam potius, quam Græca calamenthū vocauit. Itali *menta*, vulgus *herba digatti*, quod magna feles huius odore capiatur voluptate: nam si vulla, vel hærenti contingat occurrere, ei statim sese affricant, & humo, qua residet, iucundissimè suburantur.

10 Dioscoridi tria sunt genera: montanum, simile pulegio, & mentastro. Et capite de sampso aliam distinctionem accipere possumus, in tenuifoliam, & latifoliam.

Dioscorides montanam describit mōtibus familiarem, folia ocimi habentem in caua, surculos, & caules angulosos, purpureum florem, folia gustu impense feruentia, & acria, radicem superuacua. Et folia item polemonia similia alibi scribit. Hoc genere Surrentinus tractus latè scatet, flore purpureo, odore cæteris suauiori, folio magis tenui, vnde leptophyllon videtur Dioscoridis suprà memoratū genus, vti sampsochum comparat. Secundum pulegio simile est, sed maius, quam sylvestre pulegium: nomen indiderunt, quod colore ipsum emuletur, nepetam Latini vocant, folia impesè feruida, acria, radice superuacua, nobis vulgaris nepita dicitur, quæ siccis itineribus, & sepibus frequentissimè visitur. Tertia mentastro cognata est, foliis oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora: sed viribus inefficacior.

Dioscorides in campestribus, & asperis, & aquosis locis nasci scripsit.

Nicander illis rignos, & amnicos natales assignauit, in Theriacis.

Non opus est in huius satione latius euagari, quum passim nō sata nascatur.

Calum.
Solum.
Satio.

De corianno. CAP. XLVII.

30 **A**LEXIS in lebece, Athenæo autore, inter condimenta corianni meminit. M. Varro corianno subtrito in aceto carnem incorruptam æstate feruari putat. Idem Plinius.

A Theophrasto videtur appellari *κοριαννον*, & *κοριαννον*, à Dioscoride *κόριον* à cimicum putore nomen inditum verisimile est. Columella coriannum vocat. Itali *corianni*.

Nomen.

Theophrasto genere carere videtur. Plinius inter sylvestria non inueniri tradit. Nos Melphi Apuliæ sylvestre vidimus pessimè olens.

Genera.

Nudo semine nasci scripsit Theophrastus, ad perdurandum firmo, sub canis ortu salescit. Dioscorides in aliarum herbarum delineationibus illius meminit. Folia fert dauci tertii, thalitri paulo graciliora, fumarie similia, sed candida minus, angustiora quam ranunculi primi, vel anemones, minus scissa, aut parthenii, adianti. Umbella dauci primi, aut crebris in latere foliorum sectionibus,

Descriptio.

ut achillea, aut syderitis tertia. Nos hæc addimus: Caulis corianni exilis, sesquicubitalis, ramosus, folia, dum adolescit, adiantia, fumaria, vel ranunculi, sed postquam excaulescit, fœniculum æmulatur, candida odore graui, virosoque, radicem breuiusculam, ligneam, atq; admodum fibratam habet. Carpitur autumno, dum femine prægnans est.

Celum. Cœlum potius calidum, quam frigidum amare videtur. Plinius Ægyptium præcipuum esse constare scribit.

Solum. Amat terram pinguem, sed etiam in macra nascitur, delectatur humore: Palladius.

Satio. Theophrastus. Ex prima sementi, qua fit mense Iulio, post æstiuum solstitium. Nunquam nisi satum prouenit, prouentu cōtumax, quippe quod si nouum sit nasci recusat, nisi conuoluatur. Ex veteri semine celerius exit, dum modo uerustate non sit excoctum. Difficillimè prouenit, haud enim germen emittit, nisi aqua præmaceratam, causam durities habet. Columella autumno, & vere feri posse dicit. Vbi satum est sua sede immotum permanet, neq; est eius cultus alius, quam ut stercoreatum runcetur. Palladius: à Martio vsq; ad Octobrem totum coriannum seritur. Semen melius puratur, quo vetustius fuerit. Satum benè cum olere quocunque nasceretur. Seritur Februario, & Aprili.

De sinapi. CAP. XLVIII.

ATHENÆVS sinapi inter condimenta connumerauit. Plinius: Sinapis 20 vsus etiam pro pulmentario in patellis decocto, citra intellectū acrimonia; coquuntur & folia sicut reliquorum olerum. Sinapi quomodo ad salgarum simul, & conuiuiorū usum conficeretur, docuit nos Columella: Semē sinapis diligenter purgato, & cribrato, dein aqua frigida eluito, & quum bene elotum fuerit duabus horis in aqua finito: postea tollito & manibus expressum in emundatum mortarium coniecito, & pistillis conterito: tū totam intritam ad medium mortarium contrahito, & plena manu comprimito, deinde scarificato, & subditis paucis carbonibus vini aquam nitratam suffundito, ut omnem eius amaritudinem, & pallorē exinaniat, erectoq; mortario, ut omnis eliquetur humor, album, acre, acetū adlicito, sic pistillo permixtum, colatumq; 30 recondito. Caterum qui ad vsus conuiuiorū præparabant, quum exinaniuissent sinapi, nucleos pincos quàm recentissimos, & amyllum infuso aceto diligenter vnā contrerebant, hoc sinapi ad embammata non solum idoneo, sed etiam specioso utebantur: nam si curiosè factum sit, candoris erit eximii. Alii ter docet Palladius. Sinapi semen ad modū sextarii vnus & semis redigere curabis in puluerem, cui mellis pondo quinq; olei hispanici vnā libram, acetum 40 vnū sextarium, miscebis, & tritis omnibus diligenter vteris. M. Varro seruari rapā in sinapi putat. Præterea de vniuersis radicib. Græci authores præcipiunt, ut cito contenerescat. In ollam sinapi momentū iniiciendū est, & confectum coctæ fathiscūt, quod si plusculum sinapis sit iniectū, profus resoluta 40 habescēt, ex Democrito. Apud nos nil quippiā ad intinctus cibi vbiq; frequen-

tius

tius intermiscetur
magis epula inue
immediuerit, tota
monia fastidiosius
vellicante, elangu
ardore cōfecto non
& vellicās sensum
in horculo:

Apud Neapoli

gnem alitius vet
odore, sua ignea v
menta cieat. Plin

Græcè *sinapi* &

oculis. Pletaq; G

quod naturæ sibi

acrimonia distet.

Latini sinapis, &

Plinius tria ge

ruræ. Pythagoras

dicauit, quoniam

hortensis memi

fronde, flore, sili

ris maius, cuius ce

putamus. Alterun

syluestre putam

albo, minus acti

Primum gener

asperiora, flores.

Florat Aprili, aff

Nicander nigra

cum est, quod f

caule præditum

niatis floribus a

bus, & oblongis.

Antiphones,

Ægyptium dicit

quàm in tempe

prico, quàm hu

Palladius ait

vbique nascatur

Theophrastu

ius intermiscetur, gratissimo obsoniorū condimento: nihilque frigidis diebus magis epula inuenitur cōmendare. Præterea dum per vindemias semen musto immaduerit, toto anno asseruatur, ut si ciborū gratia exoleſcit, leuis ipsius acrimonia fastidiosus gustū tereat, & hoc veluti irritamento morosius palatum vellicante, elanguescens appetētia inuitetur. Id quia musto inditur, ex sinapis ardore cōfictio nomine, *mustardā* dicunt. Cuius vis per nares cerebrū penetrat, & vellicās sensum, lachrymas ciet, & stertutamentū. Testatur hoc Columella in hortulo:

Et laeſſenti ſletum ſactura ſinapis.

Apud Neapolitanos ex eo iactatum est adagiū, Hic callidior est sinapi, insignem alicuius veteratoris astutiam indicans, quum nullo asperi saporis præiudicio odore, sua ignea vi, semen per nares cerebrū feriat, & lachrymas, & stertutamenta ciet. Plinius, florum sinapis apes audissimas esse, inquit.

Græcè *σινάπι* & *σινάπις*. Athenæus dictum putat *σινάπι* *πρὸς τὴν ὀσπρίαν*, veluti officinæ Nomen. oculis. Pleraq; Græcia *νάπι*, quasi napy ab v priuatiua particula, & *πρὸς* natura, quod naturā sit immittis, ob acrem quā possidet vim. Vel quod à napis seminis acrimonia distet. Plinius. Athenienses napi appellarūt, alii thlaspi, alii saurion. Latini sinapis, & sinapi dicitur, nomēq; è Græcia in Latinū venit. Vulgò *ſenape*.

Plinius tria genera facit, gracile vnum, alterum simile rapi foliis, tertium erucæ. Pythagoras principatum habere ex iis, quorum in sublime vis fertur, indicauit, quoniam nil aliud magis in nares, & cerebrum penetrat. Dioscorides hortensis meminit, quasi sit syluestre genus. Apud nos genus est vnum, caule, fronde, flore, siliquaq; rapacea, semine verò minore, acerrimo, oleosoq; ceteris maius, cuius tenera folia in acerariis mandimus, hoc Dioscoridis hortense putamus. Alterum quod cum fronde, caule, & semine gracile nascitur, quod syluestre putamus Dioscoridis, & Plinii primum. Tertium erucæ foliis, semine albo, minus acris, putamusq; Plinii tertium. Genera.

Primum genus caulem habet hirsutum, longū, ramosum, folia rapi, minora asperiora, flores luteos, siliquas rotundas, ac hirsutas, plenas semine cādicante. Descriptio. Floret Aprili, affert semina Maio, eodēq; tēpore siliquas semine plenas affert. Nicander nigram sinapim vocat, ex Athenæo, hanc. Secundum genus erraticum est, quod folio, & tenui semine nascatur. Tertium genus itidem hirsuto caule præditum est, minore tamen, foliis erucæ maioribus, ac latioribus laciniatis, floribus albicantibus, crucisque effigiem referentibus, siliquis teretibus, & oblongis, semine pullo, rufescentiq; Floret Iunio, & Iulio.

Antiphanes, authore Athenæo, Cypri sinapium laudat. Plinius optimum Caelum. Ægyptium dicit. Vnde etſi qualicunq; nascatur cælo, melius ex his in calido quam in temperato proueniet cælo, & melius temperato, quā frigido, & aprico, quā humido.

Palladius ait diligere terram aratam, & si fieri possit, congestitiam, quamvis Solum. ubique nascatur, nec minus humore gaudet.

Theophrastus ex prima sementi esse scribit, quæ fit post brumam mense satio.

Martio. Quinto die post satum erumpit, semine firmo ad perdurandum. Columella nō solum autumnō, sed vere conferi, ita ut satum sua sede immotum permaneat, neque est illius cultus alius, quā ut stercoreatum runcetur. Plantæ quoque sinapis primō hyeme translata plus cimæ vere afferunt. Palladius Octobri ferit, & ubi natum est, sarculari debet assidue, ut respergatur pulvere, quo fouetur. Non minus gaudet humore. De quo semen eligere disponis, suo loco esse parieris, quod ad escam parabis, robustius facies transferendo. In sinapi vetus semen inutile est, vel sationi, vel esui: quod dentibus fractum, si intus viride videbitur, nouum est, si album fuerit, vetustatem fateretur. Martio mense feritur. Plinius: Sinapi nulla cultura, melius tamē plāta translata, quā ē diuerso, vix sato eo est liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Si rara feratur melius euadit, si spissius, transplantanda & alibi ponenda. Si de crescente Luna colligitur semen, est acrius, & diutius conseruatur. Seruator mundi fidem grano sinapis assimilauit: nam etsi exile est, virtute tamen, & credine magnum.

Dermia. CAP. XLIX.

INTER olera Theophrastus rutam commemorat. Est & quibusdam condimentis apriissima, ob id Athenæus inter cōdimenta connumerat. Plinius, Authoritas esculentis apud antiquos rutæ fuit. Inuenio mustum rutatum populo datum à Cornelio Cethego in cōsultatu collega Quinti Flamini comitiis peractis. Condiuntur eius folia, & seruantur in fasciculis. Columella rutā condire docet circa vernū æquinoctiū, quā sæpe diximus in olusatro, & ceteris. Est ruta fascinationis amuletū, cuius causam Aristoteles in problematis reddit. Nam effascinari se credunt, quum aut voraciter edunt, aut incommodorum quorundam suspitione tenentur, vel cibum, quem assument, habent suspectum, itaq; quum de mensa eadem quid priuatē sibi capiunt, participem intuentem faciunt, affanturque quum impertiant. Ne in e fascines. Ergo cibū cum perturbatione vorabunt, nec quid ebibent, aut esurabunt, sine turbatione & flatu, qui hauriatur vnā, & simul ingeratur. Quam obrem intruso spiritu, tormenta mouentur, & cruciatus excitantur. Igitur præsumpta ruta, suapte vi & calefactoria dote, vas, quod recipit cibos, relaxat, quo fit, ut inclusus spiritus facile per patētiōres angustias euadat. Contra venena maximē rutā pollere veteres Græci memoriæ mandarunt, ut de famigerato illo pharmaco Mithridatico fertur, in quo inter prima miscetur. Theophrastus: Vipere, ubi noxium alium comederunt, ut noxa liberentur, rutam absumunt. Sic & mustela in murium venatu & cum iis diuinatione conferta, ex Plinio. Sic & cum serpentibus dimicatura, rutam prius edēdo se munit. Aristoteles enim in problematis quærit. Quæ de causa ruta, & nonnulla pigmenta sudores foetidos moueant. Respondet, quia quorum odor grauitatem præ se fert, hæc humoribus sordidis admista secundum odorem mouere possunt.

Gracis
quia semen genit
lescant præterit
serta putatur. A P

In duo diuisit
rior, sed eius odo
suauior est. Odo
fauinæ, & montan
minoribus, herba
bis, & colore. In s

Ex Theophrast
pilci conspicitur,
si affligatur, mur
Dioscorides suo
men comparand
coii, aut serpilli
perici, aut andros
minoribus, & bre

aut apios, sed bre
trifolii asphaltites
ut ruta, & qui in sic
guo, torundo, cefi
laris siliquis, in qui
colore luteis, in iis
& Maio. Inde sem
vifa est à Iosepho,
mū Iudeæ oppidu
tudine vincebatu

mao fiserq; diuini
Athenæus in S
apicis. Columell
& sicis gaudere,
Plinius: Odor
cinere vult nutrit
lius cineris asper
certissimum est.

Theophrastus
riqua de causa sur
bus exir, & auulso
ne satam mense M

Græcis *πράνον*. Plutarchus putat à facultate dictam *ἡ δὲ πύκνωσας τὸ ἀπέρμα*, Nomen. quia semen genitale suo præficcò spiritu coagulet, quasivè arefaciat, ut sterilescent præfertim viri, ideoq; gestantibus vterum inimica, etiam coronis infesta putatur. A Peloponnesibus *πύκνον* appellari dicunt. Latine, & Italice *ruta*.

In duo diuisit genera Theophrastus, sylvestre & satium, sylvestris odoratior, sed eius odor rudio est; satium permissione terreni humoris temperata suauior est. Odor durus, & expers omnino dulcedinis. Dioscorides hortensis satia, & montanæ sylvestris meminit. Plinius refert Pythagoram marem minoribus, herbaceiq; coloris foliis à fœmina discreuisse, etiam letioribus foliis, & colore. In satiam item distinxit, & sylvestrem: illi latiora folia, & rami fruticosiores, huic horrida, & ad omnia acriora.

Ex Theophrasto descriptio. Frutex est, sed interdum arboris naturam adipsi conspiciuntur, vnde sunt, qui oleriarborem vocitent: semper virens, etiam si affligatur, muteturq; furculosus, minutisq; conditus foliis. Rutam et si Dioscorides suo capite describere dedignatus sit, utpote triuiale, aliis tamen comparando, examussim delineat. Foliis constat ambrosiæ, aut hipecoii, aut serpilli sylvestris, sed breuioribus, mollioribus, & latioribus, aut hyperici, aut androsæmi, sed triplo, aut quadruplo minoribus, aut polæmonie, sed minoribus, & breuioribus, aut polygoni maris, sed durioribus, & breuioribus, aut apios, sed breuioribus, aut latioribus, aut pepli, paulo angustioribus. Odor trifolii asphaltites, recenter enati. Plinius: Odoratissima inter olera, quæ sicca, ut ruta, & qui in siccis nascuntur. Floret cum fraxino. Addimus nos. Folio exiguo, rotundo, cæsi coloris, denso flore luteo, angulosis calycibus, cum capitularis filiquis, in quibus semen album, flore quaternis vel quinis foliolis diuiso, colore luteis, in iisdem lutei apices. Sepe in arborem transit. Diu floret Aprili, & Maio. Inde semē affert, gratissimi odoris, & saporis. Mirabilis magnitudinis visa est à Iosepho, Iudaici belli scriptore, Macheruti, quod olim fuit munitissimū Iudeæ oppidum, in ipsa regia: à nulla enim ficu, vel celsitudine, vel magnitudine vincebatur. Ferebant autem eam ex Herodis temporibus perseuerasse, manifestetq; diutius, nisi à Iudæis, qui locum ceperant, excisa esset.

Athenæus in Smyritutam in opus nasci author est. Cassianus in calidis, & apricis. Columella aprico gaudere cælo. Plinius Galaticam laudat, & apricis & siccis gaudere, terra quam maximè lateritia.

Plinius: Odit humorem, ac fimum, terra gaudet quam maximè lateritia, cinere vult nutriri. Palladius, loca desiderat altiora, vnde labatur humor, solius cineris aspersione gaudere. In terra soluti lateris ponunt, quod prodesse certissimum est.

Theophrastus rutam semine nasci aliquos negare refert, verum tardè oriari, qua de causa furculo eam serere solent. Ruta non ex prora, sed ex palmitibus exir, & auulsione. Cassianus feliciter feri ait. Columella, Autumno semine satam mense Martio deferre oportet in apricum. Februario prouenit se-

mine, vel plantis ruta. Plinius. Ruta quoq; feritur Fauonio, & ab æquinoctio autumni. Seritur è furculo melius in perforatam fabam indito, quæ succo nutrit comprehendendo furculum. Seritur & à seipsa, nanq; incuruato cacumine alicuius rami, quum attigerit terram, statim radicitur. Palladius, Martio mense, si ponas semina eius, adhuc clausa folliculis singulatim manu debet affigere, si iam minuta sunt, iactabis, & rastreo obducta cooperies, caules eius, qui inclusis seminibus nati fuerint, fortiores erunt, sed serò nascentur. Ramuli eius cum aliqua corticis parte conuulsi, verno tempore pro plantis tenebunt, tota verò translata morietur. Nonnulli ramulos eius pertusæ fabæ inferunt, vel bulbo, atq; ita obruunt, alieno vigore seruandos.

Cultus.

Aqua salsa rigatam Theophrastus rutam melius provenire dixit. Cuius ex eo rationem in brassica adduximus. sic etiam cinere radicibus aggesto, qui facit siccitate sua ut radices neq; vermem, neq; putredinem sentiant. Et alibi. Cinis radicibus congestus, siue ne radices vermulentur, seu etiam salugine coalescant: habet enim similem quandam vim calefaciendi. Rutam runcari etiam oportet, durescit enim & exarescit, sed dimutilata, & in ramos dispersa, amplior, melior, sapidiorq; redditur. Cuius etiam rationem ex eo in brassica reddidimus. Aquam simūq; sanè olera omnia diligunt, ruta excepta, hæc enim fimi aspernatricis penitus est. Quæ omnia Plinius ex eo transtulit. Odit humorem ac simū, cinere vult nutrir, hic & semini miscetur, ut careat erucis. Peculiaris medicina rutæ in salis aquis, quæ & alioqui plurimū sanitati conferunt & fertilitati. Cæterum dulcium aquarum rigua profunt. Rutam furtiuam tantum provenire fertilius putant, sicut apes furtivas pessimè. Nec ferro tangi expedit rutam, author est Sabinus Tyro. Columella, Runcari debet ruta, donec coalescat, ne herbis enecetur, sed nec lata manu debet runcari, quam nisi contexeris, perniciofa nascentur vlcera. Si tamen per ignorantiam nuda manu runcaveris, & prurigo, atq; tumor incefferit, oleo subinde perungatur. Multis annis durare innoxia potest, nisi mulier, quæ in mensuris est, contingat eam. Ab eo Plinius: Durata runcatur non sine difficultate, proponentibus vlcerebus, ni munitis manibus id fiat, oleo ve defensis. Florentinus Gra-

Ars.

cus: Fimum horret, ideo per hyemem cinere cupit ali, sic etiam natiuus calor frigoribus obstitit. Fictilibus melius feritur. Immundæ mulieris & accessum, & omnem prorsus attactum metuit, siquidem eo confestim enecatur. Palladius, Non effodi herba, sed optat euelli, immundæq; mulieris reformidat attactum. Ficui insitam rutam optimè provenire testantur authores. Aristoteles suis problematibus percontatur, Quam ob causam rata insita in ficum, pulcherrima plurimaq; proveniat. Inseritur verò inter corticē, limoq; obducto fouetur. An quod rutæ radix fomentum, teporemq; desiderat, itaq; cinere quoq; circumdata iuuatur? ficus autē calida est, quod eius succus omnium acerrimus docet, & fumus, quem etiam abundè emittit: habet igitur calorem, atq; humorem talem, qualem etiam cinis, quamobrem si ille iuuare possit, multo magis ficus,

ficus, quæ copiam peruo affluit, ficus eius consumitur ex eo melius redditur, c in fixam ferere, & ille fici super alim cinis congestus ralescant: habet enim Symposiacis suam ro & suauior sapore, liqua dulcedine r traria ratione ficu vtramq; sententi commendat, quæ nius: Amicitia est sub hac arbore. P qui maledictis qu

DIXIMVS d in hortis rut mus suo odore sen ita & in hac nost phrastus in rer oler nus iucundissimi Græcis & in quæ exuctis montibus eibus vnā coalesc vel à medendis s insitum reuocan Nostri qui sunt b salua, quod ad m incolumes homi numeros penem mulieribus huius Theophrastu ste & paxeron. Sphacelus & syluestre dixeris scabrius. Hæc ex mosus, longus, vir

ficus, quæ copiam atq; vigore eo magis præstabit, quo humor cineri non perpetuo affluit, fici autem irrequieto confluuiio manat: utpote cum arboris succus consumi ex toto non possit. Theophrastus, Quicquid in aliud feri possit, melius redditur, ceu ruta in fico, sic enim optimam fieri posse creditur. Cortici infixam ferere, & terra occultare consuevere, euenit namq; ut humor lacteus ille fici super alimoniam auxiliari quoq; suo calore valeat opportunè, sicut & cinis congestus radicibus, siue ne radices vermiculenter, seu etiã salugine coalescant: habet enim similem quandam vim calefaciendi. Plutarchus etiam in Symposiacis suam affert causam, Ruta quæ sub fico profilit, aut innascitur illi, & suauior sapore, & mollior habetur, causamq; subiūgit, quod vel eam ficus aliqua dulcedine recreet, vel grauitatem satietatēq; restinguat, nisi potius contraria ratione ficus alimentum alliciens ad se, simul acrimonium aboleat. Sic utramq; sententiam Plutarchus confirmauit. Dioscorides eam solam rutam commendat, quæ prope arborē fiti subnascatur, reliquas ferculis abdicat. Plinius: Amicitia est ei & cum fico in tantum, ut nusquā lætior proueniat, quàm sub hac arbore. Palladius: sub ficus arboris umbra libentius acquiescit. Prosequi maledictis quum ferūt eam certissimum est, ac melius furtiua proueniet.

De saluia. CAP. L.

DIXIMVS de ruta, dicturi de saluia. Solebant veteres illi rerum scriptores in hortis rutam iuxta saluiam plantare: nam illa ut superius iam diximus suo odore serpentes ex hortis fugat, saluia serpentes & buffones accersit, ita & in hac nostra villa alteram iuxta alteram collocare statuimus. Theophrastus inter olera connumerat, multisq; condimentis aptissima. Florentinus iucundissimum asserre apibus pabulum rerur.

Græcis ἐλελίσφακος, ex arenæ & cinereo squalore foliorū, qualis in torridis & exuclis montibus enata saluia est, deducto nomine ab ἐλελίσεν, & σφάκος, vocibus vnà coalescentibus, quasi sole afflatam, tabefactam, ac syderatam dicas, vel à medendis sphacelo penè demortuis partibus, natiuum calorem, roburq; insitum renocando nostræ vitæ primordia. Latinis saluia dicitur, ex Plinio. Nostri qui sunt herbarii elelispakon Græcè, Latine saluiam vocant. Diciturq; saluia, quod ad multa, & præsertim ad fecunditatem sit salutaris, & saluos & incolumes homines præstet: nam grassantem in Copto Egypti pestem innumeros penè mortales rapuisse ferunt, reparatamq; multitudinem coactis mulieribus huius herbæ succo ad conceptum uti.

Theophrastus duo saluiæ genera fecit, satium ἐλελίσφακον vocauit, syluestre σφάκελον.

Genera.

Sphacelus & saluia inter se distant, quasi alterum urbanum, alterum genus syluestre dixeris. Spacelo folium læuius, contractius, minusq; squalens, saluiæ scabrius. Hæc ex Theophrasto. Dioscorides sic depingit saluiam. Frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrāgulas, cauas, folia mali cotonei effigie, sed

Description.

longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensum attritarum quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui, semen summis caulibus sylvestri hormino simile gerit. Plinius, Est & sylvestris eleisphacos dicta à Græcis, ab aliis phacos, est & satiu lente leuior, & folio minore, atque sicciore, odoratiore. Est & alterum genus eius sylvestris, odore graui, hæc mitior. Folia habet cotonei mali effigie, sed minora & candida. Saluiam mentæ similem, cauam, odoratam, sed Græcorum sphacos, & sphacelos nomina causam dederunt errandi Plinio, vi saluiam in frugum censu reulerit inter lentis species, & Theophrasti, & Dioscoridis delineationes de salua hortensi, & sylvestri in vnum commiscuerit.

Cœlum. Substinet quodcunq; cœlum, & si apricum mihi desiderare videatur.

Solum. Dioscorides in asperis nasci dixit.

Salio. Seritur semine, Ianuario, Februario, & Martio. Sic etiam Octobri, Septembri, & Nouembri. Seritur plantis & surculis. Sed melius Martio mense. Lixiuo & cinere fruticem muniunt olitores, & sic latiore prouenire testantur. Frigora non horret, hybernis temporibus viuit, in quibus premente olerum penuria iuribus innatat.

De siliquaastro. C A P. L I.

PIPERIS vice, quod ex India nobis defertur, herba cuiusdam siliquis, & granis, quod suo piperis gustu iura commendat, quam sæpissime in condimentis utimur. Sunt qui putent Plinii esse siliquastrum, quum notæ aliquæ, quas suo siliquaastro ipse ascribit, huic nostro adamussim respondeant. Nos hortis nostris, & vasculis, tum plantæ spectaculo, tum culinis, eam ferimus, & colimus.

Nomen. Plinius siliquastrum, & piperitim vocat: videturq; convenientissimo nomine dictum: nam & siliquas nimium longas, & recuruas producit, eiusq; semine & siliquæ cortex gustu, maximam piperis acrimoniâ & sapore præ se fert. Auidenna videtur appellare ziziber caniuū. Nos Neapoli *pepe d' India* dicimus.

Genera. Plura sunt apud nos genera. Est genus vnum, quod longas, aliud quod breues siliquas profert, aliud autem rotundas, maiores, paruas, & in modum cucurbitæ viatoriæ.

Descriptio. Siliquastrum, vel piperitim ita ex Castore delineat Plinius, caule rubro, longo, densis geniculis, folio latiori, semine albo, tenui, gustu piperis. Et alibi, gustu piperis, magis etiâ siliquaastro, ob id piperitidis nomine accepto. Addimus nos. Confurgit caule cubitali, atq; etiam longiori quadrangulo, geniculis inter septo, ramis amplioribus brachiato: foliis hortensi folano non dissimilibus sed maioribus, longioribusq; floribus candidis, pusillis, ex quibus vaginula oriuntur in mucronem sensim turbinatæ, nitido virore, & lauore, crasso pediculo innixæ, per maturitatem rubidæ, coralli modo, coriaceæ, quæ dehiscentes semen ostendant candidum. Sed semen, vel valuula degustata, tanta sunt

comburendi

comburendi licentia
tatur. Etate flor
pillamentis fibra

Solum putridu

Cœlum calidu

Ex Plinio, semine

De her

ACONDIM
Am prima b

10 fructus. Male nob

patrii oleris histo

stare ait. Plinius,

Medicus priuatim

stum, & Dieuche

brarint. Ionesiur

cander, & Hippo

bant, Athenæi au

plex ministerium

bero patre vitibus

20 tum prodidere, v

entes his fabularu

ci, quorum primus

modum videti poi

torqueri, inimicu

tra temulentiam p

ra, luxuriantes ei

propius accedere

dia. Latini verò,

sic clauiculis admi

30 gunt, vt animant

vii apelliferis &

gere. Carot: Si v

cœnam esto crud

sto alia quinque

tum voles. Idem

recedente in cib

erraticam inimi

sit fugere, mori

tes, moris est, on

40 tu præmittere,

comburendi licentia, vt os, linguam, palatum igneo feruore conflagrare sentiat. Æstate floret, dein in siliquis semen producit, radice vnica, subalba, capillamentis fibrata.

Solum putridum, & macrum, aut roscidum quærit, ex Plinio.

Solum.

Cælum calidum videtur exoptare; quum nobis ex India adlatum sit.

Cælum.

Ex Plinio, semine feritur.

Satio.

De herbis escariis, & primò de brassica. CAP. LII.

ACONDIMENTARIIS ad escarias herbas transeamus. Se offert omnium prima brassica, cuius à vino, atq; messe tertius est hic Neapolitanis fructus. Male nobiscum actum videretur, si sine aliqua laudis præfatione ad patrii oleris historiam deueniremus. Cato brassicam omnibus oleribus antestare ait. Plinius, eius laudes longum esset assequi, dixit, quum & Chrysippus Medicus priuatim ei volumen dicauerit per singula membra hominis digestum, & Dieuches, ante omnes autem Pythagoras & Cato non parcius celebrarint. Iones iure iurando per brassicam suam fidem astringebant, vnde Nicander, & Hippocrates brassicam *μαύνη*, id est, vatem, quasi sacram appellabant, Athenæi autoritate. Varro vtilissimam apibus tradit, immo ex ea duplex ministerium præberi, ceram & cibum. Fabulantur Græci Lycurgum à Libero patre vitibus adalligatum illachrymasse, è cuius lachrymis hoc oculus natum prodidere, vt Nestor in libro, qui alexicephos inscribitur, narrat: innucentes his fabularum inuolueris pernicialia brassicæ, & vitis odia. Referunt Græci, quorum primus Theophrastus, rem sanè admirabilem, vt fascinum prope modum videri possit, vitem acri odore huius oleris fugari, & eius flagella in torqueri, inimicum fugiens odorem, & hoc argumento vsus Androcles contra temulentiam pollere credidit. Beritius autem: Si brassica fuerit viti adfita, luxuriantes eius palmites potius repandi curuabuntur, quàm recti velint propius accedere, tum quia sicca naturæ, tum intestina qua flagrant discordia. Latini verò, è quibus Cicero libro de Natura deorum, Iam verò vites sic clauiculis adminicula, tanquam manibus apprehendunt, atque ita se erigunt, vt animantes, quæ etiam à caulibus, brassicisquæ, si propè nati fuerint, vt à pestiferis & nocentibus refugere dicuntur, nec eos vlla ex parte contingere. Cato: Si voles in conuiuio multum bibere, cœnarequælibenter, ante cœnam esto crudam quantum voles ex aceto, & ita vbi cœnaueris, comesto alia quinque folia, reddent te quasi nil ederis, biberisquæ, bibesquæ quantum voles. Idem Varro. Plinius ait vino aduersari, vt inimicam vitibus: antecedente in cibis caueri ebrietatem, postea sumpta crapulam discuti, & erraticam inimicissimam vino, quam præcipuè vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Apud Ægyptios, qui magnopere vini sunt amatores, moris est, omnibus esculentis brassicam crudam, vel eius semina in cibatu præmittere, vt crapulam sedarent, quod & de Sibaritibus Timeus etiam

tradidit, immò vineam, in qua brassica nascuntur, languidius afferre vinum, Athenæus est author. Beritius item: Si quis feruentem in ollam brassica vini paululum guttatim instillarit, ne amplius quidem excoquetur, sed suis viribus defuncta ad perniciem trahetur. Plinius: Brassica corrumpitur in dolio vini sapor, odore betæ foliis demersis restituitur. Sed occurrit aliud ingens discordie miraculum: hoc olus, quo vitem fugari diximus, aduersum cyclamino, & origano arefcit. Sed Aristoteles in problematibus causam exquirat, cur brassica vini noxas restinguat, atq; id fieri quòd dulcem succum, discutientemq; obtineat. Vnde Medici eam aluo infundunt; frigida autē ipsa est, argumento quod ad alui vehementes deiectiones Medici ea vruntur, excocta in plenum, & suo caule purgata, refrigerataq;. Fit igitur detentis à crapula, vt eius succus humores in aluum detrahat, qui vinosi crudiq; tenentur, & ipsa supra in ventriculo remanens, corpus refrigeret, quo fit vt tenues humores ad vesicam labantur, quod quum humor vtrinq; educatur, corpus refrigeratur, rectè liberari à crapula possint. Vinum enim humidum, atque calidum est. Euenit ad hæc, vt quum humores deorsum se trahunt, atq; excernunt, statum etiam secum deducant, qui si per vinum liceat, in caput se efferens, grauitatem creat: sin autem deorsum se vertit, corpusq; ob causam prædictam refrigeratum est, dolor crapulæ omnis tollitur. Est enim crapula feruor quidam, & desinens inflammatio, quæ plus conficit, quàm remulencia, quòd mentem illa quatit & alienat, crapula autem mente sibi constante, dolorem admouet: vt enim qui febre vrgente, ludunt potius, quàm dolent, iidem vbileuari malo fuere; atq; ad se redire, in dolere occipiunt. Hoc enim in crapula quoque, vt in remulencia euenire solitum est.

Roman.

Vetus Græcia brassicam *καρὰν* vocauit, vt Aristoteles, & Theophrastus ex Polluce, Theocricus etiam, quod testatur M. Varro. Apollodorus Caristius ad id, Raphanum quod vocamus nos viri, hoc vos externi brassicam vocatis, vt videre est apud Athenæum, quæ res ansam præbuit Plinio errandi, vt raphano ascripserit, quæ de brassica protulerit Theophrastus & alii, vt videbimus in hoc capite, & vbi de raphano loquimur. Subsequuta ætas *καρὰν* vocauit, dictaque censetur, quod oculorum pupillas, quas Græci *κόρες* vocant, obtundat, hebetetq;. In hanc sententiam iussisse Columellam testantur carmina in suo hortulo,

Nunc veniat quamuis oculis inimica corambe.

Attici integro nomine *καρὰν*, sed priori etymii exemplo protulerunt, quasi *κόρες ἀμύβαν*, vel *ἀμύβαν*, quod crapulæ aduersetur, qua quidem commutatione apud omnes notissima. Hæc tot exercuit, & exercuciauit Grammaticos illo Satyrici senariolo,

Occidit miseros cramberepetita magistros.

Sunt qui brassicam dicant *καρὰν* à *vorando* dici, quum à tota plebe cub, tum cruda, tum cocta, vel muria seruata edatur. Latini brassicam *ypocarr*, quasi

quasi passica. Vnde etiam Pompeius xeris oleribus instillarit.

Theophrastus

plura brassicarum

quæ ab antiquis

ni brassicam in

lauem, & crispam

quædam ægela dicitur

tundo, copioso

liciendas aluos.

ua, & foliorum

tera scabra, tum

quædam in radice, i

folia ferat rotunda

multis exeuntia,

co sallo gustu, ali

cho inimica, ac

sem vocat, horum

lis, & acerrima

medicamento sic

tree. Folia habet

didior sativa, & h

stris brassica à Dio

sativa nil, nisi ferit

generis à brassica.

ruptisq; locis m

tior, amara. Al

bus adnascens,

existimabis. Ne

discriminabimus

stans foliis. Crisp

te, & foliorum

vocari scripserit, a

dum valentior e

utilem, aluam

duatum est spec

incoctus, tene

crepse torsit. A

bus constat foli

Eudami autori

quasi passica. Varro. Quod ex scapo minutatim præsecatur, & passa fiat, quod etiam Pompeius affirmat. Itali *cauli*, Neapolitani *foglie* vocant, quod præ cæteris oleribus insigni caule, & folio vigeat.

Theophrastus multiplicia, variaque genera brassicæ dixit. Neapoli quam Genera. plura brassicarum genera visuntur, omnia per censere odiosum duximus, sed quæ ab antiquis narrata, & nobis insigniora, satis erit attingere. Græci & Latini brassicam in tria partiuntur genera, in sylvestrem, sativam, & hanc in læuam, & crispam. Primo à sylvestri exordiemur. Sylvestris Theophrasto *ράφανος ἀγρία* dicitur, & hæc est eius forma. Folio læui, & breui, atque rotundo, copioso: fruticosaque, sapore aspero, & medicamenti instar ad eliciendas aluos. Caules peculiare sortitur, rotundos læuiore, quàm sativæ, & foliorum appendicem rotundior, folium minus angulatum, cætera scabra, tum foliis, tum caulibus, acrior, vehementiorque. Dioscoridi *πράμνη θαλάσσια*, id est, marina brassica, dicitur, prorsus à sativâ abhorret, quod folia ferat rotunda aristolochiæ, prælonga, tenuia, singula, à rubentibus ramulis exeuntia, singulari ut hederæ pediculo, albo succo prædita est, sed pauco falso gustu, aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissima, aluum ciet in cibo cocta. Cato *πράμνη* vocat, horumque verbis suffragatur. Minimis caulibus, tenerioribus foliis, & acerrima omnium, tenui succo vehementissima, & omnibus brassicis medicamentosior. Plinius à Catone describit: Sylvestris erraticæ, & petrea. Folia habet bina, parva, rotunda, lævia, plantis oleris similior, candidior sativâ, & hirsutior. Neapolitani *soldanella* dicunt. Sed alia est sylvestris brassica à Dioscoride descripta, quæ rectius sylvestris dici posset, quum à sativâ nil, nisi feritate, & succi amaritudine discreper, prædicta verò est alieni generis à brassicâ. Ipse depingit hoc modo. Sylvestris brassica marinis, præruptisque locis magna ex parte gignitur, sativæ similis, sed candida, hirsutior, amara. Abundat histotus Surrentinus tractus, præruptis crepidinibus adnascens, mari imminetibus, quod nisi gustum consulueris, sativam existimabis. Neapoli vulgò *foglie seluaggie*. Sativum genus in duo genera discriminabimus à foliorum differentia, unum crispis, alterum lævibus constans foliis. Crispum à Theophrasto *ἐλάφυλλος ῥάφανος* dicitur, succi bonitate, & foliorum amplitudine lævi præstantior est. Cato à Græcis *σελινουειδὴ* vocari scripsit, ab apii similitudine: aspectu, & natura bona, ad euacuandum valentior est lævi. Athenæus *σελινουσίαν*, Plinius selinada stomacho utilem, aluum mediocriter mollientem, & apianam dicit. Hæc apud nos duarum est specierum, alterius caulis extrumescit in medio, qui iuribus incoctus, teneritudine & sapore cæteris antecedit. Neapoli vulgò *foglie crespe torsute*. Alterius verò extenuatur. Brassicarum genus, quod lævibus constat foliis, Theophrasto *λεῖοκαυλος ῥάφανος* dicitur. Hanc Athenæus Eudemi autoritate omnibus locis nasci scripsit. Catoni *λεῖα*, grandibus

& latis foliis, caule magno. Et Plinius, quæ à Catone excepit, Extentis foliis, caule magno. Neapolitani vulgò *foglia comone*. Nos hoc genus in plures species diuidemus, & inter eas, quæ à Columella & Plinio describuntur enarrabimus, nobisq; insigniores. Lauem hanc brassicam in duas diuidemus, colore inter se differentes, in nigram videlicet & albam. Nigræ caulis semper tenuis, nec vnquam extumescit in medio, nec eadem teneritudo, quæ albæ, nec sapor dulcis, & delicatus, sed quodammodo acris, velut sylvestris species, huius aquam decoctæ maximè omnium fœtere humi affusam, etiam à Plinio narratur. Apud nos vili habetur pretio. Seritur tamen quia contra frigus peruiçax genus est, & hyeme feritur, & plantatur, & etiam hyeme cauliculos, & cymas edimus, ne quis dies sine caulibus sit, quod non contingit in aliis generibus. Omnibus est & laus foliis, & consili cymarum luxuria. Seruntur locis frigidis, quibus albæ feri non possunt, vt circa Samnites, & Brutios. Columella in hortulo, *Brutia qua tellus*.

A quo Plinius: Brutiani frigore aluntur, prægrandes foliis, caule tennes, sapore acuti; flore albo. Neapoli *foglie nere*. Sub albæ brassicæ nomine, plures in eam familiam species venerunt. Meminit albæ brassicæ Cassianus, ac Februario feri debere. Inter eas altera, cui tenuis caulis: altera, cui in-rapi modum extuberat. Hæc apud nos maximo habetur pretio, quippe tenerrima germina cauliculi: & pars ea in medio foliorum extuberans, pinguibus iusculis, & medulla incoqui solent, ac quotidiano nascuntur cibo. Imbecillis est, & frigora non tolerat, floret flore albo, & luteo. à Columella Pompeiana dicitur, nomenque à natalibus locis usurpauit, quum ibi oriunda credatur.

Quæ dulcis Pompeiæ palus vicina salinis

Herculeis, nuncq; Siler qui defluit amni.

Vocat Pompeianum genus à Pompeianis Campaniæ populis, qui prope Neapolim fuerunt. Hercules enim debellans Hispaniis, Geryonis Regis armenta exportans, in suam patriam rediturus, ad Vesuium montem bello inualidos milites reliquit, & ibi constructis tectis, oppidum exædificauit, Heracliam nomine, promouens castra ad octauum lapidem: quum ad Saranum ventum esset, veteranis alia mœnia extruxit, qui de triumphali Pompeia fuere Pompeiani dicti. Et quemadmodum Pompeianis & Herculanis idem fuit ortus, idem fuit etiam occasus, quippe conflagens Vesuius eis imminens, utrosque absumpsit. Nostri temporibus incendiorum iniuria versa sunt in vicos, vbi Herculanis cadauer sepultum existimamus, vulgò *la torre del greco*, octauo à Neapoli lapide, Pompeiani verò *la torre dell' Annonciata*. Plinius Pompeianum procerius aricino, caule ab radice tenui, intra folia crassescit, rariora hæc, angustioraque: sed teneritas in docte fit, frigora non tolerat, Neapoli vulgò *foglie torzute bianche*. Hinc admirabiliter Matthiolum suis in Dioscoridem commentariis scripsisse id brassicarum

earum genus an
ca tenuicaulis v
ta astate largit
num vocat in ho

Plinius ab eo.

tenuius hoc vili
cauliculis peculi
genus excellens a
pite, crassitudine
candicante, in la
te patula cyma, h
species, qui galli
lunt, vt alte extol
vnum crispissim
frondium, huic in
peruicaci, caulicu
frigidis Samnit
gò *foglie crespe d*

Quæ

Plinius ab eo.

studo caulem ex
nim populi monte
id genus obnoxii
familiarissima ap
tis formam extub
glomerantur, ext
luminibus, exten
quum in florem
nerefcit frigonib
vocat lacuturres

Et tur

Plinius ab eo. N
lacus rursusq; qu
porrecti, alii in la
dale aliquando c
quæ non pascunt, qua
ius alteri genus,
scilicet ab eo nol
rependa, quæ nor
ui interna, eorū sp

carum genus antiquos latuisse, quā à Plinio satis clare describatur. Alba brassica tenuicaulis vltatissima apud nos ob cauliculorum abundantiam, quam tota æstate largitur. Huius duo genera, depressus, & excelsus. Columella aricinum vocat in hortulo suo,

— *Et mater Aricia porri.*

Plinius ab eo. Aricinum altitudine non excelsius, folio numerosius, quā tenuius: hoc vtilissimum existimatur, quia sub omnibus penè foliis fruticat cauliculis peculiaribus. Neapoli dicuntur, *foglie branche non torsure*. Alterum genus excelsius attollitur, circiter quindecim pedum altitudinem, simplici stipite, crassitudine brachiali, leniter rubenti, folio prægrandi, carnosio ex cæsiso candicante, in latus vtrinq; diffuso, procurrentibus venarum toris, fruticante patula cyma, flore luteo, & albo. Nascitur Surrento & Stabiis. Serunt eas species, qui gallinas, aliàsve aues cohortales alūt. Ab imis radicibus folia euellunt, vt alte extollatur. Neapoli satq; degenerant. Vulgò *foglie alte*. Est & genus vnum crispissimis foliis, satis à primo genere diuersum: nam ei per ora tantum frondium, huic in totum crispatur, folio satis amplo, ac duro, ac contra frigus peruicaci, cauliculorum copiosissimum, qui inter cæteros sapidissimi sunt: in frigidis Samnitum regionibus perennat, illinc ad nos trāslatum. Neapoli vulgò *foglie cresse d' Apruzzo*. Columella in suo hortulo Sabellicos vocat.

Quæ duri præbent cymosa stirpe Sabellicæ.

Plinius ab eo. Sabellico vsque in admirationem crispantur folia, quare crassitudo caulem extenuat, sed dulcissimi perhibentur ex omnibus. Sabellici enim populi montes incolunt inter Sabinos & Marfos, à Sabinis orti. Est tamen id genus obnoxium pediculis, qui sub rugis, & laciniis latitant. Brassica item familiarissima apud nos est, quæ ferè toto anno victitamus, hæc enim in capitis formam extuberat, nonnunquam sesquipede crassi. Folia eius ambitu conglomerantur, exterius callosa, per ambitum erugata, multis intus carinarū voluminibus, externis semper interiora complectentibus, nunquam non nisi quum in florem exeunt, delitescantibus, quum gelicidia sentit, grata cibus, tenerescit frigoribus, humili caule, iis hyeme præcipua nobilitas. Columella hæc vocat lacuturres.

Et turri lacus.

Plinius ab eo. Nuper subiere lacuturres ex valle Aricina, vbi quondam fuit lacus rursiq; quæ remanet, capite prægrandes, folio innumeri, alii in orbem porrecti, alii in latitudinem torosi, nec plus vllis capitis post tritium, cui pedale aliquando conspicitur. Cyma nullis serior. Hæc Nicandro & Galeno καλωπὶς γαστήρ, quasi capitulatū olus dixeris. Neapoli *foglie cappuccie*. Est & huius alterū genus, spurium dictū, nam superius recensitum legitimū vocant, desciscens ab eo nobilitate, folia habens nigriora, duriora, breuioraq; sursum repanda, quæ non in absolutū orbem coeunt, sed summam fathiscentia, breui interna, eorū spatio explicantur non vsq; adeò conuolutis foliorum panicta-

lis. Vulgò *foglie cappuccie basturde*. Hasq; videtur Plinius innuere, quum dixit. Alii in latitudinem torosi, quum non clauduntur. Horum alterum est genus, quod nobis ex Liguria affertur, vasta magnitudine, eximio candore, mira teneritudine. Sed Neapoli satum degenerat, nec nisi magna folia, dura, & nigra affert. Neapoli *foglie cappuccie & Genoma*. Aliud est genus brassicæ Cumanum ab antiquis dictum. Columella,

Quæ pariunt veteri cespicio littore Cuma.

Plinius: Cumanum sessile folio, capite patulo. Diphilus Syluius dulce, laudatissimumque, in Cumis nasci dixit, scribente Athenæo. Nicandro etiam:

Aspæra nutritur Cuma prauisq; coloris,

Quæ soleas sarcire solent, non esse videtur

Pellibus assimilis.

Quantum verisimili coniectura assequi possum, genus vnum est præcox nobis dictum *foglie di Pozzuoli*. Sunt & aliqua à Columella descripta, scilicet quæ ex Marrucinis veniunt. Populi sunt prope Marîos.

Quæ Marrucini quæ Signia monte Lepino.

Est tamen Neapoli genus vnum foliis laciniatis, imò scissis per totum & crispis, omnium optimi cauliculi, quum facile coquantur. Vulgò *foglie francese*. Genus est aliud huic cognatum, quod è medio folio cauliculos producit, mira naturæ proprietate, ut carpophyllos dici possit. Alterum est genus, quod omnium nobilissimum iudicamus, puta ex specie lacuturrium. Grandi assurgit caule, folio lato cymosum, cuius cacumen omnium maximum, ut vix florem duobus, indice & pollice, diductis in circulum digitis complecti posses, prius subferuefactum, mox oleo & sale suffusum in acetariis magnatum mensis apponitur: ab huius floris excellentia, vulgo *caule fiore* dicitur. Huius oleris penuria apud nos est, solo & cælo repugnantibus, quippe semen è Cypro nobis aduectum primo anno coliculos & flores affert, secundo anno degenerat, & ad nostrates redit. Nec id nobis mirum videri debet, quum Athenæo authore, semen brassicæ è Rhodo in Alexandriam delatum, dulce primo anno brassicam, postea à bimatu regionis viriū suscepit. Est etiā, Plinius inquit, sua gratia non nunquam plantæ habitu excellentibus, balmyrida vocat, quoniam nisi in maritimis non proueniunt: nauigatione quoq; longinqua viridibus adseruatis. Statim defecti ita ne humum attingant, in cados olei quā proximè siccatos, obturatosq; conduntur, omni spiritu excludo. Eudemus Atheniēsis brassicā in sua digessit genera, halmysin, ciispā & lauē, sed halmysin ob suauitatē principatū sibi vèdicare. Nascitur in Eretria Cuma, Rhodo, Gnido & Epheso, ex Athenæo.

Celým.

Palladius caules omne cæli statū substinere dixit, sed frigidū magis, contra Austrum positi, citius ferunt, contra Septentrionē serius, sed hic caulis & sapore, & robore vincit. In Germania optimi proueniunt, nec erucas gignunt, ut in calidis regionibus. Apud Samnites omnium lapidissimi dulcedine, & teneritate, ubi maximum frigus. In Apulia, ubi maximus estus, saporis amari, & degenetis.

Theo-

Theophrastus
solum pingue, &
ne & arena non d
ponendis plantar
ait, finis humore
rior fertilitas, fin
fimi carmina, quæ
falsis locis feri iob
sam terram cribro
Theophrastus
firium mente iuli
rustate excludum
ut naturam comm
contra extraporum
caulis, in genere o
dam mutari vident
sed raphanum mu
producere, & vice
Plinius: ex semine
confirmat. Colum
frigidis & plauis
pressa plantæ qu
stercorata, melius
mam. Nonnulli ha
maior pars eius in
quam est semel de
si facias, plus sem
bruario mense cau
re, & surculatione
incrementi, quia la
pidio iam dic, si as
Iunio mense brassi
iriguo loco, vel pl
rem, ut plantas e
olus, & vere possit
serere possumus, c
toto anno feritur
tio autumni. Tr
latione præstat pr
teriorque caulicu
line castigatione T

Theophrastus solum sabulosum amare dixit. Palladius stercore gaudere, & solum pingue, & satis subactum diligere, argillam & glaream timere, sabulone & arena non delectari, nisi perennis vnda succurrat. Cliuis delectari, ideo ponendas plantas per pulvinos arearum. Plinius hos authores concordans ait. Fimus humorque si defuere, maioris saporis gratia est: Si abundauere, latior fertilitas, fimus asininum maximè conuenire. Varro Nestoris sapientissimi carmina, quæ in Alexicepo scriptum reliquerat, interpretatus, brassicam falsis locis feri iubet, dum trium foliorum erit, nitrum tritum, aut falsuginosam terram cribro excussam aspergere, ut quasi pruina resperfa videatur.

Solim.

Satir.

10 Theophrastus brassicam ex prima semine esse dicit, quæ post æstiuum solstitium mense Iulio fit, decimoque à satu die se demonstrat. Sed ne sit semen vultustate exuctum: nam semen vetus tantum valet in quibusdā, Varrone auctore, ut naturam commutet: nam ex semine brassicæ vetere sato, nasci aiunt rapa, & contra ex raporum brassicam. Videretur idem Theophrastus sensisse libro de causis, In genere olerum quædam suâ speciem seruant, ut brassica & alia, quædam mutari videmus. Cassianus brassicæ semen inueteratum non in rapam, sed raphanum mutari dicit. Florentinus rapæ semen post tres annos brassicam producere, & vice versa. Palladius: vetustam semen brassicæ mutari in rapam. Plinius: ex semine brassicæ veteri rapa fiunt, atque inuicem. Quod etiam Auerroes confirmat. Columella, Brassica quum trium foliorum erit, transferri debet, frigidis & pluuiis regionibus, positio eius optima post idus Aprilis, cuius depressa plantæ quum tenuerint, quantum olitoris ratio patitur, sepius sarrita, & stercoreata, melius conualefcit, pleniorisque incrementi, & coliculū facit, & cymam. Nonnulli hanc eandem locis aprioribus à kalendis Martiis deponunt, maior pars eius in cymam prosilit, nec postea hybernum caulem amplū facit, quum est semel defecta. Possis autem vel maximos caules bis transferre, idque si facias, plus seminis & maioris incrementi præbere dicuntur. Palladius, Februatio mense caules feremus, quin & toto anno feri possunt, gaudet stercore, & surculatione. Rarius positus conualefcit. Ponendæ sunt plantæ maioris incrementi, quia licet serius comprehendant, fortiores sunt. Si hyems est, tepido iam die, si æstas, quum sol in vespæram declinatur, planta pangenda est. Iunio mense brassica feri debet, quam inchoante transferemus Augusto, vel irriguo loco, vel pluuiâ iniunctante madefacto. Sed vtilius Septembri mense feremus, ut plantas eius Nouembri inchoante transponas, de quibus & hyeme olus, & vere possit cyma produci. Aprili ultimo, & vere transacto brassicam ferere possumus, quod cauli seruiet, quia cymæ tempus amisit. Plinius: Brassica toto anno feritur, quoniam & toto fecatur. Vtilissimè tamen ab æquinoctio autumnii. Transferitur quum quinque foliorum est. Cymas à proximatione præstat proximo vere. Hic est quidem ipsorum caulium delicatior, teneriorque cauliculus, Apiciluxuria, & per eum Druso Cæsari fastiditus, non sine castigatione Tiberii patris. Post cymam ex eadē brassica cōtingunt æstiuum

quum dixit,
no est genus,
ore, mira te-
dura, & nigra
Cumanum

is dulce, lau-
ro etiam;

m est præcox
cripta, scilicet

er totū & cri-
gliefrancefe.

roducit, mira
us, quod om-

andi affurgit
vix florem

posset, prius
in mensis ap-

oleris pe-
Cypro nobis

degenerat, &
o auctore, se-

no brassicam,
a gratia non-

nili in mari-
seruatis. Sta-

atos, obtura-
ficā in sua di-

principatū fi-
ex Athenæo.

magis, contra
aulis & lipo-

ignunt, ut in
& teneritate, 40

& d. generis.
Theo-

autumnalesq; cauliculi, mox hyberni, iterumq; cyme, nullo eque genere multifero, donec sua fertilitate cōsumatur. Tertia circa solstitium, ex qua si humidior locus est æstate, siccior autumnō plantatur. Humor firmusque si defuere, maior saporis gratia est, si abundauere, latior fertilitas. Fimum maximè asinum conuenit. Est hæc quoque res inter opera ganæ, quapropter non pigebit verbosius prosequi. Præcipuus fit caulis sapore, ac magnitudine, primum omnium si in repastinato feras, dein si terrâ fugientes cauliculos secas, à terrâque proceritate luxuriosa attollentes se, exaggerando aliam accumules, ita ne plus quàm cacumen emineat. Tritianum hoc genus vocatur, bis computabili impendio, & diōque. Auulsione brassicam nasci tradidit etiam Theophrastus, dummodo aliquid corticis adhæreat. Suspicio quidem in textu mendū, quum nunquam visum sit brassicam auulsione satam apprehendisse, impossibile enim reor. Hæc maiores nostri de brassicæ satione: nos hic sationum tempora, & modos ab earum generibus auspicabimur. Nigra Aprili seritur, transfertur primis imbribus Augusti, Octobri secatur cyma, vnde foditur, ac stercoratur, colligunturq; cauliculi vq; ad Martium, tunc efflorescens vsq; ad Aprilis medietatē. Alba crassicaulis, quā vulgò *torfutam* appellari diximus, bis anno seritur, primò Decembri, inde transfertur Februario, Aprili secatur cyma. secundo seritur Aprili, transfertur primis imbribus Augusti, secatur Octobri cyma. Si cauliculos expectas, medio caule secabis, sic adferet cauliculos Ianuario, ac Februario. Sunt eius cauliculi albi, tenues, teneriq; & omniū sapidissimi. Cassianus album genus Februario seri debere dixit, transferri Aprili, seri item Augusto, transplantari Octobri, sed id in Constantinopolitano climate, vbi maximum frigus, hic autem cælū indulgentius. Alba tenuicaulis seritur, vbi prius imbres Augusti terram madefecerint: transfertur Ianuario, & Aprili profert florentes cauliculos, tum secatur cyma, totoq; anno cauliculos affert, secundo anno secatur cyma Februario, cauliculos affert Martio, secatur tertio Aprili, sed singulis mensibus foditur, & stercoratur. Præcox Puteolana seritur Septembri, transfertur Aprili, Augusto abscinditur cacumen. Septēbri florentes cauliculos affert contra ceterorū morem. Quæ Aprili florescit, cauliculos affert, Septembri, Nouemb. Decēb. & Ianuar. Hæc Neapoli successiue ferūtur, ne vnquam & cymata & cauliculi defint. Est & genus terriū inter albam, & nigrā, inter tenuem, & crassicaulē, vulgò *castellonica*, cauliculos magnos affert, & copiosos. Seritur Aprili, transfertur Augusto, quū madescit aer. Cauliculos affert Februario, Marti, & Aprili. Capitata siue lacuturris siccis locis Ianuario seritur, transfertur Martio, secatur Maio, & Iunio, irriguis verò locis Augusto seritur, transfertur Septembri, secatur Octobri, totaque hyeme, cauliculos etiam affert. Hæc toto anno estur: frigore citius clauditur, & melius, plantatur crebrius. Sed quū tempus calidius erit, plantę teneriores sunt, quū plantantur, si frigidius, crassiusculæ sunt, hæc magis frigori resistūt, illa minus à calore excantur. In plātatione summæ radicularū partes truncantur, ne replicetur: nam

alioqui

alioqui humiles,
cum aliis, cepis
descendentibus illis.

Theophrastus
emolumentum: id
dulcor & teneri
tur. amaritudo, o
qua de causa falli
alimentum peru
brassica, ceteris
tur, sed hoc adu
liorq; redditur
fugo absunt, t
re sublato: quip
est, patet hoc ve
ram. Quum igit
cisque sentitur,
hoc idem conan
verò iam priden
pter neq; id aue
nusquam & om
enim fallugo ac
mor autem cont
ptimam fieri rati
ardore ad summ
ra. Reciso caule
les affert, vt tra
plicat, prima à
tur, plus attrah
coctum alimen
tis, quum nil sit
sursum alimen
que heretiam t
conferunt pro
nocet.

Columella d
& inuoluta trib
ra celerius mad
Celerius enim
rum, nitrū tri
inicitur. Plin
41
40

alioqui humiles, & semper retorridas producent brassicas. Possunt simul cum allis, cæpis interferi, vt quum extirpantur effceta, vacuū locum grandescenscentibus illis relinquant.

Theophrastus ait falsis aquis oblectari, falsugineque multum adipisci emolumenti: ideo Ægyptij nitro aquæ permisto brassicam aspergunt, vt dulcior & tenerior euadat, sicut cum prius sale commacerata, aquis coquitur. amaritudo, quæ in brassica est, referatis falsugine meatibus absimitur, qua de causa falsis locis brassica optima est: amaritudo enim saporem, tum alimentum peruertit: ea igitur sublata, dulcior, tenerior, altiorque efficitur brassica, cæteris verò rebus deterior redditur, quoniam nil alienum educitur, sed hoc adurit, quod eius familiare nimirum est. Brassica suauior meliorque redditur falsugine. acritatem & amaritudinem brassicæ in sitam falsugo absimit, tum etiā fragile quoddam efficit corpus totum nimio humore sublato: quippe sal ad trahendum, absumentumque humorem aptissimus est, patet hoc vel etiā cruda; frangi enim aliquas perhibent delapsas in terram. Quum igitur talis igni mandatur, facillime coquitur, & tenera dulcisque sentitur, scilicet vt consentaneum est: nam & qui nitrum iniiciunt, hoc idem conantur efficere. Veruntamen non pridem incipiunt. Natura verò iam pridem orsa, paulatimque prosequens, talem reddiderat. Quapropter neque id auersum à ratione est, vt circa solstitium, aut circa sydus, non nusquam & omnino per æstatem meliorescat, vt apud Eretriam. Tum enim falsugo acrius agit, euincitque, vt pote quum ea ipsa largior sit, humor autem contractior. In Ægypto quoque & locis eiusmodi omnibus optimam fieri ratio est. Salsugo autem siue à radicibus trahatur, siue à solis ardore ad summa ducatur, neutra sanè ratione immobilis esse possit in terra. Reciso caule regerminat, regerminatosque suauiores, & teneriores caules affert, vt tradit idem in historiis. Cuius rei rationem libro de causis explicat, prima à radicis potestate: decerpto enim caule, radix validior efficitur, plus attrahit alimenti, vt superioribus aliena concoctrix facultas percoctum alimentum foliis subministret. Præterea duris, lignosisque sublatis, quum nil sit, quod amplius impediatur, & intercipiat, quo minus feratur sursum alimentum, facilius proficit. Translatione meliorem, grandioremque fieri etiam tradidit. Plinius: Cuicumque generi plurimum suauitatis conferunt pruinæ, & nisi obliquo vulnere defendatur medulla, plurimum nocet.

Columella docet: Quum transfertur, radix eius liquido fimo prius illita & inuoluta tribus algæ teniolis, pangatur. hæc enim res efficit, vt in coctura celerius madescat, & viridem colorem sine nitro conferuet. Palladius: Celerius enim coquitur virore seruato, si dum est trium, vel quatuor foliorum, nitrum tritum cribello desuper spargas, & speciem candentis pruinæ imitetur. Plinius: Sunt qui plantam in transferendo alga subdita pediculo,

nitro ve trito, qui tribus digitis capiatur, celeriorē ad maturitatem fieri pūtent. Sunt qui semen trifolij, tritumq; simul nitrum aspergant foliis. Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit, aut Apiciana coctura oleo, ac sale, priusquam coquantur, maceratis.

Inf. rem. Nascuntur brassicis eruce, atq; vermiculi, has igitur humor collectus interimit, & simus acervatim iniectus. Industria enim bestiola cōdens sese, vt in stramento quiescit in stercore, quamobrem venari facile est, aliter nulla venandi datur facultas. Anatolius: Brassica à pulicibus infestatur, erucam cum ipsa serunt, vel plantant.

De beta. CAP. LIII.

BETA hortensium leuissima est. vsus iis (cū prius de radicibus betæ locutus esset) & cum lente, ac faba, idemq; qui oleris, & præcipuus, vt lenitas excitetur acrimonia sinapis. Medici innocentiorē, quā olus esse iudicauere. Quamobrem appositas non nemini degustare religio est, vt validis potius in cibo sint. Gemina iis natura, & oleris, & capite ipso exilientis bulbi. Mira differentia si vera est, candidis folia aluos modicē, nigris in hiberi. Et quum brassica corrumpatur in dolio vini sapor, odore betæ foliis demersis restitui. Menander ē Græcis author est, Allium edentibus, si radicē betæ in prunæ ostiā superederint, odorē extingui, ex Plinio. Propter suam insipiditatē antiquitus vino & pipere coquebatur, vt ex Martiale elicitur, 24

Vt sapiant satius subrorum prandia betæ,

O quā sapē petet vina, pipereq; coquus.

Apicius ita condit. Vt ex beta condimentum fiat gustui non ingratum, concides porrum, & contundes coriannum, cuminum, vnam passam, farinam, & omnia in medullam mittes, ligabis, & inferes ex liquamine, oleo & aceto. Aliter: Betas elixa, & sinapi, & oleo modico, & aceto benè inferūt. Diogenes Cynicus molles & cinædos betæ nomine non absq; felle videtur appellasse: nam quū ab aliquibus, vt canis incessetur, seq; observaturos dicerent, ne mordicus ab illo apprehenderetur, bono animo esse iussit, neque enim canibus esse in more vesci betis. Augustus betizare dixit, pro languere, & effœminari.

Nomen. Theophrastus τεῦτλον, τευτλῆς, σεῦτλον, ab impulsū nominavit, etenim cultus ratione incrementum arboris capessit. Latini betam vocāt, quoniam B figuram, quum ab olitoribus deprimatur, refert, ex Columellæ auctoritate in hortulo, 10.

Nomine tum Græcio, seu litera proxima prima

Pingitur in cera docti mucrone magistri,

Sic & humo pingui ferrat a cuspide ictu,

Deprimatur folio viridis pede candida beta.

Itali bieta, betola. Neapolitani foglia molle, quia mollit aluū. Dicitur & cicla 40

deter-

detorto nomine
alij non à Sicilia,

Generis diu

candida, sapore n

Iam qui dam app

dendum incidit

leatam, quod Th

rides duorum ge

leribus quatuor

populare, quod

à colore duo gen

paucissimi femin

rentes. Nostri b

tiuis, quanquam

monium à Græc

perat, an sam que

ra, album, nigrum

Galenus vnquam

ta sit. Agrestis b

Radix betæ v

modo singular,

bræ coherentes

grata cibo, vel cr

billis, sed olus ar

tum capessit, vt

copiosum, ad pe

do: nam caro in

dix dulcis est, &

in paludibus, a

plurimum dulce

bus, aut quod si

strum. Vnā eni

re saporem datu

dulcedinem ob

dicem fundit, v

Haec tenus The

ior, in binos pe

ticat non capit

triplicis, flores

lucidum, innol

alba, digitum cr

detorto nomine à Sicula, siue Sicilia infula, vnde primū nomen habuit. Sed alij non à Sicilia, sed à sicula, diminutiuo à sica, & de virilitate dici.

Generis diuersitate constare Theophrastus est author, inter betas verò candida, sapore nigra præstantior, pauciorumque seminum est, quam siculam quidam appellarunt. Sed Theodorus vertendo Theophrastum in pudentum incidit errorem: betam syluestrem reperiri dixit, ac fronde aculeatam, quod Theophrastus de limonio protulerat, non de beta. Dioscorides duorum generum meminit, candidæ, nigræque. Eudemus libro de oleribus quatuor betarum genera scribit, vulgile, surculosum candidum ac populare, quod colore fuscum est, Athenæo authore. Plinius: Betæ quoque à colore duo genera Græci faciunt, nigram, & candidam, quam præferunt, paucissimi seminis, appellantque siculam, candoris sanè discrimine præferentes. Nostri betæ genera faciunt vernum, & autumnale à temporibus factiuis, quanquam & lunio feritur. Meminit alibi syluestris betæ, quam & limonium à Græcis dici ait, quæ à Dioscoride de limonio proferente accepit, ansamque errandi Theodoro dedit. Apud nostra habentur genera, album, nigrum, & rubrum quod è Germania delatum aiunt. Negauit Galenus vnquam esse agrestem repertam betam, nisi lapathum agrestis beta sit. Agrestis beta nulla est.

Radix betæ vnica in longū protensa, ceu raphanus, è lateribus alia, item modo singulæ, modo binæ, nonnunquam ternæ funduntur, è quibus fibræ coherentes alligantur. Carnosa, gustu non iniucunda, & nonnullis grata cibo, vel cruda, cortex neque crassius, neque raphani modo extricabilis, sed olusatro quendam in modum similis: culturæ ratione incrementum capeffit, vt in arborem defecisse videatur. Semen cortice obducitur, copiosum, ad perdurandum firmum. Caule, & folio carnosum, sed alio modo: nam caro in latitudinem distenditur, & in rotunditatem crassatur. Radix dulcis est, & caulis, sed folia non respondent radicibus, vt earum, quæ in paludibus, aut fluuiis cibo idonea proueniunt. Radices enim & caules plurimum dulces, aut cibo aptissimi sunt, folia minimè. Causa in his omnibus, aut quod superiora humidiora sunt, & dilutiora, vt cunctorum palustrium. Vnà enim & aquosa sunt & tenuia, & excoctione carent, vt efficeretur saporem datum est. Radix tamen & caulis, quia minus habent humoris, dulcedinem obtinere aliquam possunt. Fruticat non capite, siquidem radicem fundit, vnde folia, caulesque prosiliunt, vt apium. Semini firmitas. Hactenus Theophrastus. Nulli hortensium, inquit Plinius, latitudo maior, in binos pedes aliquando se pendente. Semen cortice obductum fruticat non capite. Addimus nos. Caulis exilis striatus, bicubitalis, folio atriplicis, flores producit exiguos luteos, ex viridi luteolos, semen nigrum, lucidum, inuolucro herbaceo. Floret Iulio, & Augusto mensibus. Radix alba, digitum crassa, longa, fibrosa.

Genera.

Descriptio.

Celum. Athenæus Ascreas betas laudat. Plinius in Circeiensi agro amplissimas provenire dixit. Mihi videtur quodcunque cœlum substinere, sed melius frigidum.

Solum. Plinius locum humidum amare. In binos pedes aliquando se pandunt, multum & soli natura conferente eis. Palladius. Amat agrum putrem, humidum, lætum.

Satio. Theophrastus, In genus sementis primæ nomen habet, quod fit post æstivum solstitium, mense Iulio: æstate sexto, hyeme decimo die prodit terra, ex veteri semine celerius provenit. Peculiare quoddam in beta tradunt evenire, quod non continuo singula, sed anno interim sequenti, sæpe tertio producuntur, itaque ex copia seminis exigua pullulat. Cuius rei secundo de causis libro rationem reddit, semen frigidum, ac concetu perdifficile habere dicens, ut diuturnitatem sequi oporteat exortum, ut serius hac de causa exeat. Betarum disparitas est, quum alia mense posteriori emergant, alia duobus mensibus post, alia pluribus, nonnullæ etiam anno quod per uicaciam quandam ad germinandum significat: quanquam hortus assidue rigetur, colaturq; Et alibi, Si semen frigidum & concetu perdifficile habeant, diuturniorem sequi oportet exortum, ut & alia serius hac de causa exeant: nam & betarum aliquas anno postero erumpere, germinarequeasserunt, neque periculum esse, ut putrescant. Plinius. Beta æstate sexto, hyeme decimo nascitur. Ex veteri semine celerius exit. Mirum in beta semine, non enim totum eodem anno gignit, sed aliquid sequente, aliquid tertio: itaque ex copia seminis modice nascitur. Columella, Beta florente punico malo semine obruitur, & simul atque quinque foliorum est, ut brassica differtur æstate, si riguus est hortus, at si siccanus, autumno, quum iam pluvia inceserint, disponi debet. Palladius: Februario mense, & si possit tota æstate seminari, transferenda est quatuor, vel quinque foliorum, radicibus fimo recenti oblitis. Amat frequenter effodi, & multo stercore satiari. Iulio mense betas rigandas ponunt, Aprili, Martioque. Plinius: Transferuntur in planta hæ quoque, & oblini fimo radices suas amant. Sunt qui betas punico malo florente optimè feri existimant, transferri autem quum quinque foliorum esse cœperint. Cassianus: Seritur Februario, Martio, & Iulio, transfertur Iulio, Octobri, Nouembri. Nos autem quas semini destinamus, Augusto serimus, Ianuario transferimus, ita enim nobilissimum semen producunt, quæ primo anno excalescunt, & semen proferunt, extirpantur ex horto, quæ gulæ nascuntur, Decembri, Ianuario, Februario, & Martio feruntur, & ferè omni tempore, si solum accommodatum: si densius nascuntur, aliquæ è medio tollantur, & alibi plantentur. Sunt quæ ex eodem semine nascuntur, & illo anno semen non adferunt, hæ cibo destinantur. Semen quadriennio asseruatur. Ait Crescensius ex Dioscoride, quod in eius stirpem rosæ surculus inseri possit, & inde roborat-

roboratus trans-
feri posse calycem
Theophrasto
fuerit tibi cordi
radices recenti fi-
latiorem, aut tes-
tam, in latum se-
cies summa in la-
rem trahere, im-
to quæ & alioqui pl-

OMNIVM h-
hil diligenti-
reat, repentinam
scitibus negant
Sylvestres fecer-
spectantur aspar-
tris. Plutarchus
detorquebant,
nem explicat, v-
nistrat. Si spon-
grauitatem, ac m-
ve conditi de bea-
& reponi oportet
ris, in alveos con-
dent, reponunt
lui possint, sin-
exprimuntur, t-
est mistum dual-
to di, quod est per-
nunt, ita ut herb-
ueniat. Apicius
aquam calidam
rudam vocant,
acetum infertu-
vino coquant,
coquantur, diu-
tor celerem rei-
asparagi coquant
asparagi, qui primor-

roboratus transferri, quod in Dioscoride nusquā legitur. Sunt qui dicant
feri posse calyculis iuxta radicem adnatis.

Theophrasto auctore, aqua salsa rigata melior euadit. Sotion Græcus, Si
fuerit tibi cordi multo maiorem betam, eandemque iucundiores efficere,
radices recenti fimo bubulæ lines, & priusquam in caulem exeant, lapillum
latiorem, aut testam superpones, ita enim hoc pondusculo cohibitam be-
tam, in latum se diffundere, & candorem contrahere affirmât. Plinius. Spe-
cies summa in latitudine ei contingit, ut in lactucis, quum cœperint colo-
rem trahere, imposito leui pōdere. Peculiaris medicina betæ in falsis aquis,
quæ & alioqui plurimum suauitati & fertilitati conferunt.

De asparagis. CAP. LIIII.

OMNIVM hortensium laudatissima cura asparagis, Plinius inquit. Ni-
hil diligentius comprehendit Cato, nouissimumque libri est, ut appa-
reat, repentinam & nouitiam viro fuisse curam. In his quoque aliqua sibi na-
sci tribus negant, caule in tantum saginato, ut pauperis mensa non capiat.
Syluestres fecerat Natura corrudas, ut quisque demeteret passim, ecce atiles
spectantur asparagi. Et Rauenna tribus libris rependit. Heu prodigia ven-
tris. Plutarchus in coniugalibus præceptis ait. Bæotij asparagos in coronas
detorquebant, quibus nouæ nuptæ donabantur. Huius gētilitij ritus ratio-
nem explicat, ut ex asperissima spina suauissimum fructū asparagus submi-
nistret. Sic sponsa non fugienti viro, nec indigne ferenti primam coniugis
grauitatem, ac molestiam dulce præbebit commercium. Columella docet,
ut condiri debeant. Circa vernum æquinocetium asparagos in vsum colligi,
& reponi oportebit: aceti duas partes, & tertiam duræ muria si miscue-
ris, in alueos componuntur, & sale conspersi biduo sub umbra, dum confu-
dent, reponuntur: deinde si tantum remiserint humoris, ut suo sibi iure ab-
lui possint, sin minus superfusa dura muria lauantur, & pondere imposito
exprimuntur, tum suo quodque vase conditur, & ius quod supra dixi, quod
est mistum duabus partibus aceti & vna muria, infunditur, sceniculi que ari-
di, quod est per vindemiam proximo anno lectum, spissamentum impo-
nunt, ita ut herbas deprimat, & ius usque in summum labrum fidelia per-
ueniat. Apicius: Asparagos, ut palato gratiores fiant, siccabis, & rursus in
aquam calidam submittes. Platina: Incultum asparagi genus, quod alij cor-
rudam vocant, gratius est. Asparagi in patinam extenduntur, sal, oleum, &
acetum infertur. Sunt qui eos aromatibus conspergunt. Sunt qui addito
vino coquant, quod eo modo salubriores sint. Asparagorum cauliculi cito
coquantur, diutiusque decocti in tabem fathiscunt: quare Drusus Impera-
tor celerem rei successum demonstrans, dicere solebat, hoc citius fieri quam
asparagi coquantur. Apud nos copiosissimus huius oleris est usus: nam thy-
rsi, qui primores explicantur, magna helluonum voluptate aceto, oleo, &

fale conspersi eduntur, vel pingui iure pinguiusculi decocti fale, & oleo comeduntur.

Nomen. Græcis ἀσπάργος est. Nomen deduxerunt, quòd sine satù, sed sua sponte profiliat, nam altilis asparagos nō nouit antiquitas, quanquā tenellā, & primum à satione erumpentes holeraceorum germinationes asparagi dicebantur, priusquā in folia exirent, quo nomine Paulus Ægineta betarū, lactuca, bliti, atriplicis, malua, multarumq; herbarū recentissimos turiones, vel primos cauliculorū partus, veterum & Galeni testimonio fretus, nominauit, & caput vnū dicauit. Plutarchus ἀσπάργος dixit, & Athenienses sic etiā Galeni testimonio vocant. Cratinus item & Theopompus apud Athenæum. Vel etiā apharefi ἀσπάργος dicunt. Syluestris asparagus à Dioscoride corruda dicitur, *μυακάνδρα*, à Galeno *μυακάνδριν*. Plinius, Syluestrem asparagū aliqui corrudā, aliqui libycum vocant, Attici orminū, alij myacāthon. Sed Græci orminū vocant ab ὄρμῳ, id est ruo, quòd corruda vbi adoleuit facile corruat, & decidat. Libycū autē à patria. Latini asparagos vocant, à Varro sic dictos, quod ex asperis virgultis nascantur. Appion Grammaticus spharagos vocat, vel apherefi sparagus. Columella syluestre asparagū à rusticeis corrudam vocari dixit. Neapolitani, exuta principe litera, *sparagi* vocāt.

Genera. Theophrastus corrudā meminit, Dioscorides syluestris & altilis, Galenus regij, qui in hortis nascitur, & ἐλείη, id est palustris. Plinius: Syluestres fecerat natura corrudas, vt vnusquisque demeteret passim: ecce nunc altilis spectantur asparagi. Est & aliud genus incultius asparago, minus corruda, passim etiā in montibus nascens, superioris Germaniæ campis, nō in faceto Tiberij Cæsaris dicto, herbā ibi quandam nasci simillimā asparago. Athenæus meminit palustris, altilis, & montani, quem viliorem dicit. Apud nostra tria genera, syluestre, altile, & Hispanicum, optimum, & magnum.

Descriptio. Theophrastus ita syluestres depingit, qui videtur altilis non cognouisse. Spinosi sunt asparagi ferè ex toto, vt scorpius. Post æquinoctium autumnii florescit, præter aculeum, pusillum quendam producit, ex quo flosculus ille exit, radice alta numerosaque nititur, tam simul irretita, vt superior pars connexa, colligataque videatur, ex ea thyrsi emicant, exit vere caulis cibo idoneus, tum scabrescit, & processu in florem abit, qui non ex ipso solum, verum etiam de primoribus emergit caulibus, annum caulem habet. Dioscorides, Altilis asparagus est, plurimæ radice, altissimeque germinat. Viret thyrsis primum emicante, qui caulem educens, tempore ipso fastigiatus in toros striatur. In totum spina est asparagus. Addimus nos. Primo vere emicantibus multis, crebrisq; tenellis thyrululis, affecta postea etate, multis fruticant ramulis adulti, densissimisq; foliorum exilium comis, flosculos edentibus oleæ luteolis, decussis floribus baculæ dependent, primum virides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus refertæ. Ramuli per ventositatem occalescunt in spinulas.

Athenæus. In Libyæ Getulia nasci dicuntur, qui calami cyprij magnitudinem consequuntur: & duodecim pedum longitudine in montibus crassitie magnarum ferularum, longitudine viginti ferè cubitorum. Plinius: Nullum gratius his solum, quàm Rauennatiû hortorum. Et Rauenna ternis libris rependit. Sed qui in Nefide Campaniæ insula nascitur, longè optimus existimatur. Martialis.

Mollis in aquorea quæ creuit spina Rauenna,

Non erit incultis gratior asparagis.

Didymus simplici gaudere solo scripsit. Cato locum subactû, humidum, & crassum desiderare. Varro: Sic vt vmbrosis locis alia feras, vt corruda, quoddam ita petit asparagus. Palladius pingui solo, humido, & subacto. Corru-
da in siccis locis, & saxosis sepibus, & frutetis.

Cato. Locum, vbi asparagus feras, bene subigere oportet, qui habeat humorem, aut loco crasso, vbi erit subactus, areas facito, vt possis dextra, sinistraq; sarrire, seu runcare, ne calcetur. Quum deformabis areas, interuallum facito inter eas semipedem latum in omnes partes. Deinde ferito. Ad lineam grana bina, aut terna palo demittito. Eodem palo cauum terra operito. Deinde supra areas sterces spargito, benè ferito. Secundum æquinoctium vernum, vbi natum erit, herbas crebro purgato, cauetoq; ne asparagus vnà cum herba vellatur. Quo anno seueris, substramentis per hyemem operito, ne rigore peruratur. Deinde primo vere aperito, sarritoq; runcatoq;. Post annû tertium, quàm seueris, incendito vere primo, deinde ne ante sarrieris, quàm asparagus natus erit, ne in sarrièdo radices lædas. Tertio, aut quarto anno asparagi vellito ab radice: nam si defringes, stirpes fient, & intermorientur, vsq; licebit vellas, donicû in semen videbis ire. Semen maturû fit ad autumnû. Ita quum sumperis semen, incendito, & cum cœperit asparagus nasci, sarrito, & stercoreato. Post annos octo, aut nouè, quum iam vetus est, digerito, & in quo loco positurus eris, terrâ bene subigito, & stercoreato. Deinde fossulas facito, qua radices asparagi demittas. Interuallû sit
ne minus pedes singulos inter radices asparagi: vellito, & sic circumfodito, vt facile euellere possis. Caueto ne frangatur. Stercus ouillû quàm plurimû fac ingeras, id est optimû ad eam rem. Aliud sterces herbas creat. Nunc de asparagi satione Columelle placita referamus. Satiui asparagi, quâ corudam rustici vocât, semina ferè biennio præparâtur, ea cum pingui, & stercoreoso solo post idus Februarias sic obrueris, vt quantû tres digiti feminis cõprehedere queât, singulis fossulis deponas. Ferè post quadragesimû diè inter se implicâtur, & quasi vnitate faciunt, quas radículas sic illigatas, atq; cõexas, olitores spõgias appellât, easq; post quatuor, & viginti menses, in locû apriçû & bene madidû, stercoreatumq; transferri cõuenit. Sulci autè inter se pedali
mèura distantes sunt, nò amplius dodratalis altitudinis, in quâ ita spõgiolæ deprimuntur, vt facile superposita terra germinet. Sed in locis siccis partibus

Calum.

Satio.

fulcorum imis disponenda sunt semina, vt tanquam in alueolis maneant, & viginosis è cōtrario in summo porcæ dorso collocanda, ne humore nimio ladantur. Primo deinde anno, quum iam confita sunt, asparagum, quem emiserint, infringi oportet: nam si ab imo vellere volueris, adhuc teneris, inualidisque radiculis tota spongiola sequetur. Reliquis annis non erit decerpēdus, sed radicitus vellendus: nam nisi ita fiat, stirpes præfractæ angunt oculos spongiarum, & quasi excæcant, nec patiuntur asparagum emittere. Cæterum stylus qui nouissimè autumnali tempore nascitur, non omnis est tollendus, sed aliqua pars eius in semen est summittenda. Deinde quū spinam fecerit, collectis seminibus ipsis, scorpiones, vt sunt, in suo loco perurendi, & deinde sulci omnes consarriendi, herbæque eximendæ: mox vel stercurus, vel cinis iniiciendus, vt tota hyeme succus eius pluuiis manans, ad radicem perueniat. Vere deinde prius quàm cœperint germinare, capreolis, quod genus bicornis ferramenti est, terra commoueatur, vt & facilius stylus emicet, & relaxata humo plenioris crassitudinis fiat radix. Palladius ab eo. Circa Apriles Calendas asparagos seremus pingui loco, humido, subactō, ita vt minoribus fissulis ad lineā directis, bina, aut terna grana, semipedis spatio discreta ponantur. Dehinc stercore solum tegatur, & herbæ subinde vellantur, vel per hyemem supra stramina iaciantur, primo vere tollenda. Hinc post triennium nascentur asparagi. Sed expeditior ratio est, si asparagorum spongas ponas, quæ cito fructum ministrent. Semina asparagi quanta tribus digitis comprehendere possis post idus Februarias pingui & stercolato solo in singulis fossis ponis, & leuiter obruis. His cocuntibus radix connexa nascetur, quæ appellatur sponsia, sed hæc moras habet: nam per biennium in seminario suo est stercore, & assidua runcatione nutrienda. Deinde post æquinoctium autumni transferatur, & vere asparagum dabit. Has erit vtilius comparare, quàm longa expectatione nutrire. Eas tamen in sulcis disponemus, si loca sicca sunt, inter medios sulcos, si humida, in summitate fulcorum. Humor spongas asparagorum transitu suo debet tantum rigare, non sistere: asparagum, quem primo protulerint, confringere debemus, non auellere, ne adhuc inualidam moueamus spongiam. Cæteris annis auellendus est, vt oculos suæ germinationis aperiat, quia si deinceps refringas, loca, quæ sæcunda esse cōsueuerunt, remanente asparagi radice claudentur. Ministrabunt autē vere, & autumnō, reseruabis eum, de quo sumpturus es semina, postea scopas eius incendes, tunc circa hyemē spongiis adicies stercurus, & cinerem. Plinius harundinē feri iubet in humidis agris, bipaliis subactō prius solo, oculis dispositis intervallo ternorum pedum, simul & corrudam, vnde asparagi fiunt: concordare enim amicitiam. De origine eorum in syluestribus curis abunde dictum, & quomodo eos iuberet Cato in harundinetis feri. Potest & semine feri. Nihil diligentius comprehendit Cato, nouissimumque libri est, vt appareat re-

pentinam

pentinam ac no
sum, semiped
na bina, aut te
Id fieri secundu
caveri ne cum h
prolegi, vere ap
censu est, hoc m
festinant incend
ne in farriendo
defringatur, sti
maturefcere ad
riri, ac sterco
solo, sterco
& ouillo fimo n
quam aliud tent
fossio semine ace
mo. Dein nexis
disponunt peda
nos syluestres s
ad Decembrem
runcantur & co
decerpes, ne stir
Didymus plu
sulcatim defossi
gantur, aspara
cornibus contu
abhorret. Plini
fuerit toto an
dices, quæ sum
fructus novos d
proflient, in po

QVVM cog
frixi, &
tutiones collig
& si Plinius po
mani suam cer
dam sapore vin
tariis vitmur,
Recentiorib

pentinam ac nouitiam viro curam fuisse. Locum subigi humidum, & crassum, semipedali vndique intervallo feri, ne calcetur. Præterea ad linea grana bina, aut terna paxillo dimitti, videlicet semine tum tantum serebatur. Id fieri secundum æquinoctium vernum. Stercore satiari, crebrò purgari, caueri ne cum herbis euellatur asparagus. Primo anno strameto ab hyeme protegi, vere aperiri, sarri, runcari, tertio incendi anno. Quo maturius incensus est, hoc melius prouenit. Itaque harundinetis maxime cõuenit, quæ festinant incendi. Sarri iubet idem, non antequam asparagus natus fuerit, ne in sarriendo radices vexentur. Ex eo velli asparagum ab radice: nam si defringatur, stirpescere, & intermori. Velli donec in semen eat. Id autem maturefcere ad ver, incendi quæ. Ac rursus quum apparuerit asparagus, sarri, ac stercoreari. Ac post annos nouem, quum iam vetus sit, digeri, subacto solo, stercoreato quæ. Tum spongiis feri, singulorû pedum intervallo. Quin & ouillo fimo nominatim vti, quoniam aliud herbasceere solet. Nec quicquam aliud tentatum postea vtilius apparuit, nisi quod circa Idus Febr. defosso semine acruatis paruulis scrobibus ferant, plurimum maceratum fimo. Dein nexis inter se radicibus spongas factas post æquinoctiũ autumnii disponunt pedalibus interuallis, fertilitate in denos annos durante. Apud nos syluestres spongiæ primo humescente Augusto aëre plantantur, vsque ad Decembrem, Februario producit cauliculos quos velles, Augusti fine runcantur & comburuntur. Quum cauliculos colligis, diligentius digitis decerpes, ne stirpem euellas, nam citius alios producit.

Didymus plurimos nasci scripsit agrestium arietum cornibus tufis, atq; *Ars.* fulcatim defossis, ac longè mirabilius, integra arietum cornua tusa si pangantur, asparagos proferre. Dioscorides asparagum nasci prodidit arietum cornibus contusis, atque defossis, quod quãtum equidem sentio à veritate abhorret. Plinius: Inuenio nasci arietum cornibus tufis, & defossis. Si cordi fuerit toto anni decursu edulos habere asparagos, vbi fructum legeris, radices, quæ summo cespite teguntur, circumfodies, hoc cultus mangonio, frutex nouos dabit cauliculos. Albos produces, si quum primum turiones profiliunt, in pertusam harundinem indes, legantur quæ quum vti velis.

De lupo salictario. CAP. LV.

QVUM coquantur, & condiantur lupoli vulgò dicti, sicut asparagi, & frixi, & elixati nõ edi incommode possint, ac more quo asparagi eius turiones colligantur, post de asparagis tractatum de lupulis subnectemus, & si Plinius potius gulæ oblectamenta, quàm cibũ esse inquit. Ex eo Germani suam ceruisiam condunt, frugibus admisto, & commendantur quodam sapore vini, maceratis humore floribus. Eius etiam cauliculis in acetariis vtimur.

Recentioribus Græcis βύον, à brionia vtpote similitudine dicitur, & βρυον

via. Plinius videtur lupum salictarium vocare, quod salices arbores se circumplectendo scandat. Rura bruscandulā vocant. Neapolitani *lupolo*, quod fortasse caule & foliis lupi colorem imitetur.

Descriptio.

Caulis totus aculeis horret, longè per vepres, & per salicta reptans, sese viticulosus sarmentis intorquens, per vertices rotatus multis implicat voluminibus, quasi gaudeat summam euagari. Folia brionie similia: sed paulo asperiuscula, & nigriora, cacuminibus asparagi modo in torulos turbinati, flore foliaceo, cinereo, ac multis exilibus flosculis squamatim compactis, qui allium vinumque subolent. Floret Augusto, & Septembri mensibus: eius cauliculi colliguntur Martio, Aprili & Maio.

Solum.

Iuxta vepres, & salicta nascitur. Nunc ad hosce vsus etiā hortis plantatur.

De carduo sylvestri. CAP. LVI.

NUNC carduorum genera attingemus, & primum sylvestre genus, ut clarius nostra, & nostrorum maiorum dicta percipiantur. Cardui talis assignatur origo, Pythia primum ligneum canem appellante: nam Apollinem consulenti Locro, redditum est oraculum, urbem inibi cōderet, ubi ligneo cane morderetur, tandem in crure cinara vellicatus, oppidum construxit. Et si Didymus Grammaticus cynosbaton potius, id est canis sentem intellexit, ex Athenæo. Sophocles in Phœnice. Est spina cuncta quæ tenet cynarus loca. Plinius, Scolymum in cibos recipit oriens, Eratostheni laudata in pauperum cœna. Venerem in vino stimulare dicitur Hesiodo, & Alceo testibus, qui florente ea, cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis avidissimas, virosque in coitum pigerrimos scripserunt, velut providentia naturæ, hoc ad iumentum tunc valentissimo. Commanducata odorem cōmendat oris, vulvis etiā conferre traditur, ut mares gignantur, ita enim Chereas Atheniensis, & Callimachus, qui circa carduos diligentissimus videtur fuisse. Inter morbos frugum, terræque pestem connumerat carduos Virgilius.

— *Segnisq; horret in arvis*

Carduus.

Nomen.

Græcis σκόλυμος est. Nicander pyxantham vocat, Latini sylvestrē carduum. Neapolitani *cardon seluaggio*, Appuli sclarea, σκάλια, & ἀσκάληρον, ut dicemus in cinara.

Descriptio.

Theophrastus hæc habet de scolymo. Id sibi peculiare scolymus vēdicat, quod radicē tum coctam, tum erudam vescendā subministret, sed cibo gratissimā, quā florescit. Radix durata lacteum succum emittit, quā solstitium agitur, flos erumpit, sed carnosam, & cibo idoneā crassescētē partem fortitur. Ortum nō spinosum, sed oblongum habet, quod sibi duntaxat, velut propriū vsurpavit inter ea, quæ in foliis spinosam lanuginē fortiuntur. Carduus nō aculeatis foliis est, ut etiā limoniū, & pulchrē diuque floret. Similis chamæleoni, sed chamæleon tametsi nō aculeato folio constat, tamen acani spe-

ni speciem gerit
estate aliud flor
scente folio de
scorides ab eo.
griora sunt, &
caput subrigit
bos asparagi mo
tex est nunquā
lio & caule card
10 duorum generis e
rum quod sine
pit, aliud partu
Sylvestriū ge
crassius, vtriusq
purpureum mi
tem cum aura.

Ad nos vñ
feriturque; maxi
intervallō in s
20 prima semina
stercoratur, rig
tenere scāt & al
sobolē, inde er
tunt sobolē ad

Iam de alili
ritate mālū
euasit. Paulus
officere, scoly
30 cū oleo giro,
cocta, leniter
aceto in cōuiu
ministrat. Ra
maritudine e
piperis polli
pore suo am
tim inducit.

40 Plin. Poterat
q̄tus, nō sine

ni speciem gerit, flos senescens in pappos amittitur. Mirum est, quod tota ætate aliud floret in eo genere, aliud concipit, aliud parturit. Aculei flaccescente folio desinunt pungere. Semen vliginosum, & armatum spina. Dioscorides ab eo. Folia fert chamæleontis, & spinæ albæ similia, nisi quod nigriora sunt, & crassiora, caule oblongo, folioso, in cuius vertice spinosum caput subrigit. Radice nigra, & crassa. Herba, quæ recens est, tenerescit, in cibos asparagi modo recipitur. In totum similis sylvestri acantho. Plinius, Frutex est nunquam cubitali altior, crispisq; foliis, & radice nigra, sed dulci. Et folio & caule carduus spinosas lanugines habet. Floret ætate serò, & diu. Carduorum generis est, & ab iis distat, quod radix eius vscendo est decocta. Mirum quod sine interuallo tota ætate aliud floret in eo genere, aliud concipit, aliud parturit: aculei marcescente folio desinunt pungere.

Sylvestriū genera duo sunt, vnū fruticosius à terra statim, alterū vnicaule *Genera.* crassius, vtriusq; folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, sed alter florē purpureum mittit inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura.

Ad nos vnū genus sylvestre adfertur ex Hispaniis, cuius foliis vescimur, *Satio.* feriturq; maxima diligentia. Martio feritur. Semen vnū ab altero triū pedum interuallo in sulcis ponitur: quū agitur secundus sulcus, cooperiuntur iam prima semina sata. Viginti diebus nascuntur. Quū sex foliorū erit, foditur, stercoreatur, rigaturq; Dein foditur Augusto, & Octobri, obruuntur terra, vt tenerescāt & albescāt, inde præciduntur radice. Radix inde sequenti Febr. emittit sobolē, inde eruuntur, & plantantur singuli. Radicibus singulis vnā dimitunt sobolē ad semen producendū. Producit fructū spinosum & ingustabile.

De carduo satiuo, sive de cinara. CAP. LVII.

IAM de altili carduo differamus, qui in hortis cultus māgonio, domita feritate māfuecit: erat enim ferus scolymus, nunc vrbana cinara, & hortēsis euasit. Paulus Aegineta discriminē apposuit inter vtrumq;. Cinarā stomacho officere, scolymū prodesse demonstrat, succū creare improbum ait, cinaram cū oleo, giro, & corianno decoctā præstabit cibis exhibere, quasi ista, simul cocta, leniter hanc noxā amoliantur. Apud nos iuribus incocta oleo, sale, & aceto in cōuiuiis venit. Fructū suum tum crudū, tum coctū vscendum subministrat. Radices ineunte hyeme cultus mangonio candidas, teneras, & amaritudine erutas reddunt, vt hybernis cibi gratius admittantur, & salis, & piperis polline secundis mensis edimus magno gulæ delectamēto, nam sapore suo amariuscule, palatū & linguā vellicando, asperiusculū reddens sitim inducit, & post illius esum sapida fit potio. Vnde Columella in hortulo.

Hispida ponatur cinara, quæ dulcis laccho

Potanti veniat.

40 Plin. Poterāt dicta videri omnia, quæ in pretio sunt, nisi restaret res maximī q̄stus, nō sine pudore dicēda. Certū est quippe carduos apud Carthaginem

magnā, Cordubāq; præcipuè sextertia sena millia ex iis aruis reddere, quoniam portenta quoque terrarum in ganeam vertimus, etiam ea, quæ refugiant quadrupedes conscia. Apitius, Carduos ex liquamine, oleo & uis cōtusis edito, vel rutam, mentam, coriannum, & fœniculum omnia viridia conterito, adde piper ligusticum, vel liquamen, & oleum.

Nomen.

Theophrasto *κακτος* est, satisq; verisimilibus cōiecturis adducebar vt dicerem Theophrasti *κακτον*, Græcorum & Latinorum esse cinarā, quas huc afferre nimis molestum duxi, quod si quid animo adhærerat scrupuli, sustulit. Athenæus, qui inquit, *κακτος* eadem, quæ Romanis carduus, qui nō procul à Sicilia absunt, & reliquis Græcis cinara. Siquidē mutatis duabus literis *κακτος*, & cardos in eadem voce cōueniunt. Edendo fuisse *κακτον* satis Epicharmus testatur, qui post olera aspersas *κακτος* retulit. Philetas Cous *κακτος* vocabat. Phœnias Siciliam vocat spinosam plantam, Athenæo referente. A Galeno *κινάρα* dicitur. Cinaræ nomen, quod gentilem ei puellam in hanc herbam conuersam comminiscantur, dictam volunt. Sunt qui cinaram dici putant à cinere, quo gaudet. Sed horum sententiis non est accedendum, quum cinaræ vocabulum è Græcia venerit in Latium, quippe tum Poetæ, tum vetustissimi Græci oratores cinaræ vocabulum vsurparunt, vt Athenæus fatetur. Sospater Paphius qui Alexandri Philippi Regis temporibus floruit, cinarā nominauit, itemq; Ptolemæus Euergetes Aristarchi Grammatici discipulus, aliiq; teneri edulesq; caules Theophrasto *πέρνιξ*, fructus *σκαλιάς*, Athenæo *ἀσκαλινος*, vnde fortasse *scaleræ* nomē apud Appulos, Plinio *ascalica* dicitur. Fructus Tralliano *κεφαλωτός* dicitur, quia capitatus, & *ἀρτυπιδος*, vnde, vt spero, Italis nomē *articoce*. ab aliis *σπινδύλος* dicitur, quod struētili nucleorum serie pineam nucem videatur exprimere. Latinis carduus. Neapolitanis *cardosi*, *carcioffi*.

Descriptio.

Theophrastus ita *κακτον* describit. *Κακτος* in Sicilia tātum nascitur, suæ proprietatis & ipsa, in Græcia nusquā habetur, eius in terram proserpunt caules, & humi statim accubant à radice emissi, lato folio, & spinifero. Caules vocant *κακτος*, quos desquamatos non fastidiunt in cibis, & vt amaritudinē exuant, muria seruant. Caulē, qui in rectum euehitur, appellāt *πτερνικά*, eiusdē suauitatis, sed vetustatis impatientem. Inuolucris cortex, in quo semen residet, lanuginosus, echinata facie sauit, quo detracto teneritas eadem inest, quæ palmæ cerebro: scaliā appellant. Plinius quæ à Theophrasto interpretatus est, eadem habet. Et *κακτος* quoq; in Sicilia tantum nascitur, suæ proprietatis & ipsa, cuius in terra serpunt caules à radice missi, lato folio, & spinoso. Caules vocant *κακτος*, nec fastidiunt in cibis, inueteratos quoq; Vnum caulē rectum habent, quem vocant *πτερνικά*, eiusdē suauitatis, sed vetustatis impatientē. Semen ei lanuginis, quam pappo vocāt, quo detracto, & cortice teneritas similis cerebro palmæ est, vocant *ascalīā*. Quæ dā spinosa foliata sunt, vt carduus, foliis inest aculeata mordacitas. Carduus & folio

& folio, & caule

Haec

Myr

Nun

Nun

Pallia

Addimus no

vnguibsq; quan

primat, flore ele

te. Sed ne putes

sed flos globus i

Apud nos plu

cui frondes rec

verò repandæ t

ferentia est. Su

In Sicilia nasa

magnam, Cord

nos in Pithacul

pricum tamen

ritatis attollitu

Columella n

videtur aptissim

uis in pingui poi

pangantur in sol

chus editos trad

Addit & Choral

amnem eadem

re cinara, sed a

maxus Egypti

vim plerisq; lo

spinis adēptis r

Columella d

semine cōmodi

lendas Nouem

etium dispone

iam parata, ser

uerla ponantu

menda sunt, se

ticulos semen

40 duē, donec pla

mente plantis p

& folio, & caule spinosas lanugines habet. Columella cinaram ita describit.

Hæc modo purpureo surgit glomerata corymbo.

Myrtiolo modo crine vires, deflexaq; collo

Nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pungit,

Nunc similis calathæ, spinisq; rigentibus horret.

Pallidæ nonnunquam tortos imitatur acanthos.

Addimus nos: Cacuminibus squamosum extuberat globum, corticosis vnguibus squamatim compactilibus coagmetatum, vt pineam nucem exprimat, flore eleganti, purpureo rutilante, celeriter circa solstitia canescente. Sed ne putes fructum esse florem, quippe fructus semē est, cui præit flos, sed flos globus ille est, quo delibratis frondibus vescimur.

Apud nos plura sunt genera. Vnum genus nigrum vocant, & Hispanicū, cui frondes rectæ, non repandæ sunt, & spinæ in cacuminibus rectæ, in aliis verò repandæ terram versus, in aliis verò non nisi magnitudo fructus differentia est. Sunt & quæ spinis vacant.

In Sicilia nasci Theophrastus optimas dixit. Plinius apud Carthaginem magnam, Cordubamq; præcipue. In Apulia nō spernendas vidimus. Apud nos in Pithacusa, & Prochite: vt etsi quodcunq; cælū sustinere videantur, apricum tamen & calidum exoptare videantur. In Mauritania tantæ proceritatis attollitur caulis, vt duodenos cubitos superet.

Columella multo cinere stercoreari iubet, idq; genus stercoreis huic oleri videtur aptissimum. Palladius, terram stercoreatam & solutā dicit, quamuis in pingui posset melius prouenire. Et hoc alibi contra talpas prodest, si pangantur in solido, ne terra ab inimicis animalibus perforetur. Callimachus editos tradit montes circa Areanicum mare spinosa cinara pubescere. Addit & Choras minorū agros hac spina passim vestiri, camposq; circa Indum amnem eadem virefcere. Polemon est author, plerosq; tractus in horrefcere cinara, sed apud se montē ambitiosum iis vbiq; fructibus rigere. Ptolemæus Ægypti Rex memoriæ prodidit iuxta Berenicē Lybiæ magnā cinaræ vim plerisq; locis enasci, qua decerpta milites ipsum sequuti victi assēt, eiq; spinis adēptis vescendā obtulissent, alioquin mandinō posset, ex Athenæo.

Columella duobus feri temporibus posse scribit, vere, & autumno. Sed semine cōmodius circa Calendas Martias feremus, eiusq; plantā circa Calendas Nouēbris disponemus. Sed sobolem melius per autumnū æquinoctium disponemus. Palladius: Serendā sunt eadem Luna crescente, in arcu iam parata, semina spatio semipedis discretā. Cauendum est, ne semina inuērsa ponantur: nam debiles, incuruos & duos creabunt. Non altē imprimenda sunt, sed tribus digitis cōprehensa mergantur, donec ad primos articulos semen perueniat, tunc leuiter operiantur, & herbis liberentur assidue, donec plantaria solidentur, & rigentur si æstus interuenit. Octobri mense plantis ponuntur, quas cum ponemus, radices earum summas ferro

Genera.

Colum.

Solum.

Satio.

refecamus, ac fimo tingimus, ternū pedū spatio tēperamus in crementi cau-
sa, pedali scrobe depositas binas, aut ternas. Cinerē sēpe sub hyeme diebus
ficcis, simūq; miscebimus. Plinius. Carduos duobus modis serunt, autumno
planta, & semine ante nonas Martias, plantaq; ex eo disponūtur, ante Idus
Nouemb. aut in locis frigidis circa Fauoniū, stercoretur enim, si diis placet,
latioresq; pueniunt. Cinara, vt Cassianus notat, Nouemb. mense deponi
debet, vt vere suos scetus largiatur. Vere sata, aut vix eodē anno fructū dabit,
aut elanguescens gracilē, & strigosum pmet. Soboles quæ vegetioribus ad-
nascuntur caudicibus, falcis mucrone, diducta terrarū aliqua parte radicis
sunt eruendæ, vt per alia spatia digerantur, sed solū benē subactū, & vetere
fimo saturatum desiderant, iugiterq; quū æstus interuenit, rigentur, donec
plantaria solidentur, ita curatæ tenerum & vberiorē echinū exhibebunt.

Cultus.

Palladius: singulis sanē annis à radice auferendę sunt plantę, vt ne matres
fatigētur, & soboles per alia spatia digerātur. Cum aliqua tamē radicis parte
vellēdę sunt. Quos seruabis ad semina colligēda liberatos omnib. pullis, te-
sta sup te gere debebis, aut cortice, nā solēt semina sole, vel imbrib. interire.

Ars.

Palladius, Si seminū cacumina cōfringas, spinis carebunt. Item si semina
eorū madefeceris per triduū laurino oleo, vel nardino, vel opobalsamo, vel
succo rosę, vel masticino, & postea siccata deprefferis, eiusdē saporis orien-
tur, cuius vnguēta semina cōbiberint. Cassianus: si semina madefeceris per
triduū rosarum succo, aut liliorū, aut laurino, aut alterius cuiusq; suauiter
olentis liquore, eiusdē odoris orientur, cuius semina latitē hauserint. Si se-
minum cacumina lapidis attritu retundantur, spinis carebūt, annoq; toto
per hunc modū cinaras creari cōfirmant. Affirmant alij q; quocunq; tem-
pore cinarę plātentur, eodē & fructū edent, & ob hoc per totū annum posse
cinaras haberi. Lauri refert odorē, si in baccā eius excuato foramine cinarę
semina imprimātur. Si delibratę lactucę radix in tenues particulas dissece-
tur, & singula semina singulis indita segmentis obruantur, spinis carebunt.
Dulces pueniunt, si semina lacte & melle maduerint, dein siccata ponātur.
Apud nos hyeme ineunte eas humo obruunt, sic candorē asciscunt, & ama-
ritudinem exuunt, vt in hybernos cibos gratius admittantur.

Inf. rem.

Palladius: Contra talpas prodest catos frequentes habere in mediis car-
duetis, mustelas habent pleriq; mansuctas. Aliqui foramina earū rubrica, &
succo agreſſis cucumeris impleuerūt. Nōnulli iuxta cubilia talparū plures
cauernas aperiūt, vt illæ terricę fugiāt, solis admissu. Pleriq; laqueos in aditu
earū setis pendentibus ponunt. Cassianus: Radices teneras mures expectūt,
captiq; huius voluptate ad eam concurrunt, vorantq; Arcet eorum insul-
tum lana radicibus obuoluta. Item suillum stercus, vel ficulneus cinis radi-
cibus appositus, cæca rerum discordia, vt volunt, incurſam abigent.

De papauere. CAP. LVIII.

SEREMVS etiam papauera in nostro hortulo, quū antiquos seuisse, et-
iam Romanos indicio sit Tarquinius Superbus, qui, vt inquit Plinius, le-

gatis à filio missi
lud responsum
maſtis suis fore
quidem pollici
puissent, amari
Quod planē figi

Cogn

Non

Sed v

Vbi interpre

quali dicitur, q

scribendum alt

ministerium pr

ris notę nigri pa

natum ex Venet

scribit, huius se

ctu solum proba

author esse vi so

mus interempt

li, quum valetu

Græcis unco

membręq; stup

cicuta zoretor, a

dicebat Andrea

ibi primū pap

Plures sunt pa

tur, sciendū q

ste. Satiui plur

à Dioscoride s

cat. Apuleius

sperſum cōpin

batur, vnde for

efformatū sit, à

assignauimus c

lis in clusum. Si

longum, & fen

sa cum melle a

affuso quo inh

condiunt. Sa

puffillum. Add

lore pediculo,

gatis à filio missis decutiendo papauera in horto altissima, sanguinarium illud responsum hac facti ambage reddidit. Periclitabantur antiquitus, an amariis suis forent grati iuvenes, essetq; affectus mutuus, foliis papaueris: si quidem pollicii imponentes ea, & indici, mox collidebant, quod si percrepuissent, amari se argumentabantur: sin minus, vt frustrati ingemiscebant. Quod planè significauit Theocritus his versibus,

Cognoui prius aliquando periclitans si amares me,

Non autem telephyllon collisum insonuit,

Sed vanè molli in brachio conflacuit.

- 10 Vbi interpret telephyllon ramū papaueris esse autumat, dictumq; putat quasi *δηλέριον*, quod amorē præmonstret, vnde sunt, qui nō per *u*, sed per *r* scribendum astruant. Varro papauer apibus gratū dixit, item ex eo duplex ministerium præberi, quippe ex eo cerā & mel conficiunt. Columella vilioris notē nigri papaueris flores ponit. Theocritus, aliq; poetę fingūt papauer natum ex Veneris lachrymis Adonidem lugentis cum rosa. Dioscorides scribit, huius semen in panem densari in vsum sanitatis. Mnesidemus olfactu solum probauit, vi eius soporifera. Diagoras autem, & Erasistratus est author esse vi soporifera, & si plus iusto sumatur, læthifera. Plinius, Hoc sci-
mus interemptum Licinij Cæcinæ prætorij viri patrem in Hispania Baiu-
20 li, quum valetudo impatibilis odium vitæ fecisset. Item plerosque alios.

Græcis *μήκων* dictū *παρὰ τὸ μὴ κοῦειν*, quod vincti papaueris sopore sensus, *Nomen.*
membraq; stupefacta nequeant quicquā agere. Vel dictū eadē ratione quā
cicuta *κόνηλον*, à vertigine & caligine, quam vtrumq; inuehit, excæcari enim
dicebat Andreas visum succo huius, apud Plinium. *μήκων* in sula sic dicta, q̃
ibi primum papaueris fructū Ceres inuenerit. Latini papauer. Itali *papauero*.

Plures sunt papaueris species. Sed quo clarius horū discrimina intelligan-
tur, sciendū quod papauer prima sui diuisione diuidatur in satiuū, & agre-
ste. Satiui plures species, vna hortensis, cuius semen album, cōmuniter est,
à Dioscoride *συλακίτης* ab vitis forma, id est viticulariū. Plinius candidū vo-
cat. Apuleius vsuale, & folliculosum, cuius semen in sanitatis vsum pani in-
30 spersum cōpinsebatur, & cum melle in secunda mensa apud antiquos edebatur, vnde forsan ab Apuleio vsuale, & folliculosum, quod in follis modū
efformatū sit, à Theophrasto fecundo semine describitur, cuius rationem
assignauimus capite de cumino. Nec ei folia decidunt. Semen affert vascu-
lis inclusum. Succus eius lacteo similis. Dioscorides verò: Capitulum habet
longum, & semē candidum. Plinius: Candidi semen tostū in secunda men-
sa cum melle apud antiquos dabatur, hoc & panis rustici crustæ inspargitur,
affuso ouo inhærescens, vbi inferiorem crustam apium, gitq; cereali sapore
condiunt. Satiuum omne magis rotundat capita, at syluestri longum, ac
40 pusillum. Addimus nos. Foliis constat longis, per ambitum serratis, nul-
lōve pediculo, caudicēve, ramis, floribus, vel candidis, vel ex candido

leuiter purpureis, capitalis longis, in quibus semen atrum, vel candidum, ætate siccet, ac subinde semen profert. Aliud genus est apud nos nuper aliunde allatū, in totum huic nostro persimile, nisi quod caput maius, nō nudum, sed multiplicibus foliis contextū, crispis, & copiosis diuersorū colorū. Non genus vnū, aliud enim candidis foliis, aliud rubicundis, aliud purpureis, & demum variatis, intus grana, vt papauer, sed caulibus & foliis longe nostrati maioribus. Dioscorides: Syluestri verò, caput insidens, dimissumq; & nigrū semen, pithitis nominatur, nōnullis tamen & ipsum rhæas dicitur, quoniā eius scapo lacteus succus emanat. Aliud genus syluestre, qd ad medicinas valentius, multò his longius, p. ductiore capitulo. Dioscorides à dolij forma pithire, id est doliare dixit. Plinius verò hoc genus esse satiuū dicit, aliud est genus papaueris nigrū, cuius scapo inciso lacteus succus excipitur. Apuleius agreste, syluaticū, & rhæada vocat, & ex hoc opū fieri, & meconium. Sed tertiu genus iis syluestrius, & medicamentosius, quod Plinius, contra quā Dioscorides & Apuleius tradiderunt, rhæada à Græcis, à nostris erraticū vocari dicit. Aliud genus Theophrastus erraticū vocat, his verbis: Aliud erraticū vocatum, nō b. simile intubo erratico cōstat, quamobrē in vsum venit cibarium. Nascitur potissimū in aruis inter hordea, florē rufum producit, caput vnguis pollicaris magnitudine anget, colligitur ante hordei messem, estq; viridius, purgat inferius. E cuius penu hæc Dioscorides deprompsit: Papauer erraticū quod rhæada vocāt, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus decido, vnde & nomen apud Græcos accepit, folia cruce aut origano, aut cicorio, aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra, iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper, flos syluestris anemones, puniceus, interdū albus, caput oblongū, sed quā anemones minus, semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Ex his Plinius: Tertiū genus satiuū, rhæam vocant Græci, nostri erraticū, sponte quidem, sed in harenis cum hordeo maximè nascitur, erucæ simile, cubitali altitudine, flore rufo, & protinus decido, vnde & nomen à Græcis accepit. Et alibi. Inter satiuā, & syluestriā medium genus, quoniā in aruis, sed spontè nasceretur, rhæā vocauimus & erraticum. Aliud syluestre genus Theophrastus cornicularū appellauit. Folio constat verbasco nigri, sed minus nigro, caulis altitudo cubitalis, radix brevis per summa cespitū, fructus inflexi vt cornicula figurantur. Legitur circa messem, & aluū purgare potest. Folium albuginē ouibus aufert, nascitur iuxta mare, locis saxosis. Ex eo Dioscorides: Corniculariū folia habet candida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu syluestris papaueris more ferrata, caule nō dissimili, flore pallido, cauliculo scenigreci, in corniculorū modum inflexo, vnde nomē mutuatur, semine papaueris pusillo, nigroq; radice per summa cespitū nigra, crassa. Nascitur in maritimis, & asperis. Plinius: Syluestriū genus vnū, ceratitim vocant, nigrum cubitali altitudine, radice crassa, & cor-

& corticosa, calicem
ceteris syluestribus
Aliud Heraclio
tribuunt, radice
Aliud papaueris
(intellige Theophrastus)
milibus, fructu
radice in summa
exiccata. Plinius
vocatū, ab aliis a
tantibus, radice
rem trahunt æli
& Dioscorides
rhos dicitur, & l
Plinius optin
ram exoptare vi

Vrit

Vrit

Cato de pap

neq; lapidē hab

& sarmenta, qu

bussis, ibi pap

tet papaueris se

postidus Febru

dius. Locis siccis

minari. Fertur

Cato virgas &

eas combusser

nunc, etiā Tra

aliorū satus, vt

cum lactuca. V

E T nostro h

res vesceba

lus tradidit. G

addit, quo faci

Plinius inquit

coqueretur di

eo morbos, n

cito adolefcit,

Hippocrates

& corticosa, caliculo inflexo, vt cornicula. folia minora, & tenuiora, quam cæteris syluestribus, semen exile, tempestiuum est messibus. Theophrastus: Aliud Heraclion nuncupatū, folio constat struthi, quo splendorem linteis tribuunt, radice in summa terræ eunte, fructu albo. Ex quo Dioscorides: Aliud papaueris genus aphrodes, id est spumeū vocatū, ab alijs Heraclium (intellige Theophrastū) caule dodrantali, folijs admodū paruis, radicule similibus, fructu inter ea candido: nam herbula alba tota est, & spumea tota: radice in summo cespite, legitur æstate: semen, quū integrè adoleuit, decedit exiccatum. Plinius ex his omnibus: Aliud è syluestribus genus, Heraclion vocatū, ab alijs aphron, folijs, si procul intuearis, speciem passerū repræsentantibus, radice in summa terræ eunte, semine spumeo. Ex hoc linea splendorem trahunt æstate. Sed quæ Theophrastus de strutho radícula seu herba, & Dioscorides dicūt, Plinius de strutho aue intellexit, nam & auicula struthos dicitur, & lanaria herba est struthos dicta, cui cōparari debuit à Plinio.

Plinius optimum in siccis nasci dixit, vbi raro pluit. Ex Virgilio lætā terram exoptare videtur: nam vrere dicit eam.

Vrit humum lini seges, vrit auena,

Vrunt Letheo perfusa papauera somno.

Cato de papaueris satione hæc habet. Si ligna, & virgas nō poteris vèdere, Satio.

neq; lapidē habebis, vnde calcē coquas, de lignis carbones coquito, virgas & sarmenta, quæ tibi vltioni supererunt, in segetē comburi, vbi eas combusseris, ibi papauer serito. Columella, Circa calēdas Octobris obrui oportet papaueris semen, nō frigidissimo loco: nam si regio sæuas hyemes habet, post idus Februarias, semine differenda sunt, suaq; de sede partienda. Palladius, Locis siccis, & calidis Septembri seritur. Potest & cum alijs oleribus seminari. Fertur vtilius provenire, vbi virgæ & sarmēta cōbusta sunt. Plinius: Cato virgas & sarmenta, quæ tibi in satione superāt, in segete cōburito, vbi eas combusseris, ibi papauer serito syluestre. Vere papauer seritur, atq; vti nunc, etiā Transpadani seruant vsq; in quinquatrus. Sunt quædā comitātia aliorū satus, vt papauer: namq; cum brassica seritur, ac portulacā & cruca, cum lactuca. Vnum erit hoc idem tempus lino, & papaueri serendo.

De attriplice. CAP. LIX.

ET nostro hoc orto attriplicē seremus, postquā inter olera, quibus veteres vescebantur, Theophrastus recenset. Dioscorides coctū edi, vt olerus tradidit. Galenus hanc herbā cum oleo, & garo miscet, & acetū quoque addit, quo facilius, & citius secederet à stomacho. Pythagoras accusauit (vt Plinius inquit) tanquā faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorē, & coqueretur difficillimè. Addidere Dionysius, & Diocles plurimos gigni ex eo morbos, nisi mutata sæpius aqua coquatur. Præstat cibis vere, nam vt

cito adolescit, sic cito marcescit.

Hippocrates ἀνδροπάειν appellauit, Theophrastus ἀνδροπάειν, vel ἀνδροπάειν. Nomen.

Y Y y

ξιν alibi: nomē impositū ab ἀδρῶς αὐξεν, quod suā celerrimē amplitudinem assequatur; confestimq; incremento proficiat. Dioscoridi ἀτράξις, & posteriores Græci Attici ὁλίτερα mutata in τ: vocari itē χρυσόλαχον Dioscorides dixit, id est aureū olus, vel à luteo flore, quē profert, vel quod ad capillos aureo colore tingēdos optimū existat. Plinius, Latinis, authore Festo, atriplex, veteres verò atraplexū, sed à Græco nomine potius, quā ab atrore, quē hominibus evescētibus inducat, ut diximus ex Pythagora. Itali atriplice.

Genera. Theophrastus generis diuersitatē ei deesse scribit. Dioscorides in duo genera diuisit: syluestre, & satiuū. Plinius item in syluestre, & satium diuisit. Apud nos syluestriū plures species, & maritimū vnum in littoribus nascens, quod à frondium, seminum, & radice similitudine liquido apparet.

Descriptio. Radix ei vna in altitudinem descendens, vnde fibratæ alię promuntur, ut in beta. Lignosa, sed minus quā ocimo. Foliatū habet semen, & obductū cortice, numerosum, racematimq; singulis ramis insidens. Vtraq; parte affert: nam & fructificare ē suo latere potest: & sic copiosius. Ex Theophrasto. Plinius ab eo. Rectam atriplex habet radicē, statimq; plurimis nititur capillamentis, ut blitum. Semen cortice obductum. Dioscorides & si peculiari suo capiti descriptionē non præfixerit, possumus tamē ex aliis herbis, quibus assimilauit, notas aliquas extorquere. Semen habet cœnantes, folia xanthij herbæ, sed secta. Addimus nos. Hortensis caule assurgit quadrato & rubenti, ramis brachiato, folio caule tenus lato, in acutū desinente, sagittarum more, succoso, pingui, quū pubescit herbaceo, quum senescit in luteum ex viridi languescēte. Flore luteo, exiguo. Floret Iunio, & Iulio mensibus, inde semen profert, pressō ac tenui folliculo incluso. Syluestris non nisi natalibus differt. proceritate luxuriosa tamen prodit, ut quaternos sæpe cubitos excedat. Maritimum humi spargit caules, folia subalbicantia, ac gustu falsa, ut in omnibus maritimis conspicitur.

Colum. Plinius miratur, quod Solon Smyrneus in Italia atriplicem difficulter nasci scripserit.

Solum. Palladius pingue, & humidum solum amare scripsit, & assiduo humore fatiari, & succo lataminis.

Satio. Theophrastus octauo die nasci scripsit, eiusq; semen ad perdurandū infirmitatem habere. Plinius, Infirmitas sunt semina atriplici. Columella: Circa Calendas Octobris obrui oportet, nō frigidissimo loco: nam si regio sæuas habet hyemes, post Idus Februarias semina differenda sunt, suaque de sede partienda. Palladius, Aprili feremus, si rigare poterimus, & Iulio, & cæteris vsque ad autumnum. Semen statim quum spargitur, obruendum est, herbæ ei subinde vellantur. Transferri necessarium non est, quum bene feritur, tamen potest melius adolefcere, si spatio rariore pangatur, ferro tamen refecandum est semper, quia ita pullulare non cessat. Plinius vult autumni æquinoctio feri. Tam cito crescit, & adolefcit, ut quintodecimo die

sera-

seratur, & mand
Pythagora culpa

Nec ab atr
detran vet

intactū reliquen
præsertim vern

cina natū sit, ne
radicis capillam

inter eoquendū
Ligula subinde

bos expressa pe
dito, quo magi

triplicis vires vi
ieiuniori solo c

Soutlomac
quod vt reor pa

ticulato semini
centioribus m

dici vt erentur.
naceo nomine

herba glabra, &
nis principes H

alias nationes c
Exit folio pi

cimis & pinis
lis rotundis in

rido, radice ex
nio, & Iulio m

Mas senen
Solum ping

lum respuat, &
Callianus.

Iunio etiam se
tur. Seritur S

Martio, Apr
carpitur, & si

Non horret h
40 RECENSE
lenus nō

feratur, & mandatur. Vnde eripit à cōfinio cæteris herbis alimentū. Vnde à Pythagora culpātū est in hortis, nil nisi quidem lāgūidum iuxta illud nasci.

De *spanachiis*. C A P. L X.

NEC ab atriplicis natura olus hoc, vulgò *spanachia* dictū, multum diffidet: an veteribus minime fuerit cognitum in dubium vertitur, quum intactū reliquerint, quum tam frequens olus mensis quotidiano vsui sit, & præsertim verna ieiunia saturet: vel forsā quòd cibo potius, quàm medicinæ natū sit, nec in ea quicquā illustre sortitū. Eruitur radicitus, abiectisq; radicis capillamentis, citra aquā coquitur, vtpote quū magnā vim humoris inter coquendū remittat, & velut proprio contentū iure alienū aspernetur. Ligula subinde percussū ab actō lētore versatur, deinde in manuales globos expressa penitus sanie redactū, patinis in oleo, vel butyro frigitur, addito, quo magis palatū titillet, omphacio, vel acerbarū vuarū melligine. Atriplicis vires videtur sibi arrogasse, par ingenio. Videtur neglectū atriplex ieiuniori solo creditū, in hoc olus degenerasse, prioris naturæ nō oblitum.

Seutlomachon apud Cassianum reperias, quasi dicas maluacēā betam, quod vt reor parentum ad alterio natū existiment: vel quod figura, & denticulato seminis habitu betā, & mollitie maluā mentiatur. Græcis etiā recentioribus *σπανάκια* haud dubie ab oleris raritate dictū, quū raro illo Medici vterentur. Vel quod verisimilius est ab aliis nationibus emedicato spinaceo nomine. Latinis spinacia, ab insigni seminis spiculorū nota, & si ipsa herba glabra, & mollis sit: semen in spinas occalescit. Mauritanæ factio- nis principes Hispanicum olus appellauere, fortasse quòd illic oriundū ad alias nationes commigrauerit. Itali *spinaci*.

Exit folio primum triangulo, molli, sagittæ modo cuspidato, mox laciniis & pinnis dēato, caule cubitali, nō nunquā altiore, intus cauo, flosculis rotundis in vertice, racematim coeuntibus, herbaceis, semine spinis horrido, radice exigua, tenuibus capillamentis fibrata, sapore inerti. Floret Iunio, & Iulio mensibus.

30 Mas semen profert, fœmina seminis infœcunda sterilefcit.

Solum pingue, & benè pastinatum Neapoli concedimus, & si nullum solum respuat, & vbi cunq; satum fuerit, latissimè proueniat.

Cassianus. Aprili seritur seutlomachon, & mense Maio, & transplātatur, Iunio etiam seritur, & transplantatur Iulio. Augusto seritur, & transplantatur. Seritur Septembri, & transplātatur. Nos Decēbri, Ianuario, Febuario, Martio, Aprili, & Maio mensibus serimus. Septimō à satū die prodit. Quum capitur, & si eius caulis inciditur, iterum pullulabit, & diutius perdurabit. Non horret hyemis frigora, vt possit verno tempore cibum suppeditare.

De blito. C A P. L X I.

40 **R**ECENSET blitū Theophr. inter olera. Dioscorides itē vt olus edi. Galenus nō solū cū olēo, & garo, sed etiā aceto ob suā insipiditatē. Insi-

dum olus omnino est, vt rudes homines prouerbio bliteos nuncupemus. Scribitur à Plinio inde cōuitium fœminis apud Menandrum facere maritos. Apud Aristophanem *βλιτομάχους* pro stolidis accipitur, & apud Plautum in Truculento per conuitium blitea vocatur meretrix, quod insipida, vilis, & nullius pretij sit. Blitea & lutea est meretrix. Aprilii ieiunia rusticorum implet, & olitorio foro apud nos ab infima plebe coemitur.

Nomen. Theophrasto *βλίτον*, Dioscoridi *βλήτιον*, Suida *βλίτιον*, quum fatuum olus, & sine acrimonia possideat ingenium. Latini blitum, & blitus, Itali *biedone*, Neapolitani *aitillo*.

Genera. Apud nos duplex visitur genus, candidum & rubens: est & aliud ruberrimum, quod fistilibus vasculis à nostris mulieribus in fenestris asservatur ob coloris præstantiam, cuius folia iuribus incocta, sic ea rubore inficiunt, vt sanguinis colorem representent. Trallianus nigri bliti meminit.

Descriptio. Theophrastus ita delineat. Multicaulis est, foliis betaceis, & sine acrimonia fatuis, semine corticeo copioso, racematim singulis ramis insidentii. Item inferiori, & superiori plaræ parte fruticat. Radice nõ vna nititur, crassa & in rectum tendente, vt beta & lapathon & olerum pars maxima, sed cõtinuò proluxa, ac multiplici. Minus lignosa quàm ocimo. Plinius, Quæ recta non habent radicem, statim plurimis nituntur capillamentis, vt blitum. Tam vulgaris notitiæ apud nos est, vt verè bliteus sit, qui illud non cognoscat. Candidum surculosius rubro, ramis vndiq; racemoso fructu scatentibus.

Solum. Palladius. Solo qualicunq; seritur, sed culto.

Satio. Theophrastus ocysimè nasci dixit, vt tertio die erumpat. Ex tertia est semine, quam æstiuam appellant. Mense Martio seritur. Plinius: tertio die erumpit. Palladius, Martio seritur, neq; runcari, neq; sarculari flagitat hoc olus: quum semel natum fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit, vt id, si velis, vix possit aboleri.

De malua. CAP. LXII.

E Contrario in magnis laudibus malua est vtraq; & satiuæ, & syluestris. De eisdem mira traduntur ab authoribus, sed maximè si quotidie quis succi eius sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Adeoq; maluæ Veneri nascuntur, vt semen vnicaulis aspersum genitali, fœminarum auditates augere in infinitum Xenocrates tradat, ex Plinio. Maluæ vsum pro oleribus increbuisse satis testantur authores. Theophrastus dicit ex iis oleribus esse, quæ coquantur. Dioscorides, Satiua esui aptior syluestri. Vescabanturea maiores nostri ad aluum subducendam in acetariis. Martialis,

Vtere lactucis, & mollibus vtere maluis,

Nam faciem durum Phæbe cacantis habes.

Celebratur ab Hesiodo in moralibus ad Persem fratrem suum, inquit,

Hand norunt stolidi, quam toto dimidium plus,

Nec
Græcis *malua*,
ventre dictam
maluam, quasi
Ex plurimorum
Duo genera ear
pen vocant in sa
bus, cui grande
à quibusdā arista
duæ in duas alias
caule fundit. Di
strium prima co
althea dicta.
Theophrastus
eodem inclinam
refert, eodem n
uocat, quod et
Et ob id ab A
quæ Phaniæ G
uæ seminis forn
quam columna
lis foramen spic
quod facillè seca
syluestris pumil
magno, floribus
æstat, maxima
miu à sua natu
nis septenisq; m
hastæ grandesc
culi vice funga
Theophrasto.
arborefcere, b
Mauritania Lis
pals. ab Oceano
altitudinis ped
Galenus *malua*
Pinguis solo
solum in quo so
Columella
eis, ubi possit

Nec quam magna sit utilitas maluæ, asphodeliq; Nomen.
Græcis *μαλάχη*. Sed Antiphani, & Euplio *μολόχη*. Plinius ab emolliendo
ventre dictam putat, *μαλάττειν* enim mollire est. Latinis malua. M. Varro
maluam, quasi moluam dici, quod aluum molliat. Italis *malua*.

Ex plurimorum authorum scriptis elicitur generum discrimen. Plinius. Genera.
Duo genera earum amplitudine folij discernuntur, maiorem Græci malo-
pen vocant in satiis. Alteram malachen, ab emolliendo ventre. E sylvestri-
bus, cui grande folium, radices albæ, althea vocatur ab excellentia effectus,
à quibusdā aristalthea. Nos autē: Malua duplex, satiua, hortensis, quarum
duæ in duas alias secernuntur, ex hortensibus prima, quæ rosas è maluaceo
caule fundit. Diximus de ea in coronario genere. Secunda vesca est. Sylue-
strium prima edulis est, altera medicæ tantū facultati inseruit, arborescens
althea dicta.

Theophrastus annicaulem dicit. Cuius folia iter solis sequantur, seque Descri-
eodem inclinant, quo sydus feratur, quod humoris detractio acceptum ptio.
refert, eodem nanq; inclinari par est, quo sol humorem feruefaciens pro-
uocarit, quod etiam Lucius Columella numeris tradidit,

Et moloche prono sequitur qua vertice solem.

Et ob id ab Apuleio heliostrophos appellata. Nec silentio prætereundū
quæ Phnias Græcus, Athenæo referente, prodit vernaculæ, urbanæq; mal-
uæ seminis formâ placentiam vocari, quod eius omnino referat imaginem,
quam columna facit pectinatim denticulata, à qua per mediū placetq; mo-
lis foramen spiculū exeritur, vmbilicū exprimens, echinato basis ambitu,
quod facile secanti circulante seminis globulū liquido patebit. Addimus:
sylvestris pumila, & humi repens, folio rotundo, nonnihil lacinioso, caule
magno, floribus ex candido suppunicatibus, radice candida, floret per totā
æstatē, maximamq; autumnī partē. Quæ facile potest cultus mangonio ni-
miū à sua natura desciscere, vt in aliud genus permeare videatur, quippe se-
nis septenisq; mensibus, tanta longitudine, crassitudineq; proficit, vt instar
30 hastæ grandescat, arborescensq; ad vsum baculi veniat, & identidē admini-
culi vice fungatur, ac longiusculo tempore maius incrementū capeſſat, ex
Theophrasto. Plinius. Authores tradunt in Arabia maluas septimo mense
arboreſcere, baculorū vsum præbere extemplo. Sed & arbor est malua in
Mauritania Lixi oppidiæ ſtuario, vbi Hesperidū horti fuiſſe produntur, co-
paſis. ab Oceano iuxta delubrum Herculis, antiquius Gaditano, vt ferūt. Ipſa
altitudinis pedes xx, crassitudinis, quam circumplecti nemo poſſit. Hanc
Galenus *ἀνὰ δένδρον μαλάχην* dixit, id est arboreſcentem maluam.

Pingui solo delectatur & humido, gaudetq; latamine, ex Palladio. Omne Solum.
solum in quo feratur, pinguius facere dicitur.

40 Columella feri poſſe vere ait. Palladius Februario, & Martio, & Iulio lo-
cis, vbi poſſit rigari. Octobria autē ſerendam eſſe, quæ occuſu hyemis ab
Satio.

incrementi longitudine reprimatur. Transfertur planta, quum cœperit quatuor folia habere, vel quinque. Melius cōprehendit eius planta, quæ tenera est, maior enim translata languebit. Sapor illis est melior, si nō transferantur. Sed ne citò erigantur in caulem, in medio earum glebula constitues, aut lapillos. Rara ponenda est. Surculo delectatur assiduo. Sic liberanda est herbis, ne motum sentiat in radice.

De rumice. CAP. LXIII.

RECENSETUR & inter olera, quæ coqui exigunt, rumex à Theophrasto, Dioscoride, Plinio, & cæteris. Et si nostra ætas olera hæc aboleuerit, non excludemus tamen à nostro hortulo. Plinius ceram apes ex omnibus floribus conficere, excepta rumice tradit, eiusq; vsum cum ptisana tantum in cibis leuiorem, gratioremq; saporem præstare.

Nomen.

Græci *λάπαθον*, ab effectu nomē indiderunt, etenim *λαπάζεν* vacuare est: omnium siquidē generū decoctis foliis aliis exinanitur. Theocritus *ἀλάπαθα* vocauit. Latinis nomine à Græcis mutuato lapathum, & rumex dicitur. Columella,

Lubrica ceu lapathos.

Genera.

Varroni antiquo vocabulo manna ruris dicitur, vt opinor. Itali *lampaz*. Theophrastus generum diuersitatem tollit, contentus scilicet satiuū & syluestris discrimine. Dioscorides quinque recenset. Oxylapathum primum, cuius anceps videtur significatio, num scilicet ab acido sapore, vel ab acuta figura, nempe à foliis, quæ in mucronē desinunt, nomē acceperit, aliud secundum, tertium syluestre, quartum oxalida dictum, quod in acetariis nominauimus, quintum hippolapathum, quasi grande lapathum dicas.

Descriptio.

Oxylapathum Dioscorides vocat, quod in acutum tendat, prædura habens extrema, nō nisi palustribus nascens. Plinius: Est & alterum genus, ferè oxylapathon vocant, satiuo item similis, & acutiora habens folia, ac rubriora: non nisi in palustribus nascens. Sunt qui hydrolapathon tradant in aqua natum. Surgit apud nos caule cubitum, & sesquicubitum alto, rotundo, striato, purpurascēte, flore muscoso, semine triquetro in folliculis. Radix illi subest pedem longa, digiti crassitudine, flaua. Aliud genus Dioscorides priori non dissimile dicit. Hoc foliis supernè magis retusis, brevioribus, rotundioribus, vere à superiori vix discernendum. Tertium syluestre paruum, plantagini proximum, humile, & tenerum à Dioscoride pingitur. Plinius: Solum ex omnibus lapathū syluestre melius. Hoc in satuiis rumex vocatur. Theophrastus, Syluestre breuiorem agit radicem, multicaule, atq; ramosum consistit, & tota forma quum perfectum est, betæ proxima sanè cernitur. Quartum hippolapathum, olus magnum in paludibus nascens Dioscoridi. Sed Plinius: Est & aliud hippolapathon, maius satiuo, candidius, ac spissius. Apud nos hoc genus Rhabarbarum monachorum dicunt, triualis notitiæ in nostris hortis, Surgit caule trium, vel quatuor cubitorū,

radice

radice adlior
hydrolapath
detur Theop
taueris ramicen
prætenues, nit
ternis: diuturn
lera vincit, per
fistit, qua de cau
Cuncta gene
10 Theophrast
pacto locis cult
iis, quæ autum
hoc in satuiis ru
durare, nec vin

SOLANVM
duobus alter
Dioscorides ho
esse prædicat X
bus in olera est
Græcis *επιρρ*
num videtur sig
literæ mutation
Hortēlis sola
Theophrast
idoneus, exilis
mi, & latiore, f
uescit. Addim
lensis, quasi in
30 10 aliis rubris pur
Septentrion
que viis, hortis,
ueniens, & opa
Olim cum h
nunc sponte,

SEMEN fer
que anni sp
40 hanc vocant, c
mendantur quæ

radice aduultiore, flauiore, gustu, & facultate, rhabarbarum imitante, folio hydrolapatho pari, vel latiori, minus acuto, rigidoque. Hoc describere videtur Theophrastus: Satiuo radix lignosa: vni stirpem maximè omnium putaueris ramicem, nec enim lateribus crassas vllas penitus agit, sed tantum prætenues, nititur altissima omnium radice, maiore nanque semipedibus ternis: diuturnitate quoque syluestrem, & in totum, vt ita loquar, omnia olera vincit, perdurat quantum vis temporis, carne plena, atque humecta confistit, qua de causa effossa diu viuere potest.

Cuncta genera vbiuis abundè prouenientia.

- 10 Theophrastus è secunda satione esse dicit, quæ autumnò feruntur. Nullo pacto locis cultis prouenit, aut vitiosè deteriusque efficitur. Plinius ab eo: Ex iis, quæ autumnò feruntur. Ex omnibus lapathum syluestre melius satiui, hoc in satiuis rumex vocatur, nascitur fortissimum. Traditur semel satum durare, nec vinci vnquam à terra, maxime iuxta aquam.

Cœlum.

Satio.

De hortensi solano. CAP. LXIII.

SOLANVM esculentum tantummodo vnum profert Theophrastus, ex duobus alterum somnum, alterum insaniam, & interdum mortem afferre, Dioscorides hortense solanum cibus idoneum dicit. Nihil mali corporibus esse prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. A multis hodie nationibus in olere estur gustu innocens.

Græcis *σπύγγη* dicitur, vt tradit Cornelius Celsus, Plinio referente, acinum videtur significare: acinos quippe quamplures retinet. Galeno vnus literæ mutatione *σπύγγη*. Latinis solanum. Italis *solatro*.

Nomen.

Hortensis solani duo genera apud Dioscoridè, à fructuum colore distincta.

Genera.

Theophrastus fructum acinosum afferre dixit. Dioscorides, Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis coccineis alis, folio nigro, maiori quam ocimi, & latiore, fructu rotundo viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Addimus: Flosculis albidis, stellatis, Iunio, & Iulio bacculis succulentis, quasi in corymbum collectis, primo viridibus, post fuscis, nigrisque, aliis rubris purpureis, vel fuluis rutilis. Radice alba, pusilla.

Descriptio.

Septentrionali, & meridionali cœlo viuunt. In Ægypto familiare cibus, vbi que viis, hortis, cultis incultisque locis, scrobibus, marginibus, & arcibus proueniens, & opacis locis.

Cœl. Sol.

Olim cum hortensibus oleribus ferebatur in hortis, quæ edendo erant, nunc sponte, & inuitis cultoribus prouenit.

Satio.

De ferulis. CAP. LXV.

- 40 SEMEN ferulæ in Italia cibus est, inquit Plinius, conditur quippe, duratque anni spatio in vrcis. Duo eius genera, caules, & racemi. corymbiam hanc vocant, corymbosque quos condiunt. Caules eduntur decocti, commendanturque musto ac melle, stomacho viles: sin plures sumpti, capi-

tis dolores faciunt. Dioscorides, Caules ferulæ si edantur, capitis dolores facere, ac muria cōdiri, scribit. Columella sic docet. Ferulam quā legēris sub tecto exponito, dum flaccescat, dein folia, & corticē omnem folliculorum detrahito. Caules si fuerint pollice crassiores, arundine secato, & in duas partes diuidito, ipsos quoq; flores, ne sint immodici, deduci & partiri oportebit, atq; ita in vasa cōdi, deinde ius, q̄ est mistū duabus partib; aceti, & vna muria infundi, & paucas radículas laseris adiectas in spissamento sceniculi aridi cōtegi, vt ius superueniat. Scribit etiā Plinius, quod antiqui vtebātur coronis ē ferulis, & corymbis. Natura ferularum murenis infestissima: moriuntur ea tactæ. Asinis gratissima sunt in pabulo, ceteris iumentis presen-
taneo veneno, qua de causa id animal Libero patri assignabatur, cui & ferula. Erat enim Baccho, Sileno, & suis comitibus dicata. Virgilius in Gallo.

Venit & agresti capitis Sylvanus honore,

Florentes ferulas, & grandia lilia quassans.

Baccho dicata, quod ad baculū aptissima sit, & infirmi in ebrietate pedes leui hoc pedamento regantur. Aliā assignat Eusebius rationē libro de præparatione euangelica, quia quū homines merū biberent, & furiosi cuaderent, se baculis inuicē feriebāt, vnde sæpe mori cōtingebat: vt ergo malum istud euitaret, ferulis vsi sunt, quarū leuis, & nō latifer ictus foret. Aliā verò Plutarchus in Sympotiacis affert causam, nempe vt significaretur quod si inter pocula aliqua in parte peccatū sit, leuis puerilisq; reprehensio sufficiat: nam & pueri ferula castigantur. *παῖδες ἰνκοπέροι* Platonī in Phædone dicuntur Bacchi ministri, quasi feruligeri. Antiquitus ferula Imperij nota fuit. Leuis eius arboris ictus est: idē significabant magis ex seueritate eos, qui ceteris præfunt, & dignitate, quā fultium atrocitate, & verborū asperitate formidabiles esse debere: regū instar, quibus sceptrā cōceduntur, vt legibus asperiores sed pœna mitiores sint. Fuit & insigne ferula pædagogorum, quod illa manus puerorum percuterentur. Martialis,

Ferula minaces sceptrā pædagogorum,

Et Iuuenalis. Et nos quoq; manus ferula subduximus.

Nulli fruticum maior leuitas, & cum ligni leuitate durities, & rigor firmior. Ob id gestata senectuti & à longa valetudine se recolligētibus facilius baculorum vsus præbet. Lignum omne corticis loco forinsecus, loco veri ligni fungosam intus medullā habet. Quare Clearchus inter lusorias quæstiones, quas scirpos vocamus, Græci gryphos, & anigmata, Ferulā lignum esse, & non lignum dicebat. Sunt ferulæ cibo, & coronis commendabiles: nobis verò veris initio prima ferulæ germina, quæ ouī luteum referunt, sub cineribus excocta, charta prius, vel linteo madefactis inuoluta, mox pipere, sale, & oleo, & aceto cōspersa gratissimo sunt cibo. Author est Plinius salpā obsecrū piscem dici, quod percoqui, nisi ferula verberatus fuerit, nequeat. Ignē ferula adseruari certū est. Fingūt Poetæ Prometheū in cœlos à Minerva
subla-

sublarum, ferula
Veritatis fides est
ferula adseruari d
perpulchram: cor
adseruatur, vt se

Græcis *γρυφός*

dicitur videri faci
tum, & baculum
ferendo ferula d

Theophrastus
niculata, a genibu
menti modo exte
tia, vt harundine

mum folio, tum
teneritudo proce
ex insulis fortuna

Ferula caulem aff
riora. Plinius arb
hoc est forinsecu

Geniculatis nod
ra proxima. Cæ

Apulæ quinum
cipue si in saxoru
ptis rupium saxis

ter odorata. Iunio
oblongum.

Ferulaceum g
de eo, quod com
lagine, seu idem

fit, vt nonnulli p
in altitudinem f
pergitur, quibus

eo. Quæ ab vno
tot sunt generat
rentes, quas feru

Calidis ferul
vocatur, in qua
pto præcellunt.

larum maximē
vent diem. Apu
profissimē fruti

sublatum, ferulam rotis Phœbi admouisse, & accensam in terram deportasse. Veritatis fides est, quod Prometheus primum ignem è silice prouocarit, & in ferula adseruari docuerit, scribente Plinio. Aliam nos docemus rationem, & perpulchram: continuo enim ferularum attritu excitatur ignis, & in eis optimè adseruatur, vt sæpius experti sumus.

Græcis *ῥαπῆς*, Latinis & Italis ferula: non minus à feriendo, quàm ferendo dictam videri facit Hippocrates, qui eam plestinga vocauit; vt Græcis virgultum, & baculum significat, sic Latinis, quod senibus pedes ac scipiones essent, à ferendo ferulæ dicuntur.

Nomen.

- 10 Theophrastus ita describit. Ferula grandis admodum surgit, vnicaulis & geniculata, à genibus cauliculi & folia alternatim exeunt grãdia, mollia, capillamenti modo extenuata maximè, vt quæ terræ sunt proxima caule amplectentia, vt harundines. Flores lutei, & semen anethi obscurum. Germinat vere, primum folio, tum caule, qui annotinus ei est. Radice singulari profunda. Eius teneritudo processu transit in lignum. In fruticum genere est. At in Nerio vna ex insulis fortunatis altitudine tanta, vt arbor existimetur. Dioscorides verò. Ferula caulem affert ternum cubitorum, folia sceniculi longè asperiora, & latiora. Plinius arborum generi ascribit, quoniam lignum corticis loco habet, hoc est forinsecus, ligni autem loco fungosam intus medullam, vt sambucus.
- 20 Geniculatis nodata scapis. A genibus exeuntia folia maxima, vt quæque terræ proxima. Cætero natura eadem, quæ anetho, & fructui similis. Addimus: Apuliæ quinquaginta cubitorum caulis, radix magna, recta, euulsu difficilis, & præcipuè si in saxorum hiantes commissuras descenderit, vt apud nos in præruptis rupium saxis in maris prospectu. Lacteo pingui succo turgida, vehementer odorata. Iunio, & Iulio floret. Semen foliaceum, compressum, rotundum, oblongum.

Descriptio.

Ferulaceum genus in plures species distinguit Theophrastus. Sed primum de eo, quod commune omnium constat, dicendum est, scilicet ferula, & ferulagine, seu idem genus ambabus, differens magnitudine tantum, seu alterum fit, vt nonnulli putarunt; magnitudine sane differunt. Ferula enim assurgens in altitudinem finditur cacumine, inque stipites quosdam, haud magnos, dispergitur, quibus flos semenque insidet. Ferulago autem humilis est. Plinius ab eo. Quæ ab vno caule diuiditur in cacumine scemina putatur. Sed in Apulia tot sunt generum diuersitates, & species, statura, elegantia, formaque differentes, quas ferulagines vocat, vt quæ sit illa Theophrasti, difficile sit inuenire.

Genera.

Calidis ferula nascitur, atque transmarinis. Inter fortunatas insulas Notion vocatur, in qua ferulæ tanta crescunt amplitudine, vt arbores fiant. In Ægypto præcellunt. Plinius, In Africa quoque, vt Solinus tradit. Apulia nostra ferularum maximè ferax, quæ æstiuos soles, & feruidos exceptos, totum ferme formentum diem. Apud nos præruptis saxorum crepidinibus, mare aspicientibus, copiosissimè fruticat.

Cælum.

De fragis. CAP. LXVI.

NON deerit fragis locus in nostro horto, etsi non inter olera recenseatur, sed inter horti delicias, & gulæ oblectamēta. Sunt enim ex herbis sponte nascentibus, quibus pleræque gentium utuntur in cibis, tanta est ciborum ex herbis abundantia, ut fraga. Versu Maronis nota:

Qui legitis flores, & humi nascentia fraga.

Nomen. Videtur Græcis incognita, fragrat enim maximè fructus purpureus, sanguineus, diluti cruoris, saturus, ob id fragra dicta, & fragrantia. Nobis *fragole*.

Genera. Apud nos duo genera, quorum alterius ruber fructus, alterius albicat.

Descriptio. Humilis herba, folio terno, viticulis exilibus, enodibus, numerosis, pilosis, ab radice tenui, superficialia, fibrosa, prodeuntibus floribus in summo, albis, rubi minoribus. Vere fert fructum, arbuti fructum æmulantem, & tota æstate maturat.

Solum. Syluosis familiaris, & viarum marginibus, & montibus. Ouidius,

Arbutos fœtus montanaq; fraga legebant.

Cultio. Pastinatur in hortis solum, & in sulcos diducitur. Inde è syluis eruantur, ubi sponte nascuntur, ut caules plantantur, primis autumnii imbribus, post mensem stercoreantur columbarum fimo, nam ipsis peroptimum. Seruntur longo inter se intervallo: nam cauliculi, ubi terram attigerint, radices capiunt.

De genere cartilagineo, & primùm de cucumere sylvestri, & de satino, & obiter de pepone. CAP. LXVII.

SED iam cucumerarium ingrediamur, ac per eius species euagemur. Diximus enim, quæ in hortis commendantur folio, caule, & semine, nunc quæ radicibus, scilicet capite, bulbo, carne, tunicisq; carnosiss. Plinius totū hoc genus cartilagineum vocat. Inquit enim, Aliorum fructus in terra est, aliorū extra, aliorum non nisi extra. Quædam iacēt, crescuntq; ut cucurbite & cucumis, eadem & pēdent, quanquam grauiora multo etiam iis, quæ in arboribus gignuntur. Terra conduntur raphani, napiq; & rapa, atq; alio modo in ulæ, sifler & pastinaca. Sed cartilaginei generis, extra terram est, cucumis. Ab eo tandem incipiemus. Refert Palladius, Quoties tonat, veluti timore perterritus, conuerteritur. Plenilunio maximè gliscūt in hortis, manifestumq; cape sunt incrementum, & more marinorum echinorum implentur, ut tradit Athenæus. Diphilus Carystius cucumerem velut noxium primis mensis damnavit, ut qui raphani modo sursum feratur. Ultimo cibo innocentiorē esse, concoctūque faciliore pollicetur, & venerem arcere. Plinius, Viuant hausti in stomacho in posterum diem, nec perfici queunt, in cibis non insalubres, tamen plurimum natant. A mulis expetuntur, capiunturq; mira huius oleris voluptate, nec non odorem eminus sentiunt: quare munienda sunt cucumeraria, ne irrumpen-

tes depopulentur, ac proterant. Tradunt Quintilii, si subrumo infanti, qui febricitet, per longitudinem cucumis accubuerit, ipsum confectum sanari, ad eum nanq; totum caloris feruorem allici. Quærit Aristoteles Problematum libro, Quam ob causam fructuum alii partem radici proximam habent amariorem, vt cucumeres, alii postremā superiorem vt glandes. An quod aliis pars ista radici proxima crudo vescitur alimento, quoniam escæ confluuium per radicē frequentat, aliis, quia sicci natura sunt, postrema pars succo dulci inconcocto quæ inde absumpto, quū plenius assiccatur, amarescit modo salis: redditur enim vnumquodque amarum, quum amplius exiccatur, vt oliuæ, iuglandes inuenteratæ, efficiuntur amaræ.

Græci σίκυς, & σίκυος; nomenq; ex aduerso posuerunt, *ἐπὶ τῷ σίγει καὶ κυεῖν*, quod scilicet appetentiam concumbēdi sedet. Hinc Græcis prouerbiū, Athenæo referēte, Texens palliū mulier, cucumerē deuoret: textrices enim maxima ex parte, si Aristoteli credim⁹, veneri sunt opportunæ, vt ergo iis impetus elāguescat, cucumeres edendos consulebant. Heraclides Tarentinus hedygæū nominat. Latinis cucumer, & cucumis dicitur, vt Varroni placet, à concuruatu dictus, quasi curuimer. Aëtius auguriā vocari dixit, quæ veteribus σικύα. Neapolitani *cedrolo*, videturq; dictū à citrii forma, & colore: flauescit nanq; quū inaruerit. Admonent me doctōrū virōrum autoritates, vt de pepone dicā aliqua. Hermolaus pepones à cucumeribus distinguit. Ruellius pepones melones putat. Idēq; Fuchsius. Lusitanus cucumerē vocat Neapolitanorū auguriā, & peponē satium cucumerem. Suorū peccatorum expiator Robertus Cōstantinus pepones melones vocat, atq; ex Palladio de peponum genere scribit, quum peponis Palladius nusquam meminērit. Matthiolus in tantorum confusione, quid proferat, fatetur se nescire. Sed cur in re tam clara tantorum virorū cæcitas? Nostram sententiam doctioribus trutinandam exponemus. Pepo tam apud Græcos, quā Latinos à cucumere nil differt, nisi ætate, magnitudine, & figura, recens enim tenellus natus, vel primū fructus rudimentū cucumis dicitur, quia curuus, caro, cortex, & semē, quod tunc aqueū est, estur; media ætate, reiecto cortice, qui tūc amarus, in acetariis subministratur, in senectā verò, vel eius maturitate, colore flauus, mollis, magnusq; efficitur, non estur, sed pro seminio horris relinquitur, apud tamen plerasq; nationes iā maturus, reiectis intestinis seminibus, quæ tunc lignosa sunt, editur, vt apud Græcos Galenus scribit: sed nostram opinionem autoritatibus comprobemus. Refert Athenæus pepones à Cratino vocari cucumeres seminarios. Pollux etiā *σπερματίας* vocat. Eius magnitudinem expressit Anaxilaus, qui dixit, Calcaneum magis tumet, quā cucumis pepon. Eius mollitiem Theopompus, Est mihi visa mollior, quā pepon. Homerus etiam à peponis mollitie Achæos peponas vocat.

ὁ πέπωνες, καὶ ἐλέγχε, ἀχαιῖδες, ἐκ τῶν ἀχαιοί.

Phanias item dicit edēdos esse cucumeres teneros, peponas verò sine semine. Speusippus etiam cucurbitam peponem vocauit. Sed quid demoror? Ga-

lenus libro de alimentorum facultatibus hæc habet. Hæc vox πέπον veluti πένον matorum significat, quod aliis quoque, qui maturescunt, conuenit, nam & racemus exactè matorus dici potest πέπον, sed crudus, & immatorus non potest dici πέπον. Melo pepon verò, qui in se ipso πέπωνος est, id est matorus. Malè igitur Medici quidam simplici nomine πέπωνα, non totum συκωπέπωνα, id est matorum cucumerem dixere. Et paulo inferius. Differt pepon à melopepone, quia in peponibus homines à carne intima, in qua semen habetur, abstinent, in melopeponibus autem non abstinent. Apud Latinos Plinius id manifestat. Cucumeres quum magnitudine excessere, pepones vocantur. Hæc de pepone obiter pertransisse quid obest?

Genera.

Ex his cucumerum genus Theophrastus asserit, quod ex pluribus constat, & primum diuiditur in syluestre, & urbanum. Porro urbani, siue satui tres differentia, Laconicum, Scythalicum, & Bœoticum. Plinius sunt in Italia virides, & quamminimi, in prouinciis quammaximi, & citrini, aut nigri. Cucumerum tria genera, Laconicum, Scythalicum, Bœotium.

Descriptio.

De satiuo hæc habet Theophrastus. Singulis fructibus singulos flores annexos gerit, quippe in postremo fructus flos insidet, & crescentibus fructibus flos huic infixus seruator. Flos triplex, qui in postremis sarmentis emergit, qui velut infertilis à reliquorum consortio, debet explodi. Breui innititur radice, particulatim florer, sibi ipsi superflorescens. Cucumis etsi præhumidus, frigidus. 21
que sit, attamen germinare ante feruentes dies, at perdurare atque perfici posse minimè valet: causa verò est debilitas: hæc enim tamen scandat viticulis prælongisq; serpat sarmentis, ut ramis, vitisque modo se diffundat, suæ tamen vitæ comes est frigiditas: itaque ante æstatem germinare non potest, sed ad autumnum vsque vitam prorogat. Amplexicaulis est, sed ob infirmitatem humi spargitur, ni propius adsit, cui caducus incumbat. Per extimam superficiem cucumeris amaritudinem sentimus, idque dum maturescere cœperit: nanque ab internis, tanquam intrinsecus editum excerni, tanquam alienum, expuiq; foras cōsentaneum est, ut falso in cinere. Parte ampliatur superna, luxuriatq; radice tamen hæret pusilla, contra quæ radice cōstant capitata, inferiora ampla, superiora tamen tenuia. Plinius, Cartilagine integitur, cortex huic vni maturitate transit in lignum. Particulatim florer, sibi ipsi superflorescens, & sicciore locos patitur, candida lanugine obductus, magisq; quum crescit. Addimus nos: Reprat multis vitibus, & clauiculis, proxima quæque implicans, foliis hispidis, scabris, brionia similibus, sed maioribus, floribus liliaceis, ex luteo pallentibus, noctu conuiuentibus marcescentibusque, non semper fecundis, fructu tereti oblongo, semipedali, aspero, per longum canaliculato, ex obscuro virore in flauum maturescere. Sed quarit Aristoteles, cur aliqua fructu vacent, quum florem habeant, ut cucumer, cucurbita, malus punica. an his fructus non deest, sed ipsa pro fructibus habentur, qui- 40
bus flos insidet: fructus enim id est, quod florem gerit, cucumeri autem florem

V.
florem inharen-
tibus ita describ-
rium, serotino
bano cōuenit. S.
scorides ita desc-
ge minorem pa-
fert, radice can-
tum amaro. Plin-
tini, ex eo fit me-
10 cuius causa nisi
Columellæ ita e-

Hir

Ven

No

Fet

Virgilius iter

Cres

20 Ex his descri-
referre satiuum
ta, serius matur-
nostratem citre-
esse.

Athenæus ex
aque hyemem
simi Mœsia.

Theophras-
sci, reliqua no-
30 nicum aqua ga-
pia est aqua,
Cælo aperto,
mus, & prouer-

40
Theophras-
tum, quinto,
rius exit. Col-
non expediat,
idus deinde M-
40 da, mox sterco-
minibus tandi-

florem inharere perspicuum est. Sylvestris cucumis à Theophrasto *σίνυς* *σίνυς* ita describitur. E sylvestris cucumeris semine medicamentum fit elaterium, serotino enim tum germine, tum flore. Nec succo, nec viribus cum urbano cōuenit. Sed penitus incomparabilis aspectus similitudinem gerit. Dioscorides ita describit: Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo, quem longe minorem parit, oblongis glandibus ad similem, folia atq; sarmēta satiuī refert, radice candida magna: nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Plinius, Cucumis sylvestris, siue asininus, infra magnitudinem satiuī, ex eo fit medicamentum vocatum elaterium, succo expresso, & semine, cuius causa nisi maturius incidatur, semen exilit, oculorum etiam periculo. Columella ita eum suo hortulo describit,

— *At cucumis grāvida qui nascitur aluo
Hirtus, & ut coluber nodo so gramine tectus,
Ventre cubat flexo, semper collectus in orbem,
Noxius ex acuit morbos aestatis iniqua.
Fœtidus hic succo, pingui quosq; semine factus.*

Virgilius item,

— *Tortusq; per herbam
Cresceret in ventrem cucumis.*

Ex his descriptionibus quis cæcus videre non poterit sylvestrem cucumim referre satiuum, nisi quod hirsutior planta, minor fructus, retro nascens plantæ, serius maturescens? Vnde apud Theophrastum, Dioscoridem, & Plinium nostratē *citræolum*, veterum, & Latinorum cucumim, & Græcorum *σίνυς* esse.

Athenæus ex Dioclis opinione in Antiochia optimos nasci scripsit. Plinius: Cœlum æquē hyemem odēre cum cucurbita. Placent copiosissimi Africæ, grandissimi Mæsiæ.

Theophrastus ex cucumerum generibus Laconicum rigatum melius enasci, reliqua non rigata præstantiora fieri. Plinius ex eo: Ex his tantum Laconicum aqua gaudere. Amant rigua & fimum. Columella, Cucumis cum copia est aquæ, minorem curam desiderat, nam humore plurimum iuuatur. Cœlo aperto, & humidis arenis magnitudine proficiunt, quales Apuliæ vidimus, & prouerbio fertur,

Angetur veluti cucumis regione madente.

Theophrastus ex tertia satione esse dixit, quæ æstiuæ sunt. Semen post sationem, quinto, sexto, aliqui dicunt septimo die emicat. Ex recenti semine celerius exit. Columella: Si sicco loco seri debuerint, quo rigationem ministrari non expediat, mense Februario sesquipedali altitudine sulci faciendi sunt, post idus deinde Martias, quasi tertia pars altitudinis sulci, stramentis inditis regenda, mox stercorata terra vsq; in dimidium sulcum aggeranda, positisque seminibus tandiu est aqua præbenda, donec enascantur, atq; ubi conualescere

coeperint, adiecta humo incrementa eorum prosequenda sunt, donec sulcus coarquetur. Sic exculsa semina sine irrigatione tota a stare satis valebunt, fructumque iucundioris saporis, quam rigua prebebunt. A quolibet autem locis primo quoque tempore, non tamen ante cal. Mart. semen ponendum est, ut deferri possit æquinoctio confecto. Sed custodiendum est, ut quam minime ad eum locum, in quo cucumis confitus est, mulier admittatur: nam ferè contractu eius languescunt incrementa virentium. Si verò in menstruis fuerit, visu quoque suo nouellos fetus necabit. Palladius feri iubet sulcis factis Martio mense, altitudine sesquipedali, latitudine pedum trium, inter sulcos septè pedum spacium erudum relinquant, ubi possit vagari: herbis iuuantur, ideo furculo, & rigatione non indigent. Secunda eius ratio quinquatribus ferè obseruatur. Plinius, Seruntur semine in terra, sesquipedali fossura, inter æquinoctium vernum, & solstitium. Parilibus tamè aptissimè. Aliqui malunt nonis, & per quinquatrus ferre. Sed quinquatrus, vel quinquatrua festa vocabant antiqui, quæ quinq; diebus Minerue fiebant, ita videri potest, quod quinq; diebus post idus Martii celebrabatur: nam dies post idus ater erat: inde quinquatria, quasi quinq; ab atro die. Sed quæ fierent his quinq; diebus, exat Ouidii carmen Fastorum tercio:

Vna dies media est, & sunt sacra Minerva,

Nomina quæ iunctis quinq; diebus habent.

Sanguine prima vacat, nec fas concurrere ferro:

Causa, quod est illo nata Minerva die.

Altera, tresque super strata celebrantur arena,

Ensis exertis bellica lata Dea est.

Parilia verò aut palilia festa erant deæ pastorum, quæ Pales dicebatur, quæ fiebant undecimo cal. Maii. Quarit Aristoteles in Problematis: Quam ob causam cucumeres cognomento pepones optimi palustribus planis, id est, humidis fieri soleant, ut apud Orchomenum, & in Ægypto. Aquarum enim vberem terram esse Ægyptum putamus, cur ergo cucumeres, qui humidi sunt, & ob id hortenses ac rigui minimè laudati, locis palustribus, quæ madida sunt, egregiè fiant? Vtrum quoddam ob terræ duritiam altius coguntur descendere: solum namque limosum, ac planum maximè indurascit, qui autem altius innituntur, meliores euadunt: an quod terram siccam esse oporteat? quoniam cucumeres natura humidi sunt, ita enim sequetur, ut per retractum in medium veniant, palustris verò si plana, altaque sit, alimentum nec exiguum præbet propter solis altitudinem, locumque ipsum, neque nimium, quoniam solum rescicari necesse est.

Cultus.

Scribit Theophrastus esse, qui cœlestes aquas cucumeribus prodesse negent, eosdemque puluatione lartari. Megarenses enim peponibus cucumeribus, quum venti anniuersarii perflant, puluerem sarculo excitant, atque ita dulciores, melioresque reddunt absque rigatione. Hoc igitur consilium indubie habetur. Libroque de causis reddens rationem ait, cucume-

res

res puluere occo
Megarenses ita
nis qui tam siccu
& quia citata hu
lo vaporoso rete
feruore, & qui
here possit, qui
coquendi nimir
igitur tegmine d
duntur. Plinius
eti quoque, ad e
si quid obest, v
si vas cum aqua
ante posterum
suppositis aquis
hi ita eos aquan
vas aqua plenu
reruallo descende
ita gaudent hun
si aquam in pate
festinando tale
mus placentur.
Præcoquen
tempore cucum
ponat, & igni ad
der, sic longè ho
nulli, ut celerius
ham rationem,
diu viuere poss
postquam fruc
bus eisdem sequ
dinarium proue
rius: in cophinc
liquiditatem fac
implantabis, &
dio expones, ci
assidue facies,
cellabunt frigo
cultum de porta
quam curam ac
producent. Ha

res puluere occultari, nutrir, tenerioresque reddi creduntur, quamobrem Megarenfes ita eos tractare confueuerunt. Sed mirum videtur, quod pulnis qui tam ficcus est, alere queat: ratio tamen esse in pluribus possit, nam & quia citata humo, vaporati cuiusdam aëris alimentum reddatur, vt de solo vaporoso retulimus, & quia fructus loricatus puluere, defendatur à solis feruore, & quia leuiter, molliterque ficcus, amplius à vite pabulum attrahere possit, quippe hæc omnia tum ad copiam alimenti, tum ad facultatem coquendi nimirum adiuant, quapropter foliis quoque integere solent, quum igitur tegmine & aqua quoad satis sit potiantur, lati, tenerique, vt debent, redduntur. Plinius: Natura oleum odere mirè, nec minus aquas diligunt, defecti quoque, ad eas modicè distantes adrepunt, contrà oleum refugiuunt: aut si quid obest, vel si pendeant, curuantur, idque vel vna nocte deprehenditur, si vas cum aqua subiiciatur, à quatuor digitorum interuallo descenditibus ante posterum diem, aut si oleum eodem modo sit, in hamos curuatis. Nos suppositis aquis longum, & magnum cucumerem comparauimus. Quintilii ita eos aquarum auidos esse scribunt, vt si quis longos fieri concupierit, vas aquæ plenum subiiciat, & ante posterum diem à quatuor digitorum interuallo descendit, at si deficient aquæ retrocedunt, vt in hamos plicentur: ita gaudent humiditate, horrent siccitatem. Palladius, Longi & teneri fiunt, si aquam in parenti vasculo sub eis ponas duobus palmis inferiorem, ad quam festinando tales efficiuntur. Oleum sic metuit, vt si iuxta posueris, velut hamos plicentur.

Præcoquem cucumerem habere docet Theophrastus, si quis hiberno tempore cucumeris semina serat in calathis, rigetque aqua tepida, & soli exponat, & igni admoueant, ac ubi sationis tempus aduenit, canistros terræ mander, sic longè horum fructus alios præuenient. Alibi, Cucumeris semen nonnulli, vt celerius exeat, lacte cum aqua præmaceratum ferunt. Docet & alibi aliam rationem, qua possint præcoces fieri. Cucumerum radices, adhibita cura diu viuere possunt, si quis sarmentum præciderit, secundum soli superficiem, postquam fructum tulerit, terra radicibus superiniecta, rursusque ab radicibus eisdem sequenti anno ferent fructus valde purpureos, anteuerentes ordinarium prouentum aliorum, qui verno satù parati erunt. Quintilii diligentius: In cophinos aut inutilia fictilia terram cribratâ mittes, stercore ammisto liquidiorē factam, & anticipato tempore, vere videlicet inchoante, semine implantabis, & quum sol fuerit, & calor, & moderata pluuia, cophinos sub dio expones, circaque solis occasus eos in domum contactam inferes, atque hoc assidue facies, aquam irrorabis, quando vsus postulauerit. Postquam verò cessabunt frigora, & glacies, cophinos, siue dolia in locum subactum, & ex cultum deportatos defodies, ita vt labra æqualia sint terræ, & deinde reliquam curam adhibebis. Si verò abstuleris eorum virgulta, citius fructus producent. Hæc Græci, Latini verò, vt Columella: Confecta bruma ster-

coratam terram inditam cophinis obferat, modicumq; præbeat humorem, dein quum enata fuerint semina, tepidis diebus, & insolaris iuxta ædificium sub dio ponat, ita ut ab omni efflatu protegantur. Cæterū frigoribus, ac tempestatibus sub tectum referat, idq; tandiu faciat, dum æquinoctium vernum conficiatur, postea totum cophinum dimittat in terram: sic enim præcoquem fructum habebit. Possunt etiam si sit operæ pretium, vasis maioribus rotulæ subiici, quo minori labore producantur, & rursus in tecta recipiantur. Sed nihilominus integri debebunt, ut etiam frigoribus serenis diebus tuto producantur ad solem. Hac ratione ferè toto anno Tiberio Casari cucumis præbatur. Plinius: Cucumis mira voluptate Tiberio Principi expetitus, nullo quippe non die contigit ei, pensiles eorum hortos promouentibus in solem rotis hortitoribus: rursusq; hybernis diebus intra specularium munimenta reuocantibus. Id etiam leuiori opere fieri apud Egyptiæ gentis Dulum Mendesium legit Columella, qui præcipit aprico, & stercoreoso loco alternis ordinibus ferulas, alternis rubos in hortis consitas habere, deinde eas confecto æquinoctio paululum infra terram secare, & ligneo stylo laxatis vel rubi, vel ferulæ medullis stercus immittere, atq; ita semina cucumeris inserere, quæ scilicet incremento suo coeant rubis, & ferulis: nam ita non sua, sed quasi matera radice aluntur, sicq; insitam stirpem frigoribus quoq; cucumeris præbere fructum. Palladius à Columella excipiens ait. Aprico loco & stercoreoso si rubos habemus, aut ferulas, post autumnii æquinoctium his iuxta terram recisis, & excavatis ligneo stylo inter medullas lætamen immittamus, & cucumeris semen addamus, hinc nasci fructus, qui possint & inter frigora non necari. Plinius etiam: Columella suum tradit commentum, ut toto anno contingant. Fruticem rubi quàm vastissimum in apricum locum transferre, & recidere duum digitorum relicta stirpe, circa vernum æquinoctium, ita in medulla rubi semine cucumeris insito, terra minuta, fimoq; circumaggeratas resistere frigori radices. Sed quum Columella id fieri circa æquinoctium doceat, quod ex alterutro fuerit, non explicat. Palladius recidendum rubum post autumnii æquinoctium dicit, Plinius circa vernum, inter Plinium & Palladium parum conuenit, sed Plinium errasse potius quàm Palladium ratio docet. Quippe Columellæ videtur circa æquinoctium autumnii id agendum, ut Palladius scripsit: nam ab autumno frigora sequuntur, confecto verò verno æquinoctio non amplius à frigoribus vindicari desiderant: nec enim tunc sati cucumeres hyeme præbebunt fœtus, sed potius æstate. Ut virides item seruentur in planta, sit, ut quum adoleuerint, in puteum, prope quem sati fuerint, demittantur, atq; puteus operiatur: sic enim sol affluens haud quicquam siccare potest, & aquæ subditæ vapor ascendens facit ut nullam sentiat siccitatem, sed quasi recenti habitu vireant, ex Theophrasto. Quærit Aristoteles in problematis, cur si quis cucurbitas aut cucumeres apud puteum sitos in ipsum demiserit puteum, beneq; operuerit, tempestiuos & virides per totum

rum annum seruantur, seruanturque re possunt, quæ præerea datur, quæ fructificauerit, ducularitque circudix valeat conferuere ulterius potuerunt: quæ habetur, quoditio, & consilipacelerius queat. quallis situm, apud ignem, præ id ipsam cum quæres, iubet Theophraste detrabitur, nunt sunt. Aristotelecurbitas protiniquia spiritus, & minorem, tumvento, soliqueenim magna, fuculta, quonamvasis includimusaut quæuis mala sunt, parua solifaciat largioretescat. Cucumput plantabis, scondis, & dplent loci, in qustus, illi quoquænim alimentisunt verò in fluit, & quæerate narraturcurbitam quæuo vasculo miodem in maiorepiat quod ran

rum annum seruat. An quod vapor aquæ refrigerans efficit, ne assiccen-
 tur, seruatque virides, & vegetiores, & obturatio illa, & spiritus satis ale-
 re possunt, quæ iam in plenum creuerunt, permanendi verò facultas pro-
 pterea datur, quod relictis radicibus suppetit alimentum: nam si quis quum
 fructificauerit, detractis sarmentis præcisaque planta, terram aggerarit, con-
 culcaritque circum radices, cucumeres faciet præcoques, utpote quum ra-
 dix valeat conseruari: haud enim cucumer annuam sentit naturam, sed vi-
 uere ulterius potest: ferent autem isti fructus maturius, quàm qui semine
 prodierunt: quoniam radix bona pars scilicet operis præcondita iam naturæ
 habetur, quod illis seminatis prius confici necesse est: terra autem aggera-
 tio, & constipatio teporem inducit, quo radix & seruari, & germen mittere
 celerius queat. Vnde etiam fit, ut si quis per hyemem cucumeris semen, in
 quallis situm, aqua irriget tepida, & modo soli exponat, modo collocet
 apud ignem, præcoques admodum cucumeres faciat, si tempore congruo
 id ipsum cum quallis in terram dimitter. Ut magni fiant, & molles cucume-
 res, iubet Theophrastus paruos abscondi, sic enim pars nulla alimenti à so-
 le detrahitur, nec flatibus resiccantur, quibus causis moles augeri non pos-
 sunt. Aristoteles problematum libro quaerit, Cur si quis cucumeres aut cu-
 curbitas protinus paruas condiderit in terram, maiores multo efficiet? An
 quia spiritus, & sol exiccando incrementum impediunt, molemque tum
 minorem, tum crispiorum reddunt, quemadmodum & arbores, quæ loca
 vento, solique exposita tenent, quæque in cauis manent, & riguis: alteræ
 enim magnæ, fungosæque fiunt, alteræ parvæ & spissæ. At verò in terra oc-
 culta, quoniam contra afficiuntur, contra euadant necesse est. Quin ea, quæ
 vasis includimus, ut cucumeres in ferulis cauis, aut regulis, & mala punica,
 aut quæuis mala in ollis, ampla redduntur, & fungosæ: contra quæ detecta
 sunt, parua solidaque augescunt nullo ambiente operculo, quod alimoniam
 faciat largiorem, id etiam obiectum facit, ne pabulum aut evanescat, aut a-
 rescat. Cucumeres magnos facies, Quintilii docent, si eorum semen in ca-
 put plantabis. Sed si sub ipsis vas aquæ plenum obruatur, & in eo radices ab-
 sconderis, & dulciores, & maiores fieri nouimus. Cucumeres formam acci-
 pient loci, in quo siti fuerint. cuius rationem libro de causis narrat Theophra-
 stus. illi quoque respondent, qui in ferula, vel tubo fictili includuntur, plus
 enim alimenti præbetur, quoniam nulla pars exhalatur, nec exiccatur, cre-
 scunt verò in longitudinem, & quia nutrimentum facilius recto tramite
 fluit, & quia nil est, quod auocet, aduerseturque. Quod etiam ab Hippo-
 crate narratur in libro de seminis genitalis natura. Ait si quis cucumim, cu-
 curbitamque iam deflorescentem, matrisque pediculo adhaerentem in par-
 uo vasculo mittat, cauo vasi illi par, similisve reciditur, si verò quis eun-
 dem in maiore vasculo mittat, quod probè cucumim, cucurbitamve ca-
 piat (quod tamen maius, quàm cucumis natura non sit) cucumis par, si-

milisq; cauo huius vasis erit, nam quum crescit cauo illius vasis hærere & innititur. Quintilii: Transfigurabuntur in quam velis figuram, si testacea feceris vasa, eaque paruis adhuc circumposueris, & obligaueris, formas enim & characteres implebunt, quare & arundine in longum secta, excavataque & composita, & coarctata, si in eam cucumerem, aut cucurbitam, dum adhuc parua est, immiseris, augescens per omnem longitudinem, arundinem explebit. Palladius: Si quis eius flores, sicut in sua vite est, in forma fictili clauserit, ac ligauerit, qualem vultum forma, vel hominis, vel animalis, talem cucumis figuram præstabit. Aliqui florem cucumeris cum viticulae suae capite canis inferunt, quibus prius omnes nodos perforauerint, ibi cucumis nascetur in minimam longitudinem tensus. Crescunt qua coguntur forma: iidem in fistula flore demisso, mira longitudine crescunt. Nos cucumeris florem cum viticulae suae capitulo arundini, cui nodos articularum omnes perforauimus, inseruimus, & ibi cucumis natus est, qui in magnam longitudinem protendebatur, namque quod latitudini per tererem cannæ angustiam demitur, secum paria faciens, longitudine representabit. Sic florem sicut in sua vite erat, in fictili forma, quæ hominis vultum exprimebat, clausimus, talem cucumis figuram prætulit, tam nouæ formæ audax est, ut vasis, cui indideris, æmula facie representet effigiem. Quin & saporum differentiam quandam semina capiunt, si prius macerata & preparata lacte, vel mellicrato ferantur, ut cucumis, ex Theophrasto: cuius rationem assignat, libro de causis, mutationem à radice provenire. Sunt enim radices arborum elementa, elementorum conditionem omnibus sectari necesse est. Addo etiam alimentum coctius à radicibus accipi, mutatisque, ipsis fieri, ut tota arbor mutetur: ab his enim omne alimentum transmittitur, dispensaturque, ita ut aquæ copia, & solum & cultura radices primum attingant, atque hinc in toto principio, cætera subinde mutantur. Columella: Cucumis tener, & iucundissimus fit, si antequam seras, semen eius lacte maceres. Nonnulli etiã, quo dulcior existat, aqua mulsa idem faciunt. Palladius: Semina si ouillo lacte, & mulso maceres, dulces nascuntur, & candidi. Plinius: Quin lacte & mulso semine eorum biduo macerato. Apud antiquos Græciæ auctores scriptum est seri oportere, ut dulciores fiant. Non habebunt semina cucumeres hoc modo, ut Quintilii docent: Sarmentum, aut virgultum primum mox ubi increuerit, in terrâ defodito, quemadmodum vitis sarmenta solent, ut summa pars tantum virguli emineat, & postquam auctum fuerit, rursus idem, iterum ac tertio defodito, & exortus iuxta medium, & super terram extantes secato, solumque postremum, tertium videlicet relinquo, & habebis cucumeres semine carentes. Similiter sine semine eadem facies, si triduo antequam semines semē ipsum oleo sesamino maceraueris. Sine semine nasci Palladius pollicetur, si prius eorum semina oleo sabino perungantur, & herba ea, quæ culix dicitur trita confricetur. Plinius: Sunt qui herba, quæ vocatur cucurbita nomine, trita, semen eorum maceratum seri iubeant, ut sine semine nascan tur.

scantur. Sed herbarum Hermolaus, & caninum conphraisto, primis apponit. Ruellius bēfoderis, in que aut farmentis expiam alui deiectione potabiliper triduo ita sariant. longesua germina fununt, deinde exagunt. Quintilii: Cucumerum vas obsequabis etiam in contingat, & vases bebis. Seruatur in locis opacis, scilicet & lamplico cōdita rena substrato. Quintilii: Nostentibus, hispisci non permittunt lafa permanebunt.

D

Nunc ad alios prioris fori. Videtur draco de oleribus inter nostros cucumeres politani vulgo. anguis formam. Serpit longius pallidiorque, mitis, fructu oblongioris, oborto cruris, oborto nigro, herbido. atra cucumini. 40 pe cucumi in nus effecisse. S.

scantur. Sed herbam hanc culicem, vtrum Theophrastus vocet canopa, veretur Hermolaus, quoniam & cynopa scriptum est. Theodorus canis oculum, & caninum conuertit, quasi cynopa non canopa probarit. Olus est Theophrasto, primis post æquinoctium imbribus germinās, & inter spicatas herbas apponit. Ruellius conyzam verit. In quosos cucumeres habebis, si vbi sero befoderis, in quem cucumeres plantaturus es, dimidium altitudinis eius paleis aut sarmentis expleueris, & aggesta terra plantaueris, & rigaueris. Qui etiam alui deiectionem cibo moliri volunt, radices agrestis cucumeris in aqua potabili per triduum macerant, & diebus quinque plantulas huius liquoris haustu satiant. longeq; magis ventrem purgatione sollicitabunt, qui dum radices suæ germina fundunt, ablagueatis tenuibus fibris ellebori portionem adiiciunt, deinde exaggerata terra crescere patiuntur, ex Quintiliis.

Quintilii: Cucumeres in vini albi feces dulces, & non peruersas immittes, expletum vas oblines, manebuntq; recentes. Asseruantur etiam & in muria. Seruabis etiam in vigore, si vas aceti parum habens suspenderis, ita vt acetum non contingat, & vas oblinearis, vt non respiret. Hoc modo etiam hyeme recentes habebis: Seruantur in muria, vsq; ad alios fere prouetus, & virides quoq; in sabulo locis opacis, sæno sicco operiēte. Plinius: Salgamurii aceto, sale, & fœniculo, & sampso cōdiunt. Alii trita sinapi cum aceto: sed & serobe, opaco in loco, arena substrato, sænoq; sicco opertos, ac deinde terra, virides seruari tradunt.

Quintilii: Non lædentur à pulicibus, si origani ramulos, paruis adhuc existentibus, his propè defixeris, nam & præsentēs pulices perdunt, & alios nasci non permittunt. Si semina cucumerum semperuiui succo herbæ rigabis, illa læsa permanebunt, ex Florentino.

De altera cucumis specie. CAP. LXVIII.

NUNC ad aliam cucumeris speciem deueniemus, quum admodum à prioris forma distet.

Videtur draconias Græcis dictus. Refert enim Athenæus Eudemum libro de oleribus inter cucumerum species illius meminisse, si de angineo siue syluestri cucumere non intelligit. Mihi Græcis, & Latinis indictus videtur. Neapolitani vulgò *anguria* vocant, deflexo ab angue nomine, quum intortus ad anguis formam crescat.

Serpit longis, & viticulosus sarmentis, folio cucumeris plantæ rotundiori, pallidiori, minus hirsuto, tempestius fructat. Iunii principio, floribus luteis, fructu oblongo, duorum cubitorum longitudine, crassitudine hominis cruris, oborto, obvoluti anguis figuram imitatur, foris striato, lanuginoso, & nigro, herbidoque nitore, cute tenui. Putat Matthiolus *anguriam* hanc nostrā cucumem esse satium, in hanc formam artis mangonio redactum, quippe cucumi in arundinem immisso totam explere, & inde semina sata genus effecisse. Sed id tam euidenter falsum, vt refelli non mereatur, tum quod

aliis in locis à nobis probatum est, quod neglecta in suam naturam com-
meat, rum quod folio, fructu, magnitudine, colore, ac pariendi tempore lon-
gè ab illo distat.

Cal. Sol. Cælum, & solum, vt cucumis, quærit. Nos in Apulia vidimus, tam vastæ
magnitudinis, vt duos vix a se lius ferret.

Satio. Seritur semine Martio in sulcis: qui inualidi nascuntur, extripantur: distet
alter ab altero oportet passus longitudine. Sed cucumis sesquipedalis, planta
enim huius latius euagatur, & maius accipit incrementum, vbi effloruit, cy-
mas incidunt iuxta flores: nam nouæ, & meliores regenerantur, maioraque
fructus accipiunt incrementa.

Demelone. CA P. LXXIX.

IN cucumeratio genere sunt etiam melones, siue melopepones, fructus
veteribus Græcis, & Latinis incognitus, à Galeni, & Plinii ætate, qui ferè
contemporanei, nobis id genus irrepsit. Lusitani Regis Laburniæ inter alia
meridianæ illius nauigationis miracula, melones in Æthiopia nobilissimos
haberi prædicant, quorum odore elephantis sagacissimi olfactus, animalia
de longinquo sentiant, aduolantesq; cucumeraria tota depopulatur & prote-
runt. Galenus eorum cibum minus improbat, quum cucumerum, vt minus
humidi nec tam parui succi.

Nomen. Galenus *μηλοπέπωνας* vocat. Florentinus Græcus eodem modo. Latini, vt
Palladius, melones vocarunt, quasi *μηλονας*, id est, pomeos, à malorum fi-
gura. Plinius melopeponas vocat, composito ex malo & pepone nomine,
quum formam & effigiem mali rotundi referat, & genere & substantia cu-
cumeres, vel maturos pepones. Neapoli *meloni d'acqua*, & *meloni rossi*, aut
meloni di pane.

Descriptio. Plinii tempore in nostra Campania repertum fuit, vt ex eius verbis, quæ
subiiciam, patebit. Inquit enim: Ecce quum maximè noua forma in Campa-
nia prouenit mali cotonei effigie: fortè primo natum, vt audio, vnum, mox
semine ex illo genus factum: melopeponas vocant, non pendent hi, sed hu-
mi rotundantur, mirum in his, præter figuram, coloremque, & odorem,
quod maturitatem adepti, quamquam non pendentes, statim à pediculo re-
cedunt. Nostrium verò *melone de pane* describemus. Vine serpit præ longa, fla-
gellis vltro, citroq; reptantibus, frondibus ferè vitigineis, sed minoribus inci-
suris, scabris hirsutisq; floribus luteis, particulatim floret, vt faba, fructu car-
tilagineo, humani capitis instar, ac longè maiori, orbiculatim striato, promi-
nulis puluinorum toris, strigilibus in vertice pomi, & umbilico coeuntibus,
ibidemq; stellatim decussatis, cute aspera, veluti tuberculis occupata, carne
sulua, sapore mellito, vel saccharato, seminibus in vtero liratis digestis, co-
picis, oblongis, flauis, putamine vel si maioris cotio obductis, intrus dulcis
nucleus. Melones verò aquei circinata pomi rotunditate, magnitudine, vt vix
40

brachiis

V
brachiis comple
quàm antedicti
ro, cortice color
In duo potissi
alterum quod m
ta & penè infinit
albus, cinereus, al
ingenio prouenit
seicens, vel herba
19 10 & aliud genus, q
figura ouali & ob
nus *saracenicum*
scaret sanguineo
rantam repræsen
etiam quod hyper
Cælum poscun
peratum. Locis fr
Seritur, ex Pall
nus pingue & ste
10 det enim liberr
& sapor, & citius
lum, & viribus re
feruntur, prope
tur, sed in lipidi
Palladius Marti
bus pedibus. Setu
qui potius integri
firmum. Semina
teiciantur vt in
10 tetollantur, que
do fructus conco
lipidi nascuntur.
Florentinus G
cum aridis rosis d
si eorū semina m
rè spirent, semina
aquamaceratis,
ficies, si ipsorum
cte per triduum
10 ficiuntur ex Palla
paululum terra in

Brachiis completi possis, non ramen torulis sulcata, sapore magis peponem quam antedicti melonis melleam dulcedinem referente, sed succo saccharato, cortice coloris herbacei, carne alba, friabili dulcissimaque.

In duo potissimum genera diuidemus. Vnum, quod *melon di pane* diximus, alterum quod *melon di aqua*, vel *saracenicum* dicimus. Primum genus in multa & penè infinita diuiditur, color nanq; aliis herbaceus, pallidus, rufus, flauus, albus, cinereus, aliis cutis læuis, aliis textura quadam reticulari, magno Naturæ ingenio prouenit. Pulpa etiam versicolor, aliis alba, aliis rufa, aliis ex albo rufescens, vel herbacea. Aliis dura, aliis friabilis, aliud moschi odorem spirat. Est & aliud genus, quod in sua terra non marescit, sed laquearibus suspensum, figura ouali & oblonga, hyeme magna cū voluptate comeditur. Alterum genus *saracenicum* dictum, multis etiam scater generibus: nam est & quod succo scater sanguineo, aliud semine albo, aliud nigro, est quod dulcedinem gustui tantam repræsentat, vt saccharinos vocitent, aliud moschi odorem halat, est etiam quod hyeme suspensum maturatur, & estur.

Cælum possunt, quale cucumeribus destinauimus, scilicet calidū, vel temperatum. Locis frigidis meridiei obserantur.

Seritur, ex Palladio, locis subactis, vel pastinatis, maximè arenis. Solum minus pingue & stercoreatum, quale cucumeribus dedimus, arboribus nudū, gaudet enim libertate, qua possit vltro citroque vagari. Fimo corrumpitur odor, & sapor, & citius marescunt: vt sapidiore nascentur, oportet esse nouale solum, & viribus refertum, quales nobis ex Siliceo ponte in Campania dicto deferuntur, prope Auerfam. In Apuliæ Barulo humidis arenis maximi nascuntur, sed insipidi.

Palladius Martio mēse melones ferendos docet. Distēt inter se semina duobus pedibus. Seruntur etiam Aprili. Serenda semina ex iis fructibus capiuntur, qui potius integri, quam qui maturitate aperiuntur, corticemq; habent durū, firmum. Semina sunt grauiā, & quæ aquis iniecta, sidant, quæ superfuitant, reiciantur vt inania. Sint recentiora quæ haberi possunt, ea quæ fructus parte tollantur, quæ heret pediculo. Rigare oportet, vbi pluuia deficiet, sed quando fructus concoqui cœperit, his pluuia aduersissima sunt: nam ignaui, & insipidi nascuntur. Mirum quod ex eadem planta perpauci optimi præstant.

Florentinus Græcus: Rosarum fragrantiam spirare facies, si ipsorum semen cum aridis rosas deposueris, & mista plantabis. Palladius: Odorati autem fiunt, si eorū semina multis diebus inter rosæ folia sicca sepeliantur. Vt moschi odorē spirent, seminibus ex ea parte, qua germinant, apertis, & rosacea stillatitia aqua maceratis, quæ moschi odorem exceperit, pangantur. Fructus dulces efficies, si ipsorum semen lacte, & melle maceraueris. Semina eius mulso & lacte per triduum maceranda sunt, & tunc iam siccata ponenda: hinc suaves efficiuntur ex Palladio. Vt præcoques melones habeas, super calidi fimi aggeres paululum terræ indas, quando è stabulis extrahuntur, in ea terræ parte plan-

tentur semina, quæ fimi caliditate cito nascentur, ea à rore noctu cadente detendas, vbi cadere desierit, transplantentur eodem fimo, & terra, vbi coaluerunt, & citius nascentur. Fiunt & arte melones, vt supra de cucumeribus diximus, quorum semina corio vacant, vt sine labore, & impedimento corticum mandi possint lapidissimè. Hoc genus Neapoli visitur, exoptaturque ad condituram saccharinam. Fiunt & melones, qui in vtero alterum gestent, eodem pediculo dependentem. Fiunt & melones, qui eodem modo cucumeres habent. Faciendi modum in arborum fructibus docuimus.

De cucurbita. CAP. LXIX.

CUCURBITA etiam cucumerum generi tribuitur. Iacent, crescuntque eadem & pendent, quamuis grauiores etiam iis, quæ in arboribus gignantur, ex Plinio. Cucurbitarum numerosior vsus, & primus caulis in cibo, cortex viriditener: deraditur nihilominus in cibo. Cibus salubres, ac leues pluribus modis existimant, qui perfici humano ventre non queant, sed non intumescant: cibus quo longiores, tenerioresque, eogratiore, & ob id salubriore, quæ pendendo credere, minimumque seminis tales habent, duritia eius in cibus gratiam terminante. Galenus. Cruda insuavis, stomachoque perniciofa, quapropter elixa, sarragine frixa, tostave vescitur, & saporis expers, ideo multos parandi modos asceit. Sinapis acrimonia, aut salamento aliquo conditur, quorum sibi facile conditionem recipit, & nullo sapore imbuta inter assandum magnam humoris aquosi vim remittit. Non diu persistit in aluo, quod lubricos & parum tenaces efficiat meatus, quibus delapsa facile euadit.

Nomen.

Theophrastus *καλοκύνθη*, & *καλοκύνθη*, vt etiam Dioscorides Atticè *καλοκύνθη*. Vocabulumque Græci ex aduerso posuere, quod scilicet et pumili, & breues sint partus, quum ipsa corporis mole omnes herbarum, arborumve fructus videatur superare. Megalopolitani *σικανόβη* dicunt, authore Athenæo, & Hellepontii rotundas *καλοκύνθας*, longas verò *σικώας*. Latini cucurbitam à concurrentia haud dubie dixerunt, quod facile, si quid obstiterit, quo minus extendatur, concutiescant. ex Varrone. Itali *Zucca*. Neapolitani *Cocuzza*.

Genera.

Theophrastus alios esse, qui dicant cucurbita genera non esse, alios qui dicant esse scribit, sed in vno eodemque genere, alias meliores, alias deteriores affirmat. Sed primum in satiuam, & tyluestrem partiemur. In satiuis duo alia prima genera, Plinio camerarium, & plebeium. Camerarium tenui pediculo, libratur pondus immobile astræ, plebeium vetò, quod humi repit. In his sunt vernacula, peregrinaque. Vernacula prima ventrosa est, & rotunda, quæ in ventrem crescit, mira amplitudine turgescens, altera ab obliquo fructu, longam dicimus, & libertate pensili concessa, visa Plinio nouem pedum longitudinis. Est & sessilis pyri forma turbinata, cuius venter in orbem collectus potest

test lagenaria dic-
nas vocat, ad vsu
venere vteorū
Sunt ex peregrin
ad sui variatione
guina vernatione
pulpaque in qua
Eudemus Athen
eius semen ex lno
per allatum gen
dulla pulpaque
formatur, vt funi
raculo, nec min
stis est duplex, v
terram repentia
hementer amaru
viam, & καλοκύνθη
fructus: non ni
Theophrastu
riereturque. In o
flagellis, scander
uida. Vires sine a
meras & pergula
mili, flagellis, &
serpit, & nisi sit
terram, quum v
viticulis, & clau
eo, & multipli
bacei, paulo pò
porrigitur, auc
gitur.
30 Equè ac cucu
primas nasci cucu
oppoſito latius a
Solum pingui
sine aquis fruct
Theophrastu
se Martio sit. Q
ex rectiori sem
lumella: Cucur
quoque tempor

test lagenaria dici, quod sapius lagenæ officio fungatur. Columella Alexandri-
nas vocat, ad vsum vasorum idoneas. Plinius: Nuper in balnearum vsum
venere vrceorum vice: iam pridem verò etiam cadorum ad vina condenda.
Sunt ex peregrinis maioribus nostris indictæ, tanta naturæ varietate, quasi
ad sui variationem ludentis, Turcicæ dictæ, subrotundæ, parvæ, & veluti an-
guina vervatione pluribus in locis per plagulas interlitæ, carne firmiore,
pulpaque in qua semina, vt phaseolorum, rubicundissima. Sunt Indicæ.
Eudemus Atheniensis libro de cibis, cucurbitam Indicam vocavit, quod
eius semen ex India primum allatum fuerit, ex Athenæo. Est & Neapoli nu-
per allatum genus vnum cucurbitarum, specie ouata flavum, quarum me-
dullæ pulpæque post corticem in vermiculos, vel funiculorum speciem ef-
formatur, vt funis capite arrepto ferè tota dissoluatur, non paruo naturæ mi-
raculo, nec minus gravioris gustus, quàm formæ gratia exoptantur. Sylue-
stris est duplex, *καλοκύνσις*, quæ folia sarmentæve sativi cucumeris emittit, per
terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglobatum, ve-
hementer amarum, ex Dioscoride. Hippocrates eam *σικυδώνην*, Galenus *σικυδω-
νίαν*, & *καλοκύνσιν ἀγγέλιαν*. Altera *συμπός* Græcis dicta ob inanitatem, digitalis cras-
situdinis: non nisi in saxosis nascens. ex Plinio.

Theophrastus breui radice inniti dixit, & si superna parte ampliatur, luxu-
rieturque. In olerum genere incommutabilis manet. Plinius reptantibus
flagellis, scandentes parietum aspera in tectum vsque, natura sublimitatis a-
uida. Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas pernix, leui vmbra ca-
meras & pergulas operiens. Addimus nos: Folio amplo personatæ haud dissi-
mili, flagellis, & viticulis cum cucumere conuenit, caduca sui sorte humi
serpit, & nisi sit frutice vicino, perinde quasi adminiculo fulta, fertur per
terram, quum verò datur facultas erigendi, in altum se extollit, peculiaribus
viticulis, & clauiculis quicquid adepta est, complectitur, & lapsu errati-
co, & multiplici intricans irretit, flore albo, fructu coloris primum her-
bacei, paulo post flauo, qui vel in pyri formam turbinatur, aut in longum
porrigitur, aut in orbem collectus intumescit, aut breui crassamento co-
gitur.

Æque ac cucumeres hyemem odit. Plinius. Apud Athenæum Diocles o-
primas nasci cucurbitas apud Magnesium dixit. Calido cælo & loco meridiei
oppósito satius assurgunt, vel saltem temperato.

Solum pingue cucurbitis Palladius tribuit, stercoreatum, & humidum. Sed
sine aquis fructum iucundioris saporis præbere dixit Columella.

Theophrastus ex tertia sementi esse dicit, quam æstiuam appellat: Et men-
se Martio fit. Quinto, sexto, vel vt alii volunt septimo à satione emicat die,
ex rectiori semine celerius: nam eius semen infirmum, vt cetera æstiuæ. Co-
lumella: Cucurbitæ copiam aquæ nactæ, minorem curam desiderant: primo
quoque tempore, non tamen ante kalendas Martias semen ponendum est, vt

deferri possit aequinoctio confectio. Sin autem si, colloco feri debebunt, quo rigationem ministrari non expedit, mense Februario sesquipedali altitudine fulti fodiendi sunt. Post idus Martias tertia pars sulci stramentis inditis tegenda, mox stercoreata terra usque ad dimidium sulcum aggeranda, positisque feminibus, tandiu est aqua prabenda, donec enascantur, atque ubi conualescere cœperint, adiecta humo, incrementa eorum prosequenda sunt, donec sulcus coarquetur. Sic excolta semina sine rigatione tota astate satis valebunt. Palladius: Vbi adollescere cœperint adminiculis adiuuentur. Plinius: Cucurbitæ feruntur semine, in terra sesquipedali fossura, inter æquinoctium vernum, & solstitium. parilibus tamen aptissime, aliqui malunt ex kalend. Martii, & per quinquatrum ferere. Custodiendum est, ut quamminimè ad eum locum, in quo cucurbitæ conditæ sunt, mulier admittatur: nam ferè contactu eius languescunt incrementa virentium. Si verò in menstruis fuerit, visu quoque suo nouellos fœtus necabit, ex Columella. Aquæ experimento scilicet quæ mergantur, vel quæ innatent ferenda semina seligantur. Distent semina quatuor pedum interuallo inter se, tribus digitis latitudine, in profundum cooperiantur. Si verò siticulosa fuerint loca, rigationem ministrare diligenter oportet, quare fistilia vasa, aquæ plena, iuxta ponenda sunt, fasciis inditis, quæ perpetim humorem instillent. Palladius: Quæ seruantur ad semina usque ad hyemem in sua vite dependeant, deinde sublata in sole ponantur, aut fumo: aliter semina putrefacta depereunt. Ut copiosiores afferat fructus, iuxta flores decidantur flagella, sic spissior fructus, & diutius durabit.

Ars.

Ut cucurbita vastioris incrementi fiat, de media cucurbitæ parte semen inuerso cacumine ponito: at si esculenta mercis preparaueris, recto cacumine de collo cucurbitæ sumptum semen ferendum erit, quo prolixior, & tenuior fructus eius enascatur, qui scilicet maius caeteris pretium inuenit. Idque carminibus satis eleganter in suo horrulo explicauit:

*Vna neq. est illis facies: nam si tibi cordi
Longior est, gracili capitis qua vertice pendet,
Etenim collo semen lege, siue globosi
Corporis, atq. vtero nimum qua vasta tumescit,
Ventre leges medio, sobolem dabit illa capacem
Narycia picis, aut Actæi mellis Hymeti,
Aut habilem lymphis hamulam, Baccæ vel lagenam.*

Palladius: Hoc in cucurbitis insigne est, quod longas pariunt, & exiles semina, quæ in earum ceruice nascuntur: quæ in ventre fuerant, cucurbitas faciunt crassiores: quæ in fundo, latas, si inuersis cacuminibus obruantur. Plinius: Semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt, item ab imis, sed non comparandas supradictis, quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas breuiioresque. Ut cucurbita magna, & tenera fiat, idem faciendum quod in cucumere diximus. Theophrastus: Idem cucurbitis eueniet, si paruas abscondas, ut nulla

pars

pars alimenti à sole detrahatur, nec flatribus reficetur, quibus de causis moles augeri non possunt, ut arboribus euenit, quæ locis, soli, ventoque expositis manent. Nec cucurbita (ut Quintiliorum fert opinio) semen aler, si primum more vitium sarmentum siccum humetur, ut solum eis caput extremum promineat, rursumque quum adoleuerit, iterum ac tertio defodiatur. Sed danda est opera, ut quæ adnascentur propagines, in medio & super terram secantur: sola postrema, id est, tertia relinquatur, ita curatæ fructus sine intestinis seminibus creabunt, solis cartilaginibus contentæ. Sine semine etiam nascentur, si per triiduum antea spargenda semina oleo sesamino macerentur, ita prolem seminibus orbam parient. Si florem, vel primum fructus rudimentum, sicut in sua vite est, cum viticularum suarum capitibus inferas arundini, cui primum omnes nodos perforaueris, ibi coalescet in nimiam longitudinem protensa. Plinius: Cucurbita quoque omni modo fastigiatur, vaginis maximè vitilibus, coniecta in eas postquam defloruit. Crescit qua cogitur forma, plerumque & draconis intorti figura. Quintilii, Si quis cucurbitas præmaturas habere voluerit, ineunte vere terram cribratam, & stercoreatam fistilibus, aut cophinis obserat, modicumque præbeat humorem: deinde calidis diebus, & insolaris, aut imbre modico pluentibus sub diuo ponat. Cæterum solis occasu, sub ædificii tectum referat, idque tandiu faciat, subinde rigans aqua, dum frigora, tempestates, & gelicidia discutiantur, postea quum primum opportunitas vacabit, totos cophinos, & fistilia labro tenui demittat in terram, reliquamque impendat diligentiam: sic enim præcoquem fructum habebit. Si luxuriantes earum viticulas putaueris, longè celerius suos edent fructus. Lagehariae sicut cucurbitæ, siue turbinata pyri forma, si arctè funiculum illigaueris in ea parte, quam desiderabis angustam. Deinde sicca, & carne exinanita peregrè profici-scentes viceorum vice uti possunt, quo per vias à sitis iniuria se vindicare possint: præterea condendis seminibus, & sali, rusticæ suppellectili. Scribunt Quintilii: Si aluum vis purgare, semina in scammonio diu noctuque madefacies. Ut cucumeres, ita & cucurbitæ diu asseruantur, sicut diximus, si apud puteum se-
 30 rantur, & intro immittantur.

Recentium dissectæ taleolæ in feruentem aquam fundantur, dein exemptæ, vbi sub dio tota noctem refrixerint, in acri muria conditæ mergantur, ita diutissime seruantur: ex Quintiliis. Athenæus refert demiratos cōuiuas suos, quod Ianuatio mense virides oblatae essent mensis, peculiaris succi non immemores, nec proprium saporem ementitæ, quod olitorum studio, qui artem hanc percallerent, referendum putabant, erant enim à salgamariis asseruatæ, quamuis à Nicandro in secundo Georgicorum suorum modus esset descriptus. Cucurbitas aere prius assiccatas, & funiculo transfixas fumo appēci iubet; ut refertæ iis oliæ hyeme habeantur.

Defungis. CAP. LXX.

BBB

INTER cartilaginea referemus & fungos, nec nisi supra terram torus est. Diocles Caristius inter rusticas dapes recenset, Athenæus. Nunc autem sua iucunditate tam moroso diuitem palato placent, vt eos in mortis discrimina sæpius adducant. Euripides, quum in Icarum insulam ad nauigasset, matremq; cum duobus filiis, & virgine fungorum esu mortuos vidisset, hoc epigramma fecisse dicitur apud Athenæum,

Sol qui perpetuo cœlorum tramite curris,

An visum facinus huic simile antè tibi est?

Pars eadem lucis geminos cum virgine fratres

Abstulit, & matrem: quatuor urna tegit.

Libuit Plinio coquendi dare aliquas communes in omni eorum genere obseruationes, quando ipsa suis manibus delicia præparant hunc cibum solum, & cogitatione ante pascuntur, succineis nouaculis, aut argenteo apparatu comitate. Noxii erunt fungi, qui in coquendo duriores fient, innocentiores, qui nitro addito coquentur, si vtique percoquantur. Tutiores fient cū carne cocti, aut cū pediculo pyri, profunt & pyra confestim sumpta. Debellat eos & aceti natura, contraria iis. Diphilus Medicus iis, qui hoc cibo stragulantur, remedio esse dicit aqua mullæ, nitri, & aceti potum, ita vt in vomitione reddatur: itaq; parari debet ex aceto, aqua mullæ, vel melle, & sale, ex Athenæo. Apicius de fungorum apparatu hæc habet: Eūgi farnei elixi, calidi exiccati in garo cum pipere excipiuntur, ita vt piper cū liquamine feratur. Aliter: In fungis farneis, piper, carenum, acetum, & oleum laudantur. Vel fungi farnei elixi ex sale, oleo, mero, & corianno cociso inferuntur. Fungos boletos, carenum, fasciculum corianni viridis vbi ferbuerint, exempto fasciculo inferes. Vel boletorum colierint, liquamine, vel sale asperfos inferunt: vel boletorum thyrsos concisos in patellâ, ouaq; perfundes addito pipere ligustico, modico melle, & liquamine, temperabis oleo modico. Platina coquendi rationes aliquas affert. Cum succola illa thyrsi parte, qua terra inheret, in aqua primum cum excuato pane, cumq; pyris, aut pyrorum surculis, ac pediculis coquendi sunt. Allium quidam induunt, quod ob stare venenis putatur. Elixia saliti in oleo aut liquamine friguntur, fricti moreto viridi, quod salsam vocant, aut alliato suffunduntur. Sunt etiam quicquos ablata pelle, aut superiori folliculo, indito sale, atque oleo sursum versum in carbonibus decoquant, pipereque aut cinnamomo asperfos deuorent.

Nomen.

Græci *μυκέντες* ab ensis capulo, vel summo vertice vaginam occludere, appellant. Significat *μυκέντες* ensis manubrium, sicuti ex Herodoto liquet, vnde & Mycenæ nuncupari credunt, quod ibi à Perseo sint condita Mercurii præcepto, vbi excidit gladii manubrium, Poetæ *μυκέντες* vocant, hoc est terræ natos: nam quorum pater ignotus est, filios terræ vocare solent. Quod Cicero ad Atticum in epistola confirmat. Porphyrius *θεογονίης* deorum filios, quod sine semine provenire videantur. Latini fungos vocant, nomenq; (aliquorum opinione) a funere deducitur, quod suo veneno ad funus vescentes ducant. Italici *fonghi*.

Nunc

Nunc genus, f
Theophrastus co
Sed Athenæus
ce, sed principiu
sum, atq; per ipsu
vestigia demonst
Fungorum pe
genus, vel natura
Naturalium dup
aliquando perniti
ferreus, in quo si
si iuxta arbores
colluies quæ dâ
marcore viriantur
cialia profus im
panni marcor ad
num cōcoquit, d
ipsi alia vitia, nu
adhalauerit, cap
ueniet, priusqu
cēsve ab emetici
postea nascentia
na diluto rubore
ambitum labro.
tas in vertice alb
arborum verò,
authores mem

Qu
L
L

Plinius, Ro
Robur è radici
bos, Platina no
zur. Dicemus
tripliciter par
tur. Dicemus

Praten
Gracis verò

Nunc genus, suis verò particulatim tractationibus species subscribemus. *Descriptio.*
 Theophrastus cortice, medulla, nervo, & vena carere dixit, ac radice petitis.
 Sed Athenæus, Theophrasti testimonio fretus, leui cortice esse dicit sine radi-
 ce, sed principium habere suæ pullulationis caulem in longitudinem proten-
 sum, atq; per ipsum vimen se extendere. Phantias verò: neq; florem, neq; seminū
 vestigia demonstrare. Quod falsum esse iā alibi diximus, quippe semen afferunt.

Fungorum perniciofa natura. Nos paucis genera perstringemus. Fungorum *Genera.*
 genus, vel naturæ, vel artis opus. Sunt enim agitur ex industria, vt dicemus.
 Naturalium duplex discrimen, Dioscori se authore. Aut enim Qui mandatur,

aliquādo perniciofa sunt. Letales multifariam virus cōtrahunt, vel vbi clauus
 ferreus, in quo sit rubigo, vel vbi putridi pāni, vel serpentū latibula, & cetera, vel
 si iuxta arbores erūpunt, qui noxios priuatim pariunt fungos. Omnibusq; iis
 colluuiis quæ dā in lide, & spuma, iidēq; à carptu celeriter cōputrescunt, atq;
 marcire vitiantur. Plinius à Dioscoride, & aliis excipiendo hæc habet: Perni-
 cialia prorsus improbanda: Stenim caligatis clauus ferrive aliqua rubigo, aut
 panni marcor adfuerit nascenti, omnē illicō facerū alienum, saporeq; in vene-
 num cōcoquit, deprehendisseq; nisi agrestes possunt, atq; qui colligunt. Dicūt
 ipsi alia vitia, nunc quidē si serpentis cauerna iuxta fuerit, si patescens primo
 adhalauerit, capaci venenorū cognatione ad virus accipiendū, itaq; caueri con-
 ueniet, priusquā se condant serpētes. Signa erunt tot herba, tot arbores, fruti-
 cesve ab emerfū carū ad latebrā vsq; vernantes, & vel fraxini tantum folia, nec
 postea nascentia, nec antē deficientia. Quorūdam ex his facile nō scūtur vene-
 na diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, timosa stria, pallido per
 ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdā. Sicciquē & nitri similes, veluti gut-
 tas in vertice albas ex tunica sua gerunt. Vnde à peritis regionum legendi sunt:
 arborum verò, quæ varios fungos parere solent, qui cibis abdicantur, sparsim
 authores meminere Nicander in Georgicis suis, Athenæo referente.

oleis inimica propago,

Quercu, & punicea malo tristissima pestis,

Illicibusq; venit fungus granis, humidus, atq;

Letifer.

Plinius, Robur, cupressus, & pinus noxios pariūt, itē fragus. Theophrastus,
 Robur è radicibus, & iuxta radices emittit fungos. Avicenna ex oliua impro-
 bos, Platina noxios emitti. Sed edules autumnali, vel verno tempore nascun-
 tur. Dicemus de autumnalibus, qui primis imbribus nascuntur. Horum genus
 tripliciter partiemur, vel enim in pratis, vel arboribus, vel lapidibus adnascun-
 tur. Dicemus primo de pratensibus, quum sint laudabiliores. Horatius:

pratensibus optima fungis

Natura est, aliis male creditur.

Pratensium optimi, quiquē principatum tenent, boleti sunt dicti à Latinis, à
 Grecis verò βοῆται, Galeno, & Paulo Aeginetæ suo affectæ. Sunt qui dictum

volunt *ἐπὶ τῇ βολῇ*, quod glebam, & priuatim rubricam illam, vulgò bolos dictam, significat, vnde colos boleti. Neapolitani *ouole*, & *boloccoli* vocant: ita enim ouorum vitellū dicunt, cuius formam præ se ferunt. Quantum olim existimari fuerint, indicat vel illud Martialis,

Argentum, atque aurum facile est, lanamq; togamq;

Mittere, boletos mittere difficile est.

Plinius, Inter ea, quæ temere manduntur, boletos merito posuerim: optimi quidē hos cibi, sed immenso exēplo in crimē adductos, veneno Tiberio Claudio Principi per hanc occasionē à coniuge Agrippina dato. Origo talis est. Voluā terra ob hoc prius gignit, ipsum postea in volua, ceu in ovo est luteū: nec tū nica minor gratia in cibo infantis boleti. Rūpitur hæc primò nascente, mox in pediculo corpus absumitur, raroq; vnquā geminis ex vno pede. Origo prima, causaq; è limo, & acescente succo madentis terræ, aut radices ferre glandifere, initioq; spuma lentior, dein corpus membranæ simile, mox partus. Ortus occasusq; eius omnis intra dies septē est. Robur boletos pducit circa radices. Glauca stomacho vtilis putat boletos. Galenus: omniū fungorū minimè sunt noxii. Sed nequis eis largius vratur, prauis enim sunt succi, atq; interire possunt, variè condiuntur, vt ea, quæ nulla insigni qualitate prædita sunt. Eadēq; Paulus asserit. Succedunt quos Greci *ἀμύγμης* vocāt, Latini suillos, quos ad hūc vsq; dic Neapolitani vocant *filli*, & *ammoniti*. Apicius fatieos fungos vocat, vt *spicor*, à farno, roboris genere. Dixit enim Plinius robora eos pducere. Proximi bonitate iā dictis, Galenus secūdi post hos sunt amanita: & Paulus, Colore sunt fuliginoso, pediculo omniū crasso, orbe, vt sepe humanū caput equiparēt, infra colore nigro, virescente. Quum elixantur fiūt mucosi, nascuntur in syluis, vbi solū incultū. Nicander eum non torrerī debere dixit, ex Athenæo. Plinius venenis accommodatissimū. Familias nuper interemere, & toracōinia, Annem Serenum prefectum Neronis vigilū, & tribunos, & centuriones. Quæ voluptas tanta ancipitis cibi? Siccantur pendentes suilli iunco transfixi, quales è Bithynia veniunt. Suilligula nouissima irritamenta. Circa roborum radices gignuntur. Tutissimi, qui rubent callo, minus diluto rubore, quàm boleti. Mox candidi, velut apices flaminis insignib; pediculis. Hos Neapolitani *conocchielle* vocant, longo enim prodeunt pediculo, callo corporis in turbinem mucronato, à nero foliorum glomere, *conocchia* vulgò dicto, ita vocāt, placentq; moroso diuitū palato. Sunt & in fungorum genere à Grecis dicti *pezica*, qui sine radice, aut pediculo nascuntur, ex Plinio. Nūc aliquos subiūgemus antiquis indictos. Est fungorū species, Neapolitanis *gallinaccia* vulgò dicta, mirabili profectò forma, vt nescias cui assimiles, ad magnā crescit altitudinē, vt brachiis diductis vix homo complecti possit: pondus sexaginta librarum, non orbiculari forma, vt ceteri, sed veluti manus in digitos plures diducta, vt quercus frondibus assimiletur, albi, callosi, vt vix integro vniuersa familia vesci possit. *Gallinella* verò parua est forma, spongiis vel nascentibus porris perli-

milis,

milis, quatuor
fis. Est & fungus,
ac si piper voraret
vulgò *peperella* di
no, diductis polli
tur agris innoxie
dicat. Qui vulgò
ab vno pediculo
men sumptisse su
10 summa est, quod

Nunc ad aliud
Nicander maxim

Quoniam

Simo

Innocentius

Quos

Plinius non so
rum, quo simili
bus, fico, ferula,
datissima. Quer
nescio cur quer
xios, quum eiusd
res, & innoxii cre
& piceis nascunt
bus adnascuntur,

Postremum ge
semperq; nonos
xios anno demer
monte lapides,
10 Parthenio mon
nam saxa, vbi sen
seuntur aliquand
Nunc & gener
non & catnola ad
scentes. Nascunt
A spongiarum se
ma præferunt, v
& vacua sunt. Si
lore nigro, cauli
40 pore inferiores.
tur, quod vernō

milis; quatuor digitorum longitudine. Nascuntur autumnno locis umbrosiss. Est & fungus, quem *piperitina* vocant: nam vefcendo linguam vellicat, ac si piper voraremus, ac fauces incendit: nascuntur autumnno, coloris albi, vulgò *peperella* dicunt. Est & candidus, odoratissimus, orbem vix vtraq; manu, diductis pollice & indice cinges, tam esu suavis, vt crudus edatur, præbatur ægris innoxie, incolæ *richione* vocant, quasi magnum fungorum regem dicas. Qui vulgò *gallucci* dicuntur, candoris sunt immaculati, binis, aut ternis, ab vno pediculo iunctis, forma non rotundi, sed veluti galli cristæ, vnde nomen sumpsisse suspicor, croci odore, coma velut villosa. Sed ne molestissimus, summa est, quod vnaquæq; regio suos populares habet.

Nunc ad aliud genus deueniendum, quod scilicet circa arbores adnascitur. Nicander maxime fungos, qui fici adnascuntur, laudat, inquit:

Quum fuerit ficus multo sub stercore tecta,

Si mox perpetuo fructu conspexeris illam,

Innocuis surgent radicibus undiq; fungi,

Quos tu ne veritas, radicem caduon nullam.

Plinius non solum ex ficus arbore, sed his aberit, inquit, veneni argumentum, quo similior fuerit arborum fici. Quidam discreuere arborum generibus, fico, ferula, & gummi ferentibus. Populus alpina fungis nascentibus laudatissima. Quercus probatissimos, inquit Plinius. Sed apud nos noxii sunt, nec scio cur quercus probatissimos ab eo producere dicatur, robur verò noxios, quum eiusdem generis sit, ne dicam idem. Diphilus medicus: Familiares, & innoxii creduntur, recentes, minutissimi, molles, friabiles, qui in vlmis & piceis nascuntur, ex Athenæo. Sed omnium optimi, qui in sambuci radicibus adnascuntur, & hyeme edimus.

Postremum genus è saxis nascitur. Præciditur ad esum, alius subnascitur, semperq; nouos producit, testibili fecunditate, septem diebus perficitur, sexies anno demetitur, terra dodrante operitur. Neapoli afferuntur ex Vesuuii monte lapides, Surrentum ex Fageto altissimo sui tractus monte, Abellini ex Parthenio monte, in Apulia ex Gargano & celsioribus montium partibus: nam saxa, vbi semel produxisse vident, suffodiant, & venales exportant. Nascuntur aliquando non pileati, sed turiones vt asparagi, & in ramos diuisi.

Nunc & genera indicabimus, quæ verno nascuntur tempore. Plinius. Nec non & carnosæ aliqua appellabimus, vt spongiarum in humore pratorum enascentes. Nascuntur Martio mense, eisq; vefcimur quadragesimalibus ieiuniis. A spongiarum similitudine *spongiosas* dicimus. Scrobilos magnitudine, & forma præferunt, vt trium librarum pondus sæpe expleant. foraminibus peruiæ, & vacuæ sunt. Simul & cum his nascuntur, quas vulgò *monacelle* vocamus, colore nigro, cauli sex foliis rotundis per centrum annexis hærentibus, sed sapore inferiores. Sunt & omnium fungorum optimi, qui vulgò *virni* dicuntur, quod verno tempore nascantur, Romanis *prignoli* dicuntur, primis Apri-

li imbribus erumpunt, odorati, gustui suaves, & innocui, nascuntur in sylvis, sub arborum umbris: ubi semel nascuntur, quotannis repullulant. Aliquando cæcis arboribus è loco euanescent. Solum, in quo nascuntur, cinerei coloris. Hermolaus innocentissimos dixit, qui è rubis vere nascuntur, rotunditate clusili, quos inde *prunello*, & *spinulos* vocat, & è carduis, quos inde *cardueles* vocat.

Art.

Postremo eos prosequemur, quos ars reperit. Dioscorides tradit esse qui dicant, utriusque populi, albe nigraque cortices in minutias concisos, & segetibus stercoreatis insparfos, fungos viles, innocentesque parere toto anno reitibiles. Ait Tarentinus: Fermento in ipsis populi nigra truncis, iuxta terram recisis aqua diluto, protinus coalescunt ægiritæ. Additque, si montanum aruum, multis calamis, stipulis, & fruticibus scatens, quum cælum imbres parturit, incendatur, permulti sponte naturæ prorumpent fungi: si tamen aruo iam ignem experto, non subsequitur imber, qui impendere videbatur, aqua linteo raro stillatim imbris imitatione conspergenda, iis incensis locis, nascunturque, fungi quidem, sed aliquando deteriores, siquidem meliores in hoc genere sunt, qui imbre aluntur.

De tuberibus. CAP. LXXI.

Post fungorum aggrediemur tuberum tractationem. Ferè eodem genere sunt, eodemque ferè malo placent. Iuxta illud Martialis,

Rumpimus altricem tenero de vertice terram,

Tubera: boletis poma secunda sumus.

Decens erat, priusquam genus cartilagineum, quod sub terra occultitur, aggredieremur, de tuberibus alloqueremur, quæ non nisi radices sunt. Galenus radicibus aut bulbis annumeranda dicit, innoxia & insipida esse, proinde, qui ipsis utuntur ad excipienda condimenta utuntur, alimentumque, quod ab ipsis in corpus distribuitur, nullam insignem qualitatem habere. Platina vino lora sub cineribus coquenda dixit, & sale ac pipere aspersa adhuc calida in convitiis post carniū esum comedenda. Apitius, Tubera elixabis, sale asperges, surculo infiges, sub assabis, & mittes in caccabum, oleum, liquamen, careum, vinum, piper, & mel, quum ferbuerint, amylo elixabis, tubera exornabis, & inferes. Vel tubera elixabis, & asperso sale in furculis affiges, & sub assabis, & immittes in caccabum liquamen, oleum, careum, vinum modicè, & piper contractum, & mellis modicum, feruere permittas, quum ferbuerit, amylo obligabis, & tubera compinges, ut combibant, illud exornabis, quum bene ferbuerint, inferes, si volueris eadem tubera omento porcino inuolues, assabis, & sic inferes, & alia. Credidit antiquitas cognationem illius aliquam cum cælo esse, nec nisi tonante Ioue nasci, ut in Satyra Aquinas Poëta:

Et faciunt laetas optata tonitrua cœnas.

Cuius causam symplosiorum quarto Plutarchus peruestigat, aitque, complures asseuerare tonitru perinde quasi insolatione, vel aeris impulsu terram haurire, sic rimis solo fathiscente solere conijci, qua parte tubera latitent. quapro-

pter

pter tonitru gign
existimet imbres
sepibus in lucem
culum quidem ce
multa tonitrus, &
& cognitu difficil
bulbus, inquit, qu
men vitat, sed oco
fulmine non icit
10 impetu, penitus in
bosas quasdam co
corporibus calor
tubera non sine
rataque corporum
imbuita terra glo
coalescit. Plinius:
bres autumales, ac
annu durare. Ath
te iam vegeta ad
20 gna, magna, vnde
an vitium id terr
gnitudine, qua fu
ratio communis
Hispania, Cartha
prehensus intus d
naturâ in se globo
Græcis dicitur, &
Poëte, & id
filios: rationem
30 Phanas, ex A
Dioscorides ita
vete fodiuntur
bio est, & si ra
eum data, nullis
tante loco, in q
cortice tamen in
lind quam terra
librali pondere,
la radice. Athe
40 tant: eorum vig
tuberante loco

pter tonitru gigni tubera, non ostendi vulgus opinatur, nō secus, quā si quis existimet imbres cochleas creare, potius quā ille ctas humore ex maceris, & sepibus in lucem euocare. Agemachus rem confirmabat experientia, ac miraculum quidem censebat, cui tamen fides non debeat derogari, si quidem per multa tonitrus, & fulminis prodigia conspiciuntur, quæ cæcas habent causas, & cognita difficiles, vel quorum nemo prorsus rationem potest inire: etenim bulbus, inquit, qui derideri solet, ac in proverbium abiit, non exilitate sua fulmen vitat, sed occurrente discordantium virium miraculo: veluti ficus arbor fulmine non icitur. Sic cœlestibus aquis, tonitru, fulgetro, calore, & ventorum impetu, penitus in terræ viscera compulsis humum in se colligi dicebat, & globosas quasdam collectiones, abscessusq; fungosos excitare, quemadmodū in corporibus calor & sanguis sæpe strumosa, glandulosaq; tubercula creāt, itaq; tubera non sine calore neq; sine aqua gignuntur, sed à terra pariente, permutatāq; corporum incrementa capessunt, huius itaq; fermento cœlestis imbris imbuta terra globatur, & caloris adminiculo humor terreus in hæc tubera coalescit. Plinius: De tuberibus hæc traduntur peculiariter, quum fuerint imbres autūnales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maximè de tonitribus, nec ultra annū durare. Athenæus autumno, quū imbres & tonitrua inceserint, gigni, vere iam vegeta ad vsum promi. Si maxima tonitrua fuerint, maxima erūt, si magna, magna, vnde illa præcipua generationis causa videtur. Plinius: Crescāt ne, an vitium id terræ (neq; enim aliud intelligi potest) ea protinus globetur magnitudine, qua futurū est, haud facile arbitror intelligi posse. Putrescēdi etiam ratio communis est iis cum ligno. Laertio Licinio prætorio viro iura reddēti in Hispania, Carthagine, paucis hinc annis scimus accidisse mordēti tuber, vt deprehensus intus denarius primos dentes inflecteret: quo manifestū erit terræ naturā in se globari, quod certum est ex iis, quæ nascuntur, & feri non possunt.

Græcis οἰδνον, & οἰδνον dictum videtur. οἰδνον ab οἰδαίνω, id est, tumeo. Græci *Nomen.* Ποτὲρ γινώσκεις, id est, terræ natos dixerunt. Porphyrius Θεοπόφως, id est, deorum filios: rationem diximus in fungis. Latini tubera vocant: Itali *tartusi*.

Phanias, ex Athenæo, neq; florum, neq; seminum vestigia ostendere dixit. Dioscorides ita describit: Tubera rotundæ radices sunt, sine foliis flauescētes, vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur. Theophrastus: Radix proculdubio est, & si radices nullam habeat formam. Plinius: vndique terra circumdata, nullis fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtrique extuberante loco, in quo gignuntur, aut rimas agente, neque ipsa terræ coherens, cortice tamen includuntur, vt planè nec terram esse possimus dicere, nec aliud quā terræ callum. Excedit sæpè magnitudinem māli cotonei, etiam librali pondere. Miraculum est maximum, aliquid nasci aut viuere sine vllā radice. Athenæus biennium non absolvere dicit, quamvis annum vltiant: eorum vigor verno tempore. Sed quæ Plinius habet, (Nec vtrique extuberante loco in quo gignuntur, aut rimas agente) falsa videntur: nam

Descriptio.

Maior mense, quum iam ad debitum incrementum venerint & maturitatem, terra in rimas fathiscens foras eiecit. Quod etiam Martialis testatur, dicens:

Rumpimus altricem tenero de vertice terram.

Genera.

Plinius duo eorum genera. Arenosa dentibus inimica, altera sincera. Distinguitur colore, rufo, nigroq; & intus candido. Diphilus apud Athenarum inter tuberum genera, quædam lethalia esse dicit, ut in fungis. Apud nos duo eorum genera, alba, quæ extrinsecus laeua, & insipida; & nigra vulgaria: aiunt enim eum locum, qui tubera producere amplius nequit, alba illa producere.

Solum.

Athenæus: In littoribus & arenosis locis nasci vult. Plinius, Sabulosis, siccis, fructuosisque locis. Asia nobilissima circa Lampfacum & Alopeconesum, Græcia verò circa Elim. Athenæus in Acarnida circa Lampfacum, & in Alopeconeso, & in Eleorum regione. Hegesander Delphus in Hellesponto. Neapoli, Morono, Cardinali, in Apulia, & Calabria nascuntur.

Satio.

Cæterum non desunt, qui seminaria dicant origine nasci. Plinius, Quibusdam locis acceptantur riguis, & feruntur, sicut Mitylenis nasci negant, nisi exundatione fluminum, inuecto semine ab Tiaris. Est autem is locus, in quo plurima nascuntur. Athenæus: Sunt tamen qui etiam seminis principium hæc habere arbitrentur, quando in Mitylenorum littore, non prius nasci comperitum est, quàm pluuia aqua semen ex Tiaris detulerit: is enim locus est, in quo plura nascuntur. Herbam, quæ super tubera crescit, qua reperta præsertim subesse cognoscuntur, Pamphilus hydriophyllum vocat. Sed id nostro tempore falsum videtur: nam sub omnibus herbis indifferenter nascuntur. Herba enim sub quibus nascuntur multa sunt, & sylvestres, quæ sub arborum umbris vivere possunt, ut gramin, trifolium cæteraq;. Sed tubera sues demonstrant: dum enim proni pabulum quarunt, odore forsan illecti, rictu excauant, ac inueniunt, eisq; avidissimè depascuntur. Subulci loca notant, ut altero anno ibidem effodiendo alia inueniant. Nascuntur autumnis, quia copiosius hyeme & vere reperiuntur. Maio mense terram aperiunt, ac foras emergunt, quæ ab auibus, vel suis deuantur, si ab hominibus non capiuntur.

Deradicula seu raphano. CAP. LXXII.

N VNC ad alias radicum species descendendum, quæ terra occuluntur, deum ad bulbos, quum radices etiam imitentur, ut rectus hortensium herbarum seruetur ordo. Plinius: Raphano vis mira colligendi spiritum, laxandi; ructum, ob id cibus illiberalis, utiq; si proxime olus mandatur. Si verò cum oliuis drupis, rarior ructus fiet, minusq; fætidus. Aegypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt, hoc maximè cupiunt ferere, si liceat, quoniam quum & quæstus plusquàm è frumento, & minus tributi est, nullumq; copiosius oleum. Atq; ut est Græca vanitas, fertur in templo Apollinis Delphis adeo cæteris cibus prælatus raphanus, ut ex au-

Nomers.

General:

CCC

Theophrastus de raphanis, ipse erranter napsi tribuit. Inquit enim: Græcinarum quinq; genera fecere, Corinthium, Cleoneū, Liothasium, Bæoticum, & quod per se viride dixerunt. Ex iis in amplitudinem adolescit Corinthium, nuda ferè radice. Solū enim hoc genus supernè tēdit, non vt cetera in terram. Liothasium quidam Thraciū appellant, frigori patientissimum: ab eo Bæoticum dulce est, rotunditate etiam breui notabile, nec vt Cleoneū prælongum: in totum quidem, quorum tenuiora folia, ipsi quoq; dulciores: quorū scabra, & angulosa, & horrida, amariore. Est præterea genus sylvestre, cuius folia sunt eruca similia. Nostri alia fecere genera. Algidentē à loco, longum atque translucidum, alterum rapi figura, quod vocant Syriacum, suauissimum fere, ac tenerissimum, hiemisq; patiens: præcipuum tamē est, quod ē Syria non pridem aduectum apparet, quoniam apud authores non reperitur. Id autem tota hyeme durat. Est & sylvestre, in omnibus autem probandis maximè spectantur caules: immitum enim rotundiores, crassioresq; ac longis caulibus: folia ipsa tristiora, & angulis horrida. Nicander duo raphanorum genera tradidit suis in Georgicis, Athenæo referente.

*Vt raphanos duplici cernes consurgere forma,
Deinde rapas, hæc longa simul, simul aspera gustu,
Surgit in areolis.*

Et alibi:

*Duplex raphani species, hæc longa, rotundius
Surgit in areolis alter.*

Genus est vnum raphani, quod ab Herodoto narratur. Smyrnea in Agypto cum capis & allio pyramidibus condendis præberi solitum. Iulius Pollux author, cōfirmat id Diodorus & Plinius, qui scribūt ad id opus, in raphanum, cepas, & allium talenta mille octingēta erogata. Plinius. Palladius. Fœmininū generis radices putantur, quæ minus acres sunt & habent folia latiora & leuiora, & cum rotunditate virentia, ex qua iubent folia colligi. Nos ita distinguemus genera à varietate, quā Neapoli habemus, nostrasq; species authorum speciebus accommodabimus: si coniectura, & verisimilibus rationibus aliquid assequi possimus. Est genus primum satiuū dulce, tenerum, translucidum, longum, ceteris tenuius, folio leuiori, latiori, & virēti, & hoc duplici colore, albo & rubeo. Album nostratē dicimus, rubrum Hispanicum, fortasse nobis illinc aduectum. Id genus Theophrasti Cleoneum, quod prælonga radice est, & dulci, nec tam patiens aduersus frigora, & huic nostro adaptari possunt omnes hæ notæ. Plinii enim Algidentē genus, longum, translucidum, & Palladii genus fœmininum, quod minus acre, & folium latius, leuiusq; sit, & cum iucunditate virenti. Secundum genus magis ferum & immite est, & si etiam seratur à nobis. Vulgò *rapeste* dicimus, maiori amplitudine, sapore acriori, cortice duriore, validius aduersus frigora, folio hirsutiori, nigriori, cuius plures sunt species. Prima est rotunda, rapa forma, sapore dulciori, quàm prælonga, & hyeme velluntur è terra.

terra, vulgò *ramoraccie* dicuntur, & vtrumq; genus & albo, & colore nigro vestitur. Quæ orbicularis est formæ, videtur à Theophrasto Bœotica dici, quæ dulcissima & rotunda figura. Nicandri autè rotunda species. Plinii Syriaca. Alteri rapi figura, quod vocant Syriacū, suauissimum, & tenerriam, hyemisq; patiens, hyeme enim Neapoli edimus, & tunc increfcunt. Longas, quas vulgò *rapeste* dicimus, Liothafias esse coniciamus Theophrasti, validissimas aduersus frigoræ. Longū Nicandri genus, & simul asperum gustu, Palladii masculinum genus. Vnum Apuliæ nascitur, paruum, rotundū, album, resiciens piper, cibus ex-
 10 peritum, raphanum vulgò vocant. Est & postremum genus, sylvestre, longa radice & tenui, omnibus acutius, cuius caules & cymas vere, & æstare edimus ex iis, quæ sponte nascuntur in aruis expetunturq; ob id magis quàm cetera genera, vulgò *rapeste seluaggie*. Aliud sequenti capite sylvestre genus describemus.

Theophr. Radice nititur longa, crassa, rectaq; cuius cortex crassus, & extricabilis. Carnosa nec siccata quidè dulcescit. Semen in siliqua, & latere potius apta est germine parere. Quum indurescit, transit in lignū. Dioscorides sphondilio similem dicit, & astragalo. Plinius. Cortice & cartilagine constat raphanus, multisq; eorū crassior cortex, etiam quàm quibusdam arborū amaritudo plurima illi est, & pro crassitudine corporis cetera quoq; aliquando lignosa. Nos ita describemus. Assurgit caudice vno tereti, flore purpureo obsoleto, ut rapa
 20 sylvestris floreret vere, flore rapitio sed angustiore, & scabro, & magis hirtio, siliquis tumetibus, pixidatim effigiatis, rapo quadruplo maioribus, in quibus semine rotundū, rufum, superius acutū, nec maius rapo, sed eadē planta sæpius inspicienda est: nam & folia rumici, & erucæ modo diuisa, & similia habet.

Theophrastus: Gaudet raphanus, dulcescitq; frigoribus, quibus incrementum in radices, non in folia vertit, austrinis atq; serenis temporibus, celerius in caulem attollitur semenq; promit. Cato: Nebuloso cælo gaudet feri. Palladius item. Plinius. Frigore adeo gaudet, ut in Germania puerorum magnitudinem æquent. Itemq; nebuloso feri debere.

Cato raphanū in loco stercoreato benè, aut loco crasso feri iubet. Columella
 30 la stercoreata terra, & subacta. Palladius. Amat terrā pingue, solutam, & diu subactā, qualem rapa: tophum, & glaream reformidat. Lætamen non est ingerendum, sed potius paleæ, quia inde fungosæ sunt, meliores proueniunt in arenis. Plinius. Seri vult terra soluta, humida. Fimū odit, palea contentus.

Theophrastus. Ex prima sementi est. Iulio mense feritur. Ex hybernis celerissime omnium erumpit, die nanq; (ut itaq; loquar) tertio erumpit. Sua radice feri non potest, quum facile exicceretur, imbecillisq; ad perdurandum penitus sit. Sed quæ radice feruntur, tunicas habeat plures oportet, simul & lentitiam quandam, ut bulbus, & scilla. Columella: Raphanum radix bis anno rectè feritur, Februario mense, quum vernum fructum expectamus, & Augusto mense circa Vulcanalia, quum maturius. Sed hæc ratio sine dubio melior est. Cura est eius, ut terra stercoreata, & subacta obruatur, post ubi ceperit
 40

aliquod incrementum subinde aggeretur, nam si super terram emerferit dura & fungosa fiet. Sed ne antiqua priscorum obseruatio lectores neotericos remoretur, explanabimus, quæ Vulcanalia sint tempora. Vulcanalia dicebantur Vulcani festa. Alii dicunt circa calendas Maii, quoniam Flamen Vulcanalis calendis Maii diuinam re Maiæ faciebat, vt Macrobius in Saturnalibus testatur: quam opinionem refellendam contendit, vtpote quod circa canis ortum, qui Vulcano fertur sacer, fiebant, aut circa calendas Augusti. Palladius, Augusto mense locis siccis radices feruntur, quæ hyeme suū vsum ministrant, ferendæ sunt spatiis grandibus, & alrè fossis. Seruntur post nouam pluuiā, nisi possint fortè rigari: quod satum est, statim debet operiri leui sarculo. Iugerum duo sextarii, vel vt quidam quatuor, quum feruntur implent. Plinius: Seritur post idus Februarias, vt vernus sit, iterumq; circa Vulcanalia, quæ satio melior. Multi & Martio, & Aprili ferunt, & Septembri. Incipiente incremento cōfert alterna folia circū obtrudere, ipsos verò accumulare: nam qui extra terrā emerferit, durus fit, atq; fungosus. Aristomachus detrahi folia per hyemem iubet, & ne lacunę stagnent, accumulare, ita in æstate grandescere. Raphanus sexto nascitur die. Sed conicio Pliniū errasse, quippe quum Theophrastus tertio die dixerit, & omnes cōsentiant, ipse autem sexto dixit. Sed fortè quæ Theophrastus de brassica dixit decimo die prouenire, ipse de raphano protulit. Plinius: Tertio idus Nouembris Vergilię occidunt, in his temporum interuallis opera rustica, raphanos ferere quibus diebus diximus. Apud nostros olitores radix feritur primum Februario seminibus manu depositis, in sulcis scilicet binis, radicibus altero, altero verò cucurbitis, aut cucumeribus: nam post vigesimum diem radix eruitur, & estur, remanent cucurbitæ, & spatio, vbi satæ erant, terra repletur, quod Martii calce fit. Secundo feritur Augusto, semine fusim sato. Post decimum diem herbis liberatur, & stercoreatur, post quindecim dies eruitur, ferunt simul pastinacas, & spanachia: & si densius nascantur, interpollantur aliqua, vt largius radices se extendant, nam densius satę graciles fiunt, transfertur quæ semini destinatur, idque autumno fieri debet, vt vere det semen. Quarunt solum benè subactum, vt possint radices profundius extendere, in solo pingui, & pastinato radices magnas, & parua folia edunt: in duro, & sicco, radices paruas, folia magna.

Ars.

Sed quomodo radices mira capiant incrementa, docet apparatus Theophrastus, ab olitoribus sui temporis factitatum. Ablatis enim per hyemem foliis, quū maximè vigent, de super succretam inspargunt humum, ne imbres possint admitti: non enim regerminat, nec folium remittunt, nisi congestiā humum submoueas. Cuius rei in libro de causis rationē explicat. Radix enim quū nullum ab imis vim obtineat germinandi, alimentum, quod sursum transmittabant, tunc subtus cohibetur, percrassaturq; tumq; omnis putredo, omnisque corruptio aspersu obiectæ terre propulsatur, & imbrum, aliarumq; noxarum rerum iniuria vindicatur. Aristoteles autē suis problematis inquit. Cur si quis radice-

radicularum folia
ram pedibus com
fir, radiculæ ipse
ne corrumpantur
prohibet, alimen
dix sibi ipsa totur
tere radices alias
ci noimus, si qu
quum vim istam
rum negarit, nec
liment. Palladiu
lius, & solo tenui
omnia regermin
rò ocimum, raph
Raphanus vtiq;
pis, nam & eade
Quæ omnia ex
Theophrastus b
porrorum, radice
10 meliora, grand
tite iniurias, vt r
radicibus locutu
Theophrasto de
transferuntur. P
tur, vt in Ægypto
falsugine amati
celcunt, & in va
in salis aquis, q
minia ē Theop
10 dius, suauiores
ladius quoq; er
tur sex digitorū
gnitudinem scr
die ac nocte me
quorum semen
Pulices app
bus ne nocean
huc remedium
tem errant in
10 nasci dicit, non

radicularum folia tempore hyberno, quum maximè rigent, absciderit, & terram pedibus complanarit, conculcaritque, vt imbrem vllum admittere possit, radiculæ ipsæ per æstatem amplitudine mira crescunt. An propterea quia ne corrumpantur causa conculcandi soliditas est, quæ tumorem patefacere prohibet, alimentum verò quod aliter ad germen sursum transmitteretur, radix sibi ipsa totum dispensat, itaque vel amplior fiat necesse est, vel suo de latere radices alias mittat, germinans modo cæparum, has enim multiplices effici notimus, si quis annuas non euellat, sed tempore hyberno relinquat, at quum vim istam procreandi vt laseri cæparum natura dedit, sic radicularum negarit, necesse profectò est ipsas illas crassescere, nimiam ob copiam alimentum. Palladius idem docet: Maiores fieri creduntur, si sublati omnibus foliis, & solo tenui, caule dimisso sæpè terris operiatur. Plinius. Caule reciso ferè omnia regerminant, exceptis quæ non scabrum caulem habent. Est in vsu verò ocimum, raphanus, lactuca: hanc etiam suauiores putat à regerminatione. Raphanus utiq; iucundior detractis foliis, antequam decaulescat, hoc & in rapis, nam & eadem direptis foliis cooperta terra crescunt, durantq; in æstate. Quæ omnia ex Theophrasto de brassica loquente transtulit, ne aliqua quæ Theophrastus brassicæ tribuisset, ipse raphano non ascriberet. Theophrastus: porrorum, radicumque magnitudo ex translatione. Plinius, Omnia translata meliora, grandiora que fiunt. In translatione & medicina est, desinuntq; sentire iniurias, vt raphani. Sed puto Theophrastum de vniuersalibus herbarum radicibus locutum, non de raphanis, & quæ Plinius scripserit de raphanis à Theophrasto de brassica loquente transtulisse: nam raphani hic Neapoli non transferuntur. Plinius: Præcipuè salis aluntur, itaq; etiã talibus aquis irrigantur, vt in Ægypto nitro sparguntur, vbi sunt suauitate præcipui: in totū quoq; sanguine amaritudo eorum eruitur, fiuntq; coctis similes: namq; & cocti dulcescunt, & in vaporum vicem transeunt. Itemq; peculiaris medicina raphano in falsis aquis, quæ & alioqui plurimū suauitati, & fertilitati conferunt: quæ omnia è Theophrasto trāstulit, vt vidimus capite brassicæ dicato. Ex quo Palladius quoq; erraret. Plinius: Prodidere, si palo adacto cauerna palea insternatur sex digitorū altitudine, deinde in semē, simumq; & terra cōgeratur, ad magnitudinem scrobis crescere. Palladius: si ex nimis acra dulcē fieri velis, semina die ac nocte melle macerabis, aut passo. Florentinus: Raphani dulces erunt, quorum semen vino mulso, aut vuarum passarum succo fuerit maceratum.

Pulices appellatū bestiolæ raphanis innascentes, dicit Theophrastus, qui bus ne noceant, eruum interserere remedium est. Sed ne nascantur, nullū adhuc remedium repertum putat. Plinius: Raphano innascuntur erucæ. Sed item erranter interpretatus est à Theophrasto, quippe qui brassicis erucas in-

40 nasci dixit, non raphanis.

ALIA raphani sylvestris species nunc describitur. Dioscorides huius tam folia, quàm radicem in olera recipi dixit. Columella ita condit. Armoraciorum cymas salire oportet, diemq; vnum, & noctem sinere, dum muriam remittant, deinde muriam eluere, & expressas in cratibus pandere, dum afficcescant, sic conditis superinfundi ius, quod sit aceri duarum partium atque vnius muria, deinde arido spissamento fœniculi sic comprimai, vt ius supernatet: inde oportet sæpius ius suffundere, nec pati sitire salgama, idq; verno tempore faciendum.

Nomen.

Græcis *ραφανὶς ἀγρία*, id est raphanus sylvestris. Theophrasto videtur *ραφανὶς*, vt videbitur inferius. Dioscorides Romanis ramoraciam dici fatetur. Sed admonendum agrioraphanon differre à raphano agria, nam aliud est sylvestris raphanus, & aliud raphanus sylvestris, quemadmodum leucacantha ab acanthaleuce, & alba spina à spina alba. De agrioraphano Dioscorides libro quarto egit, de raphano agria, siue de raphano sylvestri nunc agetur. Columella armoracium vocat. Plinius armoraciam, & Pōtici armon, & alii leucem. Palladius: ramoracea agrestis est raphanus. Romæ adhuc *armoracia* dicitur. Neapolitanis ab armoracia corrupto satis nomine *racecotena* dicitur.

Descriptio.

Theophrastus ita describit. Amplissime Corinthia radix adolescit, quæ vel stirpe constat defecta, hæc enim sursum versus producitur, non vt ceteræ in terram ampliari solita est. Dioscorides verò, Folia satini similia, sed magis lapsanam imitantia. Radix tenera, gracilis, subacris, similisq; radici, seu tragii. Plinius: Fronde copiosius quàm corpore. Folia longa, & acuta, sinapi instar acerrima, ad eò vt caput teneret, & lachrymas cieat.

Genus.

Plinius: Est satini usus in Italia, & armoraciam satiuam vocant.

Cœlum.

Plinius: Arcadicum prætulit omnibus, & si alibi nascatur.

Solum.

In hortis habetur, sic è syluis translatus ad culta edomita feritate mitescit, meliorque fiet. Crescit aliàs circa margines itinerum, & loca arenosa, in quæ pratis, nonnunquam sua sponte copiosa prouenit. Querit solum solum, pingue, & profundè pastinatum, vt omnia olera, vt radices longiores iniiciat.

Satio.

Palladius Martio feri posse, & transferri dixit. Locis siccioribus Octobri transferri ad culta, vt melior fiat. Seri etiam Nouembri. Seri semine apud nos non vidi, seritur tamen agnatis propaginibus, helenii, vel ari modo, integris, aut dissectis, aut radicibus in multas partes recisis, Nouembri, Decembri, Ianuario, Februario, & Martio, tam viuaci est natura, quod vbi semel seueris, vix eo possis liberare loca: nam & si radices integras extirpaueris, illius fibræ, vel potius capillamenta rediuuiam nanciscuntur naturam, eundemq; locum raphanis replebunt.

Derapis. CAP. LXXIIII.

AB his ratio habenda est raporum, naporumque: nam vtraque rusticos
 imp'ent, magis tamen vilia rapa sunt, quia & maiore incremento pro-
 ueniunt, & non homines solum, verum etiam boues pascunt. nam hyberna ci-
 baria pecudibus id olus præbet, ex Columella. Plinius: Latini in transcurso de
 rapis attigere, paulò diligentius Græci, & ipsi tamen inter hortensia: si iustus
 ordo fiat, à frumento protinus ei locus assignandus, quando aliis præstantior
 vsus ab his non est. Ante omnia nanque cunctis animantibus nascuntur, nec
 in nouissimis satiant ruris alitum quoque genera, magisque si decoquatur a-
 qua, quadrupedes & fronde earum gaudent, & homini nō minor rapaciorum
 10 suis horis gratia, quàm cymarum flaccidorum quoque, & in horreis enecatorū,
 vel maior quàm virentium. Ipsa verò durat, & in sua terra seruat, & postea
 passa, penè ad alium prouentum, famemque sentiri prohibent. A vino atque
 messe tertius hic Transpadanis fructus: in cibis quidem nostris pluribus modis
 commendantur, durantiq; ad alia, sinapis acrimonia domita, etiam coloribus
 picta præter suum sex aliis, purpureo quoque, neque aliud in cibis tingi debet. Atque
 ut est Græca vanitas, fertur in templo Apollinis Delphis adedò cibis prælatus, ut
 rapum dicaretur è plumbo. Scires non ibi genitum Manium Curium Impera-
 torem, què Samnitium legatis aurum repudiaturò afferentibus, rapū torren-
 tem in foco inuentum, annales nostri prodidere. Galenus. Olerum omnium ra-
 20 dicū aduersissimæ sunt rapæ. Nisi coquatur dura est, nec esculenta, cœcta om-
 niū minus nutrit. Vnde conditur muria, & aceto & in totū annū ipsa vtuntur,
 coctione diuturniorem postulat, eaq; laudatissima, quæ cocta bis fuerit. Cru-
 dior sumpta concoctu difficilis, flatulenta, stomachoq; noxia est. Plinius: De-
 mocris in totū abdicauit eā à cibis propter inflationes. Diocles magnis laudi-
 bus extulit, etiā Venerem stimulari ab ea professus. Itē Dionysius, magisque si e-
 ruca condiretur. Sed ad eius condituras accedamus. Varro seruati rapa cōfecta
 in sinapi dixit. Columella ita docet: Raporū quamrotundissima sumito, eaq; si
 sunt lutosa detergito, & summā cutē nouacula decerpito, demū sicut consue-
 uerunt salgamarii decussatim ferramento lunato incidito. Sed caueto ne vsq;
 30 ad imum præcidas rapū. Tum salem inter incisuras raporum non nimium mi-
 nutum aspergito, & rapa in alueo, aut seria cōponito, & sale plusculo aspersa
 triduo finito, dum exudent. Post tertiam diem mediam fibram rapi gustato, si
 receperit salem. Deinde quum videbitur satis recepisse, exemptis omnibus,
 singula suo sibi iure eluito. Vel si non multum liquoris fuerit, muriam duram
 aduicito, & ita eluito. Et postea in quadratam cistam vimineam, quæ neque spisse,
 solide tamē, & crassis viminibus cōtexa sit, rapa cōponito. Deinde sic aptatam
 tabulam superponito, ut vsq; ad fundū, si res exigat, intra cistam deprimi pos-
 sit. Quum autem tabulam sic aptaueris, grauia pondera superponito, & fi-
 40 nito nocte rota, & vno die siccat. Tum in dolio, picato fictili, vel in vitreo
 componito, & sic infundito sinapi, & aceto, & à iure contegantur. Sed cu-
 randum, ut antequam caulem, aut cymam faciant, dum sunt tenera cōponat.

tur. Apicius, Rapæ sic apparantur. Rapos elixatos exprimes, deinde teres cumini quamplurimū, turæ verò minus, laserpitium item Particum adde, vel acetum, liquamen, defrutum, & oleum, quæ modice fernere facies, & inferes. Alia ad delicias præparato. Rapas elixatas inferes, oleum subinstillabis, quibus si voles acetum addis. Platina: Non erit insalubre, si prima abiecta decoctione, secundo elixaueris, additis aromatibus, quæ eius inflationem tollant. Palladius aliam docet: Decembri rapa in partes minutas recisa, & leniter cocta, tota die diligentius exiccata, ne quid referuet humoris, & sinapi ex aceto (sicut mos est) temperato immersa condire curabimus, & repleta vasa claudemus, ac post aliquos dies gustibus explorata proferemus vluri, quam Ianuario quoque, & Nouembri mense poterimus efficere. Nicander etiam docet aceto condire, & sinapi, vt quando comederentur, aperirentur venæ.

*Vt raphanos duplici cernes consurgere forma,
Deinde rapas, hac longa simul, simul aspera gustu
Surgit in areolis, hanc tu concidito, ventis
Extenuans gratamq; hyemi, & custodibus aptam.
Otia longa domi qui carpunt, fluctibus ipsum
Si calidis spargas, vitam renouare videbis.
Radicem concide rapis, pellemq; virentem,
Purgato paulum sumptas, foliq; reponens
Siccato paulum, quum feruida protinus vnda
Fecerit has tumidas, tingens salsugine multa
Mergito, ponderibus æquis infundito acetum,
Albaq; musta, tegas intus stringens sale multo,
Mox æquare tibi studio sit fundito sape
His vnam passam, & mordentia grana sinapis,
Vraq; pars fece si profundatur aceti,
Iucunda salsamentum lacerare parabit
His quibus haud aderunt mensa conuiuia laeta.*

Nomen.

Græcis ραπῶν, & ραπῶν ab eius figura, quæ plerumque rotunda esse solet, vocabulum detorserunt: nam apud eos ραπῶν dicitur, quod in rotunditatem coactum sit. Apellas in ciuitatibus Peloponnesi scribit à Lacedæmoniis gasteras appellari. Nicæder apud Bæotas zeceltidas appellari ex Athenæo. Latinis rapum, & rapa est, quod extra terrâ ruat, quasi ruapa nomen, Varone teste. Alii quod passim rapiatur, rapi nomen deflexum esse censent. Columella eum gongilida vocat in hortulo:

Gongilis illestri mittit quam Nursia campo.

Italid dicitur rapa.

Genera.

Alios rapæ esse, alios non esse generis diuersitatem putant, sed vtrumque sexum ex hoc genere intelligunt, ex eodem genere prouenientem: effemina-

ri

VI
inque rarius
cili, Theophrastu
Dein
Græci duo pri
ferendi modo ex
radifficili. Sepius
puti capitatum, &
uestre. Plinius: Sp
10 tundiratem glob
nigeneris in his f
ta suauitate, & ac
esse ait. Apud no
Rapa constar
radice carnosâ, &
ditur siliqua, & f
strem describit:
lio anguloso scab
candido, duplon
20 10 foliis raphano si
aut brassicis. Flo
scorides. Syluest
surgens, ramulosi
iora, & fructum i
intus siliqua spec
parua conspicui
Dulcescit alg
crementum cap
tur. Columella
30 10 tari dixit. Plini
draginta libras
Tepore in foli
fexterti singuli
stres in Dalmat
Cato agrum
vnde fiant, & r
lumella: Solu
humidusque lo
solorapa bien
40 10 speciem. Solu
stercore satiatu
-pdt

namque rarius collocatas, masculoscere densius compositas, & in terra difficili, Theophrastus dixit. Nicander rotunda, & longa genus dixit, ut raphani:

Ut raphanos duplici cernes consurgere forma.

Deinde rapas, hac longa simul, simul asperagustu.

Græci duo prima fecere genera, ex Plinio, masculinū, fœmininumq;: & ea ferendi modo ex eodem semine. Deiore enim satum masculoscere item in terra difficili. Sepius satam transire in marem. Cassianus Græcus in Augusto: Rapum capitatum, & rapū præcox, & gongila asparagos nominant, & rapum sylvestre. Plinius: Species omnium tres, aut enim in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari: tertiam speciem appellauere sylvestrem. Medici masculini generis in his faciunt rotunda, latiora verò, & concaua fœminini, præstatio-
ra suauitate, & ad condiendum facilia. Possidonius rapas etiam sylvestres esse ait. Apud nos in duo genera diuiduntur, alba rotunda, capitata & longa.

Descriptio.

Rapa constat radice longa ex Theophrasto, velut raphanus, & breui caule, radice carnosâ, & cortice & carne, sed cortice carni adhærente. Semen includitur siliquâ, & fœcundum est. E latere apta est fructum parere. Plinius sylvestrem describit: Radice in longitudinem procurrere raphani similitudine, folio anguloso scabroq;: succo acris: in aruis maxime nascitur fruticosum, semine candido, duplo maiore, quàm papaueris. Nos verò, Satium rapum caule & foliis raphano simile est, floribus verò & siliquis, in quibus semē profert, rapis, aut brassicis. Florer æstate, ac siliquatur. Subinde sylvestrem ita depingit Dioscorides. Sylvestre rapum in aruis nascitur, frutex est in cubiti altitudinem asurgens, ramosus, læuis in cacumine, folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis calyculatis, cumq; eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina parua conspiciuntur. Foris nigra, intus alba.

Colum.

Dulcescit algoribus ex Theophrasto, per quos in radicem, non in folia incrementum capessit. Pollux ex Athenæo: E Mantinea maximè commendatur. Columella ex Nursina ciuitate Italiæ, ut diximus. Cato calo nebuloso latari dixit. Plinius: Nebulis & pruinis aluntur amplitudine mirabili. Vidi quadraginta libras excedentia. Frigore dulciora fieri existimantur, & grandiora. Tepore in folia exeunt. Palma in Nursino agro nascentibus: Taxatio in libras sextertii singuli, & in penuria vini, proxima in Algido natis. Possidonius sylvestres in Dalmatia frequenter nasci dicit, ex Athenæo.

Solum.

Cato agrum latum & crassum optare dixit. Alibi: Rapinam & coles rapitii unde fiant, & raphanum in loco stercoreato benè, aut in loco crasso serito. Columella: Solum putre & solum desiderat, nec densa nascitur humo. Campis humidisq; locis latatur. Lociproprietas semen commutat: namque in alio solo rapa biennio sata, conuertuntur in napum, in alio napus raporum accipit speciem. Solum subactum pluribus iterationibus aratri, vel rastri, largoq; stercore satiaturum postulant; nam id plurimum refert, non solum quod melius.

DDD

ea proveniunt, sed quia etiam post fructum eorum sic tractatum solum segetes optimas facit. Palladius. Solo puri, soluto, nec spisso, locis humidis latatur, & campis. Loci proprietas rapi, & napi semen mutat in alterum: nam rapa in alio solo per biennium sata, mutantur in naps, alio verò naps transire in rapum. Plinius: Terram non morosè eligit, penè ubi nil aliud feri possit. Alibi: Nisi in stercoreto non latatur.

Satio.

Ex prima sementi Theophrastus dixit, post æstivum solstitium mense Iulio. Refert enim & tempus, sata enim diebus calidis, celerius excaulescit, & ocyus siliquatur. Semen præstantius, quo subtilius, crassum vitio non caret. Semine satas transferunt, ne densius sату masculere possint. Varro: Tantum valet vetus semē, ut naturam commutet, nam ex veterum semine brassicæ nasci aiunt rapa, & contra ex raporum brassicam. Plinius ab eo: Ex semine brassicæ veteris rapa fiunt, atque inuicem. Florentinus: Rapa semen post annos tres brassicam producit, & vice versa. Palladius: Semen brassicæ vetustum mutatur in rapa. Columella: Riguis locis recte ab solstitio feritur, siccis vltima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugero agri non amplius quatuor textariis raporum seminis obserendum est. Duas habet sationes & eandem culturam, quam raphanus. Melior tamen satio mensis Augusti. Seruant adhuc antiquorum consuetudinem religiosiores agricolæ, qui quum ea serunt, precantur ut sibi, & vicinis nascatur. Locis frigidis, ubi timor est, ne autumnalis satio hyemis gelicidiis peruratur, harundinibus humiles canterii fiunt, iisque virgæ transversæ imponuntur, & virgis stramenta supra iaciuntur, & sic à pruinis semina defenduntur. Palladius, iugero raporum quatuor sextarii sufficiunt. Si spissa sunt, interuelles aliqua ut cætera roborentur. Plinius: Seruntur ante Calen. Martias. In iugero sextarii quatuor. Diligentiores quarto sulco feri iubent, stercoreto. Serere nudum volunt, precantem sibi & vicinis serere se. Satus iustus inter duorum nundinum dies festos, Neptuni, atque Vulcani. Feruntque subtili obseruatione, quoniam luna præcedente hyeme nix prima ceciderit, si totidem luminum die intra prædictum temporis spatium serantur, mirè provenire. Seruntur & vere in calidis, atque humidis. Vulgus agreste post ciconiæ discessum malè feri rapam putant, nos omnino post Vulcanalia & præcocia cum panico. Apud nos primis Augusti imbribus spargitur semen in aruissiam duris, ac aratro operitur, eisque, velscimus Nouembri, ac Decembri. Serunt iterum Maio pro bobus. Seritur dum adhuc in area sunt stipulæ: quæ semini destinantur, transponuntur, & sequenti æstate semen proferunt. Theophrastus feri radice non posse dicit, quum non nimium durer eruta, ut pote tenui & diluto cortice intacta. Id enim genus facile exiccatur, imbecilleque ad perdurandum est. Sed tunicas habeat plures oportet, simul & lentitiam, ut scilla. Cassianus: Augusto mense feritur capitatum rapum, præcox, Septembri rapum sylvestre. Transplantatur autem capitatum, & rapum transiens in gon-
gile a paragon. Octobri transplantatur capitatum, Octobri sylvestre.

Theo-

Theophrastus
ram annum reger
æstate. Theophr
capiant, ceu rap
quia plenius radi
nius putat post tri
niam fiunt vastio
descendere. Nos
mamus subacta re
ta rapa, foliis om
cides, tunc in sulc
cies terram, & ca
lea ferantur, dicit
Columella: Q
tenera folia prout
supra cameram in
colligi debet, dei
qua conspergi, ut
seruntur.

S V N T rapa
de banio eni
lenus inter rapar
gillis, id est rapa,
bro quatto men
rur. Plinius v
possideat facul
subinuens, qu
tem eis tribuit.
jo nim, & facilius
antiquitas con
diri scripsit, sed
tem eius modum
condit, & rapo
Maris nomi
rendit, præfer
Theophrastus
densius satus n
sur, sterili que se

Theophrastus tellure accumulata condi ab olitoribus tradit, vt in sequen-
tem annum regerminet. Plinius: Rapa demptis foliis non crescit, duratque in
estate. Theophrastus: Sunt quæ vi temporis quo feruntur, diuersam speciem
capiant, ceu rapa. Si quis protinus ab area ferit, ampla efficitur, quod ideo fit,
quia plenius radicatur, dilataturque amplius. Columella: Rapa semina Higi-
nius putat post trituram, iacentibus adhuc in area paleis inspergi debere, quo-
niam fiunt vastiora capita, quam subiiciens foli duritia non patitur in altum
descendere. Nos istud sæpe frustra tentauimus, itaque rapum melius existi-
mamus subacta terra obrui. Palladius: vt verò semina maiora redigantur, eru-
ta rapa, foliis omnibus purgabis, & ad dimidii digiti crassitudinem in caule suc-
cides, tunc in sulcis diligenter subactis, octonis digitis separata obrues, & ini-
cies terram, & calcabis, ita magnæ nascentur. Plinius, Lætiora fieri, si cum pa-
lea ferantur, dicit.

Columella: Qui astate ista feret, caueat, ne propter siccitatis culex adhuc
tenera folia prorepentia consumat. Id quoque vt viteretur, puluis etiam, qui
supra cameram inuenitur, vel etiam fuligo, quæ supra focos testis inhareret,
colligi debet, deinde pridie, quàm satio fiat, commisceri cum seminibus, & a-
qua conspergi, vt tota nocte succum trahant, ac sic macerata postero die recte
feruntur.

De buniade, siue napo. CAP. LXXV.

SVNT è raporum genere napi, siue buniades, sed bunias à bunio differt:
de bunio enim Dioscorides libro secundo inter oleracea loquitur, & Ga-
lenus inter raparum species bunium locat, nihilque referre dicit siue gon-
gilis, id est rapa, siue bunium, id est napus dicatur. At bunii Dioscorides li-
bro quarto meminit, apii folia ei tribuens, vbi etiam de pseudobunio loqui-
tur. Plinius verò erranter vtrumque confundit, quum vtrumque diuersas
possideat facultates, quod etiam Dioscorides indicauit, rapi speciem esse
subinueniens, quod post caput de rapis napos subiunxit, eandemque faculta-
tem eis tribuit. Diphilus Siphnius Medicus, Napus rapa melior est, dulcior e-
nim, & facilius digeritur, stomacho magis confert, magisque nutrit. Napos
antiquitas condiebat, nunc conditura prorsus exoleuit. Dioscorides sale con-
diri scripsit, sed cui cordi scire erit, adeat Columellam in rapis iam describen-
tem eius modum, & nos superiori capite descripsimus. Apitius etiam napos
condit, & rapos.

Maris nomine rapum buniada Theophrastum intellexisse Athenæus con-
tendit, præsertim quum alibi nunquam buniados meminerit. Sed nescio vbi
Theophrastus maris rapi meminerit, nisi in iis quæ superius recitauimus, quod
densius satus masculascit, quod nostris aruis sæpe visitur, quum densius feri-
tur, sterilique solo, raphani longi speciem accipere. Græcis *Βουνιάς* à tumente

figura, quam præ se fert. Vocantur enim cliui, & colles, verrucosaq; loca *Bovoi*, quæ napus adamat, ut videbimus in suo loco. Nicander buniadis mentionem facit, Athenæo referente,

Mox serere in areolis rapas, æquare cylindro

Cura sit, ut planis aquæ depressa vire scat.

Bunias ipsa magis.

Latinis napus. Itali *naone*, Neapoli vulgò *rape di catolagna*. Galenus nullam inter rapum, & napum differentiam facit. Huius planta, inquit, quam gongilida, aut buniada appelles licet.

Genera.

Andromachus senior duplicis napi meminit, *Andromachus* verò iunior sylvestris bunii in theriacæ descriptione, sed iunior Andromachus, & Galenus videntur potius de sylvestri rapo, quàm napo locuti. Plinius quinque genera fecit, Corinthium, Cleoneum, Liothasium, Bæoticum, & quod per se viride dixerūt; quæ genera, ut vidimus superiori capite ex Theophrasto, raphanis dicato capite, errant et transtulit. Alibi tamen duorum raporum mentionem facit, quos Græci in medicina servant. Angulosi foliorum caulibus, florens vnum, quod bunion vocant, alterum genus buniada appellant, & raphano, & rapo simile: quæ verba ut diximus ex Dioscoride falsò transtulit, quum de diuersis bunii generibus sit loquutus.

Descriptio.

Athenæus: nil rapis simile magis, nisi quæ bunias dicitur. Plinius cum fraxino florere dixit. Apud nos longa & tumentis figura, colore flauo, sapore rapis dulciore, ac ructus minus illiberales mouet.

Celum.

Athenæus Thebaicos Græcos laudare dixit. Latini præcipuum bonitatis gradum Amiterninis dant. Columella in hortulo:

Quaq; Amiterninis desertur bunias aruis.

Martialis huius iudicio subscribit:

Hos Amiternus ager felicibus educat hortis.

Nursinas poteris parcius esse pilas.

Plinius æque cum rapo frigidis gaudere scripsit, palmam Amiterninis dant. Est Amiternum Campaniæ nostræ vrbs, hodie Aquilam dicimus.

Solum.

Columella solum putre, & solum desiderare dixit, nec densa nascitur humo. Terram deuexam amat, & siccam tenui propiorem, itaque glareosis, sabulosisque aruis melior exit, locique proprietates vtriusque semen commutat, nam in alio loco rapa biennio fata conuertitur in napum, in alio napus raporum accipit speciem. Subactum solum pluribus iterationibus aratri, vel rastro, largoque stercore satiarum postulat: nam id plurimum refert, non solum quod melius ea proueniunt, sed etiam post fructum eorum. sic tractatum solum segetes optimas facit. Palladius, Napus in sicco, & propè tenui, atque deuexo, & sabuloso melior nascitur, loci proprietates vtriusque semen in alterum mutat: nam rapa in alio solo per biennium fata mutantur in napos, alio verò napus mutatur in rapum. Subactum solum, stercoreatum, ver-

lacum-

farumque conqui-
eodem feruntur.

Columelle rigui-
gusti, vel prima Se-
rum seminis obfer-
phanus. Melior sa-
tari sufficiunt: si
Seruntur & ante ce-
stercorato, satus in-

ni. Seruntur & ve-
Translata omnia
dixit Plinius serere
Vulcani, id est, se-
que ad Septembr-

Columella: Q
prærodat. Cuius
cit. Naporum me-
rucas. Quo si omi-
sus, & sedi, quam

ERAPINA, &
& quæ terra
tumino, putrisq;
xit, fortasse quoni-
aduari aliqui pro-
tæ, unde phyltru-
in aliis oleis. &
inferuntur. Vel
concilas cum cu-
rum facies. Plati-
da cum lactuca
pere condita esu-
coctione in oleo
do, quo & pastin-
coquitur. Subtr-
gendus cinis, tel-
sal, irrorandum
inspergenda aro-
Dioscorides
thenæus Theop-
Theophrastum

latumque conquirunt, & quod & ipsis, & segetibus proderit, quæ ibi anno eodem feruntur.

Columelle riguis locis rectè à solstitio feritur, siccis vltima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugerum agri non amplius quinq; sextariis naporum seminis obserendū est. Duas sationes habet, & eandem culturā, quam raphanus. Melior satio mensis Augusti. Palladius: Iugero naporum quinq; sextarii suffiunt: si spissa sunt, interuelles aliqua, vt cætera roborentur. Plinius: Seruntur & ante cal. Marrias, diligentiores quinto sulco napos feri iubent, & stercoreto, satus iustus inter duorum numinum festos Neptunni, atq; Vulcani. Seruntur & vere in calidis, & humidis. Tertio die à satione nasci dicuntur. Translata omnia meliora, grandioraq; fieri, maximè porri, napiq; Sed quod dixit Plinius ferendos napos inter duorum numinum festos, Neptunni atque Vulcani, id est, ferendos esse in mense Februario, qui Neptunno sacer est, vsque ad Septembrem, qui Vulcano, vel circa Augusti finem.

Columella: Qui æstate feret, caueat ne propter siccitates culex eius folia prærodāt. Cuius remedium in rapis diximus. Plinius rapo culices innasci dicit. Naporum medicina est, siliquas vnā seri, sicut olerum cicer, arceat enim erucas. Quo si omissio iam nata sint, remedium ab sint hii succus decocti inspersus, & sedi, quam aizoum vocant, genus hoc herbæ diximus.

Depastinaca. C A P. LXXVI.

ERAPINA, & napina egressis se offert pastinaca, è cartilagineo genere est, & quæ terra occultitur, annicula utilis esse incipit, bima utilior, gratior autumno, patinisq; maximè, ex Plinio. Orpheus amatorium inesse staphilino dixit, fortasse quoniam Venerem stimulari hoc cibo certum est, ideo conceptus adiuuari aliqui prodiderunt. Quod & testatur Athenæus ex Diphili autoritate, vnde philtrum eam vocant. Columella condire docet: vt sepius diximus in aliis oleribus. Apitius ita condit. Pastinacæ, seu carotæ, frictæ cum conogaro inferuntur. Vel carotas sale, oleo puro, & aceto inferes. Vel carotas elixatas & concisas cum cumino & oleo decoques, & inferes, indeq; cuminatum colicorum facies. Platina: Bis elixanda est pastinaca, prima decoctio abiicitur, secunda cum lactuca coquitur, inde in patinam translata cum sale, aceto cõditur. Pipere condita esui peraccommodè datur. Frigi etiam excauata post primā decoctionē in oleo, & liquamine farina inuoluta solet. Conditur cariota eo modo, quo & pastinaca, sed suauior habetur, quæ sub calido cinere, & carbonibus coquitur. Subtracta vbi paululum refrixerit, depilanda est, & omnino abstergendus cinis, tessellatim concidenda, in patinamq; transferenda, addendum sal, irrorandum oleum, atq; acetum, ex defruto, vel sapa non nihil addendum, inspergenda aromata dulcia.

Dioscorides *σαπων* vocat. Theophrastus videtur *σαπων* vocare, quippe Athenæus Theophrastum pastinacæ meminisse dicit. Nec de ea verbum apud Theophrastum extare vidimus, nisi libro nono, capite quinto decimo. Daucus.

Spartensi agro præstātor ceteris. Huic vis calefactoria est, & radix nigra, quod idē capite vigesimo secūdo retulit. Dauco agro Spartēsi Achaia laudatissimū referunt, natura calefacere, radice nigra. Cassianus daucū vocat. Diocles solus astaphilinum dixit, ex Athenæo. Staphilinū vocauit Columel. in suo hortulo:

— Mollemq; sinum staphilinus in umbret.

Idē Columella tā ferrē, quā edomitā pastinacā nomen esse staphilinum à Græcis impositū his verbis indicat: Tum agrestis pastinaca & eiusdē nominis edomita, quā Græci *σαυλινον* vocant. Latinis pastinaca, nomen ei à pascendo datū videtur. Natura ei calens, sapor vehemens, corpus alit, & cit venerē. Idēq; nomē Italis, vel *carote*, quod nomē etiā ab Apitio scriptore antiquo vsurpatur.

Genera.

Pastinacā duo genera Græci tradunt, satium vnum, erraticum alterum. meminit Dioscorides syluestris pastinacā, & satia. Plinius ex his: Pastinacā vnum genus agreste, sponte provenit, staphilinos Græcē dicitur: alterum feritur radice vel semine: tertium genus hibiscum, quartum dauco, cuius genera quatuor fecere. Apud nostrum est generum. Syluestre vnum, satia duo, album & rubrum, siue nigrum, & tertium croceum.

Descriptio.

Syluestre Dioscorides describit: Folia gingidū habet, latiora, subamara, caulem rectū, scabrū, vmbellā similē anethi, in qua flores insunt, cādidi, & in medio purpureū quoddam, fermē croceū habentes. Radix digiti crassitudine dodratali, odorata, quē cocta mādatur. Satiā ita depingit: Cibo aptior. Muscario tertii dauci. Addimus nos. Syluestri per omnia similis, sed flores in medio purpureū quiddā non habet, radice lōga, brachiali crassitudine, longitudineq; colore tū albo, tū purpureo, vel sanguineo. Iulio & Augusto floret. Semē dauco simile producit. Hoc genus rubrū videtur Theophr. descripsisse in suo dauco.

Colum.

Solum.

Satia.

Theophrastus in Spartensi Achaia agro præstantiores nasci scripsit. Columella altē pastinatū, & stercoratum solū optare dixit. Palladius solum pingue, & altius pastinatum. Plinius: Solum quā alūssimē tefossum.

Columella autumno & vere feri posse, vel circa calendas Septēbris, vel melius ante calendas Martias Februario feri. Sed locis siccis tepidisq; possunt circa idus Ianuarias terrē cōmitti: quā rarissimē ponēde sunt, vt maiora capiāt incrementa, nec est alius cultus, nisi vt sarritionibus herbę tollantur. Cōmodissimē autē deponentur prima parte Septēbris, vel vltima Augusti. Plinius: Pastinaca feritur vere, & autumno, magnis feritur intervallis, nullōve minus, quā ternorum pedum, quoniam spatiosē fruticat. Seritur radice, vel semine primo vere, vel autumno, vt Higinio placet, Februario, Augusto, Septēbri & Octobri. Palladius ex his: Februario ē semine ponetur, & plantis rarā statues, vt robur accipiat. Apud nos feritur, vbi primum Augusto terra imbribus mādēfit vsq; ad Decembrem, sed quas Augusto seueris, velluntur Decēbri, quas verō Decēbri seueris, Martio ieiuniis quadragesimalibus explendis. Spargitur fusim semen in porcis, & transfertur, optimē provenit, alius labor superfluous est, quum solo altē pastinato, & large lato proveniat optimē.

De

TERRA etiam

neruus, qui decocto

multo in cibis tep

duntaxat amicu

lem, & appetentia

rio, & Februario

Conditur & qu

oleo superfundes

Græci *σάτιον*,

Plinius duum

Dioscorides et

nostro quo ignot

tior, radices vere

oblongæ aphode

Tyberius Casar

castellum Rheno

dis locis conveni

26 Stercorato &

10 Columella au

ca calend. Septer

aut tepidis Circa

natur, vt maiora

bus herbę tollant

vel vltima Augu

Aprilii, Augusto,

mno, magnis se

quomā spatiosē

30 thissimus, & Ma

Plinius de ele

PRIVOR

videtur. Di

decocta in aceto

decocta estur,

decocta mandu

Plinius: Aron m

mas durior effe

49 in quibudam au

De sifere. CAP. LXXVII.

TERRA etiam conditur sifer, vt pastinaca, ex Plinio. Ipsum Tiberius Princeps nobilitauit, flagitans omnibus annis è Germania. Inest longitudine neruus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte relicta, quæ mulso in cibis temperata, etiã in gratiã vertitur. Neruus idẽ & pastinacę maiori, duntaxat anniculæ. Dioscorides radicẽ decoctã, ori gratani, & stomacho vtilem, & appetentiam inuitare scribit. Columella eius condituram docet. Ianuario, & Februario siferis radicem eadem ratione, qua olusatrum condiebamus. Conditur & quum exegerit vsus, eximes de fidelia, & oxymelli cum exiguo oleo superfundes. Varro apes ex siferis flore liquidum mel facere scripsit.

Græci σίσαρον, Latini sifer.

Plinius duum generum esse dicit, satium & erraticum.

Dioscorides eius formam, vt pote notam describere dedignatus est, ob id nostro æuo ignota. Est apud nos planta pastinacę similis domesticæ, sed gravior, radices verò dissimiles, nam multæ sunt pendulæ, bulbosæ, teretes, & oblongæ asphodeli modo, & vesicæ sunt.

Tyberius Cæsar è Germania flagitans omnibus annis. Gelduba appellant castellum Rheno impositum, vbi generositas præcipua, ex quo apparet frigidis locis conuenire, ex Plinio.

Stercorato & alte pastinato solo conualescit, ex Columella.

Columella duobus temporibus feri posse scripsit, autumno & vere, vel circa calend. Martias Februario, locis siccis, aut tepidis. Circa idus Ianuarias terræ committi potest, sed quam rarissimè ponatur, vt maiora capiat incrementa: nec est alius eius cultus, nisi vt sarritionibus herbæ tollantur. Commodissimè autem deponitur prima parte Septēbris, vel vltima Augusti parte. Plinius: Siferis satus mensibus Februario, Martio, & Aprili, Augusto, Septembri, Octobri. Seritur vtroque tempore, vere & autumno, magnis seminum interuallis, nullòve minus, quàm ternorum pedum, quoniã spatiosè fruticat, transferre melius. Sed in siferis satione Ruellius doctissimus, & Matthiolus lapsi sunt, putâtes feri posse oculis radice excisis, quod Plinius de elenio dixerat, excipiens à Dioscoride & Columella, vt diximus.

De aro. CAP. LXXVIII.

PRIVS QUAM radicibus finem imponamus, de aro nobis dicendum videtur. Dixit Theophrastus cibo quoq; idoneum esse, & folia eiusdem decocta in aceto mandi posse, suauia profecto. Dioscorides item ait: Radix decocta estur, quum nimis acris sit, folia ad esum conduntur, & acida per se decocta manduntur in totum: ob mitiorẽ eius acrimoniam in cibis expetitur. Plinius: Aron miris laudibus extulere, in cibis sceminã preferentes, quoniam mas durior esset & in coquẽdo lætior. Galenus, Aro radix, rapi modo manditur. In quibusdam autẽ regionibus acrior quodammodo nascitur, vt dracontio fe-

Nomen.

Genera.

Descriptio.

Cultura.

Solum.

Satio.

rè similis sit. Dum recte parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidam iniicere conuenit. Cyrenis contra quam in nostra regione arum se habet, illic nimirum medicamento sum, minimumq; acrimonia possidens, adeò vt vel rapis sit vtilius, ideo radicem quoq; in Italiam comportant, vt quæ non putrescat, aut regerminet, ac longo tempore perdurare possit. In aqua elixa estur cū sinapi, & aceto, & oleo garo, quin etiã cum obsoniis, & sale & iis, quæ caseo constant, sumitur. Aquæ nos in Asia aridiores sunt. Neapoli adeò acres sunt, vt linguam, palatum & fauces incendunt. Cæsar de bello ciuili tradens. Est etiam genus radicis inuentum ab iis, qui fuerant cum Valerio, quod appellatur chara, quod admistum lacte multum in opiam lenabat, & similitudinem panis efficiebat, eius erat magna copia, ex hoc effectos panes, quum in colloquiis Pompeiani famem nostris obiectarent, vulgò in eos iaciebant, vt spem eorum minuerent: & paulò post, Exercitus optima valitudine utebatur.

Nomen. Græcis ἀρών, Theophrasto ἀρπύρα, apud Syros iupha vocatur. Dioscoride aithore. Phanas scribit dracunculum iam arum dici, ex Athenæo. Galenus charum vocat. Latini arum. Itali iaro.

Descriptio. Theophrastus. Radix fungosa, mollis, & cortice nuda. Folio item cauo, & cucumeraceo, caulem multum reddens. Radix inferius crassa. Quamobrem dubitabit sane quispiam, an debeat inter radices connumerari: nam radix, quæ sub tellure cohaeret, quare postrema non tenuior est, & in acutius affidue rendit, sed è contrario crescit. Caules & supernæ partes breues, pusillæq; sunt, inferiores verò valde crassæ, & prægrandes. Dioscorides: Folia emittit dracunculi ferè longiora, & paucioribus sugillata lituris, caulem sub purpureum dodrantalem pistilli specie, è quo croceum semen exit, radice dracunculi alba. Plinius: Aron magnæ cum dracontiolitis, quidam enim eandem dixerunt. Radicem nigram, in latitudinem rotundam habet, multoq; maiorem, ex qua manus impletur. Addimus nos: Ante seminis partem sagacis naturæ artificio, dignum erumpit in uolucrum pedali longitudine, quod mucronata in turbinem vaginula puluillis complectitur, & suo fouet sinu, tam est diligens seruandis rerum seminibus Natura. Sed ubi fructu prægnans fathiscit in hiatum, solida pistilli facies dilutiori purpura, rutilans emergit, & anfractu penitus patente crocea semina spectantur, quæ in coronæ modum concinnè contexta imam eius partem ambiunt.

Genera. Theophrastus aron duplex demonstrat, vnum arum dictum, alterum dracunculum, à mensis abdicatum, solum Medicis natum. Phanas idem arum & dracunculum existimauit, ex Athenæo. Plinius Græcorum opinione in marem, & fœminam diuidit, in cibis fœminam præferens, quod mas durior esset, & in coquendo lentior.

Satio. Theophrastus radice feri dixit, vt omnia, quæ capitatorum generis eius modi sunt.

Theo.

Theophrastus
liis videlicet terræ
plæ funduntur, &
ipsa circum obru-
tumq; in suum re-
profectusq; acce-

POSTquam
damus, de racu-
cat, quæ ab omni-
Sunt qui ex illis
que recentioribus
tiri videatur, co-
sua voce habet
liis Italia locis ar-

Folio exit obli-
cacumine fronde-
bus, à quibus ra-
esse diceret, seu
lum radieum sa-
uersum striata e-
Calidum cel-
maritima pars A-
nuspiam in Itali-
si agro. In Sicili-
fillos, & apud n-
Solum arene-
Seruntur ra-
nua sunt, radice
cunditate proc-

SED cepina-
chus recodit
& Osiride, quæ
autem marcesce-
crementa dam-
omnia crescen-
cognoscitur, q-
& maceriores

Theophrastus, Arorum radices fiunt atiles inhibita germinatione, fo- *ars.*
 liis videlicet terra obrutis. Quum enim frondibus luxuriat, perquam am-
 plæ funduntur, sed vt radix maiore proficiat incremento, folia deflecentes
 ipsa circum obruere solent, quo minus planta in germē suscitetur, alimen-
 tumq; in suum resiliat caput. Vaporis etiam attractio, qua nutrimentum,
 profectusq; accedit, ratione minime caret.

De habaziz. CAP. LXXIX.

POSTQVAM in radicum mentionem incidimus, priusquā ab his disce-
 damus, de radice illa dicendum proposuimus, quam vulgus habaziz vo-
 cat, quæ ab omnibus estur, maxima iucunditate, & præsertim hyeme.

Sunt qui existiment ab Hippocrate *ῥακωνίπδα* dici, à Tralliano cæteris. *Nomen.*
 que recentioribus Græcis *βολβακίζανον*, quum bulbum, & castaneam men-
 tiri videatur, composita nomenclatione. Aegineta manicam, Mauritanii
 sua voce habaziz vocant, qua etiam voce in Sicilia & Neapoli dicitur. ab a-
 liis Italia locis audio *Trasi*, & *dulcichini* dici.

Folio exit oblongo, & mucronato, caule cubitali, & anguloso, in cuius *Descri-*
 cacumine frondes, & flores aperti videntur. Radicibus numerosis, & tenui-
 bus, à quibus radiculæ illæ, vt in cypero dependent, ac tandem cyperū idem *prio.*
 esse diceret, seu radices, seu totam plantam spectes, nec natalia differunt, so-
 lum radieum sapore differt, qui gratus vescendo, & radix reficcata per trās-
 uersum striata est, vt harundinum radices.

Calidum cœlum videtur exoptare, quale illud Mauritaniæ: nam Sicilia *Cœlum.*
 maritima pars Austrum versus vergens affatim producit, & si à Matthiolo
 nuspiam in Italia sponte oriri dicatur præterquam amenissimo Veronen-
 si agro. In Sicilia sponte nascitur, & Neapolim venū exportant plenos qua-
 fillos, & apud nos plantata etiam optimè producit.

Solum arenosum, quale Mauritaniæ, & Sicilia maritima pars, exoptat. *Solum.*

Seruntur radiculæ illæ mense Martio. Augusto excrecunt folia, cui an- *Satio.*
 nua sunt, radiculæ autumnō eruuntur è terra. Vbi semel seueris, restibili fœ-
 cunditate procreantur è radicularum reliquiis.

De capæ. CAP. LXXX.

SEd capinam ingrediamur. Id primo mirandum occurrit, quod Plutar-
 chus recōditioris literaturæ author refert commentariolo illo de Iside,
 & Osiride, quod capæ reuiuiscit, & congerminat decedente Luna, contra
 autem marcescit adolescente. Solumq; olerum omnium contra syderis in-
 crementa damnaq; vices minuendi, & augendi habet contrarias. Siquidem
 omnia crescente Luna gliscunt, & senescente tabescunt, vt in ostreis aperte
 cognoscitur, quas syderis iuuenta complet, & vberiores facit, seniū deplet,
 & maceriores reddit, eamq; ob causam sacerdotes Ægyptij Pelusitæ capæ

non edebant, & id olus auerfabantur, eoq; cibo simul, & feriatis, & castè degentibus interdcebant, his, quodd sitim inuitaret, illis quod lachrimas euocans feriarum celebritatem interpellaret, quibus Ægyptia superstitione imbutis ex ridiculè rationes satisfaciebant. Agellius ad cæcas rerum discordias reuocare videtur. Sed capæ natiuus calor iuuenescētis Lunæ intus feruore glutinosum humorem concoquit, & terrenum cum aqueo aërioque constantius permiscet, quod munus obiri nequit, quum magna fiat aquei iactura: nam glutinosus lentor non facilè discutitur, quo fit, vt partes cæparum, quæ prius humore distendebantur, eo nunc exutæ flaccescant, & velut passæ, & in rugas contractæ tabescant. Sed quum sydus orbe toto iam 10 refulsit, & ad intermenstruum spectat, prægnans humorem parit aqueum, quem velut alimentum ex aëre perinde, atque terra, quum hærent exutæ, auidius hauriunt, quo vernaculum lentorem iciunæ foueant prioremque iacturam illo liquoris raptu resarciant, quo velut satiata surgant, & ferè reuiuiscunt. Siquidem erutæ solo, diutius humi, vel in laquearibus pensiles in aëre viuunt, quasi ancipitis vitæ modo è terra, modo ex aëre nutrimentum capeffant: nam extra terram germinare, & humoris illectu gestire certum est. Sed actò colicolo statim euanesce, tunc, quum non satis suppetat crassioris alimonix, quo scapus excitetur, depactæ cartilago in ceruicem abit, quin & incrementum saluæ capis declaratur hoc illuni tē. 20
poris curriculo, quum edomita paululum acrimonia subdulcescat, quæ tunc aliquantum ascito humore diluitur. Sed peruestigandum, vt Aristoteles in problematibus inquit, cur capæ vnum tam acriter mordere oculos potest: vnde nomen quoque à Græcis crommyon impositum putant, perinde quasi pupillam comprimere cogeret. Origanum verò nihil eiusmodi facit, nec aliud quodpiam ex cæteris, quamquam acre. neq; enim nasturtium, quod mordacius est oblatum oculis officit æquè, vt lachrymæ profluant, vt capæ, & quum oculis admoventur, & quum comeditur lachrymas mouet. An quod acriū genus discrimine euariat numerofo, quod sua cuiq; vis consistit, rataq; habetur: nasturtium ergo quia calidius est, rescicare quod colligauerit amplius potest: nam extrudere lachrymā, quum editur, potest, 30 ad motum tamen ad oculos, nihil propterea mouet, quia nullū mittit vaporē, est enim id & siccius, & calidius: origanus, cæteraq; id genus calida sunt leniter & sicca: quod lachrymas autem moueat, mordax esse debet, & humidum & lentum, quamobrem oleū quoq; lachrymas excutit, quamuis leniter mordeat, subiens enim, irreptansq; suam ob lentitiam & tenuitatem dolorem mouet, ac perinde humorem tabificat. At capæ vim eiusmodi sanè habet, vt quod & humore & vapore sit calido, tenui, & lento, itaque oculis admotum, eo quod vapor eiusmodi est, humorque tenuis commoueat, lachrymas mouet, quumq; editur, itidem trāsmissa respiratione facere potest. Allium quidem calidum est, & acre, & humoris aliquid continens, sed 40
lentum

lentum non est.
cur allia, & capæ
more alimentum
ficere queat, id
rum qui idem fa
venerit, Aristot
gyptiæ gentes a
capasque inter
conuiuiis capan
se, Capa in pote
allia & id genus
ad creandum o
harum caularu
ad fuerit, ea ad
trahens cognat
tiusque relinq
locis omnia pr
Hanc prius sol
mo, vel cunil
20 & vnius muria
quum ius com
Græcis *αἰόλη*
mordaci vapor
do, vt superius
genere capæ, à
Differunt &
nomina accep
Ascaloniæ. En
niæ tum cultu
30 mus) Colore
candidis simi
dianisque sim
tatur. Sed As
Plinius. Capæ
Schista. Ascal
mo enim, &
de quibus du
dulci. Apud
thyon, nostri
tis ordine, Af
set genera Po

lentum non est: itaque lachrymam mouere non potest. Immo quærit etiam cur allia, & cæpe solæ ex plantis reconditæ germinari possint: an quod humore alimentoque sunt refertæ? copia igitur alimenti est, quæ germen efficiere queat, idque constat argumento tum squillarum, tum etiam bulborum qui idem facere possunt. crescere autem quodque solet, quum tempus venerit. Aristoteles etiam solstitio laquearibus appensas florere dixit. Ægyptiæ gentes antiquitus per cæpe & allia iurabant. Ad id Plinius: Allium, cæpasque inter deos iure iurando habet Ægyptus. Athenus dixit, antiquos conuiuiis cæpam apposuisse, ut plus biberent, atque prouerbum prorepsisse.

- 10 se, Cæpa in potu obsonium. Porro iuxta coronarias herbas, acria, ut cæpas, allia & id genus ferenda præcipit Theophrastus. Id enim multum conferre ad creandum odoris suauitatem affirmat, quod si verum fuerit, ad alteram harum causarum referre conuenit, aut quod quantum inibi mali odoris adfuerit, ea ad se alliciunt, alitur enim vnumquodque re sibi consimili, attrahens cognatum, vicinumque, quo summo residuum purius, odoratiushque relinquitur, aut quod locum suo edaci calore resiccant, siccis enim locis omnia proueniunt odoratiore. Columella eius docet condituram. Hanc prius sole siccata, deinde sub umbra refrigerata, substrato thymo, vel cunila composito in fidelia, iure, quod sit acetri trium partium, 20 & vnius muricæ, fasciculum cunilæ superponito, ita ut cæpa deprimatur, quæ quum ius combiberit, simili mistura vas suppleatur,

Græcis *ῥόβιννον*, quod oculorum tunicam, pupillamque comprimere cogat, *Nomen.* mordaci vapore lancinando coniungere, contrahique cogat, lachrymas eliciendo, ut superius ex Aristotele diximus in problematis. Latinis cæpa, & neutro genere cæpe, à capitis magnitudine dicta. Itali *cepolla*.

- Differunt & cæpæ genere ex Theophrasto: pleræque sunt, ut quæ à locis *Genera.* nomina acceperint, Gardiæ, Cnidiæ, Samothraciæ. Item Setaniæ, fissiles, & Ascaloniæ. Ex his Setaniæ minimæ, sed largæ, dulces. Fissiles verò & Ascaloniæ tum cultu, tum natura inter se differunt. (ideo nos de illis separatè dicemus) 30 Colore etiam differunt nonnullæ, etenim apud Isum cætera quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, Sardinianisque similes ferè affirmant. Cretensum peculiaris maximè natura notatur. Sed Ascaloniis quodammodo proxima. ni fortè vel eadè dici debet. Plinius. Cæpe genera apud Græcos, Sardia, Samothracia, Alsidena, Setania, Schista. Ascalonia ab oppido Iudææ nominata. Est & colorum differentia. Sammo enim, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Sunt in honore Creticæ, de quibus dubitant an eadem sint, quæ Ascaloniæ. Distant sapore tantum dulci: Apud nos duo prima genera, vnum condimentarium, quod illi gethyon, nostri pallacanā vocant, alterum capitatum. Genera eius austeritatis ordine, Africana, Gallica, Tusculana, Amiternina. Columella tria recenset genera: Pompeianam, Ascaloniam, & Marficam simplicem, quam rustici

vocant vnionem, ea est autem, quæ non fruticat, nec habet soboles adhaerentes. Plinius capas, non esse syluestres dixit. Apud nos duo sunt genera: Augustiniana, quæ Decembri feritur, transplantatur Martio, & Augusto eruitur, editurque. Si verò relinquitur, iterum Septembri eruitur, diuiditurque; in plura capita, ac plantatur, Martio eruitur, editurque. Si verò relinquitur, iterum Septembri eruitur, diuiditurque; in plura capita, ac plantatur, Martio eruitur, nam porri instar longa est ceruice, ac editur. Hæc Columella dici potest Marfica capa. Si relinquitur Augusto semen affert, ac illico obarescit. Est & alia communis, quæ Octobri feritur.

Descriptio.

Capitatorum corpus ferè carne, & cortice tutum est, tenui folliculo totum vestiente, quapropter non immerito in dubium venit, si hæc in radicem numerum ascisci debeant, etenim quod subter terræ cohæret, radix esse creditur, quod è diuerso promitur, nullam radicis conditionem putamus. Si quidem radicis is est habitus, vt parte posteriore semper extenuata in gracilitatem, quasi in mucronem minuatur, radix cape contra crescit, vt in latus tendens inolescatur, nam cæteræ radículas de suo latere mittunt. Capæ corpus tunicatum est, quum semper aliquid eximi potest, quod duplex genus radicis quodammodo exhibere videtur, habet enim carnosam illam, & corticosam, & eas, quæ ex illa proueniunt. Folio illico à radice exeunt, pediculo carentia, & concaua. Ex caulibus laterales furculos non edunt, quia secaulis est. Fœcundissima seminis. Quum feritur, & nucleus intumescit, tota inorquetur, & hinc caucta rursus in nucleos discernitur, atque ex vno plura efficiuntur, dum caput consummatur, & continuo ab radice aliud atque aliud obducit, & si non euellantur, plura in dies fiunt. Super fistula capitari posse affirmant. Germen ab imis educere potest. Omnia capitata, partem superiorem tenuem, imbecilemque, radices amplas, carnosasque gerunt: prorsus in quibus acedo inest, vel alia eiusmodi vis, radicibus potius inest, quod ratione optima euenit, quum natura eò potius tendat. Hæc omnia ex Theophrasto Addimus. Capa caulem vacuum promittit, florem iucundum villosum, purpurascens, semē copiosum nigrum. Caulis à ceruice sensim comprimitur in latiore, & à lateribus reductam vtrinque circumferentiam, bulbi vmboni numerosa fibrarum coma aptata subest.

Colum.

Iulius Pollux Samothraciam commendat, ex Athenæo.

Solum.

Columella. Capina magis subactam postulat terram, quàm altius conuersam, itaque ex Calendis Nouembris proscindi solum debet, vt hyemis frigoribus & gelicidiis putrescat, intermissisq; quadraginta diebus, tum demum iterari, & interpositis vno, ac viginti diebus tertiarum, ac protinus stercorari, mox bidentibus æqualiter perfossum in areas disponi, deletis radicibus omnibus. Palladius. Terram pinguem vehementer subactam irriguam stercorari. Cassianus, in terra rubra latari.

Theo-

Theophrastus
nis est. Seritur et
& lentitiam qua
hant, deinde om
que partes istæ v
proueniunt, tep
toto capite, & ci
nanque inferior
in rectum germi
diximus iam ex
nere, siquidem
verò fibræ sublu
potior bulbus,
& fibras abscond
tumque est, quo
nouellas submit
trefactionem. D
aut ter imber in
nimè putent. C
mina spargi, qu
quoque habeat
ri. Palladius: Fe
esse seminandas
mine. Si capitul
ram parauimus,
remus placido,
ente Luna sera
saporis humec
pius. De quib
cæperint exci
tis indicia. Ve
ficcandi. Mart
Martio mense
frigidis locis. P
alij modo cap
tunt, sed capu
ratione semen
separatim sem
pas ter follo so
nas libras. Inte
terea, & sarriri

Theophrastus semine prouenire dicit, qui prouentus omnibus commu- *Satio.*
 nis est. Seritur etiam radice, vt omnia capitata, quum tunicas habeat plures,
 & lentitiam quandam, ynde diuidunt eas in fibras, tegumenta que detra-
 hunt, deinde omne nõ viuum à vitalibus semouendum censent: quum ne-
 que partes istæ viuunt, nec primatum obtineant. Omnes post autumnum
 proueniunt, tepido adhuc solo, vt depositas imbres occupent. Seruntur &
 toto capite, & circumciso, sed generationes haud similes fieri solent: parte
 nanque inferiore capæ nascuntur, superiore herba tantum erumpit. Sectæ
 in rectum germinare omnino nequeunt, sed vtra sit radix, bulbus an fibræ
 diximus iam ex Theophrasto. Sed constat bulbum radice rationem obti-
 nere, siquidem & sub terra est, & sine fibris etiam vtuntur vice radicum: si
 verò fibræ subsunt, erit fibra bulbi radix, aut vtræque fuerit radice pars. sed
 potior bulbus, quoniam mortuis fibris viget nihilominus. Aliqui tunicas
 & fibras abscindunt, quod neutrum impediatur generationem, argumen-
 tumque est, quod capullæ in cellis suspensæ germinant, tolluntur fibræ, &
 nouellas submittunt, tunica non prohibet generationem, sed defendit pu-
 trefactionem. Diligit aquam, quamquam nonnulli negent, si principio bis,
 aut ter imber incesserit: non desunt tamen, qui pluuias aquas prodesse mi-
 nimè putent. Columella: Ad Calendas Februarias sereno die conuenit se-
 mina spargi, quibus aliquid Satureiæ seminis intermiscendum erit, vt eam
 quoque habeamus. Sed capina certè non minus debet, quàm quater sarri-
 ri. Palladius: Februario mense cepullas serimus, sed cõstat vere, & autumno
 esse seminandas. Si tamen eas seueris, in caput crescit, & minus reddit in se-
 mine. Si capitulum ponas, ipsum inarescit, & multum semen educit. Vbi ter-
 ram parauimus, ibi areas faciemus, omnibus herbis, & radice purgatas. Se-
 remus placido, & sereno die, maximè Austro, vel Euro flantibus. Si minu-
 ente Luna serantur, tenues & aridiores proueniunt, si crescente, robustæ &
 saporis humecti. Rarius sunt ponendæ, runcandæ ac sarculandæ sunt sæ-
 pius. De quibus semina colligenda sunt, iuuentor amminiculis, vbi caulem
 cœperint excitare. Quum niger color seminis fuerit, præferunt maturita-
 tis indicia. Vellendi sunt thalli adhuc semisseci cum semine, & sic in Sole
 ficcandi. Martio locis frigidis: Octobri semine seruntur, & Nouembri.
 Martio mense cepullas seremus, & Aprili. Iulio mense serimus irriguis, &
 frigidis locis. Plinius: Seritur Amiternina frigidis, & humidis locis, & sola
 alij modo capite, reliquæ semine, proximaque æstate nullum semen emit-
 tunt. sed caput tantum, quod inarescit. Sequenti autem anno permutata
 ratione semen gignitur, caput ipsum corrumpitur. Ergo omnibus annis
 separatim semen, capæ causa seritur, separatim capæ, seminis. Cætero ca-
 pas ter fosso solo feri iubent, extirpatis radicibus herbarum. In iugera de-
 nas libras. Intermisceri satureiam, quoniã melius proueniat. Runcari præ-
 terea, & sarriri, si non sæpius quater. Querit Aristoteles in problematis:

Cur cæpæ & allia, quò sicciora serantur, eò meliora possint euadere, cætera autem deteriora? An quòd omnia istiusmodi maximè plena humoris cõficiuntur? Itaque terræ commissa sicciora temperamento commodo germinare incipient. Adde quòd minus putrent, quum sicciora seruntur.

Ars.

Theophrastus folia his vere detrahenda censet, vt vim suam in imo cõtineant, neque effusa seminefcant. Sotion: Capita, vt maiora reddantur; si quum transfertur, fibras, omnemque comam auferas. longè maiores cæpæ nascentur, si quum translationi locus est, in terra viginti diebus ante subacta, & tantisper resiccata, dum omnis exhauriatur humor, deponatur. Magis in capita crescēt, si detractis tunicis, nudæ pangētur. Palladius: Si capitata his voluerimus esse maiora, folia omnia debemus auferre, & sic succus ad inferiora cogetur.

Cõditura

Incorrupta durabunt, inquit Sotion, si in calidam aquam demersæ, mox insolatæ, donec penitus siccescant, paleis ordeaceis recõdantur: ita compositæ, vt nulla parte se contingant.

De ascaloniis. C A P. LXXXI.

QUia ascalonias cæpas tum natura, tum cultu ab alijs Theophr. differre dixit, ideo illarũ separatim meminerimus. Plin. ascaloniã condi dixit. Græcis ἀσκαλονία καὶ ὀβύζιον, Latinis Ascalonia cæpa. Plinius: à Iudææ oppido nominata. Alij Ascalonitides siue Palesinas vocant gentili nomine dictas. Nos retentis pristini vocabuli rudimentis vulgò *scalogne* dicimus.

Nomen.

Descriptio.

Peculiarem quandam figuram, vel naturam habent, vt rectè meminit Theophrastus, quippe ancipitem inter cæpam, allium, & porrum, similiores cæpis, sed minores, multæ, & simul coaceruatæ.

Genera.

Theophrastus: Cretensium peculiaris natura notatur, sed Ascaloniis quodammodo proxima, ni forte vel eadem dici debeat. Est in Creta genus quoddam quod semine quidem satum, ni radices crassatur, depositum verò in caulem semenque totum funditur sine capite, saporeque dulce est: id enim contrarium quasi cæpis habet, omnes namque depositæ, melius celeriusque proficiunt. Plinius: sunt in honore & Creticæ, de quibus dubitant an eadem sint quæ Ascaloniæ, quoniã satis capita crassescunt, depositis caules, & semina. Distāt sapore tantum dulci. Hoc genus nobis ex Caieta affertur, vocanturque *scalogne capere*, nam maiores fiunt, aliæ acrioris saporis.

Cæl. Sol.

Satio.

Cælum, quale Iudææ, & solum vt cæpæ reliquæ desiderant. Quia solæ fissiles, & veluti steriles ab radice cõsistunt, ideo iubet Theophrastus quũ neq; ab radice crassescāt, semine feri, nō deponi. Præterea circa ver, quũ germinant trāsferri. Mature celeriter putrescūt. Si deponātur, caulē ædunt, & semē fundunt, tũ ipsæ euanescūt. Columella: Si cæpæ semen excipere velis, capita maxima generis Ascalonij, quæ est optimũ mense Februario, deponito, quaternorum vel etiam quinũ digitorum spatiis distantia, & quum

& quum ceperim
caulem, humilio
seruato: nam nō
posueris, thalli ca
tur, quod scilicet
coloremque nigrũ
cidat. Verũ int
rum propria natu
illas, non deponi
transferrĩ, ita cra
Festinandũ au
deponantur & ca
mense Februari
spicas. Primò pal
laquearibus app
Nostri olitoru
rit, ac plantauerit

DIFFERT
Theophras
bimus, elucescat
Theophrastu
vocat, idque quia
funduntur, vnde
maligie.

Theophrastu
externa folia de
nar, simulque inf
sent, vt vim suã
eum sua corna h
iisdem diuisuris
detrahi iubent,
porri plantantu
foramen. Cespiti

DEBITATV
dum fuerit
Theophrastus i
nidit, in capitati
Theophrastu
lida, & epitillia

& quum cœperint virere, nec minus ter confarrito, deinde quum fecerint caulem, humilioribus, quasi canteriolis interpositis rigorem styliorū conseruato: nam nisi arundines transuersas in modū iugatæ vineæ crebras disposueris, thalli cæparum ventis prosteruntur, tantumque semen excutietur, quod scilicet nō antè legendum est, quàm quū maturefcere cœperint, coloremque nigrū habere. Sed nec patiendum est, vt perarescat, aut totū decidat. Verū integri thalli vellēdi sunt, & sole siccandi, Plinius. Ascaloniarum propria natura: etenim velut steriles sunt ab radice, & ob id semine feri illas, non deponi iussere Græci: præterea serius circa ver, quum germinant transferri, ita crassescere, & tunc properare præteriti temporis pensatione. Festinandum autem in his est, quoniam maturæ celeriter putrescunt. Si deponantur & caulem emittunt, & semen, ipsæque euanescent. Ascaloniam mense Februario ferunt nostri. Neapolitani Martio mense ferunt, vt allij spicas. Primò pastinantur Maio, secundò Iunio, Augusto terra cruuntur, laquearibus appensæ seruantur ad vernam sationem.

Nostri olitores inquirunt, si quis allij spicas in perforatā cæpam indiderit, ac plantauerit, in Ascalonias cæpas mutari.

De cæpa fissili. CAP. LXXXII.

DIFFERT etiam à cæteris cæpa fissilis cultu, & natura, vt scribitur à Theophrasto: ideo post Ascalonias de eis dicemus, vt clarius, quæ scribimus, elucescant. Fissilis etiam conditur, Plinio authore.

Theophrastus *σχιστὰ ἀπόμυρα*, Theodorus vertendo Theophrastū fissiles vocat, idque, quia detractis prioribus foliis altero germinat, simulque inferius finduntur, vnde fissiles appellatæ. Plinius à Græcis schista vocat. Itali *cepolle maligie*.

Theophrastus. Fissilem hyeme cum sua coma relinquunt inertem, vere externa folia detrahunt, & reliqua colunt, detractis his foliis altero germinat, simulque inferius finduntur. Quidam vel omnibus detrahenda folia censent, vt vim suā imo contineant, neque effusa seminescant. Plinius. Schistam cum sua coma hyeme relinquunt, vere folia detrahunt & alia subnascuntur iisdem diuisuris: vnde & nomen. Hoc exemplo reliquis quoque generibus detrahi iubent, vt in capita crescant potius, quàm in semina. Apud nos, vt porri plantantur, vt pede distet altera ab altera, & suum vnaquæque impleat foramen. Cespitem magnum faciunt. Æstate post Pascha eduntur.

De gethyo. CAP. LXXXIII.

DVBITATVR à nōnullis gethyū an inter cæpæ genera, vel porri reponendum fuerit. Nos inter vtrumque locauimus, post cæpā, & ante porrum. Theophrastus inter cæpæ genera recenset. Plinius cæpam in duo genera diuidit, in capitatū, quod cæpā diximus, & condimentariū, quod gethyon vocat.

Theop. *γέθυον* vocat. Sed sunt ex Græcis, Athenæo referēte, qui eū gethyllida, & epithyllida vocat. Sed Epænetus gethyllida capitatū porrū appellat.

tradit. Latini pallacanam vocant, authore Plinio. Ait enim. Condimentarium genus, quod Græci gethyon vocant, nostri pallacanum, sed inuenitur plerumq; gethyon, getion dici, sine y, & aspiratione. Neapolitani *porrone* vocant, quod magnum porrum præ se ferat. Sed non est à capis separatum genus. Nascitur enim in capinis, quum strictius satum est, aut solo minus pingui, & mascullescere dicunt.

*Descri-
ptio.*

Ita eum depingit Theophrastus. Gethyon penè sine capite est, cervicis tantum longæ, & ideo totum in fronde, sæpiusq; refecant, vt porrum. Singulari capite est, vt cæpa, allium, porrum. Germinat suo latere. Subtus veluti quoddam caput bulbaceum suo latere promit, vt porrum, quod folia, 10 semine etiam sublato, & arefacto prorsus caule creat. Caput multistunicis constat, vt bulbi, cæpæ, & similia: folio cōcauo, semine ad perdurandum infirmo. Didymus gethyum simile fecit ampeloproaso. Aristophanes gethyum naturam radicem allij habere dicit, Athenæo authore. Plinius: Gethyum penè sine capite est, cervicis tantum longæ, & ideo totum in fronde refecatur, vt porrum, folio concavo. Semen infirmum ad perdurandum.

Satio.

E secunda sementi est, inquit Theophrastus. Post brumam Ianuario mense incipit, tunc seminant, defiguntq; gethyum, decimo, aut duodecimo die profilit, ex recenti semine maturius. Non annicaule modo, sed à bimatu etiam fructificat, nec annum dici debet. Semine feritur nō deponitur, quia 20 10 germinatio tota in fronde, sæpiusq; retondetur. Diligit aqua, quamquam nonnulli negent, si principio bis, aut ter imber inceserit. Fimum cupit. Difficile germinat: humorem enim habeat aptum & non minus, sed forsitan magis temperiem ad augendum, ac patiendum, oportet, quod germinaturum facile, beneq; sit. Plinius. Seritur mensibus Martio, Aprili, Maio, non deponitur. Ex recentiori semine maturius gignitur. Radix diuturna: quia ex ea nascitur.

De porro. CAP. LXXXIIII

ET in hac cognatione de porro dicendum, inquit Plinius: præsertim quum sectiuo nuper autoritatem dederit princeps Nero vocis gratia, ex oleo statis mensium omnibus diebus, nihilque aliud, ac ne pane quidem vescendo. Fama est Melam equestris ordinis reum ex procuratore à Tiberio principe accersitum in summa desperatione succo porri ad trium denariorum argenteorum pondus hausto, confestim expirasse sine cruciatu. Ampliorem modum negant noxium esse. Sed cur porrum proficit ad vocem sonoram quærit Aristoteles libro problematum. nam & per dici commodum eadem in re nouimus. An quod allium quoq; elixum delinit, & quidem porrum lentitiam quandam obtinet, quæ fauces detergere possit. Porrum non olere scribit Sotion, qui cuminū prægustarint: hoc enim esu grauis odor extinguitur. Capitatos porros, vt Athenæus est author, Latonæ fa- 40

cros

eros esse narrant
lacia laboraret, h
Polemon vetu
pisset, latam faiss
tulisset porrum h
vidisse fatetur A
Diphylus obloni
Græcis πρῶτον
millima in ossibu
volunt dictum, q
Porrorum du
de quo dicturi su
tas, capitatu & se
radix in caput cr
terum genus sect
auferatur. Videt
litum quem eru
Et Tar

Sectiu Plini
bus, quo vtuntur
risque, incisuris
uissile, quod vnu
Theophrastus
folio, sed à bimatu
culos emittere.
nius ait, nō ann
firmo. Addim
lata, tunicis qui
super terram ca
herbaceo porra
cauum, multis fl
glomeratis. Vbi
Palladius loc
vidimus. Colu

Martialis: M
Plinius lauda
Palladius pla
nius. Insigne qu
prietate quadam

eros esse narrant: nam quum Apollinem in vtero gestans, prægnantiũ malacia laboraret, hoc cibo fertur elanguentem appetentiam inuitasse: quare Polemon vetustus Aristophanis enarrator, quum id olus Latona concupisset, latam fuisse Delphis legem tradit in Theoxeniis; Qui maximum attulisset porrum huic deæ, sportulam è mensa sacerdotum acciperet. Sequē vidisse fatetur Athenæus gethyllidem in rapi magnitudinem excreuisse. Diphylus obsonia commendare dixit. Esus in olere, vbiuis frequens.

Græcis *παράρον* dicitur à colore, Latinis porrum, à callosa porri capitis similitudine. *Nomen.*
millima in ossibus ferrum inatis concretione, vt coniciamus. Alij porrum volunt dictum, quod porrò eat, & longè lateq; grassetur. Itali *porro*.

Porrorum duo genera, syluestre & satiuũ, agreste ampeloprason dictũ, *Genera.*
de quo dicturi sumus mox in sequenti. Satiui duo genera signauit antiquitas, capitatũ & sectiuũ. Capitatũ Dioscorides *κεφαλατόν* vocauit, quod eius radix in caput crescat. Athenæus gethyllidas dici testatur ab Epæneto. Alterum genus sectiuum vocant, quod frondenti coma super terrā eminens auferatur. Videtur id genus Martialis Tarentinum vocare ob grauem halitum quem eructat:

Et Tarentini graui ter redolentia porri

Edisti quotiens, oscula clausa dato.

Sectiui Plinius duo genera facit. Herbaceũ folio incisuris eius euidentibus, quo vtuntur medicamentarij. Aliud genus rotundioris folij, suauiorisque, incisuris lenioribus. Sed miror antiquos porrum in duo genera diuisisse, quod vnum naturale, alterum artis mangonio confectum sit.

Theophrastus annuo folio non dici debere autumat, quippe nō annuo folio, sed à bimatu fructificare. Vnicaule esse, nec è lateribus laterales surculos emittere. Semine sæcũdissimo. Semine ad perdurandum firmo. Plinius ait, nō annum tantũ, sed sæpius parere: renasci enim à radice: semine firmo. Addim⁹ nos. Porru radice est cartilaginea, crassa, multis fibris capillata, tunicis quibusdā vestita, ex albæ ceruicis augustiis extuberans, fronde super terram carinata, & in angulum oblonga, colore adeo viridi, vt pro herbaceo porraceus color vsurpetur, bimum profilit in caulem longum, cauum, multis floribus aceruatim collectis, & in speciem absolutā pilæ conglomeratis. Vbi sementem protulit, intermoritur.

Palladius loco læto, & campestri lætari ait. Nos omne cœlum sustinere vidimus. Columella aricinum laudat. *Cœlum.*

Qua mittit Aricia porri.

Martialis: *Mittit præcipuos nemoralis Aricia porros,*

In niueo virides stipite cerne comas.

Plinius laudatissimos in Ægypto, mox Orchidæ, atque Ariciæ.

40 Palladius plana, alte pastinata, diu subacta, & stercoreata terra lætari. Plinius: Insigne quod infimo, lætoq; solo gaudeat, rigua odit, & tamen proprietate quadam soli constat. *Solum.*

F F F

Satio.

Theophrasto è secunda semēti est. Post brumā Ianuario mense defigitur porrum, duodeuigesimo die, & vigesimo à satū prorumpit, è recentiori semine celerius prouenit. Cuius causam in libro de causis disquirat. Quia omne calidum facillè germinat, & calida sunt, quæ acria, porrū verò, gethyū, fatureia, origanum acria sunt, & tamen non cito germinant, sed humorem habeant aptum, temperatumq; ad augendū, pariendūq; oportet, quod cito breuiq; germinaturū est. Columella: Mense Februario porri semen ponitur; locis apricis circa Calendas Martias licet porrū (si iam ingranduit) transferre. Circa Calendas Aprilis æquè transferes. Porri caput circa idus Maia tolerabiliter adhuc trāsfertur. Sotion admonet, post sationē porrorū, statim cōculcādos esse sulcos, & nō irrigādos, sed neglectos relinqūdos per tres dies, quarta verò rigari debere, ita enim pulcherrimos prouēcturos.

Ars.

Theophrastus porro recisionē conferre dixit, tonsumq; retonsumq; tenerius, dulcius, albidius, & omnino melius euadere: rationēq; reddit libro de causis, quippe q̄ diminuuntur, eo magis vere cōcipiunt, & si validiores fiunt, plus pabuli trahūt, meliusq; incoquere possunt. Germinatio enim prima, vt debilis, deterior etiā: præterea frondibus illis ablatis, vtpote impedimento ablato plus proficit. Columella: Si sectiū facere velis, densius satū præceperūt priores relinqui, & ita quū increuerint secari. Sed nos docuit vsus longè melius fieri, si differas, & eodem modo quo capitātū modicis spaciis, id est inter quaternos digitos depangas, & quum conualuerit defeces. In eo autē, quod magni capitis efficere voles, seruandum sit, vt antequā translātum deponas, omnes radículas amputes, & fibrarū summas partes intondeas: tum testulæ, vel conchulæ, quasi sedes in singulis subiectæ feminibus adobruuntur, vt fiant capita latoris incrementi. Cultus autem porri capitati assidua sarritio, & stercoreatio est, nec alius tamen sectiui, nisi quod toties rigari & stercoreari, sarririq; debet, quoties demetitur. Palladius: Si porrum sectiū facere velis, post duos menses, qui satus est, poteris dissecare, & mandare in areis suis: quamuis afferat Columella etiam sectiū diutius duraturum, melioremq; si transferatur, & quoties secabitur, aqua inuetur, & stercore. Apud nos qui temperatis degimus locis, feritur Decembri, Ianuario, Februario, & Martio, semine fuso, Martio deinde transfertur, pangiturq; in sulcis: distet alter ab altero quatuor digitorum latitudine, quum rectè accommodaueris, dum secundus ducitur sulcus, effossa humo cooperitur, atq; pedibus leuiter calcatur. Primo secātur Iunio, stercoreanturq; & irrigantur, secundo Augusto, tertio Septembri, eandem semper operā imponendo. Post mensem eruuntur, exponunturq; vno. Alij ferunt palo foramine adactō, pedem profundo, radículas amputant Aprili, Maio, & Iunio. Seruntur etiam Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri. Inde eruuntur Martio, & Aprili. Poteris etiam inter capas ferere. Palladius: Si capitātū facere velis, quod vere seueris, Octobri mense transferre

ferre debebis, sed
dus, quum digiti
truncatis radicibus
nis digitis separatis
leuandus est sarcina
nerit, capitis valde
tum maius fiat, r
tur. Enatum aut
ferri debet circa
10 mense Maio re
si deposueris, gr
semen immittat
frequenter hoc
ne fit. Et semina
germina faciet a
naturam coale
uos arearum pec
nimè rigari, qu
tat. Si inter se
20 30 transfertur, ca
mediū inferas,
scentibus in ma
pæ semen vent
molem adfert.
mina veterem lin
protinus irriga
Vermiculo
quasi porricid
infectus in du
30 stercore: quan

AMELIO
esse dicit.
stre porrum es
neribus sylue
rique natura p
que ad sequer
Dioscoride
dicas, nomen
40 tani porri, &
Plinius ita

ferre debebis, sed rarius feras, sarculo frequentandus est, & herbis liberandus, quum digiti crassitudinem habuerit à media parte præcisus foliis, & truncatis radicibus transferatur. Oblitus fimo liquido quaternis, vel quinis digitis separetur: quum radices aget, modicè comprehendendus, & alleuandus est sarculo, vt suspensus à terra, quod spacij vacuum subter inuenit, capitis vastitate cogatur implere. Columella. Quo porri incrementum maius fiat, raris linteolis complura grana illigantur, atq; ita obruntur. Enatum autem in his locis, quibus aqua subministrari non potest, deferri debet circa æquinoctiū autumnū, at quibus possis humorē præbere, Item plura semina in vnum ligata si deposueris, grandis porrus nascetur ex omnibus. Item si capiti eius rapæ semen immittas sine ferro, & pangas, multum fertur incrementum, melius si frequenter hoc facias. Theophrastus, Porrorū magnitudo ex transhalatione fit. Et semina plura linteolo deligata terræ mandari iubet, sic radices, & germina faciet ampliora. Plus enim valent quæ plura, & illa omnia in vnam naturam coalescunt. Sotion Græcus laudat statim, atq; satum fuerit, puluinos arearum pedibus proculcari, triduumque velut habitū neglectui minime rigari, quarto die aquæ resperfu iuuari, ita probatissimum nasci putat. Si inter serendum arena terræ misceatur, vberimum prodibit, si dum transfertur, capiti stilo vel arundine citra ferrū puncto cucumeris semē in mediū inferas, mirum in modū fertur grandescere, quando seminiis coalescentibus in magnū tumorem extuberabit. Sunt qui nō cucumeris, sed rapæ semen ventri potius insinuent, hoc in vnitatem coiens, turgidam capiti molem adfert. Item si quanta tribus digitis carpi possunt, oblita fimo semina vetere linteolo ligata deposueris, grādis porrus nascetur ex omnibus, si protinus irrigetur. Hoc falsum esse iam supra declarauimus.

Vermiculos paruos porros insectantes Theophr. *πρασονειδης* vocat, *Inf. rem.* quasi porricidas dicas, hos humor collectus interimit, & fimo aceruatim iniectus: industria enim bestiola condit sese, & vt in stramento, quiescit in stercore: quamobrem venari facile est, aliter nulla venandi datur facultas.

De ampelopraso. CAP. LXXXV.

AMPELOPRASON Galenus inter porrum, & alliū medium quoddam esse dicit. Nos post porrū locauimus, dicturi mox de allio. Ipse syluestre porrum esse testatur, & tantum à porro dissidere, quantum in congeneribus syluestre à satiuo. Syluestria enim omnia maiori acrimonia, sicciorique natura pollent. Salsamarij cæparum modo in aceto condiunt, & vsque ad sequentem annum recondunt, & sic innocentius redditur.

Dioscorides *ἀμπελοπρασον* vocat, quasi vineale, vel vitigineum porrum dicas, nomen à natalibus inditum. Plinius ampeloprason vocat. Neapoli-

40 tani porriui, & porri seluaggi.

Plinius ita describit: Folij porri, ructu grauis, Addimus: Caule proflit *Descr.*

cubitali, foliis porraccis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa.
Solum. Plinius, Prouenit in vinetis.

De allio. CAP. LXXXVI.

ALLIUM Plinius ad multa ruris medicamenta prodesse credit, tædium huic quoque halitu, ut capis, nullum tamen coctis. Menander è Græcis author est, allium edentibus si radicem betæ in pruna tostâ superederint, odorẽ extingui. Sotion, Allium edentibus halitus tædium dixit aboleri, si crudam fabam supermanducauerint. Plinius: Ferrum ad se trahente magnete lapide, & allio rursus abigente à se. Cassianus: Magnes attrahit ferrum: expirat si illi allium affricetur: reuiuiscit sanguine hircino ipsi infuso. Plutarchus: Magnus allij cum magnete dissensus, quam vocant antipathiam, tantumque inter has res surdas, & sensu carentes odium, ut ferrum abigat à sese, si affricetur allio lapis. Idem confirmat Ptolemæus, magnetem non trahere ferrum, si linatur allio. Quærit Aristoteles in problematis, cur allia quum excaulescunt plenius quàm recens edita oleant. An quod recetia humoris multum adhuc extranei continent? quo fit, ut vim suam integram habere nequeant, quum autem decocta iam sunt, secreto humore illo inutilitum suum odorem sincerè adipiscuntur, qui scilicet acer est. Quin etiam ceteri nuper æditi fructus dilutiores sunt, & capas recentiores ob eam causam minus acres sentimus. Si iuxta coronarias herbas seratur, magis eas 2
olere facit, cuius rationẽ ex Theophrasto reddidimus in capis. Pantheræ, leonesque non attingunt perunctos allio, præcipuè si & allium fuerit incoctum. Allium capasque inter deos iureiurando habet Ægyptus, ex Plinio.

Nomen.

Nominant Græci σκόροδον, ut nonnullis placet quasi σκαῖον ῥόδον, id est rudem rosam, quod aspere supra modum redoleat & nares offendat. Alij quod pandiculationes moueat, quas Græci σκορδιτισμὸς vocant, scorodon vocatum dixere. Latini allium dicunt à Græco fortasse verbo ἄλλεσθαι, id est exilire, quod nimium exiliendo crescat. Itali aglio.

Genera.

Theophrastus. Discrimen eorum quod aliud præcox, aliud serotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. differunt præterea magnitudine singulari, ut Cyprium vocatum maxime tale est, quod non decoquunt, sed in myrtotis vtuntur, & quum tunditur mirum quàm spuma increseat. Quin & illud differentiam facit, quod quædam non nucleis coagmentantur. Dioscorides in duo etiam diuidit, in satium hortense vnum, alterum syluestre. Satium aliud Ægyptium, singulari constans capite: aliud ex pluribus coagmentatum nucleis, syluestre ophioscorodon dictum. Plinius à Theophrasto. Generum differentia in tempore: præcox maturefcit sexaginta diebus. Tum in magnitudine. Vlpicum quoque in hoc genere Græci appellauere allium cypriū, alijs antiscoridon, præcipuè Africæ celebratum inter pulmentaria ruris, grandius alio, tritum in 40
oleo & aceto, mirum quantum increseat spuma.

Theo-

Theophrastus
 fimis, & quæ sepa
 coagmentatur
 nuclei fuere, hoc
 nea, caule tereti,
 quo semen emica
 branceis cuticulis

Sotion optim
 alba feritur, fossa

Substinet quon

Theophrastus

folsticia, feritur,

Primo anno capi

redditur perfectu

melius id existim

ri solet. Alij nam

autem in nucleos

caput consumatur

stula quoque &

ut mihi multoties

tos bulillos pan

Quando feruntur

fibras, tegument

mouendum cent

re solent. Colum

positio allij est F

nantur allia, ex

rentes spicas, ea

sita, minus infe

in sationibus ea

tis minor est faci

maria spacia, spi

mipedali spacio,

quo sapius id fa

pruinosis per au

puntur, quod fo

optimum est al

calendas Ianuar

situs terræ perm

& semina in loci

sa, sarcubalis fre

Theophrastus. Folia illico ab radice exeunt, vnicaule. Plinius: Tenuis- *Descri-*
 fimis, & quæ separantur in vniuersum velatur membranis, mox pluribus *ptio.*
 coagmentatur nucleis, & his separatim vestitis: asperi saporis: & quo plures
 nuclei suere, hoc est asperius. Addimus: Fronde viret capacea vel grami-
 nea, caule tereti, & inani. In cacumine flores in globum circumaguntur, in
 quo semen emicat. Bulbis è multis nucleis vna spicatum congestis, mem-
 braneis cuticulis inuolutis, è quorum medio fibrillæ tortiles porriguntur.

Sotion optimè alba terra provenire ait. Palladius idem. Terra maximè *Solum.*
 alba seritur, fossa, & subacta sine stercore.

Substinet quodcunque cælum. Vniuersale enim olus est. *Celum.*

Theophrastus hæc de allij satione: Allium ante solstitia, aut paulo post *Satio.*
 solstitia, seritur, nucleatim diuisum: perfici enim semine potest sed tardè.
 Primo anno caput accipit porri, sequenti discerni in nucleos incipit, tertio
 redditur perfectum, nec quicquā deterius. Sed etiam quidam vel deposito
 melius id existimant. Radicis autem allij, aut capæ, haud similis ortus fie-
 ri solet. Allij namque quum nucleus extumuerit, tota intorquetur, & hinc
 aucta in nucleos rursus discernitur, atque ex vno plura efficiuntur, dum
 caput consumatur. Etenim si non euellantur, plura in dies fiunt. Super fi-
 stula quoque & allium capitari posse affirmant. Neapoli continuè visitur,
 vt mihi multoties videre contingit, in allij flore, quem diximus, orbicula-
 tos bulbillos paruos provenire, vt quot fuerint flores tot bulbos producat.
 Quando seruntur allia, diuidere bulbos in nucleum solent, & caparum
 fibras, tegumenta; detrahunt: denique omne non viuum à vitalibus se-
 mouendum censent, vt etiam arboribus partes, quæ obarescunt, absconde-
 re solent. Columella: Autumno conseri debet allium. Et vltima temporis
 positio allij est Februario mense. Circa calendas Octobris antequam depo-
 nantur allia, ex vna capite in plura diuiduntur, habent enim plures cohæ-
 rentes spicas, exque quum sint diuisæ, liratum seridebent, vt in puluinis po-
 sitæ, minus infestentur hyemis aquis. Est autem lira similis ei porcæ, quam
 in sationibus campestribus rustici faciunt, vt viginem vitet. Sed hæc in hor-
 tis minor est faciēda, & per summam partem eius, id est in dorso, inter pal-
 maria spacia, spicæ allij disponendæ sunt. Sulci lirarum inter se distent se-
 mipedali spacio, deinde quū ternas fibras emisserunt spicæ, sarriantur: nam
 quò sæpius id factum est, maius semina capiunt incrementum. Regionibus
 pruinosis per autumnum non feri debet: nam brumali tempore corrup-
 puntur, quod ferè mense Ianuario mitescit, & iccirco frigidis locis tempus
 optimum est allium ponendi circa idus prædicti mensis. Multa tamē ante
 calendas Ianuarias medijs diebus serunt mense Decembri, si cæli tepor &
 situs terræ permittit. Palladius ab eo: Nouēbri mense sulcos in areis facies
 & semina in locis altioribus pones quatuor digitis separata, neq; altius præ-
 fa, sarcularis frequenter, inde plus crescunt. Plinius: quidam allium in pla-

no feri vetant, castellatimq; grumulis imponi distatibus inter se pedes ternos. Inter grana quatuor digiti interesse debent: simul atque tria folia eruperint, sarri. Grandescunt quo sapius sarriuntur. In frigidis vtilius vere feri, quàm autumno. Sunt qui allium inter compitalia, ac saturnalia feri aptissimè putent. Allium & semine prouenit, sed tardè. Primo enim anno porri crassitudine capite efficitur, sequenti diuiditur, tertio consumatur, pulchriusq; tale existimant quidam. In semen exire non debet, sed intorqueri caulis sationis gratia, vt caput validius fiat. Apud nos ponuntur spicæ Septembri, vbi quatuor foliorum fuerit, primo foditur Octobri, secundo Decembri, tertio Ianuario, quarto Februario. Si spicas quæris eruuntur Maio: si relinquis, erit Decembri tenerrimum.

Ars.

Quo vastiora capita fiant, docet Columella, Antequam caulem faciant, omnem viridem superficiem intorquere & in terram sternere conueniet. Sed quandocunq; vel conferemus, vel iam matura in tabulatum reponemus, seruabimus in iis locis, quibus aut obruentur, aut eruentur, vt Luna infra terrâ sit: nam sic sata, & rursus sic recondita existimantur, neq; acerrimi saporis existere, neque mandentium halitus inodorare. Palladius ab eo: si capitatum facere volueris, vbi cœperit caulis prodire, proculca, succus reuertetur ad spicas. Fertur si Luna sub terris posita seratur, & item sub terris Luna latente vellatur, odoris fœditate cariturum. Plinius: Cæterum vt odore careant, omnia hæc iubentur feri quum Luna sub terris sit, colligi quum in coitu. Allia tradit Sotion dulcescere, quorum fractæ leniter spicæ serantur, dulciorem contrahere saporem, quæ in pangendo olearum fraces admiserit. Idem asserit, allium, si Luna sub terris posita seratur, & item sub terris Luna latente vellatur, odoris fœditate cariturum. Meliora nascuntur omnia acervatim sato semine, quàm sparsa, ita certè allium ferunt in laciniis colligatum.

Cōditura

Plinius: Quod si diutius allium, cæpamq; inueterari libeat, aqua salsa tepida capita intingenda sunt, ita diuturniora fient, melioraq; vsui, sed in satum sterilia. Alij contenti sunt primo super prunas suspendisse, abunde q; ita profici arbitrantur, ne germinet, quod facere allium cæpamq; extra terram certum est, & cauliculo actō euanescere. Aliqui & allium palea seruari optimè putant. Palladius: Vel paleis condita allia, vel fumo suspensa durabunt.

De alio cyprio, siue vlpico. CAP. LXXXVII.

NVNC alteram allij speciem ab hortenfi dicamus, scilicet cypriū. Theophrastus id nō decoqui dicit, sed in myrtotis vsurpari. Myrtota dicebantur ab odoris fœditate, in quo caseum quoq; addebant. Plinius ruris pulmentaria vocauit.

Theophrastus *κύπερον σκόροδον* vocat, id est cyprium allium, Columella à Græcis *ἀπρὸ σκόροδον* appellari dixit, ab aliquibus allium punicū, & vlpicum.

Plinius

Plinius à Græcis
nij verbis mendo
legendum, quip
desumpsit, vt
in aliis authorib
Aphrorum gent
scorodon punicu
cæ celebratum p
dipor dicunt, ad q

10 tanditur, mirum
torquens, Triton
India dicitur. T
decoquit, inquit
crescat spuma. C
alliū, habetenim
adolefcit multo p
in cuius fastigio
cōglomerato, qu
prenubus tegun
20 ceruice breui tur
vbi succreuerit;

Vlpica

Calido ccelo
bis ex Aprilia aff
Terra alba, fo
Quomodo à

10 I NTER horten
Dioscorides
Theophrastu
nucleis coagmen
pureum vergens
ab aliis diuersum
vnum accipere,

D I X I M V S h
nere Dios
tium semina co
10 aues stupentes n
Diosc. itē & S
nius illud sponte

Plinius à Græcis ἀνθηκόροdon, & allium cyprium à Latinis vlpicū dici. In Plinij verbis mendum subesse suspicor. quippe nō ἀνθηκόροdon, sed ἀφροσκόροdon legendum, quippe à Theophrasto κίπειον, & à Columellā penu ἀφροσκόροdon desumpsit, ut eius mos vniuerso suo opere perpetuus, præsertim quum in aliis authoribus nil de antischorodo tractetur. Et ἀφροσκόροdon vocabulum vel ab Aphrorum gente nomenclaturam sibi vendicauit, cum Columella aphroscorodon punicum allium vocari dixit, & Plinius vlpicum præcipuè Africæ celebratum prodidit inter pulmentaria ruris: vel à spuma quam Græci ἀφρον dicunt, ad quod satis accedit Theophrastus, qui dixit, Cyprium, quum tunditur, mirum quàm spuma increseat. Et Plinius ab eo verbotenus detorquens, Triton mirum quantum increseat spuma. Hodie Neapoli *aglio di India* dicitur. Theophr. ab aliis differre magnitudine singulari dicit, nec decoquū, inquit, sed in myttotis vtuntur, & quū tundūtur mirū quàm increseat spuma. Columella dicit vlpicū esse longè maioris incrementi, quàm alliū, habet enim velut alliū multas cohærentes spicas. Addimus nos: Caule adolefcit multo proceriore, glabro, & tereti, foliis lōge vulgari latioribus, in cuius fastigio semen in cumulū congeritur, capite ex grandioribus spicis cōglomerato, quæ veluti fœdere quodā inito cōiunctæ confertim hæret, & p̄tenuibus teguntur mēbranis, grandiore folliculo omnes simul ambiète: ceruice breui tunicata. Radix primū extumescit in spicas, deinde curuatur, vbi succreuerit, iterū in numeros diducitur. Odore graui Colum. in horto: ————— & olentia latè

Vlpica.

Calido cælo fruitur, proinde à Plinio dictum Africæ celebratum. No- Cælum.
bis ex Aprilia affertur.

Terra alba, fossa, & subacta sine stercore delectatur, ut allium. Palladius. Solum.
Quomodo à Columella feratur, diximus capite de alio. Satio.

De alio Aegyptio. CAP. LXXXVIII.

INTER hortensis allij species, Aegyptij meminimus ex Diosc. & Theophr. Dioscorides Aegyptium vocat. Itali *aglio maschio*.

Theophrastus. Quidam & illud differētiam facit, quod quædam nō in nucleis coagmentatur. Dioscorides: singulari constat capite, dulce, in pureum vergens parum. Negant olitores nostri Aegyptium allium, genere ab aliis diuersum, sed vulgare allium densius satum, vel tenuiori solo caput vnum accipere, quod mascullescere dicunt. Nomen. Descri- ptio.

De alio anguino. CAP. LXXXIX.

DIXIMVS hortensis allij genera, accedendū ad syluestria. Huius meminere Dioscorides & Plinius, aduersus improbitatē alitum depascen- tium semina coctū, ne renasci possit, abiicitur: statimq; quæ deuorauere aues stupentes manu capiuntur, & si paulum commorentur confopitæ.

Diosc. itē & Sotion ἀφροσκόροdon nominant, quasi anguinū alliū dicas. Plinius illud sponte nascens in aruis, alium vocari dixit. Itali *aglio serpentino*. Nomen.

Descriptio. Nos ita describemus: Caule foliisque serpentaria modo maculosis, radicis ceruice longiore, rimosa cute obsita, proximè vrsinum allium delineans.
Solum. Nascitur in montosis.

De allio vrsino. CAP. XC.

Nomen. INTER allij species, Plinius vrsini meminit, & nostro huic horto inferimus. Plinius vrsinum nominat.

Descriptio. Plinius, odore molli, capite prætenui, foliis grandibus. Addimus: foliis ephemeri non lætali similibus, floribus in summo candidis. Floret Aprili, & Maio. Bulbus aliquot nucleolis oblongis sparsis, candicans: allij tadiosum spirans odorem, sapore acri, sed non ingrato, magis odore, quàm habitu allium referens.

Solum. Syluis & vmbrosis, vel vdis pratensis quibusuis obuium.

De scorodopraso. CAP. XCI.

POST allij & porri tractatum scorodoprason aggrediemur, quò vtriusque naturam participet. Dioscorides scorodoprason autumat qualitatem habere porri, & allij, quòd coctum pari modo dulcescat, & in olerum vicem transeat. Galenus item: scorodoprason mistum ex gustu & odore, virtutem obtinens ex allio nempe & porro: sic & Paulus: Sunt qui olitorum diligentia olera hæc duo in vnum veluti monstrum aliquod coaluisse suspicentur, quum habitu porrum simul, & allium æmulentur, vtrumque exprimens olus, ita & medias vires retinere.

Nomen. Dioscorides: σκοροδόπρασον, quasi alliporrum dicas, mutuatur ab vtroque parente nomen. Itali aglio porro, aut porrone.

Descriptio. Dioscorides. Magnitudine porrum æquat: natura ei promiscua, temperans in eo allij porriq; parentum proprietates, effectus vtriusq; præbens.

De bulbis. CAP. XCII.

SUNT etiam bulbi è genere cartilagineo, atq; iam dictis proximi. Cato in horto suburbano, coronamenti omne genus è bulbo Megarico seri oportere scribit. De bulborum conditura hæc à Philemone docta leguntur, apud Athenæum: Caseo indiget, melle, sesamo, oleo, cæpa, aceto, lasere: nam suapte natura, malus est, & asper. Heraclides Tarentinus ait, quod sperma generare videtur, tum quod multi sit nutrimenti, tum quod primam naturam in spermate & vires vniformes habeat. Vnde prouerbium, Nil profuerint bulbi, nisi neruus adesset. Martialis ad illud,

Cum sit anus coniux, cum sint tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quàm satur esse potes.

Prouerbio sunt obnoxij, qui ob stipo capite terrâ spectant, & oculos humi defigunt, quasi bulbos querant, vt est apud Aristophanem. Libidinosos quoque taxauit, quos ait bulborum ollâ deuorasse, quasi mulierosos esse dixisset. Apitius de bulborum apparatu hæc habet, Bulbos oleo, liquamine, & aceto

infe-

inferes, modico
 quacques, dein o
 acetum, defrutum
 Vel bulbos elixos
 rum, defrutum, ca
 hæc de bulbis dixi
 legitimis nuptiis
 succo, & pipere, ve
 cibi appetentiam
 yberius enutrit, e
 dinem accendunt
 moria prodidit b
 ris, sed caris reru
 boli bulbis abstine

Græcis βολβός;

Bulborum gene
 gnitudine, colore
 in locis prodeant,
 Sed peculiaris nat
 cuius inter summu
 tur natura, ex qua
 gerum appellaru
 phrastus est auth
 summum cortice
 mappæ vestesq; c
 liqua bulborum g
 qui dulces in Tat
 laudantur, mox
 thion, acrocorici
 hyeme, verno au
 bum pinguescer
 nus bulborum de
 rum est, vt vna ra
 excreuit, contral
 regii sunt, qui V
 ui, scillæ natura
 euntur, melliore
 runt, quia dulce
 herbam portace
 Theophrastu
 mine laterale pre

inferes, modico cumino hæc super disperso. Vel bulbos aquatundes, & ex aqua coques, dein oleo friges. His sic facies: Accipe piper, pulegiū, origanū, mel, acetum, defrutum, careotam, liquamen, & olei modicum asperges & inferes. Vel bulbos elixos in pultarium pressos mittes, thymum, origanum, mel, acetum, defrutum, careotam, liquamen, oleum modice aspergas, & inferes. Varro hæc de bulbis dixit, Aqua decoque bulbos, qui Veneris vltum querunt, deinde legitimis nuptiis in cœna ponantur, sed & cum nucleis pineis, aut cum erucæ succo, & pipere, vel bulbos frictos cum garo inferes. Paulus Ægineta bulbos cibi appetentiam proritare, ac stomachum roborare dixit, si bis decoquantur, vberius enutrire, ipsorumq; propulsari amarorem, semen producunt, & libidinem accendunt, comedunturq; cum oleo, garo, & aceto. Plutarchus memoria prodidit bulbos nunquam de cœlo tangi, quod non exiguitati corporis, sed cæcis rerum discordiis refert acceptū. Hercules vt est in Amalthia, Euboli bulbis abstinuit, feruorem eorum causatus, & grauem halitum.

Græcis βολβός, Latinis bulbus, Italis *cepolle seluaggie*.

Nomen.

Bulborum genera plura esse descripsit Theophrastus. Differunt namq; magnitudine, colore, figura, & suauitate. Quippe quum adeo dulces quibuldam in locis prodeant, vt crudi faellimè mandī possint, vt in Chersoneso Taurica. Sed peculiaris natura lanigerorum. Est enim bulbi genus circa littora nascens, cuius inter summum corticem, eamq; partem, qua vescuntur, lanea continetur natura, ex qua mappæ, aliæq; vestes quondam conficerentur, ob id lanigerum appellarunt. Indis non lanati, sed criniti nascuntur. Plinius ab eo. Theophrastus est author, esse bulbi genus circa ripas amnium nascens, cuius inter summum corticem, eamq; partem qua vescuntur, esse laneam naturam, ex qua mappæ vestesq; conficiantur. Eadem Phantias retulit, authore Athenæo. Reliqua bulborum genera differunt colore, magnitudine, & suauitate. Post eos, qui dulces in Taurica Chersoneso nascuntur, sunt qui in Africa nati maximè laudantur, mox Appuli. Genera Græci hæc fecere, bulbinem, setanion, pythion, acrocoriō, ægilopa, sisyrrinchion. In hoc mirū, imas eius radices crescere hyeme, verno autem quū apparuerit viola, minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere, ex Plinio. Apud Theophrastum: Sisyrrinchion redigi ad genus bulborum desideratur, quod radice orbiculetur. Peculiare sisyrrinchio datum est, vt vna radix primò augeatur hyeme, tum ineunte vere, quod in imo excreuit, contrahatur, supernumq; crescat quod manditur. Apud Athenæum regii sunt, qui Venerem accersant, cæteris præstantiores, hos sequuntur fului, scillæ naturam æmulantes, deterrimi omnium Ægyptii. Quæ bulbinæ dicuntur, meliorem habent succum, quàm bulbi: non tamen stomacho conferunt, quia dulcedinem cum crassitie habent. Plinius, Bulbinem Græci vocant herbam portaceis foliis, rubicundo bulbo.

Genera.

Theophrastus. Folio valde angusto, caulis nimirum assurgit, germen è semine laterale producit, sed ei peculiare datur, quod non simul ex omnibus se-

Descriptio.

GGG

minibus exit, sed partim anno primo, partim secundo. Tunicas habet plures, simul & lentitiam quandam. Radice pusilla inhæret, ut omnes bulbi, qui radice sunt capitata, contra partem superiorem tenuem, imbecillamq; radicem amplam, carnosamque gerit. Antiquis bulborum facies notior visa est, quam quæ deberet representari: nostris verò temporibus usus obsoleuit, ut vix dignoscatur. Nos ita describemus: Bulbi caput ex pluribus nucleis coagmentatur, qui simul in capillitio coeunt, factis sensim eorum diuortiis, ita ut in latus pateant, vertice fibris crispato, medio torosiore, cortice tenui, foris squamosis membranis tunicata, nullo tamen folliculo omnes partes amplectente, fronde cepitia, terete, inani, angusta, in mucronē desinente, cauliculo dodrantali, in cuius fastigio flos purpureus. Mucosi aliqui, sapore insulsi, ut magis accipiendo condimenta, quam condiendo apti.

Calam.

Nicanor Megareses bulbos laudat, ex Athenæo, eisdem antiquus Caro, & Martialis,

Quæq; viros acuum, armanq; puellas,
Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.

Plinius è Taurica Chersoneso bulbos laudat, post hos in Africa natos, mox Appulos. Vnde Ovidius hos enumerans, ait:

Damnus, aut Libycis bulbis tibi missus ab oris,
Aut veniat Megaris, noxius omnis erit.

Satio.

Theophrastus radice feri dixit. E semine partim primo, partim altero puenit anno. Anatolius à cal. Nouēbris ad Februarias ferendi tēpus indicat. Plinius: Bulbos non nasci nisi ex semine priores tradiderunt. Sed & Prænestinis campis spontē nascitur, ac sine modo etiam in Remorum arvis. Effodiuntur bulbi ante ver, at deteriores illico fiunt, si finduntur. Signum maturitatis folia inarescentia ab imo. Improbant vetustiores, item paruos & longos, contra rubicundis, rotundioribusq; laus, & grandissimis.

Ars.

Ut bulbi in caput crescant, & grandiore corporis callo protuberent, Anatolius testam vasorum radicibus subterni præcipit.

De scilla. CAP. XCII.

SCILLA è genere capitatorum, siue bulborum est: etsi non tamen omnis est, nostro seremus horto, ob multiplices, quas in villa retinet utilitates, & maximas. Tradit enim Theophrastus, scyllam ante portam satam contra veneficiorum noxam amuletum esse. Fructus contentos seruat, præsertim punica mala, pediculo prius exempto. Si ficus iuxta eam seratur, ocyus crescit, minusque à vermibus infestatur: & in summa quicquid scillæ fuerit confitum, facilius germinat, & celerius gliscit. Habet enim lentorē, caloremq; insitum, ob id proficiens, in arborum putationibus, ne plagis intrudatur imber, aut sol; nam facile morbi contrahendi periculū imminet: plagis scillam apponunt, ut eas foueat. Democritus fillum sarmentum, ut citius caulescat, scyllæ 40
insetum.

insetum terræ m
vulpes propter lo
Scylla, & medican
lumen condidit,
propellere dixit,
tius est author, vi
gos fructuum pro

Græcis exima, fi

men inditum put

10 serie composita.

scylla: unde put

Theophrastus

ex eo emergens i

ter, singulis suis

enim florum pro

tertius nouissim

micant. Proflus p

Radix multiplici

genus exhibere v

10 ex illa proueniunt

mero ascisci deb

per extenuata, it

scit, ita ut latus t

bra, & medio cap

litur, quo dubita

quod omnium m

num temporis

descylla: Nob

tunt, mox in ca

30 lium: caulis exi

fationum ostend

dam, tertio nou

Theophrastu

vocata, quæ ab

tiq; quam re

albis,

diu

infertum terræ mandat. Pamphilus, Scyllæ contactu lupus conuellitur, vnde vulpes propter lupos latebris suis scillas apponunt. Plinius, Nobilissima est Scylla, & medicamentis nata, acetoq; exacuendo: vnde de his Pythagoras volumen condidit, atq; scyllam in ianuæ limine suspensam, malorum iniuriam propellere dixit, quod non subtrixit etiam Dioscorides. Scyllæ flos, vt Beritius est author, virgata specie profiliens, modo celeriter non emarcescat, largos fructuum prouentus, ac vberem annonam nobis promittit.

Græcis *σκύλλα*, Hippocrati scella, & schœnum vocari Galenus est author. Nomen inditum putant à squilla pisce testaceo, à tunica squamarum compactili serie composita. Tanta inter eas similitudo intercessit. Latini scylla, Varroni squilla: vnde puto nomen Neapolitanis deriuatum, *Cepolla squilla*.

Theophrastus, Caulis prius per se profilit, vt in croco, & narcisso, tamē flos ex eo emergens insidit, particulatim floret, ab ima sui parte incipiens, floret ter, singulis suis floribus singulas semētēs, quæ ternæ sunt, denuntiat. Primus enim florum prouentus, arandi primum tempus ostentat, secundus medium, tertius nouissimum, quum flos senuerit, folia demum multis post diebus emicant. Prorsus pediculo vidua, ab radice pullulat. Aliud, atq; aliud producit. Radix multiplicibus tunicis contexta, in rectum agitur. Itaque duplex radicis genus exhibere videtur: habet enim capitatam illam, & carnosam, & eas, quæ ex illa proueniunt. Quapropter dubitabit sanè quispiā, an hæc in radicem numero ascisci debeant: siquidem radicis is est habitus, vt parte posteriore semper extenuata, in gracilitatem semper acuminetur. Scillæ radix contorta crescit, ita vt latus tendens inolescatur, item cæteræ lateribus foras iaciunt, illa glabra, & medio capite capillamenta quædam fundit, quibus pars extuberans alitur, quo dubitari posset, fructus ne, an radix sit. Id tamen peculiare sortitur, quod omnium maximè viuax sit, quippe solo eruta, ac pensilis viuere plurimum temporis possit. Immo ad germen excitandum valet. Plinius hæc habet de scylla: Nobilis & scyllæ natura, quod omnes herbæ folium primum emittunt, mox in caulem rotundantur. In ea caulis primum intelligitur, quàm folium: caulis exit, deinde flos ex eo emergit, eademq; ter floret, tria tempora sationum ostendens. Primo flore primam arationem ostendit, medio secundam, tertio nouissimam. Nulli amplitudo maior, nec vis asperior.

Theophrastus: Vescenda est scillæ radix, non tamen omnis sed *ἀγνὴ* videtur. Genera vocatur, quæ ab vsu nuncupationem sortita est. Hæc angustiori folio, leuiorq;, quàm reliqua constat. Plinius, duo genera medica. Masculus foliis albis, fœmina nigris, tertium genus cibus gratum epimenidium vocatum, angustius folio, ac minus aspero, candidissima, vtilissimaq;.

IOAN. BAPTISTAE
PORTÆ NEAPOLITANI
VILLAE
LIBER VNDECIMVS

SIVE

SEGES.

PROOEMIUM.



AM ad reliqua herbacea veniendum nobis est, unde in aruo fecunda segetes, & lata pascua nostris sese offerant oculis: hæc enim duo supersunt fastigia ex iis, in quæ herbariam familiam ab initio diuiseramus, quæq; cognatione, & herbaceæ naturæ consequutione sibi mutuò cohærebant. Nos primum fruges, post pabula prosequemur. Cato sextum locū agro frumentario in prædii exilimatione tribuit. M. Varro tertio loco Cere-
rem, & Liberum veneratur, quod horum fructus maximè necessarij ad victum sint: ab his enim cibis, & potio venit è fundo. Ex frugibus primum de tritico loquemur, quum sit stirpium omnium utilissimum, prastantissimumque, & necessarium, ex quo animantium princeps homo victum trahit. Ob id quum exactius hanc doctrinam tradere constituissimus, ad Laborias nostras, & Apuliam nos contulimus, quarum latifundia, & vastæ aquoreæ planities restibili, nec intermissa fecunditate frugibus semper abundant, ut non solum cupidi agricolæ votis potiantur, sed et opum progrediantur, ut cum principibus ferè contendere audeant. Ibi enim, quæ ab antiquioribus tradita sunt præcepta, cum recentioribus contulimus, ut quicquid boni ex utrisque esset, colligeremus, addisceremus, doceremus. Frumenti prima, & maxima duo genera sunt, auctore Theophrasto, frumentacea, & *χλυσπη*, id est, legumina. Frumentacea vocamus triticum, ordeum, zeam, typham, & cætera, quæ tritici, ordeæve specimen gerunt. Legumina verò fabam, pisum, & cætera. Addit & præterea tertium genus, veluti milium, panicum, sesamum, & ad summum quæ in æstiuis sementibus communi carent appellatione. Ex quo Plinius: Sunt autem duo frugum prima genera, frumenta, ut triticum, ordeum: & legumina, ut faba, cicer: differentia notior, quàm ut indicari debeat.

Frumentii

VIL

Frumentii ipsius
Vergiliarum occa-
deum. *Æstiva*, quæ
cum, *sesama*, horum
omnia Vergiliaru-
lia. Ex his quædam
tem, cicer, *alicam*,
pum, rapam. Nos
nea, postremo æst-

10

Quæ

SEGES, auctore
Smella de legum-
prædictorum legum-
seminum, ex quibus
Poetæ telorum, &
Hinc Segesta dici-
his placet, Segestia
dea frugum dicitur
tho alma dicitur
bit, dicta Ceres,
id est terræ.
Theophrastum
lege vivebant, po-
ptum est de agros
fuisse primam vo-

10

Legis

Hæc quando
rum primo,

10

Lum

Liber

Varro suæ agri-
inuenticem: et
dones. Quod et

(Chao

Et in Cereis
inventionem glan-

Et Cæ

Falce

40

Frumenti ipsius totidem genera, per tempora satū diuisa. Hyberna, quæ circa Vergiliarum occasum sata terra per hyemem nutriuntur, vt triticum, far, ordeum. Æstiuæ, quæ æstate ante Vergiliarum exortum seruntur, vt miliū, panicum, sesama, horminum, irio, Italiæ duntaxat ritu. Alioquin Græcia, & Asia omnia Vergiliarum occasu seruntur. Quædam autem utroque tempore in Italia. Ex his quædam & tertio, veris scilicet. Aliqui verna, milium, panicum, lentem, cicero, alicam appellant. Sementina autem triticum, ordeum, fabam, napum, rapam. Nos dictam diuisionem sequemur. Primò triticea, post leguminea, postremò æstiuæ pertractabimus.

Quid seges, & de Segetia dea, & Cerere. CAP. I.

SE G E S, authore Varrone, pro ipsa terra accipitur iam arata, & sata. Columella de leguminibus loquens, etiam segetem vsurpauit, inquit, Quod prædictorū leguminum segetibus factiscit, Valla fruges vocat propriè eorum seminum, ex quibus conficitur panis, nondum demessas. Per translationem Poetæ telorum, & stimulorum segetem dicunt. Cicero gloriæ segetem dixit. Hinc Segetia dicitur dea Plinio à legetibus, quibus præesse putabatur, & vt aliis placet, Segetia, Seiaq; à serendo, quarum simulachra in circo erant. Ceres dea frugum dicitur, à creando, Saturni & Opis filia, quæ peculiari epitheto alma dicitur, quia nos alit, vel, vt Cicero libro de natura Deorum scribit, dicta Ceres, tanquam gerēs, à gerendis frugibus. A Græcis δημήτηρ, quasi μημήτηρ, id est terræ mater, quod fructuum creatrix, & alitrix sit. Hanc etiam Theophrastum vocant, id est legum laticem, quia antiquitus homines nulla lege vivebant, postea quum ipsa Agriculturæ vsum & frugum docuisset, ceptum est de agrorum finibus disceptari: ob id eam legum, & iuris originem fuisse primam volunt. Virgilius,

Legifera Cereri, Phœboq; patriq; Lyao.

Hæc quandoque pro Luna dicitur, vt Liber pro Sole. Virgilius Georgicorum primo,

— vos ô clarissima mundi

Lumina, labentem cælo qua ducitis annum,

Liber, & alma Ceres.

Varro suæ agriculturæ libri initio statim Cererem inuocat, quasi frugum inuentricem: erant enim homines primò βαλανοφάγοι, id est glandium comedones. Quod etiam ex Virgilio elicitur,

— alma Ceres, vestro si munere tellus

(Chaonicam pingui glandem mutauit arista.

Et in Cereris sacris querna corona melloribus tribuebatur, quod frugum inuentione glandium victum aboleuerit. Virgilius,

Et Cererem clamore vocant in tecta, neque ante

Falcem maturis quisquam supponit aristis.

*Quam Cereri tortare dimitus tempora quercu,
Dei motus in compositos, & carmina dicat.*

Theodosius verò Cererem ait Siculi Siciliae Regis uxorem fuisse, & primam, quæ usum tritici demonstrasset populis: vnde ansam Poetæ fabulandi sumpserunt. Hesiodus,

*Plutonem in primis venerare, atq; annua sacra
Vota refer Cereri, quum stiva innixus agendo
Incipis exercere bonus stimuloq; fatigas.*

De cælo frumentis apto. CAP. II.

MAxima Naturæ benignitate factum est, ut triticeum genus, ex quo in toto ferè terrarum orbe homo victum trahit, eiq; immensæ utilitatis est, ubiq; quouis cælo, & solo luxuriet, eoq; nihil sit fœcundius, utpote, quum è modio, si sit aptum solum, quale in Byzantio Africa campo, centeni, quinquageni modii reddantur. Misit ex eo loco, inquit Plinius, Diuo Augusto procurator eius ex vno grano (vix credibile dictu) quadringenta paucis minus germina, extantque de eare epistolæ. Misit & Neroni similiter cccxxx stipulas ex vno grano. Cum centesimo quidem & Leontini Siciliae campi fundunt, aliq; & tota Bætica, & in primis Ægyptus. Plurima, & ferè infinita sunt eius genera, ut quibusvis locis feri possit. Plurimis tunicis Thracium vestitur, ob nimia frigora illi plagæ exquisitum. Eadem de causa & trimestria inuenit, detinentibus terras niuib; quod tertio ferè à satumense, & in reliquo orbe metitur: totis hoc Alpibus notum, & hyemalibus prouinciis, nullum hoc frumento latius. Est & bimestre circa Thracium finum quod quadagesimo die, quum satum est, maturefcit: mirumque nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia, & Achaia, montosis utraq; partibus. Eubœa quoque circa Carystum. Tradunt in Bactris grana tantæ magnitudinis fieri, ut singula spicas nostras æquent. Sed cæli qualitates ad agrum à summo agricolarum præceptore Theophrasto petamus. Libro enim de causis quærit, quæ fiat, ut & frigida loca, & calida sint fertilissima: ut in septentrione Thracia, & Pontus, in Austro Africa, & Ægyptus. Etenim supra cetera frigus, æstusque aliquid conferunt, & aer circumfusus. Omnino ager bonæ frugis, frigora quoque multa desiderat, serenitates enim & austrini flatus vitia afferunt sæpè, æruginosasque segetes efficiunt: frigus verò constipatis, canceratisque radicibus magnitudinem modicam verno tempore facit, terramque si occupauerit, cultam, ratiorem, & solutiorem reddit. Si aliquod genus tunicis multis contegitur, ceu Thracium, solo hyberno conuenientius dabitur: frigus enim nil officere potest, rarum, solutumque, ceu canchrydias vocitatum, agro pluuiis ferendum profectò est, quippe quum alimentum copiam id quoque desiderat, quamobrem & culmo crasso exurgit.

Et

Et in historiis. Differte intra paucior sexto à satumense. Quin & Sicilia apud summationem sex, sed tamen cum mirabilis quod inginta dies merere dorum insula fieri narrant, ut ordeum que serere, atque in totum loca maiora intelliguntur detruncasse, & in Lilybeo cecidisse, eis dixerunt dicatur. Sed à falcis forma, legisse. Columella parente, & ad forum robustius alipulæ campi, ubi situm memorat Thracitates, si ad flatum graciles, & vitiatas habeant.

ET si varia tunc & quamplurime in qua segete Virgilio,

Ventis
Cura
Et qui
Hic se
Sed Theophrastus
In exurgant, quocumque
utile esse debet
frugum omnium
diga, sunt avida
seu iuniorum sunt, et

Et in historiis. Differt terra à terra, & cœlum à cœlo: quædam enim loca proferre intra pauciores dies videntur, vt conspicuè in Ægypto: illic enim ordeum sexto à satum mense, triticum septimo metitur, quod apud plurimos octauo. Quin & Sicilia apud Milas vocatas, agri Mesani celerem quandam fieri con summationem serorum affirmant, esse nanque sementem eorum menses sex, sed tamen cum primis vnà metere posse, qui mense nouissimo seuerit. Sed mirabilius quod in Melio fieri aiunt, sata enim intra triginta, aut quadraginta dies metere incipiunt. Sed omnibus mirabilius, quod in Chalcia Rhodiorum insula fieri solet: illic enim locum præcoquem fertilemque adeò
 0 narrant, vt ordeum satum in eo, quum cæteris sereretur locis, metere, iterumque serere, atque cum reliquis vnà frugibus rursus metere possint. Atque in totum loca maritima tam ad hæc ipsa, quàm ad reliquos fructus festinatiora intelliguntur. Ob id fingunt poetæ Saturnum genitori Cœlo genitalia detruncasse, & in mare proiecisse, falcemque non procul à promontorio Lilybeo cecidisse, vnde loco Drepanum inditum nomen, quum falx Græcis *σπείραρος* dicatur. Quo inuolucro Poëtæ illius loci vbertatem designant. Sed à falcis forma, cui lictus assimilatur, nomen Drepani inditum memini me legisse. Columella verò dicit: Omne autem frumentum maximè campo patente, & ad solem propto, apricoque læratur. Collis enim quamuis granum robustius aliquanto, minus tamen triticum reddit. Ideo fertilissimi Apulix campi, vbi immensa planities patenti Soli obiecta. Terrarum enim situm memorat Theophrastus plus afferre momenti, quàm ipsius arui qualitates, si ad flatum, solemque optimum vergant. Enimvero plerique agri graciles, & vitiati feraces sunt, quod commodam ad hæc ipsa positionem habeant.

De solo frumentis apto. CAP. III.

ET si varia tritici genera varias exposcant soli qualitates, vnum tamen & quamplurimis commune. Vnde multum refert inspicere in ea regione in qua segetem instituere voles, an solum habile sit frumentis: docente

0 Virgilio,

Ventos, & varium cœli perdiscere morem

Cura sit: ac patrios cultusq; habitusq; locorum:

Et quid quaq; ferat regio, & quid quaq; recuset.

Hic segetes, illic veniunt felicius vna.

Sed Theophrastus pingue solum segetibus tribuit, quod alimentum illud exugant, quod summa tellure supeditatur, neque id exiguum, neque ex-utile esse debet. Sed cur frumentum pingui terra non lædatur, ait, quia frugum omnium stipula exucta, strigosa natura est, & quæ humoris indiga, sunt auida pinguioris alimenti, hominum exemplo, qui macilentiores
 10 ieiunique sunt, expingui cibo summum attrahunt alimentum, & in colore

& viribus maximos progressus faciunt. Sicca corpora pingui indiga sunt cibo, quia defectus emendatur supplemento, sicciori non iuuatur, quia humor non addit, quo persui valent, immò in periculum adducit agrotandi, & præcipuè qui ventriculo tentari solent. Solum igitur rarum & tenue, si altum siccumq; sit, frumento incommodum est; laxum enim transmittit hybernos imbres in profundum, quo ex loco sibi haurire nequeunt fruges, ob radicum superficialium situm. Humectum frumentis habile, quia humorem ad alendum fruges habet: siccum verò minimè bonum, quia pabulo careat, quod sufficiat. Caro agrum crassum, & lerum & sine arboribus frumētis tribuit, Virgilius nigrum, putre, & densum probat,

*Nigra ferè, & presso pinguis sub vomere terra,
Et cui putre solum (nanque hoc imitatur arando)
Optima frumentis.*

*Nunc quo quamq; modo possis cognoscere dicam.
Rara sit, an supra morem si densa requiras,
Altera frumentis quoniam fauet, altera Baccho,
Densa magis Cereri, rarissima quaq; Lyao:
Antè locum capies oculis, atq; inebis
In solido puteum demitti, omnemq; repones
Rursus humum, & pedibus summas aquabis arenas.
Si deerunt, rarum pecori, & vitibus almis
Aptius vber erit, sin in sua posse negabunt
Ire loca, & scrobibus superabit terra repletis,
Spissus ager.*

*Salsa autem tellus, & qua perhibetur amara,
Frugibus infelix: ea nec mansuescit arando,
Tale dabit specimen. Tu spisso vimine qualos
Colla q; prælorum fumosis deripe rectis.
Huc ager ille malus, dulcesq; a fontibus vnde
Ad plenum calcentur, aqua eluctabitur omnis,
Scilicet & grandes ibunt per vimina gutta.
At sapor indicium faciet manifestus, & ora
Tristia tentantum sensu torquetur amaror.
Pinguis item qua sit tellus, hoc deniq; pacto
Discimus: hand unquam manibus iactata sathiscit,
Sed picis in morem ad digitos lente scit habendo.*

Columella quæ à Virgilio excepta habet: Frumentarius ager pinguis, & dulcis sit oportet, vtrumque hoc expedita ratione contingit discere. Per exigua conspergitur aqua gleba, manuq; subigitur. ac si glutinosa est, leuissimo quouis tactu pressa in ba rescit picis in morem, eademque illisa humo non dissipatur, ea res admonet nos tali materia naturalem succum, & pinguedinem. Sed si ve-

si velis scrobibus
pinguem, quum d
que dignoscemus
in fictili vase ma
lata gustu explor
dicemus. Signific
folium, ebulum,
non nisi dulcibus
ma specie summi
ne sit frumentis b
ser: Ebulum, vel p
pratensis, quercu
ra nigra, & cinere
nisi id prætenue e
Tarentinus. In p
lucosam, & humic
li frumentariam
dius nascitur, qu
mine. Campanie
numerosis const
hincinde distind
in siliquis. Hoc fi
vigidi decore, qu

De seg

N V n c de sen
seratur, alia
scindatur in rect
trario: postea ag
da, sicca, vel saxo
phrastus soli agit
post satum mon
tis coloni deside
state vertendam
est, quod tali cu
tio siccat, & arter
lium vtroque ter
calore arationi,
peruia redditur,
mentum. Nives
enim, & rarefaci

si velis scrobibus egestam humum recondere, & abundauerit, certum erit esse pinguem, quum defuerit, exilem, quum æquauerit, mediocrē. Saporem sic quoque dignoscemus: si ex ea parte agri, quæ maximè displicebit, effossa glebæ, & in fictili vase madefactæ, dulciaqua permisceantur, ac more faculentivini colatæ gustu explorentur: nam qualem retulerit humor saporem, talem eius soli dicemus. Significant frumentis habilem terram iuncus, calamus, gramen, trifolium, ebulum, rubi, pruni sylvestres, & alia complura, quæ aquilegis nota, non nisi dulcibus terræ venis educantur. Nec contentos nos esse oportet prima specie summi soli, sed exploranda est inferioris terræ qualitas, terrena nec ne sit: frumentis bona erit bipedanea humus. Plinius, quæ Cato habet, recenset: Ebulum, vel prunus sylvestris, vel rubus, bulbus minutus, trifolium, herba pratensis, quercus sylvestris, pyrus, malusque frumentarii soli notæ. Item terra nigra, & cinerei coloris. Omnis terra, inquit, nisi permacra. Sabulum etiam, nisi id prætenue est, & multo campestribus, quàm cliuosis respondet eadem. Tarentinus, In profunda terra seminare melius est frumentum. Leontius in lutosam, & humidam terram seminandum, quia in tali magis augefcit. Appuli frumentariam terram eligunt, vbi coronopus, ferula, vel sylvestris carduus nascitur, quem *sclearcam* vocant, vulgò nimirum à scolymo detorto nomine. Campani ex ebulo, & herba, quam *ursinam* vocant, ruta capraria: Hæc numerosis constat radicibus, foliis oblongis, quæ foliolis oliuæ similibus, hinc inde distinctis constant, vt in bibinella, caule alto, flore caruleo, semine in siliquis. Hoc signum præferunt, quum à Maio mense herbæ solum amicitur virgidi decore, quum in cæteris à Martio, & Aprili.

De segetum cultura, & primò de aratione. CAP. IIII.

N VNC de semente agitur, & de agri subactione, quæ alia est, prius, quàm seratur, alia quum seritur. Ante sationem curadum, vt terra optimè proscindatur in rectum, & per transversum, & quæ porca fuit, sit sulcus, & è contrario: postea agendū, quo tempore, hyeme, æstate, vel vere, pinguis, macra, vda, sicca, vel saxosa terra aretur, quæ omnia sigillatim nos perpèdemus. Theophrastus soli agitationem præcipit, tempus sementis indicat, & sarritionem post satum monet, in quorum tractatione non desunt, quæ iudicium prudentis coloni desiderant. Humidam terram, grauem, pinguem, & solidam æstate vertendam dicit, siccam, resolutam, leuem, tenuem hyeme. Causa est, quòd tali cultu vtrique tribuitur quod opus habet. Æstiuæ enim aratio siccatur, & attenuatur, hyberna crassitudinem addit, & humectat. Cura noualium vtroque tempore suscipitur, incumbendum autem est sub frigore, & sub calore arationi, vt terra solem, & frigora sentiat; terra enim mota, & subacta, peruia redditur, & libera ab obsidione plantarum, à quibus absumitur alimentum. Niues hybernis noualibus commendantur, pruina obest, exedit enim, & rarefacit. Post primas arationes secunda erit aratio verna, vt cespitem

HHH

inuertat ad herbas extirpandas. Tertio etiam astate arant, quarto quum sere-
re volunt leniter proscindendo, utpote quum solum bene præagitatum, præ-
paratumque est: quapropter ad hoc opus præstant aratro ligones, & ligoni pa-
stinum, maius ferramentum, quod altius descendit, & terram inuertit. Hæc a-
gricoltura est. Vnde si qui de hac diligentia per ignauiam omiserint, id quod
semel non benè fecerunt, coguntur sepè facere, propterea quod herbarum ra-
dices non sunt per initia reuulsæ: sic anticipat herba segetes, cum quia validior,
tum quia præerat. Sed si vicissim anteuerit herbis seges, herba necantur: nam
quæ suboriuntur herba, imbecilliores sunt. Catonis sententia hæc est. Vbilo-
cus aquosissimus, frigidissimusque erit, ibi primum serito, in calidissimis pos-
tremo. Terram caue cariosam tractes. Ager rubricosus, & terra pulla, atterina ru-
deta, & arenosa. Quid est agrum benè colere? bene arare. Quid secundum? ara-
re. Quid tertium? stercoreare. Agrum frumentarium quum ares, bene & tem-
pestiuè ares. Sulco vario ne ares. Varro arationes docendo, earum vocabula
declarat. Terram quum primum arant, proscindere appellant, quum iterum,
offringere dicunt, quod prima aratione glebae grandes solent excitari, quum
iteratur offringere vocant, tertio quum arant, iacto semine, boues lirare dicun-
tur, id est cum tabellis additis ad vomerem simul, & satum frumentum ope-
riunt in porcis, & sulcant fossas, quod pluuia aqua dilabatur, nonnulli postea, qui
segetes non tam latas habent, (ut in Apulia) id genus prædii per sarritores oc-
care solent, si quæ in porcis grandiores glebae relictæ sunt. Qua aratrum vo-
mere lacunam stiriam fecit, fuleus vocatur. Quod est inter duos sulcos elata
terra, dicitur porca, quod ea seges frumentum porrigit. Hesiodus Græcus ara-
tionis tempus ita præfiniuit,

— sed sidus quum deficit Orionis,
Pleiadesque, Hyadesque cadunt, meminisse iuuabit.
Protinus impresso subuertere vomere terram.
Contemplare etiam quum grus e nubibus altis
Assiduus agitat clangores, inuocat imbrem,
Venturamque hyemem, tempusque inducit arandi.
Præterea, quum tempus ades, rescindere campum.
Fortius instantes operi exercere ministros,
Nam vertenda duplex sibi sicca, atque humida tellus.
Vere nouo veniunt celebres ad atram iuuenti.

A quo Virgilius:

Vere nouo gelidus canis quum montibus humor
Liquitur, & Zephyro puris se gleba resoluit,
Depresso incipiat iam tum mihi taurus aratro
Ingemere, & sulco attritus splendescere vomer.
Illa seges demum votis respondet auari
Agricola, his quæ solem, his frigora sensit.

Ping
Fortis
Pulch
At si
Arcti
Illic
Hic
Alien
Et seg

Sed inter agri-
ba perstringente
ginosi, post idus
ediderint, nec se-
scatur in vtraque
cantur. Sed & cor-
desideret occasio
male subactum a-
exploret agricolæ
netrauerit, solū e-
(non facient. Ho-
tis circa solstitiū,
oportebit, ac deit
uo solstitio cōuen-
bus terra perma-
lio veruata subig-
no desinit posse
semimadidus, id
barum madesce-
ritate afficitur
gine. Itaque, si cecit
madesacta terra
tuor operis expe-
tur dodrante, in
cas, quum sic ara-
frumentis præb-
que regionis su-
in solstitium ite-
ridem operis, q-
do maxime ob-
tamen quociens

— ergo age terra
Pingue solum primis ex templo à mensibus anni
Fortes inuergant tauri glebasq; iacentes
Puluerulenta coquat maturis solibus aestas.
At si non fuerit tellus fecunda; sub ipsum
Arcturum, tenui sat erit suspendere sulco.
Illic officiant latis ne frugibus herbae,
Hic sterilem exiguus ne deserat humor arenam.
Alternis idem tonsas cessare nonales,
Et segnem patiēte situ durescere campum.

Sed inter agricolas nemo exactius, quā ipse Columella docet: nos eius verba perstringentes, quā breuiter poterimus repetemus. Pingues cāpi, & vliginosi, post idus Aprilis proscindendi sunt, anni tēpore incalēscēte, quū herbas ediderint, nec semina maturuerint, sed tā frequētibus sulcis arādi, vt vix digno scatur in vtrā partem vomer actus sit, quoniā sic radices herbarū perruptæ necantur. Sed & compluribus iterationibus sic resoluetur veruactum, vt nullam desideret occationem, quum seminauerimus: nam veteres Romani dixerunt, malē subactum agrum, qui satis frugibus occandus sit; eum an rectē aretur ita exploret agricola. Pertica trāsuerfis sulcis inseritur, quæ si sine offensione penetrauerit, solū esse motum manifestabit, & hoc quū bubulci viderint, scamna non facient. Hoc igitur tempore quum campi arati fuerint, diebus interpositis circa solstitiū, quod est nouo, vel octauo kalendarum Iuliarū, iteratos esse oportebit, ac deinde circa Septembris kalendas tertiātos, quū id tēpus ab æstiuo solstitio cōuenit inter peritos rei rusticæ nō esse arandū, nisi magnis imbris terra permaduērit. Quod quū accidit, nihil prohibet, quō minus mēse Iulio veruacta subigantur. Sed obseruandū ne lutosus ager aretur, quia toto anno desinit posse tractari, nec est habilis sementi, occationi, aut sarritioni, néve semina didus, id est quū post longas siccitates leuis pluuia superiorē partē glebarum madefecerit, quā terram cariosam appellant, quia cōtinuo triennio sterilitate afficitur. Igitur in arandis agris, neq; succo careant, neq; abundant vligine. Itaq; siccitatibus, quod iam proscissum est, iterare pluuiamq; operiri, quæ madefacta terra, facilem nobis culturam præbeat. Sed iugerum talis agri quatuor operis expeditur: nam cōmodē proscinditur duabus, vna iteratur, tertiatur dodrante, in lirā statim redigitur quadrāte operæ. Liras rustici vocant porcas, quum sic aratum est, vt inter duos sulcos medius cumulus siccā sedem frumentis præbeat. Colles pinguis sōli mēse Martio, si tepor cœli, siccitasque regionis suadebit, Februario proscindendi sunt. De Aprili medio vsque in solstitium iterandi, tertiandi que, Septembri verò circa æquinoctium, ac totidem operis, quot vliginosi campi excolitur iugerum talis agri. Sed in arando maximē obseruandum semper, vt transuersus mons sulcetur. Paulum tamen quotiescunque iterabitur modo in elatiora, modo in depressiora cliui

obliquum agi sulcum oportebit, ut in utramque partem rescindamus, nec eodem vestigio terram moliamur. Exilis ager, planus, vliginosus primum aretur vltima in parte mensis Augusti, subinde Septembri, sic iteratus, paratusque sementi circa æquinoctium, operæ tres in iugero sufficiunt. Graciles cliui non sunt in æstate arandi, sed circa Calendas Septembres, quoniam ante hoc tempus æstiuo sole peruruntur. Itaque optimè inter Calendas, & idus Septembris aratur, ac subinde iteratur, ut primis æquinoctialibus pluuiis consèri possit, nec in lira, sed sub sulco talis ager seminandus est. Hesiodus negat sub æstu arandam esse terram,

Et sterilis tellus medio versata sub æstu.

Plinius Catonis placita refert, aliqua addit. Tepidioribus locis à bruma proscindi arua oportet, frigidioribus ab æquinoctio verno, & maturius sicca regione, quàm humida. Maturius densa terra, quàm soluta, pingui, quàm macra. Vbi sicca, & graues æstates, terra cretosa, aut gracilis: vtilius inter solstitium, & autumnii æquinoctium aratur. Vbi leues æstus, frequentes imbres, pingue herbosumque solum, ibi melius caloribus. Altum & graue solum etiam hyeme moueri placet, tenue valdè & aridum paulò ante sationis tempus. Sunt & hic suæ leges. Lutosam terram ne tangito. Vi omni arato: prius quàm ares proscindito. Hoc vtilitatem habet, quod inuerso cespere herbarum radices necantur. Quidam ab æquinoctio verno proscindi volūt. Quod vere semel aratum est, à temporis argumento veruactum vocatur. Hoc in nouali, atque requieto necessarium est. Nouale est quod alternis annis feritur. Iustum est proscindi sulco dodrantali iugerum vno die, iterari sesqui iugerum, si sit facilitas soli; si minus, proscindi semissem, iterari assem. Palladius ea habet, quæ ab his exceptit.

Arationis inuentor, & instrumenta. CAP. V.

DIODORVS ait Dionysium secundum ex Ioue & Proserpina genitum, vel, ut alii dicunt, ex Cerere, boues ad aratrum primum iunxisse, quum terra prius hominum manibus coleretur. Baccho cornua ascribi, quoniam iudicarunt, quod prius coniungendorum bouum author fuerit. Plinius ait: Aratrum Biges Atheniensis inuenit, ut alii tradunt Triptolemus, de quo etiam Virgilius intellexit,

— vnciq; puer monstrator aratri.

Seruius & Tibullus Osyrim inuentorem fuisse dicunt: nam Triptolemus frumenta diuisit, & ob id Virgilium nomen tacuisse, quia non vnus in orbe monstrator aratri fuerit, sed diuersi in diuersis locis. Trogus dixit Habidem Hispaniæ Regem barbarum populum docuisse primo boues aratro domare, frumenta quæ sulco ferere. Cæterum omnia rustica ferramenta, quibus terra vertitur simul cum aratro Cererem comperisse, Virgilius dixit hoc

versu,

Prima

Prima

Instru

Various Heru
quo familia Buzy
vel quod iuga con
Brapia. & d. n. v. v.
ues. Colitur aut
quia humana exc
lebit ac Lactanti

10 Ceres, frument
gyptios, vti ex lo
docet Hesiodus:

Temo

Stina

Virgilius ex eo

Contin

In bur

Huic

Bine

(adit

Stina

Et su

Flagellum est
do, vel hastile cus

ALIQV
cenfebim

capitibus ingre
tur iugum (vt q

30 antur, & leui vo

tuntur, & qui al

segetum increm

resolui desiderat

maneant, frugib

ratio Agypto, &

pinguibus areni

gredi oportet, al

sulcare, necubi c

tinere, ne in radi

40 tem offendar, au

*Prima Ceres ferro mortales vertere terram
Instituit.*

Varinus Herculem Buzygem dixit, quod bubus iunctis terram arauerit, à quo familia Buzygia. Iugarius deus colebatur, quod coniuges coniungeret, vel quod iuga committebat. Augustinus tradit libro de ciuitate Dei. Minerua Boapua, ὅθεν τὸ συναρῶσαι, καὶ ζεύξαι, quod coniunxerit in iugum & aratrum boues. Colitur autem hoc nomine apud Boetos. Pallas βύδεια cognominatur, quia humana excogitatum prudentia est bouum opera terram colere. Sed Eusebii ac Laëtantii testimonio constat, ante multas tempestates, quàm esset Ceres, frumenti vsum apud mortales fuisse, præsertim apud Hebræos, & Ægyptios, vti ex Iosepho colligere licet. Aratrum quibus lignis confici debeat, docet Hesiodus:

*Temonem ex ulmo, viridi seu confice lauro,
Stina sit expino, dura dentalia quercu.*

Virgilius ex eo:

*Continuo in syluis magna vi flexa domatur
In burim, & curui formam accipit ulmus aratri.
Huic à stirpe pedes temo protensus in octo,
Bina aures, duplici aptantur dentalia dorso.
Ceditur & tilia ante, ingo lenis, altaq; fagus,
Stinaq; qua currus à tergo torqueat imos,
Et suspensa focis exploret robor a fumus.*

Flagellum est stimulus, quo punguntur boues: est autem prælonga arundo, vel hastile cuspidè quapiam acuminatum, quo & hodie vtimur.

Arationis regula & utilitates. CAP. VI.

ALIVÆ supersunt arationis regulæ, & utilitates, quas à Columella recensēbimus. In opere boues arctè iunctos habere conuenit, quo elatis capitibus ingrediantur, ac minus colla labefactentur. Nam si cornibus illigetur iugum (vt quibusdam provinciis vsurpat) resupinis capitibus excruciantur, & leui vomere terram sauciant: at hoc modo tota corporis mole nituntur, & qui altè terram proscindunt, plurimum virentibus conferunt, & segetum incremento. In Italia vbi arbutis, atq; oleis confitus est ager, altius resolui desiderat, vt summæ radices vitium, olearumq; rescindantur, quæ si maneant, frugibus obsunt. Celsus exiguis vomeribus terram subigit, sed sua ratio Ægypto, & Numidiæ conuenit, vbi arboribus viduum solum, & terram pinguibus arenis putrem dente moueri satis est. Bubulcum per proscissum ingredi oportet, alternisq; versibus obliquum tenere aratrum, & alternis recto sulcare; necubi crudum solum relinquat. Boues quum ad arbores venerint retinere, ne in radicem vomis impactus colla commoueat, nève cornu ad stipitem offendant, aut extremo iugo truncum delibret. Voce potius quàm verbe-

HHH 3

ribus terreat, vltimaque sint opus recusantibus remedia plagæ. Nunquam stimulo lacessat iumentum, quod calcitrosus cum reddit, sed admoneat flagello. Nec in media parte versuræ consistat, detq; requiem in summa, vt spe cessandi totum spatium, bos agilius enitatur. Sulcum non ducat longiorem, quàm pedum centum viginti: vbi hunc modum excesserit, plus æquo fatigatur. Quum ventum erit ad versuram, boues inhibeat: & in priorem partem iugum propellat, vt eorum colla refrigescant, ne ex eo tumor, & vlcera inuadant. Dolabra & vomere bubulcus vratur, vt summas radices, & perfractas stirpes refodiat, & persequatur. Quum boues ab opere disiunxerit, substrictos confricet, colla subigat, merumque faucibus infundat, si aestuauerint: antequam sudare, & anhelare desierint, ad præsepia ne religentur, & quum tempestiue potuerint vesci, paulatim cibum præbere conuenit: quem quum assumpserint, ad aquam ducantur, tum reducti largiori pabulo satientur. Plinius præterea quæ Columella, hæc habet. Si inter arbores, vitesq; aretur, fiscellis capistrari, ne germinum tenera præcerpant. Purget vomerem subinde stimulus cuspidatus rulla.

De occatione. CAP. VII.

ARATIONEM occatio sequitur. Est enim occare glebas confringere. Varro ad hanc significationem accepit, inquit: Arare, & postea occare, id est comminuere, ne sit gleba: quod ita occidunt, occare dicunt. Festus occare dictum putat ab occidendo, quod cadant grandes globos terræ. Plinius, Aratione per transversum iterata occatio sequitur, vbi res poscit, crata, vel rastro, & sato semine iteratio. Columella: frigidioribus regionibus Septembri puluationem faciunt, quam vocant rustici occationem, quum omnis gleba in vineis refringitur, & resoluitur in puluerem. Est & occare semen operire. Cicero de senectute: Quæ quum gremio mollito, ac subacto sparsum semen excipit, primum id occatum cohibet, ex quo occatio, quæ hoc efficit, nominata est. Palladius: Arbores, quæ ablaqueatæ fuerunt, occare, id est operire iam conuenit. In hoc significato etiam Columella: Nam quod sicco solo ingestum & inoccatum est, perinde ac si repositum in horreo non corrumpitur. Sunt qui dicant occatio, quasi occæratio quædam.

De arui stercoreatione. CAP. VIII.

SED si terra exilis fuerit, stercoreandam esse post arationem præcipiunt veteres agricolæ. Theophrastus secundo loco ante sationem stercoreandam esse terram dicit, sed macram largius, pinguem parcius, tum propter soli virtutem, tum quia finis plus affert succi, quàm quantum percoqui possit: superfluous enim succus additus, abit in cruditatem. Addit & præceptum simile stercoreationi, intermiscendo terrenum diuersi habitus, sicut graui leuem, macro pinguem, sic albo rubrum, & si qua contrarietas alia sit, quippe non so-

lam

lūm mutuis bene-
vim addi quanda
& ferre vegeta f
tilicarem, est eni
miscere eas quinc
ta ima, quæ succo
cum. Intimus en
dum idonea. Cat
secundum? Arare
num agro sparge
terram iteremus,
potarius, in colle
nentur, atque in
minus. Sed id de
lugerum, quod sp
rarius, duodevig
solis balit vites a
quum in hoc agro
rum dissipari, quæ
est, antequam lan
getem spargere,
to refrigerare ag
conducit frequen
copiam, siccus mi
regelatur, alter qu
è sabulosus locis cr
tuatur agricola, a
idus Septembris
vim stercoreation
secundum floren
leuiter putrescit, p
tius sustinet, vt
tempestiue repol
& adhuc vites so
his prætermissa:
post imbrem. V
lustum est vehes
scar, aut iactato f
rat, ante puluerem
singulas vehes su
nas, nisi continga

lūm mutuis beneficiis vtrinque; afferri quantum deest supplementi, sed etiam vim addi quandam, veluti si effœta terra fertilis permisceatur, recentabitur, & ferrē vegeta facta incipiet. Argilla sterilis est, si aliis admisceatur, iuuat fertilitatem, est enim alteri altera fini vice. Megarensium consuetudo est permiscere eas quinquennio, aut sexennio, eandem è profundo petunt, vt terra ima, quæ succum retinet, in summo sit, pro ea quæ amittit in fruge succum. Intimus enim locus, quasi gremium est, in quod aqua refedit ad alendum idonea. Cato: Quid est agrum benè colere? Plimum bene arare. Quid secundum? Arare. Quid tertium? Stercorare. Præcipitque columbinum finum agro spargendum. Columella autem satis diffusè: Prius quàm exilem terram iteremus, stercoreare conueniet: nam eo, quasi pabulo, gliscit. In campo rarius, in colle spissius. Acerui stercoris instar quinque modiorum disponentur, atque in plano pedes interualli quoquoersus octo, in cliuo duobus minus. Sed id decrecente Luna fieri placet, nam ea res herbis liberat segetes. Iugerum, quod spissius stercoreatur, desiderat vehes quatuor, & viginti, quod rarius, duodeviginti. Disiectum deinde finum inarari, & obrui conuenit, ne solis halitus vires amittat, vt permista humus hoc alimento pinguescat. Itaque quum in hoc agro disponentur acerui stercoris, non debet maior modus eorum dissipari, quàm quem bubulci eodem die possint obruere. Secunda ratio est, antequam sarrias, more seminantis, ex auxiliis puluerem stercoris per segetem spargere, si is non erit, caprinum, atque terram sarculis permiscere. Scito refrigerescere agrum, qui non stercoretur, ita peruri, si nimium: magisque conducit frequenter, quàm immodicè facere. Aquosus ager maiorem eius copiam, siccus minorem desiderat: alter, quod humore rigens, hoc adhibito regelatur, alter quod hoc largiore assumpto torretur. Si stercus non supererit, è sabulosis locis cretam ingerat, cretosis sabulonem, & si his omnibus destituatur agricola, ad lupini præsidium confugiendum, quod cum exili loco circa idus Septembris sparferit, & inarauerit, idque tempestiuè vomere succiderit, vim stercoreationis exhibebit. Sed sabulosis locis lupinū succidi oportet, quum secundum florem: rubricos, quum tertium egerit: illic dum tenerum est, celeriter putrescit, permisceturque solo: hic iam robustius solidiores glebas diutius sustinet, vt ex solibus vaporata resoluatur. Præterea stercus, quod tempestiuè repositum anno requieuerit, segetibus maximè est vtile: nam & adhuc vires solidas habet, & herbas non creat. Plinius aliqua habet ab his prætermissa: Autumno aliquid saturus, Septembri mense finum inarare post imbrem. Vtique si verno erit saturus, per hyemem finum disponat. Iustum est vehes xvi iugero tribui, dispergere autem priusquam are-scat, aut iactato semine. Si hæc omissa sit stercoreatio, sequens est priusquàm se-rat, ante puluerem. Quod vt hanc quoque curam determinemus, iustum est singulas vehes finii, denario ire, in singulas pecudes minores, in maiores de-nas, nisi contingat hoc, male subtrauisse pecori colonum appareat. Sunt qui

optimè stercorari putent, sub dio retibus inclusa pecorum mansione. Sed minori & labore, & impensa nos optimè agrum stercorare solemus. Sed oportet in eo prius pratum sit satum, & densè suis radicibus solum irretitum, vt summa terræ cutis aptis ligonibus, vel pastinis decorticetur, idq; Aprili, vel Maio faciendum, si tempus serenum fuerit. Sit terræ cortex euulsus longitudine quinque pedum, latitudine quatuor, altitudo verò binum digitorum. Primum à solo ex vna parte decorticetur, post à contraria leuibus, & crebris ictibus, vt maxima diligentia integra ex humo diuellatur. Pars quæ solo hæserebit obliqua, obuertatur soli meridiano, vt optimè resiccetur quinque dierum spatio. Erit pastini commoda longitudo duorum pedum, latitudo vnus, acies acuta valdè, vt fecet, non conuellat cutim: nam sic commodius opus absoluent. Hæ cutes in clibani modum componantur, alteram alteri superimponendo, vt aptè per eas ignis euagetur. Sit diameter duorum cubitorum, eademq; altitudo: ostium vnus pedis, in summo foramen apertum, per quod exhalet fumus, intus paleas, & sarmenta iniicienda, vt facilius ignem concipiant. Vbi omnia benè accensa cognoueris, superius os operies: sic & ora, quæ vis ignis effecerit. Quum optimè omnia combusta videbis, & in cinerem versa, quod diei curriculo eueniet, benè erit, si aliqua in combusta remanent, aliis clibanis accommodetur, vt omnia in cinerem resoluantur, quo maiores, & spissiores clibani erunt, & meliores, & spissior cinis, vbi solum ab igne crudum remansit, & pastino, & ligonibus permiscetur, idq; fiat ante sationem quinque diebus.

De seminum electione in serendo. C A P. IX.

THEOPHRASTVS de seminum electu hæc habet. Ad exortum autem, vniuersamq; sementem semen anniculum optimum putatur, bimum deterius & trimum, quod autem vltra acceperis, sterile fermè est, quamquam ad vsum cibarium idoneum constar. Omnibus ad generandum data est vita definita, & inter sese differunt, locorum causa, quibus cõdantur. In petra Cappadociæ vel quadragenos annos fœcunda, sexagenos autem, & septuagenos ad vsum cibarium idonea. Locum hunc cum aliis excelsum, tum flatibus esse apertum, & ab exortu, occasu, meridieque auris editum. Columella præcepit, de messis segetibus iam in area, futuro semini consulamus. Ait Celsus, Vbi mediocris est fructus, optimam quamq; spicam legere oportet, separatimque ex ea semen reponere, quum amplior messis prouenerit, quicquid exteretur, capisterio expurgandum erit, & quod propter magnitudinem ac pondus in imo subsederit, id semen reseruandum: nam nisi cura talis adhibeatur, frumenta degenerant, & ex robusto fit non robustum. Ideoque Virgilius de seminibus præclare sic disserit,

*Vidi ego lecta diu & multo spectata labore,
Degenerare tamen, ni vis humana quotannis*

Maxima

Gtanum rutili
bet, integrum est
conspicitur candi
habet. Vindanio
est generosum, p
tissimum est, ex p
sum. Quidam ple
o eaq; in sementem
mus ad fertilitate
velut ex montan
enim contrarior
tamen si fiat, opo
non ex præstanti

SED SATUSTEM
mus. Inquit e
tissimum, quod
io maxima fere par

Quamobrem
quod vere incipit
seri desiderant, a
trumq; tempus
gillis orientibus
arbitrantur. Alii
bres subsequi co
raturget ad conc
am in lutum non
solatam: dilutum
rit, si sicceetur ob
cile putrescit, qu
Caloris quidem
absoluit, quare t
tempestiue, non
tuerusq; brumal
rofa, ac similis la

Maxima quæq; manu legeret, sic omnia satis

In peius ruere, ac retro sublapsa referri.

Granum rutilum, si quum diffusum est, eundem colorem interiore habet, integrum esse non dubitamus. Quod extrinsecus albidum, intus etiam conspicitur candidum, leue, ac vanum intelligi debet. Plinius quæ inscribere habet. Vindanionius Græcus ad id. Frumentum, quod seremus, eligendum est generosum, plenum, solidum, colore ad aurum inclinante, & quod gratissimum est, ex panificio cognoscitur. Fugiendum contra contusum, & rugosum. Quidam pleniores spicas eligunt, quæ grana habent solida, & perfecta, eaq; in sementem reseruant, præstantiorem fructum ex his capientes. Didymus ad fertilitatem conferre tradit, vt semina in contrarios locos ferantur, velut ex montanis in campestres, ex humidis in squallidos, & vice versa. Esse enim contrariorum appetentiam æqualiter & in seminibus, & in terra. Quod tamen si fiat, oportet vt ex deterioribus regionibus in meliores transferamus, non ex præstantioribus in peiores.

De tempore sationis. C A P. X.

SED satustempora dicamus, & primum Theophrasti placita demonstramus. Inquit enim: Sementis duo tempora notantur, sed primum atq; potissimum, quod circa Vergiliarum occasum accipitur, quod & Hesiodus & maxima ferè pars authorum sequuta est,

Quum cælo emergunt sublimi ab Atlantide nata

Pleiades, truncanda Ceres, Morientibus illis

Mute in aratra boues.

Quamobrem id tempus per excellentiam satum appellarunt. Secundum quod vere incipit, post brumam, sed non eisdem datur vtrumq;. Alia maturè feri desiderant, alia ferè, quod hyemem nequeant tolerare: non desunt quæ vtrumq; tempus satis aptè contingant. Maturè feritur triticum. Alii iubet Vergiliis orientibus, tunc enim semina in terra sicca, & irroscida incolumbia seruari arbitrantur. Alii illarum occasu, ex Cleodemi sententia, quod septimo die imbres subsequi consueuerint. Sed ipse optimam iudicat eo anni tempore quo terra turgit ad conceptionem, esse mandandum. Ad id addit receptum sententiam, in lutum non esse ponendum semen, nec in seminadentem terram, nec insolatam: dilutum enim in lacteum pulcem dissolui dixit, & postquam maduerit, si siccetur oblinat, nec transmeandi libertatem concedit. Semina didum facile putrescit, quia neq; humor, neque calor satis est ad operis perfectionem. Caloris quidem generationis apparatus auspicatur, sed germinationem non absoluit, quare hanc omnium mentem pessimam esse. Quæ in sicco facta est tempestiuè, non corrumpit semen. Aliam addunt Cleodemi opinionem, aduersusq; brumalem satum. Terra enim per id temporis vda, ponderosa, vaporosa, ac similis lanis malè carptis, nec potest vapores attrahere, ac in altum trans-

mittere calore destituta, qui vtriusq; author est. Sed quia sunt quædam fruges ferotina, ideo melius ad brumam seruntur, & cæli fauor seminibus in satum prodest, & post satum si tepor fuerit, ut semina valeant pullulare, qui superueniente frigore utilis est, nil enim iam confirmatis & stabilis obest, sed cōstipando fecundiora reddit: quippe quum radice robustiore plus alimenti trahatur, & incrementum post festinantius veniat. Quæ nanq; præcipiant incrementa, & præmaturè erumpunt, de facili pereunt, immò intèpestiua educatio fluxa est, unde effusionem illam cohibent alii, secando, aut carpendo. Conferunt etiam niues, quod iis fermentatur ager, & rarefit, & pabulum præbet, & consipato calore radices augetur roboranturq;. Alibi verò præcepta tradit seminandum siccum, tum humidum solum. Ante imbres in sicco serere, ut imbrui iuuetur superuentu, & in humido eodem modo, ut imbres præueniantur, ut adhuc humo tepida semina pullulare possint, & imbres validius sufferre. Frumentacea maturè feri debent, ut fortius radiceantur, nam sua natura protinus fursum feruntur, hyemis autem superuentu cohibentur, sic verò deorsum retento alimento radices plus fundant, & multiplici culmo se attollere possunt. Sed Democritus Græcus naturali quadam obseruatione tradit, circa Coronæ occasum seminandū esse, tunc enim non solū multi imbres emitti solent, sed terra ipsa naturalem quendam motum suscipiendi, & ad ea, quæ sata sunt, fecunda efficienda habet. Incipit Coronæ occasus circa Phœnicē ad septimum cal. Decembres. Oportet satorem boreales dies, vel frigidus euitare, in his enim terram conclusam, & velut horretem semina non suscipere manifestum est. In serenis enim diebus remisse calidis, semina tum suscipere, tum ad radicem agendam concitari, & plenos fructus facere. Alioqui sementē augete Luna, à quarta vsq; ad plenā, hoc est quindecim dierū spacio facere cōsulant. Quidam tutius operantes, non omnē seminationē præcocem faciunt, sed in binā, ternā, vel quatuor tēpora partiuntur, temporis incertitudine deuitantes. Leontius dicit: Satio præcox omnibus præstat, profundam terram anticipare oportet, si parum aëris pluuiosi nacta fuerit. Quibusdam videtur frigidioribus locis autūno per totam hyemem rectè seminationem fieri ad idus vsq; Martii, vel æquinoctium vernū. Diligentiores sementis tempora hoc modo distribuunt. Frumentis sationē incipiunt à Pleiadum occasu, qui ad quartū nonas Nouembres cōtingit: cessant à satione solstitio hyemali, hoc est ad nonū cal. Ianuarias. Cato è Latinis primus ita docet: Vbi quisq; locus frigidissimus, aquosissimusq; erit, ibi primū serito, in calidissimis locis sementē postremo fieri oportet. Varro ab æquinoctio autūnali incipere scribit oportere serere vsq; ad diem xci post brumam, nisi quæ necessaria causa coegerit non serere, quod tantum interfit, ut ante brumam sata, septimo die, quæ à bruma sata xxi die vix exeant, neq; ante æquinoctium incipi oportere putant, quod si minus idoneæ tempestates sint consequutæ, putrescere semina soleant. Nec tædeat elegantiissima Virgillii carmina recitare primo Georgicorum libro.

*At si triticeam in messem, robustaq; farra
Exercebis humum, solisq; instabis aristis,
Ante tibi Eoa Atlantides abscondantur,
Gnosiaq; ardentis decedat stella corona,
Debita quam sulcis committas semina, quamq;
Inuita properes anni spem credere terra.
Multi ante occasum Maia cœpere, sed illos
Expectata seges vanis elusit auenis.*

Columella Virgilio placita sequitur, in occasu Vergiliarum feri debere. Ab-
10 scconduntur altero & vigesimo die post autumnale æquinoctium, quod ferè
conficitur nono cal. Octobris. Erit ergo tritici satio dierum sex & quadragin-
ta ab occasu Vergiliarum, quod fit ante diē nonum cal. Nouembris ad brumę
tempora. Sic vt quindecim diebus prius, quàm conficiatur bruma, totidemq;
post eam confectā non arent. Nec ambigendum tēperato agro sementem sic
fieri. Locis verò vlginosi, exilibus, frigidis, & opacis circa cal. Octobris semi-
nare conuenire, sicca tellure, dum nubila pendent, vt prius radices frumento-
rum conualescant, quàm hybernis imbribus infestentur. Quidam præcepere,
ne seminarentur agri, nisi quum terra pluuiis permaduerit, quod si tempesti-
uè contigerit, proderit: sed si feri sunt imbres, quamuis sitienti solo, rectè se-
men committitur: nam quod sicco solo ingestum, & inoccatum est, perinde
ac si repositum in horreo non corrumpitur. Atq; vbi venit imber, vno die se-
men surgit. Plinius multa antiquorum dicta adducit, quæ nec adducere pige-
bit: Accius in Praxidico dicit feri debere quum Luna est in Ariete, Gemi-
nis, Leone, Libra, Aquario. Zoroastres sole x i partes scorpionis transgres-
so, quum Luna esset in Tauro. Sequitur huc dilata, & maxima indigens cura
de tempore ferendi fruges quæstio, magnaq; ex parte ratione syderum con-
nexa. Quamobrem sententias omnium in primis ad id pertinentes expone-
mus. Hesiodus qui omnium princeps de agricultura præcepit, vnum tempus
ferendi tradidit à Vergiliarum occasu. Scribebat enim in Bœotia Helladis, v-
30 bi ita feri diximus. Inter diligentissimos conuenit, vt in alitum, quadrupedūq;
genitura, esse quosdam ad conceptus impetus terræ. Hos Græci ita definiunt,
quum sit calida & humida. Virgilius à Vergiliarum occasu feri iubet, quo fit,
vthorum syderum exortus, & occasus digerendi sint in suos dies. Sunt qui
properent, atq; ita pronuncient, festinatam sementem sape decipere, seroti-
nam semper. E contrario alii, vel vere potius ferendum, quàm male in autu-
mno, atq; vbi fuerit necesse inter Fauonium, & vernum æquinoctium. Palla-
dius eadem habet.

De modo ferendi. CAP. XI.

40 **N** Vnc præcepta ferendi describemus, vt pro agri qualitate, & tem-
poris, seminis mensura proiciatur, quod accuratius despiciendum.

Theophrastus quod ante pluuiam seritur, iubet rarum seriri: quod post, spissum: quod hoc multum radicitur, illud parè. Quod enim maturè seritur, si spissum seritur, non radicitur, quia terra siccior: quod serè seritur, quia terra mader, frequentius serendum: suppetit enim humor, fit ergo quæ crebro seritur seges multistipula. Plinius ab eo: Festinata satione densum spargi semen, quia tardè concipiat, serotina rarum, quia densitate nimia necetur. Artis etiam cuiusdam est æqualiter spargere. Manus utiq; cōgruere debet cum gradu, semperq; cum dextro pede. Fit quoq; quorundam occultaratione, quod fors genialis atq; fecunda est. Serere in agro temperati soli iustum est tritici modios quinq; pingui solo plus, gracili minus. Est & alia distinctio: In denso, aut cretoso, aut vliginoso solo tritici modios sex. In soluta terra & nuda, & sicca, & lata quatuor: macies enim soli maior, nisi rarum culmum habeat, spicam minutam facit, & inanem. Pingua arua ex vna seminis radice fruticem numerosum fundunt, densamq; segetem è raro semine emittunt. Ergo inter quatuor & sex modios pro natura soli alii quinq; non minus feri, pluresve præcipiunt. Item in confito, aut cliuoso, ut in macro. Pamphilus Græcus mensuram ita præfinit. Diducito digitos manus, eosq; imprimito in terram, & sublata deinde manu, multitudinem seminum in impresso digitorum typo considerato. In frumeto numerum septenarium summum esse oportet, minimū quinarium. Caterum in terram, quæ assiduas niues perpetitur, semina crassius iacienda sunt, propterea quod aliqua glacie corrumpantur. Columella etiam quantum frumenti iugerum agri recipiat, refert. Iugerum agri recipit tritici modios quatuor, vel quinq; Hesiodus post sationem cooperiendum semen docet,

Semina quum terra committis, ponè sequatur

Seruulus, atq; anibus retro sata lata recondat.

Plinius: Sato semine sequitur iteratio. Hæc quoq; ubi consuetudo patitur, crate dentata, vel tabula aratro annexa: quod vocant lirare, operientes semina, vnde primum appellata deliratio est.

De sarritione, & truncatione. C A P. XII.

MEMINIT Theophrastus in segetum cura post satum sarritionis, & ad frugum suauitatem plurimum conferre dixit. Significat enim sarrire sarculis fodere, vel purgare, quod fit, quum segetes leniter scalpendo rastris à noxiis herbis purgamus. Plautus,

Semper occant prius, quàm sarriant rustici.

Varro segetem sarriri iubet primo intervallo inter Fauonium, & æquinoctium vernum. Columella exactam sarritionis disciplinam tradit, ideo ipse audiendus. Peracta sementi, sequens cura est sarritionis, de qua non conuenit inter authores. Quidam negant eam quicquam proficere, quod frumenti radices sarculo detegantur, aliqua etiam succidantur, ac si frigora inceserint, post sarritionem gela frumenta enecentur. Satiùs autem 40

esse:

esse ea tempestiue runcari, & purgari. Pluribus tamen sarriri placet, sed neque eodem modo, neque iisdem temporibus vsquequa; fieri: nam in agris siccis, simulac sarritionem pati queant segetes, debere eas permota terra adobruui, vt fruticare possint, quod ante hyemem fieri oportet, & post hyemem iterari. In palustri transacta hyeme sarriri, nec adobruui, sed plana sarritione terram promoueri. Multis regionibus aptam esse hyemalem sarritionem comperimus, vbi scilicet cœli tepores permittunt, sed incolarum consuetudinem sequi debemus. Sunt enim regionum propria munera, vt Ægypti, & Africæ, quibus agricola post sementem ante messem segetem non attingit, quoniam ea cœli conditio & terræ est, vt vix vlla herba exeat, nisi ex semine iacto, siue quia rari imbres, siue quod ea sit humi qualitas. Iis locis vbi sarritio desideratur, nō sunt attingendæ segetes, etiam si cœli status permittit, nisi quum fata sulcos contexerint. Triticum autem cum quatuor fibras habere cœperit, recte sarrietur. Plinius: Sarculatio induratum hyberno rigore soli tristitiam laxat temporibus vernis, nouosque soles admittit. Qui sarriet, caueat, ne frumenti radices suffodiat. Triticum bis sarriri melius. Sarritur diebus viginti. Ab æquinoctio nocere satura segeti existimatur. Leontius Græcus de sarritione hæc habet: Optimum est fata per homines sarriri, & adobruui, vt optimè omnia contegantur. Quod si fieri non potest, per boues sarriantur. Quando verò iam glebam & sulcum occultare, & contegere cœperint, id fiat, quo & agrestes herbe dissipentur, & nudatæ ab aquis radices obruantur. Bis quoque si sarritio fiat, geminata erit vtilitas. Runcatio est inutilium herbarum, fruticumque euulsio, inquit Columella. Subiungenda est deinde sarritioni runcatio, curandumque ne florentem segetem tangamus, sed vt antea, aut mox quū defloruerit. Varro, Secundo intervallo inter vernum æquinoctium, & Vergiliarum exortum hæc fieri debent, segete runcari, herbam ex segetibus expurgari. Plinius: Quum seges in articulo est, euulsis inutilibus herbis, frugum radicem vindicat, segetemque discernit à cespite. Leontius Græcus: Quando iam frumenta spicam emisserint, runcetur. Sic etiam fructus puri, & multæ commoditatis perficiuntur, quum non amet terra herbas peregrinas iugiter coalere.

De vitis segetum & remediis CAP. XIII.

SUNT & permulta segetum vitia, morbi que, quorum etsi cuique in sua tractatione remedium demonstrabitur, lubet tamen aliqua generatim præfari, quum præsertim & à nostris antiquioribus geoponica pertractantibus, describantur. Sed qui fuerint hi morbi, à Theophrasto perdiscamus. Seminum vitia quædam omnibus communia, vt rubigo, quædam propria quibusdam dantur, vt tabitudo radici ciceris, & erucarum infestatio. Aliis etiam publicum, bestiarum erosio: nonnulla scabie, & falgugine pereunt, vt cuminum. Animalia vel in iis gignuntur, vel extrinsecus veniunt, quæ non æquè officiant. Nascitur in tritico cantharis, & in eruo phalangium, & in aliis alia genera. Mor-

biautem, ut in summa dixerim, omnibus seminibus ob alimenti, cœlique intemperiem eueniunt, videlicet, quum plus, minusve alimenti præberetur, aut aer immôdicè humidus siccusve est, vel quum non tempestiue humescit. Sed incipiamus primo à rubigine, à qua aliæ fruges vastantur, aliæ immunes sunt. Rubigo in frumentaceis magis, quam in leguminibus, & inter frumenta ordeum magis, quàm triticum sentit, & inter ordea aliud plus, aliud minus. Rubiginem nullam sentiunt tractus excelſi perflatique; caui, depressique; & flatribus nullis expositi frequentissimè habent. Gignitur hæc plenilunio. Rubigo putrefactio quædam est, quum exceptus in spica humor non defluit, sed solis superuentu calefactus, putrescit. Aufugiunt hoc vitium quæ inclinatam habent spicam, non porrectam, quia ab ea non excipitur humor. Longiores stipulæ spicis grauata incuruuntur, quia sub illis flectuntur, breues verò subiectas gerunt, ob id ærugini obnoxia. Prodest quæ à foliis suspensa spica est, quia longius humor abest, qui in foliis continetur. Ordeum achilleis vocatum æruginosum est, quia porrectam gerit spicam, eteocritum verò, quia incuruatur, ab ærugine innoxium est. Sic & ventis perflata segetes minus rubigine infestantur, quia humor vento deicitur, & postimbres sequente flatu mox compluta spica reficcatur prius, quàm solis calore ferueat. Plenilunius potissimum gignitur, quia Luna plena caloris plena est, quo putrefacit. M. Varro in limine sui de re rustica libri, Robigum, & Floram inuocat, quibus propitiis rubigo neque frumenta, neque arbores corrumpat, neque non tempestiue floreat. Namque publicæ Robigo feriæ robigalia. Floræ ludi floralia instituti sunt. A quibus Plinius: Cœleste frugum malum, nullo minus noxium est rubigo. Frequentissima hæc in roscido tractu, conuallibusque, ac perflatum non habentibus. E diuerso carent ea ventosa, & excelsa. Triatempora fructibus metuebant Romani, propter quod instituerunt ferias, diesque festos, Robigalia, Floralia, Vinalia. Robigalia Numa constituit, anno regni sui vndecimo, quæ (Plinii tempore) agebantur ad vii. Calen. Maii, quoniam tunc ferè segetes rubigo occupat. Hoc tempus Varro determinauit sole tauri partem decimam obuente, sicut tunc ferebat ratio. Sed vera causa est, quod post dies vndeuginti ab æquinoctio verno per id quadriduum varia gentium obseruatione in iiii. cal. Maii Canis occidit, syldus & perse vehemens, & cui præoccidere caniculam necesse sit. Idem itaque floralia iiii. calen. eiusdem instituerunt urbis anno quingentesimo sexdecimo ex oraculis Sibyllæ, ut omnia benè deflorescerent. Hunc diem Varro determinat, sole tauri partem quartamdecimam obtinente. Ergo si in hoc quadriduum inciderit plenilunium, fruges & omnia, quæ floreant, lædi necesse erit. Ex his canis in sacris Robigi victimam fuit. Ouidius Fastorum libro:

Est canis, (Icarium dicunt) quo sydere moto

Tota sitit tellus, præripiturque seges.

Pro cane sydereo, canis hic imponitur ara,

Et quare fiat nil nisi nomen habet.

Pro

Pro cuius rem
pestis, lauriam
aur palcarum ac
quum timebis in
auxiliatur, ubi ne
paleas & purgam
instare videris, co
culi enecant, alii p
tes abfolui neque
deinde alimento
rit, si verò alteran
nus violauit, id qu
rat. Idque in Thell
bro de causis rari
humiditate debet
ad excoctionem
nim in eius radice
ferint. Tunc enim
ciens, animal pro
eisdem rebus ger
Nascuntur & ve
ferit repentinus
calor inferuescit.

Est & canthar
animalia cum cibo
tulis si miscerant
mocrinus succo
tine verò sedum
verò, si dulced
murca pura, ac
tibus triticum,
tiaperflantur, au
magis ita perire c
que flatus inuase
uentari dixerunt
to, & ordeo. In
pietibus. Tum
Sol quoque ex tr
ticum magis, qu
men percipi mi
ter vitia segetu

Pro cuius remediis Plinius hæc recitat: Rubigo quidem maxima legetum pestis, lauri ramulis in aruo defixis, transit in earum folia ex aruis. Sarmenta, aut palearum aceruos, & euulsas herbas, fruticesq; per vineas, camposque, quum timebis incendito, fumus medebitur. Hic è paleis, & contra nebulas auxiliatur, vbi nebula nocet. Ab eo Palladius: Contra nebulas, & rubiginem, paleas & purgamenta pluribus locis disposita, simul omnia, & quum nebulas instare videris, combures. Sed ad Theophrastum redeamus: Triticum vermiculi enecant, alii protinus nascentes, radicitus erodentes, alii quum squallentes absolui nequeant, tunc enim vermiculus culmum vsque ad spicam erodit, deinde alimento consumpto, emoritur, & si totum erosit, triticum ipsum interit, si verò alteram tantummodo culmi partem frugemque fundendam eatenus violauit, id quidem spice pereat necesse est, reliquum autem incolume extat. Idq; in Thessalia maximè, minus verò in Africa, & in Lelanto Eubææ. Libro de causis rationem assignat. Nam vbiq; animal gignitur, quum calor cum humiditate debita ratione coit, humiditas enim, ceu materia subiacet calori ad excoctionem conficiendam, quod in tritico euenire videmus. Vermes enim in eius radice creantur, quum post sementem flatus austrini crebro incesserint. Tunc enim radice humescente, & aere calido, radicem caliditas putrefaciens, animal procreat, vermis inde natus radicem erodit. Singulis enim ex eisdem rebus generationem, & alimentum Natura præscripsit. A quo Plinius: Nascuntur & vermiculi in radice, quum sementem imbribus sequutis incluserit repentinus calor humorem. Gignuntur & in grano, quum spice pluuiis calor inferuescit.

Est & cantharus dictus scarabeus, paruus frumenta erodens. Omnia ea animalia cum cibo deficiunt. Sed hæc eorum remedia. Semina cupressi foliis tuis si misceantur, non esse vermiculis obnoxia, nec si interlunio ferantur. Democritus succo herbæ, quæ appellatur ἀνζωον, in tegulis nascens, tabulisve, Latine verò sedum, aut digitellum, medicata feri iubet omnia semina. Vulgò verò, si dulcedo noceat, & vermes radicibus inhæreant, remedium est amurca pura, ac sine sale spargere, deinde sarrire. Maximè intereunt afflatibus triticum, atque hordeum, inquit Theophrastus, quum aut florentia persilantur, aut flore demisso protinus infirma concutiuntur. Sed ordeum magis ita perire certum est, sæpè enim crassescunt, si vehementius diutiusque flatus inuaserint, exiccantur, & penitus inarescunt, quod quidam euentari dixerunt. Plinius: Venti autem tribus temporibus nocent, frumento, & ordeo. In flore, aut protinus quum defloruere, aut maturescere incipientibus. Tum enim exinaniunt grana, prioribus causis nasci prohibent. Sol quoque ex nube, inquit Theophrastus, ambo ista interimit, sed triticum magis, quàm ordeum, ita vt quanquam spica exinanita sit, visu tamen percipi minimè possit. Plinius: Nocet & sol è nube creber. Inter vitia legetum luxuria est, quum onerata fertilitate procumbunt.

Luxuria segetum castigatur dente pecoris in herba duntaxat, & depasta quidem, vel sapius nullam in spica iniuriam sentiunt. Retonsarum etiam semel omnino certum est granum longius fieri. Sed inape, cassumque, ac satum non nasci. Imber in herba utilis tantum. Florentibus autem frumento, & ordeo nocet, leguminibus innocuus, præterquam ciceri. Maturescentia frumenta imbre læduntur, & ordeum magis. Virgilius nitro & amurca perfundi iubet fabam, sic etiam grandescere promittit. Vino ante semina perfusa minus agrotare existimant. Quin & armo talpæ contacta semina vberiora esse. Apuleius testatur semina vino conspersa minus esse agrotatura. Aqua etiam & amurca, si irroraueris ipsa maxime iuuabis. Palladius: Quædam animalia subterranea sectis radicibus necant plerumque frumenta. Contra hæc proderit, si herbæ, quæ sedum dicitur, succus aquæ mistus, vna nocte madefaciat, quæ spargenda sunt semina, vel agrestis cucumeris humor expressus, & eius radix trita, si aqua diluatur, & eodem, quæ serenda sunt, macerentur humore. Plinius: Mures abiguntur cinere mustelæ, vel felis diluto, & semine sparso, vel decoctarum aqua. Sed redolet virus animalium eorum in pane. Ob id felle bubulo semina attingi utilius putant. Apuleius: Si post sationem, & ubi terra iam obruta fuerint semina, modicum frumentum veratro ammistum propè seminaueris, quæcunque aues gustauerint, moriuntur. Auiculas ipsas mortuas arundini affixas expeditibus suspendito, & de cætero auicula nulla accedet. Vel si modicum frumentum veratro ammistum foris per ambitum seminaueris, sata ab auium iniuria vindicabis. Si caneros fluuiales, aut marinos in aquam coniectos ad dies octo siueris, & hac aqua foris sata ipsa consperferis, neque semina, neque plantæ ab auibus læduntur. Quidam cerui cornu, aut elephantis siccum aspergunt, alii aqua madefaciunt, atque ita semina irrorant. Si in mensuram, qua semina metiri solemus, serenda semina iniiciuntur, & hyænx pelle contegantur, post aliquot dies transumpta ab animali, naturali potentia erodere, à nemine facile læduntur. Incorrofa manent, quæ Luna semiplena seminata sunt. Priusquam aruum fodiatur, rubeta noctu circum ipsum gestanda est, & in vase fictili concludenda, atque in medio aruo adobruenda. Verum sationis tempore instante, refodienda est, & extra aruum eicienda, ut ne fructus amarus fiat. Quin veteri vrina, ac canino stercore simul solutis si semina madefeceris, aut arbores, aut vites, illa sa omnia conseruabis.

Prænotio segetum fertilitatis. CAP. XIV.

FUTURE vbertatis prognostica segetum aliqua à syderibus, vel ab aeris qualitatibus, vel ex arboribus cognosci possunt. Nos primo ea manifestabimus signa, quæ etiam agricolis innotescere possunt, postremo quæ accuratorem astrologiæ scientiam exposcunt. Et primo si optime floruerit seges, optimam præbere potest spem vbertatis. Ouidius in Fastis,

Si bene floruerint segetes, erit area diuis.

Virgilius

Virgilius ex an

Conte

In dæ

Si sup

Magi

At si

Neg

Sed Appuli ex

florulentem col

gum vbertatem

qualia semina fer

pian loco de vno

igitur exoritur C

quaquam. Hoc i

serunt, relinqu

sis. Cæterum quæ si

ed commodius n

uant, & in qua Z

ruptionem potte

2 corruptione. In l

Sagittario, in m

nem. In Aquatio

modica. Ex Cani

seruantes in qua

menti fertilitas n

ti abundantia. In

tas. In Ariete,

Gregi asserunt. E

Aræam breuem

10 tis omnia frum

culæ, qui apud l

tur, explorant,

stinent, illa proc

generi vnicuique

De fr

ET quia iam

ea diuidam

na, & aestua. D

Græcis sup

4 nullorum fruct

Virgilius ex amygdalæ floribus futura frugum copia iudicia desumit.

Contemplator item, cum se nux plurima syluis

Induet in florem, & ramos curuabit olentes.

Si superant fœtus, pariter frumenta sequentur,

Magnaq; cum magno veniet tritura calore,

At si luxuria foliorum exuberat umbra,

Nequicquam pingues palea teret area culmos.

Sed Appuli ex asphodelo iudicium vbertatis desumunt, quippe si optime florentem cospexerint, & deflorescentē, & seminum copiam, eandem frugum vbertatem sibi promittunt. Legitur apud Græcos Zoroastræ prænotio, qualia semina fertilia futura sint. Paucis diebus ante caniculæ exortum in quopiam loco de vnoquoque semine paululum experimenti gratia ferunt. Quum igitur exoritur Canicula, quædam ex satis, vt verisimile est, lædit, quædam nequaquam. Hoc igitur signum statuantes, ea, quæ in eius ortu illæsa manent, ferunt, relinquunt incuruata. Est autē Canis exortus decima nona Iulii mensis. Cæterū quæ sic seremus, ea triginta diebus ante rigabimus, quò videlicet eò commodius nasci possint. Vel post Canis ortum primum tonitru observant, & in qua Zodiaci domo existat Luna. Si in Tauro, frumenti & ordei corruptionem portendit. Si in Geminis, frumenti corruptelam. In Cancro ordei corruptionē. In Leone, frumenti, ac ordei perniciem in montana regione. In Sagittario, in montana regione frumenti fertilitatem, in campestri corruptionem. In Aquario, leguminum perniciem. In Piscibus, frumenti corruptionem modicā. Ex Caniculæ etiam ortu, qui fit illucescente vigesima Iulii mensis, obseruantes in qua domo existat Luna, prædicunt. Si in Leone fuerit Luna, frumenti fertilitas magna. In Virgine, frumenti corruptela. In Sagittario, frumenti abundantia. In Capricorno, fertilitas. In Aquario, carentia. In Piscibus, vbertas. In Ariete, copia exigua. In Geminis, multa fertilitas. A quibus Palladius: Græci asserūt Ægyptios homines prouentum futuri cuiusq; seminis experiri. Arēam breuem loco subactō, & humido nunc excolunt, & in ea diuersis spatiis omnia frumenti, vel leguminum semina spargunt. Deinde in ortu Caniculæ, qui apud Romanos quartodecimo Calendarum Augustarum die tenetur, explorant, quæ semina ortum sydus exurat, quæ illæsa custodiat. His abstinent, illa procurant, quia indicium noxæ, aut beneficii per annum futurum generi unicuique sydus aridum præsentī exitio, vel salute præmisit.

De frumenti generibus, & primo de tritico. C A P. XV.

ET quia iam vniuersis frumenti generibus agrum præparauimus, nunc ea diuidamus. Diximus frumenti genera pro tempore satus diuisa, hyberna, & æstiuā. Dicemus de hybernis, & primum à tritico incipiemus.

Græcis *τροπος* dicitur, ab acutie, aut à similitudine, quam habet cum non-

40 nullorum fructuum grans, vel gygartis, quæ *τροπαι* dicuntur. Dicitur enim

KKK

σινς, quasi cibus, quæ vox vniuersis cerealibus conuenit. Latini triticum dicunt, quod molis teratur, sic etiam frumenta à fruendo dixere prisca. Itali grano.

Genera.

Triticum omnes agriculturæ consulti in quamplurimas differentias distinxerunt, etsi specie, & natura reapse vnum sit, cælum, regio, satus, cultus, & hominum industria varium fecerunt. Tritici diuisionem à Theophrasto desumemus, doctrina & tempore omnium primo. Triticum & vrbantum, & syluestre dicit, sed temporis spatio cultum, mitigatumque & loci mutatione mutatum. Vrbantum Columella in plures species diuisit. Prima, inquit, & vtilissima sunt hominibus frumenta, triticum, & semen adonideum. Dicemus nos de tritico primum, dein de adonide generibus. Tritici genera complura sunt, & tempus differentiam in his primo facit: nam genus est, quod trimestre dicitur, quod tribus mensibus absoluat, de quo posterius loquemur. Ex reliquis generibus vnum maximè ferendum genus dicit, quod robus dicitur, quum & pondere & nitore præster. Secunda species est siliginis, reliquis tritici species, nisi si quos multiplex varietas frugum, & inanis gloria delectat, superfluas dicit. Hoc genus Apulia, & Campania *brondella* vocat, quod ad flauum colorem inclinet, estque primæ dotis inter cetera præstantissimum. Granum non ita tumidum, sed solidum, graue, flauum, vel rubellum, siccum, mansuè minime muscidum, & nitidum. Apuli præterea suis generibus vernaculis à folliculorum, & aristarum colore nomina imposuerunt. Primum genus albo folliculo, & nigra arista est. Secundum nigro folliculo, & alba arista. Tertium folliculo & arista albis, quartum nigris. Apulo tritico multum Varro contulit. Urbani plura genera apud Theophrastum notantur, cognomina ex locis sortita, vt Africum, Ponticum, Thracium, Assyrium, Egyptium, & Siculum, quæ colore, magnitudine, specie, & proprietate inter se differunt. Quædam cognomina sortuntur ex viribus, tum vel aliis, tum maximè quæ ad cibum pertinent, vt Cachrias, Stelengis, Alexandrinus. Nec ab re fuerit, si pro differentiis capies, quod aliud præcox, aliud serum, aliud auctum amplum, multumque reddens, aliud ieiunum parum reddens, aliud spica grandiore, aliud paruam effundens, aliud diu in folliculo manens, aliud aptum breui abfolui, vt Africum, aliud culmo tenui constans, aliud crasso, vt Africum, & Canchrydias. Item aliud tunicis paucis, aliud multis vestitur, vt Thracium, & aliud vnicalamum, aliud multicalamum. Ponticum breuissimum est, ponderosius Siculum, sed eo ponderosius, quod Bæotia fert. In Asia vltra Bactra, quodam id loco adeo grande frumentum fieri tradunt, vt nucleis oliuæ suæ æquiparent magnitudine grana singula. In Pissonis adeo firmum nasci affirmant, vt si quis plus comederit disrumpatur. Nuper genus illud, quod vltra Bactra nasci scripsit Theophrastus, nobis à Constantinopoli exportatur, cuius granum oblongum, & amplum est, cetera valde superans, *alicam* vulgò vocat. Hodie Bactra in Turcarum dirione sunt, vnde Constantinopolim delata nobis deinde adue-

aduehuntur, etsi ratione de generibus familiare est grana spicas fundi fecundum, quos sto hæc habet: Triticum comparauerim, cum do comparatur. Inde Sicilia, mox arbutatum cum de fecerat. Gracia dem genere gra crassissimi calamissima fuit. Græce re mortem eius a frumentum Itali

Et for

Quæ laus pecorum nullam Theophrastus lentiori, nec per neuo tantum c taginem vocant. multis tegitur & præterea. Quin & anno pr quod solum rad ab exercitu, ad spica, imperfecta la explicat. Spica aristam, & etiam est incitum sol longa eminet & granum omni scriptum scio el à glubendo, qu lant fici eius, q àgerendo. Id er gerat, vt vitis 40 rustici, vt acc eam enim, qu

aduehuntur, et si oleæ nucleï magnitudinem non attingunt, soli, cæliue mutatione degenerasse putamus. Ponticum facillimum, & durissimum est. Nobis familiare est genus vnum, profecto admirabile visu, cuius spica alias è lateribus spicas fundit, vulgò *grano aracem* vocant, vt spica spicata sit, & maximè fecundum, quod serimus & colimus, vt cætera genera. Plinius à Theophrasto hæc habet: Tritici genera plura, quæ fecere gentes Italico nullum equidem comparauerim, candore, & pondere, quo maximè decernitur. Montanis modo comparatur Italiæ agtis externum, in quo principatum reuult Bæotia, deinde Sicilia, mox Africa. Tertiū pōdus erat Thracio, Syrioq; , deinde Ægyptio, athletarum cū decreto, quorū capacitas iumentis similis, quæ diximus ordinē fecerat. Græcia Ponticū laudauit, quod in Italiam non peruenit. Ex omni eodem genere graui prætulit dracontiam, strangiam, & selenusium, argumento crassissimi calami. Hæ fuere sententiæ, Alexandro Magno regnante, quum clarissima fuit Græcia, atq; in toto terrarum orbe potentissima: ita tamen vt ante mortem eius annis ferè cxxxv Sophocles Poeta in fabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudauerit, ad verbum translata sententia,

Et fortunatam Italiam frumento canescere candido.

Quæ laus peculiaris hodieque Italico est, quo magis admittor posteros Græcorum nullam mentionem fecisse huius frumenti.

Descriptio.

20 Theophrastus ita describit. Assurgit triticum leuiori calamo, quā ordeum, lentiori, nec perinde fragili, & erecto, folio atundineo, angustiori, vt pote quod neruo tantum cōstet. Sed ramis brachiari nequit, præter genus, quod frumentaginem vocant. Spica in cacumine incondita, & æqualis vndiq; cōstat. Granū multis tegitur tunicis, palea suauior, mollior, & succulentior, radicibus multis, & prætenuibus. E frumentaceis solū de radicibus anno sequente regerminat. Quin & anno primo retusum regerminat culmo è latere subnascente. Ratio quod solūm radicis copiam, vimq; obtinet. Adde etiam id, quod conculcatum ab exercitu, adeo vt nil perspicui possit, restibile tamen efficitur. Sed huic exigua spica, imperfectaque funditur, vt pote quæ secunda emerferit. Varro vocabula explicat. Spica quæ mutica non est, tria habet continentia. Granū, glumam, aristam, & etiam primitus spicā quum oritur, vaginam. Granum dictum, quod est intimum solidum. Gluma, qui est folliculus eius. Arista, quæ vt acutenuis longa eminet è gluma. Proinde vt granithecā sit gluma, & apex arista. Arista & granum omnibus ferè notum, gluma paucis. Itaque id apud Ennium solū scriptum scio esse in Euhemerilibris versis. Videtur vocabulū etymon habere à glubendo, quod eo folliculo deglubitur granū. Itaque eodem vocabulo appellant fici eius, quam edimus, folliculum. Arista dicta quod arefcit prima, granū à gerendo. Id enim feritur, vt spica gerat frumentū, non vt glumā, aut aristam gerat, vt vitis feritur, non vt pampinum ferat, sed vnam. Spica autem, quam rustici, vt acceperunt antiquitus, vocant specam, à spe videtur nominata: eam enim, quod sperant fore, ferunt. Spica mutica dicitur, quæ non habet

aristam. Aristæ autem quasi cornua sunt spicarum, quæ primitus, quum oriuntur, neque planè apparent: quæ sublatent herba, ea vocatur vagina, ut in qua latet conditus gladius. Illud autem summa in spica iam matura, quod est minus, quàm granum, vocatur frit, quod in infima spica ad culmum stramenti summum, item minus, quàm granum est, appellatur vrruncum. Plinius ex Theophrasto excepit: Frumenta multis radicanur fibris, sineramis. Triticum genicula quaterna. Folium arundinaceum. Grana in stipula crinito textu spicantur. Tunica frumentorum plures. Culmus altior, quàm ordeo.

Cal. sol.

Diximus communiter cælum, quod tritico convenit: nunc variis tritici speciebus quæ variæ cœli qualitates tribuantur, videamus. Africum, & Dracontias appellatum, & Strangias, & Selenusium, latum exigunt agrum: hæc enim vberius succos hauriunt. Argumento calamus est, quem crassum gerunt. Solo hyberno conveniētius Thraciū dabitur, quod tunicis multis contegitur, (ipsa forma ostendit) frigus enim huic nil officere potest. Rarum solutumq; ceu Canchrydias vocitatum, agro pluvio ferendum, quippe alimenti copiam desiderat, quam obrem & culmo crasso confurgit. Thracicum solo pluvio vberius, quàm ordeum feritur, & omnino contra imbres validius ex Theophrasto. Varro in pingui rectius feri, quæ succi sunt maioris, ut triticum. Cassianus, Martio mense ferere convenire ait frumentum album sitanum cognominatum, & nigrius, & oblongum Alexandrinum appellatum in leuem terram, & apricam, & montanam, & lacubus plenam, arenosam, & aquis carentem vsq; ad Calendas Aprilis.

Satio.

In Apulia Nouembri, & Octobri mensibus arua proscindunt, vulgò *rompere* dicunt, Decembri iterant, vulgò *recotere*, & Februario tertio arant, quod *tertiare* dicunt, quarto Augusto, quod *inquartare* vulgò nominant. Aliqua verò occasione impediti, Ianuario, & Februario proscindunt, Martio iterant, Aprilii tertio arant, quarto Augusti medio, & Octobri mense, si aruum herbosum inveniunt, denuò arant, sic liberum semen fundunt, & aratro cooperiunt, sed prius quàm serant aruum, in porcas diuidunt, viginti, aut triginta pedum latitudinis, si sarritor longimanus erit, triginta pedum porcæ latitudo erit, si breuior, viginti, ut hinc inde iactando semen, equaliter porcas compleat. Nouembri mense ubi iā triticū germinare cœperit, sarritur rastro. Ob id vulgò iactati solet. *Quando l'orgio nasce, il gran si pasce*. Maiores canunt maiores herbas, ut ferulas, & similes, nam eiusmodi crescendo minores strangulant. Februario mense si nix, vel frigus inceserit, radices confutato calore sobolescent, maximæq; spicarum copiam fundunt. Post satū, si cælum roseidū erit, septem diebus pullulat triticū, si siccum, viginti. Theophrastus ad hæc: Quæ sara conceperint, atq; adulta fuerint, aqua omnibus prodest, florēti obest, facit enim, ut intereat: implenū crassato noxia est, & ordeo magis, quàm tritico. Septimo à satū die exit. Cermen ex utraq; parte effundit, quippe quod parte ima, crassaq; radicem, tenui superna herbam propellit, sit tamen unum, atque cōtinuum ex ambobus, radice,

radice, & caule. E
qua de causa num
queat. Hyeme i
atq; genicularur,
liqua mole conspi
mè quum culmar
in folliculo fuerit
mox folliculo ab
bus ferè floret, qu
tant: postquam
quadragenta. Qu
Ægypto triticum
in quarto genicul
nicula sunt tritico
conceptus est spic
bus florere incipit
ter nouenis diebus
nim quum deflor
quadragenta. In
maiores Cicero m
Aus quidem me,
mio mollito ac fi
bet, ex quo occat
re, & complexu su
nixa fibris stirpiu
quasi pubescens i
ordine structam,
Columella: Om
semita est, spica
octo diebus deflo
florem ad matur
reduunt, & deinde
evenum.
Mellis, authe
maxime in frume
sunt mellionis, vi
mentum, & mani
eos fecerunt, iter
mentum, spicas co
inquant in segete
no, vbi lignum h

radice, & caule. Exit vno folio, prætenuibus, & permultis radicibus innititur, qua de causa numeroſo caule ſe attollit, ſed quod brachiari ramis omnino nequeat. Hyeme in herba manet, tempore miteſcente, caulem de medio mittit, atq; geniculatur, vt protinus quarto geniculo incipiat ſpicam, ſed nondum aliqua mole conſpiciam, & quidem per totum culmum ſpica digeritur, vt ferme quum culmari incœperit, mox eam conſpici ſit, ſed latet antequam adulta in folliculo fuerit, tum etiam fœtus ſuæ craſſitudine molis euidentis exiſtat, mox folliculo abſoluto, quarto, aut quinto die florere incipit, totidemq; diebus ſerè florer, qui verò plus temporis referunt, ſeptimo die reſſoreſcere notant: poſtquam deſloruit craſſatur, perficiturq; quum plurimum intra dies quadraginta. Quædam enim loca proferre intra pauciores dies videntur. In Ægypto triticum ſeptimo menſe metitur. Ex quo Plinius: Frumenta quædam in quarto geniculo ſpicam incipiunt concipere, ſed etiamnum occultam. Genicula ſunt tritico quaterna, ſed non ante prædictum geniculorum numerum conceptus eſt ſpica, qui, vt ſpem ſui fecit, quatuor aut quinque; tardiſſimè diebus florere incipiunt totidemq; aut paulo pluribus deſſoreſcunt. Varro quater nouenis diebus fruges abſolui tradit, & menſe nono meti. Frumenta enim quum deſloruere, craſſeſcunt, maturanturq; quum plurimum diebus quadraginta. In Ægypto ſeptimo à ſatu menſe metitur. Hæc omnia in Catone maiore Cicero mira verborum elegantia reſert: Quamquam non modo fructus quidem me, ſed etiam ipſius terræ viſ, ac natura delectat, quæ quum gremio mollito ac ſubactò ſemen ſparſum exceperit, primum id occatum cohibet, ex quo occatio (quæ hoc efficit) nominata eſt, deinde tepeſactum vapore, & complexu ſuo diſſundit, & elicit herbeſcentem ex eo viriditatem, quæ nixa fibris ſtirpium ſenſim adoleſcit, culmoq; erecta geniculato vaginis iam quaſi pubeſcens includitur, è quibus quum emerſerit, fundit frugem ſpicæ ordine ſtructam, & contra auium minorum morſus munitur vallo ariſtarum. Columella: Omne autem frumentum, & ordeum, & quicquid non duplici ſemine eſt, ſpicam à tertio, ad quartum nodum emittit, & quum totam edidit, octo diebus deſſoreſcit, ac deinde grandæſcit diebus quadraginta, quibus poſt florem ad maturitatem deuenit. Palladius ex his: Frumenta octo diebus floreant, & deinde per dies quadraginta flore depoſito uſque ad maturitatis euentum.

Melliſ, authore Varrone, propriò nomine dicitur in iis, quæ metuntur, Meſſis. maxime in frumento, & ab eo vocabulo eſt declinata. Frumenti tria genera ſunt meſſionis, vnum, vt in Vmbria, vbi falce ſecundum terram ſuccidunt ſtramentum, & manipulum, vt quenq; ſubſecuerint, ponunt in terra, vbi multos eos fecerunt, iterum eos perſecant, ac de ſingulis ſecant inter ſpicas, & ſtramentum, ſpicas coniiciunt in corbem, atq; in aream mittunt. Stramenta relinquunt in ſegete, vnde tollantur in aceruū. Altero modo metunt, vt in Piceno, vbi ligneum habent incuruum batillum, in quo ſit extremo ſerrula ferrea.

Hec quum comprehendit fascem spicarum desecat, & stramenta stantia in segete relinquit, vt postea subsecuntur. Tertium modo metitur, vt sub vrbe Roma & locis plerisq; vt stramentum mediū subsecant, quod manu sinistra summumprehendunt, à quo medio messem dictam puto. Infra manum stramentū, quod terra hæret, postea subsecatur. Contrā, quod cum spica stramentum hæret, corbibus in areā deferitur, ibi discedit in aperto loco palam, à quo nominata esse potest palea. Alii stramentū à stando, vt stamen dictum putant. Alii ab stratu, quod id substernatur pecori. Quum est matura seges, metendum, cum in ea iugerum ferè vna opera, propemodū in facili agro satis esse dicatur, vt messas spicas in aream corbibus deferre debeant. Quæ seges grandissima, atq; optima fuerit, seorsum in areā secerni oportet spicas, vt semen optimum habeas. E spicis in area excutigrana: quod fit apud alios iumēris iunctis, ac tribulo id fit, è tabula lapidibus, aut ferro exasperata, quo imposito auriga, aut pondere grādi, trahitur iumēris iunctis, vt discutiat è spica grana, aut ex assibus dentatis cum orbiculis, quod vocant plostellū pœnicum. In eo quis sedet, vt agitet, quæ trahunt, iumenta, vt in Hispania citeriore, & aliis locis faciunt. Apud alios exteritur grege iumentorum inacto, & ibi agitato perticis, quod vngulis è spica exteruntur grana. Histritis, oportet è terra subiacuari vallis, aut ventilabris, quum ventus spirat levis. Ita fit, vt quod leuissimum est in eo, atq; appellatur acus, euannatur foras extra aream, ac frumentum, quod est ponderosum, purum veniat ad corbem. Messe facta, specilegium venire oportet, aut domi legere stipulam, aut si sunt spicæ raræ, & operæ caræ, compasci. Summa enim spectanda, ne in ea re sumptus fructum superet. Hesiodus tempus messim incidendi ita eleganter describit:

Quum caelo emergunt sublimi ab Atlantide nata

Pleiades, truncanda Ceres, morientibus illis

Mitte in aratra bones, latitare ea sydera dicunt

Viginti, totidemq; dies, annoq; voluto

Apparent iterum: maturam incidere messim

Rursus & incipiunt dentata falce coloni.

Columella Varroni multa addit perneccessaria. Quum matura fuerit seges, antequam torreatur vaporibus æstiuu syderis, qui sunt vastissimi per ortum Caniculæ, celeriter demetatur. Nam dispendiosa est cunctatio. Primum quod auibis prædam, cæterisq; animalibus præbet. Deinde quod grana, & ipsa spicæ culmis arentibus, & aristis celeriter decidunt, si verò procellæ ventorum, aut turbines inceserint, maior pars ad terram defluit, propter quæ recrastinari non debet. Quum rubicundum colorem traxerunt, messis faciendae est, vt potius in area, & in acerno, quàm in agro grandescant frumenta. Constat enim, si tempestiuè decisa sint, postea capere incrementum. Sunt autem metendi genera complura. Multi falcibus vericulatis, atq; iis, vel rostratis, vel dēticularis medium culmum secant, multi mergis, alii pectinibus spicam ipsam legunt;

gant, idq; in rare
ges cum parte cu
riur, & sabinde
tūmodo recise
lis excuti, vel ext
dubium est, qu
sunt, adicere tri
minuit. Ipsa aut
vbi paleis immis
eximius, qui leni
est agricolæ, qui
derita frument
ribus diebus tile
vasta tēpestas ir
Florentinus Gre
Galliarum larifu
tis per segetem in
lum cadunt spica
gites spica disten
ab se obiter agru
vbi stipula dom
stramento pale
gressibus exteri
piolius inuenitur
ma, antequam g
lum verò: Bidu
Nil egimus, si
ea quod non leg
wis eadem ad re
miliū, quæ dat
quàm triticum,
reis calce laui
non penitus exi
nus arefactum p
decurenim in a
messum durare
post messem ex
li aspersiōnem
meccatum, sole
ricur & exilius
nais atque ani

gunt, idq; in rara segete facillimū, in dēsa difficillimum est. Quod si falcibus seges cum parte culmi demessa sit, protinus in aceruū, vel in nubilium congeritur, & subinde opportunis solibus torrefacta proteritur, sin autē spicæ tantūmodo recisæ sint, possunt in horreū conferri, & deinde per hyemē, vel baculis excuti, vel exteri pecudibus, at si cōpetit, vt in area teratur frumentum, nihil dubium est, quin equis melius, quā bubus ea res conficiatur, & si pauca iuga sunt, adiciere tribulam & traham possis, quæ res vtraq; culmos facillimē comminuit. Ipsæ autem spicæ melius fustibus tunduntur, vannisq; expurgātur. At vbi paleis immista sunt frumēta, vento separētur, ad eā rem Fauonius habetur eximius, qui lenis, æqualisq; æstiuis mensibus perflat, quē tamen operiri lenti est agricola, quia dum expectatur, sæua nos hyems deprehendit. Itaq; in area detrita frumenta sic sunt aggerāda, vt omni flatu possint excerni. At si cōpluribus diebus silebit aura, vannis expurgētur, ne post nimīā ventorū segnitie m vasta tēpestas irritū faciat totius anni laborem. Palladius nil noui habet, neq; Florentinus Græcus. Plinius non spernenda describit. Messis ipsius ratio varia. Galliarum latifundiis valli prægrādes dentibus in margine infestis, duabus rotis per segetem impelluntur, iumento in contrarium iuncto, ita direptæ in vallum cadunt spicæ, stipulæ alibi mediæ falce præciduntur, atq; inter duas metegites spica distringitur. Alibi ab radice euellunt. Quod qui faciunt, proscindi ab se obiter agrum interpretantur, quum extrahant succum. Differentia hæc, vbi stipula domos contegunt, quam longissimam seruant: vbi fœni inopia est, stramento paleam quærunt. Messis ipsa alibi tribulis in area, alibi equarum gressibus exeritur, alibi perticis flagellatur. Triticum quò serius metitur, copiosius inuenitur, quo celerius verò, hoc speciosius, ac robustius. Lex aptissima, antequam granum indureseat, & quum iam traxerit colorem. Oraculum verò: Biduum celerius messem facere, quā biduo serius.

Nil egimus, si seuiamus & collegimus, nisi optimè cōdamus, & seruemus, circa quod non segnis agricolarum cura fuit. Theophrastus dixit: seminibus non vis eadem ad reseruandum vtiq; datur. Quædam reseruari egregiè possunt, vt milium, quædam celerrimè pereunt, vt aphaca, & siliqua, & ordeum celerius, quā triticum, & puluerulentum celerius, quā purgatum, & quod in horreis calce læuigatis conditum est, quā quod in non ita læuigatis. Triticum non penitus exiccare patiuntur, quod ad reddendam farinam melius minus arefactum putatur, qua de causa in acervos componere assolent: videtur enim in acervo crassescere potius, quā attenuari. In spica nondum messum durare maximè potest. Quærit etiam in causis, cur triticum si post messem expandatur, peius habeat, quā si cumuletur acervatim? Alii asperisionem aquæ instituant? Ratio est, quia expansum ab aëre humectatum, sole superueniente cum humiditate illa proprius succus exhauritur & exilius semen fit, at in meras coacervatum, vapor terræ præternis atque animalis semen subit, & superpondium auget. Idem etiam

Cōditura.

euenire contingit, quum in horreis fusi repositum est, ascendente enim vaporem retinet, ut non abeat. Immo in foueas mittunt, ut magis crescat. Argumento etiam est, quod admista terra cōseruat, ne laboret vitio vlllo, & magnificat illud, & habitius facit. Addit etiam, quod semina trahere sibi alimentū sine radicibus possunt. Iccirco non ab re dictum esse, ab aëre, & a ventis quoque ali posse. Sed cur puluerulentum triticum putrescit, & reconditum horreis rectorio opere laugatis? causa est calor extraneus, qui in puluere reperitur, & calcis illimento: intus enim calor proprius obsidetur, suffocatumq; feruefacit, ac putrescit, & plus caloris exoritur. Ordeum celerius, quàm triticum peritū dicitur, quia triticum magis solidum, & magis vestitum tunicis. Cuius remedio est protinus area illita, & triticum ventilatum, Columella: Pura frumenta si in annos reconduntur, repurgari debent, nam quanto sunt expolitiora, minus à curculionibus exeduntur: sin protinus vsui destinantur, nihil attinet repoliri, satisq; est in ymbra refrigerari, & ita granario inferri. Horreum, & remedia ad condituram frumentii iam primo libro docuimus.

De panificio. CAP. XVI.

SEQVITVR triticum panificium. Panis vocabulum à pano dici Varro putat. Messapios redundantiam & saturitatem appellasse paniam testis est Athenæus, unde Latini nomen de flexerunt. Nauticum panem intelligimus, qui verus, & siccus sit, dictus bis coctus, quem Græci *διπλουν* vocant. Syncomistos, vel autopyros panis, Galeno auctore, est, qui ex omnibus suæ farinae partibus citra vllam detractionem constat, inter fufuraceum, & similagineum medius. Syncomistos quasi confusaneus dictus, quod omnes simul tulerit furfures, vtriculos, & similam. Vtriculos volunt id, quod furfure melius est, & simila deterius. Autopyri panes, qui furfure tantum leuiter succreto fiunt, qualis ferè secundarius est. Fieri autem solet, ut Galenus ait, quories triticum generosum non est: generosum, inquit, vocatur, quod similaginis plus habet, quàm fufuris. Præfertur omnibus sanitatis vsu à Galeno clibanites, à clibano, Varroni testaceus dicitur, quod in testo calido coqueretur, nam quod clibanum Græci, Latini testum dicunt. Diphilus Siphnius panem ordeaceum tradit vberius alere vires, faciliusq; in membra distribui, quapropter ii primatum tenent, secundas partes sibi vendicant similaginei, quos triticei sequuntur, & hos ii qui ex noua farina subacti sunt. Philistion Locrus ex similagine confectos panes plus corporis robur firmare prodidit, post hos ex alica, deinde ex farina triticea coactos. Ex polline facti minus alunt, ventos creant, nec agrè membratim digeruntur, siccari opulent, & difficilior in corpus permeant. Subcineritius stomacho grauis, & quod inæqualiter torreatur, ægrius membra subit. Clibanites longè magis viribus pollet, & sanitatis vsu prælatus, probum creat succum. Stomacho placet, faciliè coquitur, nec ventrem coercet, nec spiritus distendit. Andreas Medicus ex ficu Egypti panem fieri

fieri scriptum reli-
lorum sentiant de
ceus panis maxim
tiam habeat, quæ
corpori debeat. P
sal exicat: ablu
tur humor à sale
insidens efficit gr
rare Didymus, ni
etiam carnem. A
nem faciant, in a
nantes tollunt
rur, & panes faci
re velis, quum in
ceprum cum farin
ad solem siccatas
pro fermento vte
rentinus ait, clib
concoctilem esse

NON parum
sionis è nat
lolum, sed in ali
quod species qu
tum ob eam ip
subest admirati
cilla nunc in ro
est enim lolium
ciebus robustio
ta, id peractis
quia non videm
ergo quod muc
solutio. His de
uenire sine vll
bribus oppletis
seminis deprau
prum est, facta
mutationem ill
est, si sint mut

fieri scriptum reliquit, quem vocant sycaminitem, quo qui vescuntur, capillorum sentiunt defluvia. Aristoteles libro problematum inquit, quod triticeus panis maximè corporibus nostris vescentior est, quod mediocrem lentitiam habeat, quam cibus habeat oportet, quippe adharere, conglutinarique corpori debeat. Præterea non salitos panes plus ponderare, quàm salitos, quia sal exiccat: absumitur enim à sale humor, qui ex calore putrescit. In pane igitur humor à sale consumitur, extraque afflatur, & qui sale vacat, humor largius insidens efficit grauiorem. Iucundissimum panem citra fermentum docet parare Didymus, nitrum adiciendo, etenim nitrum panes friabiles facit, velut etiam carnem. Alii panem absque fermento sic faciunt: Vnas pridie quàm panem faciant, in aquam coniiciunt, & sequenti die ubi panem facere volunt, innatantes tollunt, ac exprimunt, effluenteque humiditate pro fermento vtuntur, & panes faciunt iucundiores. Si verò in totum annum fermentum habere velis, quum in doliis mustum ebullierit, spumosum illud, quod efferbuit, acceptum cum farina milii commisceto, diligenterque trita, in massas cogito, quas ad solem siccatas in humido loco repones, inde sufficienti accepta quantitate pro fermento vteris. Panes sine fermento efficacissimi sunt ad venerem. Florentinus ait, clibanitem panem graciliter efformatum, & in sole arefactum concoctilem esse, in furnis coctum, grauius concoqui.

Mutationis tritici in lolium & e contra, cause, & disquisitiones. CAP. XVII.

NON parum maximi Theophrasti animum anxio causæ disquisitio egressionis est natura speciei, non solum in affines, & congeneres, vt tritici in lolium, sed in alienigenas, vt lini in lolium, quum natura conueniens non sit, quod species quæpiam se ipsam amittat, & in aliam commeat. Mirandum sanè tum ob eam ipsam mutationem, tum ob eius peculiarem euentum. Alia etiam subest admirationis ratio, quod vt robusta mutantur in debiliora, sic & imbecilla nunc in robustiora mutantur, quum lolium in triticum, & ordeum mutetur: est enim lolium quasi ferum triticum, & omnia agrestia sunt mitibus suis speciebus robustiora. Præterea mutatio & corruptio est seminis, vel plantæ, si plantæ, id peractis radicibus contingit, sed radices mutari absurdum penitus est, quia non videmus segetem mutari, remanet ergo radix ab initio. Semen est ergo quod mutatur, seminis igitur erit lactatio, putrefactio, aut in totum resolutio. His de causis nonnulli negarunt omnino has degeneraciones, sed euenire sine vilo tritici, vel ordei fatu, & lolium sponte nasci in aruis multis imbribus oppletis, ab imbribus ergo gigni lolium, non autem è primordiis tritici seminis deprauari. Sed his hæc aduersantur obiectiones. Quod à multis acceptum est, facta tritici, ordeive semente lolii messem habuisse, ergo ab radice mutationem illam fieri posse docebimus: nam radices mutatas esse necesse est, si sint mutata folia, & ob id seminum mutationem fieri, sed non à se-

mine corrupto : à semine nanque corrupto nil prodire certum est ; nec radix corrupta nutriendi posset officio fungi. Sed seminis corruptionem aut putrefactionem, aut lactationem esse non intelligimus, sed aliam, quæ præ nimia nutriendi copia seminibus deliquescentibus euenit, quæ non ex toto semina perdit, sed victo naturali principio, in aliud genus traducit, exemplo sumpto ab animalibus : nam si fœmina robustior sit mare, fœminam pariet, vel si aliqua mutatio accidit, monstrum : terram nanque fœminam capi debere, & reliqua ad proportionem. Quum igitur terra imbrium frequentia largiorem alimenti copiam præstat, tunc degenerandi occasio euenit, quæ generandi vis non penitus aboleretur, sed fit alia. Quod autem natura seminum viuax sit, ac sanè viuacior, quàm animalium natura, plus quoque durare ratio est : nam & sine seminum origine pleraque plantæ tum grandes, tum humiles sponte naturæ consistunt. Ob id liquido fit, non herbar, sed seminis alteratione mutationem illam oriri, donec portionis seruetur existimatio. Si animalium mutationem intuebamur, mutato semine, videmus mutari animalia : nam asini semen ab equi semine alteratum, conformatur in mulum, tunc quum semen imbecille est : tunc ergo mutari arbitrandum, quum imbecilla planta est, ac in primo ipsius vestibulo generationis, quum enim est in eo traiectu vnius status in alterum, facillè potest aliofsum impelli, quia in motu est, postquam verò nata est, talis esse pergit, qualis exiit, nec fit amplius plantæ mutatio, sed diminutio tantum, & augmentum. Et rei rusticæ consulti, ex primis ortus rudimentis lolium existere, non fore dicunt, cognosci quæ id ex folii colore, & magis saturata viriditate, & quod pinguius & strictius sit, non autem prodire frumenti folio, quod postea fiat lolium. His rationibus semen causam habere apparet, nec aspernandam esse sententiam iudicamus, quæ radici assignat causam, vt ab ea ortum habeat vitium mutationis. Siquidem vnum quodque ortum à sua origine secunda incipit, est enim semen principium primum, radix secundum, vt in arboribus videre est, quæ fructus suos cultura immutat, ex acidis, amarisque in dulces, vel ex nucleosis in enuclea-
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000

pter radicum rob
 rd, quæ imbecilli
 misq; imbribus a
 quæ tempore ve
 cipiunt. Cæterum
 lium, causa est, q
 gmina non hab
 Sed triticum ob a
 frumenti eueni
 10 teris prouenit, h
 cælum alteratio
 ratione omnino
 conuenienter st

D I C E M U S
 conditio ha
 quit, in pane præ
 longè, aut magn
 solo per terra
 20 tritici delicias di
 rum de filigine
 lumella vitii tri
 ticu omne vligin
 Preterea ponder
 vitilabem, & in
 vocat, ac veluti
 lum auidius eff
 laudatissimum
 thores non nisi
 30 go vrbani ha
 dere deficiat, qu
 syluestrem habi
 mus. Ob id Plin
 nem, & vrbani
 triticum filigia
 præclaros auth
 Siligo frum
 quidem, vt etia
 quidem purissi
 40 mus munda

pter radicum robur, & numerum, ob id resistere infirmius possunt: cetera vero, quæ imbecillia sunt, penitus pereunt: tempus enim satus maximis, plurimisq; imbribus afficitur, & diu in terra detinetur, obsideturq;. Cetera verò, quæ tempore verno seruntur, blando cœli tepore, germinare confestim incipiunt. Ceterum fabæ, quæ cum tritico seruntur, cur non mutantur in lolium, causa est, quia mutationes fiunt in propinqua genera, quare quum legumina non habeant, in quod mutantur, pereunt in aditu ipso corruptionis. Sed triticum ob affinitatem in lolium mutatur. Mutationes quæ inter genera frumenti eueniunt, quum ex tali, tale triticum, vel ordeum vel aliquid ex ceteris prouenit, haudquaquam miranda sunt: tempus enim, & alimentum, & cœlum alterationes efficiunt animalium pariter, & plantarum, quæ quidem ratione omnino ad genus mutandum qualitatem quantitatemque alimentum conuenienter statuendum censemus.

De siligine. CAP. XVIII.

DICEMVS de siligine post triticum, quum inter tritici genera secunda conditio habenda sit siliginis, vt Columella admonet. Cuius species inquit, in pane præcipua, pondere deficitur, vitiumque esse ait tritici, nec eam longè, aut magna difficultate requirendam esse: nam triticum omne vliginoso solo per tertiam sationem conuerti in siliginem. Plinius siliginem propriè tritici delicias dixit, non vitium, ac biennio verti in triticum. Sed sunt qui parum de siligine inter Columellam & Plinium conuenire censeant. Nam Columella vitium tritici esse contendit, nec magnopere requirendum esse: quum triticum omne vliginoso solo creditum post tertiam sationem in siliginem conuertatur. Præterea pondere à tritico deficere, ac breui in triticum desciscere, nonnullam vitii labem, & infirmitatis argumentum ostendit. Plinius verò delicias tritici vocat, ac veluti delicatam molliem pondere defectam, quum & semen nullum audius esse tradat, nec quod plus alimentum trahat, candore præstare, laudatissimum è siligine panem, operaq; pristino laudatissima. Sed hi aucthores non nisi de vrbantate, & feritate tritici differunt: ostendit quippe siligo vrbani habitum, quod præstat candore & mutica spina, sed virtute & pondere deficiat, quum triticum pondere, virtute, & aristis præcellat, quæ omnia syluestrem habitum in stirpium physiognomoniam demonstrare iam ostendimus. Ob id Plinius tritici delicias, quasi tritici delicationem, & suauiotem panem, & vrbani ostenderet, & siligo neglecta in triticum degenerat, quasi triticum siliginis vitium sit: vnde nil controuersie & dissensionis inter hos præclaros auctores competient, qui hæc sana mente diiudicabunt.

Siligo frumentigenus videtur Galeno, & σιλιγγον vocat. Apud Romanos quidem, vt etiam apud alios propemodum omnes, quibus ipsi imperant, panis quidem purissimus σιλιγγιτης, id est, siligineus vocatur, qui autem huic proximus σιμιδαλιτης, id est, similaceus nuncupatur. Verum σιμιδαλις, Græcum

quidem nomen est, & antiquum: *σείγις* verò neq; Græcum est, neq; ipsam aliter possum exprimere. Putant Hermolaus, Manardus, & Ruellius similiginem olyram dici à Græcis, sed aperto errore labuntur, ut ex his paulo post videbimus. Latini Catone, Varrone, Columella, & Plinio auctoribus, siliginem vocant. Neapolitani *grano cacosello*, quod muticam spinam ferat, nam *caru-sum* vulgò vocant caput glabrum & capillis vacuum. Aliis Italiæ locis *caluissum* vocari audio à grani caluitie, quod aristis vacet.

Descriptio.

Plinius ita describit. Siligo nunquam pariter maturefcit, nec vlla segetum minus dilationem patitur propter teneritatem, iis, quæ maturuere protinus granum dimittentibus: sed minus quàm cætera frumenta in stipula periclitatur, quoniam semper rectam habet spicam, nec rorem continet, qui rubiginem creet. Far sine arista est, item siligo, excepta quæ laconica appellatur. Campana siligo rufior, Pisana candidior. Siligo sine pondere est, & sine virtute est. Apud nos triticum, quod *grano cacosello* vocari diximus, ut reliquum triticum surgit, sed non tam multiplici stipula, nec tam crasso culmo, spicam sine arista fundit. In spica granum ferè rubellum, alibi album, sed farinam omnium candidissimam & leuem facit, cuius modius quindecim ferè libris minus pender, quàm reliquum triticum. Panis primæ dotis, & præstantissimus pistorum suffragio receptus, magnatum mensis apponitur, ob id cæteris carius venditur.

Calum.

Caro, Siliginem in loco aperto, & celsso, ubi sol quamdiutissimè fiet, feri oportet. Columella verò: densa, cretosa, & vliginosa humus siliginem non incommodè alit, & locis manantibus magis apra est, nec tam en ea longè nobis, aut magna difficultate requirèda est: nam omne triticum solo vliginoso post tertiam sationem conuertitur in siliginem. Plinius ab his. Siligo conueniens humidis tractibus, qualis Italiæ sunt, & Galliæ comata, sed & trans Alpes in Allobrogum tantum, Aruernorumq; agro pertinax. In cæteris ibi partibus biennio in triticum transit. Remedium, ut grauissima quæq; grana eius ferantur. Præcellit in Italia, si Campana Pisis nata misceatur. Rufior illa, at Pisana candidior, ponderosior verò cretacea. Siliginem in loco aperto, æditoque qui sole quàm diutissimè torreatur, ferito. Sed si bi Plinius planè aduersatur, qui modo aprico loco, & edito, & torrefacto siliginem feri præcipit ex Catone, quò prius ex Columella dixerit vliginoso, & humidis tractibus. Sed id fuit in causa, ut opinor, quod alia est tritici species, siligo Catonis à communi nostro, & Columelle. Sed Matthiolus increpat præsei seculi vecordiã tam excellentis frumentis speciem, & propagationem sic neglectam habuisse, ut non solum in Italia, ubi maxima sedulitate & diligentia circa gulæ cupidias fatigantur homines, sed & in Europa desideretur. Sed immeritò, quum in tota Capania nostra, & locis finitimis amplissima segetes huius frumeti ad præstantissimi cibi usum diligentissimè colantur. Nos in Venusinis vliginosis, & depressis aruis, ubi reses aqua, farã vidimus: nec incolæ adduci possunt, ut credant siliginem tritici vitium ex loci vligine, vel ex siccitate in triticum verti, quò per se proprium genus prædicent.

M. Varro

M. Varro in pin-
lumella locis ma-
solum sortiri in

Columella. u-
quàm ut prius di-
tus locus, idemq;
macet tantunde-
spicam facit, ar-
gere densam fa-

10 quatuor, occato-
riuntur, runcato-
rarum decem, &

scit pariter, nec
iis, quæ maturue-
vliginoso solo, u-
sicca, & lara qua-
cam minutam fa-
numerosum fur-
liginem Nouen-

10 est diebus: singi-
eodem modo,

Plinius. Silig-

Galenus, ut a-
ceus, Siligineus
co medius. Plini-
darissima. luttu-
dire sextarios o-
Præterea floris-

10 tor, futforis
tera paria sunt.

stat. Amylum e-
in alueum inda-
geto bene, in al-
reum nouum in-
id omne ita faci-
ubi arebit, in ol-
lum fieri ex om-

40 P O s t siligi-
lumella in

M. Varro in pingui solo rectius feri dixit, quæ succi sunt maioris, ut siligo. *Columella* locis manantibus magis aptam esse. Plinius, cretosum & vliginosum solum sortiri: in pingui ferenda, quæ cibi sunt maioris, ut siligo.

Columella: si mediocriter cretosus, & vliginosus ager est, etiam paulo plus, *satio*. quàm ut prius dixi, quinque modis ad sationem opus est, at si siccus, & resolutus locus, idem quæ vel pinguis, vel exilis est, quatuor, quoniam & contratio macer tantundem seminis poscit: nam nisi rare conferitur, vanam & minutam spicam facit, at ubi ex vno semine pluribus culmis fruticauit, etiam ex rara segete densam facit. Siliginis modii quinque bubulcorum operas occupant quatuor, occatoris vnam, sarritoris duas primum, & vnam quum iterum sarriuntur, runcatoris vnam, messoris vnam & dimidiam, in totum summa operarum decem, & dimidia, quot erunt tritici. Plinius: Siligo nunquam maturefcit pariter, nec vlla segetum minus dilationem patitur propter teneritatem, iis, quæ maturuere protinus granum dimittentibus. In denso, aut cretoso, aut vliginoso solo, tritici aut siliginis modios sex serito: in soluta terra, & nuda, & sicca, & læta quatuor. Macies enim soli maior, nisi rarum culmum habeat, spicam minutam facit, & inanem. Pingua arua ex vna seminis radice fruticem numerosum fundunt, densam quæ segetem è raro semine emittunt. Serunt siliginem Nouembri mense. Siliginem occato, sarrito, runcato quibus dictum est diebus: singulæ operæ cuique generi in iugero sufficient. Seritur apud nos eodem modo, eadem quæ cura, ut triticum.

Plinius. Siliginis & tritici eadem ratio in area, horreo quæ

Galenus, ut diximus, ait. Purissimus panis siligineus, huic proximus similaceus. Siligineus plurimum alimenti præstat, post ipsum similaceus, tertio loco medius. Plinius: E siligine laudatissimus panis, pistrinarum quæ opera laudatissima. Iustum est è grano Campaniæ, quam vocant castratam, è modio reddere sextarios quatuor siliginis, vel è gregali sine castratura sextarios quinque. Præterea floris semodiu. Et cibarii, quod secundarium vocat, sextarios quatuor, fufuris sextarios totidem. E Pisana autem siliginis sextarios quinque, cætera paria sunt. Panis summa laus siliginis bonitate, & cribri tenuitate constat. Amylum ex siligine facere ita docet Cato. Siliginem purgato bene, postea in alueum indas, eò aquam addas bis in die, die decimo aquam exiccato, exurgeto bene, in alueo puro miscro bene, facito quæ tanquam fex fiat. Id in linteum nouum indito, exprimito cremore in patinā nouam, aut in mortarium, id omne ita facito, & refricato denuo. Eam patinam in sole ponito, ut areseat, ubi arebit, in ollam nouam indito, inde facito cum lacte coquat. Plinius amyllum fieri ex omni tritico dicit, ac siligine, sed optimum ex trimestri.

De trimestri tritico. CAP. XIX.

POST siliginem de trimestri, siue bimestri tritico agemus. Est enim, ut *Columella* inquit, siliginis species, & tertium tritici genus, cuius vltus agricola

lis gratissimus: nā vbi propter aquas, aliāve causam matura satio est omīssa, praesidium ab hoc petitur. Sed diuersum genus est Theophrasto. Inquit enim, Sua illorum satio est, quæ genere discrepant, vt tritici genus quoddam, quod trimestre appellant, quoniam per tantum temporis perfici possit. Et alibi genera frumenti enumerās, ait, Quibus & trimestrium annumerari genus par est, & bimestriū, & si quid intra pauciores dies valeat cōsumari. Et libro de causis quærit, cur congenera non pari tempore omnia perficiātur, sed triticum aliud bimestre, aliud trimestre sit, & si quid aliud sit, quod festinantiū perfici possit. & sic multis aliis in locis, trimestribus à tritico separatā esse formā innuit, quemadmodū & ipsa quoq; trimestria diuersis locis differre videmus, nec eiūsdē succi, ponderis, & formæ esse. Sed id est cōtra Columellæ sententiam, ipse nanq; nullum putat trimestre genus: nā etsi sic appellatur, cū tritico satum nihilominus prouenire. Neq; enim est vllū, inquit, (vt multi crediderunt) natura trimestre semen, quippe idē iactum autumno melius respondet. Plinius Columellam falli dixit, qui ne trimestre quidem proprium genus existimauit esse, quum sit antiquissimum: *τριμηνών* vocant. Nos autem quod sentimus in medium afferemus. Verum est quod Columella tradit, agricolas si quando malè cessit autumnus commentos hanc sationem pro subsidio, ac optimè prouenire. Et apud Samnites, quia triticum hyemis rigores, & imbres perferre neutiquam potest, satio in vernum tempus differtur, non quod autument, si alibi, vbi cælum indulgens sit feratur, non prouenire, vel quod proprium genus sit, sed solum quod omīssa tempestiua autumnī sementis occasione, vel per imbres, vel niues, aliāve incommoda, huius serotina satione vtuntur, quod felicius longè proueniret, si eodem, quo reliqua genera tempore humo mandarentur, etsi quæ verno tempore ferunt, alibi autumno ferantur, vberius proueniunt. A nobis commune triticum vere satum tulit, sed minima radice, imbecillo trunco, & spica, sed nos serimus ante brumam vt firmius radiceretur, & plures culmos ferat; nam semper, & vbiuis gentium satum prouenit & fert, dummodo nimio calore, vel frigore non intereat. Sed genus trimestre Theophrasti, vel Italiæ incognitum, vel triticum pluribus annis veresatum quoddam genus constituiſſe, vt vberius vere satum iisdem in locis proferat, alibi verò satum degenerabit in vernaculum. Nā, vt idem Theophrastus ait, continuatio vnius rei mutat naturam eius, vt genus diuersum videri possit: vnde non specie differre, sed imbecilliore quadam constitutione hoc trimestre triticum à vernaculo differre putarem.

Nomen.

Græci *τριμηνών* vocant, vt apud Theophrastum, quod tertio à satū mense metatur. Dioscorides, & Galenus sitanium vocant. Sitanium dicit Galenus est triticum instantis anni, quod vere feritur. Setanium Articē, quasi purum, vt Phocioni placet. Plinius: Græci trimenon vocāt. Latini trimestre. Itali & Neapolitani *grano marzolino*, quod Martio mense terris manderetur iis locis, in quibus vsque ad id temporis niues supra terram derinentur.

Est

Est genus triticum quoddam intra esse, ac ponderosius volunt. Et bimestre sunt, sed hæc pauciores iucunda sunt. Caristum. Trimestre admodū est, huiusmodi solum, quod nulli frumento

10 chaia, montosis

Theophrastus vnicalem, ait: quæ de causis quod minus est, terum parce, aliter trahat. Excerptum haud multum tem

20 mos pauciores re feratur, frigida ramina radice ciunt, quod in

Columella: sine vaporibus meo ipsam celeriter Si verò locorum to commodius prouincis nulli quod quadraginta

30 to plus esse possit vitæ; partit triticum non frigidis locis gelicidias ex tur, frigus toler

Theophrastus causis. Alimentum Trimestrem quod stibilis crassius Columella Fidis regionibus

Est genus trimestre, & bimestre, Theophrastus inquit, & in Eubœa genus Genus
 quoddam intra quadraginta dies crassari, perficiq; posse affirmât, idēq; firmū
 esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leue, nec multū in hoc fursuris esse
 volunt. Et bimestria quædam habentur, quæ ex Sicilia, & in Achaiam aduecta
 sunt, sed hæc paucū reddunt, parumq; fecunda habētur, quamq; cibo facilia
 & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud
 Caristum. Trimestria verò per multa, & ubiq; habentur. Vernū etiam durum
 admodū est, hybernū autem molle. A quo Plinius. Est & bimestre circa Thra-
 cium sinum, quod quadagesimo die, quam satum est maturescit: mirum quo-
 10 nulli frumento plus esse ponderis, & fursuribus carere: vtitur eo Sicilia, & A-
 chaia, montosis vtraque partibus. Eubœa quoque circa Caristum.

Theophrastus ita describit. Trimestre triticum leue est, & parū fecūdum, Descriptio
 vnicalamum, atq; in totum infirmum, paucis radicibus paucisq; culmis confi-
 stit: qua de causa sursum continuo nititur, atq; celeriter consummat, nam
 quod minus est, perfici facilius potest. Hinc etiam alterum largè frutificat, al-
 terum parcè, alterum facile, alterum graue, quum plus alimenti & turbulen-
 tius trahat. Excursus quoq; præpropere agitur, quum in condendis radicibus
 haud multū temporis consumat. Si vere obferatur, velocius nascetur, & in cul-
 mos pauciores spargetur, & spicam parua, & parum fertilem geret. Si matu-
 20 rē seratur, frigus tolerare non poterit, suæ causa imbecillitatis. Sic enim vete-
 ra minus radices agunt, sed sursum protinus tendunt, atq; ita celerius se perfici-
 ciunt, quod in omnibus ferè vitam breuem agentibus constat.

Columella: Trimestre locis prægelidis, ac niuosis, ubi æstas est humida, & Colum.
 sine vaporibus rectè committitur, cæteris admodum raro respōdet, quam ta-
 men ipsam celeriter & vtiq; ante æquinoctium vernum conueniet peragere.
 Si verò locorum, & cæli conditio patietur, quanto maturius seuerimus, tan-
 to commodius proueniet. Plinius: Totis Alpibus hoc notum, & hyemalibus
 prouinciis nullum hoc frumēto latius. Est & bimestre circa Thracium sinum,
 quod quadagesimo die quam satum est, maturescit. Mirumq; nulli frumen-
 30 to plus esse ponderis, & fursuribus carere. Vtitur eo Sicilia & Achaia monto-
 sis vtraq; partibus. Eubœa quoq; circa Caristum. Dicimus nos quod trimestre
 triticum non frigida & niuosa querit, nam eius nuda forma non tale admittit,
 sed frigidis locis, ubi triticum feri autumno non potest, serunt trimestre vere,
 gelicidiis iam exactis. Id confirmat Theophrastus: Trimestre si maturē sera-
 tur, frigus tolerare non poterit, suæ causa imbecillitatis.

Theophrastus triticum trimestre solo tenui melius fieri tradidit, libro de Solum.
 causis. Alimentū enim subministrari modicū eo potest, hoc est leue leui. Cato,
 Trimestrem quo in loco sementem maturā facere nō poteris, & qui locus re-
 stibilis crassitudine fieri poterit, feri oportet. Plinius montosis partibus, dixit.
 40 Columella Februario trimestrium sationem non esse alienā dicit, quāuis te-
 pidis regionibus melius administretur per mensem Ianuar. Plinius. Februario

trimestria ferantur. Si trimestria bruma ferantur, non ferunt frigoris incommoda, quippe necessario debet vernum tempus trimestribus propter imbecillitatem, non autem feruari ad deficientis prouentus subsidia, ut Columella sentiebat, ex Theophrasti opinione.

Trimestre triticum facile est, quasi minus terræ in seminibus sit propter temporis breuitatem: quæ enim non multum terræ attrahunt, sed leuiori paulo vegetantur, vsum quoque cibarium faciunt leuiorem.

De tipha cereali. CAP. XX.

DE cereali tipha agendum nobis est: ea enim duplex est, palustris, & cerealis. meminit vtriusque Theophrastus: palustris libro quinto, capite tertio decimo, & primo capite octauo, Dioscorides tertio. Cerealem impræsentiarum describemus. Theophrastus è genere tritici, triticoque simillimum aspectu scribit, tantamque affinitatem inter ea esse, ut nullum offendi frumenti genus possit, quod in aliud transire tam facile queat, quam tipha, & zea, siue semen. Sed paratu quodam, arteque fieri ait, si pinfit, hoc est tusa ferantur, in triticum transire, idque non protinus sed anno tertio. Quod simile ferè fit, atque quum femina ratione locorum permutantur: nam ea quoque singulis in locis, temporis spatio ferè pari, atque tipha mutantur, cuius rationem libro de causis reddidit: quale nanque semen redditur, tale generat, vnde si alteratum committitur, facile commutatur: si pars aliqua tiphæ semini desit, affici oportet, vnde mutari necesse est, nec eandem paleæ altitudinem retinet, præterea sua imbecillitate semen nil tolerare potest.

Nomen.

Genus hoc vnum tiphæ duplici nomine insignitum putat Mnesitheus, scilicet quod aliis *ῥῖφι*, aliis *ἀνύγε* dicatur. Sed nos Mnesitheum falli putamus, quum aliud tipha, aliud sit olyra, ut suo capite videbimus. Theophrasto *ῥῖφι* est, & aliis Græcis: Latinis tipha dicitur. Hermolaus differre putat typham à tipha cereali, quod illa per y græcum scribatur. Briza Macedonum simillima fuit Græcorum tiphæ Galeni iudicio. Sed quid apud nostrates sit, maxima est inter aucthores discordia, & fortasse quia hæc ab illis pertractantur, quibus hæc generare nec inquirere nec ferere curæ fuit. Nos Græcorum tipham vulgare *germanum* nostrum vulgò dictum non dubitamus proferre, quod reliquæ Italiæ *secale* dicitur, quum descriptio, quæ apud Theophrastum extat, nulli melius, quam *germano* vocato quadret, & quæ Latini de secale descripserunt, eadem omnia eidem *germano* conueniant. Vtrumque genus separauimus, non quod diuersas res putaremus, sed ut vnicuique liberum iudicium relinquatur perquirendi, scribendique, & vtriusque historia perlegatur. Maior pars authorum, qui apud me alicuius sunt authoritatis, tipham zeæ speciem faciunt. Sed Theophrasti zeæ à tipha valdè differt, & vtriusque ipse meminit, nec abhorret *germanum* nostrum zeæ speciem esse. Plinius, Tipha apud Græcos est zea.

Descriptio.

Tipha tritici specimen gerit, eique simillima, frumentorum omnium leuissima

uissima constar.
merosa. Nullam
ter tipham & sen
rare, & in proximi
Plinius: Tradunt
si pista ferantur
siligo exceptitia
tipha & ipsa eius
germanum vocat

10 recta rubigini ob
culmo multiplic
gnata res tritico
mi ponderis gra
co flauiori, corp
esse. Hector, H
quum tritici esu
Plinius, & Egy
lenus in Asia na
Theophrasto

20 simplici culmo:
Maturè serit
sto. Postquam
draginta. Germ
dicem, tenui sup
dice, & caule. C
sara in spicas abi
Theophrasto
ire dicit, id est
præmacerata
30 la imperfecta,
germanum. Et

Mnesitheus
alat, nec magnæ
quem Plitarch
titur non solū
seruatus panis
ventre concre
quacis, ut den
le conequat
40 tūm pauperum
stici panifici

uissima constat. Simplici proficiens culmo, sed folliculo multiplici, radix numerosa. Nullum autem genus, quod totum transire in triticum aptum sit, præter tiphā & semen comperies, quia ob imbecillitatem nil penitus quit tolerare, & in proximū degenerat, quæ mutatio & sponte, & arte naturæ euenit. Plinius: Tradunt zeam, & tiphē, quum sint degeneres, redire ad frumentum, si pistæ serantur, nec protinus, sed anno tertio. Adiciuntur his genera, bromos, siligo exceptitia, & tragos, externa omnia ab oriente inuecta, oryzæ similia, tiphā & ipsa eiusdem generis, ex qua fit in nostro orbe oryza. Apud nos surgit *germanum* vocatum fecunda, sed gracili stipula, triticea, & proceriore, spica erecta rubigini obnoxia, innocentioribus arstis, in versus spicatos, radice & culmo multiplici, grano tristi, strigoso, nigricante, glumis implicito, tam cognata res tritico, ut facile alterum in alterum mutetur soli mutatione, & minimi ponderis grano. Mihi sylvestre triticum videtur. Sed Galenus colore tritico flauiori, corpore strigiosiori, exiliori quæ, ut exile triticum appellant, vescūque esse. Hector, Homero teste, suis equis obtulit, eo quæ innoxie depascuntur, quum tritici esu noxam contrahant.

Plinius, Ægypto ac Syriæ, Ciliciæque, & Asiæ, ac Græciæ peculiaris tiphæ. *Galenus* in Asia nasci, regione, quæ supra Pergamum sita est.

Theophrastus tenui solo contentam esse dixit, quia omnium leuissima, & *Solum*.

20 simplici culmo assurgit, nec uti semen, pingue, & latum desiderat.

Maturè seritur tiphā, Vergiliatum occasu, ut triticum, & zeā, ex Theophrasto. Postquam defloruerit, crassatur perficiturque, cum pluribus intra dies quadraginta. Germen ex utroque latere effundit, quippe quæ parte ima, crassaque, radicem, tenui superna herbam propellat. Fit tamen vnum, atque continuum radice, & caule. Cassianus. In propriis locis Maio mense ferenda est tiphā, quum sata in spicas abierit, runcabis ipsam. *Sasia*.

Theophrastus paratu quodam triticū in tiphā, & tiphā in triticum transire dicit, id est si tiphā pin sita seratur, nec protinus, sed anno tertio: sicut ea, quæ præmacerata fructus afferunt dulciores. Nostri agricolæ inquiunt, si grana illa imperfecta, quæ in acumine, & spicæ calce nascuntur, serantur, mutari in *germanum*. Et etiam ieiuno, & squallido solo semina commissa mutari. *Ar.*

Mnesitheus tertiam à tritico, & ordeo sedem assignauit tiphæ, quum satis alat, nec magno negotio conficiatur, præponitque zeā. Idemque Diocles libro, quem Plutarcho dicauit de arborum facultatibus, confirmat. Calidusque expectitur non solum rusticis, sed politioribus, & moroso palato laborantibus. Sed reseruatus panis deterior euadit, quippe qui triduo, aut biduo vescatur, lutum in ventre concretum residere putet, tam ipsius massa tenax est, & lentitiae sequacis, ut densetur, occalescatque, & ipsis etiam rusticis insuauior, & difficile concoquatur. Panis apud nos, qui ex *germano* conficitur, ad arcendum tantum pauperum famem utilis, quum viscosa & tenacis substantiæ sit, unde rusticis in panificio milium admiscet, ut eius friabilitati huius viscositate consula- *Panif.*

tur. Plinius farri admisceri tradit, ut eius amaritudinem mitiget, & quoque sic ingratus est ventri. Noster amarus valde, & ventri admodum ingratus, sed citò de ventre labitur, totius familiæ & laborantium rusticorum famem explet tritico admisto.

Defecale. CAP. XXI.

HERMOLAVS non ambigit vulgarem hanc segalam veterum esse siliginem, quum ab ea toto cælo discrepet. Illa granum candidum, leue, multiplici tunica contextum habet, spina mutica, ex qua panis candidus fit, & primum tenens, ut ex Columellæ & Plinii placitis iam diximus: hæc granum nigrum, striatum, angustum, spicam aristis armatam habet: panis ad explendam famem plebeculæ, quem invita comedit.

Nomen. Diximus ex Theophrasto *πφφ*, Latinis fecalem esse, vel saltem eius speciem. Taurini, Plinio auctore, asiam vocant sub Alpibus. Neapolitani *germano*, quam tritico affinitate, & germanitate diximus coherere.

Descriptio. Plinius sic eam describit. Nascitur fecunda, & gracili stipula, nigritia tritice, sed pondere præcipuum.

Cælum. Cælum sustinet frigidum, ex Plinio, ob id sub Alpibus feritur. Et apud nos frigidis etiam locis.

Solum. Plinius qualicumque solo nasci dixit, cum centesimo grano, ipsumque pro latamine est. Nos sicco, sabuloso, & effæto serimus.

Sætas. Plinius. Occari tantum desiderat. Apud nos feritur ante triticum. Aprilis calce floret locis temperatis, quo tempore tangi non debet, unde quadraginta diebus ad maturitatem pervenit, ante triticum.

Far. Deterrimum, & tantum ad arcendam famem utile. Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem eius, & tamen sic quoque ingratus ventri est, ex Plinio.

De adoreo, sive farre. CAP. XXII.

DIXIMVS de generibus tritici ex Columellæ opinione: nunc ex eiusdem sententia farri genera prosequemur: nam diximus vulgarissima frumentigena, triticum & far. Plinius inquit: Primus antiquis Latio cibus magno argumento in adorea donis. Præponitur zea, quia qui non habent far, zea utuntur.

Antiquitus far *ζα* appellabatur, testis est Dionysius Halicarnaseus, dicens: Vocabant prieci sacras nuptias *παρρηνα*, quia coniuges *παρρη* vescebantur, quod nos Græci zeam dicimus. Et Asclepiades apud Galenum libro nono *ζα* *πρως*. Far veteres, Latini adoreum appellauere, Plinio auctore. Dictumque far à ferendo, quod in terra proferatur: Est far duplex, factitium, & naturale. Factitium, ut Varroni placet, à faciendo dicebatur, quod in pistrino fieret, id est, præpararetur, & contunderetur. Hinc triticeum far, & hordeaceum far pro hordeo dicebant. Columella. Cauea cum matre claudendi sunt, & farre ordeaceo cum aqua in cocto alendi. Idemque. Labrusca de vepribus lecta cum farre.

farre triticeo mi
ne certum quod
edor, deinde lit
quod far adoreu
neribus trecent
denique ipsam à
ris pretium in
qua de causa sta
est. Alii sunt, qu
Fellus, antequa
farro dicitur, ali

Columella
candoris nitidi
sed utrumque; m
tot halicaftrum
que suum genu
niridissimi gran
panis, quam far
Farri genicu

20 spica, qui ut sp
incipiunt, tot
nouen's diebu
derosius est. Fa
herba crassior
ægre è suis glu
incommodum

Varro dem
esse ait. Quoc
mum far, & c
40 subacta, vel

In creta, &
tissimum serie
serunt, quam t
crivrumque. C
quod raro qui
terueniente p
lignosa non in
re minus inf
ticum feritur,
40 sus longioris
brica, & aqu

Farre triticeo minuto obicitur esurientibus. Sed naturali proprie farris nomine certum quoddam frumenti genus intelligitur, quod primum ab edendo edor, deinde literæ primæ immutatione ador appellatum fuit, auctore Festo, quod far adorem dicebatur. Populum Romanum ex omnibus frumenti generibus trecentis annis farre tantum vsum ex Verrio Plinius tradit. Clotiam deniq; ipsam à farris honore Adorem appellabant. Minutius Augurinus farris pretium in trinis nundinis ad assẽm redegit vndecimus plebis tribunus, qua de causa statua ei extra portam trigeminam à populo stipe collata statuta est. Alii sunt, qui ab adurendo dictum putant, quod torreretur, ut inquit Festus, antequam ex eo mola salsa conficeretur in usu sacrorum. Nobis vulgò *farro* dicitur, aliquibus *spelta*.

Columella quatuor genera facit aderei. Far, quod appellatur clusinum *Genera.* candoris nitidi, quod vocatur vennuculum rutilum, atq; alterum candidum, sed vtrumq; maioris ponderis, quàm clusinum. Semen trimestre, quod dicitur halicestrum, idq; pondere & bobitate est præcipuum. Plinius. Gallia quoque suum genus farris dedere, quod illic brance vocant, apud nos sandalum, nitidissimi grani. Et alia differentia est, quod ferè quaternis libris plus reddit panis, quàm far aliud.

Farri genicula sena, sed non ante geniculorum numerum conceptus est *Descriptio.* spicæ, qui ut spem sui fecit, quatuor, aut quinque tardissime diebus florere incipiunt, totidemq; , aut paulo pluribus deflorescunt. Varro quaternouenis diebus fruges absolui tradidit, & mense nono meti. Ordeo ponderosius est. Far sine arista est in Ægypto. Nobis speltæ simile videtur, sed herba crassior, spica maior, rigidior, noxioque aristarum cingitur vallo, ægre è suis glumis educitur, quibus nisi euoluetur, & vsui, & panificio, sit incommodum.

Varro demonstrans in Italia vtensile non modo nasci, sed etiam egregium *Calum.* esse ait. Quod far conferam Campano? Plinius: Ex omnium genere durissimum far, & contra hyemes firmissimum. Patitur frigidissima loca, & minus subacta, vel æstuosa, sitientiaq;.

In creta, & vlgine, & rubrica, & agro, qui aquosus erit, semen adorem potissimum serit Cato. Varro autem: Periti in loco humidior far adorem potius serunt, quàm triticum. Contrà in aridior ordeum potius quàm far, in mediocri vtrumq;. Columella, Aderei genera propterea custodienda sunt agricolis, quod raro quisquã ager ita situs est, vt vno semine contenti esse possimus, interueniente parte aliqua, vel vliginosa, vel arida. Densa, cretosaq; humus & vliginosa non incommodè adorem alit. Triticum in siccò loco coalescit, adorem minus infestatur humore. Magis aptè in pluuiò agro adorem, quàm triticum seritur, quoniam folliculum, quo continetur, firmum & durabile aduersus longioris tẽporis humorem habet. Plinius à Catone habet: In creta, & rubrica, & aquosiorẽ agro adorem, in loco humili far adorem, potius quàm

triticeū feretur. Cretosum & vliginosum locum sortitur. In Campania campus est, subiacens montibus nimboris totis quidem xxx. m. pass. planitie. Gratia terræ eius (vt protinus soli natura dicatur) puluere a summa, inferior bibula, & pumicis vice fistulans, montium quoque culpa in bonum cedit. Cretosus enim imbres percolat, atq; transmittit, nec dilui aut madere voluit, propter facilitatem culturæ. Eadem acceptum humorem nullis fontibus reddit, sed temperat, & concoquens intra se vice succi continet. Seritur toto anno panico semel, bis farre.

Satio.

Columella. Placet nostro Poetæ adorem non tantè seminare, quàm occiderint Vergiliæ, quod ipsum numeris sic edisserit,

*At si triticeam in messem, robustaq; farra
Exercebis humum, solisq; instabis aristis,
Ante tibi Eos Atlantides abscondantur.*

Absconditur autem altero & trigesimo die post autumnale æquinoctium, quod ferè conficitur nono Calendas Octobris. Virgilius serenam hyemen, humidam a statem farri optat.

*Humida solstitia, atq; hyemes optate serenas
Agricolæ, hyberno lætissima puluere farra.*

Et fertur rusticum hoc vetus canticum, vt ex Macrobio habetur, Hyberno puluere, verno luto, grandia farra Camille metes: ex quo Virgilium id traxisse existimant. Columella, lugerum agri pinguis, adorei modios nouem postulat, si mediocre, decem desiderat. Quum quatuor fibras habere cœperit, rectè sarrientur. Virgilius à Vergiliarum occasu far feri iubet. Quidam omiſſa celeſti cura far Septembri extremo vsque ad idus Octobris ferunt. Farra purgari non nisi tosta possunt, itaque hæc cum suis folliculis feruntur cruda, & far in vaginulis suis seruant ad satus, atque non torrent. Occato, sarrito, runcato quibus dictum est diebus de tritico. Singula opera cuique generi in iugero sufficient. Varro etiam feri farri modios decem in iugero dixit. Palladius autem ex his colligens exactius præcipit huius frumenti serendi disciplinam. Octobri mense adorem seremus. Iusta satio est à decimo Calendarum Nouembrium vsq; ad sextum idus Decembris regionibus temperatis. Nouembri far seritur satione legitima ac semente solenni. Lugerum seminis modius quinq; tenebitur. Septembri mense vliginosis locis, aut exilibus, aut frigidis, aut opacis circa æquinoctium adorem seritur, dū serenitas constat, vt radices ante hyemem conualeſcant. Sarritur, quum quatuor foliorum est, Ianuario.

Paris.

Numa instituit far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, ex Plinio. Farinam à farre dictam nomine ipso apparet.

De zea sine semine. CAP. XXIII.

EFA R R I s genere zea est, multiq; far ipsum zeam esse opinati sunt: non tamè dubito inter genera farri à Columella enumerata esse zeam, eiusq; speciem.

speciem è tritice
phraſto, nullum
dicas: pistamq;
tertio. Cuius cau
caulis recitat, cu
g: nere auenæ pr
mum sit semen,
rosa cohæret, ice
nitus, non in alia
rimisq; imbutus
semine mutatur
detrahatur princ
& velut penitus
qualitate mutatu
zeam, ac tiphen
tur, nec protinus
ducens, sed ap
naret. Commem
Zea apud Græ
20 atas id nomen v
dicit vulgò. Lat
in Campania m
Dioscorides d
armamentis inu
Africa, latiorib
Theophrastu
culmo assurgit
cunctis animar
pnam faram ob
30 ma, duobus vtr
ctis, quam à Di
nus, & glum osu
Plinius: Agy
zea. Qui zea vtu
Est apud nos ze
nus sit obnoxia
dent, eam inibi
tu zea victitant
abiis sciscitatus
40 deſſe frumentig
bus zeopytoni

speciem è tritici genere esse, eiq; aspectu persimilem, immò, authore Theophrasto, nullum genus aptius in triticum transire est, quàm zea, sine semendicas: pistamq; ferunt, qui mutari eam volunt in triticum, idq; anno demum tertio. Cuius causam in tipha reddidimus. Rationem Theophrastus libro de causis recitat, cur facîle in auenam mutetur. Facilitas transmutationis, quia genere auenæ proxima est. Sed mirandum profectò, quod quum robustissimum sit semen, in eam degenerat. Sed quia validissimum est, radiceq; numerosa cohæret, iccirco resistere penitus potest, reliqua verò corrumpuntur penitus, non in aliam mutantur speciem. Sed tempore quo feritur, maximis plurimisq; imbribus afficitur, diuque in terra obsessum perpetitur multa. Pinito semine mutatur in triticum, terræ commisso: pars enim aliqua deest, quæ si detrahatur principio, generationem minus impedit, sed si exempta penitus sit, & velut penitus semen dispolietur, atq; affici opportunius relinquatur, tum in qualitate mutatur, nec eandem multitudinem paleæ tetinet. Plinius. Tradunt zeam, ac tiphen, quum sint degeneres, redire ad frumentum, si pinitæ ferantur, nec protinus, sed anno tertio. Homerus commendans aruum zeam producens, *ἑλδανον ἄρουρον* dixit, non vt aliqui arbitrantur, quoniam vitam donaret. Commendauit & Hesiodus à magna eius excellentia.

Zea apud Græcos olim vagum nomen fuit, & perplexæ notionis: nostra *Nomen.* ætas id nomen vni duntaxat frumento largitur, quod speltam, vel spentriam dicit vulgò. Latini à frugis præstantia semen vocant. Plinius. Est & hæc Italiæ, in Campania maximè, semenq; appellatur. Hoc habet nomen res præclara.

Dioscorides duas species tradidit, alteram simplicis grani, alteram duobus *Genera.* armamentis inuoluti, ob id Græcis appellata *διπλοκας*. Plinius adulterinam Africæ, latioribus spicis, nigrioribusque, & breui stipula esse dicit.

Theophrastus suam zeam ita depingit. Zea quam simillima tritico, & oryze, *Descriptio.* culmo assurgit numerofo, grano multiplici tunica tecto. Fructu facillimo, & cunctis animantibus gratissimo. Radice multiplici, altaq; Speciem circa Capuam fatam obseruauimus, quæ erat culmo, geniculis, & spica tritico simillima, duobus vtriculis iunctis duo grana simul ferebat, duplici ordine distinctis, quam à Dioscoride notatam diximus. Granum erat tritico fascius, & minus, & glumofum.

Plinius: Ægypto autem ac Syriæ, Ciliciæq; & Asiæ, ac Græciæ peculiaris *Colum.* zea. Qui zea vtuntur non habent far. Est & hæc Italiæ, in Campania maximè. Est apud nos zea frigidi soli alumna: nam quum gelicidiis, & frigorebus minus sit obnoxia, horumq; minus iniurias, quàm reliqua frumenta reformident, eam inibi serere coguntur, qui hybernis regionibus, & gelido cœli statu zea victitant. Galenus tamen, qui regiones omnes hybernas peragravit, & ab iis sciscitatus diligenter, qui eas perlustrassent, nusquam audiuit aliquod adesse frumentigenus, quod incolæ zeam appellent. Sed in Bithyniæ tractibus zeopyron inuenit.

Solum.

Quum nil ea robustius, & maximè terram exinaniens sit, pingue & solum latum desiderat, ex Theophrasto. Nos apud Capuanos, nigro & argilloso, albo latoq; satam vidimus solo, locis frigidissimis, & glacie diutina obstitis.

Satio.

Maturè feri Theophrastus dixit, circa Vergiliatum occasum. Germen ex vna grani parte effundit, ex crassa radicem, ex tenui herbam pellit, vt cætera frumenta. Plinius iugero modios decem seminat. Nos hic Martio serimus, non autumno.

Panis.

Diocles zeam tiphæ in ciborum ratione postposuit. Mnesitheus panem ex ea factum caput aggrauare, & difficulter egeri dixit, ex Athenæo. Galenus vim habere inter ordeum, & triticum mediam, tantum in cibo tritico cedit, quantum ordeo præfertur in panificio. Alimonia maiore est, quàm ordeum, minore quàm triticum. Pane è zea confecto nemo diutius in offensa valetudine vescens degit, præsertim si abundè estur: quod si quispiam insolens eo utitur, paucò esu noxam contrahet: nam & ægiè coquitur, & stomacho negotium exhibet. Panis parum è zea per initia, quod magno sit odore, deuorari potest, assuetis tamen familiaris redditur cibus, & qui facile conficiatur. In summa grauis concoctu, & pertinax est, sed valens & membranosa. Zea minus quàm tipha nutrit. Plinius, Alcia sit ex zea. Tunditur granum eius in pila li-gnea: nam lapidis duritia conteritur. Nobilius, vt notum est, pilo victorum pœnali opera. Primori inest pyxis ferrea: excussis inde tunicis, iterum iisdem atriametis nudata conciditur medulla. Ita fiunt alicæ tria genera, minimum, ac secundarium, grandissimum verò apharema appellant. Alica adulterina fit ex zea, quæ in Africa degenerat.

De olyra. CAP. XXIIII.

Dioscorides olyram ex zea semine esse existimat, ideo nos post zeam eius descriptionem apposumus.

Nomen.

Græcis *ὄρυζα*. Latinis Hermolao, Ruellio, cæterisq; authoribus siligo. authoremq; talis ineptiæ Plinium faciunt, quod nusquam dixit. Theodorus in Theophrasti versione satis ineptè etiam siliginem vertit. Turannius eandem esse olyram, & oryzam existimat. Arincam ab Homero vocari dixit Plinius, ab Herodoto zeam. Audio ab Italia *scandellam* vocari.

Descriptio.

Theophrastus ex iis, quæ tritico simillima sunt, olyram esse dicit, zea molliorem infirmioremq; grano multipliciter tunicato. Plinius, Spissior, quàm far, & minor spica, eadem & ponderosior. Raro modius grani non xvi libras implet. Facilis, fertilisq; Galenus, Tiphæ semen extrinsecus corticem habet, veluti olyra, & ordeum, verum decorticatum in panes congeritur. Et alibi. Color in ordeis, & olyris est albus, in triticeis autem subflauus.

Cælum.

In Græcia nasci difficilem, in Ægypto verò facilem, fertilemq; Plinius dixit. Arinca Galliarum propria, copiosa & Italiæ est. Ægypto autem, ac Syriæ, Ciliciæq; & Asiæ, ac Græciæ peculiaris olyra.

Theo-

Theophrastus olyram maturè seri dixit, idemq; tempus ferendi, vt tritico *Sol. Satio.*
statuit. Solum vt zeæ ei darem, quum maiori spica, & ponderosiori grano con-
stet, terram enim exinanir, ob id latam constituerem. Seritur vt zeæ.

Plinius, Ex arinca dulcissimus panis, exteritur in Græcia difficulter, ob id *Panis.*
iumentis dari ab Homero dicta. Galenus inter triticum & ordeum medium
tenere temperamentum dixit. Præterea olyrini panes sunt præstantissimi, si ex
bona olyra fiant, post triticeos. Quod si olyrini ex vitioso semine sint facti,
triphinis erunt inferiores. Mnesitheus panem qui ex olyra fit, multum nutrire
dixit, quia sine magno labore digeritur, ex Athenæo. Cassianus tragus ex o-
lyra generosa facere docet. Olyra maceratur, & decorticatur, & in sole calido
siccat. Deinde idem rursus fit, donec & pelliculæ, & quicquid fibrosum est
in frumeto dilabatur. Plinius far ex olyra fieri dixit. Dioscorides olyram minus
aliquanto nutrire, quàm zeam, & in panes, vt zeam, cogi dixit.

Detritico Indico. CAP. XXV.

N Vn c ad alia tritici genera transeamus, fortasse veteribus incognita,
quorum primum se offert Indicum.

Nos Indicum triticum dicimus, quod ex occidentalibus Indiis nobis pri- *Nomen.*
mum aduectum sit. Incolæ vernacula lingua *mitz* vocant, quod & nos quoq;
ita vocare solemus. Sunt qui turcicum vocent, quod ex Turcica Asia primum
adlatum dicant, atq; ab Plinio sub milii nomine memoratum, non quidem re-
ctè, vt in milio dicemus.

Granorū color, & spicarū varietas genera faciunt, nam sunt punicea, buxea, *Genera.*
subcandiantia, vel etiā mixta ex croceis & subpurpureis. Addit & tēporis dif-
ferentiā, est enim genus trimestre, bimestre, vel sex hebdomadarū.

Calamo assurgit procero, septenum, octonūve pedum, crasso, rotundo, *Descriptio.*
geniculato, medulla farcto candida, cuiusmodi saccharinæ arundinis. Folio mi-
liaceo. Flores summo nutant culmo, non fœturæ destinati, non umbræ, sed
spectatores ornatu oblectantes, nā rurāq; luxum ostentantes, quod rarè in a-
liis ostendit. Medio foliorum, geniculorumq; sinu, spicam pandit muticam,
cylindracea effigie, tiphæ clauæ simili, tenui vagina foliacea operta, in qua
grana pisi magnitudine penitissimè stipata conduntur, denis duodenisve ver-
sibus ordinata, qualia in punicorum acinis, colore purpurea, interdum fulua,
nonnunquam fusca, vel rubra. E vaginularum verticibus paniculacea, vel ca-
pillacea filamenta dependent, concolora granis. Inferior caudicis pars purpu-
rascit. Radicibus multis, densis, ac minimè crassiss.

Mediocrè terra, & cœli fert temperiem. Apud nos satum optimè prouenit. *Col. Sol.*

Indi hoc modo serunt. Descendunt Aprili, vel Maio in complutum agrum *Satio.*
fatores, recta linea æqualiter dispositi, ac deinde palo effossis serobibus dextra
manu, statim grana quatuor, vel quinque triduo macerata, sinistra in singulis
coniiciunt, ac pede serobes operientes, ne psitraci semina depascantur, ac ita se-

riatim suo passu distantias metientes, agrum totum semine complent retrocedentes. Nasitur paucis diebus, metunt Augusto, vel Septembri. Dicunt Peruvianitoto ferme anno meti, & feri posse.

Panis.

Indi ex granis candidissimam farinam moliuntur, quæ in panificium cogitur. Nostri & in pane, & placitis vtuntur. Substantia magis crassa, & viscida, ob id grauis, & ingratus ventriculo.

De ordeo. CAP. XXVI.

NON ad aliud frumenti genus deuentum est, scilicet ordeum. Duonamque videntur antiquis fuisse frumentorum fastigia, tritici & ordei, præ cæteris quidem cerealibus vtilissima, & quorum cætera sint quasi abortus, & degeneres partus, mixtaq; natura ex tritico, & ordeo. Quin nonnullis videtur ordeum siligo spuria. Antiquissimum, inquit Plinius, in cibus ordeum, sicut Atheniensium ritu, Menandro auctore, apparet, & gladiatorum cognomine, qui ordearii vocabantur.

Nomen.

Græcis *orpsi* nomen est, quasi dicerent secretum, & separatum, quum ei multa opera essent secernenda glumæ. Latini hordeum ab horrore dixere, quod eius arista tritici arista mordacior sit. Vel ab oriendi celeritate, quod ante omnia frumenta sit aridum. Vel ab antiquo verbo hordus, quod apud veterustissimos significabat grauidum. *Ital. orzo.*

Descriptio.

Ordeum, ex Theophrasto, triticeo, & multiplici attollitur culmo, sed qui non fundatur in brachia, sed quàm triticum horridiori, fragiliori quæ, breuiori quæ. Simpliciter in stipula folio, neruoso, vt arundineo, & latiori. Cacumine fert spicam, vt cætera frumentacea, sed minus à foliis discreta. Granum crinito textu spicatur, sed longè paucioribus tunicis contentum, quàm triticum: siquidem propè nudum extat, & omnium maximè tegumento caret, mordaciori arista. Radice tenui, frequenti coma fibrata. Palea durior, & insuauior, vt pote, quæ minus succi retineat. Ex Plinio, Breuiori, quàm triticum assurgit calamo, cui octona genicula. Cacumine folium vnum habet, sed scabrum, arundinaceum, cæteris laue. Granum maximè nudum, muniturq; aristarum quadruplici vallo, & arista mordacior.

Genera.

Apud Theophrastum plura ordei discrimina visuntur, fructibus, spicis, formis, viribus & effectibus differentia. Est enim aliud quod binos spicarum versus, aliud ternos, quaternosq; continet, item quinos, nullum tamen plures fenis. Quod verò pluribus constituitur versibus, spissius hoc, positurq; semper arctius constat. Magnam & Indicum differentiam facit, quod fundatur in brachia. Et spicæ aliis grandiores, rariioresq; constant, aliis mitiores, frequentioresq;, & aliis distantes à foliis, aliis proximiores, vt Achilleis cognomine. Sunt & complura grani discrimina. Aliis rotundius, & breuius, aliis maius & oblongius, & rarius, aliud candicat, aliud vergit in purpuram, copiosius farina, validiusq; quàm candidum, & contra cœli mutationes contumacius. In

India

India syluestre n. Alexandri, vt m. latum desit esse noxium rubigin. Est & genus tritici. Plinius: Ordeum. Spicæ quædam. Grano ipsi aliquantundius, candidiora tempestates. Ex altichum dicemus.

Solum pluviumq; frumentum omnino contra quàm ordeum d. productionem.

In Egypto sex præcocem, tantum ordeum inibi c. rursum demeti.

Et si fratur

Gracile solum or. dera. Lutosum achilleidi, quipp. sto. Sed Plinius nisi sicca, & sol. le possit fieri, se non multo ind.

tenue solum or. far feritur, in te. Sationem a. casu, & maturi. noctio autum. tione solstitio h.

Lib.

Et n.

Ex.

Vg.

Plinius à Vi.

India syluestre nascitur ordeum, iucundum in panis esu, hoc equis oblatum Alexandri, ut manderent, necabat eos primo, dein in palea exhibitum, paulatim desit esse noxium. Est genus ordeï achilleis vocatum, propensius obnoxium rubigini, tam atrum, quàm candidum, quod spicam erectam gerat. Est & genus trimestre dictum, quod per dictum tempus perfici valet. Ex eo Plinius: Ordeum Indis sativum & sylvestre, ex quo panis apud eos precipuus. Spicæ quædam binos ordines habent, quædam plures usque ad senos. Grano ipsi aliquot differentiæ, longius, leniusque, aut brevius, aut rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est. Ultimo ad polentam, contra tempestates candido maxima infirmitas. Sunt & Colomellæ sua genera: Exastichum, siue cantherinum, & distichum, siue Galaticum, ut suo loco dicemus.

Solum pluuium, & frigidum convenit ad ordeï fructificationem, ceterorumque frumentorum, quum soluta hæc sint, sed minus ordeum geritur, & omnino contra imbres inualidius. Sed vere hybernis locis triticum potius, quàm ordeum datur. Sed differt cælum à cælo, & solum à solo ad fructuum productionem. Quædam enim loca proferre intra pauciores dies videntur. In Ægypto sexto à satù mense metitur. In Chalcita Rhodiorum insula, tam præcocem, tamque feracis naturæ locum esse prodidit Theophrastus, ut ordeum inibi cum cæteris satum, iterum referi, & unà cum cæteris frugibus rursus demeti valeat.

Et si fruatur terra ordeum, gracili etiam solo proficere satis potest. Et alibi. Gracile solum ordeum melius præstat, quia minus & lenius alimentum desiderat. Lutosum solum commodius siccis, & paruo alimento contentis, ut achilleidi, quippe hoc succos melius digerens facit candidiora. Ex Theophrasto. Sed Plinius: Ordeum omnium frugum mollissimum est, feri non vult nisi sicca, & soluta terra, ac nisi læta. ordeum in novali, & aruo, quod restibile possit fieri, feritur. Subtilis & illa sententia, serenda ea in tenuiore terra, quæ non multo indigent succo, in pingui autem, quæ sunt cibi maioris. Sic ergo tenue solum ordeum dabitur, minus enim alimenti radix poscit. In humili loco far feritur, in temperato ordeum.

Sationem à tempore exordiemur. Theophrastus ferit Vergiliarum octavio, & maturius quàm triticum. Cassianus ordeï sationem inchoat ab æquinoctio autumnali, quod est ad octavum calendas Octobres, cessat à satione solstitio hyemali, quod est ad nonas calendas Ianuarii. Virgilius,

*Libra dies, somniq; pares ubi fecerit horas,
Et medium luci, atq; umbris iam dividit orbem:
Exercete viri tauros, ferite ordeæ campis,
Vsq; sub extremum bruma intractabilis imbrem.*

40 Plinius à Virgilio excipiendo, ait, Virgilius ordeum inter æquinoctium an-

NNN

tummi & brumam ferit. Sed Vindanionius eligendum iubet ordeum plenum, recens, album, & quam grauiſſimum, & non cōtuſum. Sicco ſolo committendum præcipit Theophrastus, utpote quod maximè valeat perdurare, ubi non auibus, aut aliis beſtiis tellus obnoxia ſit. Haud enim commodum ſemimade- factum ſolum putatur: quippe quum ſemina in eo facilè lateſcant, atq; in- tereant, ſimul accidit, ut frequens herba naſcatur. Imbrem ſuperuenire poſt ſationem prodeſt. Denſum, aut rarum ſpargere ſemen terrarum ratio- ne conuenit: plus enim craſſa, lataq; tolerare poſeſt, quàm arenosa, & tenuis. A quo Varro, Ordei ſeruntur quinque modi in iugero. Sed nonnullis locis paulo amplius, aut minus. Si enim locus craſſus, plus: ſi macer, minus. qua- re obſeruabis, quantum in ea regione conſuetudo eſt ſerendi, ut tantum fa- cias, quantum valet regio, ac genus terræ. Sed Pamphilus Græcus præciſi- ſus monendo docet, ut lata iuſtam ſymmetriam habeant, digitos manus di- ducendos, eosq; imprimendos in terram, & ſublata deinde manu, multitu- dinem ſeminum in impreſſo digitorum typo conſiderandam: etenim in or- deo nouenarium ſummum eſſe oportet, minimum ſeptenarium. Plinius, In iugero temperati ſoli iuſtum eſt ordei modios ſex, pingui plus, gracili minus. Sarculo ſeritur, propterea celerrimè reddit, fertiliſſimumq; quod in Hiſpaniæ Carthagine Aprili menſe collectum eſt. Hoc ſeritur eodem men- ſe in Celtiberia, eodemq; anno bis naſcitur. Ordeum niſi ſit ſiccum ne ſerito. Et ſi in tritico dixerimus de radice, ortu, herba, flore, ſpica, di- camus iterum de ordeo. Erumpit, Theophrasto authore, à primo ſatu or- deum die ſeptimo, magisq; quàm triticum feſtinat. Ex utroque extremo radicem, & folium emittit, caput alterum grani in radicem exit, alterum in herbam, quæ prior floret. Radicem craſſior pars grani fundit, tenuior florem, cæteris ſeminibus eadem pars radicem & folium. Exit vno folio, hyeme in herba eſt, tempore miteſcente caulem de medio mittit, & ter- tio, vel quarto geniculo ſpicam, ſed nondum aliqua mole conſpicuam, & quidè per totum culmum ſpica digeritur, ut ſermè quum culmari incœpe- rit, mox eam conſpici ſit, ſed latet, antequam adulta in folliculo fuerit: tum enim fœtus ſuæ craſſitudine molis euident exat, mox folliculo abſoluta, quarto aut quinto die florere incipit, totidemq; diebus ſerè floret: qui verò plus temporis referunt, ſeptimo die deſſeſcere notant. Poſtquam de- floruit craſſatur, perficiturq; quum primum intra dies quadraginta. A quo Plinius. Erumpit à primo ſatu ordeum die ſeptimo, alterum caput grani in radicem exit, alterum in herbam, quæ & prior floret. Radicem craſſior pars grani fundit, tenuior florem, cæteris ſeminibus eadem pars & radicem & florem. Hyeme in herba eſt, verno tempore faſtigiat in ſtipulam. In octa- uo geniculo ſpicam incipit concipere, ſed etiamnum occultam. Sed non an- te ſupradictum geniculorum numerum conceptus eſt ſpica, qui ut ſpem ſui fecit, quatuor aut quinque diebus florere incipit, totidemq; aut paulo plu- ribus.

tribus deſſeſcere
maturaturq; q
exire dixit. The
primopræſent
dicis copiam, v
ras tres exigun
vnam, ſumma

Aqua nupet
tum intereat,

10 Plinius, Imber
gis laeditur. O
nemeniter vex
& conſtitatu
quia nudum e
quia rarum na
quum rigum
& proprium e
quod imbecill
& inter frum

10 plus, aliud m
rugine, quod
effundit, tel
quod ſpicam
fluere: qua de
continuum eſt
miniſtrum e
per rubigo. I
num naſcatur
Lolium & a

30 niſtra, quæ
Nullum e
& ordeum, q
locis, & lon
num, quæ v
præſent q
dimus ex Th

In Ægypt
nius autem
cætera: frag
40 lauius: luni
areſactis ſpi

tribus deflorescere, & quum tardissimè, septem. Quum defloruit crassescit, maturaturq; quum plurimum diebus quadraginta. Varro septimo à satù die exire dixit. Theophrastus nasci è radicibus anno sequente dixit, quin & anno primo pratunsum regerminat culmo è latere subnascante. Ratio, quod id radicis copiam, vimq; obinet. Columella, Ordei modii quinque bubulci operas tres exigunt, occatoris vnam, sarritoriam vnam & dimidiam, messoriam vnam, summa operarum sex, & dimidia.

Aqua nuper satò, & adolescenti prodest, florenti obest, facit enim, vt totum intereat, in plenum crassato maximè noxia esse putatur. A Theophrasto Plinius, Imber in herba vilis tantum, florenti nocet, maturescens imbre magis læditur. Ordeum post florem, si adhuc humidum, tenellumq; afflatu vehementer vexetur, facile perit, educitur enim quod in his tenuissimum est, & confictatum inter se euanescit, quum euanuerit, pluvia sequuta nocet, quia nudum est, & omnino tritico debilius est. Ordeum plus attrahit pabuli, quia rarum natura est, idque excoquere nequit, quoniam inualidum est, & quum riguum imbre fuerit, sol vnà cum aduentitio humore internum quoq; & proprium educit. Et à floribus quoq; concussum magis hoc perditur, vt pote quod imbecillum est. Rubigines in frumentaceis magis quàm leguminibus, & inter frumentacea ordeum magis quàm triticum sentit, & inter ordea aliud plus, aliud minus, sed præcipuè dixerim achilleis. Facile afficitur ordeum e-rugine, quod nudum est, & folium spicæ gerit proximius, vnde suam frugem effundit, residet enim in eo humor putrefactus, qui eruginem creat. Adde quod spicam gerat erectam, densioremq; hinc enim humor minus potest defluere: qua de causa spicam aliquantulum inclinari melius est, sic enim quod continuum est, dissolui atq; decidere celerius potest. Plinius: Ordeum ex omni frumento minimè calamitosum, quia tollitur antequam triticum occupet rubigo. Eteocritum genus ordei est tutum à rubigine, quoniam incuruum nascatur. Ordeum necat festuca, quæ vocatur ægilops. Theophrastus, Lolium & auena in ordeo prouenientes, pabulum tollunt, tam quod terra ministrat, quàm quod à sole, & aëre venit.

Nullum ex feminibus corruptum mutari in aliud aptius est, quàm triticum, & ordeum, quod degenerat in lolium, idque imbribus infestis, aut viginosis locis, & longiore plauia dilutum. Degenerant penitus fruges illæ potissimum, quæ viribus præstant, vt ordeum, & triticum, quæ in lolium transeunt, præsertim quum lolium ordeo validius sit, quorum rationes in tritico reddidimus ex Theophrasto. Plinius, Ordeum in auenam degenerat.

In Egypto sexto à satù mense ordeum metitur, inquit Theophrastus. Plinius autem, Rapitur omne à prima statim maturitate festinantius, quàm cætera: fragili enim stipula, & tenuissima palea granum continetur. Paladius: Iunio ordei messis incipitur, quæ consummanda est, antequam grana arefactis spicis lapsa decurrant, quia nullis, sicut triticum folliculis vestitur.

Quinq; modios recidere potest pleni agri opera vna melloris experti, mediocris verò tres, vltimi etiā minus. Sed ordeiculmos iacere in agris aliquantulum sinamus, quia fertur hoc more grandescere. Theophrastus: Quoddam ordeigenus non patitur exiccati, quod ad reddendam farinam melius minus arefactum putatur. Qua de causa in aceruos componere assolent: videtur enim in aceruo crassescere potius quàm attenuari.

Coditura.

Perit celeriter hordeum, & puluerulentum celerius, quàm purgatum, & quod in horreis calce lenigatis conditum est, quàm quod in non ita lenigatis. Ordeum multo celerius, quàm triticum tunditur, quia solutius ac nudius est. Singula pro suo humore peculiare animal creant, vt ordeū curculionem. Triticū magis ordeo durat, quia calidius sit, & tunicis pluribus tegatur. Ordeum enim nudum propemodum est. Non omittā quod loco medellæ aliquādo ordeum plantis vitium interferatur, aut aliquid siccum, vt immodicū humorem absumeret. Damageron incolume in horreis seruat lauri fertilis foliis siccis, & omnis cinis, præferim à lauri ligno impositus. Similiter seruat ordeum semperuiū herba siccata, cū calaminta, & vna cum gypso ordeo ammissa. Quidam vas acetoplenum, & confectum operculo in medio ordeiponunt. Verū nosse oportet, ordeum veterascens amarum fieri. Florentinus, Ventilatum & cribratum ordeum, vnam, aut alteram diem, aut noctem in area relinquere oportet, & deportare ante solis exortum, vt adhuc refrigeratus fructus in horreum deportetur, ad diuturnitatem confert.

Panis.

Panem ex hordeo veteribus vstratum vita damnavit, quadrupedumq; tradidit refectibus: eoq; Romani ignavos milites ignominia causa pascebant. Æthiopes non aliam frugem, quàm milii, ordeive nouere. Panis hordeaceus, præter id, quod ventriculo laborem inferat, frigidos lentosq; succos generat, parum nutrit, & flatus gignit, & si podagricis peridoneum esse dicant. Diphilus Syluius ordeaceos panes meliores esse, magis nutrire, & melius digeri dixit. Ex Athenæo.

De ordeo hexasticho, siue cantherino. CAP. XXVII.

PRÆTERMISSA illa vaga, & confusa ordeigenum recensione, quippe non specificas, sed accidentarias, & aduentitias, nempe magnitudinis, coloris, glumarū & aliarum affectionum differentias efficiebant, nunc ad magis proprias, paucis accedamus, & perspicuas ad historiam: nam Columella duplex affert hordeigenus, hexastichum, siue cantherinum, & distichum, siue galaticum. Nos de priori dicemus.

Nomen.

Columella rusticorum more *ἑξαστήχον* vocat: nam spicam fert, quæ sex ordines habet, reliquum nomen à glabritie, & grani nuditate affert. Siquidem vel oritur ordeum follicello perrinaci hæsu granum sepiente, aut leuiore gluma, & facili exutu, cuiusmodi est id genus, quod nudum nos vocamus. Cantherinum vocat, quod folliculo castratum nascatur, sponteque granum gluma
concidat.

concidat. Can
oreo mondarolo

Columella
riter decidens.

Seritur sicca
segeribus mace

cero non possi
rem postulat: n

tollo commiseri

10 10 taterra, ac nisi

rum pingui: n
tero nō habet,

aliud ferre non

Columella.

menti, si lato so

ubi paulum ma
dum erit. Nam

decidit, iisdēq;
substuleris, opt

20 20 & omne virus,

feri ordeum ca
rum. Post hoc,

Columella.

lia animalia, q
quàm malum r

tendit.

ALTER

Theophr

30 30 Theophras

mella ordeum

quod eximii ca

truncato nomi

Theophras

cam, sed milii,

quis, pista, tan

oryzē genus re

areis torretur p

id prius inde, q

40 Plinius, Oryza

concidat. Cantherii dicuntur equi, qui castrati sunt, Catone auctore. Nos *oreo mondarolo* vulgò dicimus, quòd facillè mundetur.

Columella, Fragili culmo, & nulla vestitum palea granum eius, & ideo celeriter decidens. *Descriptio.*

Seritur sicca, & soluta terra, & vel præualida, vel exili, quia constat arua eius fegetibus macescere, propter quod pinguiſſimo agro, cuius nimis viribus nocero non possit, aut macro cui nihil aliud committitur. Nullam mediocritatem postulat: nam vel pinguiſſima, vel macerrima humo iacitur: quod si lutoſo commiseris, emoritur. A quo Plinius: Seri non vult, nisi sicca, & soluta terra, ac nisi lata. Palladius etiam: Seritur macra, & sicca terra, vel multum pingui: nam quia hoc semine macescunt arua, pingui vincitur agro, altero non habet, quod amplius nocere possit, quum propter macritatem semen aliud ferre non valet. *Cal. Sol.*

Columella. Altero sulco seminari debet, post æquinoctium ferè media sementi, si lato solo: si gracili maturius. Iugerum quinq; modii occupabunt, idq; ubi paulum maturuerit, festinantius quàm vllum aliud frumentum demerendum erit. Nam & fragili culmo, & nulla vestitum palea granum eius celeriter decidit, iisdèq; de causis facilius teritur, quàm cætera. Sed quum eius messem substuleris, optimum est noualia pati anno cessare, si minus, stercore saturare, & omne virus, quod adhuc inest terræ propulsare. Palladius: Octobri mense feri ordeum cantherinum. Gracili solo Septembri, modis quinque per iugerum. Post hoc genus agros cessare patieris, nisi fortè latamen aspergas. *Sat. mes.*

Columella. Proximus est frumentis vsus ordei hexastichi, quoniam & alia animalia, quæ ruri sunt, melius quàm triticum, & hominem salubrius, quàm malum triticum pascit. Nec aliud in egenis rebus magis inopiam descendit. *Pau.*

De oryza. CAP. XXVIII.

ALTERVM genus ordei Columellæ distichum erat, siue galaticum. Theophrastus oryzam vocat, Indiæ inquilinā, & indidem exportatam. Theophrastus ὀρυζαν vocat, & Dioscorides. Latini oryzam appellant. Columella ordeum distichum, quod binis versibus ordinatum sit, & galaticum, quod eximii candoris sit. Et ab eo etiam Palladius ita vocat. Itali ex oryza truncato nomine *rifo* dicunt. *Nomen.*

Theophrastus oryzam zææ similem dicit, & aspectu lolii. Effundit non spicam, sed milii, atq; panici modo iubam. Magna temporis parte residens in aquis, pista, tanquam alica concoctu facilis, redditur. Strabo apud Bosmoros, oryzæ genus religiosum tradit, tritico minus, inter amnes proueniens, excussum areis torretur protinus, & iureiurando adiguntur messorum non asportaturos id prius inde, quàm coxerint: veriti ne semen in aliis terris communicaretur. *Descriptio.*

Plinius, Oryzæ quidem folia carnosæ, porro similia, sed latiora, altitudo cubi-

talis, flos purpureus, radix gemmarum rotunditatis. Columella, Ordeo similis, binis ordinibus distincta spica. Granum ponderis, & candoris eximii. Nos autem: Culmo exurgit ordeaceo, cubitali, vel sesquicubitali. In arista flexuosa, & rigidula grana visuntur, spicata alterno situ subfluo folliculo, acutis seu angulosis liris per longum striata. Grano candido, pellucido, & duro. Radice tritici, folio arundineo, carnosio, porro simili.

Col. Sol.

Theophrastus. Magna ex parte in aquis residens. Strabo in omnibus provenire. Dioscorides vliginoso, & palustri loco. Columella feri quam pingui-
ssimis, & frigidis locis. Theophrastus in India nasci scripsit. Italicos, Plinius ait, maxime oryza gaudere. Strabo in India. Hodie in Bactrianis, Sufide, atq; Syria inferiore vberissime nascitur, ex Strabone. Apud nos in Salernitano agro, & alibi maximo prouentu, patenti, vda planitie, quam tamen euripis, & illicibus, & fluuiis ductis, quoties opus est, rigamus, alioquin nullam, aut casam segetem latura.

Satio.

Columella; Quam pingui-ssimis & frigidis locis circa Martium mensem seritur. Melius tamen respondet, si dementia hyemis permittit, quum seminatur circa idus Ianuarias. Iugerum sex modios postulat. Palladius: Si demens fuerit hyems, ordeum gallaticum, quod graue & candidum est, circa idus Ianuarias seremus locis temperatis. Octo modis iugerum complebitur. Locis frigidis feretur circa Martias calendas. Messis serotina est circa æquinoctium autumnale. Maturescit enim æstiuis solibus.

Pan.

Columella: Ordeum galaticum tritico mistum egregia cibaria familie præbet. Plinius, Indos oleum ex oryza conficere, scripsit. Indipistum, tanquam alica, reddunt concoctu per facile, dixit Theophrastus. Bonum alimentum, & lautum suggerit, etiamq; valetudini prodest, Plinius: Italici ex oryza pisanam conficiunt, quam reliqui mortales ex ordeo. Sunt qui hodie in lacte parant, ut sanguinem alant, & genituram adaugeant.

De auena. CAP. XXIX.

DIXIMVS de tritico & ordeo: nunc de eius vitis, scilicet de auena. Est enim vulgaris notitia, in quam triticum, & ordeum, & semen facile mutatur.

Nomen.

Theophrasto *αἰνῶν*, Dioscoridi *σπῆρος*, vel ei consimile genus, sed alia est *αἰνῶν* Dioscoridis, de qua libro quarto differit. Latini auenam dicunt. Poëtæ bromum, vel bromium. Sunt qui festuca nomen adeptum putent, quod ei semen ante messem deciduum sit, & spica granis orba spicilegi tempore repariatur, inarescente adhuc in festuca. Italis *auena* dicitur.

Descriptio.

Theophrastus ita suam ægilopem describit. Inter ea, quæ tritico & ordeo similia sunt, auena est, sed aspectu quodam syluestri, & immiti. Numerosa radice attollitur, ex qua frequens culmus spargitur, folio piloso, lolio simili, non tamen ut illi pingne. Semine multipliciter tunicato: immo eius granum omnium maxime natura operuit. Matura illico granum proicit, ut culmus restet

stocinanis. Plinius
git apud nos pro
dicto simile, lea
modum per mel
Satiuam auen
sequenti. Hac r
cultu, semine vid

Est & auena C

10 lem auenam, ægi

Quia radice,

precepto frugal

dixit: *Vri lini*

Hoc semen,

quæ est supra Pe

nus: Germaniæ

insulis. Ex hoc au

& frigido, ut Ge

Theophrasti

20 nis infœcunda

cullari velillo à

men aptum sit p

deletiperconu

sa in herbam est

planissimū eius

statur. Cuius ra

ratio in radice,

te, & intercept

procreetur: ob

10 do arationi: &

no præstitū est,

Vel semen totū

appetari donem

vsu veniunt. Ve

anno germinat

scenum, vel pab

mmi solo ferunt

proceriori culm

dicum præcede

10 liquamq; frugen

alimentum, ita

fit inanis. Plinius: Ipsa frumenti fit instar, granum maximè nudum. Assurgit apud nos procerò, crassoq; culmo, vt triticum. Semen *germano* iam dicto simile, sed arctius, longius, acutius, & nigrius, sæpè albicans, & admodum per menses caducum.

Satiuam auenam dicimus, syluestrem bromum Theophrasti, vt dicemus in *Gent.* sequenti. Hæc tamen quum feritur, & colitur, frugifera est, si neglecta & inculta, semine vidua. Ob id Virgilius,

Steriles dominantur auenæ.

Est & auena Græca, cui non cadit semen. Plinius, Sunt qui bromum fertilem auenam, & gilopem verò dicant sterilem, quasi festucam sine semine.

Quia radice, culmoq; multiplici nascitur, solū emaciat, ob id Theophrasti *solum.* præcepto frugale ei damus. Alii sicco solo latari dicunt. Virgilius solū emaciare dixit: *Vrit lini campum seges, vrit auenæ.*

Hoc semen, Galenus inquit, in Asia frequens est, & potissimum in Myſia; *Colum.* quæ est supra Pergamum, vbi & tiphæ, & olyræ vberimus est proventus. Plinius: Germaniæ populi ferunt eam, nec alia pulte viuunt. In oriente & Onis insulis. Ex hoc auguror, quod vtroq; cælo fruitur, calido vt Asiæ, & Apuliæ: & frigido, vt Germaniæ, atq; tritici naturam forsitur.

Theophrastus in cultis erumpere dixit, nonnunquam quum prius germinis infœcunda esset, diligenter culta germinauit, & copiosa reddita est. Et peculiari vel illo à cæteris frumentis eis discerni putatur, quod annis alternis semen aptum sit provenire. Quamobrem qui eam delere penitus volunt (nam deleri percontumax est) segetes annos duos laxant à sarn, quumq; plenè diffusa in herbam est, pecus sæpè impellunt, vsq; dum penitus depascatur, idque planissimū eius exitium fit, quod simul & alternatam eius germinationem testatur. Cuius rationē libro de causis vestigat, & varia opinione fluctuat, numeratio in radice, ex qua postquā vnus prodierit stipes, prodit alter anno sequente, & intercepta iterū instaretur germinatio: vel collapsio prioris anni semine procreetur: ob id vt eam deleant, rudetū primum faciunt, biennio supersedendo arationi: & altero anno subpullulat, quod reliquum est, vt quod priore anno præstitū est, & quod sequenti pollicebatur, exeat non amplius rediturum. Vel semen totum annum incorruptum permanere sub terra, quoad tempus appetat idoneum ipsum ciens ad germina, & tunice plures, quibus vestitur, ei vsu veniunt. Vel bipartiti seminis pars abit in stipulam, pars manet sequente anno germinatura. Columella: Avena autumno feritur, partim caditur in fœnum, vel pabulum dum adhuc viret, partim semini custoditur. In Apulia omni solo ferunt, tempore quo feritur ordeum. Quæ sata nascitur, crassiori & proceriori culmo est, quæ sponte, tenui stipula, & ieiuna spica sterili est. Caducum præcedentis anni semen in agris restibili fecunditate regerminat, re-
 40 Equamq; frugem præcoci maturitate præueniens, tabe conficit, ei subripiens alimentum, ita seges suo decoquit domino.

Messis.

Properanda messis est: nam ut diximus, illicò matura semen prolicat, ut spica granis viduata appareat, ex Theophrasto. Multo enim ordeum antecedit auena, ut culmus remaneat inanis.

Coditura.

Pertunditur etiam auena, & si multum vestita sit, sponte suæ naturæ. Intus enim incipit vitium, nempe si vetulam auenam consideres integro corio, optimam iudicabis, si conteres digitis, cassam inuenies, nec nisi acus, aut glumus est.

Panis.

Germaniæ populi ferunt auenam, nec alia pulve viuunt. Plinius. Et in Orientis partibus gentes esse, quæ ibi sponte nascenti auena vescantur, & in Oonis insulis. Et si apud nos equorum, iumentorumque pabulo feratur. Sunt gentes etiam, quæ alimonix caritate, confecto ex auena pane, famem arceant.

Mutatio.

Mutatur zea, triticum, & hordeum in auenam. Theophrastus auenam in ordeo nasci scripsit, & esse, quæ non singulis frugibus oriantur, ut auena tritico, & ordeo: eaque interimat, quia pabulum tollit, tam quod terra ministrat, quam quod à sole & aëre venit. Mutatio in formam alienigenam miranda sanè est: ut ex semine in auenam suam permutat naturam, sed vere transit in proximam. Plinius, Proximum omnium frumenti vitium auena est, & ordeum in eam degenerat. Soli maxime, cœlique humore hoc euenit vitium. Sequentem causam habet imbecillitas seminis, quum diutius retentum est terra, priusquam erumpat. Eadem est ratio si cariosum fuerit, quum fereretur. Prima autem statim eruptione agnoscitur, ex quo apparet, in radice esse causam. Est & aliud ex vicino auenæ vitium, quum amplitudine inchoata granum, sed nondum matura priusquam roboretur corpus, afflatu noxio cassum, & inane in spica euanescit quodam abortiuo. Agilopem ordei vitio fieri testis est Galenus ex nimia vligine, quum prima generatio vel incrementum ipsis non rectè successerint. Porro ut Galeni pater ætate iam declinante, quum agricultura delectaretur, descripsit, triticum ac ordeum aliquando seminavit, omnibus diuersi generis seminibus, quæ ipsis erant admista, diligenter selectis, quo certo cognosceret, num ex ipsorum mutatione lolium, & ægilops nasceretur, an hæc propriè semina naturam haberent. Enatis seminibus in tritico frequens lolium, in ordeo parum, sed magnum ægilopis vim enatam conspexit.

De bromo. CAP. XXX.

SVBI VNIXIMVS auenæ de bromo caput, quum vel eadem res multis existimetur, vel ab ea parum diuersa. Theophrastus de vtraque seorsum egit, & inter se similia dixit: quod fuit in causa, ut nos diuersum caput cōderemus. Plinius externum semen esse, & ab oriente inuectum nobis dixit, & inter vitia segetum esse, & ex auenæ genere.

Nomen.

Græcis βρομος, non à fœtore, sed quia veterina ea vescantur, vel à fragore, quem

quem natura legis
lis auena galatro.

Theophrastus
qua culmus frequen
tubicaloricatur.
dicerem. Nascit
ticum, & aspect
folio, grana in spi
at istas granum s
10 mapilosa est, &
mum suum ita pi
tur, & in cacumib
bus semen con
ferens, folio & st
veluti locustas ha
similia foliis triti
tria, & super ipsa
duo, quæ diximu

Plinius. Gen
10 Sta, oryza simili
mania & Italia
diuimus panes fi

Est & inter
ficium.

Græci βρομος
cerebrum vapi
ut remulentes
liquaq; membra
30 Itali gregio
Ordei, cuius n
fuit. Sed pingui
non multis inter
ideo & tritico
psit capite de ph
granum in dura
Aquam vehem
et us diligere ex
corruptis vligin
40 Negat Theo

quem natura seges flatu edit. Latinis auena, quod ad fructum non veniat. Italica *auena galatro*.

Theophrastus ita describit. Avena radice numerosiore, quam ægilops, ex qua culmus frequens spargitur: aspectu veluti sylvestri, & immiti, multiplici tunica loricator. Semen ut zea. Mea sententia *galatrum* vulgò vocatum esse dicerem. Nascitur auena inter ordeum solum. *Galatrum* inter ordem & triticum, & aspectu sylvestrius quam auena, stipula surgit crassiori, & nigriori folio, grana in spica bino ordine, in auena singulari, gluma foras binas profert aristas granum strigosius, longius, & pilosius, avidius à bestiis deuoratur: gluma pilosa est, & nigra, è cuius dorso arista intorta nascitur. Dioscorides bromum suum ita pingit: Genicula quædam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur. Plinius à Dioscoride eadem refert. Herba est spicam ferens, folio & stipula triticum imitatur, in cacuminibus dependentes paruas veluti locustas habet. Auicenna ægilopem depingit. Est herba cuius folia sunt similia foliis tritici, sed sunt leuiora, & fructus eius habet velamina duo, aut tria, & super ipsa sunt quædam similia pilis. Galatrum tria habet velamina, duo, quæ diximus, tertium cito cadit maturescens.

Plinius. Genera bromos, siligo, & tragos, externa omnia ab oriente inuenta, oryza similia. Nascitur inter vitia segetum, ex auenæ genere. Gallia, Germania & Italia latatissimum, equis pabulum eius granum. In Calabria audiuimus panes fieri non respuendos, & pulkes, & porus.

De lolio. CAP. XXXI.

EST & inter segetum vitia lolium, cuius etiam semen scribitur in panificum.

Græci *ζζον* vocant, *ζζον* nō *ἀσπερας*, quod est sursum efferri: effertur enim in cerebrum vapida aura, atq; dementia affinis, tenebrosa vertigo ex lolii usu, ut temulentos efficiat vescentes, ut torpido veterno cerebrum opprimat, reliquaq; membra torpore afficiat. Vocant etiam & *ζζον*. Latini verò lolium. Itali *gioglio* & *zania*.

Ordei, cuius mentitur effigiē, vitium est, sed foliū angustius, pinguius, & hirsutius. Sed pinguitudo ei peculiare notatur: nam pilositas auenæ datur. Semen non multis intactū tunicis affert, ut auena, sed nudū, aspectu penitus sylvestre, ideo & tritico validius est. Hec ex Theophrasto. Dioscorides spicā ferre scripsit capite de phœnice. Describimus nos: Spica nulli similior, quam phœnici, granum in dura tunica, stipula, codice, & reliquis, ut tritici, flore subpurpureo.

Aquam vehementissimè amare Theophrastus scripsit, ob id vliginosos tractus diligere existimarem, quum & huiusmodi in locis triticum, vel ordeum corruptis vligine seminibus, aut nimio imbre dilutis, nasci dicant.

Negat Theophrastus lolium vernam esse frugem, quemadmodum reliqua satia.

herba: nam confestim hyeme ineunte id exortum patescit. Nascitur partim anno primo, partim secundo.

Mutatio.

Triticum, ordeum, & linum mutatur in lolium, & è contra. De lolii origine, tanquam cæca, ambigitur. Mirandum profectò arbitratur Theophrastus, triticum, & lolium mutatas inter se habere vicissitudines: nam & triticum in lolium, & rursus lolium in triticum, quum nullum ex frumentis istis validius reperiatur, & tam magnam mutationem recipiant. Per multi enim quum ordeum & triticum seruissent, lolium messuerunt. Mirum quoque si linum in lolium transeat: nam inter se plurimum distant, quarum rationes superius capite de tritico diximus. Degenerant fruges, quæ potissimum viribus præstant, ut triticum atq; ordeum, hæc enim in lolium transeunt, sed magis triticum, quia validius. At si lolium in triticum transeat, hoc certe admirabilius est, ceu imbecillitatem quandam, vel morbum seminis intelligere licet, quam alimēti, cæliq; mutatio tollere possit. Ad hæc in genere frumentorum aliud purum lolii nascitur, ut Ponticum, atq; Ægyptium, purum & siculum satis, & præcipuè Agrigentinum sine lolio exit. Sed hæc quidem locorum naturæ ascribi licet. Plinius lolium inter frugum morbos potius, quam inter ipsius terræ pestes connumerat. A Virgilio infelix dictum in Georgicis,

Infelix lolium, & steriles dominantur æuena.

Barb.

Aristoteles libro de somno & vigilia inter ea, quæ grauedinem capitis efficiunt, lolium commemorat. Theophrastus graue lolium dixit, & caput tentans. In potu enim inebriat, & celerrimè vertiginem mouet. Aiunt Græciæ & Asiæ balneatores ad pellendum turbam solitos carbonibus id semen obii-cere. Ouidius ad id in Fastis,

Et careant lolis oculos vitiantibus agri.

Hinc natum prouerbum, quo Plautus vitur in milite, contra eum, qui nihil videat,

Mirum est lolio vilitare te, tam vili tritico.

Quid iam? Quia lusciosus.

Monere solebat Galeni pater, ut cerealia semina priusquam in satiationis v-
sum venirent, diligentissimè iis frugum vitis liberarentur, etenim triticum, nisi
lolium à re frumentaria operosè idoneis ad hoc incerniculis expietur, vescen-
tibus noxam inferet, nam capitis dolores continuo mouentur, vertigines ob-
uersantur, postmodum sequens estas curem fœdis obsidet vlceribus, aliq; e-
mergunt incōmoda, quæ nutrimenti huius improbitatē satis ostendunt. Præ-
cepit igitur Galenus non fastidiendum triticei repurgamēti præceptū: nam si
grassantem sensim noxā inter iniuria propter exiguitatē vespentes non sentiāt,
gliscente multo pluribus diebus vitio impunè non effugient, quū tandem ea
non sine magna vitæ alea, manifestus eruptura prodeat. Frumentū, ut Paxa-
mus est author, lolium necat, panibusq; mixtū vertigines edentibus adducit. 40

et dicitur.

Sponte naturæ tunditur, & si acerbi sit saporis, ex Theophrasto.

De

CONNV M
Criticum con-
Theophrasto
domelanthium
Theophrastu
triticum peculiare
rans: nascitur int
men nigerrimu
nem candidissim
cernere, quum
pedum longitu
pureos, malua
rina tritico perm

N V x cad al
ante Vergi
lat, atq; commu
Columella inte
tribuerit, nam
Gracis xēgōs
xēgōs vocat
cant, à miliaria
nim tanx ferac
ro etymon à G
rum milium
Theophrast
lium multiplici
quem circa spic
am comam iuba
rimis folliculis c
concauam. Sen
fensum quippe
capillo curuans
num triumve c
comam harunc
te tunica tectis,
Cato nebulo
do celo gauden

De melampyro. CAP. XXXII.

CONNUMERATUR etiam melampyron à Theophrasto inter ea, quæ tritico conuascuntur, quasi etiam frugum pestis.

Theophrasto *μελάνυρον* est, quasi nigrum triticum dicas: nobis verò pseu- Nomen.
domelanrhium dictum. Plinius git vocat.

Theophrastus de suo melampyro hæc pauca habet, Melampyron siculo Descriptio.
tritico peculiare, granum eius innocens, nec sicut lolium graue, ac caput ten-
tans: nascitur inter triticum, & præcipue apulum, quò siculum conferrem, se-
men nigerrimum, farina alba, nec noxia capiti, vt Theophrastus dicit, pa-
nem candidissimum facit tritico immistum: nec curant pistores à tritico se-
cernere, quum res innocua sit. Caules producit rectos, quinque vel quatuor
pedum longitudine, folia lata, vt leucolii, pilosa, in summo flores profert pur-
pureos, maluæ effigie, radix alba, multum fibrata. Semen nigrum, cuius fa-
rina tritico permista vesca est. Dixit Plinius: git pistrinis nascitur.

De milio. CAP. XXXIII.

NUNC ad alia frumenti genera deueniendum, quæ æstiuæ dicuntur, quum ante Vergiliarum exortum serantur. Theophrastus tertium genus appel-
lat, atq; communi appellatione carere ait. Nos miliacea frumenta dicemus.
Columella inter frumenta reponendum cæset, quamuis id leguminibus con-
tribuerit, nam multis regionibus cibariis eorum coloni substinentur.

Græcis *κέρως* à minuti sicuum granis, seu gigartis numerosissimis, quæ Nomen.
κέρως vocantur, dictum existimo. Straboni *κέρως*, Latini milium vo-
cant, à miliaria summa, authore Festo, quasi millesimum ferat granum: est e-
nim tantæ feracitatis, vt singula grana ternos reddere sextarios ferantur. Var-
ro etymon à Græcis deducit, quod communi nomenclatura tum panicum,
tum milium *μυλινον* vocant. Itali *miglio*.

Theophrastus ita describit. Ex alta numerosa, & valida radice fruticat mi- Descriptio.
lium multiplici, & valida stipula geniculata, arundinacea, flore lanuginoso,
quem circa spicam gerit. Semen in iubam profert, effusam illam arundinace-
am comam iubam appellat, similem ei, quam oryza fundit, semine feraci, plu-
rimis folliculis concluso. Plinius, Surgit milium in culmum geniculatum, &
concauum. Semen tantum pro indiuiso, & paruis aubus expositum, inde-
fensum quippe membranis continetur. Comæ granum complexa simbriato
capillo curuantur. Apud nos fibrosa radice ternos, quaternosve culmos, bi-
num triumve cubitorum altos, hirsutos, arundinæcos exerit, iubata fœtura,
comam harundinaceam imitante, grauida pusillis numerosisq; acinis, læui-
ore tunica tectis, rotundis, lubricisque.

Cato nebuloso solo feri iussit. Plinius eadem ex Catone. Columella humi- Cælum.
do cælo gaudere dixit. A quo Palladius etiam humidum cælum ei tribuit.

Milio Campania præcipue gaudere dixit. Plinius, Sarmatarum quoque gentes, non aliam frugem nouisse: serique debere in humidis. Apud nos aërem tepidiorem amat.

Solum.

Theophrastus quia multiplici culmo, numerosa, validaque radice præditum sit, proinde maxime terram extenuare dicit, ob id facile latum, & crassum agrum tribuendum censuerim. Cato ei agrum crassum, latum, & sine arboribus conuenire dixit. Columella leuem, solutamque humum desiderare. Nec in sabuloso solo, sed in arena quoque prouenire, modò humido cælo, vel riguo solo: nam siccum, cretosumque reformidat. Plinius vetat inter vites arboresque frugiferas milium seri, terram hoc satum emacrari existimans, nec nisi in sterco rato seri. A Columella Palladius eadem habet. Florentinus Græcus, Limosa & humida terra gaudet milium, arenosa etiam, si frequentius rigetur. Nos limoso, pingui, & glutinoso solo serimus.

Satio.

Verno tempore seritur, quod aestiuus seminibus attributum est, quum ob suam imbecillitatē hyemem perferre nequeat. A flore intra dies quadraginta absolui dixit Theophrastus, idque inter omnes constare, non tamen deesse, qui vel pauciores prodiderint. Minus aquarum indiget, nam si plus habuerit, folia dimittit. A quo Plinius: Aestiuā ante Vergiliatū exortum serūtur, Italiā duntaxat ritu, alioquin in Græcia & Asia omnia Vergiliatū occasu seruntur. Alii vernum milium appellant. Quadraginta diebus maturatur à flore, & quia purgati nisi tostum non potest, cum suis folliculis crudum seritur. Extremo vere milii satio est. Iustum est hoc maturato hordeo, atque etiam in eodem aruo, estque signum illius maturitatis, & horum sationis commune lucentes vespere per arua cicindelæ. Ita appellant rustici stellantes volatus, Græci verò lampyrides, incredibili benignitate naturæ. Serere in iugero temperati soli iustum est milii sextarios quatuor. Varro: Exit è terra milium quatrinduo, aut quinque diebus. Columella: Antever feri non potest, quoniam teporibus maxima tamen parte Martii mensis commodissime terræ committitur. Nec impensa graui satione cultores onerat, quippe sextariis ferè quatuor iugerum implet. Frequentem tamen exigit sarritionem, & runcationem, ut herbis liberetur. Milii sextarii quatuor bubulcorum operas occupant quatuor, occantur operibus tribus, sarriuntur tribus, quot operis carpantur incertum est. Palladius calidis & siccis regionibus Martio mense milium serit, herbis inber assidue liberari, quinque sextariis spatium iugeri compleri. Maio mense locis frigidis, & humectis. Florentinus Græcus, Seminis pauxillum omnem implet agrum, sarriri, & runcari continuo desiderat. Seritur ab æquinoctio, quod ante octauum Apillium calendatum diem peragitur. Quod si densius seratur, noxam trahit, quando vix iugerum recipiat, quantum plena manus continet, etiam si inter sarrendum quippiam euellatur. Itaque satum diligenter iugerum modicos quadraginta proculdubio perfert.

Meis.

Semina quoque minora sunt, eo fertiliora sunt, & quæ minima, maxime fructificare:

fructificare videmus, quod minor est, quod eiusmodi temperent. Argmina ipsa hac ea validi sunt, nec Er alibi: Aetna ætuo tempore

Columella: I

10 10 stidio potest absolui diendam præbetur nis prædulcis. Saffarina, equinoctiam frugem, quæ frumentum pondopanis emendis. Fit quoque cultibus: Milii penuria. Panistur per aridum & pinguedinis, & oleo veltuntur lius concoquitur lacti in octam, vultur edulium, vultur tris facilius molitur laganas, & placili mox, quum

Milium et si

30 30 men optime repertus Plus centum m Multi ad nulli sarriantur, defoc nocere, sed etu sturnorū passer in quatuor angu

D Epanico e ui poterat inter frumenta

edificare videmus, ut milium. Rationem assignat Theophrastus libro de causis, quod minora facilius effici possunt, copia autem facilitati adiudicanda est, quod eiusmodi omnia facilius augeant, celerius quæ aëris qualitati obtemperent. Argumento quoque temporis breuitas accipi potest: nam & semina ipsa hac eadem causa fertiliora, quam arbores sunt. Item eorum caules validi sunt, nec ligno constant, & multiplices, & in ramos diffusi prosiliunt. Et alibi: Æstiva semina, quia imbecillia sunt, perfici celeriter possunt, & ob id æstiuo tempore feruntur.

Columella: Panis ex milio conficitur, qui antequam refrigescat, sine fastidio potest absumi. Pultem quamvis in copia, maximè cum lacte non fastidiendam præbet. Plinius, Campania pultem candidam ex eo facit. Fit & panis prædulcis. Sarmatarum gentes hac maximè pulte aluntur, & arida etiam farina, equino lacte, vel sanguine è cruris venis admisto. Æthiopes non aliam frugem, quam milii nouere. Panis multifariam è milio fit, sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. x x x x enim pondo panis è modio reducant, modiumque pulvis ex tribus sextariis madidis. Fit quoque vinum è milii semine maturo. Galenus de alimentorum facultatibus: Milio item in panes nonnunquam abutuntur, urgente frugum penuria. Panis tamen ex eo exigui est alimenti, & refrigerans. Constat insuper peraridum & instar arenæ & cineris friabilem esse, nihil enim in se habet pinguedinis, & lentoris. Agricola huius farina cocta, admisto adipe suillo & oleo vescuntur. Ad omnia panico præfert: nam & gratius estur, & facilius concoquitur, ventremque minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam, veluti triticeam, agricolæ mandunt. Lacte præstantius redditur edulium, ut in edendo iucundam volupratem conciliet, deiectionem ventris facilius molitur, eoque duce facilius membratim digeratur. Nos panes, laganas, & placentas ex eo conficimus, in mandendo glutinosas, & ingratas, nisi mox, quum coctæ fuerint, edantur.

Milium etsi acerbis saporis, sponte tamen suæ naturæ tunditur, omnium tamen optimè reponitur milium, quia tunica multiplici integitur, & sicca est. Plus centum manet annos, si condatur, quo venti non petuant.

Multi ad milii remedia, rubetam noctu aruo circumferri iubet prius, quam fartiantur, defodi que in medio inclusam vase fictili, ita nec passerè, nec vermem nocere, sed eruendâ priusquam metatur, alioqui amarum fieri. Pestem à milio sturnorum passerumve agmina scit Plinius abigi herba, cuius nomen ignotum est, in quatuor angulis fegetum defossa, mirum dictum, ut omnino nulla avis intret.

De panico. CAP. XXXIIII.

De panico eadem est tractatio cum milio, eodemque capite vtrumque absolute potest, nisi nos clarioris doctrinæ gratia seiungeremus. Columella inter frumenta reponendum arbitratur.

Nomen.

Theophrasto nunc *ελυμος*, nunc *μελινος* dicitur, unde & milium etiam dicebatur, auctore Varrone. Fuit enim milii, & panici propter communes naturas, & usus promiscua nomenclatio, est quippe milii species. Latinis panicum dictum à glomerosis tuberosisq; racemis in paniculam nurantem, & longam aggestis: nam Plinius panicum à paniculis dictum dicit. Apud nos Latinum nomen retinet, *panico*.

Genera.

Plinius: Sunt & panico genera. Mammoso, è pano parvis racemato paniculis, & cacumine gemino. Quin & colore distinguuntur, candido, nigro, rufo, etiam purpureo. Apud nos sativum & sylvestre.

Descriptio.

A Theophrasto ei calamus tribuitur arundinis ut milio rectus flos lanuginis, semen circa spicam, multiplici tunica contextum, & radice valida, & caule valido, & multiplici. Plinius, Cacumine languido, nutante, paulatim extenuato culmo penè in surculum, prædens aceruatur grans cum longissimo pedali, semper tamen pro indiviso, & parvis aubus expositum, indefensis quippe membranis continetur, culmo geniculato, & concauo. Panicum milio per omnia simile, nisi in paniculis, siquidem ea pedali longitudine profert ad terram versa, prædens racemis compacta, non ut in milio diuisa, grans miliaceis exilioribus, numerosioribusq; multis tunicis obsitis, & hirsutis. Sylvestre stipula, folio, culmo, internodiis, & radice omnia panico non dissimilia profert, longè tamen minora, sed spica peculiari non in umbonem collecta, sed minore, & alterno situ summo cauli hærente.

Cael. Sol.

Cælum, & solum idem, quod in milio diximus.

Eandem quoq; panico tribuimus diligentiam, quam milio tribuimus.

Diocles Medicus, auctore Plinio, mel frugū appellauit. Panico Gallia quædam, præcipuè Aquitania vitur. Sed & Circumpadana Italia, addita faba, sine qua nihil conficiunt. Pontica gentes nullum panico præferunt cibum. E panico panis rarius fit, quàm è milio. Columella, Panicum pinstitutum, & euolutum furfure pulterem, quauis inopia, maximè cum lacte non fastidiendam præbet. Dioscorides miliaceo pane minus nutrire & stringere dicit. Galenus paucioris alimenti dixit. Nulla gratia, aut iucunditate cõmendatur, maximè quod in Asia nascitur: nam apud alias gentes, ut in Italia longè melius inuenitur. Panis, qui ex eo defingitur, persiccus, & cineris aut auenæ modo friabilis, lentoris fœdere, aut humoris vinculo carens. Quapropter iure optimo coctum in aluo resiccat humorè, atq; exhauriēs exugit. Rustici haud ferè aliter, quàm admissito pingui suillo, & oleo ad domandā ariditatē farina vescuntur. Panicum in omnibus milio cedit, infuuius esu, cõcoctu difficilius, ventremq; multo magis firmas, quare in eduliis rustici nō sine lacte vtuntur, ad tollendas eiusmodi noxas, sic faciliorem concoctionem, suauitatē, ac in corpus distributionem à lacte sibi asciscit. Sed agreste panicum, molitur in farinam, & in agrestem cogitur panem, ubi premit caritas tritici. Apud nos verò ad columbarum, gallinarumq; saginam potius, quàm ad hominum alimentum feritur.

De

INTER frugum dicum Plinius annos omni gignuntur.

Latini (6 Plinius) saginam, & meli fruges, scilicet m Plinius ita des

des altitudine sepegetem vidimus medulla intrus farris, spicatis in sum oblonga rotunda tunica involutis. pas concinnant, mis viticulis rigi

Apud Ferrariorum maturitatem

Plinius seri deplici culmo, & r

Apud eos ira

optime pastinatu

Locis temperatis

Viginti diebus su

lulet. Iunio occu

bri meritur, & in

Miselli illic c

gent, melicam

30 boum, & equar

EST & apud

quàm panis

opicum milium

magnitudinem

co in dico iam di

do, in summo sp

capillaceis filam

candido colore,

40 ticularis, durissi

De milio Indico. CAP. XXXV.

INTER frugum genera melicam annuærabimus, & fortasse milium Indicum Plinii ex India in Italiam allatum Neronis principatu, intra decem annos omnium frugum fertilissimum: nam ex vno grano terni sextarii gignuntur.

Latini (si Plinianum Indicum milium est) Indicum milium vocant, Itali *Nomen* *saginam*, & *melicam*, vel *surgam* à proceritate, qua surgit inter suas cognatas fruges, scilicet milium, & panicum.

Plinius ita describit: Amplum grano, arundineum culmo, adolescit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis: lobas vocant. Ferraria nos hanc fegetem vidimus, harundineis consurgere culmis ad hominis proceritatem, medulla intus farctis, fuscis, geniculis tuberosis, superioribus foliis mucronatis, spicatis in summitatibus fastigiis, panico maioribus, floribus luteis, granis oblonga rotunditatis, subrubris, cannabis aut milii duplo maioribus, duplici tunica inuolutis. Petioli, quasi filamenta sunt, è quibus, excussis granis, scopas concinnant, vestibus, & capiti detergendis, verrendisq; & arefactis summis viticulis rigidioribus, & exilibus.

Apud Ferrarienses genera sunt, rufiora, nigrioraq; & quæ cito, & quæ serò maturitatem sentiunt.

Plinius seri debere in humidis scribit. Oprat & lætum solum: nam multiplici culmo, & radice emaciatur solum.

Apud eos ita feritur. Octaua corbæ pars bubulcam replet, solum exposcit optimè pastinatum. Si nimia loci pinguedine perit, sarculatione adiuuetur. Locis temperatis, Martii fine, calidis citius, frigidis serius cum milio feritur. Viginti diebus sub terra latitat. Maii initio ablaqueatur, ut lætius à radice pululet. Iunio occatur, ut se solis ardore tueri possit. Augusti fine, vel Septembri metitur, & in fasces colligitur, & ubi sole inaruit, area tritatur.

Miselli illic coloni pertæli operæ, & longioris moræ, qua ceteræ fruges egent, melicam ferunt ad panificia, alibi columbis, & pullis alendis, & suum, & boum, & equarum pabulo.

De milio Æthiopico. CAP. XXXVI.

EST & apud nos planta, superiori multum affinis, ut oblectationi magis, quàm panificio sata, & culta. Dicunt ex Æthiopia aduectam, ob id Æthiopicum milium multis vocatum, & nostro orbi iam inquilinum, ad frugum magnitudinem, & speciositatem adolescit. Folio & calamo cõsurgit similis tritico indico iam dicto, intus alba medulla infarcto, sacchariferarum arundinum modo, in summo spicata fastigia milio maiora insunt, quæ post delapsos flores è capillaceis filamentis exiguis, rigidisq; grana dependent, albo folliculo oclusa, candido colore, ut niuea videantur, minus exacta rotunditatis, sed cõpresso, lenticularis, durissimum fractu, nigro puncto, quo spicæ, vel petiolo hærent, ut

ægrè diuellantur. Spica est semipedis longitudine. Tepidum cœlum, & pingue solum desiderat. Seritur Martio cum milio. Floret Iunii fine, quindenis diebus singulas radices profert è nodis siue geniculis, primo è terrâ proximioribus, & gradatim ad superiora tendens, vsque ad quartum. Radices terram à summo petunt, eique infunduntur, vt plantæ moles firmius contra ventorum impetum firmetur. Grana candidissima, candidissimam farinam promunt, panificiis aptam.

De sesamo. CAP. XXXVII.

ETSI veteribus ferè omnibus, vt pleraq; alia cerealium seminum, notissimus erat vsus sesamæ, nostris tamen temporibus intercidit: nam multis in locis non solum frugem ipsam, sed nomen ignorant, sed medico tantum vsui inseruit. Columella inter legumina reposuit, Plinius inter æstiuæ frumenta. Theophrastus tertium genus dixit, quæ in æstiuis sementibus carent communis appellatione. Nostra leges in vtriusq; medio habet, & frumentorum fine, & leguminum principio, vtrouis modo accipito. Sed æstiuæ semine aliqua spicis, aliqua vasculis clauderantur: diximus quæ spicis, par est, quæ clauduntur vasculis subiungere.

Nomen.

Græcis & Latinis idem nomen fuit, quippe illis *σιταμον*, vel *σιταμν*, his sesamum, & sesama. Varro sesima. Palladius sisamū. Italis *ginguile* a vulgò dicitur.

Descriptio.

Theophrastus ita efformat illud. Attollitur caule crassiori, & multipliciori, & numerosiori radice, quàm miliū. Alibi verò simpliciori radice, & culmo quàm miliū, caule ferulaceo, recto, flore lanugineo, sed foliis conformato. Grana fert in siliquis, distincta vt lupini, sed peculiari quodam in modo septa, & pinguiuscula. Viride nullū animal attingit propter amaritudinē, & grauitatē saporis, siccū acceptius, & suauius sit, quum quicquid amaritudinis in eo fuerit, percoctum excretumq; sit solis opera. Inter æstiuæ feracior, & in totum ferè simile iriono Plinius verò ita depingit, Sesama fastigiatur in culmum ferulaceum, folio sanguineo, semen includitur vasculis, nullum animal veskitur. Addimus: Surgit caule sesquicubicum alto, foliis amygdali, siliquis cylindraceis, præsepiolis distinctis, semine flauesciente, oblongo, radice simplici, & alta.

Genera.

Generum differentiam ex colore, & sapore Theophrastus accipit. Ex eo candidum præfertur dulcedine, quod & in cæteris leguminibus accidit. Plinius, Color eius candidus.

Cœlum.

Columella in Syriæ, & Ciliciæ regionibus, & Pamphiliæ Chalcide vidit. Plinius, Sesama ex Indis venit. Ob id existimarem calidum cœlum exoptare.

Solum.

Nihil ita emacrat solum ex æstiuis sementibus, vt pote cui crassior, & multiplicior sit arundo, quàm milio, & radix quoq; numerosior, ex Theophrasto. Ob id Columella dixit, Putre solum, quod Campani pullum vocant, plerumq; desiderat, nō deterius tamen pinguibus arenis, vel congestiis humo prouenit. Palladius ab eo: Seritur putri solo, vel pinguibus arenis, vel terra congestiis.

Æstate

Æstate feri sesamum monet Theophrastus, tum imbecillitate, ut à tem- Satio.
 pore petat opem, tum quod natura propensa sit ad celerem fructificatio-
 nem. Neq; est terrestris substantiæ, ut illa leguminum, neque penitus le-
 uis, ut illa hordei, sed pinguiuscula est, atq; opus habet coctionis, ob id cun-
 ctabundum it ad maturitatem. Constat radice vnice, ob id æstatis molli-
 tiem appetit, nec habet aduersus hyemem præsidia. Non moratur ergo na-
 turæ operam ad superiora conficienda, quin sese expediat, nisi pinguedo
 illa nonnihil exigeret operæ. Postquam defloruit quadragesimo die absol-
 uitur, ut omnia æstiuæ, & si non desint qui intra pauciores dicant: ei post
 10 sationem imber officit, quæ cæteris omnibus superueniens frugibus pro-
 fit. Plinius: Quadraginta diebus maturatur à flore sesama. Varro: quin-
 que diebus sesima exit è terra, præterquam si quid regio, aut tempestas vi-
 tij attulit, quominus ita fiat. Columella eius sationem docet sic: Sesama,
 quæ rigantur, maturius, quæ carent humore ab æquinoctio autumnali se-
 renda sunt in Idus Octobris. Tantumq; feminis, quantum milium, pani-
 cumque, interdum etiam duobus sextariis amplius in iugerum spargitur.
 Sed Ciliciæ, & Syriæ regionibus Iunio, Iulioq; cõseritur, & per autumnum
 quum permaturuerit, tollitur. Sesami modij nouem, vel decem totidem
 operas, quot tritici modij quinque postulant. Sesami sextarij sex tribus iu-
 20 gis à proficissione coluntur, occantur operis quatuor, sarriuntur quatuor,
 & sarriuntur iterum duabus, metuntur duabus. Summa fit operarum quin-
 decim. Alibi: Quibusdam regionibus, sicut in Cilicia & Pamphylia Augu-
 sto mense sesama feruntur. Italiæ autem regionibus humidis possunt vlti-
 mo mense Iunio feri. Plinius, Æstate ante Vergiliarum exortum feritur, ut
 cætera æstiuæ Italiæ duntaxat ritu. Palladius, Septembri feritur. Iugero
 quatuor, vel sex sextarios seuisse conueniet, feriturque vsque ad idus Octo-
 bres etiã lato agro. Ex Quintiliis. Februario feritur, ut trimestre triticum,
 & Martio.

Optime reponitur, inquit Theophrastus, quia pingue est, sui que succi
 30 natura se tutari potest. Acerbi saporis est, & sponte suæ naturæ tunditur. *Cõditura*

Alexis in lebe in condimentorum catalogo sesamam recensuit ex A-
 thenæo. Plinius, Indi ex ea oleum conficiunt. Sic pinsi iubet Mago. Sesa-
 mam in calidam maceratam exporrigi, deinde cõfricari, frigidæ immergi,
 ut paleæ fluctuent, iterumq; exporrigi in sole super lintea. Quod nisi festi-
 nato peragatur, liuido colore mucescere. Dioscorides oleum Ægyptios ex
 eo conficere, ut nunc apud Græcos, & Turcas in maxima copia paratur in
 cibum, secundum locorum bonitatem. Nunc condiendis panibus in spar-
 gitur, & præsertim buccellatis, qui ex Cypro Venetias afferuntur. Nullus o-
 rientis frequentior cibus, quàm sesami, quamuis sequacis sit lentitiæ, &
 40 olæaginei liquoris.

Post sesamæ de erysimo, siue mauis de irione dicendum, quum sesamæ maximè assimilet Theophrastus, & cognatum faciat, & in aestiuarū frugum censu connumeret. Meminit alterius erysimi Dioscorides inter oleraceas plantas, à prædicto admodum dissimilis, sed vtriusque meminit Galenus, & Theophrastus inter frumenta, & Dioscorides inter medicamenta. Plinius vtrumque confandit, vt videbimus.

Nomen. Græci ἐρύσιμον vocant, Latini irionem, Dioscoride teste, sed suum irionem oleraceum intelligit. Plinius etiam cereale irionem vocari dicit, sesamæ simile, in Asia, Græciaq; erysimum, quod apud nos vocant irionem. Videtur mihi *fermentone* dictum esse, vel ei non admodum dissimile, vel *saracenicum*, quum nulla planta eruditorum sententia ei affinior videatur.

Descriptio. Theophrastus ita depingit: Caule consurgit ferulaceo. Folio constat, quod ab aliis sua proprietate discernitur. Flore foliaceo, vt sesamū. Prorsum idem erat, nisi pinguiusculum esset, quo virente nullum animal vescitur, quod amarum sit, sed siccum cibo idoneum, quum quantū in eo amaritudinis & difficultatis erat, percoctum excoctumq; sit solis opera. Feracissimum est, semenq; minimum affert, ideo ex seminis exiguitate fecunditas arguitur. Plinius, Folium sanguineum irioni & sesamæ. Erysimum erat, nisi pinguius esset, quod apud nos vocant irionem, medicaminibus annumerandum potius quàm frugibus. Irione nullum animal vescitur virente. Sed apud nos cubitali caule assurgit, striato, folio non frumentaceo, sed leguminoso, similacis, aut atriplicis, flore candido, semine glumis contento triquetris, nigris, maturescens planta purpurascit. Contritum semen albam farinam ostendit.

Cœlum. Calidum cœlum exoptare videtur: nam Plinius in Asia, & Græcia nasci scripsit. Apud Belgas & Antuerpianos nasci audiui: & in Italia ferax.

Satio. Theophrastus, Recens satio irioni pluuius imber nocet, quam quā reliquis frugibus prodesse videatur. Astatistempore seritur, quo panicum, & sesamum. A quo Plinius. Fruges sunt aestiuæ, quæ ante Vergiliarum exitum seruntur, vt sesamæ, irio, Italiæ duntaxat ritu, alioqui in Græcia & Asia omnia Vergiliarū occasu seruntur. Seritur & in Italia Aprili & metitur Iunio mense. Addunt calidis in locis bis in anno eodem agro prouenire.

Panis. Galenus primo de alimentorum facultatibus inter fruges eum referens, dixit, vt milio panicum ad simile est quodammodo, sed ad omnia deterius, ita & sesamo erysimum corporis substantia nonnihil affine, sed prorsum insuauius est, & tenuioris alimenti, adeo quod in omnibus deterius existit. Rustici non solum panem conficiunt, sed etiam pulmenta, quibus hyeme victitant. Vel granum incoquant rustici, vt bubus, iumentis, pecudibusque cedat in pabulum, cuius vsu vehementer gliscit sagina.

In ad alterum nunc de legum. grauidantur filii dicebantur, sic Varroni dicuntur. Gallicani quasi ferenda, quæ feraciora sunt. Eo clarissimis R. tuli, & Pisones, bis incipimus nius, sola ceredelebantur aprium præbetur pum causa faba.

Græcis *κναι* uit. Antiqui ferarunt a verbo. 20 faba poltea legte non vulgar. *κναι* etiam v quibus *κναι*, celebrabantur. tinis fabam dicit.

Theophrastus. Plinius & quæ percoctuarario seritur. 30 varix sunt magna. Est enim & minima, me reaspeisa, vel.

Theophrastus. surgit, & sine niculo, & magna. Fructus principium in propter com 40 sublata, minu.

IAM ad alterum frugum genus deuentum est: diximus enim de triticeis, nunc de leguminibus dicendum: illa enim spicantur glumis & aristis, hæc grauidantur siliquis, & vaginulis, & quemadmodum illa à terendo triticea dicebantur, sic hæc à legendo legumina Latini dixerunt. Legumina etiam Varroni dicuntur, quod vellantur à terra, non autem subsecuntur, vt fruges. Gallicani quidam legaria appellant. Græci *χεσποπὰ*, sicut etiam *καρεια*, quasi ferenda, quod semina multo scenore reddant, quum legumina triticeis feraciora sint, & multo prouentu minore labore, & tempore colantur. Ea clarissimis Romanis cognomina dederunt, sicut Fabij, Cicerones, Lentuli, & Pisones, à faba, cicere, lente, & piso cognomina retulere. Nos à fabis incipiemus, quod inter legumina maximus sit honos fabæ, inquit Plinius, sola certè frugum etiam exesa repletur crescente Luna. Faba maximè delectantur apes, vbi pabulum autumnale deest, duplexq; ex ea ministerium præbetur, cera, & cibus, vt inquit Varro, & Palladius. Et Plinius, Apum causa fabam ferere oportet.

Græcis *κίω* vocatur, à maxima earum feracitate, vt Galenus annotauit. Antiqui ferè cuncta legumina fabas, quasi prægnantes, & sæcundas vocarunt à verbo *κίω*, id est prægnans sum, & *κίωμοι* testiculi dicti olim. Sed faba postea leguminum omnium notissima, vt quæ plebi in annonæ caritate non vulgare præsidium afferat, speciatim nomen sibi soli usurpauit. *Πυραν* etiam vocarunt, vnde *πυρανεία* Atheniensium festa Apollini sacra, quibus *πυραν*, id est fabæ & legumina ferebantur, à quibus mensis, in quo celebrabantur, *πυρανείον* dictus, is Aprilis est, qui & Octobri conuenit. Latini fabam dicunt, & fabulum Festo, & Gellio authoribus. Itali *faua*.

Theophrastus colore & sapore discrepare dixit, cādida dulcedine præstant. Plinius nasci in Mauritania dixit, syluestrem passim, sed præduram, & quæ percoqui non possit. Columella trimestris meminit, quæ mense Februuario feritur, sed exiguas paleas, nec multam siliquam facit. Apud nos variæ sunt magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti, rotunda. Est enim magna, quæ pollicis iuncturâ superat, *ischiane* vocata. Sunt & minimæ, mediæque, quas *canzanellas* vulgò vocant. Sunt & rubro colore aspersæ, veluti cruore, & magnæ, quæ pro deliciis feruntur.

Theophrastus ita depingit: Faba sola ferè leguminum erecto scapo cōsurgit, & sine adminiculo nititur, mira interdum proceritate post cicer, geniculato, & fistuloso, sine ramis, folio rotundo, vt leguminum pars magna. Fructum fert siliquis, qui siliquis adhæret, & veluti quoddam principium inde obtinet eminens. Quum recentes sunt, mandi possunt, propter commissionem aquosi humoris: aridiores verò, humoris temperie

sublata, minus commendantur. Radice singulari, lignosa, & capillata fibris,

vt cætera legumina. A quo Plinius: Legumina omnia singulas habent radices, præter fabam. Leguminum vnicaulis faba sola, sed fistulosus caulis, folia multiplicia habet, vt cicer, & pisum, rotunda, vt magna leguminum pars. In eius flore literæ lugubres reperiuntur, alternis lateribus siliquatur. Sunt qui putent nostram fabam non esse antiquorum illam, quum nostras maior, eorum fabula, vel fabella sit, nunc enim loto, & terebintho pares comparantur, nunc taxi baccis apud Dioscoridem. Galenus verò rotundas, iuxta & æquales asellis subter hydriis delitescensibus ^{xylois} vocatis comparat. Aristoteles pulli decimi incubitus diei oculos faba maiores dicit. Ex his cognoscimus eorū fabam fuisse minorem, quàm hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem. Addimus nos: Folia ab extremo in fastigium rotundantur, carnosa, portulacæ similia, exortu alterno in ramis, quæ e caule dispari exortu prodeunt. Flore cristato versicolore, partim albo, partim purpureo, atris quibusdam maculis notato, vel nigricantibus lituris, quas rati lugubres literas illi Romani Flamines non mandebant, vt tradit Varro. Plures racematim ex vno pediculo exeunt, non vtrinque, sed vno tantum latere feriatim appensi. Eramusculorum cacuminibus capreoli exeunt singulares, adeo tenues, vt facile perdantur. Siliqua semipedali, fructu intus lato, humani vnguis effigie, vnusquisq; suis inhærens valvulis, perinde quasi peculiaribus cellulis clausi, basi, qua hæret, cernitur vestigiū nigrū illud, quod hilum vocabant antiqui, quasi germinis vmbilicellum.

Calum.

Calidum videntur cœlum expostulare, quippe calidis in locis, foliisq; expositis Theophrastus, coctiles fabas euenire dixit, vt in Ægypto, solis & aeris causa. Calor enim coctilitati, & digestionis pernecessarius est. Contra verò frigidus cœlo incoctiles. Apud Philippos ob frigidos flatus incoctiles nascuntur, vt latius in sequentibus dicemus. Auguror id verum esse, quod latis Apuliæ campis, & calidissimis optimæ proueniunt. Plinius nasci scripsit sua sponte plerisque in locis, sicut septentrionalis Oceani insulis, quas ob id fabarias dicunt. Columella nebulosum locum non pati dixit.

Solum.

Theophrastus leue solum melius fabam ferre dixit, sic enim modicè alimentum offertur, idemq; optimū præstare nouale dixit, quamuis frequens pangatur, & fructum largiorem ferat. Minime enim molesta est terræ, tum raritatis suæ causa, tum etiam quod solum, in quo sata sit, lætificet stercoreis vice. Ob id circa Thessaliam, & Macedoniam, quum florere incipit, arua moris est inuertere, quia legumen id solum pro stercore proficit. Cato: fabam in locis validis non calamitosi serito. Columella: Fabæ pinguisissimus locus, vel stercoreatus destinatur, nec macrum locum patitur, densa tamen humo commodè respondet. Sunt & qui putent in aruis hanc eandem vice stercoreis fungi, quod sic ego interpretor, vt existimem non sationibus eius pinguescere humum, sed minus hanc quàm cætera semina vim terræ consumere. Nam certum habeo frumentis vtiliorem agrum esse, qui nihil

quàm

quàm quistam
bam serito. Solum
doniam Thessaliam
dere lutosa terra
antequam enas
fiunt. Quintili
re. Palladius à C
locum, vel vall
eius generis non

frumentis proba
baccæ mellis ed
terris serimus, v

Theophrastu
dicum firmitate
ante hyemem se
nam si serò serat
flore, quia raro
obnoxia est, vt
possit. Eiusim

corpore soluto.

quauis causa of

serere audeant.

mè seri putat Va

seri, & pars vlti

Tempestiua fre

mam parum rec

quæ mense Feb

guas paleas, ne

dicentes audio

quocunque ter

uerimus in satio

curret eo die sol

decima vtiq; a

semen operiri n

liisve caulis: du

Vera

Ab his Pliniu

vt antecedit hy

lia ritu. Sed ma

fructum eius.

præcepit, allij p

quàm qui istam siliquam proximo anno tulerit. Plinius: In solo valido fabam serito. Solum, in quo fata est, latificat stercoreis vice. Ideo circa Macedoniam Thessaliâque, quâ florere incipit, vertunt arua. Didymus gaudere lutosa terra dixit. Rationem addit Leontius. In arida enim cōcidunt, antequam enascantur, & pereunt, quæ verò non concidunt, degeneres fiunt. Quintilij fabam humectis locis, & humorem continentibus gaudere. Palladius à Columella: Faba pinguisimum, vel stercoreatum desiderat locum, vel vallem, quam succus veniens à summitate fecundet. Satione eius generis non fecundatur terra, sed minus læditur, & agrum vtiliorem frumentis probari, qui anno superiore vacuus fuerit, quàm qui calamos fabaceæ messis eduxit. Nos autem magnas & latas fabas in planis & validis terris serimus, vt Apuliæ, paruas autem tenui solo, & collibus.

Theophrastus maturè feri præcipit: nam suæ imbecillitatis gratia ad radicem firmitatem consequendam, desiderat anteuertere hyemem. Faba ante hyemem seritur, simul & quia imbrem in flore amat, diuque refloreat, nam si serò seratur, imbrem haud assequi possit. Prædest fabæ imber, quum floret, quia raro opere constat. Aded enim detrimentis multis frequenter obnoxia est, vt quamuis maturè prouenerit, tamen perfici plerunque non possit. Eius imbecillitatem, sensui manifestam, percipere licet: Est enim corpore soluto, & valido, nec radice numerosa subnuitur. quamobrem à quauis causa offensa transigi facile potest. Dicit etiam esse, qui sero eam serere audeant, si minus primis imbris expedire potuerint. Fabas optimè feri putat Varro in Vergiliarum occasu. Columella: Media sementi pars feri, & pars vltima debet, quæ septimuncialis satio (à sacrificiis) dicitur. Tempestiua frequentius, nonnunquam tamen sera, melior est. Post brumam parum rectè seritur, pessimè vere, quamuis sit etiam trimestris faba, quæ mense Februario seratur, quinta parte amplius, quàm matura, sed exiguas paleas, nec multam siliquam facit. Veteres itaque rusticos plerunque dicentes audio, malle se matura fabalia, quàm fructum trimestrem. Sed quocunque tempore anni seratur, opera danda erit, vt quantum destinauerimus in sationem, tantum quintadecima Luna, si tamen ea non transcurrat eo die solis radios, quod Græci ἀπὸ πρῶτης vocant. Si minus, quartadecima vtique adhuc crescente lumine, spargatur, etiam si cōfestim totum semen operiri non poterit. Nihil enim nocebitur ei nocturnis roribus, aliisve causis: dum à pecore, & auibz vindicetur. Virgilius verè serit.

Vere fabis satio.

Ab his Plinius: Seritur ante Vergiliarum occasum leguminum prima, vt antecedit hyemem. Virgilius eam per ver feri iubet Circumpadanæ Italiæ ritu. Sed maior pars malunt fabalia maturæ sationis, quàm trimestrem fructum eius. Varro in fabæ vtique satu hanc obseruationem custodiri præcepit, allij plena Luna serendam. Didymus: Oportet fabas serotinas

plantare. Palladius Nouembri mense spargit semen, & Decembri circa septimum idus. nam post exactam brumam malè seminatur. Nos hic magnas Octobri serimus, quia præcoces sunt, minimas verò serius.

Elect. se.

Virgilius priusquam semina proiciat in terram, vtitur aliquibus medicaminibus, vt grandior nascatur, & coctilis euadat:

Semina vidi equidem multos medicata serentes,

Et nitro prius, & nigra profundere amurca,

Grandior vt ferus siliquis fallacibus esset:

Et quamuis igni exiguo properata maderent.

Eadem Columella à Virgilio refert. Plinius: Si vino antè semina perfusa; minus ægrotare existimant. Quidam verò: si triduo ante satum, vrina & aqua macerentur, præcipue adolescere putant. Græci afferunt fabæ semina galli sanguine macerata ab aduersantibus herbis liberari. Putat enim satis ineptè Sotion, quòd quemadmodum gallus leoni aduersatur, sic orobanche, quæ necat fabas, os prolecon à Græcis dicta, vel herba leo, sanguine galli perfusa semina timeat, ob id eis non officiat. Didymus: Et nitrata aqua resperfas cocturam non habere difficilem. Aqua pridie infusa, citius nasci. Nostri, qui fabas in scrobibus paxillo depressas infodiunt, longè maiores producant. Sed quantitas in seminio proficiendo, ab his ita determinatur. Varro: Seruntur fabæ modis quatuor in iugero. Si locus crassus plus, si macer minus. Columella ex Tremellij opinione & sua, ita serendâ mensuram præscribit fabarum in iugero: Iugerum agri quatuor, vt Tremellio, sex verò, vt ei videtur, occupant modij, si solum pingue sit, si mediocre, paulo amplius. Plinius, Serere in iugero temperati soli iustû est tritici modios quinque, fabæ quintam partem amplius quàm tritici, pingui solo plus, gracili minus. Pamphilus Græcus præcisius docet, deducit digitos manus, eosque imprimit in terram, & seminum numerum in manus vestigio considerat. In fabis senarium, & quaternarium esse debet. Sationis modum ita docent. Columella: Et si vernactum erit in valle situm, quod à superiore parte succum accipiat, prius tamen iacemus semina, deinde proficindemus terram, proficillamque in lyram reuocabimus, occabimusque, quo largiore humo altius contegatur: nam id plurimum refert, vt radices enatorum seminum penitus demersæ sint: sin autem proximæ messis occupandum erit restibile, defectis stramentis, quatuor & viginti vehes stercoreis in iugerum disponemus, dissipabimusque: & similiter quum semen crudo solo ingesserimus, inarabimus, imporcatumque occabimus, quamuis scio, quod locis frigidis negent oportere occari fabam, quia extantes glebæ à gelicidiis adhuc teneram vindicent, & aliquem teporem frigore laboranti præbeant. Post sationem, vt Theophrastus refert, quibusdam in locis, vel quintodecimo, aliis vigesimo difficillimè omnium leguminum

proue-

prouenit, & si
difficilis reddi
leguminum ge
consistit, in qu
obscuro, qu
Radix deorsum
foliis, vt pisum
Diebus quadra
tim. Caulis par

que ita ad sup
perficetur, ita
atque perfic
Aqua in flore
derat, ob id se
Causa est, quia
& adepta benè
ta humorem a
iuuari desider
minum maxim

que diebus, p
nusa Theoph
lis distinctum
vigessim, D
scapi tandi, q
frumenti parit
eunte. Quum
diebus quadra
flouerunt, ex
rent, simulque

Columella
nibus, quum ma
ta herba sceno
qui inter ceter
lata faba scenu
quit, esse pess
bus enim pluri
rustici pruden
quum præserti
fabam sarriend
cultam compe
nemin valui

prouenit, & si quum sata fuerit, imbres plus æquo inceserint, prouentu difficilis redditur. Eadem parte scapus & radix funditur, idque in omnium leguminum genere, non in diuersa ut in frumento, qua siliquarum nexus consistit, inque ea, veluti principium quoddam germinandi haudquaquam obscurum, quod vel ad mentula formam effigiatum sanè inspicere possis. Radix deorsum versus, folium verò & caulis sursum. Exit primum multis foliis, ut pisum, atque cicer, non singulis ut triticum unde caulem emittit. Diebus quadraginta floret, non vniuersim ut frumentum, sed particulatim. Caulis pars infera primum florem promit, quo excusso proxima, atque ita ad supremum itur, successu continuo. Post florem diebus totidem perficitur, ita tamen, ut citra tantundem spacium temporis hæc florere, atque perfici nata sit, quum cætera intra dies pauciores consummentur. Aquas in flore maxime concupiscit, quum verò defloruerit, exiguas desiderat, ob id serò eam serere volunt, consummatio enim iam in vicino est. Causa est, quia legumina diutius florent, ex quo fit, ut pluuiam desiderant, & adepta benè succedant, sed hoc forsitan per accidens est, quod tota planta humorem adepta, melius vegetetur, quum fructus, quo perficiatur, iuari desiderat, & præcipuè faba, quia rara, & fertilis flore fructuque omnium maxime sit. M. Varro: Legumina serè quatrinduo exeunt, aut quin-

20 que diebus, præterquam faba, ea enim serius aliquando prodit seges. Plinius à Theophrasto: Fabæ in totum exeunt, deinde caulem emittunt, nullis distinctum internodiis. Erumpit faba à satu primo à decimoquinto ad vigesimum. Diutissimè faba floret quadraginta diebus, non autem singuli scapi tandiu, quoniam alio desinente alius incipit, nec tota seges, sicut frumenti pariter. Siliquantur ab ima primum parte, paulatim flore subeunte. Quum defloruerunt crassescunt, maturanturque cum plurimum diebus quadraginta. Aquas in flore maxime concupiscunt, quum verò defloruerunt, exiguas desiderant. Palladius: Fabæ quadraginta diebus florent, simulque grandescunt.

30 Columella: Fabam multi ne sarriendam quidem putant, quod & manibus, quum maturuerit, ducta secernatur à cætera runcatione, & internata herba sceno referuentur. Cuius opinionis etiam Cornelius Celsus est, qui inter cæteras dotes eius leguminis hanc quoque enumerat, quod sublata faba scenum ex eodem loco secari posse dicat. Sed mihi videtur, inquit, esse pessimi agricolæ committere, ut satis herba proueniat. Frugibus enim plurimum detrahitur, si relinquitur runcatio. Neque enim est rustici prudentis magis pabulis studere pecudum, quam cibis hominum, quum præsertim liceat illa quoque cultu pratorum consequi, adeoque fabam sarriendam censeo, ut existimem debere etiam ter sarri: nam sic

40 cultam comperimus non solum multiplicare fructum, sed exiguam portionem in valulis habere. Hyberna sarritio plurimum iuuat diebus serenis

Cultus.

ac siccis post brumam confectam mense Ianuario, si gelicidia non sint: ea porro sic debet fieri, ne radices satorum lædatur, & vt potius adobruantur, cumulisq; exaggerentur, vt latius se frutex humi diffundat, id prima sarritione fecisse proderit, secunda oberit: quia quum pullulare desiit frumentum putrescit, si obrutum est. Nihil itaque amplius in iteratione, quàm remoliri terra debet æqualiter, eamque transacto æquinoctio verno statim peragi oportet intra dies viginti, antequam seges in articulū eat, quoniam serius sarrita corrumpitur, in sequentibus æstiuis siccitatibus, & caloribus. Subiungenda deinde est sarritioni runcatio, curandumq; ne florentem segetem tangamus, sed aut antea, aut mox, quum defloruerit. Fabæ modij quatuor, vel sex in veruacto duas operas bubulcorum detinent, at in restibili vnam. Occantur sesquiopera. Sarriuntur sesquiopera, iterum sarriuntur vna opera, & tertio vna, metuntur vna, summa sit operarum octo, vel septem. Plinius. Ter quidem sarritam modium fracta è modio solida reddere dicunt. Fabam non proficisso serere sine damno compendium operæ est, bis sarrire melius, runcari non gestit, quoniam euincit herbas. Faba ante quàm trium foliorū esse cœperit, leui sarculo purgare, verius quàm fodere conuenit. Florentem vtique xv primis diebus non attingere. Palladius. Faba si bis sarculetur, proficiet, & multum fructum, & maximum asferet, vt ad mensuram modij complendi fresa propemodum sicut integra respondeat. Nos Maio mense sarrimus, quum floruerit, ne luxuriat in frondem, cymam decerpimus, vbi solidum est non fistulosum, nam per fistulam ingrediens aqua, corrumpit eam. Iterum foditur Maij fine, ac Februario adobruitur, vt pullulationes terræ aggere adiuentur.

Mesii.

Columella: Faba & sine iumentis teri, & sine vento purgari expeditissime sic poterit: Modicus fasciculorum numerus resolutus in extrema parte areæ collocetur, quem per longissimum eius mediumq; spacium tres, vel quatuor homines promoueant pedibus, & baculis, furcillisve cōrundant. Deinde quum ad alteram partem areæ peruenerint, in acruum culmos regerant. Nam semina excussa in area iacebunt, superque ea paulatim eodem modo reliqui fasciculi excutientur. Ac durissimæ quidem acus reiectæ, separatæque erunt à cudentibus, minutæ verò, quæ de siliis cum faba resederunt, aliter secernentur. Nam quum acruus paleis, granisque mistus in vnum fuerit cōgestus, paulatim ex eo ventilabris per longius spacium iactetur, quo pacto, palea quæ leuior est, citra decidet, faba, quæ longius emittetur, pura eo perueniet, quò ventilator eam iaculabitur. Plinius. Octauo Calend. Iulij faba teritur, deinde concutitur.

Cōditura

Theophrastus. Celerrimè faba tunditur sua natura, sed dici fortasse verissimè potest, hæc perinde ac locis valent, posse perdurare. Quippe quum apud Apolloniæ maris Ionij fabas multos perdurare annos confirmet, multos etiam apud Cyzicum. Sic apud Tarentum & contusam reparari posse

posse affirmant
nè facit: sic enim
bam vellito ante
Luna increment
to, sic condita à
sis obliata cinere,
rigata & resperfa
riis cadis oblitam
Regis ætate in qu
gni bellum dura
ob hoc effere sc
ante lucem sanè
tur, ita gargulio

Ex faba etiam
uaturque pond
pleraque gentes
prisco ritu fabac
bo. Aqua marin
poris halitum in
solidam, vti suil
sam, lenem, ac
raus primus pra
esse non parum
mentem in som
dixit, ita canens

Quoniam
Poeta ex hac o
30 A g

Sed A. Gelli
atque aperte cy
est pariendi au
sed vetus opin
in eo verbo no
tur. Quum Ph
pius legumine
subduceret sen
40 etum esse Pyth
tranquillitate

posse affirmant, cinere quoque tosta plurimum ad diuturnitatem sanè facit: sic enim humoris minus relinquitur. Columella: Silente Luna fabam vellito ante lucem; deinde quum in area exaruit, cōfestim prius quàm Luna incrementum capiat, excussam refrigeratamq; in granarium conferto, sic condita à curculionibus erit innoxia. M. Varro: Faba in oleariis vasis oblita cinere, per diu incolumis seruatur. Didymus: Fabæ marina aqua rigatæ & respersæ, integræ & illasæ permanebunt. Plinius fabam in oleariis cadis oblita cinere longo tempore seruari dixit. Item fabam à Pyrihi Regis ætate in quodam specu Ambraciæ vsque ad piraticum Pompeij Magni bellum durasse annis circiter cxxv. Faba crassioribus tunicis operitur, ob hoc efferuescit. Palladius à Columella: Faba Luna minuente velletur, ante lucem sanè, & antequam Luna procedat, excussa & refrigerata ponetur, ita gurguliones non patietur infestos.

Ex faba etiam tentatus est panis: lomentum appellatur farina ea: aggrauaturque pondus illa ex omni legumine. Frumento etiam miscetur apud plerasque gentes, & maximè panico solida, ac delicatius fracta. Quin & prisco ritu fabacia suæ religionis diis in sacro est, præualens pulmentari cibo. Aqua marina, aliæve falsa non percoquitur, Plinius. Galenus, Qui corporis halitum inani sagina mentiuntur, vti solent, pariunt enim fabæ non solidam, vti suillæ carnes, aut densam corpulentiam, sed quandam fungosam, lenem, ac flatulentam saginam. Porro fabis abstinendum Amphiaræus primus præcepit, quod vaticinationibus, quæ somnio colliguntur, obesse non parum credidit, quod suo flatu placidam interpellet quietem, ac mentem in somnis conturbet. Orpheus vates fabarum cibum nobis interdixit, ita canens,

A fabulo miseri, miseri subducite dextras,

Par fuit hoc fabulum, caput ac exesse parentis.

Quoniam vt Magi tradidere, mortuorū animæ sint in ea. Callimachus Poëta ex hac opinione, ita dixit,

A cyano dextram tristante amouit edentis,

Hoc, vt Pythagoras iusserat, ipse loquor.

Sed A. Gellius hoc loco, Pythagorico more testatur loquutum fuisse, atque aperte cyamos testiculos appellare voluisse, quòd sint τὰ κύειν ὄντοι, id est pariendi authores, vel εἰς τὸ κύειν δευδοί, hoc est ferendo vtero valentes: sed vetus opinio est Pythagoram philosophum fabam non esitasse, quum in eo verbo non cyamum, id est fabam, sed rei veneræ proluuium detestetur. Quum Philoxenus, Aristotelis auditor, scriptum reliquerit, nullo sapius legumine Pythagoram vsum fuisse quàm fabis, quoniam & is cibus subduceret sensim aluum, & læuigaret. Cicero in ea opinione est, interdum esse Pythagoreis, ne faba vescerentur, quod animi perturbationem tranquillitatem quærentibus afferat, quibus is cibus quum magnam ha-

QQQ

beat inflationem, contrarius esse constat. Plutarchus in commentario de educandis liberis hoc ænigmate abstinendum à fabis interpretatur, id est, à tractandis reipublicæ muneribus, propterea quod antiquitus in erandis magistratibus suffragia per fabas calculorum vice ferebantur. Nempe qui negotiorum securus, & animi in silentio ac tranquillitate vivere cupit, is vacare debet perturbationibus, quæ in obeundis magistratibus frequentissimè sese offerunt. Ex his Plinius: Faba hebetare sensus exstimata, insomnia quoque facere. Ob hæc Pythagorica sententia damnata: velut (vt alij tradidere) quoniam mortuorum animæ sint in ea. Qua de causa parentando vtique assumitur. Varro & ob hæc flaminæ ea non vesci tradidit, quoniã in flore eius literæ lugubres reperiantur. In eadē peculiaris religio: namq; fabam vtq; è frugibus referre mos est auspicij causa, quæ ideo refri-
na appellatur. Et auctionibus eam adhiberi lucrosam putant. Didymus ex his. Physici aiunt fabas hebetare corda eorum, qui eis vescuntur. Quare re-
ctè somnia impedire eas putant, sunt enim flatuosæ. Aiunt & domesticas gallinas ex assiduo earum esu steriles fieri, & cætera quæ retulimus.

Coct. Inc. Nunc de incoctilibus, & coctilibus fabis loquemur. Hesiodus canit, Fabarum semina quæ bubulorum cornuum occurso conciderint, non optimam nacta conditionem, sed veluti errantia & prolabantia, flabellatis potius, quàm satis proximè accedunt. Inde conceptum frigus ea corrumpit, & exucca, & lignosa reddit, adeò vt liquari nō possint. Hoc genus seminis cerasbolum nominatur à Platone, superstitiosa satis origine, quasi sterilia, & irrita proueniant, quæ per boum cornua ferendo cecidissent in terram. Sotion ait. Seminantem obseruare oportet, ne semina boum cornibus incidant. hæc enim semina quidam cerasbola ab ipso facto vocant, aiunt quæ & sterilia, & imperfecta, ac inutilia talia generari, adeo vt neque per ignis vim edomari possint. Plutarchus in Sympliciis hac de re abunde differit, tradens euidentius esse, quàm vt dici debeat, semina quæ inter iactandum inter boum cornua ceciderint, fructum ateramona, quasi rebellem nec coctiuū dixeris, producere. Sic ex lepida translatione, duræ ceruicis hominem apprimè contumacem, cerasbolum, & ateramona appellare Græci consue-
uere. Verùm rei tam cæcæ nō facilè ratio iniri potest. Plutarchus amicis sæpè causam disquirentibus planè sic irrita & cassa fieri semina cornibus bubulis prociua inficiatus est, quū permulta sint euidentia, quorum omnino cæca sit causa, nec ratio quouis modo possit iniri. Tandem leguminū, seminūq; contumaciā frigori acceptā refert, quod premens & cogens habitū ad duritiā perducit, sicut calor in mollitiē obsequiosam laxet, sed à Theophrasto causa protinus dilucidatur. Ipse nanq; insaniā putat, referre causam ad aratorū boum cornua, quorū occurso dum iactantur semina percussa obduruissent: nam si in lapidē impigerint, nō idèò lapidescunt, quū lapis quouis cornu durior sit. Præterea si ad cornua non offenderint, vt qui equis, & 4
mula-

mulabus arant,
minibus fabas le
hæc sola pati,
solemus, non in
hæc cruditas, qu
aut celo eueni
liquando inco
facilia, illic co
incoctilia, & vic
10 vltus rationem p
non potest, inco
dicat, & ab eo pr
pidis locis, ster
habent, itaque
ra Lemnia, vbi
Ægyptus etiam
tis, & digestion
diebus ea, quæ
his de causis co
20 nimio abundet
coctilia sunt, n
stis, congelati
palustria nulli
vt ne macerata
sam aeris, & ad
pars est, vnde
depravatione
terra sit vda. S
alias incoctili
30 tur, quum in
uis putandum
tes diuersentur
eadem siliqua
imbecillitas fa
mentum illu
interdum nig
ostendit regi
regio illa frig
in valulis, i
40 tum quia teg
quod terra ad

mulabus arant, etiam robustæ, & incoctiles nascuntur. Neque solas ex leguminibus fabas lentesq; pati hoc, sed alia legumina, & frumenta. Sed videri hæc sola pati, propter eorum vsum frequentiore. Præterea aliis frefis vti solemus, non integris, & ex farina, nec facile deprehendi potest importuna hæc cruditæ, quæ vi ignis domari non potest. Existimat igitur id vel à solo, aut cælo euenire. Fit enim vt ager vnus, cultus idem, aliquando coctilia, aliquando incoctilia ferat, & aliquando sulco discriminante, semina vt hæc facilia, illic cōtumacia nascantur. Eueniunt etiam ex seminibus coctilibus incoctilia, & vicissim ex his illa. Vocat coctile, quod facile elixari ad nostri

- 10 vsus rationem potest, contra vitium in tarditate coquendi, vel quod laxari non potest, incoctile. Tandem aditum totius vestigationis alimentum esse dicit, & ab eo procedere. Scilicet eius qualitate, & quantitate: nam quæ tepidis locis, stercoretis, tenuibus, & apricis sunt, alimentum leue, & facile habent, itaque fructum rarum, mollemque præstant. Exemplum in terra Lemnia, vbi quia terra lenis, similia alimenta porrigit, ob id coctilia. Egyptus etiam soli, & aëris causa coctilia affert. author enim coctilitatis, & digestionis est calor: quapropter stercoreta antecedunt vicienis ferè diebus ea, quæ nõ stercoreta. Quæ igitur agro feruenti leuiq; proueniunt, his de causis coctilia sunt. Contra quæ terra frigida, lenta, & viscida, & quæ
- 20 nimio abundet humore, & stagnanti, & cui sub sunt scatebræ, exurgunt, incoctilia sunt, nimia alimenti copia, ex permissione frigida partis, & terrestris, congelatio namq; & condensatio ex iis fiunt, quibus induratio. Vnde palustria nulli vsui humano procreant idonea, & non nisi pecori abdicata, vt ne macerata quidem obsequantur. Quum dixerit de solo, transit ad causam aëris, & ad eius peregrinas conditiones, nempe pluuias, quia alimenti pars est, vnde quum plus alimenti, & crudius subministretur, eandem sequi deprauationem. Vnde si incessatur imbribus, perinde esse, ac si sua natura terra sit vda. Si causæ digerantur in hæc, nil vetat si ager vnus, aliàs coctilia, aliàs incoctilia ferat, nihilq; vetat si eodem sulco diuersa semina procreentur, quum in terris etiam venæ diffformes sint, & vt in metallis, sic & in ar-
- 30 uis putandum est. Ex his rationibus sequitur, quod partium quoq; partes diuersentur, vt ex eodem caule diuersis naturis prodeant semina, & ex eadem siliqua, vbi scilicet aër suam impegit qualitatem. Accedit ad hæc imbecillitas fabacei generis, vt eius partes etiam imbecilliores sint. Argumentum illud est quod faba sui coloris non sit compos perpetuò, sed interdum nigrescat. A frigore etiam concretionem, & densitatem fieri ostendit regio apud Philippos, in qua nascuntur incoctiles fabæ, quod regio illa frigida sit: aliud argumentum, quod si in area relinquatur in valuulis, iam estu torrefactis, non mutantur, sed manent coctiles,
- 40 tum quia teguntur siliqua, tum quia sese mutuo stipant, tum etiam quod terra affecta est calore, muniuntur aduersus illam refractionem,

sic è contrario ablatæ ab area, positæq; in tabulatis flatus subit, & cōdensat, propter imbecillitatem, quippe tum primum exutas domiciliis suis. Sed si ubi perfectæ fuerint vānentur, nil tum à ventis patiuntur, quia iam durius corium præsidio est. Adhuc si diutius sub diuo relinquantur, contrahunt vitium incœtilitatis, quia ex refrigeratione durefcunt. Et post sationem si imbres incesferint, incoctiles etiam euadunt: non est igitur mirum, aërem, aquam, & solum, cogere posse in sua iura semen ipsum. Sunt & qui dicant incoctilia fieri, quando putamine duriori vestiantur, quippe nō videntur admittere calorem, quo perficiantur: quod si corticis contumacia remiserit, admissio calore coctilia fieri. Qui verò putant hoc vitium fieri, dum in area sunt, non est verisimile, quippe solis vis si dempserit de succo aliquid, ac de suauitate, tamen addit aliquid facilitatis ad coctionem, & si hoc verum sit, non tamen aduersatur iis, quæ diximus: nam hæc siccitas non affert duritiem sicut illa, quæ prouenit à condensatione: nam hæc exiccatio solis potius rarefacit. Coctilia etiam facile perforantur, quia sunt dulciora, facilius in eis bestiolarum generantur, & concocta magis sunt, ob id etiam celerius immutantur. Plinius: Circa Philippos ateram non nominant in pingui solo herbam, quæ faba necatur: teram non, quia in macro, quum ydam quidam ventus afflauit. In qua translatione aperto errore Plinius falsus est, quippe Græci non herbam inter fabas nascentem, sed ateram non vocant legumina inobsequiosa, & contumacia.

Inf. rem.

Faba, Theophrastus inquit, magis æruginē infestatur, quia vndique foliis stipatur, & foliorum sinibus infidet humor, densiusq; obseritur, & sua raritate plus trahit humoris. Adde quod fructus haud procul abest à terra: inferiores ob id putrescunt partes, quia minus perflabiles, hæret humor, nec excutitur, ob id facilius putrefit: rubigo enim putrefactio quædam est residui humoris, quæ propter ex largioribus imbribus rubigo non prouenit, qui eluunt se ipsi, sed ex minutis pluuiis, atque roribus siue flatu, siue solis superuentu. Nec omittit fabarum putamina, quæ non solum radicibus, sed etiam germinibus arborum apposita sunt, nocere, & præsertim iis, quæ nuper profiluere, utpote imbecillioribus: idque duritia, & siccitate sua operantur, alimentum tum trahendo tum arcendo, alimento enim destituta omnia moriuntur. Didymus: Caue ne ponas circa arboris radicem fabæ semen, ne arbor arefcatur. Arbores omnes iuuari dicuntur fabarum paleis, aut aliorum leguminum, aut frumentacei generis, iuxta cuius radices inditæ fuerint arefactæ. Quintilij: Quæcunque arbores flores abijciunt, aut defluos habent, sic curabis: Circumfossis radicibus pælearum fabacearum aqua temperatarum, magnæ quidem arbori octo congiarum mensuram, parvæ verò non minus, quam duos congios circumiice, sic ægrotantes curabuntur, & de cætero à morbo libera erunt.

De piso.

40

VI
Post fabam
bilibus. Varro
turapes pisum,
Græcis πιδυ
inter Oslam, &
etiam Græcæ
exprimit, quum
pallidum, à med
Polladio dicitur
litudinem, quæ
Theophrastus
longiusculo, ca
sed quasi inuic
becilla. Plinius
adminiculum,
triplicia, granu
hæc seges serpi
Prælongis, gra
liatæ modo, su
bicante, sui me
inde semina in
Duo sunt ap
terum arbores
illigat. Discrep
cant. Minus in
ra, quod exist
scens, figura
coloris obsol
Columella
midum. Pliniu
Italia, & auster
Serendum
Subdit Colum
prius quam in
Plinius in Itali
ra serere conu
Quæ verò non
Sera, Theop
rum obferitur
tumali. Plini

De pīso. CAP. XL.

POST fabam de pīso dicemus, quod nullum vel hoc nomine à faba nobilius. Varro: Si pabulum naturale desit, seratur, quòd maximè sequantur apes pīsum, quod valentibus vtilissimum est.

Græcis *πιδός* dicitur, à Pīsa, loco, in quo olim copiosissimè nascebatur, *Nomen.* inter Ossam, & Olympum montes sito, vnde adlatum prædicant. Dicitur etiam Græcè *λείδος*, quasi dicas oui vitellum, quem colore & similitudine exprimit, quum per maturitatem ex viridi flauescit. Dicitur & *ωχρός*, id est pallidum, à medullæ colore. Latinis pariter pīsum, pīsus, & pīsa, vni tantum Palladio dicitur in genere fœminino. Vocant etiam eruiliam propter similitudinem, quam cum pīsis habent. Itali *pifello* dicunt.

Theophrastus, quando è terra nascitur, inquit, frequenti exit folio, oblongiusculo, caule humi sparso, siliqua cylindracea, granis non interseptis, sed quasi inuicem se contingentibus, amplum vagumque, sed radice imbecilla. Plinius: Quorundam caules sparguntur in terram, si non habeant adminiculum, vt pīsorum, quod si nò habuere, deteriora fiunt. Folia multiplicitia, granū inæquale, & angulosum veluti cicerula. Prolixè admodum hæc seges serpit, humi semper sparsa, nisi ridicas sit nacta. Folio oblongo. Prælongis, gracilibus, & fistulosis caulibus, per media folia euntibus perforata modo, supernè in clauiculas eminentibus. Flore papilionis effigie, al-bicante, sui medio purpureo. Februario, & Martio mensibus floret, & subinde semina in vaginulis cylindraceis affert. *Descriptio.*

Duo sunt apud nos pīsi genera; vnum minus, fulcris non indigens, alterum arbores scandens, quibus accubet affixum, omnia capreolis vinciens illigat. Discrepant & colore grana, alba, & cinerea, quæ nònulli eruilia vocant. Minus in cibus gratum. Vidimus & vnum genus angulosa corporatura, quod existimauimus Plinianum. Syluestre copiosum est, apud nos nascens, figura non absimili, radice multis fibrillis capillata, adultiore, flore coloris obsoletioris, folio nigriori. *Genera.*

30 Columella tepidum locum exoptare scripsit, & cœlum frequenter humidum. Plinius in apricis feri dixit, frigorum impatientissimum. Ideo in Italia, & austeriore cœlo non nisi verno tempore. *Cœlum.*

Serendum soluta, & facili terra. Stercorari agros pīso Salserna putauit. Subdit Columella. Si confestim aratrum sequatur, & quod falx reliquerit, prius quàm inarescat, vomis rescindat, atque obruat, id cedit pro stercore. Plinius in Italia feri terra facili ac soluta. Leontius, pīsum, dicit lutosa terra serere conuenit, in arida enim conciditur, priusquam enascatur, & perit. Quæ verò non conciduntur, degeneres fiunt. *Solum.*

Sera, Theophrastus ait, satione gaudere. Columella, Tribus modiis iugerum obseritur, licet obserere primo tempore sementis, ab æquinoctio autumnali. Plinius: Nouembri mense seritur in Græcia pīsum, at in Italia, & *Satio.*

austriore cœlo non nisi verno tempore. Iugerum pisi tres modios recipit. Palladius Septembri mense postremo, & ad idus vsque Octobris pisum ferit. Iugero quatuor modios, vel tres sparsisse sufficit. Nos Nouembri, & Decembri, Ianuario, & Februario serimus. Ridicas iuxta affigimus quo sequaci reptatu per ramos scandant, nec humi serpent, & corrumpantur. Colliguntur quum persica fuerint, nec Luna minueat.

Inf. rem. Theophrastus fragilissimum pisum putat, quippe æruginem vehementissime sentit, quia frequenti folio est, terrenum, amplum, vagumque. Implet enim locum totum, etiam si amplo intervallo positum sit. Frigoribus, atque gelationibus id obnoxium maxime, quia radice imbecilla cohæreat. Vermes etiam in piso nascuntur, quum aer modice humidus, siccusque, vel quum tempestiue non humescit.

Cibus. Diocles in leguminum censu ei secundas à faba tribuit partes. Galenus fabis non dissimilem retulisse naturam dicit, nec diuerso ab illis modo mandi. Apud nos commendatio in iurulentis, quia facile elixantur, & manduntur in patinis cum suis thecis, & in opiparis cenis nullum legumen sapius se offert.

Coditura Exucto solibus humore, diutius à putrilaginis labe vindicatur, suis valulis explicitum.

De cicere. CAP. XLI.

POST pisum, cicer describetur, cuius exactam historiam, à Theophrasto desumemus.

Nomen. Græcis ἐπίλινδος, Latinis cicer, Italis cecce, & cecere dicitur.

Descriptio. Theophrastus ita effigiat. Caule surgit omnium firmissimo, lignosissimo, sed obliquo, parua siliqua, pauciora continet, cum cæteris leguminibus seminum multitudo pro eius magnitudine sequatur. Principium unde siliquis adhæret, eminens est, quo germinat, & radicator. Summam foliorum partem falsilago quædam obducit. Altissima radice cohæret, quum legumina ferè cuncta singulari nitantur radice, eademque lignosa, & præterniuis furculis capillamentorum fibrata, & nonnunquam ex latere emittit. Plinius ex eo: Altissimas cicer radices habet, ramosaque est, folio multiplici, siliquis rotundis. Culmo apud nos surgit, sesquipedali, lateratim ramoso, quasi in obliquum flexo, fistuloso, compluribus in eo hærentibus foliolis rotundis. Iuxta summos alarum ramulos, confertim siliquulae proueniunt, vno exortu nixæ cylindraceæ, in quibus semina particulatim distincta protuberantibus torulis conspicitur, nulla intersepiente membranula.

Genera. Cicer, apud Theophrastum, tum magnitudine, tum sapore, odore, & forma plures differentias sortitur: ut arietinum, & columbinum. Candida inter omnia dulcedine præstant. Nigrum, & rufum firmiter est, quam album. Dioscorides syluestris, & satiui meminit. Syluestre foliis satiuo simile, odore acris, & figura seminis discrepans. Columella arietini, & punici meminit.

Plinius

Plinius dicit ar-
bum, nigrumque
rotundum, leu-
foliis satiuo sim-
ilium, & orobi-
& angulo muc-
vel ex fusco pu-
cum vocare illu-
subamarum vt
Columella
atque humido
Breui agrum
non facit, nec
mè terra potiri
que latari, vel
pulari. Cicer o-
optimo profici-
riter exit, sed co-
ribus perficiat

cere potest: n-
minandum, i-
ta afferat sal, e-
ta ciceris natu-
tius proueni-
Sed curid in sa-
prietate euen-
Cariolam ter-
malum est. C-
ladit, atque

xime obesse a-
ceris est gign-
terra, quæ no-
mella edoctu-
Theophra-
rendu censet
quarum confis-
obscure, a-
sum versius, f-
suma est, sed
tem diebus c-
leguminis co-

Plinius dicit arietinum esse arietino capiti simile, vnde ita appellatur album, nigrumque. Columbinum, quod alij venetium vocant, candidum, rotundum, leue, arietino minus, quod religio peruigiliis adhibet. Syluestre foliis satiuo simile, odore graui. Auicenna nominat album, rubrum, nigrum, & orobinum. Apud nos arietinum videtur frontata arietum effigie, & angulo mucronem æmulante, colore album, rubrū, obsoletè nigricans, vel ex fusco purpurascens. Græcis *αρίων* dicitur. Columella videtur punicum vocare illud erui similitudine, ob id aliquibus orobeium appellatum, subamarum vt eruum.

10 Columella humido gaudere cœlo dixit. Palladius amare loca maritima, atque humido cœlo feri. Athenæus in agro Milesio optimum prouenire. *Colum.*

Breui agrum emaciare dixit Theophrastus, quam obrem solum nouale non facit, nec solo quolibet, sed bono proficit. Edax legumen esse, maxime terra potiri, etsi in ea minus temporis maneat, solum solo pullo, crassoque lætari, vel terram nigram melius cicer ferre. Breui agri succum depopulari. Cicer ob id solum nouale non facit, nec quolibet vulgari solo, sed optimo proficit, quod contra rationem esse videtur, quia non solum celeriter exit, sed celerrimè perficitur, quum quadraginta diebus, vel paulo pluribus perficiatur, cuius rei causa robur est, quo & alta superare, & sibi suffi-

20 cere potest: nam & aqua minima indiget, & hac tantum ad primum germinandum, inde quod reliquum est, se ipsum nutrit, nisi virium momenta afferat sal, exiccans quod nimis est: nam & in generatione iuuat, & priuata ciceris natura talis est. Argumento: ea, quæ secundum mare sata sunt, lætius proueniunt. Et diluta pluuiis salislagine corrumpitur, & vermiculatur. Sed cur id in sabuletis eueniat, querendum, nisi ab ipsius substantiæ proprietate eueniat. Sed videamus quid cæteri agricolæ de eo statuunt. Cato, Cariosam terram faciet, si iacias cicer, & quia vellitur, & quod falsum est, eo malum est. Columella loco feri debere dicit quam lætissimo, nam terram lædit, atque ideo improbatur à calidioribus agricolis. Tremellius maxime obesse ait solo virus ciceris, quia sit falsæ naturæ. Plinius: Natura ciceris est gigni cum salislagine, ideo solum vrit. Serendum in tenuiori terra, quæ non multo indiget succo. Palladius lætissimo loco ferit à Columella edoctus. *Solum.*

Theophrastus tempore vtriq; datum dicit, & locis dilutioribus serò se-

rendū censet. Eadem ex parte radicem fundit, & caulem, qua annexus siliquarū consistit, inq; ea velut principium quoddā germinandi haudquaquam obscurum, ad mentulæ formam effigiatum, inspicere possis. Radix deorsum versus, folium & caulis sursum tendunt. Floris productio diuturnissima est, sed perfici diebus paucissimis potest, siquidem post semina-
40 tem diebus quadraginta absolui possit: nam in totum celerrimè genus id leguminis cōsummari nulli dubium est. Herbam enecat omnē, & maxime,

ac celerrimè tribulum. Florenti pluvia obest, id enim abluta falsugine radice tabescens interit, & ab erucis protinus erosum perit. Cicer nigrum, atque rufum firmitus est, quam album, enim uero iactura illa falsuginis, veluti sphacelismus est. Columella. Cicer, quod arietinum vocatur, itemque alterius generis, quod punicum vocatur, feri mense Martio toto potest. Iugero modij tres abundè sunt, operis totidem seminantur, occantur duabus sarriuntur vna, runcantur vna, velluntur tribus. Summa fit vndecim operarum. Plinius: Paucissimis diebus post florè maturatur cicer, id enim à semente diebus xxx x perficitur, nec nisi madefactum pridie feri debet. Imber florenti nocuus. Commune omnium satorum vitium vrica, etiam ciceris, quum falsilaginem eius abluendo, imber dulcius id facit. Serere in iugero temperati soli iustum est ciceris modios tres. Palladius Maio mense ferit. Iugerum tribus modis conferitur.

Cultus.

Certo mangonium commeto cicer pramature exire monet Theophrastus, si iam suis thecis prius aqua maceratum seratur. Primo quia minus putrescit, quia arcetur siliquarum obiectu humidior terræ noxa. Præterea ex putaminibus ipsis putrefactis plus alimenti accedit, sic ante illa exeunt, quæ sine thecis nata fuerint. Ne florenti ciceri pluvius aer obsit, nam abluta falsugine, tanquam ei ingenua & connaturalis tabescit illico, & exeditur erucis, ab ea noxa liberat vinum, si semen in eo præmaceretur, nec ratio deest, quia vinum acrimonia non caret, qua falsugo illa fouetur, ne tam facile imbris diluatur, & erucæ à vino cauent. Columella ut celerius enascatur, macerandum pridie iubet. Florentinus: Si pridie quàm seminaturus es cicer aqua tepida maceraveris, maius nascetur. Quorundam supervacuaria cura est, qui maius cicer esse volentes, vna cum corticibus ipsum similiter præmaceratum, addito nitro in aquam ferunt. Quod si præcox cicer facere velis, ipsum circa hordei tempus seminato. Quo verò vigoris tempore nemo ipsum comedere possit, cucumeris sylvestris, & absinthij semine ex aqua tritis per dies quinque sub diluculum irrorato: etenim ros per quinque dies eluit omnem ex ipso amaritudinem. Palladius: Macerandum est pridie, ut possit citius nasci. Cicer grande nasci Græci dicunt, si aqua tepida pridie infundatur.

Inf. rem.

Vermes ciceri innascuntur, & erucæ, ob alimèti, cœlique intemperiem, videlicet quum plus minusve alimenti præbetur: aer enim immodicè humidus siccusve est, vel etiam quum non tempestivè humescit. Ciceri verò, quum falsugine ablata dulcedinem ceperit, vermes innascuntur, quippe natura ubique animal gignit, modo calor cum humiditate ratione debita coeat. Tabitudo propria radice ciceris est, & vricarum infestatio. Vermes gignuntur, quum sequutis imbris calor repentinus humorem incluse-rit, sic & nasci vricæ solent. Cicer circumplicando necat se. Paxamus, Oleum medicina est cicer, si vna seratur, arcet enim erucas. Plinius. Cicer in-

tra

tra olera propter
phrastus refert
durare posse. Co
id solum gigner
rat. Cicer diu p
succu, quod & n
cicer, quia aman
lites seruare in
bestiolas, quon
tur & tunditur
horreis nullæ b

Post cicer
que, nominat
Quæ Theop
cicerula est. N

Caule humi
phrastus. Sed
habens, veluti
te nihilo differ
pior, frequen
gulos, pisi mag
ceas clauiculas

Columella,
Iidemq; loc
nocere. Immo
Inter solstiti
lumella Ianua
te Calendas N

det, quia nec
moda ferè eo t
tuor, operas b
vna, velluntur
nuario. Iuger
Vermiculis
ribus, vel si pri
dicè humescen

Galenus oc
prodidit, Afiat
nec eo tantum
& phaselis, sed

tra olera propter multa portenta ferendum esse tradidit Palladius. Theophrastus refert in Media, reliquisque excelsis tractibus conditum diu perdurare posse. Corruptis seminibus animal semper gignitur, cicere excepto, id solum gignere animal nullum potest, ob id cicero omnium maximè durat. Cicero diu perdurare potest, quod acredinem, & amaritudinem habeat succi, quod & nigrescit, quum corrumpitur. Omnium optimè reponitur cicero, quia amaritudinem quandam & acredinem habet, quæ quidem qualitates seruare impune possunt, quomobrem & corruptum nullas generat bestiolas, quemadmodum nec semina olerum. Nonnunquam sponte naturæ tunditur cicero, & omnino quæ acerbi saporis sunt. Plinius. Cicero in horreis nullæ bestię innascuntur.

De cicercula. CAP. XLII.

POST cicero de cicercula, quum non minus eo apud nos feratur colaturque, nomine & figura affinis.

Quæ Theophrasto *ἀδύρον*, & *ἀδύρον*, Theodoro interpreti, & Latinis *Nomen*, cicercula est. Neapolitanus *cicercchia* corrupto à cicercula nomine.

Caule humi prociduo, & folio, vt pisum, oblongiori exiri dixit Theophrastus. Sed Plinius: Est & cicercula minuti cicero, inæquales angulos habens, veluti pisum. Columella. Cicercula, quæ piso similis est, sapore certe nihilo differt à cicera, sed colore tantum discernitur: nam albedini propior, frequens apud nos feritur, quaternos & inæquales granū habet angulos, pisi magnitudine in siliqua compressiori, ramuli in tortiles capillaceas clauiculas desinunt.

Columella, & Palladius ab eo, cælū humidū cicerculæ exoptare dixerunt. *Colum.* Idemque locum lætum ei ascripserunt, nec vllum leguminū minus agro *Solum.* nocere. Immo Siferia iuuari agros & stercoreari cicercula putauit.

Inter solstitium, & caniculam Varro ferendam cicerculam putat. *Satio.* Columella Ianuario, & Februario feri debere, quomobrem in Italiæ locis ante Calendas Nouemb. feritur. Tres modij iugerum implent. Rarò respondet, quia nec siccitates nec austros in flore substat, quæ vtraque incommoda ferè eo tempore anni sunt, quo deflorescit. Cicerculæ modij quatuor, operas bubulcorum tres postulant. Occantur opera vna, runcantur vna, velluntur vna. Summa fit sex operarum. Eadem habet Palladius in Ianuario. Iugerum cicerculæ modios tres recipit.

Vermiculis obnoxia. In ipsis enim gignuntur, sequentis post imbres caloribus, vel si prius quàm fuerit resiccata, dies feruidi accesserint, & aer modicè humescens, ex Theophrasto. *Inf. rem.*

Galenus ochris, & phaselis non longè dissimili natura lathyron cōstare prodidit, Asiaticos suos eo cibo maximè in Mysia & Phrygia plurimum uti: nec eo tantum modo, quo in Alexandria, aliisque pluribus oppidis ochris, & phaselis, sed in modum phacoptisanæ etiam, id est freforum cremoris. *Efus.*

VT congeneralegumina describamus, post cicerculam ciceram describemus. Columella non tam leguminibus, quàm pabuli generibus annuerat, ut dicemus in pascuis, fed eadē in cibis nō inutilis, nec iniucunda.

Nomen. Theophrastus *ὀχρὸς*, Theodorus ciceram vertit, modo eruiliam. Varro & plerique eruiliā sapius meminere, & videntur per eruiliam ciceram intellexisse. Galenus eruiliam genus leguminis dicit, foliō quàm faba longiore, quum eruiliā nusquam meminerit. Neapolitani *doliche* vocant.

Descriptio. Folio oblongiore constare eruiliam Theophrastus dixit. Columella à cicercula solo colore differre, nam est obsoletior, & nigro propior, quum sapore nihilo certe differat. Palladius ab eo. Cicera distat à cicercula solo colore, quia sordet, & nigrior est. Plinius oblongiore folio eruiliam constare dixit: & quæ Theophrastus de *ὀχρο* dixit, de eruilia conuertit.

Solum. Columella lato solo ferit, sic ab eo Palladius.

Satio. Seritur ab eodem, primo, vel altero sulco, mense Martio, ita ut postulat foli lætitia, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum etiā duobus, ac semodio iugerū occupat. Cicera modij quatuor operas bulcorum tres postulant, occantur opera vna, runcatur vna, velluntur vna. Summa fit sex operarum. Palladius à Columella: Cicera Martio seritur, primo, vel secundo sulco. Iugerum quatuor, vel tribus, vel etiam duobus modis implebimus,

Cibus. Columella. Cicera bobus eruilo loco fresca datur in Hispania Batica, quæ quum suspensa mola diuisa est, paulum aqua maceratur, dum lentescat, atque ita mista paleis subtritis pecori præbatur. Cicera libræ sexdecim satis faciunt vni iugo, eadem hominibus non inutilis, neque iniucunda est. Plinius torrere docet. Quum fieret panis hordeaceus, eruiliæ admixtione fermentabantur, iustumque erat duæ libræ in sex semodios.

Coditura. Theophrastus feruari optimè posse dixit, quoniam id habet, quod arce-re, tutarique possit. Hæc tamen calida, & sicca est. Celerrimè tunditur sua natura. Plinius: sua amaritudine cicercula se facile tueri potest, ex Theophrasto, qui ut vidimus, de cicera, non de cicercula dixit.

EST aracus lentis vitium, post cicerculam apponemus, quum non pauci sint non infimæ literaturæ viri, qui cicerculam à Galeno aracum vocari velint, nos distinximus, quia Theophrastus, quem in hoc opere sequimur, eiusque valde doctrinam admiramur, vtriusque meminerit, & si Galeni aracum non sit cicercula, tamen ex leguminibus fortasse ei valdè affine est.

Nomen. Theophrasto *ἀρακὸς*, siue *ἀρακίς* est. Galenus *ἀρακὸς* per *χ* scripsit, ultimā syllabam, in Aristophanis comœdia, quæ Holcades inscribitur, ubi inquit, *αρακόν*, triticum, ptisanam, zeiam, lolium, simillam, & id semen cicerculæ affine, 40

fine, sed suis regionibus nasci ait sylvestre quoddam rotundum, ac durum, eruo exilius in cerealibus granis, quod arachum adiecto in vltima syllaba spiritu nominant. Latini aracum dicunt.

Theophrastus nasci ait in lente, rem duram, & scabram. Galenus araci semen cicerculæ proximū prodit, eamq; reliqua facie tam emulari, vt multi idem esse genus existiment, quandoquidem tam vsu, quam viribus consentiunt. Sed aliquando duriores sentiuntur araci, cōstitui quoque difficilius in ventre conficiuntur, sed Galeni pater Agriculturæ studiosus, quum per senectam ruri degeret, inuenit aracum quodam degenerationis argumento, durum ac rotundum in nasci lenti, cibo tamen damnatum. Apud nos legumen exoritur, ab indole sua cognoscitur cicerculam in hanc spuriam abiisse, est ei prorsus cognatum & simile, vt altera cicercula dici possit, quum eius grana sordibus nigricent inter pisa, orobos & cicerculas, vt Columella affirmare videtur. Foliis cicerculæ, ramulis peruoluitur flexilibus, quasi teniolis circa frutices, vel calamos, inter legumina nascitur, vt vitium, & exitium lentium sit verè.

Descri-
ptio.

De lente. CAP. XLV.

LENTICVLÆ laudes apud Græcos authores maximas leges, & præsertim apud Athenienses. Pythagorici maximo honore prosequuti sunt. Varro pro apibus ferendâ censet, præcipuè vbi naturale pabulum abfuerit.

Dicebatur *φάνος* Græcis ab rure, qui fuit *ἀόνος*, vnius elementi mutatione, quia eius siliqua granis compressis, circinatâ lagenulam effigiare videtur. Latinis lens est, & lenticula, quod lenes, æquanimēsque vrescentes efficiat. Apud Italos nomen retinet, nam *lenticchia* vocant.

Nomen.

Fertilissimum leguminum Theophrastus prædicat, quum pusillum semen afferat, caulis in latus spectat, siliquæ in latitudinem molliter funduntur, minor siliqua pauciora fert. Plinius: Ramosa lens. Apud nos lentis feges humi fusa, & reptatrix est, foliis vicæ, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascens, siliquis paucis, vbi duæ, aut plurimum tres insunt. Floret Iulio mense, & deinceps in siliquis fert grana.

Descri-
ptio.

Theophrastus quo ad colorem, saporemq; differentiam facit. Sed candida sapore præstantior. Nascitur & Indiæ lens, visu sænugræco similis, quæ circa Vergiliarum occasum metitur. Plinius, Duo eius genera in Ægypto, alterum rotundi, nigriusque, alterū sua figura. Vnde vario vsu translatum est in lenticulas nomen.

Genera.

Plinius siccum cœlum exoptare scripsit. Laudatur maximè lens Pelusiaca, est enim Pelusium oppidum vnum ex sex ostiis Nili in Ægypto. Apud nos sicco, vdoque cœlo gaudet, vbi humor, lætior. Martialis:

Cœlum.

Accipe Niliacam Pelusia munera lentem,

Vilior est alica, cavior illo faba.

Solum.

Cato lentem in rudeto, & rubricoso loco, qui herbosus non sit, ferit. Columella: Solo tenui, & resoluto, vel pingui, & sicco maximè loco feri debere: nam in flore facile luxuriat, & humore corrumpitur. Sæfena lente solum stercoreari putat, si post eam viridè descitam statim aratrum subsequatur, & quod falx reliquerit, priusquam inarescat, vomis rescindat, atque obruat. Plinius: Lens amat solum tenue magis, quàm pingue. Lentem in fructuoso, & rubricoso, qui non sit herbidus, ferit, ex Catone. Palladius eadem habet, quæ Columella.

Satio.

Theophrastus lentem tertiæ sationis esse dixit. Varro lentem intervallo ferit inter caniculā, & solstitiū. Virgil. occidente Boote feri debere scribit. 10

Nec Pelusiaca curam aspernabere lentis,

Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes.

Incipe & ad medias sementem extende pruinas.

Columella sementi media, crescente Luna vsque in duodecimam ferit, sationesque eius duas seruat, alteram maturam per mediam sementem, sèriorem alteram mense Februario. Iugerum agri paulo plus, quàm modius occupat. Lentis sesquimodius occatur vna opera, sarritur duabus, runcatur vna, vellitur vna. Summa sit operarū octo. Plinius: Virgilius lentem feri iubet Boote occidente. Nouembri feritur. Serere iugero tēperati soli iustum est lentis modios tres. Serendum à vigesima quinta Luna, vsque ad 20 x x x. ita demum sine limacibus fore. Palladius eadem, quæ Columella recitat.

Ar.

Theophrastus retulit lentem, quæ ante fatum bubulo fimo fuerit obuoluta, longè præstantiorem fructum producturam. Ratio est, quia iuuat calor, & siccitas stercoreis. Ac paxillo demissam crassescere. Columella: Lens vt celeriter prodeat, atque grandescat, antequam feratur fimo arido permisceri debet, & quum ita quatuor, aut quinque diebus requieverit, spargi. Palladius eadem à Columella. Florentinus, Lentem, quæ ante fatum bubulo stercore fuerit obuoluta, longè præstantiorem emicare fructum prodidit. Celeriusque demeti pollicetur, additque proceriorem euadere, quæ in aqua tepida cum nitro prius maduerit, quàm feratur. 30

Inf. rem.

In lente exit aracus res dura, & scabra, dicit Theophrastus. Adnascitur lappā (ἀρακίον) lenti, & interimit, quæ alimoniam subripit, tam quam terra ministrat, quàm quæ à sole, & aëre venit. Plinius: Lentem herba securidica, quam Græci à similitudine peleciton vocant, & quidem complexu necat. Paxamus: Lentem securidica herba, Græci peleciton appellant, necat. Reperitur & in eis coctibilitas, & incoctibilitas. Sed eius rationes in faba diximus. Apuleius tradit seminibus lentem modicam ammiscendam esse, dum feruntur. Natura enim resistit aduersus impetus, atque mollias ventorum.

Cib.

Plinius inuenit apud authores æquanimitem fieri vescentibus ea, & 40

opti-

optimam esse.
Florentinus &
ciliare dixit. Ex
sit friari.

Columella.
liqua estur cur
inani, quæ prot
silphij trita cum
cata, & mox ref
10 nor, in vasis ole
sint, quando cuc
Potest tamen e
uari. Florentin
quod la serpitiat

Nunc de se
horto abu
num aphaca seg
sanè clarè con
20 oleracea distin
Græcis ἀφάκ
ficiale, & παρ
care, quod quæ
viro thori. Latin
litani apice vocat
Theophras
in aphacis secu
alatur, intermi
seu ob aliam al
30 liquas lenticul
lente minora co
habet, pusillo a
quaterna semin
Aphacæ semin
tiuscula, similis
siliquis pis, len
foliis ex aduers
depictum, viti
Dioscorides
40 Theophras

optimam esse, quæ facillimè coquatur, & quæ maximè aquam absorbet. Florentinus Ægyptiam lentem in cibo acceptam lætitiā afferre, & conciliare dixit. Ex lente intentatus est panis, quum perarida citra pingue possit friari.

Columella. Lens ne curculionibus absumatur (nam etiam dum est in siliqua estur) curandum erit, ut quum extrita sit, in aquam demittatur, & ab inani, quæ protinus innatat, separetur solida, tum in sole siccetur, & radice silphij trita cum aceto aspergatur, defriceturque, atque ita rursus in sole siccata, & mox refrigerata, recondatur, si maior est modus, in horreo, si minor, in vasis olearius, fassamentariisque, quæ repleta, quum statim gypsata sint, quando cunque in usus prompterimus, integram lentem reperiemus. Potest tamen etiam citra istam medicationem cineri mista commodè seruari. Florentinus nullum semen corruptionis labem sentire promittit, quod laserpitiato aceto conspersum sit.

Cōditura

De aphaca. CAP. XLVI.

NUNC de segetali aphaca sermonem habebimus, quum de oleracea in horto abundè dixerimus. Dubitat Hermolaus apud Theophrastum, num aphaca segetalis vnum & idem sit cum oleracea, an diuersum. Quum sanè clarè constet Theophrastū in leguminum censu segetalē aphacam ab oleracea distinxisse, in quientē, in leguminū genere, lens, aphaca, & pisum.

Græcis ἀράκη est, vnde si Græcum etymon respiciemus, & poterit esse inficiale, & ἀράκη lens, quasi non lens. Potest & illud & similitudinem significare, quod quadantenus lenti simile, ut ἀράκη vxor est quod eiusdem cum viro thori. Latinis aphaca. Italis *veccione*, quia viciæ species videtur. Neapolitani *apice* vocant, corrupto ab aphaca nomine.

Nomen.

Theophrastus scribit aphacæ esse siliquas leniter latas, ut lenti. Nascitur in aphacis securina, securi similis, atque in omnibus ferè inest, quod simul alatur, intermisceaturque, seu ratione telluris, quod non ineptè putaueris, seu ob aliam aliquam causam. Dioscorides: Altior lente, tenuibus foliis, siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna, quaternave semina nigra, lente minora continentur. A quo Plinius: Aphaca tenuia admodum folia habet, pusillo altior lenticula est, siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaterna semina sunt nigriora, & madidiora, & minora lenticula. Galenus: Aphacæ feminum figura non rotunda velut fabarum, sed aliquando latiuscula, similis lenti. Apud nos quadrangulare caule exit, flore subrubro, siliquis pisi, lenticulæ maioribus, in quibus semen viciæ maius, aut nigrius, foliis ex aduerso binis, pisi capreolis. Semen maculosum, vipereis maculis depictum, viticulis exilibus, optat pedamenta circum, quibus surrigi possit.

Descriptio.

Dioscorides & Plinius in aruis nasci dixerunt, vel intra segetes spontè.

Cul. sal.

Theophrastus. Sera illarū satio est. Apud nos scribitur mense Septembri.

Satio.

Ufus.

Seritur multis Italiae locis ad columbarum saginam. Galenus: Aphacam cum planta & valvulis integram rustici reponunt, ut brutis pecudibus pabulo sit. Per famem tamen quosdam inueni, qui hanc quoque comederint, potissimum vere, quum etiam nūm viret, quemadmodum fabas, & cicera esitare consuecunt. Sunt non solum insuauia, sed concoctu difficilia: alimonia, quæ ex ipsis in corpus permeat, improbi & crassi succi esse dicitur.

Coditura.

Celerrimè perit. nā corruptis animalia propria gignuntur, ex Theophrasto.

De eruuo. CAP. XLVII

ERUUM medicaminis vim obtinet, quippe per eruum Diuum Augustum curatum in epistolis ipsius memoria extat, ut ex Plinio habetur, eiusq; farina theriacam subintrat. Leguminibus etiam adnumerandum.

Nomen.

Græcis ὀρόβος, Latinis eruum, nec multum à Græco Latinū vocabulum distat ab eruendo, quod manu capiatur, & eruatur. Italis orobo.

Descriptio.

Theophrastus caule obliquo exire scripsit, siliqua cylindracea, grana in siliquis sine septo, quæ se inuicem ut pisum tangant, sed minora, quam paludapij, vel sambuci acini. Dioscorides, Eruum est frutex tenuis, angusto folio, semē in vasculis habens, simile tithymali paraliij, aut catanances, magnitudine seminis ethiopidis, aut lithospermatis. Plinius, Ramosum, diutius floret.

Genera.

Saporem, & colorem, generum differentiam facere scripsit Theophrastus, sed candidum dulcedine præstat. Galenus addit: Pallidum inter candidum, & rufum medium: laudatque flauum & pallidum, utpote medicamento sum haberi, & alterum inter segetes spontè nascens.

Solum.

Lætari loco macro, nec humido Columella dicit, quia luxuria plerumq; corrumpitur. Palladius: loco sicco, macroque.

Satio.

Theophrastus utriusque temporis dari scripsit. Seri maturo satū, sui roboris causa, quum possit hyemis algores sufferre. Temporis ratione semina mutari, ut leuiora, facilioraque reddantur, nam si eruum quis vere serat, facile gratumq; exit, non graue, quemadmodum si autumno seratur. Florum productio diutina est: nam & flos cæterorum leguminum more partiolatim erumpit, ab ima parte flore subeunte, siliquaturque diuersis diebus. Primum pars infera floret, quæ quum desierit, proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu assiduo, qua de causa multa ex eruis euulsa parte ima defluxisse cernuntur, superna verò penitus esse viridia. Columella: Potest & autumno seri, nec minus post brumam, Ianuarij parte nouissima, vel toto Februario, dum ante Calendas Martias, quæ mensē vniuersum negant agricolæ huic legumini cōuenire, quod eo tempore satum pecori sit noxium, & præcipuè bubus, quos pabulo suo eerebrosos reddit. Quinq; modis iugerū obseritur. Erui modij quinq; totidem operis conferuntur, occantur vna, item singulis sarriuntur, runcantur, metuunturque,

cuncta

etuncta sex opera
ninus: Nec eius o
eiunt singulis bo
esse bobus autu
re satum. In iug
num seri nouill
eiunt. Octobr

Dioscorides a
lius idem annu

10 Eheu quam p

Galenus in iu
dicandum, sed l
rō grassante fam
necessitate press

Seri eruum in
tra papilionēs,
eiudem generis
greditur, ut imbr
xu vinciens, ang

20 eruum circuml

Nascitur in
Plinius à Theo
aqua sit.

Post eruum
rum omniu
banche, mox L

Græcis ὀρόβος
quæ angit, & st

30 phrastum, qua

quæ scapum &
quam brachior

quam idem Th

vocata, quæ arb

ninus: Est & Syri

ipsis etiā spinis

litera y in u tran
podagra lmi dicit

eo facile non po
40 epithymū à Dio
cis congenerib

cuncta sex operas occupant, stercorari aruum ex eo Saserna putauit. Plinius: Nec eius operosa cura est, hoc amplius quàm vicia runcatur. Sufficiunt singulis bouum iugis modij quini sati. Martio mense satum noxium esse bobus aiunt, item autumno grauedinosum. Innoxium fieri primo vere satum. In iugero erui modios sex serere iustum est. Palladius Ianuario eruum seri nouissimò loco sitco, & macro. In iugero quinque modij sufficiunt. Octobri in lato agro.

Dioscorides ad bouum lagnam satum dixit coctum appositum. Virg. *Cibus* eiusdem annuit,

10 *Eheu quam pingui macer est mihi taurus in eruo.*

Galenus iniucundum, & insuaue prorsus fatetur, & hominum cibis abdicandum, sed bobus in pabulo gratissimum, si prius aqua madescat. Porro grassante famis iniuria, vt Hippocrates scriptum reliquit, inexpugnabili necessitate pressi homines, hoc sese saturant.

Seri eruum inter radices cōsuevit, vt tradit Theophrastus, remedio contra papillones, & brassicis associatur, vt ab erucis defendatur, & quicquid eiusdem generis sit. Pestis eius est orobanche, quæ scapum, & comas aggreditur, vt imbecillitatem suam fulciat, & tanquam brachiorum complexu vinciens, angit, & obstrangulat. Plinius: Est herba, quæ cicer enecat, & 20 eruum circumligando se, vocatur orobanche.

Nascitur in eruo phalangium. Patientissimum omnium vetustatis est. *Coditura* Plinius à Theophrasto. Nascitur in eruo bestiola aranei generis, si hyems aquosa sit.

De orobanche. CAP. XLVIII.

POST eruum vitium erui prosequemur, vel anguinam erui, imò herbarum omnium, quibus adhæserit. Dicemus primo de Theophrasti orobanche, mox Dioscoridis, quæ satis inter se diuersæ sunt.

Græcis ὀροβάνη, quasi erui anginam dicas, suo enim amplexu, complexu, 30 quæ angit, & strangulat eruum. Theodorus eruanga vertit apud Theophrastum, quam ita describit. Erui pestis est orobanche, ciceris & fabæ, quæ scapum & comam aggreditur, vt imbecillitatem suam fulciat, & tanquam brachiorum complexu vinciens enecat. Huius speciei esse dicerem, quam idem Theophrastus cadytam vocat. Est Syriaca illa herbula cadytas vocata, quæ arboribus, vepribus, atq; aliis quibuidam innascitur. A quo Plinius: Est & Syriaca herba, quæ vocatur cadytas, non tantum arboribus, sed 40 ipsis etiā spinis circūuoluens se. Recentioribus Græcis videtur hæc ὀροβάνη, litera γ in u transiente, cassuta, & posterioribus euscuta. Vulgò apud nos *podagra lini* dicitur, quod quasi compedibus id, cui inciderit, illigat, vt vinctu eo facile non possit extricari. Hæc thymum aggrediens, & circumplectens epithymū à Dioscoride dicitur, sic etiam hyssopo, serpillio, aliisq; non paucis congeneribus clauiculis inhæret, vt in Gargano monte sæpius vidi,

De phaseolo. CAP. XLIX.

EST & phaseolus ex leguminum genere: huius Theophrastus non meminit, nisi sub dolichorum nomine, nos hunc segetalem, alterum hortensem dicemus, sed nunc segetalem, intelligendo de illis minimis candidis.

Græcis φασιολος. Galenus discrimen inter φάσηλον, & φασιολον facit, ac diuersa esse legumina scribit libro de alimentorum facultatibus, & videtur hunc vilem nostrum & minimum φάσηλον, & simlacem & hortensem φασιολον dicere. Latini Græcorum imitatione pluribus nominibus nominant. Columella phaseolus, phaselus, Palladius faselus, Plinius faseolus. Itali faggioli.

Plinius venosa folia habere dixit, cuius siliquæ cum ipsis manduntur granis. Surgunt apud nos phaseoli sine pedamento subsistentes, ramos in latum pandunt, foliis hederaceis, minoribus, mollioribus venosis, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, floribus purpureis, albicantibus, siliquis pedalis, primo exortu viridibus, & teneris, vt cum granis simul mandantur elixæ, grana alba, circa nexus, quibus hærent siliquis, nigricantia.

Apud nos plura genera sunt, maiora, media, minima, albaq;.

Columella. Veruacito, vel melius pingui, & restibili agro seruntur. Ab eo eadem Palladius. Serere eos qua velis terra licet.

Virgilius ad occasum Bootes ferendum phaseolum præcipit in Georgicis.

Si verò vitiamq; seres, vilemq; faselum,

Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes.

Columella, Faselum ad escam vindemiis serito, ad percipiendum semen vltima parte Octobris, circa cal. Nouembres melius obruitur. Septembri mense seu potius à calendis Octobris phaselus rectè terræ mandatur, nec amplius quatuor modiis iugerum obseritur. Phaseoli modii quatuor obruuntur totidem operis, occantur vna, metuntur vna. Palladius eadem, quæ Columella. Plinius à Virgilio feri iubet Bootæ occidente. à Columella: Ab idibus Octobris ad calendas Nouembres. A fidiculæ occasu, occari tantum desiderat.

De dolichis, siliquis, siue phaseolis. CAP. L.

NUNC ad alteram phasioli speciem, siue de hortensi, quam supra describendam proposueramus.

Theophrasto δολιχος, ας λοβος à siliquarum magnitudine. Dioscoridi σμίλαξ, siue hortensis similax, Theodorus Theophrastum vertendo, vbi dolichos, siliquam vertit. Galenus libro de alimentorum facultatibus ex Theophrasti autoritate hos dolichos appellat. Itali faggioli turcheschi.

Theophrastus ita suum dolichum describit. Siliqua speciali nomine appellatur, scandit pedamento, cui accumbit, prælongo, propter eos adfixo, ita enim reddi eos putant frugi, contrahit enim eruginem, nisi adminiculo fulciatur, perit facillimè siliqua. Corpore læui graciliq; constat, facile

SSS

arborescendit, offensusatque. Dioscorides hortensum simlacem suam ita depingit. Frutex est, folio hederæ, molliori tamen, tenui caule, capreolis vicinis fruticibus circumuolutis, qui tantum adoleſcunt, ut topiarias scenas representare videantur. Siliquas fœnigraci profert, longiores, & torosiores, in quibus semina renum similia, sed in æquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Galenus ex Theophrasto: Dolichus adacta palo consurgit, & fructum gerit: sin hoc adminiculo careat, vitiosus fit, & rubigine tentatur. Apud nos prolixissimis viticulis serpit, ad topiariorum ornamenta, atregia & umbracula efformans.

Genera.

Ex fructus varietate distinguuntur genera. Fructus enim perquam amœno aspectu sunt, non flavescent, interdum auro prorsus rubescentes, plerumque bicolores, & unicolores, maculis atris, giluis, rotundis granis, tenuitatem aspersis, obliquis, renunculi effigiem referentes.

Cel. Sol.

Cælum, solumque: ut patricum exoptat, & milium, quum plerumque in ea ferantur, & inter ciceres, capas, & caules. Macro, & soluto etiam optimè provenit: quò pinguius solum, eò rarius spargatur: etenim pensilibus hortulia mulieres nostræ ferunt in fenestris, ut æstius solibus liberentur. In segetibus nemo veterum agricolarum meminit, quum solius horti munus esset.

Satio.

Iisdem temporibus, quibus panicum, & milium à nascentibus herbis liberentur. Colliguntur ubi siliquæ albescunt, sole assiccantur, reponunturque.

Cibus.

Diocles in leguminum censu post fabam, pisum, post pisum dolicham apponit. Nos horum valtulas cum granis ipsi asparagorum more mandimus ancipiti edulio, inter bonum malumque succum ambigente.

De lupino. CAP. LI.

DIXIMVS de sativis leguminibus, nunc de sylvestribus, vel quæ pro sylvestribus habentur. Lupino multum tribuit Columella, quod & minimum operarum absumit, & vilissimè emitur, & maximè ex iis, quæ feruntur, iquat agrum. Nam & vineis iam emaciatis, & aruis optimum sterco præbet, ac vel effæcto solo provenit, vel repositum in granario, patitur ævum, boves per hyemem alit, & famem hominibus propulsat in annonis. Subſcribit huic Plinius. Nullius, quæ feruntur natura assensu terræ mirabilior est. Primum omnium cum sole quotidie circummagitur, horasque agricolis etiam nubo die demonstrat. Arboribus ægris lupinum circa radices earum seri convenit, aqua lupini vsti circumfusa pomis prodest. Lupino trito cum oleo radicibus linunt, contra formicas. Apuleius Græcus addit quoque cum sole quotidie circummagi, & ruralibus diei horas indicare, etiam ære nubiloſo.

Græcis *ῥεπύς* dicitur, quod calidior sit cæteris leguminibus, vel quod aqua calida lauetur, quo molestum, & tristem amarorem exuit. Apuleius *ῥεπύς* vocat, montanum lupinum, & sylvestre. Legitur aqua Athenarum Polemonis

VI
lemonis testimo
italis lupinus.

Omnibus v
re circumſep
Caule singulari
inde ac faba, re
sum, radice sing
terno situ exeru
uerſa, virentia, ſa

crenata, fructu
perquam amaru
poſtea è caulicu

Eſt ſylveſtri
& ſponte naſce
dius noſtrate, m
ſylveſtres ſunt,
nos paſſim naſc
caule, pedali fo
ceo, fructu ror

20 Frigida, niu
Idem etiam

lū aſperari, &
celerius perſici
cundum reddie
noſa, item qua
venit ſolo, xer
limoſoq; non
vel arenoſo, ſi
mè ſabuloſa, &

30 amat, cretoſa
ladiu. Qualie
amat exilem te

Lupinus du
viloca fœcun
phraſtus lupin
robuſtiſſimu
terram calen
gumento eſt t
enim eius ſati

40 ſtendere germ
ſi quis exiguo

lemonis testimonio lupinos apud Laconas Lyfiadas nos nominari. Latinis & Italis lupinus.

Omnibus utpote notus à Theophrasto non describitur. Siliqua magnope re circumsepta. Principium, quo siliquis adharet concavum, habet. Plinius: Caule singulari, fistuloso, ter florens. Nos ita describimus: Culmum edit perinde ac faba, rectum & suapte natura stantem, rotundum, nonnihil tomentosum, radice singulari, & multum fibrosa, à qua ferè per totum caulem, rami alterno situ exeruntur. In pediculis folia fena, vel septena diuisura, digitata, aduersa, virentia, subtus incaua, hirsuta, siliquæ fabaceis minores, per ambitum crenatæ, fructus durus, rotundus, compressus, albidus foris, subluteus intus, perquam amarus. Flos ter æstate spectandus: nam initio ex imo emicant albi, postea è cauliculis effera æstate, & autumno exeunte.

Et si sylvestris penitus sit, ut Theophrastus de eo retulit, est ramèn sativus & sponte nascens. Sativi apud nos tria genera: maior, qui *ischiario* dicitur, medius *nostrate*, minimus *canzanello*. Sylvestris Plinius meminit. Lupini quoque sylvestres sunt, omnimodo minores sativis, præterquam amaritudine. Apud nos passim nascuntur, sativum per omnia refert, nisi quia grandior multo est caule, pedali folio, quinquesariam dissecto, angustiore, flore purpureo puniceo, fructu rotundo minore, guttatis maculis, pullis, cinereis veluti viperinis.

20 Frigida, niuosaque amare dixit Theophrastus, ut sylvestre.

Idem etiam arenas, sabulū, & terræ vitia sequi, horrere culta, & frugale solum aspernari, & exile solum amare. Causam adde, quia in hoc sentire calorē & celerius perfici possit: nam in cultis & aquosis sylvestrens, & luxurians, infecundum redditur. Cato: in agro rubricoso, terra pulla atterina, rudeta, & arenosa, item quæ aquosa non erit, ibi lupinū bonū erit. Columella: Effæto provenit solo, terram amat exilem, & rubricosam præcipuè, vel cretā reformidat, limosamque non exit agro. Plinius à Catone, In solo autem rubricoso, vel pullo, vel arenoso, si non sit aquosum, lupinū feri. A Columella verò: In terra maxime sabulosa, & sicca, atque etiam arenosa. Ex densiore terra, rubricam maxime

30 amat, cretosam terrā, limosamque odit, & in iis non provenit. A Columella Palladius. Qualicumque terra feritur, limoso agro non nascitur, cretam reformidat, amat exilem terram, atque rubricosam. Florentinus: In terra imbecilli serendum.

Lupinus duplici causa feritur, semine recipiendo, vel stercoreando agro, ut loca fecundentur exilia. Dicemus primo quando feritur ad semen. Theophrastus lupinum maturius, & protinus post aream ferendum censet, licet robustissimum, aliter malè proveniet. Rationem affert libro de causis, quia terram calentem desiderat, quum eius natura difficilis, & contumax sit, argumentum est nimia eius amaritudo, ob id caloris multum exigit. In matura enim eius satione, agri calorem nactus, & macerari, & optimè suum ostendere germen potest, sin minus & prauè germinabit, & simile eveniet, ut si quis exiguo igne validissimum quicquam coquere vellet, ob id bonum

solum aspernatur, & strigosum desiderat, & sabulera, quia calidius & expeditius ad negotium conficiendum. Petir etiam abunde ab agricola sibi parari, ut haud profundo abscondatur sulco, ut insolari, fruiq; possit aëris tepore. In totum condi sub terram recusat, quae de causa subarantes id ferunt, & saepe si in materiem, aut herbam prædensam quampiam altè incidat, eam vi summa impellendo nititur, radiceq; terram contingit, & germinat. Ostendit etiam robur, quod altè à terra conditum, deducit radicem, & in sua se feri valet & abscondit. Primus omnium feritur, nouissimus omnium tollitur. Columella. Id solum omnium leguminū non desiderat requiem in horreo, à Septembri mense ante æquinoctium crudis noualibus ingeras, & qualitercunque obruas, substinet coloni negligentiam. Teporem autem autumnī desiderat, ut celeriter confirmetur: nam si non ante hyemem conualuerit, frigoribus affligitur. Iugerum decem modii occupant. Lupini modii decem obruuntur vna opera, occantur vna, metuntur vna. Plinius: Terram amat, tertiaq; operis non vult. Et vnum hoc feritur non aratro. Coli non vult. Tellurem aded amat, ut quamuis frutectoso solo coniectum inter folia vepresq;, ad terram tamen radice perueniat. Nihilq; aliud nullo impendio constat, ut quod ne ferēdi quidem gratia opus sit afferre. Protinus feritur ex aruo, ac nec spargi quidem postulat, decidens sponte. Primumq; omnium feritur, nouissimumque tollitur. Vtrunq; Septembri mense, quia si non antecessit hyemem, frigoribus obnoxium est. Impunè præterea iacet, vel derelictum etiam, si non protinus sequuti obruant imbres, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutum. Plerunq; tamen leui sulco integunt. Palladius à Columella: Septembri mense vel maturius aliquanto lupinus feritur, decem modii iugeri mensura complebitur. Florentinus Græcus, Lupinum præ cæteris aliis ferere oportet post æquinoctium autumnī, non expectatis imbris. Pro soli stercoreatione, M. Varro quædam ferenda non tam propter præsentem fructum, quàm in annum proficiemem, quod ibi subiecta atq; relicta terram faciunt meliorem. Itaq; lupinum, quum nec dum siliculam cepit, si ager mactior est, pro stercore inarare solent. Columella, Lupinum nisi in florem verteris, nihil agrum stercoreaueris, sed nec vlla res magis vacui operis, aut feritur, aut conditur. Nam & primis temporibus ante aliam sementem potest id obrui, & nouissimis post cunctos fructus tolli. Sementi facta inoccare oportet, quod sparsuris. Duo iugera tres operæ commodè occubunt, arboresq; quæ intereunt, ablaqueabunt, quamuis antiqui singulis operis singula iugera sarriri, & occari velint. Plinius: octauo calen. Iulii lupinum stercoreandi causa vertitur. Ad terram alendam post tertium florem verti debet, in sabuloso post secundum. Palladius: mense Septembri circa idus, ut loca fecundentur exilia, lupinus feritur, & ubi creuerit, vertitur vomere, ut putrefiat excisus. Si quis lupinum stercoreandi agri causa seminabit, aratio illud tunc debet euertere. Cassianus Græcus: Maio mense lupinum fodere conuenit, quod stercoreandi, aut purganda

ganda terra gra
secare, quum ad
trellat, & postea
corrumpantur.

Theophrastus
à siliquis exilit,
mane demeritur
ninus, Remedium
cepit maturescere

10 10 Florentinus, C
lit, & latenter d

Quoniam syl
lamella: Lupin
fuerit sauciata,
ret, superuacua
herbis, ut ipsa h
satu arua, inuari
ret. Lupinus tunc
habet radicem,

20 20 um cultoris affl
quam flores co
bam depalcent
eger fimo, quon
ter, tellurem q
licta sede fugit

Theophrastus
dinem quidem
quog; suæ natu
Repositum in

30 30 in tabulatum,
sit, vermes gign
sci non potest.
do vermiculi ei
ret. Palladius:
tur ex area. Se
mè custoditur,

Columella:
mem quoq; si a
ninus: Lupino ei
40 40 ungulas habent
uem vnum mo

ganda terræ gratia seminatum est. Deinde ante idus, antequam vitis floret, fecare, quum adhuc humidum existat, & demessum finire, vt paululum putrescat, & postea arare, donec defectum adobruatur, atq; sic radices omnes corrumpantur.

Theophrastus confestim post imbrem rapiendum monet. Siccatus enim *Messu.* à siliquis exilit, interitq; quum decidit. Post dies feruentes, aëre humefacto mane demeritur, quoniam si prius tangatur, decidit, & capi non potest. Plinius, Remedium eius ne metētes fugiat exiliendo, vt ab imbre tollatur, quum cœpit maturefcere, rapiendus est, quoniam cito exilit, latetq; quum decidit. Florentinus, Cōfestim post imbrem rapiendum, siccatum enim è siliquis exilit, & latenter decidit.

Quoniam sylvestre quidem est, cura ei officit, inquit Theophrastus. *Cultus.* Columella: Lupino contraria est sarritio, quoniam vnā radicem habet, quæ si fuerit fauciata, seu vulnerata, totus frutex emoritur. Quod etiam si non fieret, superuacuum tamen esset cultus, quum sola hæc res adeo non infestetur herbis, vt ipsa herbas perimar. Plinius: Coli vtq; non vult. Pinguescunt hoc satū arua, inuariq; diximus: adeo non eget fimo, vt optimi vicem repræsentet. Lupinus runcatur tantum. Palladius, Lupinus si sarculetur, quia vnā radicem, extinguitur, quod nec desiderat, quia herbas præter auxilium cultoris affligit. Florentini Græci hæc sententia de eorum cultura: Antequam flores edant, boues immittantur, quippe quum omnem aliam herbam depascent, solum lupinum ob amaritudinem intactum relinquunt: nec eget fimo, quum pinguescant hoc satū arua, optimiq; fimi vicem repræsentet, telluremq; in futurum feraciorem reddat. Si coloni sentiat operam, relicta sede fugit, culturam enim reformidat.

Theophrastus lupinum diuturnius eruo & cicere contineri dicit. Amaritudinem quidem, & acridinem habet, nigrescitq; quum corrumpitur, sponte quoq; suæ naturæ tunditur, & omnino quæ acerbis saporis sunt. Columella: Repositum in granarium patitur æuum. Reliquum, quod seminis superest, in tabulatum, quo fumus peruenit, optime reponitur, quod si humor inuasit, vermes gignit, qui simulatq; oscilla lupinorum aderunt, reliqua pars enasci non potest. Plinius, Condi in fumo maximè conuenit, quoniam in humido vermiculi eius in sterilitatem castrantur. Amaritudo facit, vt diutius dureret. Palladius: Iunio mense lupinus colligitur, & si placuerit, statim separatur ex area. Sed longè ab humore est ponendus in horreis: sic enim diutissimè custoditur, maxime si grana eius afflauerit fumus assiduus.

Columella: Bouem per hyemem coctum, maceratūq; probè alit. *Fanis.* Famen quoq; si annonæ sterilitas incessit, hominibus commodè propulsat. Plinius: Lupino est vsus proximus, quum sit & homini, & quadrupedum generi ungulas habenti communis. Maceratū calida aqua homini cibo est, nam bouem vnum modū singuli sariant, validumq; præstant. Florentinus: macera-

tur in aqua marina, vel fluminali triduo, dulcescere, & ita siccatū ad vsum recō-
di, homini & quadrupedū generi in cibo esse. Boves cum paleis satiari, homi-
nibus commodē cum triticea, aut ordeacea farina in panes digeri. Diphilus Si-
phnius lupinos tradit, qui maceratu dulcescūt, corporis vires alere. Quomodo
enim ex eis optimus panis fiat, iam docuimus in nostra naturali Magia. Zeno
Cittieus vir morosæ seueritatis, in suos familiares ac notos præter modum ira-
cundia percitus exandescibat, verum quum plusculum vini haussisset, blan-
dior factus & suauior mansuescebat. Rogantibus horum morum discrimen,
respondere solebat, sese idem cum lupinis pati, siquidem illi antequā madue-
rint, amarissimi sentiuntur, dulcescunt verò potu satiati, & mitescunt.

Delino. CAP. LII.

DE lino dicemus, quod tundimus in lanæ mollitiem ad linteorum textu-
ras. Columella inter legumina connumerat. Plinius neq; inter horten-
tia, neq; inter fruges asserit dici posse linum: sed miraculum ait, Herbam esse,
quæ admoveat Aegyptum Italiæ septimo die: herbam esse, quæ Gadeis ab Her-
culis columnis septimo die Ostiam afferat, & citeriorem Hispaniam quarto,
provinciam Narbonensem tertio, Africam altero. Aliquid feri, quod ventos
procellasq; recipiat: deniq; tam paruo semine nasci, quod orbem terrarum vl-
tro, citroq; portet, gracili auena, tam non altè à terra tolli, neq; id viribus suis
necti. Aiunt linum & retia Arachnem reperisse.

Nomen.

Tam Græcis, quā Latinis, Italisq; *λίνον* dictum volunt propter corticis recta
stamina in recta filamenta scindi solita, quæ etiam lina dicuntur, à quo etiam
linea & libella, qua directiones, & parietum structura librantur. Fabri ligna-
rii directorium filum etiam lineam vocant. Sic piscatores *filum*, quod an-
nexum est hamulis.

Description.

Herba tam frequens est, & vulgaris notitiæ, ut superuacuum sit plura linea-
menta afferre, quam sequentia. Tenuicaulis, angustifolia, in summo acumi-
nata, floribus cæruleis speciosis, semine strigoso, fuluo.

Genera.

Duo apud nos genera visuntur, satium, & sylvestre, vernum satium, hy-
bernium rustici vocant sylvestre, quia hyemis gelicidia substat.

Cœlum.

Cœli, quo fruatur linū, auctores non meminere, mihi repido frui videtur.

Solum.

Theophrastus solum amare dicit succosum, quum id pabulum immodicè
trahat. Varro, in pingui rectius solo feritur, quia maioris est succi. Tremellius
apud Columellam maximè dicit obesse terræ virus lini, quia feruidæ sit natu-
ræ: quod etiam Virgilius significauit Georgicorum libro.

Vrit enim lini campum seges, vrit auena,

Vrunt lethæo perflua papauera somno.

Columella, Lini semen, nisi magnus est in ea regione, quam colis, prouen-
tus & pretium procidat, ferendum non est, agris enim præcipue noxium est,

atq;

atq; pinguis-
prædictis semin-
adiuues, & ablu-
lis maximè. Qui

Virgilius fer-

Lili-

Et-

Ex-

Vig-

Ne-

Ten-

Columella,

Decembris. lug-

quâspissimum

li lato solo ferat

re dicunt. Lini

operibus tribus

rarum. Plinius,

te vellitur. Ver

10 cet, quod pro

velis loco ping

qui macro foli

Quintili ab aq

nonas Ianuarii.

ante hyemem p

mem quinquie

aratum prim

lime fieri pote

tempus, sparg

30 ger herpetic ob

let. Locis calid

sculum, ut abe

Conducibilis

næ incommo

plexantes ang

uerint, & ampl

incedunt per se

Plinius de ei

gitur, totum es

40 culos manuales

bus vno die, m

atq; pinguiſſimum, latum, & modicè humidum poſcit. Sed omni ſolo, quod prædictis ſeminis ſegetibus ſatisfacit, vna præſens medicina eſt, vt ſtercore adiues, & abſumpras vires hoc velut pabulo reſoucas. Plinius: ſeritur fabuloſis maximè. Quintilii limoſis tractibus gaudere dixerunt, & vliginoſis.

Virgilius ſerendi lini tempus præſcribit Georgicorum primo.

Satis

*Libra dies, ſomniq; pares ubi fecerit horas,
Et medium luci, atq; umbris iam diuidet orbem,
Exercete viri tauros, ſerite ordea campis,
Vſq; ſub extremum bruma intractabilis imbrem.
Nec non & lini ſegetem, & cerale papauer
Tempus humo tegere.*

Columella, ſeritur à calendis Octobris in ortū aquilæ, qui eſt ſeptimo idus Decembris. Iugerum agri octo modiis obſeritur, nonnullis placet macro ſolo quāſpiſſiſſimum ſemen vetus committi, quo tenue linū proueniat. Idem etiam ſi lato ſolo ſeratur, menſe Februario, decem modios in iugerum iaci oportere dicunt. Lini decem modii vel octo, quatuor iugis conſeruntur, occantur operibus tribus, tuncantur vna, velluntur tribus. Summa ſit vndecim operarum. Plinius, ſeritur vno ſulco, nec magis feſtinat aliud. Vere ſatum & ſtate vellitur. Vere ſeritur. Palladius: Octobri menſe lini ſemen ſeremus, ſi placeat, quod pro malitia ſui ſerendum non eſt, nam terræ vber exhaurit, ſed ſi velis loco pinguiſſimo & modice humido, ſeretur in iugero v i i i modiis. Aliqui macro ſolo ſpiſſum ſerunt, ita aſſequuntur, vt linum ſubtile naſcatur. Quintilii ab æquinocſio autumnali vſq; ad exortum Arcturi, quod ſit pridie nonas Ianuarii. Nos autem linum ſerimus maxima diligentia & labore. Poſt hyemem proſcindimus, vt glebæ gelu in puluerem redigantur. Poſt hyemem quinq; dies, aut ſexies aratur, vt optimè tellus pulueretur, ſed eo pacto, vt aratrum primo profundius immittatur, ac deinde minus, poſtremo, quā ſublime fieri poterit. Inde à medio Aprilis vſq; ad calcem optimum eſt ſarritionis tempus, ſpargatur ſemen, ac aratro cooperiatur. Proſciet ſi poſt ſationem ager herpici obſeratur, ſi tēpus ſiccus, optimum eſſet, ſi tellus maſcere poſſet. Locis calidis poſſet & ante hyemem ſeri, vt adueniente frigore ſit firmiuſculum, vt ab eo ſeruiri poſſit. Cretola humo etiam tunc optimè prouenit. Conducibilis erit ab hominum manibus, quā bubus herpica trahi, ob vrinæ incommodum. Ab herbis liberandum lolio, & caſſutha, nam caulem amplexantes angunt, & ſtrugulant, id quæ prius quā creſcant: nam ſi increuerint, & amplexantes linum ſuis cincinnis lædunt, & agrius diuelluntur. Qui incidunt per ſegetem caueant, ne proculcent & obterant pullulantem.

Meſſia.

Plinius de eius meſſi hæc habet. Maturitas eius duobus argumentis intelligitur, intumeſcente ſemine, aut calore ſtueſcente. Tunc euulſum & in faſciculos manuales colligatum, ſiccetur in ſole pendens conuerſis ſupernè radicibus vno die, mox quinq; aliis in contrariū inter ſe verſis faſciam acuminibus,

ut semen in medio cadat, deinde post messem triticeam virgæ ipsæ mergantur in aquam, solibus tepefactam, pondere aliquo depressæ. Nulli enim leuitas maior. Maceratas indicio est membrana laxatior. Iterumque inuersa ut prius, sole siccantur, mox arefactæ in saxo tunduntur stupario malleo. Quod proximum cortici fuit, stupa appellatur, deterioris lini, lucernarum ferè luminibus aptior. Et ipsa tamen peccitur ferreishamis, donec omnis membrana decorticeretur. Medullæ numerosior distinctio, candore, mollitia. Cortices quoque decussi clibanis, & furnis præbent usum. Ars depectendi, digerendiq; iustum est è quinquagenis fascium libris quinas denas carminari. Iterum deinde in filo politur, illisum crebro in silice ex aqua, textumq; rursus tunditur clavis, semper iniuria melius.

Cibus. Theophrastus semen habere quandam pinguedinem, & lentitiam dicit. Plinius. Exprimitur è semine oleum, quod non solum medicis, sed etiam pictoribus, lapicidis, lignariis, cementariis, ac fabris ferrariis vsui est. Præstat & ad lucernarum usum, quod diutius igni resistat, quàm quod ex oliui.

Inf. rem. Vnum hoc maximè rationem desiderare dicit Theophrastus, si lolium transit in linum: nam inter se plurimum distant, nisi forte pabulum id etiam immodicè trahat, ut ex ista nimietate mutatio accadat. Sed nostri agricolæ credere non possunt, quod linum in lolium abeat.

De cannabo. CAP. LIII.

LEGVMINVM complura genera Columella dicit, inter quæ cannabis maximè grata, & in hominis vsus.

Nomen. Græcis καλλιβος. Sparsæ sunt aquarum scaturigines, quo loci cannabis sata, vel sponte nata luxuriat, ob id videtur id nominis inditum. Latinis ut Varroni cannabis, Palladio cannabus. Itali canape.

Genera. Meminit Dioscorides sativi, & sylvestris. Plinius tria eius genera facit. Optima Alabandica, secunda Milasea, tertia rosea agri Sabini, quæ quod ad proceritatem quidem attinet, arborum altitudinem æquat. Apud nos in marem & fœminam duntaxat distinguitur, mas ex flos, fœmina sterilitatem cõpensat.

Descriptio. Dioscorides satiuam ita delineat. Foliis fraxini, graui odore, caulibus proceris, semine rotundo. Gliscit verò apud nos rectis culmis, quadratis, striatis, horridis, foliis nigricantibus serratis, septenis, & nouenis è singulo pediculo, diuisuris ricini, crebrisq; geniculatur nodis. Sylvestrem Dioscorides ita depingit. Virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes, folio satiuæ nigriore, & asperiore, flore lichnidis, subrubro semine, & radice althææ, cuius cortex torquendis funibus accommodatus.

Solum. Columella, Pingue solum, stercoreatum, & riguum, vel planum, atq; humidum, & alrè subactum deposcit. Palladius eadem, quæ Columella habet. Quintilii, Umbrosis lacunis, vdisq; marginibus delectatur.

Satio. Columella, Arcturo exoriente, quod est ultimo mense Februario, circa sextum

VI
sextum aut quin
modicum vernum
plinius celsitate
que desideret.
lii, Cannabis se
Cassianus ex ve
dius eadem, qu
ram, pro restibus
stiozem cultum,
10 tibus & capistris
musculo & pul
diocriter latis,
& delicatior co
ta est, herbis ma
Plinius. Sem
gitur, & sole, au
mia, ac lucubrat
aut medullæ, lau
semine in mani
20 nã componunt
ribus, vel her
hebdomadam
& condunt. C
macerantur diu
velluntur, ut fit
Plinius, Vso
da trahendaq;
bus infima ple
aut laqueo su
30 ex ea confecta
vibus præcipi
que supellectil
Plinius. Sat
hoc cibo frequ
libus suggerim
guedinis mole
tantum sagina
duelibus & lin
exprimitur.

Sexum aut quintum calendarum Martii feri debet, nec tamen vsque in æquinoctium vernum. In quadratum pedem feruntur grana sex eius seminis. Si sit pluuius cœli status, improbè feretur. Incertum est quantam impensam curamque desideret. Plinius. Seritur à Fauonio, quò densior est, eo tenerior. Quintilii, Cannabis feritur ab arcturi exortu, qui est ad quintum calendas Aprilis. Cassianus ex veterum Græcorum placitis Februario ferendum censet. Palladius eadem, quæ Columella habet. Apud nos, qui cannabinæ segeti dant curam, pro restibus conficiendis latissimo solo semina committunt: nam robustiorem cultum, crassiorémq; corticem, ac rudiorem stupam creabit, rudentibus & capistris apta, & quanto rarior feretur, eò pinguior fruticabit. Situ muscoso & puluerulento, florum seminumq; spes perit. Qui verò locis mediocriter latis, densiusve semen sparget, graciliorem calamum, & sine ramis, & delatior cortice producet, aptiorem ad nendum, & ad texturas. Vbi facta est, herbis manibus solum purgabis.

Plinius. Semen eius, quum est maturum, ab æquinoctio autumnii distringitur, & sole, aut vento, aut fumo siccatur. Ipsa cannabis vellitur post vindemiâ, ac lucubrationibus decorticata, purgatur. Improbatur cortici proximum, aut medulla, laudatissimum est è medio, quæ mela vocatur. Nostri maturato semine in manipulos colligunt, ac simul obseruantes seminarios culmos vna componunt, radices verò ex altera parte. Deinde semina in culmis straminibus, vel herbis cooperiuntur, vt perfectam maturitatem concipiant per hebdomadam: inde sublatis straminibus in substratis linteis decutiunt semen, & condunt. Collecto semine, manipuli lacunis aquæ plenæ merguntur, vbi macerantur diu, deinde insolantur, ac tunduntur, ac deinde cortices staminei velluntur, vt fit in lino.

Plinius. Vtus funibus vtilissimus: iis enim vtuntur in fabricis ad sustinenda trahendaq; ingentia pondera, ad nauigia regenda, & ad lintea texenda, quibus infima plebs vtitur. Inuisa admodum furibus, qua subinde ii pendeant, aut laqueo suffocentur. Necessaria piscatorum retibus, quum funes & retia ex ea confecta diutius in aqua commorentur, quàm ex lino. Plagatum etiam vñbus præcipua. Apud nos ad vestium stragula, velorum, & quamlibet denique supellestem.

Plinius. Saturandis hyeme gallinis, quo tempore raro oua parere solent, hoc cibo frequenti vtuntur. Nos multum alimentum ex eo gallinis cohortalibus suggerimus, vt hyeme fecundiores sint, sed steriles postea, quasi pinguedinis mole obruta redduntur. Auiculis etiam in cibum porrigimus, ac tantum saginæ affert, vt aut enecet, aut cantillandi alacritatem adimat, vt carduelibus & linottis. Præterea lucernis alit ellychnia & lucem, & ex ea oleum exprimitur.

INTER lini genera sunt qui gossipium adnumerent, è cuius fructu candidissimū vellus netur ad multa vtile, nec est aliud linigenus, quod huic molliæ & candore præferri possit.

Nomen. Græcis *ξύλον* dicitur, Polluce authore, Theophrasto *ἰεροφόρα* dicitur, Suidæ *βύμβαξ* & *πάμπας*, Nicolao Myrepsio *βουβάνιον*. Plinio, cæterisque Latinis gossipium & xylon, vnde ligna xylinea. Arabes *cottonem* vocāt, à mali cotonei fortasse effigie, quod cum eo gignitur. Itali ab his nomina mutuantes, *bombace*, & *cottone* vulgò vocant.

Descriptio. Theophrastus ita suam lanigeram depingit. In Tylo insula, in sinu Arabico est lanigera arbor, folio vitigineo fruticans, verum minori fructu nullo, sed in quo lana cōtinetur, mali magnitudine cernitur, verum nascens compressum, quum tempestiuæ maturitatis sit, aperiri, lanas eximi, qua telas texunt: aliàs viles; aliàs pretiosas. Plinius ab eo: Tylos insula est in sinu Persico: Eius excelsoe suggestu lanigeræ arbores alio modo quàm serum. His folia infæcunda, quæ niminora essent, vitium poterant videri. Ferunt cotonei mali amplitudine cucurbitas, quæ maturitate ruptæ, ostendunt lanuginis pilas, ex quibus vestes pretiosolinteo faciunt. Sed ex se hanc eandem alibi describit. Frutex est parvus, similemque barbaræ nucis defert fructum, cuius ex interiore bombice lanugo netur. Nec vlla sunt in candore, molliæ præferenda. Hæc descriptio commodè, & concinnè nostro gossipio quadrat: nam fruticulus est, in quo vitis folia, sed minora, molliora, incana, flores lutei nonnihil purpurascens in medio, nuculasq; ferunt, aut potius mala exigua pullo colore, dum maturuerint hiantia, lanolum floccum, aut glomum ostendunt, semen oblongum cubebæ, copiosum, alba factum medulla, oleaginosa, lanugine inuolutum, vt difficillimè extrices.

Cælium. Cælum exoptare calidum videtur: nam Theophrastus in Arabico sinu ad orientem verso, & Tylo insula nasci dixit. Plinius in superiore Ægypti parte, in Arabiam vergente. Apud nos apticis maritimis ad Austrū versis prouenit, vt in Apulia, sic Crera, Cipro, Sicilia, & Mehsæ Italia prouenit vbertim.

Solum. Solum pingue, latum, & profundum amat, & si macrum erit, latamine satiatur. Sed melius erit per se pingue: nam sole incalescente simum plantas inrerimit.

Satio. Satus rationem ita apud Appulos obseruauimus, vbi copiosissimè seritur. Solum primò Ianuario proscinditur, Februario secundo, ac tertio Martio. Aprili demum quando seritur, iterum aratur. Semen separatur vnum ab altero, & spargitur vt triticum. Iugerum soli quarta pars modij complet, sparsum operitur pastino, nascitur post mensem, quum tria folia emerferint foras. manibus herbis liberatur, vel sarculis, & si denuò nascuntur, denuò idem opus obeundum. Si in solstitio luxuriat in germina & frondes, summa decerpuntur. Floret Iulio, nec desinit florere, fructificareque, donec hyemis asperitate cohibetur. Aiunt Candiota oltores semen suillo stercore & vaccino

mace-

macerari, sic v
fert, antequam
ores in minus
ciunt.

Nullum lini
ratis in eo par

SERITUR
modo serat

10 Bónap; The
m; Plinius d

Græcis cornu
corniculis simi

vocat, Colum
rustici fœnum

Itali sieno greco
Theophrast

Ex Dioscoride
loti syluestris,

20 cauliculis par
bicanti, semina

Theophrast
quod nulli è re

omnino nequ
Columella

sa seritur, alte
sem seminari

incommodè
tuor digitis o

30 lipriusquam
sarculis adobi

metuuntur v
que peius tra

prosit neglig
Theophr

vocat Græc
xi, in culmine

adnascens in
sole & aère v

macerari, sic vberius, & felicius enasci, nempe celerius emergit, & vberius fert, antequam frugis tyrannidem, & fruiam. Sic etiam nostri olitores in minus commodo cœlo, vel morosissimas plantas vernaculas faciunt.

Nullum linigenus huic candore, & mollitie præfertur, quanquam firmi-
tatis in eo parum.

De fœnugraco. CAP. LV.

SERITVR fœnumgræcum ad messem, & ad pabulum, ad pabulum quo-
modo feratur dicemus in prato.

10 **Βένανος**, Theophrastus illi nomen imposuit, à bubuli cornu similitudine, & **Νέανος**, Plinius **ἀγροκαρπός** à caprini cornu similitudine: sic etiam **κέραιος**, nam **κέραιος** Græcis cornu est, magna que Græcarum nomenclationum pars à filiquis, quæ corniculis similes existunt, desumpta est. Hippocrates **κέραιος**. Varro filiculam vocat, Columella ab iisdem filiquis filiquam vocat, inquit: Siliquam, quam rustici fœnum græcum appellant. Plinius filiciam, Palladius fœnumgræcum. Itali *fœnogreco*.

Theophrastus ait eius semen viride inolidum esse, siccum verò odoratum. *Descriptio*
Ex Dioscoride. Siliquas profert sinilacis, sed minus longas, & torosas, semen loti sylvestris, sed multo minus, vel myagro simile. Emicat fœnumgræcum
20 cauliculis parum striatis, foliis ternis, loto æmulis, & crenatis, flore paruo al-
bicanti, semine anguloso, fuluo in corniculis.

Theophrastus fœnumgræcum solo tenui inarescere, nec pingui producere, *solum*
quod nulli è reliquis accidere dixit. Vt in Eubœa apud Lelantum nasci quidem omnino nequit, & apud Canethum.

Columella ita ferit: Duo tempora sationum habet, vnum quū pabuli cau-
sa feritur, alterum mensis Ianuarij ultimo, vel primo Februarij, quum in mes-
sem seminatur. Hac ratione iugerum sex modiis occupamus, cruda terra non
incommodè fit, daturque opera, vt spisse aretur, nec tam altè. nam si plus qua-
tuor digitis obrutum est semen eius non facile prodit, propter quod non nul-
30 li priusquam ferant, minimis aratris proscindunt, atque ita iaciunt semina, &
sarculis adobruunt. Siliquæ modij sex, vel septem totidem operis obruuntur,
metuuntur vna. Plinius non aratione, sed scarificatione feri dixit, quantum-
que peius tractetur, eò lætius provenire, rarumque dictu, esse aliquid, cui
probit negligentia. Occatur tantum. Palladius ea, quæ Columella habet.

Theophrastus scribit subnasci huic statim ab radice, quod hæmodorum *Inf. rem.*
vocat Græci, singulari caule, nec ab simili consurgens, verum longè breuior-
zi, in culmine quippiam capitis instar gerit, radice subrotunda nititur. Statim
adnascens interit, quia pabulum tollit, tum quod terra ministratur, tum quod
sole & aère venit.

De herbatinctorum. CAP. LVI.

SERITVR in Campania herbatinctorum, officinis maxime expetita. Latet me an fuerit antiquis cognita.

Nomen. Aluz, vel tinctorum herba vulgo nominatur.

Descriptio. Assurgit grandicaule, & tereti, auenæ crassitie, altitudine cubitali, in longum spicata, spica à medio caule incipit, in quo flores & semen, folio oblongo, vt linaria, sed latiusculo, in viridi clarescente, flore herbaceo, vel croceo, radice tenui, alba, sapore rapisti.

Celum. Aperto, & calido ccelo gaudet, oblæditur frigore.

Solum. Solo verò macro, & cliuoso.

Satio. Praeparatur solum, vt in lino diximus. Seritur Ianuario, vel Februario, modium seminis duodecim iugera complet. Nascitur à satù sexto, vel octauo die, floret initio Maii, sementelcit, excipiturq; decussò semine.

De arundine saccharifera. CAP. LVII.

NOSTRÆ segeti coronidem imponet calamus saccharatus, quum apud nos seratur, colatur, nec mediocrem quaestum inde extorqueant mercatores, dum saccharum diuersis in locis venum exportant, & præsertim quum nemo adhuc eius sationem, & vsum conscripserit, quoniam maiores nostri auditione potius, quàm oculata fide & exploratione aliqua nobis tradiderunt. Aristoteles enim & Theophrastus eius discipulus mel arundinibus Indicis excipi dixerunt. Dioscorides, Est & aliud concretum mellis genus, quod saccharum nominant, in India, & felici Arabia in arundinibus inuenitur, salis modo concretum, & dentibus, vt sal, fragile. Galenus otiri ait in Indicis harundinibus mel, saccharum nominatum. Strabo in sua Geographia non solum radicibus, sed arundinibus mel extrahere in India, sine apibus. Vatro è Latinis huius rei meminit.

Indica non magnanimis arbore crescit arundo,

Illius & lentis premitur radicibus humor,

Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Plinius: Saccharum Arabia fert, sed laudatius India, est autem mel harundinibus collectum, candidum, dentibus fragile, amplissimum, nucis auellanae magnitudine. Et Seneca memorat cannas, quarum humor pinguis, dulcisque in mel abeat.

Nomen. Recentioribus Grecis saccharon, Latinis saccarum, Arriano vel calaminum, vel indicum. Italis Zuccaro.

Descriptio. Non magnitudine solum, sed effigie saccharatus calamus harundines & milium indicum, & Aethiopicum dicta æmulatur, vel medium inter miliaceas, & arundinaceas plantas, septenum, octonumve pedum altitudine calamos proferit, pollice crassiores, densis geniculis, albida, succulentaque, & perquam

quam dulci farc
so flore, quadam
et sunt, præse
cum saccharatu
Calidi, vel ter

Africa, vel Arab
Hispaniæ, Galli
narias transuect
Humentis soli

10 Apud Brutio
iteratur, dicunt
re: Martio dein

lare: sint areæ vi
erigatur sulcus,
mnes aquario iu
vt quum decurr

sacchariferas ian
rudinis, in quib
interuallo dista

10 lot inualecit, ri
diebus aliis par

iuxta radicem,
decem pedum

serendum Mart
se, herba euellit

Novembri secul
cura. Nouem

pud Brutios se
pere, sic etiam

30 erit, per bienn
Saccharum

runtur, emund
trapeto contur

cortinam, seu
aquam inicien

solum fuit imb
vaporem excip

seu figlina vasa
loco foraminu

40 relinquant, &
eat, eodem die

quàm dulci farctus medulla, folio bicubitali, per longitudinem striato, como-
so flore, quadantenus *forgi*, radice harundinacea. Quum harundines anulæ fa-
ctæ sunt, præsenio turgidæ fiunt, excluduntq; è rimis, quibus hiascunt, suc-
cum saccharatum, sed solidum salis aspectu.

Calidi, vel tepidi aëris amassæ sunt, utpote Egypti, Rhodi, Cypri, Indiæ, *Cælum*.
Africa, vel Arabia, quæ fœlix cognominatur, sed aëre blandiori allecæ, Italiæ,
Hispaniæ, Galliæ tandem & orbi Europeo inquilinæ factæ sunt, ut vltq; ad Ca-
narias transuectæ sint.

Humentis foli, & palustris amica.

Solum.

10 Apud Brutios & Siculos tali arte præparatur ager. Ianuario aratur, in fine *satio*.

iteratur, dicunt vulgo *duplare*, medio Febuario tertio aratur, dicunt *tertia-*
re: Martio deinde postremo ager in areolas efformatur, dicunt vulgò *incas-*
lare: sint areæ viginti pedum longitudinis, octo latitudinis, in extremitatibus
erigatur sulcus, in medio lacunæ fiant, in quibus immixtæ resident aquæ, o-
mnes aquario iulco hærent, ob id declui aruo feruntur, qui flumini subiacear,
ut quum decurrat aqua per apertum vadum recipiat aquam, inde harundines
sacchariferas iam adseruatas in metam in taleolas scindunt semipedis longi-
tudinis, in quibus genicula intercipientur, sulco hinc inde figuntur semipedis
interuallo distantes, quæ Aprilis concipientes germinant. Maio mense, ubi ca-

20 lor inualefcit, rigantur, ut singulis hebdomadibus areæ semel irrigentur, aliis
diebus aliis partiuntur, idq; vltq; ad Octobrem. Nouembri mense inciduntur
iuxta radicem, & in fasciculos colligantur in metas, quæ sub dio efformantur,
decem pedum altitudinis, & ita seruantur ad saccharum conficiendum, vel ad
ferendum Martio, & nunc ager hortus dicitur. Secundo anno Martio men-
se, herbæ euelluntur, & stercoreantur sulci, & Maio irrigantur, ut diximus, &
Nouembri secantur calami, diciturque *cannamela* vulgò. Tertio anno eadem
cura. Nouembri eruitur radicibus, ut per triennium requiescat ager. Hic a-
pud Brutios ferendi modus. Possunt etiam stolones euulsi, & depaſti conci-
pere, sic etiam oculis è radicibus satis, ut in harundinibus. Si solum imbecille
30 erit, per biennium fatigant solum.

Saccharum paratur arte tali. Euulsi è radicibus calami ad trapetum defe-
runtur, emundantur primo frondibus, incidunturq; ad palmares taleolas, sub
trapeto contunduntur, ac sub prælo elicitur incomparabilis utilitatis latex. In
cortinam, seu ahnum conicitur, ac per diem naturalem effluere sinunt,
aquam iniiciendo ebullitioni suffecturam, & vicissim despumando. Si verò
solum fuit imbecille, per diem & quadrantem ebulliat, ubi verò iam aqua in
vaporem expirauit, excoctum saccharum instar salis coalescit, & in nolas,
seu figlina vasa infunditur, in metæ formam effigata, quibus in angustiiori
loco foraminulum est, suis paleis obturatum, ita quadraginta dierum spatio
40 relinquunt, & reſerato foraminulo, quo sordidius crassamentum facilius ex-
eat, eodem dierum interuallo quiescere sinunt, inde luto ex figlina terra, &

Ars.

aqua subacto diluore, metæ latam basim inducunt, & loricam latam, duorum, triumve digitorum faciunt, quæ crusta ubi aruerit, demum & noua superinducitur, bis tervē repetunt, quousq; probè coopertam cognouerint.

V. 10.

Sacchari multiplex vsus. Præbet enim suas delicias tum culinæ, tum pharmacicæ, multa enim è saccharo conflantur, loricantur, conduntur, & conuoluuntur, dulciaria, & tragemata, & alia gulæ blandimenta.

IOAN. BAPTISTÆ PORTÆ NEAPOLITANI

VILLÆ

LIBER DVODECIMVS ET VLTIMVS,

SIVE

P R A T V M.

P R O O E M I V M.



AM ad operis finem deuentum est, scilicet ad reliqua herbacea, ubi de prato, siue de pascuis loquemur. Ex iis enim villicus fœni copiam habet, quo armenta saturentur, sine quibus terra commodè coli non poterit. Cato summus in villa prato quintum locum tribuit. Interrogatusq; inquit Plinius, quis esset certissimus questus? respondit si bene pascat: quis proximus? si mediocriter pascat. Summa omnium in hoc spectando fuit, vt fructus is maximè probaretur, qui quamminimo impendio constaretur. Sed scrofa, ex Varronis sententia, de hoc non consentit, quod alii dant primatum bonis pratis, vt & Varro quoque, à quo antiqui prata quasi parata appellarunt. Columella ab his, Necessarius est prati cultus, cui veteres Romani primas in agriculturalione tribuerunt. Nomen quoque indiderunt ab eo, quod protinus esset paratum, nec magnum laborem desideret. M. quidem Porcius & illa commemorauit, quod nec tempestatibus affligeretur, vt aliæ partes ruris, minimiq; sumptus egens, per omnes annos præberet reditum, neque eum simplicem, quum etiam in pabulo non minus redideret, quàm in fœno. Vlpianus de verborum significatione pratum vocat, in quo ad fructum percipiendum salce duntaxat opus est. Cæsar Vo-

piscus

piscus quum cau-
esse, in quibus p-
benignitate pr-
citare, perenni-
scendo obiteret
rore, imbris
bus pabulo esse

Quot p-

10 C A T O dup-
bis, fœnun-
gua, si aquam ha-
beas quamplurim-
genera, quorum
to idoneum elig-
nec collis præcip-
nestam præcip-
guis est, aut rig-
tur, quæ exigui-
20 imvorati, aut
lus in aliqua pa-
rum abundanti-
Prato locum pin-
tabimus, ubi hu-
rete. Varro etia-
herbosa. Nunc
sideratur influe-
cosogignitur fo-
cessaria, si maci-
30 uis exili, prærun-
eligit solum pin-
ti forma, si rig-
mus, & si id n-
nam si frigidum
re orbabitur. N-
quas adit hume-

P R A T A vel
noua instituta

piscus quum causam apud censores ageret, campos Roseæ dixit Italiæ sūmen esse, in quibus perticas pridie relictas gramen operiret. Pratum summa Dei benignitate productum est, vt summa terræ cutis vbique nada restibili feracitate, perenniꝫ; prouentu, virore decoraretur amœno, & vltro pecori vescendo obiceretur. Ex varia enim partium terræ commistione, cœli habiru, rore, imbribus variæ herbæ producuntur, vt variis quoq; animalium generibus pabulo esse possint.

Quot pratorum genera, & de aëre, solo, & aquis pratis conuenientibus. C A P. I.

- 10 **C** A T O duplicis prati meminit, rigui, & sicci. Pratum si irriguum habebis, fœnum non deficiet: si non, & erit siccum, summittito. Prata irrigua, si aquam habebis, id potissimum facito: si aquam non habebis, sic vt habeas quamplurimum facito. A quo Columella. Prati duo animaduertimus genera, quorum alterum est siccaneum, alterum riguum. Sed potum prato idoneum eligamus. Columella: Nec campus concauæ positionis esse, nec collis prærupti debet, ille ne collectam diutius contineat aquam, hic ne statim præcipitem fundat. Potest tamen mediocriter accliuus, si aut pinguis est, aut riguus ager, pratum fieri. At planicies maximè talis probatur, quæ exigue prona non patitur diutius imbres, aut influentes riuos
- 20 inuorari, aut si quis eam superuenit humor, lentè prorepat. Itaque si palus in aliqua parte subsidens restagnat, sulcis deriuanda est: quippe aquarum abundantia aut penuria graminibus æquè est exitio. Ab eo Palladius: Prato locum pinguem, leniter inclinatum, vel huiusmodi vallem deputabimus, vbi humor nec statim præcipitari cogitur, nec diu debet inhærere. Varro etiam campestem positionem probauit, quia ibi semper prata herbosa. Nunc solum eligamus. Columella: Læto, pinguiꝫ; campo non desideratur influens riuus, meliusq; habetur fœnum, quod suapte natura succoso gignitur solo, quàm quod irrigatum aquis elicitur, quæ tamen sunt necessaria, si macies terræ postulat: nam & in densa, & resoluta humo quamuis exili, pratum fieri potest, quum facultas irrigandi datur. Palladius ab eo
- 30 eligit solum pingue roscidum. Potest quidem & soluto, & gracili solo prati forma, si rigetur, imponi. Cœlum tamen optate temperatum nos dicimus, & si id non assequimur, frigido tamen proximum, humidoque: nam si frigidum fuerit, solum continuò niuib. obfessum herbarum virore orbabitur. Nimis calidum herbas exuret, calidum exiccabit, nisi propinquus adsit humor.

Quomodo fiant prata. C A P. II.

P R A T A vel naturæ sponte nascuntur, vel arte fiunt. Quæ arte fiunt, vel noua instituenda sunt, vel antiqua renouanda (nam multa sunt, vt dixi,

quæ negligentia exoleſcunt, & fiunt ſterilia) ea expedit interdum etiam framenti cauſa exarare, quia talis ager poſt longam deſidiam, latas ſegetes affert. Igitur cum locum, quem prato deſtinauerimus, æſtate proſciſſum, ſubactumque ſæpius per autumnum rapis, vel napis, vel etiam faba conſeremus, inſequentem deinde anno, frumento, tertio diligenter arabimus, omneſq; validiores herbas, & rubos, & arbores, quæ interueniunt, radicitus extirpabimus, niſi, ſi fructus arbuſti id facere nos prohibuerit. Ab eo Palladius: Septembri tempore extirpandus eſt locus, & liberandus omnibus impedimenſis, vel herbis latioribus, & ſolidis, atq; virgultis. Deinde quum frequenter exercitatus fuerit, ac multa aratione ſolutus, ſubmotis lapidibus, & glebis ubiq; confractis, ſtercoretur Luna creſcente recenti latamine. Ab vngulis iumentorum ſumma intentione ſeruetur intactus, præcipuè quoties humeſcit, ne in aquale ſolum reddant mollibus locis impreſſa veſtigia. Vtiliſſimum ſimul & herbe arare, deinde cratire. Nec primo anno rigari nec paſci ante ſecunda ſcæniſecia, ne herbe vellantur, obtrituq; hebetentur. ex Plinio.

Quomodo facta prata colantur. CAP. III.

CVLTVS autem pratorum magis curæ, quàm laboris eſt. Primum ne ſtirpes aut ſpinas, validioresq; incrementi herbas in eſſe patiamur, atque alias ante hyemem, & per autumnum extirpemus, vt rubos, virgulta, iuncos, alias per ver euellamus, vt intuba, ac ſolſtitiales ſpinas, ac neq; ſuam velimus impaſci, quoniam roſtro ſuffodiat, & ceſpites excitet, neq; pecora maiora, niſi quum ſicciffimum ſolum eſt, quoniam demergunt vngulas, & atterunt, ſi induuntq; radices herbarum. Tum deinde maciora & pendula loca menſe Februario, Luna creſcente ſimo iuuada ſunt, omneſq; lapides & ſi qua obiacent falcibus obnoxia colligi debent, ac longius exportari, ſummittiq; pro natura locorum, aut temporis aut ſerius. Sunt etiam quædam prata ſitu vetuſtatis obducta veteri, vel craſſo muſco, quibus mederi ſolent agricolæ ſeminibus de tabulato ſuperiectis, vel ingeſto ſtercore, quorum neutrum tantum prodeſt, quantum ſi cinerem ſæpius ingeras, ea res muſcum enecat. Attamen pigriora ſunt iſta remedia, quum ſit efficaciffimum de integro locum exarare. Quum herba permaturuerit, tum ſcæniſecam meſſorem oportet inducere, & deſectam herbam religare, & exportare, deinde locum rigare ſi fuerit facultas aquæ, ſi tamen terra denſior eſt: nam in reſoluta humo non expedit inducere maiorem vim riuorum, priuſquam conſpiſſatum, & herbis colligatum ſit ſolum, quoniam imperus aquarum proluit tetram, nudatiſq; radicibus gramina non patitur coaleſcere, propter quod nec pecora quidem oportet teneri adhuc, & ſubſidentibus pratis immittere, ſed quoties herba proſiluerit, falcibus deſecare. Nam pecudes, vt ante dixi, molli ſolo inſigunt vngulas, atque interruptas non ſiunt herbarum radices ſerpere, & condenſare. Altero tamen anno minora pecora poſt ſcæniſecia permittemus admitti, ſi modo ſicci

tas

tas, & conditio lo
erit, poterit etiam
ſecundum Fau
ſceni, maciora
etiam ſubiectis a
ductus, ſuccum
prudentes agric
quoniam pluvia
ladius: Sed ſi pr
10 eiſdem locis ſcæ
prodeſt, cinis ſa
curia, vetuſtate
plerumque arare
quorum meſſe ſi
prata, reſtituiq;
anno frumento,
ſint, ſicilite, hoc

Su

20 **E**XACTIS
ri, & conc
nam & largius p
tem modus in ſi
quod omnem ſu
miam retinuit
& incendium,
quod ſi perma
tem ſole ſiccari
muſus in ſtriam,
30 minus ſub tectu
portetur, aut i
erit, in metas ex
nam ſic defend
dictas metas fa
aceruis. Quap
nunt, quàm per
untur. Plinius
roborari, ſecan
ces, priuſ quam
40 rigua. Noctib

tas, & conditio loci patietur. Tertio deinde, quum pratum solidius, ac durius erit, poterit etiam maiores recipere pecudes, sed in totum curandum est, vt secundum Fauonii exortum, mense Februario circa idus, immittis seminibus fœni, mactiora loca, & vtiq; celsiora, stercorentur: nam editior clius præbet etiam subiectis alimentum, quum superueniens imber, aut manu riuus perductus, succum stercoreis in inferiorem partem secum trahit, atque ideo ferè prudentes agricolæ etiam in aratis collem magis, quàm vallem stercoreant, quoniam pluuia semper pinguiorem materiam in ima deducunt. Ab eo Palladius: Sed si prata vetera muscus obduxerit, abradendus est, & scalpris 10 eisdem locis fœni spargenda sunt semina, & quod ad necandum muscum prodest, cinis sæpius ingerendus. Quod si sterilis factus est locus carie, incuria, vetustate, exaretur, ac de nouo rursus æquetur. Nam prata sterilia plerunque arare conueniet. Sed in nouo prato rapa conferere possumus, quorum messe finita, cætera quæ dicta sunt, exequemur. Plinius: Senescunt prata, restituiq; debent faba in his sata, vel rapis, vel milio: mox insequente anno frumento, rursusque in prata tertio relinqui. Præterea quotiens secta sint, sicilire, hoc est, quæ fœnifeces prætereunt secari.

Succisum fœnum quomodo tractari & condi debeat.

CAP. IIII.

- 20 **E**XACTISSIME Columella docet, quomodo succisum fœnum tractari, & condi debeat. Fœnum antequam inarescat, optimè demetitur: nam & largius percipitur, & iucundior cibum pecudibus præbet. Est autem modus in siccando, vt neq; peraridum, neque viride colligatur: alterum, quod omnem succum si amisit, stramenti vicem obtinet: alterum quod si nimium retinuit, in tabulato putrescit, ac sæpe, quum concaluit, ignem creat, & incendium, nonnunquam etiam quum fœnum cecidimus imber oppressit, quod si permaduit, inutile est vñ mouere: patiemur igitur superiorem partem sole siccati, tum demum conuertemus, & vtrumq; siccatum coarctabimus in striam, atq; ita manipulos vinciemus, nec omnino cunctabimur, quominus sub tectum congeratur, vel si non competit, vt, aut in villam fœnum 30 portetur, aut in manipulos colligatur. Quum igitur ad eum modum siccatum erit, in metas extrui conueniet, easque ipsas in angustissimos vertices exacui: nam sic defenditur à pluuiis, quæ etsi non erunt, non alienum tamen est prædictas metas facere, vt si quis humor herbis inest, exudet, atq; excoquatur in acervis. Quapropter prudentes agricolæ, illatum tecto, non ante componunt, quàm per paucos dies congestum in se concoqui & deferuescere patiuntur. Plinius verò: Secandi tempus quum spica deflorescere cœperit, atq; roborari, secandumq; antequam inarescat. Cato fœnum, inquit, ne ferò feces, prius quàm semen maturum sit, secato. Quidam pridie rigant, vbi sunt 40 rigua. Noctibus roscidis secari melius. Quædam partes Italia post messem

secant. Fuit hoc quoque maioris impendii apud priores, Creticis tanrum, transmarinisque cotibus notis, nec nisi oleo falcis aciem excitantibus. Igitur cornu propter oleum ad crus ligato fœnifex incedebat. Italia aquarias cotes dedit, limæ vice imperantes ferro. Sed aquaria protinus viret. Falcium ipsarum duo genera: Italicum breuius, ac vel inter vepres quoque tractabile. Galliarum latifundia maioris compendii, quippe medias cædunt herbas, breuiioresque prætereunt. Italus fœnifex dextera vna manu secat. Iustum est vna opera iugerum in die defecari, alligarique manipulos mille ducentos quaternorum pondo. Sectum verti ad solem, nec nisi siccurn construi oportet. Nisi fuerit hoc obseruatum diligenter, exhalare matutino nebulam quandam, metasque mox sole accendi, & conflagrare certum est. Rursus rigari defecta oportet, vt secetur autumnale fœnum, quod vocant cordum. Interamnæ in Vmbria quater anno secantur, etiam non rigua. Ter verò plerisque in locis, & postea in ipso pabulo non minus emolumentum est, quam à fœno. Varro: Primum de pratis summissis, quum herba crescere desit, & astibus arefcit, subsecari falcibus debet, & quoad perarefcit, furcillis versari, quum peraruit, de ea manipulos fieri, ac vehi ad villam, tum de pratis stipulam rastellis eradi, atque addere fœnifecæ cumulum. Quo facto sicilienda prata, id est, falcibus consecanda, quæ fœnifecæ præterierunt, ac quasi tuberosum reliquerunt campum. A qua sectione arbitror dictum sicilire pratum.

De medica. C A P. V.

PABULORVM genera complura esse scribit Columella, sicut medicam, viciam, sarraginem quoque ordeaceam, & auenam, fœnumgræcum nec minus eruum, & ciceram: nam cætera neque enumerare, ac minus serere dignamur, excepta cytiso. Sed ex iis, quæ placent, eximia est herba medica, quod quum semel seritur, decem annis durat, quod per annum deinde rectè quater, interdum etiam sexies demetitur, quod agrum stercoreat, quod omne emaciatum armentum ex ea pinguescit, quod agrotanti pecori remedium est, quod iugerum eius toto anno tribus equis abunde sufficit. Plinius: Medica vel in primis dicenda. Tantra dos eius est, quum vno satum amplius, quam tricenis annis duret. Vnum de ea, & cytiso volumen fecit Amphilocho confusum. Medicam maximè sequi apes dixit Varro.

Nomen.

Græcis *μῆδικον* dicitur. Plinius: Medica externa etiam Græciæ, vt à Medis aduecta per bella Persarum, quæ Darius intulit. Sic nos etiam à Mediæ regionis hortis aduectum citrium, malum medicum dicimus. Latinis medica. Neapolitanis *sarsara*.

Dioscorides ita describit. Medica quum recenter prodiit, foliis & caule trifolio pratensi similis est, procedens verò folia contrahit, caules edens trifolii, & siliquas coliculorum intortas, in quibus semen lentis magnitudine

dependet.

dependet. Id sicca
ba tota program
folio, caule, foli
hitor. Ex Hispa
amulatur, prol
exprimens, semi
lubet Varro, F
mittas. Plinius. F
Medicam dixi

10 vocabulum indi
Varro. In iug
medicæ selquim
licet quum pabu
ximo vere medic
rota hyeme pur
la. ides omnes eq
terriato, & occat
dum denum, lon
strari possit, ad
20 licito, atque ita m
seminis locum o
feceris ligneis r
tur, nam celerri
bet, atque vt dixi,
rius generis her
facere oportet
voles teneram
ter initia parti
& multum cr
30 paucos deinde
eruncato. Sic
cem. Ab eo Pl
igitur autum
quinis diebus i
alias pruinis ob
semenesque herb
aduritur, terraq
vincitur & del
bus liberanda
40 & quoties de
ter. In semen

dependet. Id ficcum iucundi saporis gratia conditaneo sali admiscetur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt. Ab eo Plinius: Similis est trifolio, caule, foliisque geniculata, quicquid in caule assurgit, in folio contrahitur. Ex Hispaniis aduecta, nobis inquilina facta est. Trifolium pratense æmulatur, prolixioribus caulibus, follicum orbiculatum, voluta figuram exprimens, semina genista.

lubet Varro, ne in terram nimium aridam, aut variam, sed temperatam de-
mittas. Plinius. Poscit ficcum, succisumq;, vel riguum solum.

Medicam diximus nomine suo narales suos fateri, locumque vbi foetificat,

vocabulum inditat: nam à Medis Græciæ, & Italiæ aduenit.

Varro. In iugerum vnum, si est natura temperata terra, scribunt opus esse medicæ sesquimodium, id seritur ita, vt semen iactatur, quemadmodum scilicet quum pabulum, & frumentum seritur. Columella: Locum, in quo proximo vere medicam saturus es, proscindito circa calendas Octobris, & eum tota hyeme putrescere sinito. Deinde calendis Februarii diligenter iterato, & lapides omnes egerito, glebasque offringito. Postea circa Martium mensem terriato, & occato. Quum sic terram subegeris, in morem horti areas latas pedum denum, longas pedum quinquagenum facito, vt per semitas aqua ministrari possit, aditusq; vtraque parte runcantibus pateat, deinde verus sterco iniicito, atq; ita mense vltimo Aprilis serito tantum, quantum vt singuli cyathi seminis locum occupent decem pedum longum, & quinque latum, quod vbi feceris ligneis rastris (id enim multum confert) statim iacta semina obruantur, nam celerrimè sole aduruntur. Post sationem tangi ferro locus non debet, atq; vt dixi, ligneis rastris sarriendus, & identidem runcandus est, ne alterius generis herba inualidam medicam perimat. Tardius messem primam eius facere oportebit, quum iam seminum aliquam partem eiecerit. Posteaquam volens teneram, quum profuerit, desecescit, & iumentis præbeas. Sed inter initia parcius, dum consuecant, ne nouitas pabuli noceat: inflat enim & multum creat sanguinem. Quum secueris autem, sapius eam rigato: paucos deinde post dies, vbi cœperit fruticare omnes alterius generis herbas eruncato. Sic culta, sexies in anno demeti poterit, & permanebit annis decem. Ab eo Plinius: Solum, in quo seratur, elapidatum, purgatumque subigitur automno, mox aratum & occatum, integitur crare iterum, & tertium, quinis diebus interpositis, & fimo addito. Ita præparatū seritur mense Maio, alias pruinis obnoxia. Opus est densitate seminis omnia occupari, internascentesq; herbas excludi: id præstant in iugera modica vicena. Cauendum ne adurit, terraque protinus integri debet. Si sit humidum solum, herbosumve, vincitur & desecit in pratium. Ideo protinus altitudine vnciali, herbis omnibus liberanda est, manu potius quam sarculo. Secatur incipiens florere, & quoties defloruit, id sexies euenit per annos, quum minimum quater. In semen maturescere prohibenda est, quia pabulum vtilius est usque

ad trimatum. Verno feri debet, liberariq; cæteris herbis, ad trimatum maris ad solum radi: ita reliquæ herbæ intereunt sine ipsius damno, propter altitudinem radicum. Si euicerint herbæ, remedium vnicum est aratio, sapius verendo, donec omnes aliæ radices intereant. Dari non ad satietatem debet, ne deplere sanguinem necesse sit. Et viridis utilior est, arefcit sarculosè, ac postremo in puluerem inutilem extenuatur. Palladius eadem, quæ Columella recitat. Virgilius vere ferendam dixit.

Vere fabis satio: tunc te quoque medica putres

Accipiunt sulci.

Theophrastus medicam nimio stercore & vrina perire dixit aliorum relatione.

De cythiso. CAP. VI.

FRUTEX est & cythisus, ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus prædicatus pabulo ouium, aridus verò etiam suum: spondetq; iugero eius annua H. S. MM. vel mediocri solo redditus. Utilitas quæ eruo, sed ocysor satietas, perquam modico pinguescente quadrupede, ita vt iumenta bordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior, super omnia pecorum medicina à morbis omni vfu præstante. Quin & nutricibus in defectu lactis aridum, atq; in aqua decoctum, potum cum vino dari iubet, firmiores celsioresq; infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit madefactum. Apes quoq; nunquam de fore cythisi pabulo contingere, promittunt Democritus, & Aristomachus, nec aliud minoris impendit est. Hæc Plinius, quæ ex Columella exceptit. Cythisum in agro esse quamplurimum maximè refert, quod gallinis, apibus, capris, bubus quoq; & omni generi pecudum utilissimus est, quod ex eo citò pinguescit, & lactis plurimū præbet ouibus, tum etiam quod octo mensibus viridi eo pabulo vti, & postea arido possit. Mulieres quidem si lactis inopia premuntur, cythisum aridum in aquā macerari oportet, & quum tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico vino, atque ita potandum dari, sic & ipsæ valebunt, & pueri abundantia lactis confirmabuntur. Varro è cythiso bonum fieri mel dixit. Et si à Theocriti & Virgilio versibus sit maximè celebratus, hodie ferè apud nos abolitus est vus.

Nomen.

Græcis *κύθισος* dicitur. Plinius è loco nomē desumpsisse indicat, dum inquit, Inuentus hæc frutex in Cythno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas. Ego potius Cynthiæ insula, quæ vna è Cycladibus est, nomen ferre dixerim. Qui *κύθισος* in Poëtis legunt, secundum scenum dicunt, quod veneri multum hominis ministrat. Latinis cythisus.

Theophrastus hebenum cythisi modo fruticosam dicit. Molestus est iuxta nascens, alimentum rapina, nam omnia ferè necat, sed eo valentior halimus est, hic enim vel cythisum ipsum interimit. Dioscorides: Frutex cythisus est albus.

albus in torum
folia scenugra
trita erucam ole
terque si quis ex
mulosa ei folia
eam altitudinē
tice candido, fol
tur, odorem eru
re in cacumini

bus paruis, vi i
Columella i
Plinius in in
dinum, aut ouis
lia. Apud nos fr
mis collibus.

Varro rectius
indiget succo:
comprehendere

Cythisus ferit
tur, & in selsqui
tantur, & ita pa
si, vel autumnu
subegeris, areo
tas inde vere dif
dissent. Si sem
coratam terrar
proximis dieb
triennium de
saris commode

substinet. Plin
autumno ante
gitur. Planæ c
rofrutice. Per
definit, vel puer

cepe feri, fertile
Omnem in
Cythiso nigra
cedere viderur
re ebenum vide
40 præ nullam gra
medullam inue

albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia scœnogræci, aut loti trifolia minora, dorso medio prominente, ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer sapiunt. Plinius: Canus aspectu, breuiterque si quis exprimere similitudinem velit, angustioris trifolij frutex. Ramulosa ei folia. Necat alimentum rapina. Galenus, Fruticosa planta cytisus est, eam altitudinē attingens, ad quam myrtus crescit. Apud nos virer cytisus frutice candido, foliis singulis pediculis ternis, & ramulosis, quæ si digitis terantur, odorem eruce proximum habent, gustatūq; cicer recens representat, flore in cacuminibus saturatē luteo, pulcherrimoque. Siliquis contortis, seminibus paruis, vix ineunte æstate maturefcentibus.

Columella in apibus vtriusque cytisi meminit; satiuæ, & suæ spontis.

Genus.

Plinius in insula Cythno nasci dixit: non æstuum, non frigorū, non grandinum, aut niuis iniuriam expauescit. Vnde maximè miratur rarum esse in Italia. Apud nos frequens obuia, in Neside insula, Puteolis, Paufilipo, maritimis collibus.

Colum.

Varro rectius in tenui terra feri cytisum dicit, propterea quod non multo indiget succo. Columella in quolibet agro, quamuis macerrimo celeriter comprehendere.

Solum.

Cytisus feritur in terra bene subacta tanquam semen brassicæ, inde differtur, & in sesquipedem ponitur. Aut etiam de cytiso duriore virgulæ deplantantur, & ita panguntur in ferendo. Varro. At Columella: Satio autem cytisi, vel autumnō circa idus Octobris, vel vere fieri potest. Quum terram benè subegeris, areolas facito, ibiq; velut ocymisemen cytisi autumnō serito, plantas inde vere disposito, ita ut inter se quoquoersus quatuor pedum spatia distent. Si semen non habueris, cacumina cytisorum vere disposito, & stercoreatam terram circumaggerato. Si pluvia non inceserit, rigato quindecim proximis diebus, simul atque nouam frondem agere cœperit, sarrito, & post triennium deinde cadito, & pecori præbeto. Potest etiam ante Septembrem satis commodè ramis cytisus feri, quoniam facile comprehendit, & iniuriam sustinet. Plinius: Seritur cum hordeo, aut vere, semine ut porrum, vel caule autumnō ante brumam. Si semine, madidum, & si desint imbres, satum spargitur. Plantæ cubitales feruntur scrobe pedali. Seritur post æquinoctia tenebro frutice. Perficitur triennio: demeritur verno æquinoctio, quum florere desinit, vel pueri vel anus vilissima opera. Obiterque inter ordines allium, & cepe feri, fertile est.

Cultus.

Omni iniuriam sine noxa patitur.

Materies.

Cytiso nigra materies ex Theophrasto: & spissa, & proximè ad ebenum accedere videtur. Ab eo Plinius: Nigricans color cytiso, quæ proximè accedere ebenum videtur. Alibi autem: Adicit Hyginus, ne hostium quidem, propter nullam gratiam igni, iniuriam expauescit. Sed nos quum nigram cytisi medullam inuenire quæreremus, frustrabamur voto, attamen inueteratis,

caudicemque crassissimum habentibus mediam partem nigram reperimus, in adolescente vero nequaquam.

Pabulum. Equo abunde est viridis pondo, xv bubus pondo vicena, ceterisque pecoribus pro portione virium. Aridum si dabis, parcius præbero, quoniam vires maiores habet. Prius aqua macerato, & exemptum paleis permisceto Cythisum quum aridum facere voles, circa mensem Septembrem, ubi semen eius grandescere incipiet, caedito, paucisque horis, dum flaccescat, in sole habeto, deinde in umbra siccato, & ita condito. Plinius. Datur animalibus post biduum semper. Hyeme verò quod inaruit, madidum. Sariant equos denæ libræ, & portione minora animalia.

De trifolio pratensi, CAP. VII.

OPTIMAM esse in prato trifolij herbam dicit Plinius, omnesque ab eiusmodi præstantia pratense trifolium vocant. Idemque trifolium inhorrescere, & folia contra tempestatem subrigere, quod in omni trifolio observauimus.

Nomen. Græcè τριφύλλον, Latine trifolium. Neapolitani *prato*.

Genus. Trifariam distinctum à floribus colore, quippe purpureum, est flore purpureo, album, albicante, & maioribus foliis alterum. Sunt & guttatis, & falcatis superficie foliorum maculis.

Caulem rotundum erigit, cubitalem, ramos exiles, folia per intervalla tria, florem in summo, radicem longam, & lignosam habet. Plinius: vtilissimum simul & herbarum arare, deinde gratire, serere florem ex scænilibus, atque ex præsepibus scæno dilapsam spargere, priusquam gratiantur. Nec primo anno rigari, & cætera.

De vicia. CAP. VIII.

EPABULORUM genere vicia est, auctore Columella, atque agrum stercoerat, in quo seratur, nec ipsis agricolis operosa. Sed oportet ubi viridem viciam defeceris, aratrum subsequatur, & quod falx reliquerit prius, quam inarescat, vomis rescindat, atque obruat. Id enim cedit pro stercore: nam si radices eius defecto pabulo relictæ inaruerint, succum omnem solo auferent, vimque terræ absument.

Nomen. Græci βίκιον dicunt, quod semen fortasse lagenulæ effigiem referat, Latini viciam, ut Varroni placet, à vinciendo, quod item capre olos habeat, ut vitis, quibus sursum uersum serpit, ad scapum lupini, aliū mve calamum, ad quem ut hæreat, eum solet vincire. Itali *vecchia*.

Descriptio. Cubitali assurgit altitudine, foliis aphaces, angustioribus tantum, flore pisi, nigricantibus in siliquis seminibus, vel fuscis, quorum figura lenticularis. Iunio mense floribus, & seminibus prægnans est, humi funditur, & repit. Galenus viciæ semini figuram assignauit non orbicularem, sed lenti similem, & fabarum modo longiusculam.

Plinius 40

Plinius siccit.
umbrosa. Caton.

Vicia dua fa-
tumale serimur
dios mense lanu-
satio potest cru-
amat rores, quæ
gendum est, quæ
plius proici debet

10 sit, quantulo-
uandum erit ne

10 satis fore limace

sationis tempor

tunc optime ser

lanuario est: no

farritur, non ste

matura est, pale

si in arbusculo ser

tes eam. Vicia

20 Serere in iuger

decimam parte

serendam, ita c

seminis autem

Si v

Ha

30 Sura Manilius

tantundem &

uenagrace, cu

causa feri foliu

duos dicunt. H

quod valet cito

cymum quod

segete viride se

40 V

Arro, E

sa viridia,

Plinius siccitatem ex omnibus, quæ feruntur, maximè amare, nec aspernari *Columella*.
 umbrosa. Cato quam minimè herbosis locis feri iubet.

Viciæ duæ sationes sunt. Prima quam pabuli causa circa æquinoctium au- *Satio.*
 tumnale serimus, septem modios eius in vñ iugerum. Secunda qua sex mo-
 dios mense Ianuario, vel etiam serius iacimus semini prognerando. Vtraque
 satio potest cruda terra fieri, sed melius proficissa, idque genus præcipuè non
 amat rores, quum feritur. Itaque post secundam diei horam, vel tertiam spar-
 gendum est, quum iam omnis humor sole, ventove, deterfus est, neque am-
 plius proici debet, quàm quod eodem die possit operiri: nam si nox inces-
 sit, quantulocunque humore, priusquam obruatur, corrumpitur. Obser-
 uandum erit ne ante quintam, & vigesimam lunam terræ mandetur. Aliter
 satis ferè limacem nocere comperimus. Hæc Columella. Sed Plinius tria eius
 sationis tempora dicit, Circa occasum Arcturi, vt Decembri mense pascat,
 tunc optimè feritur in semen. Equè nanq; fert depasta. Secunda satio mense
 Ianuario est: nouissima Martio, tum ad frondē vtilissima. Vno sulco sata, non
 farritur, non stercoratur, nec aliud quàm deoccuratur. Ex semine eius, si lecta
 matura est, palea cæteris præfertur. Vitibus præripit succum, languescuntq;
 si in arbusculo feratur. Limaces nascuntur in viciæ, mirum in modum eroden-
 tes eam. Viciam non proficisso serere sine damno, compendium operæ est.
 20 Serere in iugero temperati soli iustum est tritici modios quinque, viciæ duo-
 decimam partem amplius quàm tritici. Viciam à x x v, ad x x x lunæ diebus
 ferendam, ita demum sine limacibus fore. Quidam pabuli causa sic feri iubent,
 feminis autem vere. Virgilius viciæ tempus sationis docet.

*Si verò viciamq; seres, vilemq; faselum,
 Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes.*

De ocymo. CAP. IX.

DIXIMVS simplicia pabulorum genera, nunc mista prosequemur. Erat
 apud antiquos pabuli genus, quod Cato pabulum vocauit, eoque siste-
 bant aluum bobus: id erat è pabulis, segete viridi defecta, antequam gelaret.
 30 Sura Manilius id aliter interpretatur, & tradit fabæ modios decem, viciæ duos,
 tantundem & eruiiæ in iugero autumno misceri & feri solitos. Melius & a-
 uenagræca, cui non cadit semen, admista. Hoc vocitatum ocymum, boumq;
 causa feri solitum. Varro appellatum à celeritate proueniendi, à Græco, quod
ὀκνῶς, dicunt. Hæc Plinius. Sed Varro. Ocymum dictum à Græco verbo *ὀκνῶς*,
 quod valet cito. Similiter quoque ocymum in horto. Hoc amplius dictum o-
 cymum quod citat aluum bubus, & ideo iis datur, vt purgentur, id ex pabuli
 segete viride sectum, antequam gerat siliquas.

De farragine. CAP. X.

VARRO, Ex segete, vbi satum admista ordeū & viciæ, & legumina pabuli cau-
 40 sa viridia, quod, far, & ferro cæsa, farrago dicta, aut quod primū in farra-

cia segete feri cœpta. Ea equi, & iumenta cætera verno tempore purgantur, & saginantur. Columella: Farraginem in restibili stercoreatissimo loco, & altero sulco ferere conuenit. Ea fit optima cum cantherini ordeï x modis iugurum, obseritur circa æquinoctium autumnale, sed impendentibus pluuiis, vt consita rigataque imbris celeriter prodeat, & confirmetur ante hyemis violentiam: nam frigoribus, quum alia pabula defecerint, ea bubus cæterisq; pecudibus, optimè defecta præbetur. Et si depascere sapius voles, vsque in mensem Maiū sufficit, quod si etiam semen voles ex ea percipere, à Cal. Martiis pecora depellenda & ab omni noxa defendenda est, vt sit idonea frugibus. Plinius. Farrago ex recrementis farris prædensa feritur, admista aliquando & vicia. Eadem in Africa fit ex ordeo. Omnia hac pabularia: degeneratq; è leguminibus, quæ vocatur cracca: in tantum columbis grata, vt pastas ea negent fugitiuas illius loci fieri. Palladius: Farrago etiam loco restibili stercoreato feritur. Ordeï cantherini in iugero x spargimus circa æquinoctium: & cætera quæ Columella.

F I N I S.

INDEX

VILLÆ
QVI V
STVS E

Bd om
ruri
abies, a
fera

74, 22 vti de scri

74, 28 quot spec

bus gaudeat locis

lior 77, 30 eius sa

ries 78, 12 abies

pua 79, 4 abies a

15 abietis resina

ablaquentio fossionis

fit 127, 23 abla

saria

Abrotonon, femi

Abrotonum quam

vnde denominet

nerum 621, 6

621, 8

Absyrus Medea

Academia Athen

Acadesis, qui Aty

acer, siue aceris, ar

rum elegantia c

acetaria hiemalia c

be

acetum cōficiendi

quid 572, 38, 4

beat 573, 9 ad

acetum duplica

commentitium

acharnica rigua

Acheron inferor

Achillis hasta fra

INDEX PERSPICVVS

VILLAE LIBRORVM XII:

QVI VT PROBA SERIE DIGE-

STVS EST, ITA ET MAXIME GENERA NO-

tatu digniora complectitur.



BDOMINVS, stirpis regia,

ruri agit pag. 12, ver. 31

abies, arbor conifera resini-

ferag. 74, 20 unde dicta

74, 22 uti describatur a Theophrasto

74, 28 quot specierum sit 76, 35 qui-

bus gaudeat locis 77, 12 quae alia me-

lior 77, 30 eius satio 78, 4 eius mate-

ries 78, 12 abies admirationis praci-

puae 79, 4 abies ab Hercule euulsa 80,

15 abietis resina 80, 19

ablaqueatio fossionis species 227, 22 quid

sit 227, 23 ablaqueatio olineto neces-

saria 465, 29

Abrotonos, femina 620, 32

abrotonum quam vim habeat 620, 17

unde denominetur 620, 21 quot ge-

nerum 621, 6 quale solum appetat

621, 8

Abfyrus Medea 447, 5

Academia Athen. situs 9, 31

Accestis, qui Atyn adamat 87, 11

acer, siue aceris, arbor 127, 15 acer ope-

rum elegantia cedro secunda 128, 9

acetaria hiemalia 659, 40 acetaria her-

ba 653, 37. 654, 1

acetum cōficiendi modi 572, 32 acetum

quid 572, 38 acetum an aquam ha-

beat 573, 9 acetum dulce 573, 10

acetum duplicatum 573, 15 acetum

commentitium ex non vino 573, 21

acharnica rigua 636, 16

Acheron inferorum fluius 134, 23

Achillis hasta fraxinea 123, 39

Achilles corona oleaginea donatum

440, 28

Achillis sepulcrum 609, 23. 614, 33

Acilius Sthenelus 5, 36

acropolis quid 114, 11

acus moscata 679, 7

Adamo protoplasta terrae cultura a Deo

mandata 2, 7

Adamus in deliciarum horto positus 6, 16

Adami pomum 270, 8

adolefcentia negligente quem reddit 21, 27

Adonis Veneri dilectus 584, 37 & 41 a

Marte casus 585, 1 Myrrha filius

654, 37 a Veneri lugetur 737, 15

Adonidis cruor in anemones flore mu-

tatus 612, 14 Adonidis fabula quid

denotet 612, 31 Adonidis hortuli ut

pangebantur 621, 19

Adorea dea qua 845, 6

adoreum quid 844, 35

ador & adoreum 845, 3

adificiorum rusticorum situs 45, 19

agilops 160, 14 & eius figuratio 160,

15

agilops descriptio 856, 37

agis quid 95, 38 agis mellei coloris 100,

28

Aegypti lanificium 4, 25

Aegypti nauigatio 14, 13

Aegypti coelum, caliginosum & rosci-

dum 582, 38. 587, 39

Aegyptiorum mos in designando sano

homine 614, 39

Aegyptus qualis terra 752, 28

XXX

IN VILLAM

Ægyptij sacerdotes capis abstinere
 787, 39
Ælij Spartiani hortus 12, 4
anigmata & gryphi, Latinis scirpi & qua-
stiones lusoria 680, 24
agui nocturni autumnale 821, 10. 846, 14
Æsculapij caput lauro redimiti 114, 2
astus adurii oliuas 474, 29
Æthiopes, Rhi & opbagi dicti 2, 34
Æthiopia lanifera arbores 4, 21
in Æthiopia melones nobilissimi 758,
Ætolus Oeneis filius 494, 15 (15
Ætolus pastor, Staphylinus nomine
 494, 20
Africa Massyli 3, 27
Africanus oleas seuit 448, 17
Agamemnonis manu platani consue 12,
 38. 135, 26. 132, 7
agarcu in glandiferis nascens arboribus
 158, 13
ager arbutis idoneus quis 540, 16 *ager*
bonæ frugis frigora quoque desiderat
 808, 31
agri subactio duplicis generis 811, 25
agrum bene colere quid 812, 12. 817, 8
agricola felices 8, 2 *agricola boni viri*
 14, 24
agricolarum dua meta; utilitas, & vo-
luptas 15, 23
agricola qui liberi, qui serui 21, 14
agricultura generi humano pernecessaria
 1, 25 *ceterisq; animalibus* 2, 2 *agri-*
cultura praeferitur mercatura 5, 5 &
foenerationi 5, 6 *agricultura a regi-*
bis exculita 12, 13 *agricultura, ars*
generosa 14, 36 *ars ingenua* 14, 39
agricultura etiam monachis inter ho-
nestas artes 15, 8 *agricultura quid* 15,
 18. 16, 8 *agricultura sub Nili simu-*
lacro 16, 37
agricultura laudes & necessitas 1, 7

utilitas 1, 15. 5, 1 *voluptas dignitate*
commista 1, 16. 6, 8. *agricultura di-*
gnitas 10, 5 *antiquitas* 10, 7 *agricul-*
tura inuentores 16, 23 *agricultura*
principia; terra, aqua, anima sol 17, 31
agriolea, & agrippus 449, 24
agrioraphanos alius araphano agria 776,
 12
Agrippina coniugi venenū offert 766, 8
Ajax a Graecis oleaginea corona donatus
 440, 28
Aiacis error in hyacinthum conuer-
sus 606, 8
Ajax, regia stirpe satus 607, 20
alaternus, arbor perpetua fronde 108, 2
uti depingatur 108, 7
Alcibiades Atheniensium dux 13, 10
Alexander Magnus persea arbore orna-
tus 10, 33 *agriculturam docet*, 12, 35
Alexander ex India hedera coronatus
abit 638, 20 & 27 *Alexandri statua*
apud Coos 591, 10
Alexandro Severo victoriam laurus
prae monstrat 115, 24 *laurus mortem*
prae nunciat 115, 35
Alexandrini supplices à Romanis pacem
rogant 441, 20
alica sit ex Zea 848, 18 *trium generum*
 848, 21
alliporum 802, 22
allij historia 798, 3 *allij satio* 799, 11
culius 800, 12 *allij condimentū* 800,
 28 *allium cypriū, siue vspicū* 800, 35
allium punicum 800, 41 *allium Æ-*
gyptium 801, 28 *allium anguinum*
 801, 36 *allium vrsinum* 802, 4
Allobij, inter Sarmatas 4, 15
Allobiorum vestes 4, 15
almus, sylvestris arbor 142, 5 *eiusq; hi-*
storia 142, 11
Alphens amnis oleastris frequens 442, 2
 altera-

alterationis causa;
 tempus
 alucaria optimi
 alui deiectione brassica
 alvus lapathio ex
 alu herba in tector
 amamelis
 amaraci umbra 61
 latioris 626, 32
 ei non eadem rat
 racis descriptio 6
 617, 19 satio
 Amaracius Cynara
 sampsecum ver
 amarantibus aut lu
 609, 11 vnde de
 ranthus purpure
 amarantibus pur
 delineatio 615
 cultus
 amarum quidqu
 749, 9
 amassi quomodo v
 scerent
 ambigua, herbain
 aminea vitis
 Aminei populi
 ampeloproston 79
 scriptio
 Amphiarum fab
 21
 amuletū horti, a
 amurca commen
 Amyclensium ag
 Amycus Bebyon
 tumulus laur
 decerpitum qu
 gia suscitiat
 amygdali tracta
 forma
 amygdalorum

I N D E X.

- aptas dignitate
 agricultura di-
 10, 7 agricul-
 3 agricultura
 nima sol 17, 31
 449, 24
 bano agria 776,
 offert 766, 8
 orona donatus
 anthum conuer-
 606, 8
 607, 20
 a fronde 108, 2
 108, 7
 dux 13, 10
 ea arbore orna-
 am docet, 12, 35
 edera coronatus
 alexandri statua
 591, 10
 floriam laurus
 laurus mortem
 115, 35
 romani pacem
 441, 20
 tritium generum
 802, 22
 i satio 799, 11
 ndimentu 800,
 ulpicu 800, 35
 1 allium A-
 am anguinum
 802, 4
 4, 15
 4, 15
 5 eius 3, hi-
 142, 11
 equens 442, 7
 altera
- alienationis causa; celum, alimentum,
 tempus 837, 10
 alucaria optima ex subere 151, 28
 alui deiectio brassica innatur 716, 10
 aluus lapathio exinanitur 744, 14
 alu. herbatinctorum 902, 4
 amamelis 167, 3
 amaraci umbra 626, 19 amaraci appel-
 lationes 626, 32 amaraci & sampsu-
 ci non eadem ratio 626, 37 ama-
 raci descriptio 627, 8 amaraci celu
 627, 19 satio 627, 25
 Amaracus Cynara regis Cypri filius, in
 sampsicum versus 626, 25. 627, 21
 amaranthus aut luteus, aut purpureus
 609, 11 unde dictus 609, 27 ama-
 ranthus purpureus 614, 29
 amaranthi purpurei nomina 615, 3
 delineatio 615, 11 species 615, 16
 cultus ibid. 21
 amarum quidque ex siccitate redditur
 749, 9
 amasi quomodo ut redamareretur cogno-
 scerent 757, 2
 ambugia, herba intubacea 662, 11
 aminea vites 499, 29
 Aminei populi 500, 34
 ampeloprasen 795, 11 ampeloprafi de-
 scriptio 797, 31
 Amphiarau fabis primus interdixit 875,
 21
 amuletū horti, asini caluaria est 642, 24
 amurca commentatio 486, 19
 Amyclensium ager deuastatus 502, 31
 Amycus Bebycum rex 117, 11 cuius
 tumulus lauro tegitur 117, 12 equa
 decerptum quid nauibuz illatū iur-
 gia suscitāt 117, 13
 amygdali tractatio 420, 15 amygdali
 forma 421, 30
 amygdalorum differentia 422, 31 sa-
 tiones 424, 3 cultus ratio 426, 12 &
 21 amygdalorum morbi & remedia
 427, 26 amygdalarum conditura
 428, 20
 anacacabea arbor 168, 35
 anacacabos loti fructus 168, 35
 anchusa nomen unde descendat 13, 10
 Androcides sapientia clarus 562, 12
 anemones flos 612, 13 ex Adonidis cruo-
 renatus 612, 14 ex Veneris lacrimis
 satus 612, 25 anemones flore Egy-
 ptij quando pingant 612, 33
 anemone unde dicatur 612, 40 qui-
 bus nominibus indigitetur 613, 2 quot
 generum sit 613, 11 ubi proueniat 613,
 38
 anesum, & anethum 693, 4
 anethum unde nuncupetur 691, 40 a-
 nethi descriptio 692, 3 satio ibid. 20
 anguria cucumis species 757, 31 angu-
 ria quadam vastæ magnitudinis 758,
 4 angurie satio 758, 6
 anguilla quando sine aquis duret 30, 1
 anicetum 693, 1
 anima hominis imperans 21, 9
 anima mortuorum in fabis includun-
 tur 875, 28. 876, 9
 animalia post plantas nata 2, 3 & 5 ani-
 malia venenosa 556, 7
 animantium mutatio 836, 15
 animum menta recreat 705, 7 item &
 nepita ibid.
 anisi vsus 692, 30 satio 693, 16
 anni non semper eadem facies 18, 36
 annus non tellus fructificat 254, 7
 anthedonis descriptio 386, 21
 antidoton contra omnia venena 628, 20
 & 32
 antischoridon 798, 49
 Antoninus Pius 12, 40 tiliaceis tabu-
 lis fasciatus 127, 10
 XXX 2

IN VILLAM

anularis insitionis modus	211, 20	aquifolia ilex coccifera	149, 30
apes hyacinto gaudent	605, 20	Aquila ortus	254, 27
lo pabulantur	621, 36	Aquila, Vestinorum vrbs	604, 25
rumicem refu- giunt	744, 10	Aquilo non omnibus utilis	255, 41
apum ducis officium	25, 4	aquus, olim pro acus	107, 15
apibus thymi flores gratissimi	623, 25	Arabes arbores pro tuguriis habent	3, 31
apibus gratissima saturcia	695, 18	Arabum vestes	4, 14
apibus gratum origanon	698, 23	Arabes annua thuris vectigalia pen- dunt	6, 1
bus duplex ministeriū prabet papaner	737, 12	Arachosij populi vnde agriculturā didi- cerint	12, 36
aphaca Theophrasti	663, 23	Aracis fluij accolae plantarum fructus ad cibum reponere	2, 21
aphaca segetalis historia	887, 15	aracus, lentis vitium	884, 33
aplorodes 739, 5 aphron 739, 10 vitru- que vñ idemq. papaneris genus ibid.	633, 10 & 16	arare, & bene arare	465, 10
apiastrum	633, 10 & 16	aratia 811, 24 iuxta terre qualitates ex- ercenda 811, 32 aratio prima, qua an- te sationem 811, 26 secunda 811, 40 tertia 812, 1 aratio quarta, qua se- mentis tempore	812, 1
apij historia	682, 23	arationū vocabula declarata	812, 14
apium palustre 685, 39 apiū capita- tum	686, 14	arationis ratio exaltior per Columel- lam 813, 11 arationis inuentor	814, 27
Apollini ludī à Theſeo instituti 11, 5 A- pollini laurus dicata	13, 28	arationis regule	815, 25
Apollo myriceus vnde cognominatus	121, 5	arattrum remoratur ulmus	539, 39
quare imberbis fingatur 605, 25		aratri inuentores	814, 31
apomelis, pyri genus	167, 3	arattrum ex qua materia fiat	815, 11
Appulus pastor nymphas irridet	449, 6	arbor quid 65, 18 arbor paradisi 170, 34	
in oleastrum conuertitur	ibid.	arbor arbori vt copuletur 219, 16 ar- bor sterilis vt fructum ferat 253, 1	
Aprilis Veneri sacer	389, 10	arbor vt copiosorem fructum reddat	253, 8
apris medicina hedera	635, 37	ne flores aut folia abiciat 253, 9	
Apulia plurimum thymi profert	624, 21	ne fructū amittat 253, 12 arbor vt	
Apulia campi fertilissimi	809, 20	a vitis & vermib. vindicetur 253, 24	
aqua ville que eligenda	37, 37	arboris cultura perpetua	542, 32
aquam inuestigandi ars	37, 12	arbori vt maritentur vites	543, 5
aquarum fugiendarū signa 42, 18 a- quarum vitia vt emendentur	43, 15	arbores terra antiquiores Sardis 2, 8	
aqua vino immista deprehenditur	570, 1 & seq.	arbores & cibos & habitacula prabet	3, 15
aquosum omne in fundo sedit	566, 25	ite & vestes 4, 10 arbores lani- fera 4, 17 arbores cadue aut resinifera	62, 12
aquifolia arboris nomē 107, 10 delinea- tio 107, 17 insitio ibid. 27 materies	107, 29	aut nō resinifera	62, 12
aquifolia	148, 35		

ferae aut virentes at
147, 28 arbores
164, 35 arbores
539, 1 & 11
arborum herbaru
malia vefcuntur
39 arborum vfu
arborum vectigalia pen-
dunt
rum fluestrum
mori, physiognon
borum peculiares
borum corruptione
arborum pomifer
28 arborum plant
arbutina arboris for
arbutina vitis vid
arbutum veterū 537
moda 538, 1 & d.
arbano conuenit
quid 538, 29 ar
commoda 540, 16
commendabile; j
nemum 546, 4
546, 31 arbutu
arbuti, arboris flue
16
arbutus & vned
arbutus, arbor: a
38
arbuti descriptio
teris 168, 14 ar
dimentum
Arcades Balanopha
32 Arcades prin
152, 24 ante lu
25, & 3, 37
Arcadia satyreia
ferre
Archelaus
arena humida mustū
argilla alba multum

I N D E X.

149, 36
254, 27
604, 25
255, 41
107, 15
is habent 3, 31
4, 14
vectigalia pen-
6, 1
griculturā didi-
12, 36
ntarum fructus
2, 21
884, 33
465, 10
qualitates ex-
prima, qua an-
cunda 811, 40
quarta, que se-
812, 1
clarata 812, 14
per Columel-
inuentor 814,
815, 25
539, 39
814, 31
riafiat 815, 11
aradis 170, 34
tur 219, 16 ar-
perferat 253, 1
fructum reddat
lia abiciat 253,
53, 12 arbor ut
licetur 253, 24
ua 542, 32
ies 543, 5
res Sardis 2, 8
titacula præbe-
arbores lani-
arbores pomi-
fera:

feræ aut virentes aut frondē remitteñtes
147, 28 arbores pomifera sylvestres
164, 35 arbores arbutina quæ sint
539, 1 & 11
arborum herbarumq; fructibus ani-
malia vescuntur & victitant, 2, 1 &
39 arborum usus ex Cicerone 4, 34
arborum vectigalia 5, 41, 6, 1 arbo-
rum sylvestrium genitura, natura,
morbi, physiognomoniam 65, 37 ar-
borum peculiare morbi 238, 37 ar-
borum corruptiones violenta 245, 35
arborum pomiferarum remedia 252,
28 arborum plantandarū ratio 541, 1
arbutinae arboris formatio 542, 1
arbutina vitis vide vitis arbutina
arbutum veterū 537, 21 arbuti com-
moda 538, 1 & d. arbutū fundo sub-
arbano conuenit 538, 14 arbutum
quid 538, 29 arbutum quæ terra ac-
commoda 540, 16 arbutum densum
commendabile; senio confectum, in-
uenustum 546, 4 arbutū Gallicum
546, 31 arbutum Italicum 547, 3
arbuti, arboris sylvestris tractatio 166,
16
arbutus & vnedo diuerse 166, 26
arbutus, arbor: arbutum, fructus 166
38
arbuti descriptio 167, 10 arbuti ma-
teries 168, 14 arbuti pomorum con-
dimentum 168, 17
Arcades Balanophagi vocati 2, 36, 152
32 Arcades primi ex terra homines
152, 24 ante lunam & astra ibid.
25, & 3, 37
Arcadia satureciam & origanum non
fert 624, 9
Archelaus 13, 3
arena humida mustū conseruat 569, 13
argilla alba multum vaporis flatusq; con-

tinet 454, 17
argilla sterilis 817, 3 alius admixta
fertilitatem inuat ibid.
Argippai sub arboribus incubant 3, 25
Argiuorum cibus 2, 28
Argus olea Io alligat 448, 17
Aricina vallis 719, 33
arietum cornua confusa asparagum pa-
riunt 731, 23
Arimphaeorum alimentum 2, 31
Arimphai Asia populi in nemoribus
degunt 3, 27
arinca Homeri 848, 30
Aristeus Apollinis filius 13, 19, 440, 5
deus 13, 20 olea inuentor 440, 6
armoracia historia 776, 1
Artaxerxes Sidonem obsidet 441, 15
Artemisia regina 13, 12
artemisia nomen unde 13, 13
artes omnes agricultura famulantur 1, 18
ars humana vrbes adificat 10, 14
artis & natura discrepantia 249, 12
artes lucubrationibus perdiscuntur
438, 23
arti natura succedit 555, 19
articulatio vitium morbus 557, 14 tri-
bus de causis accidit 557, 27
arui stercoratio 816, 32
Arula apud Campanos 541, 34
ari tractatus 785, 32 arui cibo idoneus
785, 34 ari descriptio 786, 18 arui
arte ut pertractetur 787, 1
arundo saccharifera 902, 14
ascalonia capæ 792, 16
Asia Arimphai 3, 27
asia, frumenti genus 844, 13
asini claua, lili probrum 590, 33 asini
caluaria alexicaco horiorum 642, 24
asinus Priapo latibilis victima 642,
14 Libero patri assignatur 680, 27
asinus cur Baccho assignatus 746, 11

I N V I O L I A M

asparagus Gallica satina 672, 15
asparagi percunctatio 727, 12 *aspara-*
ragi condiendi ratio 727, 23 *aspara-*
gi genera 728, 19 *eorumq; descriptio*
728, 27 *locus & satio* 729, 1 & 13
qua arte asparagi producatur 731, 23
asphaltion 628, 18 & 19 *quare ita no-*
minatum 628, 22
Assyria stella 564, 19
Astomi, India gens, solo odore viuunt 2,
24
Astomorum vestimenta 4, 13
astrion, inter intubacea 675, 17
astrologia non inutilis rusticis 254, 1
atavulus Apulia ventus 475, 9
Athene unde nomen traxerint 438, 32.
439, 2, 22
Athenis in arcem vix capra admissa
475, 29
Athenienses oleam primi coluere 439,
41 *magno in honore habuerunt ole-*
am 440, 17. 442, 11
Atheniensium alimenta 2, 28 *Athe-*
nienium ludi 11, 15 *Atheniensium*
terra à Neptuno innudata 439, 32 *A-*
theniensium celebritas eiprotabon dicta
442, 27
athleta oleo se perungunt 444, 14
atimia, ulmi genus 138, 25. 139, 4
Atlantis horti 257, 27
Atlas mons 4, 28. 257, 23
Atlas nouus in agricultura 1, 24
atrplexum veteribus, quod modo atri-
plex 740, 6
atriplex in cibum uti veniat 739, 34
atriplex nomen 739, 41 *atriplex*
genera 740, 8 *delineatio* 740, 12
satio ibid, 32
Attali regis horti 9, 33
Attalus Asia rex 13, 3
Atticus ager 439, 3 & 38

Attico in solo fructus præter thymum
omnes dulces 623, 39
Arys fabula 86, 30. 87, 3, 8
aucupii voluptas 7, 35
auellane descriptio 428, 34
auena, ordeis vitium 85, 6, 29 *eiusq; histo-*
ria ibid.
aues ne vnas attingant 562, 2 *aues ut*
castigentur 801, 40 *quo medio ab*
frumentis prohibeantur 826, 19
animum modulatio, non minima dele-
ctatio 7, 27
Augustus lactuca conseruatus 654, 13
aurea mala 267, 29
aurelia quid 609, 35
aurum habere præclarum non est, sed iis
qui aurum habent imperare 12, 22
auri apyri vnguentum 609, 22. 610, 8
Auster omnibus infestus 256, 1. *præcipue*
florentibus arboribus ibid.
austrini flatu frumētis damnosus 808,
32
autumnus & ver sese imitantur 464, 40
autumnus calorem retinet ex pristinis
solibus 464, 41
autumnalis aëris qualitas non diffimi-
lis verne 547, 39
axes querni cum asculeis non miscendi
155, 37
azadarat arbor 170, 29 *azadarat qui*
seratur 170, 41

B

B *Abylonico agro lasme vulgaris* 598,
25
bacca olearum ne abiiciantur 473, 28
baccharis, fascini depulsoria 631, 21
somni conciliatrix 631, 24 *baccha-*
ris etiam mæxæ cur vocata 631, 32
baccharis uti describatur 631, 37 *quo*
solo proveniat 632, 5
Bacchus cur inter deos numeretur 13, 23
aquam

aquam vino primu
Bacchus semper iu
ni reperit 494
in Graciam vitem
Baccho prior Noe
28 *Bacchus Linn*
31 *Bacchus infan*
2 & *cornutus depi*
capitulum 680, 30
ferula, bedera, picu
cur sacra bedera vi
cho hircus immol
lax dicitur 618, 2
tus 746, 11 *Baccho*
12 *Baccho cur co*
29
Bacini ilicis similes
Balanophagorum non
Balsami triduum
Barolum Apulia
Basan quercus
basilicon, herba
batis seu crithmos
batuere, idem quod ca
beatior vna mystica
bellii inter coronario
20 *species ibid.*
solum 610, 40
Benevolentia obsequi
Berecynthius, Phrygi
20 *abundat*
Berot annus
bestiole horto minascer
beta commentatio 72
tura 724, 23 *be*
& *delineatio* 725
7 *beta radix alla*
798, 6
betici, molles Cynico
betizare, pro langua
724, 39

I N D E X.

prater thymum
62, 39
86, 30. 87, 3. 8
7, 35
428, 34
6, 29 eiusq. histo-
ibid.
562, 2 anu vi
quo medio ab
826, 19
non minima dele-
7, 27
ruatus 64, 13
267, 29
609, 35
m non est, sed in
imperare 12, 22
m 609, 22. 610, 8
256, 1. praeipue
ibid.
etis damnos 808,
antantur 464, 40
etinet ex pristinis
464, 41
alitas non diffimi-
547, 39
leis non miscendi
29 a cadat qui
170, 41
sue vulgaris 598,
antantur 473, 28
ulforia 631, 21
631, 24 baccha-
ur vocata 631, 33
batur 631, 37 qui
632, 5
nameretur 3, 23
aquam

aquam vino primum miscuit 494, 17
Bacchus semper inuenis 494, 24 vi-
ni repertor 494, 26 & 28 Bacchus
in Graciam vitem transfert 494, 33
Baccho prior Noe vitem coluit 495,
28 Bacchus Limnaeus, a Limnis 495,
31 Bacchus insanus, ab effectu 496,
2 & cornutus depictus idid. Bacchus
vap̄m̄ōp̄ōs 680, 30 Baccho assignata
ferula, hedera, picea 13, 32 Baccho
eius sacra hedera vide in hedera. Bac-
cho hircus immolatur 494, 30 smi-
lax dicatur 618, 28 asinus assigna-
tus 746, 11 Baccho ferula dicata 746
12 Baccho cur cornua apposita 814,
29
Baotii ilicis similes 149, 24
Balanophagorum nominis origo 2, 36
Balsami tributum 6, 3
Barolum Apulia 600, 10
Basan quercus 155, 13
basilicon, herba 701, 22
batis seu crithmos 671, 25. 672, 7
batuere, idem quod cadere 106, 21
beatior vita rustica nulla 10, 24
belli inter coronarios flores nomen 610,
20 species ibid. 23 descriptio 610, 27
solum 610, 40 cultus 611, 1
Beneuolentia obsequentes parit operas 21, 30
Berecynthius, Phrygia mons 111, 18 bu-
xo abundat ibid.
Beroë annus 495, 1
bestiola horto innascentes 649, 6
beta commentatio 724, 10 beta condi-
tura 724, 23 beta genera 725, 3
& delineatio 725, 20 beta satio 726,
7 beta radix allii extinguit odorem
798, 6
betici, molles Cynico 724, 27
betizare, pro languere & effeminari
724, 30

betula, arbor 106, 17 betula arboris ma-
teries ad quod usum adhibeatur 106, 34
Biges Albeniēsis, aratri inuentor 814, 13
bipennula, herba 669, 31
Bislingua, lauri species 120, 5
Bithyni ut arboribus vitem maritare so-
leant 544, 8
bitumen ex arbore betula 106, 41
blattas necandi experimenta 651, 8
blichon, blechon, βλινχόν 704, 26
bliti denominatio 741, 7 species 741, 10
ac satio ibid. 23 bliti historia 741, 40
Boarmia cur Minerva nuncupata 815, 6
Boeotum cyathi 76, 41
boleti, fungorum species 765, 40. 766, 7
bombyces unde & ubi nascantur 4, 30
Bona dea myrtum refugit 389, 12
bono viro indecens non est agricultura o-
pus 10, 18
boni viri ex agro solum requisiti 14, 29
bonos viros esse agricolas 14, 24
bonus vir Catoni quis 14, 33
Boreas, Celtarum rex 81, 37
Borea Zelotypia in Pana 86, 19
Boreas Hyacinthū extinguit 606, 23
borrago vetus 671, 1
Bos moris oryzae religiosa 855, 36
botryones albinigri, ex eadem vite 553,
15
bones frondium fasciculis pascuntur hye-
me 2, 7 boni cibus, glans 3, 12 bonum
cornuum seminibus suam vim ad-
imant 876, 18
Brachmanes sacerdotes 3, 29
brance Gallorum 845, 16
brassica viti inimica 562, 9. 698, 25.
715, 21 brassica, herba escaria, histo-
ria 715, 9 brassica genera 717, 4
brassica qualem cœli statum toleret
720, 37
quali solo gaudeat 721, 1

IN VILLAM

brassica confitio 721, 10 *brassica cultura* 723, 4 *apparatus artificiosus* ibid. 36 *de brassica que dixerit Theophrastus, Plinius raphano assignavit* 771, 6
brenthis Cypriorum lactuca 655, 12
brionia 731, 40. 732, 6
Briza Macedonum 842, 27
bromos, vel bromios 856, 34 *bromos sylvestris* 857, 5 *bromos fertilis* 857, 9
bromi tractatus 858, 34
bruma nonnunquam vitem comprehendere 547, 31 *bruma vitis non putanda* 547, 33
bruscum acerinum 128, 10
brya silvestris 121, 17
bulbula carnes breui ut coquantur 171, 36
bulbula lingua 670, 35
bulbulci arantis regula 815, 36. 816, 8
Budia cur Pallas appellata 815, 7
buglosson, buglossa 670, 21
bulbi e genere cartilagineo 802, 27 *bulbi nil prosunt nisi neruus adsit* 802, 33
bulborum conditura 802, 29 *bulborum ollam deuorasse* prouerb. 802, 39
bulborum apparatus 802, 40 *bulborum genera* 803, 16 *bulbos ferendi ratio* & *ars* 804, 21 & 28 *bulbos querere*, prouerb. 802, 38
bumamma Varronis 498, 18
bumasti 498, 15, 20 & 24
bumelia quid 122, 32 & 37
buniadis materia & *tractatio* 781, 20
buphthalmos 611, 15, & 30
Buxentum, Italia oppidum 12, 9 *abuxo desumpsit nomen* 110, 27
buxus, arbor silvestris 110, 22 *siluis crepta* ibid. 23 *triplici genere* 110, 31 *quibus locis vigeat* 111, 4 *quomodo feratur* 111, 22 *quam producat materiam* ibid. 34

Buzygia familia 815, 4

C *Achryllii efficacia* 685, 16 *achrylli significatum* 685, 19
cachrys quid 76, 30. 158, 5. 159, 14
Cadusiorum cibi 2, 27
cadenda viti & *quando materies* 67, 13
cælum cum terra maritatur 16, 10 & 19
coeli electio pro villa comparanda 28,
5 *coeli vitia emendandi ratio* 30, 26
cælum frumentis habile 808, 9 *cælum à cælo differt* 809, 1
Cælum Saturni genitor 809, 13
capa suspensa floret 704, 5
capa historia 787, 31 *capa genere differunt* 789, 26 *capas producendi ratio* 791, 1 & *deinceps incorruptas seruandi modus* 792, 13
capa ascalonia 792, 17 *capa Palestina* 792, 20
capa fissilis 793, 19 *viti seri debeat* 793, 26 *capa conditura* 800, 28
cerephillum, cerefolium 668, 33
Cæsaris imago lauro coronata 10, 36 *Cæsaris triumphus Gallicus* 11, 4 *Cæsaris stella* 564, 19
Cæsarum progenies sub Nerone deficit 115, 34
C. Sernilius Hala 12, 25
calabricis historia 174, 30
calaminta, pulegii genus 704, 38 *calaminta historia* 706, 40
calculos pellendi remedium 687, 21
callidiorem sinapi esse 709, 9
calor digestionis autor 877, 16
caltha, flos 611, 5 *æius nomina* 611, 14
descriptio 611, 23 *caltha duplex, satina* & *hyæstris* 612, 7 *caltha cultus* 612, 9
campe, eruca 649, 20
Campania solum felix 640, 33 *Campania*

nis campus
 campi Elisi
 cancri fluminales
 fructus in lapide
 25. cancri fata
 cinque bestias se
 Canicula ortus ubi
 cat
 Canis estum um
 7, 8 Canis occa
 rius
 Canopus gubernator
 cantharus in tritico
 tharis frumenta
 prohibeatur
 capitis dolores lenari
 i capitis dolor
 746, 7
 Cappadocia Magi
 caparis vsus & de
 paris genera q
 caparis satio
 capra fraxinea fr
 capra hominib
 capra nouella se
 pit 475, 19
 nu 475, 21 c
 475, 23 capr
 capreolis quid s
 capreolis cur
 caprifici historia
 & nigra 172
 172, 20 capri
 tiis
 caprinumpescus q
 108, 11 capri
 mendentur
 Caprotina Roma
 caraba, arbor
 carbones optimi
 cardaceae syncope
 20

I N D E X.

- 815, 6
85, 16
685, 19
158, 5, 159, 14
2, 27
materies 67, 13
tur 16, 10 & 19
mparanda 28,
ndiratio 30, 26
bile 808, 9
809, 1
809, 13
704, 5
capa genere dif-
s producendū
ps incorrupta
792, 13
7 cepa Palesti-
792, 20
viti feri debeat
tura 800, 28
668, 33
nata 10, 36
cius 11, 4
564, 19
Sub Nerone deficiit
12, 25
174, 30
704, 38
706, 40
687, 11
709, 9
877, 16
us nomina 611, 14
liba duplex, sati-
7 caliba cultus
649, 20
640, 33
nie
- nia campus 846, 1
campi Elisi 4, 9
cancri fluminales, siue πῆσποι, arborum
fructus à lapsu præseruant 253, 16 &
25. cancri sata & arbores à quibus-
cunque bestiis seruant illesa 653, 31
Canicula ortus vbertatem quando prædi-
cat 254, 11
Canis estum umbra arborum leniunt
7, 8. Canis occasus 824, 31
tus 827, 15
Canopus gubernator 629, 25
cantharis in tritico nascēs 823, 40
tharis frumenta erodens 825, 24 ut
prohibeatur ibid. 25
capitis dolores leuat pulegiū 703, 41
1 capitis dolor ex ferula caulium esu
746, 1
Cappadocū Magi Pyrethi appellati 121, 12
capparitis vsus & descriptio 672, 33
capparitis genera quæ vitanda 673, 25
capparitis satio 674, 7
capra fraxineis frondibus nutritur 3, 11
capra hominibus diisq; inuisa 473, 25
capra nouella sata carpendo corrup-
pit 475, 19 eius salina fructui vene-
niū 475, 21 capra vnde nomen sortita
475, 23 capra Minervæ immolatur
capreolus quid 504, 4 (642, 22
capreoli cur vitibus dati 538, 35
caprisici historia 171, 6 caprisicus alba
& nigra 172, 16 bifera & trifera
172, 20 caprisicus nullis obnoxia vi-
tiis 173, 3
caprinum pecus quibus maxime pascatur
108, 11 caprino morsu infecta vti e-
mendentur 475, 31
Caprotina Romanorum 171, 23
caraba, arbor 165, 7
carbones optimi 159, 1
cardiaca syncoperemediū nasturtiū 667
- cardui origo 732, 14
lineatio 732, 34
cardui efficacia 732, 20
carduus sativus, altilis, aut hortensis
733, 25
carduus sylvestris, sclarea
nuncupatur 811, 18
caria quid 106, 25
caritatis euentura præsagia 254, 1
Carmani palmis aluntur 2, 30
caro incorrupta estate corianno seruat
707, 29
carpinum, è genere aceris 127, 11 & 29
carpinus ab acere distat 128, 31
pinus, Græcis ῥύζα 128, 33
carpini
materies 129, 10
carpophyllos, laurigenus 110, 22
Carthaginenses à Scipione pacem depre-
cantur 441, 17
Carthago Hispania 587, 36
cartilagineum genus quid 748, 24
caryophylli 599, 4 vnde dicti 599, 5, 14
describuntur 599, 26 quotuplices 599
33 quo cælo gaudeant 600, 12 quò solo
600, 14
caryophyllorum satio 600, 16 cultus
600, 28 ars 600, 32 (455, 32
Cassianus ager olei quā frumenti feracior
Castana Magnesia oppidum 433, 24
castanearum enarratio 433, 14 genera
434, 9 castanearum plantatio 435,
7 conditura 437, 1
castitatis & sterilitatis symbolū salix 143
25 castitate olea præsulē esse 438, 22
casula tam veterum quam nostrorum
populorum 3, 21 & d.
Catiuulcusa taxo se exanimavit 109, 23
Catonis spectaculum in theatro 449, 16
caupones casum & nuces cur apponant
568, 28 (26
causidicis absq; artibus felices vrbes 14,
causa caca complurimum 876, 33
T T T

IN VILLAM

<i>Cecrops Atheniensium rex</i>	439, 23	<i>chamacerasus</i>	380, 17
<i>Cedros insula</i>	12, 7	<i>chamadaphne</i>	618, 2 & 10
<i>cedrium Syris quid</i>	95, 6	<i>chamaleon animal innoxium</i>	171, 37
<i>cedrus magna</i>	71, 1	<i>circa caprificos ferum</i>	ibid.
<i>cedri minores</i> 73, 19 <i>ut à maioribus differant</i> 73, 22 <i>quot generum sint</i> 73, 24 <i>earundem descriptiones</i> 73, 31 <i>quale solum quarant</i> 74, 17		<i>chameplatanus</i>	132, 19
<i>celastrus Theophrasti</i>	119, 36	<i>Charion, Chremili servus</i>	14, 30
<i>cella vinaria</i> 53, 22 <i>cella olearia eiusq. torcular</i> 55, 26		<i>Charites, Eteochis filia</i>	80, 25, 82, 11
<i>celtis Afrorum, arbor</i>	168, 39	<i>chenosiris Egyptiorum</i>	635, 3
<i>Cepheus amnis</i>	601, 6	<i>Chii primo viem colere discunt</i>	494, 31
<i>Cephisus & Melas flumini Boetia</i> 551, 35		<i>chondrilla, ex intubaceis</i> 662, 36 <i>eius descriptio</i> 663, 5	
<i>cerasbalon, seminis genus</i>	876, 21	<i>Chremilus, vir iustus</i>	14, 30
<i>cerasti historia</i> 357, 7 <i>cerasti species</i> 358, 21 <i>cerasticultus & insitio</i> 360, 9 & 14 <i>cerasti morbi & remedia</i> 379, 23 <i>cerasorum conditura</i> 379, 38 <i>cerasus pumila</i> 380, 6		<i>chreston, ex intubigere</i>	662, 10
<i>Cerasus, Ponti ciuitas</i>	112, 10	<i>Christi gratia trans Tyberim Roma per oleam indicata</i>	446, 24
<i>ceratitus, papauarea species</i>	738, 41	<i>cibi potusq. varii variarum gentium</i> 2, 5 & d. <i>cibus nomen quibusdam populis indidit</i> 2, 32 <i>cibus pinguis siccis corporibus conueniens</i> 810, 1	
<i>cera Tyrrenica</i>	106, 12	<i>cicera, legumen</i>	884, 1
<i>ceraunia Ionum</i>	165, 17	<i>cicerbita Columella</i>	665, 20
<i>Ceres terra appellata</i> 10, 15 <i>Ceres inter deas cur relata</i> 13, 22 <i>Ceres, sine Geres</i> 16, 27 <i>Ceres dea frugum</i> 807, 17 <i>Saturni & Opis filia</i> 807, 18 <i>unde nomen indepta</i> 807, 20 <i>Cereris sacra</i> 807, 37 <i>Ceres Siculi Siciliae regis uxor</i> 808, 3 <i>Ceres aratri & ferramentorum rusticorum inuentrix</i> 814, 39 <i>ante Cererem frumenti usum mortalibus innotuisse</i> 815, 9		<i>cicerule historia</i>	883, 12
<i>ceruisia Germanorum</i>	731, 37	<i>ciceris historia</i>	880, 20
<i>ceruus roboris species</i> 160, 12 <i>cerui materies</i> 160, 35 <i>celeriter marcescit</i> 161, 6 <i>ceruis phalangium exitiale, ceruis salutare</i> 635, 35 <i>(ualefcit)</i> 443, 25 <i>ceruus agrotas, olea ramis mansis concharephylon, charefolium</i> 668, 21		<i>Ciceronis exilium</i> 9, 27 <i>Ciceronis academia</i> 9, 40 <i>Cicero lux doctrinarum altera</i> 33, 18 <i>Cicerones, à cicere</i> 869, 10	
		<i>cichorium Egyptium</i> 660, 14 <i>cichorium, intubus siluestris</i> 662, 9 <i>cichorium, diuini generum</i> 662, 13 <i>cichorium, seu chondrilla</i> 663, 1	
		<i>cicla unde deuocetur</i> 724, 40, 725, 1	
		<i>ciconia austris se non committit</i> 29, 40	
		<i>ciconia noctuas platani foliis abigunt</i> 130, 35 <i>item & vespertilioes</i> 131, 1	
		<i>ciconia origano aduersum venenosum munitur animalia</i> 698, 27	
		<i>Cimon academiam exornat</i> 9, 31	
		<i>cinara, seu carduus hortensis</i> 733, 25 <i>cinara ut in cibus veniat</i> 733, 30, 734, 5	
		<i>cinara nuncupatio</i> 734, 6 <i>descriptio</i> 734, 7	

734, 17 cinara
735, 32 cultus
Cingias poeta Grece
Circe, solis filia
circo, accipitris ge
Cithonia festa
citrago 63, 17 a
ibid. 25
citreolus moderum
751, 23
citrus, citrius, citru
Cittus puer saltans
cinica corona
ciuitates in Iouis tu
claua, an idem quo
clauicula vitium
clauum oleatiui
Cleareus Heracle
259, 4
clematis daphnoia
68, 1 descriptio
Cloria dea
Clorinympha
Clymenus rex
clymenus unde not
cena nascitur in
ex Cocco tributu
Codiculi qui sint
cognomina ex ar
Co, insula bomby
coitum stimulat
collumida quid
color hyacinthinu
606, 2 colossin
columba agrotat
113, 28
Columella notat
Plinii concilio
colytea arbor 108
litas
comitalis morbu

I N D E X.

380, 17	734, 27 cinaragenera	735, 12 satio	Commodus Imp.	14, 17
618, 28, 10	735, 32 culus	736, 13	concordia per malum punicum demon-	
xiium 171, 37	Cinesias poeta Gracus	127, 7	straito	397, 33
ibid.	Circe, solis filia	13, 24	condimentaria herba	682, 22
132, 19	circos, accipitris genus	655, 25	conditina mala que Varroni	450, 17
14, 30	Cithonia festa	606, 22	confinem vicini fundum olea refugit	
80, 25, 82, 11	citrageo 633, 17 à melissophyllo distincta		463, 35	
635, 3	ibid. 25		Conilos, herba cumila inuentor	699, 17
discunt 494, 31	citreolus modernus, veterum cucumis		conturatorum nomina in tabulis tiliaceis	
662, 36 eius	751, 23		scribi solita	125, 23
663, 5	citrus, citrius, citreum	259, 28	Constantinopolitani climatis frigus ma-	
14, 30	Cittus puer saltans	636, 1	ximum	722, 23
662, 10	cinica corona	152, 36	continuacione nature qualitates mutari	
herim Roma per	ciuitates in Iouis tutela	153, 2	840, 33	
446, 24	claua, an idem quod talea	189, 15	contrariorum appetentia & in terra &	
um genium 2,	clauicula vitium	538, 36	in seminibus	819, 13
quibusdam po-	clauum olea patitur	474, 15	conuuantium corona	11, 26 & 27
pus pinguis siccis	Cleareus Heracleota, Ponti tyrannus		conuoluolus ne fiat in vinca	561, 6
810, 1	259, 4		conuoluolus, herba	591, 26
884, 2	clematis daphnoides 617, 37 eius nomina		corianni enarratio 707, 28	corianni sa-
665, 20	618, 1 descriptio 618, 11 solum ibi. 20		tio & cultus	708, 10
883, 12	Cloria dea	845, 5	Cornelius Cethegus mustum rutatum po-	
880, 20	Cloris nympa	582, 9	pulo dedit	710, 19
Ciceronis aca-	Clymenus rex	13, 9	cornu cerninum, herba	675, 19
doctrinarum	clymenus unde nomen indispiscatur	13, 9	corollaria	580, 24
33, 8	cena nasturtio inchoatur	667, 6	corollarum vsus & inuentores	580, 17
869, 10	ex Cocco tributum qui soluant	6, 4	corona laurea 10, 36 myrtea 11, 3 ci-	
60, 14 cichori-	Codiculi qui sint	538, 36	trea 11, 4 Deliaea 11, 6 oleaginea	
662, 9 cichori-	cognomina ex arboribus imposita	11, 34	11, 10, 12, 15 pinea 11, 16 corona	
662, 13 cichori-	Co, insula bombycibus clara	4, 30	ex apio 11, 17 ex lauro, & hedera 11,	
663, 2	coitum stimulat satureia	696, 25	18 frondea 11, 26 corona hederacea	
724, 40, 725, 1	collimida quid	451, 12	11, 27 coronarosea 11, 28 corona	
mittit 19, 40	color hyacinthinus 605, 40	ianihinus	ex philyra 11, 31 corona pinea apud	
foliis abigunt	606, 2 colossinus	617, 32	Isthmos 87, 39 corona iligna post-	
erriliones 131, 1	columba egrotans lauro sibi medetur		ponitur ei quæ ex esculo sit 147, 32.	
rsum venenosa	113, 28		152, 33 oleaginea 440, 18. 580, 28	
698, 27	Columella notatur 460, 4 Columella &		obsidionalis 580, 29 cinica 580, 31	
9, 31	Plinii conciliatio	837, 21	myrtea 580, 34 nardina 580, 38	
ensis 733, 25 ci-	colytea arbor 108, 30 eius natura & qua-		corona inuentum	580, 26
733, 30, 734, 3	litas	ibid. 33	corona myrtina 389, 39 corona unde di-	
4, 6 descripta	comitialis morbus	692, 38	cta 580, 20 corona ludicra & puellares	
734			rrr 2	

I N V I L L A M

§ 80,39 corona vno supradec.	§ 81,17	Croesus Lampfacenis ut pinum se eos ex-	
Corona occasus.	820,20	cisurum interminatus	88,8
coronamentis cur flores inserti	§ 81,14	crotona, olea infesta	442,12
coronarum sola varietate placentium		cucumber annuam non sentit naturam	
duo genera	§ 81,18	755,7	
coronopus, intubacea herba	675,10	cucumberarii ingressus	748,22
corpus hominis ut instrumentum	21,10	cucumberem praeconomem ut habeas	
corporis vita, anima idolum	601,12	753,23	
corruda asparagi genus incultum	727,33	cucumberem toto anno ut habeas	754,10
corruda sylvestris asparagus	728,18	cucumeres aqua amantes	753,10
cortex vitis pars vitalis	§ 48,16	cucumeres oleum odere	753,10 & 21
corticis ablatio	247,8	uti maneant illae	757,23
corylum vitis odit	§ 62,22	cucumberum satio	751,35
corymba, corymbion	616,3 & 5	cultus	752,37
corymbia 636,3 & 16 corymbia & co-		cucumberum artificiosa aliquot expe-	
rymbi ferule	745,39	rimenta	753,23 & dein. cucumberum
cosmosandalos, Hermionem flos	606,20	conditura	757,13
cotinos, & cotinodis	449,21,23	cucumeribus solum comenens	751,28
Cotinusa Hispania unde denocata	449,	cucumis in cibum uti veniat	748,33
cotinus, siue oleaster	12,6	cucumis historia	748,29
Cotinus insula	12,6	cucumistoni-	
coroneorum malorum historia	270,20	nitru conuertitur ibi.	30
cornuicibus veratrum noxium	388,2	cucumis &	
myrtus salubris	ibid.	cucumber unde nuncupatus	749,16
crambidion Varronis	771,25	cucumis satini descriptio	750,16
crambus, quarum morbus	558,12	cucumis humidus frigidusq.	750,20
Crana Arcadia	77,13	cucumis silvestris	751,1
crapulam sedat brassica	715,38	asinus	751,8
crapula quid	716,19	cucurbitarum sationes	761,37
dinosa	716,20	ars	762,
crassinenium, aceris genus	127,25	23 conditura	763,31
Creta cupresso abundat	83,15	culices unde gignantur	565,37
turiginosa & viginosa	454,33	16 culices ne oleribus noceant	650,35
crethmos Plinii	672,14	651,1	
crithmi seu batis historia	671,25	culminia bacca	452,1
Crocus iuuenis	603,17	culminiana olea	451,41
618,26 & 31		cultus terra necessarius	223,12
crocus 603,4 croci nome	603,24	terra utilis	223,26
descri-		cuminum, herba condimentaria	693,38
ptio	603,28	cumini genera	694,9
genera	604,1	delineatio ibi.	
caeli	604,	16 satio & morbi	695,1 & 9
10 satio	604,27	cunila duo genera	695,32
croci conditura	605,	do feratur	697,20
1 croci odor, quotidie acrior	605,5	& quomodo cola-	
croci probatio	605,9	tur ibid. cunila quibusdam organos	
		699,12, & 16	
		Cupidinis delineatio	584,33
		Cupressus	

cupressus Plutoni
 pressus unde origi
 81,3 Diti ob lu
 20 in cimiteri
 patibulo ibi. en
 cupressus feralis
 37 cupressus qu
 derit 81,40 mo
 nero 82,3 inimi
 nomina 82,10
 genera 83,9
 41 infuso 85,1
 pressi resina 86,5
 seu Sabina
 cupressum odit
 cupressorum silua
 cyanus flos 614,1
 614,9 delineatio
 & erraticus
 qathi Baotici
 Cybeles curru leon
 223,22 Cybelis
 bele deum mate
 cognominata
 cyclaminus 617,4
 seruanda 617
 617,12 cyclan
 solum
 Cyelopam cibi, fru
 tes
 cydoniorum infusio
 Cyllenum promont
 Cymestorum terra a
 Cyne arboris frond
 bibus
 Cynea legati facete
 vini gustum
 Cyparissa ciuitas
 Cyparissa, Borea fili
 Cyparissa, ignes
 Cyparissus, Teleph

I N D E X.

cupressus Plutoni consecratur 13, 32 *cu-*
pressus unde originem traxerit 80, 37
 81, 3 Diti ob suam naturam sacra 81, 7 &
 20 in caemiteriis feritur 81, 21 etiam in
 patibulo ibi. eiusdem varius usus 81, 20
cupressus feralis & luctuosa 81, 20 &
 37 *cupressus* quid Vespasiano porten-
 derit 81, 40 mortis ostentum Imp. Se-
 uero 82, 3 inimica viti 82, 6 *cupressi*
 nomina 82, 10 descriptio ibid. 18
 genera 83, 9 caelum 83, 15 satio 83,
 41 insitio 85, 14 materies 85, 19 *cu-*
pressi resina 86, 9 *cupressus* Cretica,
 seu Sabina 120, 30
cupressum odit vitis 562, 25
cupressorum silue quatuordecim 5, 33
cyaneus flos 614, 1 blaptisecula ruribus
 614, 9 delineatur ibid. 14. hortensis.
 & erraticus 614, 20
cyathi Bæotici 76, 41
Cybeles currui leones adiuncti 13, 25.
 223, 22 *Cybeli* pinus sacra 13, 33 *Cy-*
bele deum mater 86, 26 turrata unde
 cognominata 87, 14
cyclaminus 617, 4 in omnibus domibus
 seruanda 617, 6 unde nominetur
 617, 12 *cyclamini* descriptio 617, 24
 solum 617, 35
Cyclopum cibi, fructus sponte provenien-
 tes 2, 18
cydoniorum insitio 273, 5
Cyllenum promontorium 77, 21
Cymesorum terra a rege exculpta 12, 37
Cynea arboris frondes vestium vice Ara-
 bibus 4, 14
Cynea legati facere dictum in austeriorem
 vini gustum 538, 11
Cyparissa ciuitas 12, 10
Cyparissa, Borea filia amissa 81, 37
Cyparissa, ignes prodigiosi 82, 14
Cyparissus, Telephi filius 80, 29 eius

historia poetica ibid.
Cyrenaicus succus 555, 13 *Cyrenaicum*
 lac 555, 13
Cyrenei horti 9, 33
Cyrene nymphea 13, 19 eius filius *Aristeus*
 ibid.
Cyri Persarum regis solertia 12, 14
Cyffos adolescens in hederam conuersus
 634, 13
cythisi fruticis historia 910, 13

D

D *Actyli* inter vites numerantur 499,
 17 unde dicantur 499, 20
dæmones laurum oderunt 113, 33
Daphne, Asia urbs, *Daphnitis* & *Da-*
phiusa 12, 11
Daphne, palatium Roma 114, 8
daphnitis, e lauri genere 120, 22
Darius Persarum rex 10, 33
Dauid, Palaestinum gigantem interficit
 12, 4
decacuminatio 248, 9
decussis quid 197, 12
defectus emendatur supplemento 810, 2
defrutum coquendi ratio 570, 26
deliratio unde deuocetur 822, 28
Delphica platanus a quo confita 12, 38
Delphica laurus Apollini dicata 115, 9
Delphicum templum e lauri ramulis
 115, 3
Delum appulit *Theſeus* 11, 5
Democritus Abderites philosophus 9, 35 *De-*
mocritus, agricolarum sapientissimus,
 terram celo maritat 16, 19
Demoſthenes plus olei quam vini absum-
 psit 438, 27
dendrogalenum vinum quoddam Bithy-
 nie 497, 26
densora frigori obnoxia 474, 26
dens leonis 664, 4 & 21
dentium remedium 676, 4

IN VILLAM

deorum simulacra ex subere primum cō-	Dodone quernum nemus	153, 21
fecta 151, 26 deū ex palma 151, 27	dolia quo tempore aperienda	568, 29
deorum corona 609, 18 & 28	de dolichis	891, 29
Deucalion 494, 11	doliorū musto cōdendo preparatio	566, 7
Deus tertia die pomiferum lignū, sexta	domini assidui diuitia	5, 13
produxit animalia 2, 4 Deus primo	domus priscorum hominū	3, 21
homini deliciarum hortum destina-	domus patrisfamilias rustica urbana	
uit 6, 16 Deus incrementū dat 6, 23	47, 8 domus villici, seruorum & ani-	
deuteria an vina dicenda 565, 38 deu-	malium 48, 34 domus fructuaria	
teriarum tria genera 565, 40	50, 26	
Diana nemorum dea 68, 35	domus ab arboribus tribuuntur	3, 15.
Diana Ephesia simulacrum an viti-	4, 10	
gineum, an verò ex ebano 579, 6	dosiliarum, plantaria	5, 35
dictator creatur Cincinnatus in agris de-	draco hortensis, herba	681, 39
gens 12, 23	dracōtias, Graecis cucumeris species	757,
Didymi error 553, 21	28	
dies felicibus operibus apti 18, 20	dracunculus	786, 16 & 35
dij agrestes 8, 16	Drepani nominis ratio	809, 15
diligentia inimicissimum vinum 22, 39	Druidae Gallorum magi	3, 30
diminuta, vere increſcunt 796, 15	drupa, veterum cibus	2, 23
Diocletianus ruri agit 8, 1 Diocletianus	drupa quid	446, 39. 478, 13
in agris consenescit 12, 26 olea ma-	druparū vermiculatio	472, 12 & 23
nibus suis consita imperio praefert 12,	Drusus Caesar	721, 40. 727, 37
29	drus Greco Latinum verbum nullum re-	
Diogenes Cynicus 153, 15. 724, 27	spondet	147, 20
Diomedis delubrum 132, 28		
Dionysius hederaceam instituit coronam		
11, 27 Dionysij maioris tyranni hor-		
tus 12, 39		
Dionysius, qui & Osiris 16, 24 Dio-		
nysius vitem primus plantauit 494, 37		
Dionysius Semele genitus 494, 38		
Dionysius, Ioue ac Proserpina vel Ce-		
reus satus 814, 27 boves primum ad		
aratum iunxit 814, 28		
disciplina lucubrationibus addiscuntur		
438, 23		
Dis mortuorum deus 81, 7 & 13		
diminatio in somnis per laurum praebetur		
13, 29		
diaturnitatis specimen quercus 153, 6		

E

Bori vindicando a carie oleum con-	
ueniens	443, 18
ebrietas saltim semel in mense permessa	
492, 36 ebrietatem arcet crocus 603,	
9 ebrietas absque vino inducitur he-	
dera 634, 30 brassica caueri potest	
715, 32. 716, 36 in ebrietate peccatum	
leui reprehensione castigatur 746, 20	
ebrii poeta meliores	492, 20
ebrius myrica corona conuenit	89, 41
echij nomen	13, 10
echini marini plenilunio augētur 748, 32	
elaja callistephanos quid	449, 15
eadem quid	74, 24
Elector, solis nomen	137, 36
elao-	

elaeophyllos
 electrum quid voc
 orum 138, 4
 nia aurabit
 elelphacos
 eleoselinon
 elephas oleastro sibi
 elephantes odore sag
 Elico Helucius
 Eliochrysenympha
 Elisy campi, deoru
 elixyru quid
 Empedocles ignea
 113, 35
 emplastratio quid
 generis idonea
 ensis, floris nomen
 Epaphus Phaetont
 epimelides
 Epimenides Phaeti
 Soloni in multis
 epithillis
 epithymbra quid
 epithymum florem e
 equapium, pater
 Equensis ciuitas
 equi castrati, cant
 Eridanus amnis
 erigeron, siue seneci
 Erion, Dorica vr
 eruca varum genu
 vitibus quibus a
 cas auertendi mo
 & seq.
 eruca, herba, hist
 erulia 87, 30 eru
 erni vitum phalang
 25 erni tractatio
 erysimon cereale
 esculus unde nomen
 10, 16 Ioni sacra

I N D E X

153,11	eleostaphylos	554,14	esculi historia	161,7	esculi materiei
568,29	electrum quid vocemus	137,35	usus	162,6	
891,29	orium 138,4	electrum paleosa & le-	escaprius, post modo eruca dicta	666,16	
eparatio 566,7	nua attrahit	138,10	Eteoclis filia, Charites	80,25	
5,13	eleisphacos	713,30.714,3	Eubolus coniugem ob appositā lactucam		
3,21	eleoselinon	683,3.685,41	incessit	654,41	
rustica urbana	elephas oleastro sibi medetur	449,19	euentari	825,35	
ruorum & ani-	elephantes odore sagacissimi	758,16	euphorbium à Iuba denominatur	13,9	
mus fructuaria	Elico Heluctius	443,37	euphrosynum, buglosson	670,31	
	Eliochrysenympha	609,37	Euribiades oleagineam coronā à Grecis		
ribuuntur 3,15.	Elisij campi, deorum sedes	4,10	accipit	440,30	
5,35	ἐλμύχιον quid	615,28	Euripidis mater filiiq, fungorū esu mor-		
681,39	Empedocles igneam statuebat animam		tui	764,4	
eris species 757,	113,35		Euristheus, Argiuorum rex	258,7	
786,16 & 35	emplastratio quid	210,2	Europa sub platano à Ioue compressa	131,	
809,15	generi idonea	210,17	19 Europa, narcissos carpens	601,14	
3,30	ensis, floris nomen	608,1	Eurotas fl. cur Apollini sacer	114,36	
2,23	Epaphus Phaetonti molestus	138,39	Eurus lenis	7,19	
46,39.478,13	epimelides	167,5	exercitatio ἑκαστοῦ μύνης	14,8	
io 472,12 & 23	Epimenides Phastius	442,21	exercitus loti fructibus alitur	169,8	
721,40.727,37	Soloni in multis adiutor	442,22	exigua facilius suū arripiūt sine	694,19	
um nullum re-	epithillis	793,41	exilij tolerandi ratio	9,27	
147,20	epithymbra quid	697,27			
	epithymum florem esse	697,25			
	equarium, ἱπποέλιον	687,1			
	Equensis ciuitas	108,21			
carie oleum con-	equi castrati, cantherij appellantur	855,1			
443,18	Eridanus amnis Padus dicitur	137,35			
menſe permissa	erigeron, sine senecio	664,20			
arcet crocus 603,	Erinon, Dorica urbs	171,41			
no inducitur be-	eruca varium genus	474,38. 475,3			
lica caneri potest	vitibus quibus abigatur	561,35			
rietate peccatum	cas auertendi modus varius	649,10			
stigatur 746,20	& seq.				
492,20	eruca, herba, historia	665,34			
conuenit; 89,41	erulia 879,10	erulia, an cicera			
13,10	erui vitium phalangium	823,40. 889,			
o angētur 748,32	25 erui tractatio	888,8			
449,15	erysimon cereale	868,1			
74,24	esculus unde nomen adepta	2,37. 161,			
137,36	10,16 Ioni sacra	161,12.13,26			
elao-					

Faba Græca 168,36 Syriaca 168,38 faba batcas olea a lapsu præseruat 473,28 faba cruda allij factorem tollit 798,7 faba, eiusque commentatio 869,1 fabæ conditura 874,38 faba quadam annorum cxv. 875,10 faba, refri-na dicta 876,12 fabæ flos lugubribus literis 607,3 faba in lolium non mutantur 837,5 licet cum tritico serantur ibid. fabæ coctiles & incoctiles 876,17 fabarum cibus interdictus 875,21 fabarum imbecillitas 877,34 Fabij, à faba 869,10 fabulum, idem quod faba 869,25 facilitas propiores habet principijs suis finis 694,20

I N V I L L A M

- factus quid* 453,4
fagus Lydis ubi dicta 12,5 *fagus Latini*
norum 163,15 *vipera nocua* 163,19
quot generum 163,23 *ubi proveniat*
164,7
fagi glandifera duo genera 159,29
& 38 fagi urbana descriptio 159,41
materies 160,3 *provenit in cultis*
160,10
falx, Iani infigne 16,31 *falcis vineati-*
ca figura 528,7
Falernus ubi modo 500,34
far frumenti genus 844,29 *Zeā prepo-*
ponitur 844,36 *farfalticium & na-*
turale 844,36 *far triticeum & hor-*
deaceum 844,38 *far quid & unde*
denocetur 845,1 *far Campanū nulli*
simile 845,28 *far ex olerasti* 849,12
farris usus apud Roman. 845,5 *satio*
845,9 genera 845,12 *soli* 845,31
farnus glandifera arbor 163,2 *eius de-*
scriptio ibid. 5 *species* 163,11
fascinationis amuletum, ruta 710,23
Fauonius aliis noxius, aliis utilis 255,41
febriles astus coronis arciti 627,38
feculentum omne in fundo sedit 566,25
feles calaminia delectari 707,7
feminarum calceatus 4,16
feria propter fructus instituta 254,30
feriarum vices omnia volunt 546,27
fermentarum rustica a Cerere inuenta 814,
38
ferrum oleo remollitur 443,27 *recre-*
descit aqua 443,28 *a magnete tra-*
hitur 798,8
fertilitatis olearum praeotiones 470,28
fertilitas nimia oleis nocua 472,3 *fer-*
tilitas olea quae ratione inducenda 472,
40
ferulacei generis species 747,26
ferulago 681,26 & 31. 747,28 & 32
ferula Baccho sacra 13,32 *ferula, lignum*
non lignum 680,26. 746,35 *feru-*
la asinis pabulum, ceteris iumentis ve-
nenum 680,27. 746,10 *ferula impe-*
rij nota 746,23 *quo modo in cibū ve-*
niat 746,36 *unde dicta* 747,6
ferula descriptio 681,11 *ferula semē,*
Italiae cibis 745,38 *ferula caules ca-*
pitū dolore gignit 746,1 *ferula pra-*
paratio 746,2 *ferula delineatio per*
Theophrastum 747,10 *per Plinium*
747,18 per Portam 747,21
ferula cibo commendabiles 680,2 *quo-*
modo condiantur 680,7
ferula ignis aservatur 746,41. 747,2
ferularū attritu ignis excitatur 747,4
festuca aliquibus, auena 856,34
fici umbra viti infesta 541,18
de ficu, eius inuentione & laudibus 300,
1 ficu natales loci 312,26 *ficus sa-*
tio ex semine 314,1 *ex viti radice* 314,
15 ficus satio ex propagatione, aui-
lione, ramo 315,31. 37 & 40 *ficus sa-*
tio ex talea, ex surculo 316,15 & 23
ficus insitio & cultus 317,12 ac 27
ficus morbi & remedia 319,38 *ficu-*
um conditura 325,9 *ficus Aegyptia-*
ca 165,10 & 18 *ficus & caprificus*
differunt 171,9 *ficus fatua* 172,1
fides sinapi assimilata 710,14
Filisci adhortatio de tolerando exilio 9,
26
fineta vi immunia fiant a serpentibus
156,22
fimi oleribus maximè idonei 645,28 *o-*
leribus incommodi 646,1 *fimorum*
optimi qui 817,9
fistula vnde reperta 7,20
flagelli descriptio 815,23
flamen Dialis attactu hedera piaculum
committit 634,20 *flamen faba non*
vesci-

vescitur
statibus & tractibus
251,11 statibus
34 statibus oleis
in regionibus quibus
statibus frumento
Flora, aca, florum
Floralia 254,31
feria Florae instituta
ibid. 32
flores quos simplices
riorum generati-
um excellit in
21
flos triferi prone-
fecunditatem oleis
473,7
femina quando pa-
renatio vilior ag-
ibid. *renatio*
renator quae
feniculi historia
seratur 691,14
ra ferat ibid. 30
num
fenum cordum
fenum gracum
foliis etiam satio fi-
formica ne vicem
fugentur
fortitudinis symbo-
Fortunate insula
forum Caesaris Ro-
fossio terra quid
& 40
fractibus olearum
23
fraga gula oblecta-
incognita 748
748,9 quomodo
16

INDEX

ferula lignum
 746, 35. *feru-*
eris iumeis ve-
o ferula impe-
do in cibum ve-
ta 747, 6
 1 *ferula semē,*
erula canes ca-
 5, 1 *ferula pra-*
delineatio per
io per Plinium
 747, 21
ules 680, 2 *quo-*
 680, 7
 746, 41. 747, 2
excitatur 747, 4
 856, 34
 541, 18
 3 *laudibus* 300,
 12, 26 *ficus sa-*
rim radice 314,
 7 *40 ficus sa-*
 316, 15 & 23
 317, 12 & 27
 319, 38 *ficu-*
ficus *Egyptia-*
cus & *caprificus*
us fatua 172, 1
 710, 14
olerando exilio 9,
ant à serpentibus
donei 645, 28 &
 646, 1 *simorum*
 817, 9
 7, 20
 815, 23
hedera piaculum
flamen faba non
vesci-

vescitur 876, 10
flatus *Stractus* & *regio tota infestatur*
 251, 11 *flatus alij alijs prestant* 255,
 34 *flatus oleas adurunt* 474, 29 *fla-*
tus regionib. quibusda proprij 475, 8
flatus frumento efficiunt 825, 30
Flora, dea florum 582, 1
Floralia 254, 31. 582, 4, 11 *floralia*
feria Flora instituta 824, 22 *quando*
ibid. 32
flores quotuplices 580, 9 *florum corona-*
riorum generatio, cultusq. 583, 17 *flo-*
rum excelsitas maxima in lilio 591,
 21
flos triferi prouentus 600, 7
fœcunditatem oleis adferendi medium
 473, 7
fœmina quando pariat 836, 6
Fœneratio vilior agriculturâ 5, 6 *illicita*
ibid. *fœneratio cum terra* 5, 9
fœnerator quadrupli cœdemnatur 5, 8
fœniculi historia 689, 36 *fœniculum ut*
seratur 591, 14 & *ut semina dulcio-*
ra ferat *ibid.* 30 *fœniculum Roma-*
num 693, 4
fœnum cordum 672, 13
fœnum gracum 901, 7
folijs etiam satio fit 192, 24
formica ne vitem ascendat 561, 23 *uti*
fugentur 651, 19
fortitudinis symbolum quercus 153, 6
Fortunata insula 747, 15, 36
forum-Casaris Roma 169, 38
fossio terra quid & *quotuplex* 226, 39
 & 40
fracibus olearum dulcescunt allia 800,
 23
fraga gula oblectamenta 748, 3 *Gracis*
incognita 748, 7 *duplicis generis*
 748, 9 *quomodo conferantur* 748,
 16
fraxinus 122, 9 *qua fabula præcis ibid.*
 11 *eius genera* 122, 29 *ubi nascatur*
 123, 12 *qua materie* & *quàm utili*
 123, 32 *fraxinus florida, donū nu-*
ptiale 124, 21 *fraxinus capris oni-*
busque pergrata 539, 6
frigiditas humorem eximit 452, 27
frigoris vis terrâ excoguit 646, 30 *fri-*
goris effectus 808, 33
frigus densis magis insidet quàm raris
 474, 26
frondea corona in cœniuiis 11, 26
frondium fasciculishieme pecora pascun-
tur 3, 7
Frondius miles 11, 41
fructus simul miscēdi per infisionem me-
dia 220, 30 *fructibus venenum ca-*
pra salina 475, 21
fructuū peculiare morbi 240, 8 *fru-*
ctuū quidam partem imam cur supe-
riori amariorē habeant 749, 4
fructibus sponte prouenientibus homi-
nes quosdam viuere 2, 10 & 18
frumentacea genera 806, 28
frumenti genera 827, 35 *frumenti con-*
ditura 833, 27 *frumenti generum in*
alia mutationes 837, 8 *frumenti vul-*
garissima genera, triticū & *far* 844,
 28
frumento tribus temporibus à ventis
nocetur 825, 35
frumentorum alia frumentacea, alia
ædipota 806, 26 *frumentorum alia*
hyberna 807, 1 *alia æstina* *ibid.* 3 *fru-*
mentorum qua aliud in aliud muten-
tur 843, 5 *frumentorum fastigia duo;*
tritici & *ordei* 850, 9
frumentis cœlum conueniens 808, 9
frumentis solum commodum 809, 25
frutex quid 65, 20
fuci occasio in arboribus 473, 25

IN VILLAM

fulguris noxam a vino quid dimoneat
571,29
fulmen in ilicem frequenter fertur 148,2
fulminis miracula per cacas quasdam
causas 769,5
fulminum pra metu laurea adhibetur
113,15
fundus suburbanus arbutum expetit
538,14
fungi probatissimi & noxii 156,16 fun-
gi in roboribus nascentes 157,20 su-
illi 766,19 & 29 farnei 766,20
amanita 766,22 piperites 767,2 cir-
ca arbores nascentes 767,11 fungi ver-
no nascentes genere 767,33 fungi quos
ars reperit 768,6
fungum olea patitur 474,15
fungorum locus & explanatio 764,1
fungorum genera 765,7
fungos coquendi observationes 764,11
fur dupli condemnatur 5,7
fusterna quid 28,32,36

G

Gadir Hispania civitas 449,21
quondam Tartessum, & Continusa
ibid.
Galatia Asiatice 621,13
Galenus regiones hybernas peragravit o-
mnes 847,38
Galerius 12,28
galla ad coria utiles 154,8 galla nigra &
candida 156,37 galla resinosa 157,2
galla deterrima 157,34 galla esculi
161,2 & 36
Gallicum arbutum, siue rumpotinum
546,31
Galli cur in Italiam primo transfuerint
443,36
Gallorum magi Druidae 3,30
gallinacei ne vias attingant 562,3
gallina fabarum esu steriles enadit 876,15

Garganus mons thymo scater 624,28
Gariliannus fluvius 632,2
gastera, rapa Lacedaemoniorum 778,33
Gebanitarum regi thus Arabes pendunt
6,2 item Sabai 6,3
gelu facile oleam adurit 474,24
genera quae facile transmutentur 842,14
generosa animalia 14,38
Gentiana a Gentio inuenta 13,6
Gentius Myricorum rex 13,7
Geometria 19,3
geranium Plinij 679,9 & 13 geranium
Dioscorid. 679,17
e Germania sifer Romam allatum 785,3
Germanorum vestimenta ex plantarum
corticibus 4,15 Germanorum brach-
sica optima 720,39
germinare an quapiam terram non conten-
ta possint 520,37
germinatio arborum quando conspicia-
tur 75,9 germinatio prima vi debilis,
ita deterior 796,17
Geryon rex 718,28
gethyi historia 793,35
gethyllis 793,40 gethyllis rapi magnitu-
dine 795,6 gethyllis quid 795,14
gethyon quali forma depingatur 794,7
quomodo seratur 794,17
gladiatores ordearij 850,13
gladiolus, flos coronarius 607,36 eius
appellationes 607,40 descriptio 608,
5 ubi plurimum nascatur 608,23
gladioli vagum nomen 608,21
glandaria silva 147,6
glandifera arbores an generali aliquo co-
prehendantur nomine 147,20 glan-
difera arbores inter felices numeratae
147,24 quadam aeterna coma pubent
147,25 quadam caluescentes ibid. 26
glandifagi, Arcadium cognomen
152,39

glans

glans bonum cibum
ratem refert 15
153,35
prima & gran-
cerrea 160,16
dulcissima
glandis honos
dis nomine om-
contineri
glandis nutritio
147,11 glan-
opes 147,12
14 secundis m-
eunt
glutinum abdicat
Gnosporum capres
gongri oleam infest
indicentur non
Gordianus senior
gorgopia Syrorum
gossipum lini ger-
Graeca vinitatis
Gracia sterile
Graci oleagine
Atiaci donant
& Eutribadi
440,30
grandinem quid
Gratia, siue Char-
tie poetarum in-
gruaria delineati
gurguliones fabis
ceantur
gustus ieiuno bebe-
immutent
guttus saginus
gypsum musto con-
gypsi utilitas

Habis Hispania
ram docuit

I N D E X.

glans, bonum cibus 3, 12 quercus obſceni-
tatem refert 153, 13 glans dulciſſima
153, 35. 154, 7 maxima 154, 13 o-
ptima & grandiffima 156, 19 glans
cerrea 160, 26 fagea 163, 39 omniū
dulciſſima ibid. 40
glandis honos cuſtoditus 152, 34 glan-
dis nomine omnium arborum fructus
contineri 250, 10
glandes nutrices inopis ac fere ſortis
147, 11 glandes multarum gentium
opes 147, 12 panis vice ſubeunt 147,
14 ſecundis menſis in Hiſpaniis ſub-
eunt ibid.
glutinum abdicat robur 159, 19
Gnoſſorum cupreſſeta 83, 29
gongri oleam infeſtant 447, 10 quo alio
indicentur nomine ibid.
Gordianus ſenior 9, 23
gorphia Syrorum qua ligna 457, 39
goſſipium lini genus 900, 1
Graca vanitatis exemplum 253, 3
Gracia ſterile ſolum 182, 2
Graci oleagineam coronam Achilli &
Aiaci donant 440, 28 Themiftocli
& Euribiadi coronam ex olea largiti
440, 30
grandinem quid remoretur 561, 5. 648, 2
Gratia, ſive Charites 80, 25. 82, 11 Gra-
tia poetarum tres 584, 24
guaria delineatio 679, 29
gurguliones fabis infeſti 875, 13 uti ar-
ceantur ibid.
guſtus ieiuno hebes 568, 22 guſtum qua
immutent 568, 23. 28
guttus ſaginus 164, 21
gyſſum muſto commodum 566, 27
gyſſi utilitas 571, 19 & 20

H

Habis Hiſpanie 814, 36 agricultu-
ram docuit ibid.

habitacla diuerſi generis 3, 15 & ſeq.
habix radix 787, 9 quo nomine au-
thoribus indicetur 787, 11 habix
cælum calidū exoptat 787, 22 etiam
naſcitur ſua ſponte 787, 25
Hamorrhous, αἰμορροῦς, ſerpens 629, 25
halicaſtrum 845, 15
haliphaenarratio 162, 12 ſpecies 162,
58 delineatio ibid. 22
Halirrhodius Neptuni filius 442, 37
harpe, auis aquila ſimilis, hederam nidis
ingerit 635, 36
Harpocrati perſea ſacra 13, 33. 176, 10
Hebe, Hercules uxor 134, 13
Hecale ſonchon Theſeo apponit 665, 6
hedera arbores amplexatur 636 hedera
Cilicia 618, 23 nullo odore 634, 11
quo ſigmento Gracis orta ibid. 13 Bac-
cho ſacra 13, 32. 581, 1. 634, 17 &
37. 635, 2 ſatis omnibus inimica 635,
21 hedera Cilicia nomen 618, 35 de-
lineatio ibid. 39 genera & ſolum 619,
22 hedera nominatio 635, 40 hedera
genera & deſcriptio 636, 10 hedera
amplexus arbores infeſtat 636, 39 he-
dera cælum 638, 17 ſolum & ſatio
638, 34 & 36 cultus, ars & materies
639, 10 & d.
hedygum Tarētinus quid vocet 749, 15
hedyſmos, herba 705, 13
hedyſnois Plinij 663, 22. 664, 7 hedy-
ſnois unde nomen capiat 664, 18
Helena, inſula 630, 25. 631, 5
Helena lachryma herbam producant
629, 25
Helenium Helenes inuentum 13, 11
helenium, herba 629, 23 unde enatum
629, 25 hilaritatem efficit ibid. 29
ut condiatur 629, 34 & 39. 630, 7
eius delineatio 630, 21
heleoſelinum 686, 3

Z Z Z 2

IN VILLAM

<i>Heliades, Phaetontis sorores</i> 138, 3 in ar-	<i>Herculis uxor</i> 134, 13 <i>quercus</i> 13,
<i>bores mutata</i> ibid. & 142, 6	14-154, 22 <i>Herculis claua ex olea-</i>
<i>helica vitium</i> 538, 36	<i>stro fuit</i> 448, 40 <i>terra defixa sponte</i>
<i>helice, è salicis genere</i> 144, 17	<i>effloruit</i> 449, 1 in <i>Herculis honorem</i>
<i>helichrysos, sine amarathus</i> 609, 10 vn-	<i>Olympici ludi inuenti</i> 449, 12 <i>Her-</i>
<i>de dicatur</i> 609, 27	<i>culis delubrum</i> 743, 35
<i>heliochrysi delineatio</i> 609, 39 <i>heliochry-</i>	<i>Herculi sacra populus</i> 13, 33
<i>sos ubi nascatur</i> 610, 14	<i>Herodis tristitia & pestis, filua commoda</i>
<i>heliostrophos Apuleio quid</i> 743, 19	<i>lenata</i> 14, 19
<i>helix</i> 636, 13 & 18 <i>helicis genera</i> ibid.	<i>heroes animu reru rusticare relaxarunt</i> 9, 15
26.637, 27 & 32 <i>helix fructum non</i>	<i>Herous sinus</i> 116, 35
<i>gignit</i> 638, 12	<i>Hesperidum horti</i> 257, 5. 743, 34
<i>helleborum feritur in Thaso</i> 556, 5	<i>Hetruria ut creuerit</i> 8, 24
<i>hemeris an diuersa à quercu</i> 153, 35 <i>he-</i>	<i>hiems ab ilice predicatur</i> 148, 21 &
<i>meris descriptio</i> 154, 5	<i>quercu</i> 153, 25 <i>hiems comoda</i> 255, 1
<i>hemerocallis Dioscoridis</i> 607, 21 Theo-	<i>hieme celi rigorem non soli probamus</i>
<i>phrastru</i> 607, 30	560, 15
<i>Heractia, urbs Campania</i> 718, 3 <i>eius</i>	<i>Hierapolis Syria</i> 621, 13
<i>ortus & interitus</i> ibid.	<i>Hiero</i> 13, 3
<i>heraclion papaueris genus</i> 739, 3, & 9	<i>hilaritas nullam abssemio</i> 493, 16 <i>hi-</i>
<i>herba tinctorum</i> 902, 1	<i>laritatis effectrix buglossa</i> 670, 32
<i>herba quid</i> 65, 22	<i>hippomelides</i> 167, 5
<i>herba lachrymis quoque nascuntur</i> 179,	<i>Hippodamia Pelopi nubis</i> 389, 25
10 <i>herba an insitione admittant</i> 222,	<i>hippoglossus, lauri species</i> 120, 2 & 21
28 <i>herba vel odorata vel inodorata</i>	<i>hippolapathum</i> 744, 24
580, 13 <i>herba condimentaria</i> 682,	<i>Hippolyti habent</i> 449, 26 & <i>currus</i> ibid.
22 <i>herba segetem anticipantes suffo-</i>	<i>hipposelinon</i> 683, 3. 686, 26 <i>hippose-</i>
<i>cant</i> 812, 7 <i>anteuerse necantur</i> ibid. 8	<i>linon Dioscoridis, aliud ab eo, quod</i>
<i>herbarum arborumque fructibus ve-</i>	<i>smyrnion vocat</i> 688, 30
<i>scuntur ac victitant animalia</i> 2, 2	<i>hippuris vitis minus pruinâ curat</i> 560, 24
<i>Herculeius</i> 12, 28	<i>hircinus adeps</i> 558, 24 <i>hircinus sanguis</i>
<i>Hercules oleastrum unde attulerit</i> 11, 10	<i>magneti trahendi virtutem restituit</i>
<i>abietem euellit</i> 80, 15 <i>Iunonis serpen-</i>	798, 10
<i>tem interimit</i> 257, 25 <i>ad auferenda</i>	<i>hircus Baccho immolatur</i> 494, 30.
<i>mala medica missus</i> 258, 7 <i>ludorum</i>	642, 23
<i>Olympicoru inuentor</i> 444, 3 <i>primus</i>	<i>Hispania pauperes tributum soluunt</i> 6, 4
<i>oleastro coronatus</i> 449, 18 <i>Hercu-</i>	<i>Hispani secundis mensis glandes inse-</i>
<i>les Iouis filius ex Alemens</i> 590, 23	<i>runt</i> 147, 15
<i>in suam patriam redit</i> 718, 28 <i>mili-</i>	<i>Homeri Laertes</i> 9, 25
<i>tibus suis urbes aedificat</i> 718, 30 & 32	<i>homines quare ex arboribus nati puten-</i>
<i>Buzgyes cur dictus</i> 815, 3	<i>tur</i> 3, 32

ho m

hominum alim
10 hominu prin
num ratio aut
17, 20
Horatius Cocles,
hordei enarratio
hordus veteribus
horreum
Hortensius, ab hortu
hortensium semen
hortus coronarius
hortus quid 6
641, 20 horti
portere 644, 21
celum solumq
tra horto inna
649, 6
horti Hesperidum
hortorum deua
medi contra co
hortis quis loc
hortis quale cie
at
hostis nequam qua
2 hostis quid
humani actus o
negotio
humor a gelu exin
humoris indig
da alimenti
hyacinthinus color
hyacinthus in horti
duplex, hystori
20 hyacinthus
606, 5
hyacinthi med
scriptio 605, 29
maxime prouen
tur 606, 3
hyacinthi poci
hyacinthi pue

I N D E X.

quercus 13,
is claua ex olea
ra defixa sponte
rculis honorem
 449, 12 *Her-*
 743, 35
 13, 33
filia commoda
 14, 19
laxarum 9, 15
 116, 35
 17, 5 743, 34
 8, 24
 148, 21 *Et*
comoda 255, 1
soli probamus
 621, 13
 13, 3
 493, 16 *hi-*
offa 670, 32
 167, 5
 389, 25
 110, 2 & 21
 744, 24
 628, 21 *ubi*
 6, 26 *hippoc-*
undab eo, quod
 688, 30
na curat 60, 24
irritus sanguis
ntem restituit
atur 494, 30
um solium 6, 4
is glandes in se-
 147, 15
 9, 25
us nati puen-
 3, 32
ho m

hominum alimenta poma & semina 2,
 10 *hominū primi Arcades* 3, 37 *homi-*
num ratio aut imperans, aut audiens
 17, 20 (149, 22)
Horatius Cocles, Sublicii pontis defensor
hordei enarratio 850, 7
hordus veteribus granidus 850, 18
horreum 50, 26
Hortensii, ab hortis 11, 40
hortensium sementes tres 646, 35
hortus coronarius quid contineat 580, 7
hortus quid 641, 7 *hortus olitorius*
 641, 20 *horti locum irriguum esse o-*
portere 644, 2, 13 *horto qui locus, quod*
caelum solumq; deputetur 582, 21 *con-*
tra horto innascentes bestiolas media
 649, 6
horti Hesperidum ubi sint 257, 5
hortorum deus 641, 23 *hortorum re-*
media contra cœli noxas 647, 38
hortis quis locus deputetur 642, 25
hortis quale cœlum solumve conueni-
at 642, 38
hostis nequam qua soli parte euadat 453,
 2 *hostis quid* 453, 4
humanus actus omnis aut villa est aut
negotatio 15, 13
humor à gelu eximitur 452, 27
humoris indiga, pinguioris sunt ani-
da alimenti 809, 38
hyacinthinus color 605, 40
hyacinthus in hortis nutriendus 605, 19
duplex, historicus & fabulosus 605,
 20 *hyacinthus fabulosus, sine poeticus*
 606, 5
hyacinthi medici nomen 605, 27 *de-*
scriptio 605, 29 *species* 605, 37 *ubi*
maxime proueniat 605, 39 *non feri-*
tur 606, 3; (scriptio 606, 36)
hyacinthi poetici nomina 606, 33 *de-*
Hyacinthus puer in florem conuersus

606, 22 *regis filius* 207, 20
Hyacinthum quare puerum fingant
poeta 605, 25 (28 & 38)
hydrolapatho, rumex in aqua natus 744
hydrophantica 37, 13
Hyperboreorum cibi 2, 20
hyphear, & stelis 76, 4
hyssopus, hortensis herba 697, 32 *unde*
nomen nata 697, 36 *duum gene-*
rum 697, 39 *hyssopus vulgaris* 698,
 4 *hyssopus Dioscoridis ibid.* *hyssopus*
Hebraeorum 698, 5

I

Iacintus 593, 31, 39
Iaculum ex aquifolio 107, 30
Iani insigne, falx 16, 31 *Ianus corollarum*
inuentor 580, 26
Iannarii calendis cur lauri folia & cari-
ca donata 113, 40
iasme frutex 598, 1 *eiusq; nomen* 598, 18
descriptio 598, 16 *genera* 598, 22
cœlum 598, 28 *solum* 598, 29 *satio*
 598, 31 *insitio* 598, 39
Iasonis navis in Colchidem vecta 80, 2
Icarus insula 764, 4
icteros caltha arcetur 611, 11
Idæ spelunca aditus 135, 18
Idæ, mons Phrygiae pini refertissimus 87,
 28, 93, 5
ieiuniorum alimentum ex pingui succo
 809, 40
ignis qua ligna non ladat 101, 19 *ignis è*
filice à Prometheo primum exceptus
 680, 11, 747, 2 *ignis ferula asseruatur*
 746, 41 *ignis continuo ferularum at-*
ritu elicitur 747, 4
ilex, arbor glandifera aterna virens, casa-
rie 147, 31 *Iouis sacra ibi* 33 *ilex mi-*
nor 148, 2 *ilex frequenti icitur fulmi-*
ne 148, 2 *arbor infasti ominis* 148, 8
ubertatis indicia prebet 148, 18 *dna-*

IN VILLAM

rum specierum 148,30 ilex nigra à Poe-
tis appellata 148,41 ilex in Vaticano
149,12 ilex aquifolia coccifera 149,
30 milex Plinio, sed perperam 149,32
ilex femina 151,34. 152,12 & 18 ilex
aquifolia, vel sterilis vel fructifera
149,36 ilicis aquifolia descriptio 149
38 quo loco maximè nascatur 150,27
qualem producat materiem 150,32
ilicis materia 149,11
iligna corona 147,32. 152,33
Illicet nonissimum verbum 81,36
Ilium, Iliumulus 154,20
imbecillia paratiora ad opus sunt 694,22
ab externis facilius patiuntur ibi. 23
imber viti florenti noxius 558,27 im-
brestempestini 255,11 inopportuni
floribus qui 583,30 imbrum pra-
nuncia oxyis 678,8
imperandi prudentia 21,36
imperij nota, ferula 746,23
imprecationibus feritur cuminum 695,1
imprudencia plus, quam scientia prodest,
incommodat 23,23
India venenosa animalia 3,29 India oc-
cidentales 849,17
Indi arandinibus nutriuntur 2,29 Indi
lectos in arboribus sternunt 3,29
Indorum cibi 2,19 habitatio 3,28
Indorum Seres 4,19
Indus fluuius 2,19
inertibus nasturtium mandendum 667,15
infantis subrumi febricitantis remedium
749,1
infoliatio 212,21
inguinum tumor 388,20
inoculatio, inferendi modus 208,33 et-
iam satio dici meretur 209,31
Ino Dionysij nutrix 495,8
inopia à rege perfertur 12,33
insitio, agricultura pars nobilissima 178,

21 insitio quid 206,35 insitio, quæ
truncus finditur 213,20 insitio an
herbis conueniat 222,28 insitio per re-
scissionem 548,10 per contactum
550,22 per terebrationem 550,37
insitionis necessitas, utilitas, voluptas
204,34 insitionis modi 208,32 insi-
tionis nouus modus, anularis nuncu-
patus 211,20 insitionis, quæ refecta ar-
bore fit, ratio 212,6 insitionis præcepti-
ones 214,34 insitionis temporum ra-
tio 216,21
insitione meliores redduntur fructus
181,40 insitiones vitis tres 548,9
insurculatio 212,6. 213,22
intubacea Theophrasto quæ 659,35
intubi quid 659,37 intubi paratus &
conditura 661,24 intubus siluestris
662,1 intubus erraticus 662,9
inula conditura 629,39. 630,7
Ioan. Baptista Porta in eloquentia studiis
non admodum exercitatus 1,20 agri-
cultura studiosus 1,24 nouus Atlas
ibid. arbores confert 540,38
Ione, nymphe 595,39. 596,1
Iones per brassicam iurabant 714,15
Io in vaccam commutata 448,17. 593,
4 olea alligata 448,17
Iouis sceptrum ex acere 128,23 in Iouis
tutela ciuitates 153,2 Iouis stella, anni
qualitatum index 254,19 Iouis Stra-
tij ara 154,22 Iouis simulacrum è vi-
te 579,1
irion, siue erysimon 868,2
iris, flos coronarius 607,39
irrigatio, cultui maximè necessaria 232,
18
Isthmia in Melicerta honorem instituta
87,40
Italia querno folio assimilata 154,25
omnium terrarum alumna 154,27

caustarum genti
lia toto orbe po
lia soli concessa
iteratio (sato) semit
Iuba Mauritan
Iudas Romanor
Iugarius deus
inglans à coronan
ingum an cornib
inuba 381,40
Iulia Augusta qu
Iulii Caesaris ima
12 Iulii Cæsa
pramonstrat
Iulius Vindex ad
iuniperus, arbor
103,17 somn
mina 10,330 d
104,9 celi &
terius ad quid
na 104,40 in
tur
Iunonis simulacr
sus 171,21 Jun
per 157,24 I
inpha Syrorum
Iupiter sagittalis
iure iurandum p
714,15 per a
iuris origo Cere
inuenum officia,
xepedam quid
xepia, inglans
xomelita 275,5 p
L Abor a pecc
Lacedæmon
566,28
lac cyrenæum 5
lactea via

I N D E X.

caunctarū gentiū patria 154, 31 *Italia* toto orbe potior olimetis 453, 14 *Italia* soli concessa arborū ratio 538, 18
iteratio sato semine sequitur 822, 36
Iuba Mauritaniae rex 13, 9
Iudaei Romanorum tributarii 6, 4
Iugarius deus 815, 4
inglans a coronamentis abdicata 581, 4
ingum an cornibus illigandum 815, 28
iuniba 381, 40 (629, 39)
Julia Augusta quotidianus cibus, heleniū
Julii Caesaris imago lauro coronata 115, 12
Julii Caesaris cades laureo ramulo praemonstratur 115, 31
Julius Vindex adsertor libertatis 694, 3
iuniperus, arbor resinifera bacciferaq;
 103, 17 somnū affert 103, 18 eius nomina 103, 30 descriptio ibi. 34 genera 104, 9 celi & soli 104, 21 & 26, materies ad quid utilis ibi. 28 eius resina 104, 40 iuniperus a pecore respuitur 148, 33
Iunonis simulacro caprifici ramus suspensus 171, 22 *Iunonis* hortorū custos serpens 257, 24 *Iunonis* lac 590, 23
iupha Syrorum 786, 15 (442, 36)
Iupiter fagutalis 163, 18 *Iupiter Morios* iure iurandum per brassicam conceptum 714, 15 per allium capasq; 798, 23
iuris origo Cereri attribuitur 807, 24
iuuenum officia, seniorum imperia 23, 32

K

κερπιδάμ quid 71, 14
κερπιδάμ, inglans 581, 5
κερπιδάμ & κερπιδάμ, prouerb. 83, 4

L

L *Abor* a peccato profluit 6, 18
Lacedaemonii ut mustum emendent 566, 28 (23)
lac cyrenaicum 555, 13 *lac Iunonis* 590, 1
lactea via 590, 27

lactuca in acetariis optima 654, 7 *lactuca* genera 655, 17 *lactuca satio* 657, 35 *lactuca* quas artes admittat 658, 14 *ab erucis* & vermiculis ut vindicetur 659, 29 *lactuca leporaria* 665, 18 *lactuca* sine eruca non edēda 666, 1
lactucina unde dicta 665, 20
Lactucini, e familia *Valeria* 655, 6
lacus Lucrinus 9, 41
lacus aerem inficit & fructum 251, 20
lacturres, e brassica genere 719, 31
Laertes Homeri 9, 25
letitia efficiens causa vinum 493, 2
Lampsaceni Crassi minas explorant 88, 9
Lampsacus, Hellepontiorbs, qui olim appellata 88, 28
lanarum tintura 154, 39
lanificium ex arboribus 4, 17
lanigera arbores 4, 17
Lanoni fluminis filia 113, 18
lapathi nomen ab effectu 744, 13 *lapathi* & rumicis discrimine 744, 35. 745, 12
lapillus puniceus in robore genitus 157, 15
Larignum, castellum a D. Cesare debellatum 101, 5
Larissa solum frigidius factum 453, 12
larix, arbor conifera, resinifera, perdisolia 99, 15 *laricis* descriptio 99, 28. 100, 7 *larix* quo caelo oblectetur 100, 17 *larix* celebris, a Tiberio Cas. in pontenau machario exposita 100, 21
laricis materies 100, 21
latifolia arbor 161, 14 (14)
Latinus Latij rex, Circa filius 114, 9 &
Latona, Apollinem & Dianam enixa 440, 6 *Latona* porri capitati dicantur 794, 40
lauandula & lauanda 633, 36
Lauinium, Ital. oppidum 114, 13 item & *Lauinia* ibid.
Laurentum, Italia vrbs 12, 11 *Lauren-*

IN VILLAM

eum, crebris lauri filius 14, 17 nomen
 eius originem unde traxerit 114, 9
 Laureia, libertus Ciceronis 112, 2
 Laureia, una 10, 36. 115, 12 Laureia Poe-
 tarii infigne 116, 2 Laureia usus in deo-
 rum coronis & sacrificijs 116, 13
 Laureum scipionem gestare : prouerb.
 113, 31
 laurus Apollini sacra, fulmine non icti-
 tur, diuinationem in somnis prabet 113,
 29 arbor siluestris 112, 36 triumphis
 dicata 112, 38 pacifera ibid. 40 usu
 laudabili 113, 1 & d. 114, 4 & seq.
 115, 3 laurus Delphicatribus radici-
 bus 115, 9 laurus triumphantium pro-
 pria 115, 29 bonigenii planta 118, 22
 laurus Alexandria 120, 7 laurus vi-
 tem offendit 116, 2, 9
 lauri miracula 115, 20 & d. lauri ra-
 mulus in Luia gremium dimissus 115,
 20 lauri nomina, ac genera 116, 32
 lauri delineatio 117, 15 quo caelo pro-
 ueniat 117, 34 quo solo 118, 3 lauri
 satio & plantatio 118, 4 lauri insitio
 119, 8 lauri materies cuius usus 119,
 10 lauri species 119, 22
 Laydis Cyreni in hortis schola 9, 33
 lege antiquitus homines nulla vinebant
 807, 22
 legumina quid 806, 29 leguminum
 historia 869, 3
 legum origo penes Cererem 807, 24
 Lemnia terra 877, 14
 lens & leticula 885, 17 eiusq. historia ibi.
 lentiscus, arbor resinifera, baccifera 105,
 8 eius nomen 105, 11 descriptio ibid.
 16 lentisci satio 106, 1 insitio ibid. 3
 materies & resina 106, 5, 10
 Lentuli, a lente 869, 10
 leones cur Cybeles currui adiuncti 13, 25
 leo ilicis foliis calcatis torpore corripi-

tur 148, 1 leones alio peruntum non
 attingunt 798, 22
 leonis dens, herba 664, 4 & 21
 leporaria lactuca 665, 18 leporum estu-
 lassorum remedium ibid.
 leptophyllon Dioscoridis 707, 17
 leptoraga Plinii 497, 10
 Lesbi nemus incensum 89, 27. 97, 12, 22
 leucoion quid, eiusq. nomen 593, 10 de-
 scriptio 594, 1 leucoion bulbaceum
 595, 9 leucoio commune 595, 11 leu-
 coion Dioscorideum 595, 11
 leucoii genera 594, 16 caelum 594,
 32 solum 594, 36 satio 594, 37 cul-
 tus 595, 7
 leuson, quid 79, 18
 lex Delphis lata de porro 795, 4 lex duo-
 decimabularum, de glade in alienum
 procidente fundum 147, 16
 libanotis seu rosmarinus 632, 8 qua
 Graecis fabula 632, 15
 Liberi patris platanus & laurus 13, 16
 librorum appellatione qua contineantur
 125, 21
 licinia olina 451, 32 (121, 38
 lienis antipathia mirabilis in tamarice
 ligneus canis 732, 15
 lignum suberis non fluitat 151, 32
 lilium rosa nobilitate proximum 590, 21
 Iunonis lacte natum 590, 23 pulchri-
 tudinis symbolum 590, 28 Veneri in-
 nisum 590, 32 lilium rubrum 606, 34
 lilii nomen 591, 3 descriptio 591, 14
 lilii genera 591, 34 caelum 591, 37
 solum 591, 39 satio 591, 40 cultus
 592, 18 ars 592, 20 coditura 592, 37
 de limone, mali medica specie 269, 24
 limonia mala 266, 30
 lingua cordi coniuncta 176, 10 lingua
 bubula 670, 35
 lini in lolium transgressio 835, 24
 linum

linum, & eius
 liquores humanis co-
 mi
 lira, & liratum seve-
 lirare bonum est 81
 18. & 82, 27
 liras rustici quas p-
 Liriope nymphea
 Lissas orator
 litora lagubres inf-
 Linia Drusilla lau-
 Lixum Mauritan-
 ubi Hesperidum
 locorum propria vi-
 Locrensum origo
 Locrus urben con-
 locusta ab agri tud-
 rantur 443, 26
 rum media
 lollimutationes in
 lio origo & tra-
 lolium, segetum
 que historia
 lomentum, farina
 lora quomodo pare-
 Lotus pudicitia in
 15
 Lotophagi 2, 33
 populi 2, 33 L-
 12 & 17
 lotos arbor 2, 33
 30
 loti arboris fru-
 170, 3 mater-
 lotos, herba lauda-
 mine 629, 10
 ut a Dioscori-
 e semine nascit-
 Lotos nymphea in
 22
 Lotus, arbor silue-

I N D E X.

- linum, & eius enarratio 896, 10
 Liguores humanis corporibus duo gratissi-
 mi 443, 14
 Lira, & liratum serere 799, 28 & 29
 Lirare boum est 812, 17 Lirare quid ibid.
 18. & 822, 27
 Liras rustici quas porcas vocant 813, 34
 Liriopenympha 601, 6
 Lissias orator 127, 7
 Litera lugubres in faba 876, 11
 Linia Drusilla laurea 115, 20. 118, 36
 Lixum Mauritanie oppidum 743, 34
 ubi Hesperidum horti ibid.
 Locorum propria vitia 474, 36
 Locrensum origo 732, 16
 Locrus urbem condidit 732, 16
 Locusta ab agitudine per olea folia libe-
 rantur 443, 26 locustarum arcenda-
 rum media 651, 35. 652, 3
 Lolij mutationes in triticum 835, 20 lo-
 lij origo & transmutatio 860, 3
 lolium, segetum vitium 859, 23 eius-
 que historia ibid.
 Lomentum, farina fabacea 875, 14
 lora quomodo paretur 565, 19
 Lotus pudicitia insidiatus Priapus 642,
 15
 Lotophagi 2, 33. 168, 31. 169, 5 Libya
 populi 2, 33 Lotophagorum regio 170,
 12 & 17
 Lotos arbor 2, 33 vinax & longana 169,
 30
 loti arboris fructus in cibum ut veniat
 170, 3 materies 170, 17
 Lotos, herba laudata 629, 5 equinoco no-
 mine 629, 10 unde dicatur ibid. 12
 ut a Dioscoride depingatur 629, 17
 e semine nascitur 629, 21
 Lotos nymphea in arborem conuersa 168,
 22
 Lotus, arbor siluestris 168, 20
 Lucina dea 155, 41 Lucina arca Roma
 169, 31 Lucina unde nomen sortua
 169, 33
 Lucina augurum in abiete 76, 10
 L. Quintus Cincinnatus agrum colens,
 dictator creatur 12, 23
 Lucullus in villa vitam finit 9, 20
 lud Olympici 11, 10 nauales 11, 12 A-
 theniensium 11, 15
 luna Diana vocitata 68, 34 quando ca-
 lidissima 560, 41 quando fructus pu-
 trefaciat 561, 1 luna crescente omnia
 gliscunt, & senescente tabescunt 787,
 37
 lupini historia 892, 24
 lupi salictarij, sine lupuli historia 731, 33
 Luscinie modulatio 7, 30
 Lusitanorum quercus 155, 2 Lusitani
 regis nauigatio 758, 14
 luxuria segetum inter vitia 825, 41 quo-
 modo castigetur 826, 1
 Lycei platanus 131, 29 & 34
 lychnis e Veneris labro nata 615, 25 un-
 de appellata 615, 27 lychnidis deli-
 neatio 615, 35 coelum 616, 6 cultus
 616, 10
 Lycurgus a Libero patre vitibus alliga-
 tus 715, 18
 Lydi, ubi fagum vocant 12, 5 Lydorum
 gens libidiosa 620, 25
 Lysander Lacedaemonius 12, 16
 lysimachia inuentor 13, 7
 Lysimachus Macedo 13, 8
 M
 Macilenti homines ex pingui succo
 multum trahunt alimentum 809, 40
 magnapium unde dictum 687, 2
 magnetis ferrum attrahentis virtus allio
 tollitur 798, 8
 Mago Carthaginensis 17, 38 (16
 maiorana delineatio 627, 10 genera 627,
 AAAA

I N V I L L A M

malache, è maluaceo genere	743, 7	de Materie cadenda & conseruanda	67,
malleolus quid	510, 36	malleoli ferendi	13
ratio	514, 8	malleoli ponendi modus	18, 7
	515, 17	Mathematica scientia	18, 7
malope, malus species	743, 6	matrifamilias horti cura mandata	640,
malua hortensis, vel rosea	616, 14		28
eius nomen	616, 18	Matthiolus Pliniū notans fallitur	608,
genus	616, 21	errat, anguriam esse cucumim sa-	17
descriptio	ibid. 24	titum	757, 39
solā & satio	616, 35 & 36	Mausolus Caria rex	13, 12
efficacia	742, 29	eius uxor	ibid.
genera	743, 5	Artemisia	ibid.
malua ingentis magnitudinis	743, 33	meconis, lactuca atra	655, 40
malua satio	743, 40	Medea Absyrius	447, 9
translatio	744, 1	medica arbor	257, 14
malum siluestre, nomen generale	173, 11	Medos amygdalis nutriti	2, 29
malum citrium	259, 24	medulla vitis pars vitalis non est	548,
arantium	267, 35		16
mala montana	173, 12	Megarensis oleaster	446, 6
siluatica	ibid.	melampyron, tritico connascens	861, 2
13 mala & nuces ut discrepent	250,	Melas, fluius Boeotie	552, 35
18 mala limonia	266, 30	mel Atticum optimum	624, 12
conditiua	450, 17	mellis angurium, thymus	623, 28
malorum siluestrium historia	173, 8	Melicertia Isthmia instituta	87, 40
cotoneorum	270, 20	meliloton, herba	627, 30
punicorū	397, 1	meliloti descri-	ptio
malus medica	257, 11	ubi nascatur	628, 12 &
mali medica vires	258, 26		15
malus aurea	267, 25	meliloton loqueris: prouerb.	627, 33
verna	285, 28	melissophyllon apibus gratissimum	633, 8
malus, & malum	275, 10	quibus nominibus indicetur	633, 15
mamma, rumen veteribus dicta	677, 28	duplicis generis, hortense & siluestre	633, 23
manica	787, 13	Melinus, Fraxini vir	112, 13
Manius Curius Imperator rapos torpere		Mellona, à melle nuncupata	250, 31
inuentus	777, 17	melones, veteribus incogniti	758, 12
manna verè melleū ex olea manat	445,	bilissimi in Ethiopia	758, 15
23 manna raris	744, 18	melones quasi pomei dicti	758, 21
marathron, feniculum	690, 24	melonum descriptio	758, 26
M. Agrippa septa	100, 26	quo loco & quo modo se-	rantur
M. Varronis studium in villa	10, 3		759, 18 & 25
M. Curius	12, 19	melones ut odorati reddantur	759, 33
Mariamna, Herodis uxor, à viro interi-		ut dulces	759, 37
mi iussa	14, 20	ut praecones	759,
Mariana quercus	10, 1	40 ut Calius admittant quies	760, 3
Marius Maximus	554, 4		mel-
Massageta siluestribus fructibus fruun-			
tur	2, 22		
Scythia populi, arbore ve-			
stuentur	4, 12		
Massyli Africa per saltus errant	3, 27,		

mempropon 750, 4
meloepones id
12
memecylon arbuer
Memphim e Persi
ta
mensis primis cucu
vi Graphanus
menta vis ad recr
705, 7 menta
menta belli ren
26 menta den
species 705, 37
1 an semine iu
reat 706, 18
706, 36
mentastrum, ment
600, 30
mercatura inferior
Mercurio sacrum
Mercurius ole
meretrix: blitea P
Merve Nilis insul
Mervus, Indiamon
mesphyllum quid
mesphili delineatio
20 morbi &
messis quid 831,
ibid.
metus multum c
24, 17
Midarex filiam
milax Plinij
Miletus, urbs Car
nata
milij descriptio 8
865, 1 Ethio
Miltiades à Lam
Minerva olea sac
nerua & Nept
438, 33, 43

conservanda 67.
 18,7
mandata 640,
fallitur 608,
cucumim fa-
 757,39
 12 eius uxor
 ibid.
 655,40
 447,9
 157,14
 2,29
 is non est 548,
 446,6
ascens 861,2
 552,35
 624,12
mus 623,28
uta 8740
meliloti descri-
 tur 628,12
uerb. 627,33
ti 633,8
dicetur 633,18
ense & *siluestre*
 112,13
ata 250,31
iti 758,12 no-
 758,15 melo-
 758,21
 58,26 genera
 759,18 & 25
damur 759,32
precoques 759,
ant 760,3
mel-
mepepon 750,4 à *pepone* differt 750,6
melopepones idem quod *melones* 758,
 12 ubi & plura.
memecylon arbuti fructus 166,36
Memphim è *Perfide* arbor *persea* transla-
 ta 10,34
mexsis primis *cucumis* damnatur 748,33
 ut *Graphanus* ibid.
menta vis ad recreandos animi affectus
 705,7 *menta* usus in cibis 705,8
menta belli tempore non edenda 705,
 26 *menta* denominatio 705,30 due
species 705,37 *menta* delineatio 706,
 1 an *semine* iuxta *Theophrastum* ca-
 reat 706,18 ferro tangi non uult
 706,36
mentastrum, *menta* species 705,38. 706,
 6 ac 30
mercatura inferior agricultura 5,5
Mercurio sacrum malum punicum 13,33
Mercurius olea inuentor 440,2
meretrix blitea *Planto* quid 742,3
Meroe *Nili* insula 2,35
Merus, *India* mons 638,18 & 26
mesphyllum quid dicatur 633,17
mespili delineatio 383,33 genera 384,
 20 morbi & remedia 385,33
messis quid 831,34 cuius tria tempora
 ibid.
metus multum confert ad diligentiam
 24,17
Midas rex *filiam* *Aty* despondet 87,11
milax *Plinij* 149,32
Miletus, urbs *Caria*, *Pityusa* unde nomi-
 nata 88,24
miliij descriptio 861,15 *milium* *Indicum*
 865,1 *Ethiopicum* ibid. 31
Miltiades à *Lampsacenis* dimissus 88,12
Minerva olea sacra 13,30. 438,9 *Min-*
erva & *Neptuni* contentio de *Athe-*
is 438,33. 439,6 *Minerva* capram

respuit 475,27 *Minerva* festa 7525
 14 *Minerva* *Boarmia* dicta 815,5
belli dea 580,29
Minotaurus à *Theseo* vincitur 11,5
Minthe, *Achaia* mons 705,12
Mintha puella fabula 705,17
Minutius *Augurinus* 845,6 cui statua
 propter *farris* pretium posita ibid.
minyantes 628,17 & 21
Mithridates *Pontis* rex 13,8 *laurum* ha-
 bere laborat 117,41
Mithridatis con pharmacum 710,33
Mnesithei error 842,24
moerum pro muro veteribus 250,3
molluscum *acerinum* 128,11
monachos non dedecet agricultura 15,8
Monobasia 503,11
mons transuersim sulcandus 813,40
montapium, ὄρεος ἑλίου 689,11
montiulmus quasi *montana* *ulmus* 138,21
morbi plantarum uniuersales 235,28
 peculiare arborum 238,37 speciales
 fructuum 240,8 morbi vel intrinse-
 ci, vel extrinseci 472,1 morbi intrin-
 seci vel copia vel inopia alimenti pro-
 ueniunt 472,2 morbi extrinseci aut
 secundum naturam, aut prater natu-
 ram 472,5 morbi extrinsecus ueni-
 entes qui sint 474,23
morbus quid 256,39
Morifolia *bombyces* alunt 432
morus arbor 327,17 qua forma 328,9
 duplicis generis 329,8 mori cultus ac
 insitio 330,14 & 21
mors mori anime *fabis* continentur 875,
 28. 876,9
moscata *asus* 679,8
moscum maioribus ignotum 497,37
Moses autorum verissimus 2,4
muceri, sine amygdale 421,17
muli *cucumerc* delectantur 748,37

I N V I L L A M

muliebris pili suffusus 561, 32
mulier cur viro imbecillior 24, 13 *cur*
timidior 24, 15 *mulier texens palliū*
cucumerē deuoret, prouerb. 749, 13
murenis infesta natura ferula 681, 4.
 746, 9
mures ut à vineis auertantur 561, 14
mures rurales ne officiant 652, 14 *mu-*
res agrestes à serpentibus lesi chondril-
lam edunt 662, 39 *mures à radicibus*
arcenti ratio 736, 36 *mures à fru-*
mentis abigendi medium 826, 14
Musa medicus 654, 14
muscata acus 679, 8
muscus ruber 453, 2
mustarda 709, 6
mustelas infestandi modus 653, 12 *mu-*
stela ruita, ut venenum defugiat, ve-
scitur 710, 35
mustum quomodo in dolia condendum
 566, 6 *quomodo purgandū* 566, 12
pluuīs frequentibus imbecillum, ut
curetur 566, 22 *toto anno dulce ut*
haberi queat 568, 38
mustum pro chyma quod dicatur 569, 6
musso iniecia origani, vinum dulce
efficit 698, 31 *mustum rutatum*
 710, 19
myacanthos quid quidam nuncupent
 728, 13
mycerus quid Ameriadi 421, 17
myrice, frutex siluestris perpetuo folio
 121, 4 *eius descriptio* 121, 24
myrrhis descriptio 679, 27
Myrsine Attica puella 388, 26
myrtatum obsonium 388, 9
myrtidani 388, 7
myrtus Veneri consecrata 13, 31
myrti commentatio 388, 4 *de myrto fa-*
bula 388, 27 *myrtus quibus historiis*
nobilitata 389, 10 *myrti nomē et for-*

ma 390, 29 & 38 *species* 391, 41 *myr-*
tus quo celo, quo loco proveniat 393,
 11, 35 *myrti plantatio* 394, 3 *culin-*
ra 395, 10 *insitio ibid.* 22 *conditu-*
ra 396, 1 *myrti cum olea familiaritas*
 448, 1

Myrsorum nomen à sago 12, 5
myrtota quid 800, 37
myxorum historia 344, 12

N

Nabidi suo Hispani rei rustica in-
uentum tribuunt 16, 28
napunculus 678, 27
napus quo solo proveniat 782, 31
napi seu buniadis pertractatio 781, 20
napi et rapi Galeno nulla differentia
 782, 8 *naporū probatio* 783, 3 & 15
Narbonensis pronuncia 569, 38
Narcissi fabula 601, 5
narcissi nomen 601, 18 *genera* 601, 32
celum solumq. 602, 30 *satio* 602, 32
ars 602, 39
narcissi à lilio differentia 602, 23
nardus seu odor 633, 32 *nardus ge-*
nuina veterum 633, 34
Nasamones palma viclitant 2, 31
nasturtij descriptio 667, 5
natura, rerum parens et nutritrix 1, 26
natura agros, ars humana vrbes con-
struit 10, 14 *frustra nil facit* 181, 1
natura et artis discrepantia 249, 12
natura arti succedit 555, 19 *natura*
qualitates continuatione permutan-
tur 840, 33
nanalium ludorum victores 11, 12
nausfragium omnium animantium 442, 2
necessitas feriis caret 23, 5
Neda fluminis 172, 3
negligens plerumq. adolescens 21, 27
negligentia plus obest, quam prodest scien-
tia 23, 23
 nego-

negotii omnis caput
 sit
Nemaei certaminis
nepita animi ex
Neptuni et Minervae contentio
Neronis amphibi-
ronis ultimo a-
desinit 115, 34
no lacu Ostiam
nescire se, quinquaginta
ssimum
nihil agendo homi-
 22, 30
Nili simulacrum
Nisa, India mons
nistrum una matris
Alexandrinum
nivis seruanda in-
multitudo 255
ualibus commo-
Noe arca 442, 2
ditans significat
nobilium Rom. cog-
 11, 34
noctua platani
Noe primus vine-
nona Romanorum
Norion, insula for-
uisse quid agendu-
 put
novalium cura et
pore assumenda
 814, 22
nuciperfici histori-
nucleus allii 799
nummis antiquior-
nuptiae sacra veter-
nux ingrans 414, 1
 417, 13 *nucis in-*
eius morbi, eorum

INDEX

negotii omnis caput, nosse quid agendum sit 19, 11
 Nemei certaminis victores 682, 30
 nepita animum exhilarat 705, 7
 Neptuni & Minerva de Atheniensi urbe contentio 438, 33-439, 6
 Neronis amphitheatrum 100, 23 Neronis ultimo anno Caesarum prosapia definit 115, 34 Neronis fossa à Baiano lacu Ostiam usque 502, 29
 nescire se, quenquam intelligere, pretiosissimum 23, 22
 nihil agendo homines male agere discunt 22, 30 (16, 37)
 Nili simulacrum agriculturam denotat Nisa, India mons 13, 16
 nitrum uvas maturat 554, 24 nitrum Alexandrinum 569, 15
 niuis seruanda inuentum 156, 8 niuis multitudo 255, 22 nives hibernis noualibus commendantur 811, 39
 Noe arca 442, 2 pacem hominibus redditam significat 442, 4
 nobilium Rom. cognomina ex arboribus 11, 34
 noctuae platanum refugiunt 130, 35
 Noe primus vineam plantauit 495, 28
 nona Romanorum Caprotina dicta 171, 23
 Norion, insula fortunata 681, 17
 nosse quid agendum, omni in negotio caput 19, 11
 nonalium cura & aestiuo & hyemali tempore assumenda 811, 35 nonale quid 814, 22
 nuciperfici historia 337, 29
 nucleus alii 799, 16 (153, 5)
 nummis antiquorum quercus inscripta nuptie sacra veteribus pappaua 844, 33
 nux inglans 414, 1 & dein. eius plantatio 417, 13 nucis inglandis insitio 418, 5
 eius morbi, eorum remedia 419, 5 con-

ditura ibid. 16 materies 420, 3
 nux Persica 414, 27 Thasia 421, 21
 Graca 421, 23 auellana 429, 13 eius historia 429, 29 auellana satio 430, 29
 nux Heracleotica 429, 14. 433, 32
 Praneatina 429, 17
 nuxes à malis ut distinguantur 250, 18
 Nymphae Bacchi nutrices 495, 8 & 33
 Nyssades nymphae 635, 8

O

Oblivio à vino inducitur 22, 39
 occidere quando opus 812, 20 unde & quid appelletur 816, 18
 occatio quid 816, 18 (4, 27)
 Oceani insula quaedam apud Diodorum
 ocimum quare à plerisque increpetur 700, 24 ocimi anceps nomen 701, 10 ocimi descriptio 701, 26 ocimi regio 702, 14 ocimi satio 702, 28 ocimi cultus vulgaris & artificiosus 703, 14
 ocima serere, prouerb. 702, 37 (8 & 20)
 oculorum caligo feniculi succo tollitur 690, 4 oculis inimica corambe 716, 31
 ocymum, idem quod ocimum 701, 25
 odorata aqua ex loto 629, 16
 odore solo Astomi visitant 2, 24
 odores oleo seruantur 444, 21
 odorifica vitis 557, 6
 oeconomus qualis esse debeat 17, 26. 18, 7 & deinceps oeconomia tria aduocata 19, 7 oeconomi officium in religione 19, 17
 oeconomus Christianus 19, 26 oeconomum vendacem non emacé esse oportet 20, 30 oeconomi domus 47, 8
 in oeconomia quid primum, quid secundum, quid tertium 24, 30
 oenanthe, è floribus coronariis 608, 30
 uago nomine 608, 31 unde denominatur 608, 34 quomodo describatur 608, 37 quo caelo gaudeat 608, 6

AAAA 3

IN VILLAM

OENEUS Orestei filius 494, 14 unde no-
men indeptus ibid.

OENEI capella 494, 20

OENOPION Chios vinea culturam docuit
494, 32

cenopolarum fraudes detecta 568, 16

offringere terram 812, 16

olea stirpium nobilissima 437, 28 quando

in Italiam pervenerit 437, 32. 438, 1

quamobrem Minerva dicata sit 438, 9.

13, 30

olea origo fabulosa 438, 31 olea inuen-
tio 440, 2 quo in honore fuerit Athe-
nienfibus 440, 17. 442, 11 quo Roma-
nis 440, 36 olea supplicantiū & pacis
symbolum 441, 2 olea necessitas & uti-
litas 443, 10 olea rei medica necessaria
443, 13 olea longana vita 444, 40 le-
ni cultu sustinetur 445, 8 ficu præsta-
tior 445, 14 olea prodigia 445, 30 olea
nomē 446, 28 olea & olina an discre-
pent 446, 31 olea cum myrto amicitia
448, 1 olea descriptio 447, 3. 448, 4 o-
lea ducentos vixit annos 447, 40 lon-
ge vita est 448, 16 urbana & sylvestris
448, 36 olea diuersa ab oleastro 449,

33

olearum domesticarū genera 450, 7

olea regia 451, 3 & 7 olea cœlum & si-
tus qui conueniant 452, 23 olea circa
Lariſſam deſierunt 453, 13 olea ſolum
debitum 454, 14 quibus modis naſca-
tur 455, 37. 456, 11 olea ſatio per ſemē
456, 12 olea plantatio per ingentes ra-
mos 456, 27 trunco in plures partes per
longum diſciſſo 457, 15 olea uſitatus per
ſobolem ſerendi modus 458, 20 olea
quomodo ex radicū oculis exurgat
459, 30 oleam ſerendi ratio per taleas
460, 36 olearum ſeminarium 461, 2

de olearum plantatione præcepta 461, 27

olea cum quibusdam arboribus odium

464, 1 & 2 olearū ſerendarū interual-
lū 464, 6 olea plantanda tempus 464,

24 olearū cultus 465, 6 olearū ſterco-
ratio 466, 10 irrigatio 466, 36 olea

inſtitio 468, 18 in olea quid arte para-
turve fieri poſſit 470, 8 olearū fertili-
tatis & caritatis prognostica 470, 28

olearū morbi 472, 1 & remedia, ibid.

olea nouella fertilitas, morbida eſt 472,

3 olearū particulares morbi, vt liche-
nes 472, 29 arachniū 472, 32 aut ara-
neum quoq; 472, 36 & alii deinceps.

olearum ſterilitas vt caſtigetur 472,

40. 473, 7 olearum morbi extrinſecus
venientes 474, 23

olea fructus duplex 486, 18 olea & o-
leaſtri materies 490, 1 olea & vitis cō-
cordia 554, 1

oleaſter pecus opimat 2, 11 oleaſtrum at-
tulit ex Hyperboreis Hercules 11, 10

oleaſtri origo 448, 38. 449, 5 oleaſter
elephantū amuleti 449, 19 oleaſter vt
ab olea differat 449, 33

Oleaſtrū oppidi nomē 449, 29 (12, 29

olea imperio a Diocletiano anteponitur
olei utilitas 443, 34. 444, 19 oleū inſanie
pharmacū 444, 13 oleū & oliuū vn-
de dicatur 446, 40 oleū Turditanū
455, 21 olei eliciendi inſtrumenta
476, 28 olei collectio 478, 15 olei a-
cerbi vel viridis faciendi ratio 479,

33 olei tria genera 479, 34 maturi
conficiendi modus 481, 29 vitis quē-
admodum vindicetur 482, 20 olei di-
uerſa quædam genera 487, 26 olei na-
tura Philoſophorum dogmatibus elu-
ſidata 490, 20

olitoria rei laudes 640, 15

olitorius hortus 641, 20 olitorii horti
remedia cōtra cœli noxas 647, 38 ad-
uerſum

ſerum beſti-

649, 6

oliva cibum ſuan-

olinarum cōd-

albarum 484

oliva colymba-

oluitati neceſſa-

475, 36 ante

randa 475, 39

1

oluſtrum 686,

olus cordum quid-

etur 641, 15

conueniat 643

olum 643, 32

entes 644, 31

ſunt oleribus ido-

num adhibenda-

olerum ſationes

ria 654, 5 eru-

666, 11 oleru-

minum 694,

nitate poſſim-

rum monſtrum

Olympia, Græcia v-

Olympias ſtatui-

gidus 474, 30

Olympicorum vi-

Olympicorum luo-

444, 3 corona

Olyra Mæſſibet 8

848, 24

omomelia 167, 4

Omphale mulier d-

onitis, origani ſpec-

onopetalum, origa-

operariorum quali-

operatrices artes bi-

tibus

Ophellus Carſiagi-

oph. oforidin

I N D E X.

- boribus odinā*
darū interual-
tempus 464,
olearū sterco-
466, 36 olea
quid arte para-
olearū fertili-
fica 470, 28
remedia, ibid.
orbida est 472,
morbi, ut liche-
72, 32 aut ara-
alis deinceps.
affigetur 472,
tribus extrinsecu
474, 23
5, 18 olea & o-
olea & vitis co-
554, 1
oleastrum at-
Hercules 11, 10
449, 5 oleaster
19, 19 oleaster ut
449, 33
29 (12, 29
no anteponitur
19 oleū infania
leū & oliuū un-
oleū Tarditanū
di instrumenta
478, 15 olei a-
endi ratio 479,
79, 34 maturi
1, 29 vitis quē-
482, 20 olei di-
487, 26 oleina-
dogmatibus elu-
490, 10
640, 15
20 olitorii horti
as 647, 38 ad-
uersum
- uersum bestiolas horto inuascētes*
649, 6
oliva cibum suauiore efficiunt 444, 32
olinarum cōditura 483, 37 olinarum
albarum 484, 4 nigrarum 485, 11
oliva colymbades quomodo fiat 485, 36
oluitati necessaria vasa uti ordinentur
475, 36 ante oliuitatem quae prepa-
randa 475, 39 oliuitatis tempus 477,
1 (688, 33
olusatrum 686, 27. 687, 7. 688, 19.
olus cordum quid 672, 10 olus quid vo-
cetur 641, 15 oleribus quale solum
conueniat 643, 1 & d. quale vitan-
dum 643, 32 oleribus aqua conueni-
entes 644, 31. 645, 9 qui fimorum
sint oleribus idonei 645, 25 oleribus fi-
mmum adhibendi tempus 646, 7
olerum sationes 646, 19 olera aceta-
ria 654, 5 eruce vicinitate inuuantur
666, 11 olerum fecundissimum, ca-
minum 694, 18 olerum quod duntur-
nitate potissimum 745, 6 olerum duo-
rum monstrum 802, 19
Olympia, Graciae urbis, ludī 449, 10
Olympias flatus in Chalcide Eubœa fri-
gidus 474, 30. 475, 9
Olympicorum victorum corona 11, 10
Olynpicorum ludorū inuentor Hercules
444, 3 corona ex oleastro 449, 11
olyra Mnesithei 842, 24 olyra historia
848, 24
omomelis 167, 4 (27
Omphale mulier dominatur Lydis 620,
onitis, origanī species 699, 19
onopetalum, origanī genus 699, 18
operariorum qualitas 26, 17
operatrices artes binis discriminata par-
tibus 21, 12
Ophellus Carthaginem petit 169, 8
oph. of. oriden 798, 36
- oporotheca 56, 18*
opuli descriptio 129, 24 & 30 eiusque
materiei vsus 130, 6 opulus vitem a-
lit 539, 1
orchites olea 450, 19 eius vsus 450, 23
orchitis denominatio 450, 26
ordeum, seu hordenum 850, 7 quot gene-
rum 850, 31 ordeo conueniens coelum
851, 13 accommodum solum ibid. 22
ordeisatio 851, 32 cultura 853, 8 in
lolium mutatio 853, 31 messisibi. 37
conditura 854, 7 ordeum hexastichō
sive cantherinum 854, 29 distichon
sive galaticum 855, 28
oreoselinon 683, 3
oreoselinum, herba 689, 6
Orestus Deucalionis filius 494, 11
origanī historia 698, 20 species 699, 20
descriptio 699, 30 satio 700, 10
oris suauitas ab apio 682, 30 oris odorem
commendat carduus 732, 24
orminum Attici quid vocent 728, 13
ornus, eiusq. qualitates & descriptio 124,
25 ornus pyriū malumq. recipit 125, 5
orobanche, erui vitium 889, 25
Orphei simulachrum ex cupresso 85, 36
Orpheus fabarum cibum prohibet 875,
24
oryza eadem quod olyra 848, 29 oryza
historia 855, 27
Osiris qui idem cum Dionysio, agricultu-
ra inuentor 16, 24
Osiris vitifator 493, 32. 494, 35 a-
ratri inuentor 814, 34
Osiris quid sit 635, 4
oues vlneis frondibus aluntur 3, 11
oxalidis historia 677, 16
oxalis, & rumicis genere 744, 23
oxylapathum primum 744, 20 secun-
dum ibi. 22 oxylapathi utriusque de-
lineatio 744, 25

IN VILLA M

oxys, sine oxytriphylon 678, 12 eiusq;
descriptio 678, 14
oximum, ab oza 701, 17

P

PAcis insigne olea 439, 9. 441, 12
Padus, a picea vocatus 96, 37 Eri-
danus quoque appellatur 137, 35
padagogorum insigne ferula 746, 27
Pales, pastorum dea 752, 24
Palilia festa 752, 24
palinurus 381, 21
Pallas Budia 815, 7
pallorē inducit cumini 693, 40. 694, 4
palma multos populos alit 2, 30
palme historia 345, 4 & d.
palmam dare, prouerbiū 11, 9
palmitū duo genera 545, 6 pampinarium
& fructuariū 545, 8 palmites precipi-
tes qui dicuntur 545, 24 palmitis genus
quod materiam vocant 545, 33
palmes focaneus quis 545, 35
paludapium, palustre apium 686, 4
palustria vsui inidonea 877, 23
pampini ad quid vitibus dati 538, 36
pampinula seu pimpinella 669, 31
Panathenea, Athenis magna sacra 441,
4. à Theſeo in Minervæ honorem in-
ſtituta 441, 5
Panathenai 11, 15
panace herba 631, 32 eius delineatio ibi.
pancraton, quasi omnia complectens bo-
na, herba 662, 10
Pan, deus agrestis 8, 17 Pityn adamat 86,
19 Panes epino comas facilitates ge-
runt 87, 32
panificii tractatio 834, 16
panis papaueris 737, 16, filigineus & si-
milaceus 839, 23 tiphinus 843, 32 ex
germano 843, 39 ex segala 844, 10 &
24 farraceus 846, 36 ex Zea confectus
848, 8 ex arinca 849, 4 olyrinus 849,

6, hordeaceus 854, 22 ex oryza 856,
22 ex aucna 858, 11 ex bromo 859,
21 fabaceus 875, 14
panici tractatio 861, 37
panthera allium fugiunt 798, 21
papaveris historia 736, 40 papaver ex
Veneris lacrumis natum 737, 15 pa-
paveris vis soporifera 727, 17 latifera
737, 18 papaveris specierum descriptio
737, 26 papaveris satio 739, 19
Papyrii de Parthis triumphantis corona
11, 3. 580, 34
paradiſi arbor 170, 34
Paridis naues ad Helenæ raptum parata
79, 40
Paridiſius Veterenſis filias uti dotauerit
494, 4
Parilia festa 752, 24
Parnassus ob laurum Phæbo ſacer 114,
40. 115, 1
Parthenius mons 767, 30
parthenium, pro amaraco 626, 39
partiū partes quoq; diuerſantur 877, 31
paſſi acini unde nomen ſortiantur 578,
13
paſtinaca, è cartilagineo genere 783, 21
duorum generum 784, 12
paſtinatio vitium 512, 8
Patauinorum vindemia ſalicem redolēt
556, 4
paterfamilias vide æconomus 17, 22 pa-
terfamilias religioſus 19, 17
Paulus Æmilius 11, 2
Pausanias doctiſſimus & ſuperſtitioſus
448, 38
pauſea, ſeu poſea 451, 16
peccatum peperit laborem 6, 18
pecora hyeme ſaſciculis frondium nutri-
untur 3, 7 pecorum cibus 3, 8 & 11
pediti viatori myrti virgis utendum 388,
19

Pelaſgis

Pelaſgis regio, à Pe-
31
Pelaſgi vir magni
glandium cibum
Pelei & Thetidis
Pelius Theſſalianus
Peloponneſus Ap-
Pelopi Hippodami
peponis enarratio 7
differat 749, 2
749, 40 unde
amelopepene d
Periclis caput oleo
441, 3
Perſarum nutritio
Perſa Romanorū ſ
arborem in A
176, 15 Perſa
xiii
perſea arbor ornam
gnio, 33 Ha
deperſea peregr
ſacra 176, 8 de
tradant
Perſeus Macedon
perſica quatuor
cia 331, 21 A
racina
è Perſide primun
ſea traducta
Peſti, Calabria q
peſtium remedia 14
rea utendum
petroſelinum noſ
pium 682, 2
683, 4 petroſ
689, 9 & 26
deſcriptio
Phaeton Solis &
fulmine ætius
138, 2

INDEX.

Pelagis regio, à Pelasgo nuncupata 152,
 31
Pelasgus vir magnus & sapiens 152, 30
glandium cibum Arcadas docuit ibid.
Pelei & Thetidis nuptia 124, 19
Pelius Thessalia mons 124, 20
Peloponnesus Apia unde dicatur 12, 6
Pelops Hippodamia potitur 389, 25
peponis enarratio 749, 19 an à cucumere
differat 749, 26 sine semine edendus
 749, 40 unde nomen sortitur 750, 1
à melopepone discriminatur 750, 6
Periclis caput oleaginea corona incinctū
 441, 3
Persarum nutrimentum 2, 30 reges 6, 2
Persa Romanorū serui 115, 28 letalem
arborem in Ægyptum transmittunt
 176, 15 *Persarum frugalitas & lu-*
xus 667, 8
persea arbor ornamentū Alexandri Ma-
gni 10, 33 *Harpocrati sacra* 13, 33
de persea peregrina arbore 176, 3 *Ifidi*
sacra 176, 8 *de persea diligetiores quid*
tradant 177, 8
Perseus Macedonia rex 441, 20
persica quatuor generum 331, 17 *preco-*
cia 331, 21 *Armeniaca* 332, 24 *du-*
racina 333, 29
è Perside primum Memphim arbor per-
sea traducta 10, 34
Pesti, Calabria oppidi, rosaria 588, 8
pestis remedia 14, 15 *pestis tempore lau-*
rea utendum 116, 24
petroselinum nostrum, antiquorum a-
pium 682, 25 *ut veteres indigitarint*
 683, 4 *petroselinon, in saxis nascens*
 689, 9 & 26 *petroselini Macedonici*
descriptio 689, 21
Phaeton Solis & Clymenes filius 137, 38
fulmine ætus in Eridanum labitur
 138, 2
Pelagis

phalangium in eruo nascens 823, 40
Phaon inter lactucas absconditus 655, 4
phaseolus eiusque historia 891, 1
phanlia olea species 451, 10
phaunos olea fri 449, 25
phellodris delineatio 152, 10
Philomela mille per vocum discrimina
canit 7, 30
Philometrus 13, 3
philosophia commodus locus, villa 9, 15 &
d. philosophia naturalis agricola ne-
cessaria 17, 34
philosophis facile ditari 5, 26 *philosophi*
ruri vitam agunt 9, 29
Philotis ancilla, eiusque facinus 171, 25
Philoxenus, Aristotelis auditor 875, 37
philyra veneri sacra 13, 32 *philyra Theo-*
phraستي 108, 7 *Dioscoridis* 108, 25, 41
Philyra, Oceani filia, à Saturno ada-
mata 125, 11
phoca pellis ad quid conferat 561, 3
phthisicis cōducunt sylva resinosa piccave
 14, 11
phthorium vinum 556, 6
Phytognomonici scriptores 14, 2
picea 96, 15 *Neptuno & Libero patri*
consecrata 96, 21 *arbor feralis* 96,
 35 *eius nominatio* 96, 39
picris, unde nomen adepta 662, 27 *toto*
floret anno 662, 34
pimpinella historia 669, 19
pinastr quid 95, 16 *uti appelletur* 95, 17
quot generum sit 95, 22 *eius descri-*
ptio 95, 26
pingui cibo indiga sunt sicca corpora 810,
 1
pinus, arbor siluestris 86, 12 *Cybele deū*
matri sacra 86, 26 *natura imagi-*
nem refert 87, 29 *fraudi dicata* 87,
 31 *mortis symbolum* 88, 3
pini denominatio 88, 13 *descriptio*
 BBBb

I N V I L L A M

88,32 species 90,8^o cœlum 90,16
 solum 90,27 satio 90,38 cultus 91,
 21 morbi & remedia 91,26 condi-
 tura 92,12 pini materies 92,16 pi-
 nus ingēs, pulchra cognominata 93,6
 pini resina 93,10
 pinus tractatio 408,15 fabule de pinu
 408,21 pinus plantatio 412,3
 Pinus puella fabulosa historia 86,18
 piperis vicem supplet myrtus 388,8 sili-
 quastrum 714,19
 piperitis 714,25 & 32
 pisces apio recreantur 682,29
 pisi historia 879,1
 Pisones, a piso 869,10
 pistacorum descriptio 431,30 satio 432,
 28
 pithire quid 738,11
 pithitis, papaueris genus 738,8
 Pityodes & Pityusa, maris Balearicis in-
 sula 12,8. 88,27 alia eiusdem nomi-
 nis in sinu Argolico ibid.
 Pitys puella 86,20
 pix optima & purissima 93,21 quomo-
 do vratur 94,12 Plinio quid 94,32
 pix liquida Europa 95,3 picis duo
 genera, spissum & liquidum 95,11
 pix epicea 98,20
 plante ante omnia animalia mundo na-
 ta sunt 2,3 plantarum fructus ad
 hyemalem cibum reponuntur 2,21
 plante quibus modis exoriantur 179,
 9 plantarum sponte nascentium gene-
 rationes 179,28 plantarum generatio
 ex radice duplex 185,1 plantarum
 internalla 193,30 morbi & corru-
 ptiones 235,31 sua principia partim
 intus habent, partim extrinsecus 236,
 14
 plantationis modos suppeditabit satio 178
 platani praecurium 130,9 nominatio, de-
 lineatio 131,10 & 17 locus & satio
 132,27 & 38 insitio ac materies 133,
 14,22
 plenilunius omnia rubigine afficiuntur
 560,40 plenilunio incrementum ca-
 piunt cucumeres 748,31 echini mari-
 ni ibid. 32
 Plinij error 74,26 mos vertendi per-
 uertendi Theophrastum 687,25
 Plinij & Columella conciliatio 837,21
 Plutonis cupressus 13,32
 Plutus Aristophanis 14,30
 podagricis idoneus hordeaceus panis 854,
 26
 inter Pocula erratorum deinceps commi-
 nisci parum conuenit 680,34 sed le-
 uis reprehensio sufficit ibid. 36
 penitentia rei gesta nil agricolis facilius
 193,39
 Poeta, unde ex arboribus homines fingant
 procreatos 3,34 poetarum, in signe
 10,30. 11,17. 116,2 poeta vino ingur-
 gitandi 492,20 poetis smilax sacra-
 tur 618,28 hederacea corona 635,
 23 poetas lacte ac melle pasci 635,31
 Polemon vetustus Aristophanis enarra-
 tor 795,3
 Pollio uti ad magnam atatem perueniret
 443,22
 polypremni herba succus arboribus ac-
 commodus 252,39
 pomarij materia & obiecta 249,21 La-
 tinis quid 249,33 pomarij positio &
 locus 251,3 pomurio solum quod con-
 ueniat 251,30 pomarij arbores ut fe-
 cundiores euadant, media 252,31
 pomelum, seu pomarium 249,37
 pomifera arbores aut frondem retinent
 aut dimittunt 147,28
 pomarium quid notet 250,2
 Pomona pomorum dea 250,30 a Ver-
 tumna

tummo adamat
 Pompeij fascibus
 Pompeiani Campi
 unde nomen
 tus & interuui
 pomum Adami
 nius adheresc
 6 generetam
 tiner
 poncerium, acru
 pons ilicis materi
 Pontica arbor, qu
 populi a cibis nom
 populus, Herculi
 arbor infelix
 135,3 popu
 339,24 in a
 28 ad alenda
 nenit
 Populania, arbo
 579,1
 portricide
 porra, quid dica
 porritrattatio 7
 tur 795,8
 11 & 22 qu
 porrum silu
 vitiginem
 Portius Latio
 stros
 portulaca vitib
 7 portulaca
 portulaca sat
 posca oliua speci
 Posthumus Sil
 potus herbi di
 bras
 Pranesse Italia
 148,6
 praesentia domi
 praesentia do

INDEX.

- locus & satio
 materies 13, 3
 ine afficiuntur
 crementum ca-
 31 ecbini mari-
 ibid. 32
 vertendi per-
 um 687, 25
 nciliatio 837, 21
 13, 32
 14, 30
 acem panis 854
 incepti commi-
 80, 34 sed le-
 ibid. 36
 gricolis facilius
 homines fingant
 etarum infigne-
 petra vino ingur-
 is simulacra sacra-
 a corona 635, 7
 epasci 635, 34
 ophanis enarra-
 794, 3
 uatem peruenire
 us arboribus ac-
 252, 39
 249, 21 La-
 omarij postio &
 solum quod con-
 rij arbores ut so-
 media 252, 31
 249, 37
 ondem retinere
 147, 28
 250, 2
 250, 30 à Ver-
 tumas
 rumno adamata 250, 31
 Pompeij fascibus laurus alligata 115, 38
 Pompeiani Campania populi 718, 26
 unde nomen sortiti 718, 32 eorum or-
 tus & interitus ibid.
 pomum Adami 270, 8 pomum folij v-
 nius adharefcētis 176, 9 quid sit 250,
 6 genere tam mala quam nuces con-
 tinet 250, 22
 poncerium, acriū citriorū genus 269, 38
 pons ilicis materie structus 149, 19
 Pontica arbor, qua viuūt Arimphai 2, 31
 populi a cibus nomen sortiti 2, 32
 populus, Herculi dicata 13, 33, 134, 11
 arbor infelix 134, 2 populi genera
 135, 3 populi & ulmi differentia
 539, 24 in arbusco recipienda 539,
 28 ad alendam vitem maxime con-
 uenit 540, 6
 Populonia, vrbs Iouis simulacro celebris
 579, 1
 porricide 797, 17
 porra, quid dicatur 812, 23
 porri tractatio 794, 29 unde nuncupe-
 tur 795, 8 duorum generum 795,
 11 & 22 quali loco proneniat 795, 34
 porrum siluestre 797, 33 vineale vel
 vitigenum 797, 38
 Portius Latro clarus inter dicendi magi-
 stros 694, 1
 portulaca vitibus putredinē inhibet 560,
 7 portulaca descriptio 676, 18 & 31
 portulaca satio 677, 11
 posca oliuæ species 451, 15
 Posthumus Siluius 115, 36
 potus herbidi per montium aestina salu-
 bres 14, 14
 Præneste Italia vrbs unde nomen indepta
 148, 6
 presentia domini quantum polleat 19, 37
 presentia domini, prouentus agri 20, 2
 prati percontatio 904, 12 prati genera
 905, 8 prato aer, solum, aqua qua
 conueniant ibid.
 prata quomodo fiant 905, 37 facta quo-
 modo colantur 905, 16
 premnus, olea morbus 447, 12
 Priapus salignam falcem curgerat 143,
 28 Loton deperit 168, 23 hortorum
 deus 641, 28 Corinthiis in magna ve-
 natione 642, 10
 proditor quis 24, 2
 Prometheus è silice ignem ferulis excep-
 pit 680, 21 à Minerva in celos sub-
 latus 746, 41 ferulam accensam in
 terrā deportat 747, 1 primum ignem
 è silice pronocauit 747, 2 ignem feru-
 la asseruari docuit ibid.
 propagatio plantarū 186, 39 unde nun-
 cupata 187, 2 propagatio duplex, ar-
 borum, & herbarum 187, 10
 propius sata aliis qua perniciem inferant
 245, 16
 proscindere terram 812, 15
 Proserpina à Plutone capta 601, 15
 aduersus Pruinam vineas ledentem re-
 media 605, 9 pruina suauitate plan-
 tis confert 723, 33 nonalibus officit
 811, 39
 pruni commentatio 339, 17 prunorum
 genera 340, 18
 pseudonardus odore prestantissima 633,
 28 eius species & nomina 633, 32
 quemadmodum feratur 634, 5
 Ptolemaus Euergetes Aristarchi disci-
 pulus 734, 20
 pubertatem coerces hyacinthus 605, 23
 puerilis atas ad agriculturā apta 27, 5
 puerperis petroselinon denitandū 683, 6
 pugio, flos 607, 40, 608, 3
 pulegium herba condimentaria 703, 40
 capiti salubre 704, 1 quid miri de eo
 BBBb 2

IN VILLAM

prodiderint 704,3 unde deuocetur
704,29
pulegij species 704,38 regio & satio
705,1
pulices hortorum abigendi rationes 650,
24 pulices terra originū enecat 757,
21 raphanis innaſcentes eruum arcet
775,37
pulmentaria ruris 800,39.801,8
pulueratio oleis prodeſt 465,25
pulsis vitibus excitandus 533,24 licet
ſiccus nonnunquam alit 753,3
pumila cerasus 380,6
punica arboris hiſtoria 397,1
panicum malum Mercurij 13,33 puni-
corum malorum enarratio 397,1
purgatoria vitis 556,30
purpura ſarrana 596,7 purpure Tyria
Laconicaque 614,30
putatio diſſicillima cultus vitis pars 544,
12
putens quando effodiendus 644,4
pyanipſia, feſta Apollinis 869,22
pyra cypreſſo circumdata 81,33 pyri hi-
ſtoria 287,35
Pyrethi, Cappadocia magi 121,12
Pyrrhæum nemus incenſum 89,27.97,
12,22
Pythagoras & Pythagorici an faba veſcā-
tur 875,32 Pythagorei cupreſſino li-
gno abſtinebant 86,4
Pythia carmina, a Pythone ſerpente dicta
114,22 Pythia oraculum 2,36
pyracantha Nicandri 732,31
Quæſtus vinearum 5,30 & 36
quercus Ioni dicata 13,27.152,35
153,1 arborum prima nata 152,24
153,3 cibum militibus ſuppeditat
153,1
quercus diuturnitas 153,10 quercus

an à hemeri differat 153,35 quercus
diſtributio 153,35 qua cœli conſtitu-
tione proueniat 154,33 quercus ſa-
tio 155,14 quercus cum olea odium
155,21 an pyrum ferat 155,31 quercus
materies 155,34 infinita æternitatis
156,1 domeſtica arbor 156,13
quercum cum olea complicari prouer-
155,25
quies in toto natura opere 546,27
quincuncialis arborum ordo 541,19.196
3 eius typus 197,24
quinquatræ Minervæ feſta 752,14
quinquennales ludi 11,16
quinquennes ulmi transferuntur 541,3
Radicis plantatio 185,1 radicis ge-
nera 771,31
radicis (orinthia) deſcriptio 776,19
radius maior 450,33 ad eſcam idone-
us ibid. 37
radius minor ſive radiolus 450,40 un-
de nuncietur 451,1
rami quid dicantur 189,5 per ramos ſe-
rendi modus ibid.
ramoracia ſive ramoracea, aut etiam ar-
moni 776,11
ranarum ſanguis viti commodus 558,25
rapa in ſinapi ſeruatur 708,38 rapa-
rum apparatus 778,1 an generis di-
uerſitatem habeant 778,40.779,5
quale cœlum, & quod ſolum appetant
779,27 & 35 raparum coſtitio 780,7
raphani tractatio 770,30 in delphico
templo cateris cibis antelatus 770,40
raphano aſſignat Plinius qua Theo-
phraſtus braſſica 771,6 raphani gene-
ra 771,30 raphanus frigoris gan-
dei 773,24 raphani ſatio 773,34
raphani artiſcioſe producendi ratio
774,33
raphanus

raphanus ſilue
ſum quid a ſilue
& ſeri & trans
rapus terra
raporum tractati
rapum & plum
phico 777,16
nulla
rapunculus, acetu
eius ſatio
rauca, vermes in
tes
Rauenna omnium
alveis palis
regalis ſtudio agri
reges agricultura
obrem ſcepta a
regionum propria
Remi & fratris v
rerum parens ac n
reſinarum alia cau
mellei coloris 9
28 iuniperi
Rhabarbarum mo
rheas papeuerum
Rhea dea vitis
Rhegium
Rhemnus Palam
Rhiſtophagi nomi
Rhodiorum tribu
1344 Rhodi
precantur
ridica radicibus
praſtat
rigandi hora ma
703,15
Riphaei montes
robignalia ferie Ro
a quo & quana
Robigus, deus
roborenum prarobo

INDEX.

33, 35 quercus
a celi constituta
3 quercus sa-
um olea odium
155, 31 quercus
nita aternitatis
r 156, 13
plicari prouer.
546, 27
rdo 541, 19
197, 24
esta 752, 14
11, 16
eruntur 541, 1
1 radice ge-
771, 31
riptione 776, 19
a eam idone-
ibid. 37
us 450, 40
451, 1
per ramos fe-
ibid.
a, aut etiam ar-
776, 11
modius 58, 25
708, 38 rapa-
an generis di-
78, 40 779, 5
solum appetant
cussio 780, 7
30 in delphico
telatus 770, 40
ius qua Theo-
6 raphanigen-
frigoribus gau-
satio 773, 34
ducendi ratio
raphanus

raphanus siluestris 776, 1 & 10 diuer-
sum quid a siluestri raphano 776, 12
& feri & transferri potest 776, 31
rapus terra 617, 16
raporum tractatio 777, 1
rapum e plumbo dicatum in templo Del-
phico 777, 16. rapi & napi differentia
nulla 782, 8
rapunculus, acetariis conueniens 678, 23
eius satio 679, 4
rauca, vermes in quercus radice nascent-
es 464, 1
Rauenne omnium operum fundamenta
alneis palis 143, 6
regalius studio agri colendi nihil 10, 21
reges agriculturæ dedit 12, 13 regibus quæ
obrem sceptræ assignentur 746, 26
regionum propria sunt munera 823, 8
Remi & fratris vita 8, 24
rerum parens ac nutrix, natura 1, 26
resinarum alia candida, alia nigra, alia
mellei coloris 99, 23 resina laricis 101,
28 iuniperi 104, 40
Rhabbarum monachorum 744, 40
rheas papauereum genus 738, 8, 15 & 27
Rhea dea vitis 494, 35
Rhegium 12, 40
Rhennus Palamon 5, 37
Rhiſſophagi, nominati Ethiopes 2, 34
Rhodiorum tributa 6, 5 ludi funebres
134, 4 Rhodii veniam a Romanis de-
precantur 441, 23
ridica radicibus a ventis securitatem
præstat 550, 10
rigandi hora matutina: atque vespera
703, 15
Riphai montes 2, 20
robignalia feria Robigo instituta 824, 22
a quo & quando 824, 26
Robigus, deus 582, 18
robosenum pro robore veteres 156, 25

robur, commune glandiferarum arbo-
rum nomen 147, 23 robur quid 153,
9 a quercu differt 156, 12 unde nomē
sumat 156, 26 qua forma 156, 28
quando cadatur 159, 5 roboris fru-
ctus 157, 1 materies 158, 32
robusti unde viri præstantes dicti 153, 8
Romanis Iudæi tributum pendunt 6, 4
Romanorum nobilia cognomina vi-
de 11, 34 Romani posteriores Tiburti-
bus 149, 13 a Romanis pacem rogant
Alexandrini 441, 20 Rhodii ibi 23
Romani farretanum principio vsq; 845,
4 Romanorum clariss. cognomina a
leguminibus 869, 10
Roma pulcherrima facta 8, 25 Romæ
pons ilicis tantum structus materie
149, 19
Romana maiestas magnum olea hono-
rem præbuit 440, 36
roratio vitium morbus 557, 39 tribus
de causis accidit ibid.
rosa inter flores princeps 583, 35 Veneri
sacra 13, 32. 584, 13 humane vo-
luptatis imago 584, 29 Cupidini di-
cata 584, 32 rosa multiplex fabula
584, 37 rosa vitæ humane speculum
585, 14 scarabeum necat 585, 20
scorpionis amuletum 585, 23 amule-
tum serpentis 585, 23 rose nomen 585,
26 descriptio 585, 30 genera 586,
10 cælum 587, 34 rose solum 588,
11 satio 588, 15 cultus 589, 11 insti-
tio 589, 22 ars 589, 32 conditura
590, 10
rosa rudis 798, 24 (612, 36
Rosam cum anemone conferre: prouer.
rosamarinus qua natura qualitate 632,
8 & d. quomodo seratur 632, 36 cul-
tum exigit 633, 4
Rubignalia 254, 31

I N V I L L A M

rubiginis tractatus 824, 4 rubigo quid
824, 8 pro rubigine remedia 825, 1
rubrica Lemnia 253, 30
rumen veteribus mamma 677, 28
rumex, seu oxalis 677, 27 inter olera
recensitus 744, 8 apibus incommo-
dus 744, 10 eius usus in cibis 744, 11
quot generum 744, 19 rumex quid
744, 35 rumicis & lapathi interstin-
etio 744, 35. 745, 12
Rumpotinu quid vocetur 539, 3. 546, 32
rumpotinarum arborum spatia 547, 1
runcatio, qua sarritioni subiungitur 823,
23
ruri domicilium proborum 14, 32
rustica vita beatos efficit homines 8, 27
urbanam antiquior 10, 9 rustica vita
commoditates 15, 18 & d.
rusticum opus sapientie consanguine-
um 14, 25 (ra 494, 3
rusticis nil convenientius vitis cultu-
rusticum de farre canticum 846, 19
ruta simum aspernatur 645, 28 ruta v-
sus & conditura 710, 17 nomina &
descriptio 711, 18 & 12 cultus 712, 11
amicitia cum fico 712, 35

S

Sabei thure abundant 6, 3
Sabellici populi qui 719, 22
sabina, perpetua coma 120, 27 alia ste-
rilis, alia frugifera ibi. 31 sabina her-
ba duorum generum 120, 34 sabina
non herba sed frutex ibid. 40 vti pro-
pagetur 121, 1
Sabinorum veterum vita 8, 23
sacchari historia 902, 14
Sagunti Diana templum 104, 30
sala corruptionis vitio vindicat 159, 26
trahit absumentq. humorem 773, 14
salsa aqua plurimum fertilitati confe-
runt & suavitati 727, 10

salsa tellus frugibus infelix 810, 25
Salentinorum regioni olimeta ingentia
452, 8
salix, arbor necessaria 143, 19 salicis
species ac descriptio 144, 5 & 20 sa-
lix quo loco, quaveratione proveniat
145, 5 & 13 salicis insitio & materies
146, 7 ac 16 an vitum commodet 539,
9 & 15
salignum lignum vini vitium omne tollit
572, 22
salinca Virgiliana 633, 35
Salomon sapientiss. 13, 2
Salona Diocletianus ruri agit 8, 1 Salo-
na olet 12, 29
salpa obscenus piscis 746, 40 non nisi fe-
rula vapulans coquitur ibid.
salsicortex 162, 16
salvia historia 713, 19 salvia & spha-
celi differentia 713, 37
Samnitum aurum repudiatum a M. Cu-
rio 12, 22
sampsucum, herba 626, 12 an idem cum
amaraco 626, 37 unde appellatum
627, 21 sampsuci descriptio 627, 1
sandition quid nuncupetur 667, 25
sanguisorba, quibusdam pimpinella 669, 33
sanitas ex villa conquiratur 13, 37. 13, 38
santion quid nominetur 667, 25
scarabeus frumenta rodens 825, 24
scella, sine scilla 805, 8 (26
sceptra qua de causa reges usurpent 746,
schœnum Galeni 805, 8
schola in hortis 9, 33
scilla bulbi beneficio sata facilius compre-
hendunt 555, 24 scilla, è capitatoru
genere 804, 31 scilla delineatio 805,
12 species 805, 33
Scipio Linternum deligit 9, 24 Scipio
Africanus 11, 1
sclarea unde derivetur 811, 18

scolopendrea gladio
scolymi descriptio
scondi inuenior
scondopras histor
scondos effodiendi
scylla vide scilla
Scytharum Argip
habituacula 3, 2
siri
Scythicum fru
scit
sapa quo tempore
sapientia rusticum
sapius, quibusdam
98, 29 alius ar
pinex species 98,
stica
Sardis in Lydia
Sardina per Arist
13, 10
Sardorum demen
sarmenta vitium
27 quatuor ad
enda
Saron Archadia n
rex
Saronicus sinus a
15, 32
saronos, antiquis q
sarrire quid
sarrino
sationes plantarum
arborum petr
culi 191, 15 sari
posse 192, 22 sari
8 sationis plan
200, 26. 819, 1
1 & deinceps
satorum pestes
satureia feritur in
endis 695, 15
scole-

I N D E X.

scoropendrea gladiolo gaudens 608, 8
scolymi descriptio 732, 34
scordii inuentor 13, 8
scorodoprafi historia 802, 14
scrobes effodiendi precepta 198, 20
scylla vide scilla
Scytharum Argippai 3, 25 *Scytharum*
habituacula 3, 27 *Scythas arbore ve-*
stri 4, 12
Scythicum frumentum celeriter cre-
scit 704, 9
sapa quo tempore coquenda 570, 37
sapientie rusticum opus affine 14, 25
sapinus, quibusdam inferior abietis pars
98, 29 *alii arbor peculiaris* 98, 30
pinica species 98, 3 *Porta picea d me-*
stica 99, 12
Sardes in Lydia 12, 15
Sardina per Aristum arboribus consita
13, 20
Sardorum dementia 2, 8
sarmenta vitium quando colligenda 511,
27 *qualia ad vitis insitionem accipi-*
enda 549, 25
Saron Archadia nemus 153, 33 *Saron*
rex 153, 33
Saronicus sinus a quercu nomen accepit
153, 32
saronos, antiquis quercus 153, 32
sarrire quid 822, 31
sarrutio 822, 29 & 36, 823, 1
sationes plantarum multifaria 178, 29
arborum per truncos 188, 9 *satio sur-*
culi 191, 15 *sationem etiam foliis fieri*
posse 192, 22 *satio per lachrymam* 193,
8 *sationis plantarum statuta tempora*
200, 26, 819, 16 *varia precepta* 203,
1 & deinceps
satorum pestes 245, 18
satureia feritur in hortis pro cibis condi-
endis 695, 15 *utilior medicina in*

montibus provenit 695, 16 *satureia*
genera, ac descriptio 696, 28 & 36
locus & satio 697, 1 & deinceps
Saturni vita 8, 26 *reliquia* 10, 16 *Sa-*
turnus rei rustica inuentor 16, 26
Philyram deperit 125, 11 *genitori Cae-*
lo genitalia detruncat 809, 13 *filios*
cur fingatur deuorasse 181, 13
satus per excellentiam 819, 24
Satyri factas epino comas gerunt 87, 32
savina, idem quod sabina 120, 29
secalis historia 844, 6
segala, veterum siligo 844, 6
Segeta segetum dea 807, 16
segetalis flos 608, 3
Segetia segetum dea 807, 17
segetis enarratio 806, 6 *seges quid* 807,
11 *segetum cultura* 811, 24 *vitia*
& *remedia* 823, 31 *segetum fertilita-*
tis pranotio 826, 34
Seia, segeti addicta dea 807, 17
selinum odoratum, urbanum, hortense
683, 1
Semele, Cadmi filia, eiusque fabula 494,
41
semen frumenti genus 846, 38, 847, 22
semen producentia nascuntur omnia se-
mine 180, 37 *semine nata non omnia*
degenerant 181, 31 *semen vetus natu-*
ram aliquando immutat 721, 12 *se-*
mine sata omnia meliora nascuntur
800, 25 *semina ne depascantur ab a-*
litibus 801, 39 *seminum electus in se-*
rendo 818, 23 *seminum vita ad gene-*
randum desinita 818, 27 *seminu vi-*
tia quadam communia, quadam pro-
pria 823, 35 *seminibus morbi ex qui-*
bus causis proveniant 824, 1 *seminis*
corruptio & putrefactio 836, 2 *seminu*
natura vinacior quam animalium
836, 10

I N V I L L A M

sementis tempora	819,16	seruia corolla	80,22
seminij principium ab aere	180,8	Seuero Imp. cupressus mortis ostentum	
Semiramidis Persarum regina horti	61,20	82,3	
Semnones dii qui	641,29	sesamum, sesama, sesima	866,8
senecionis descriptio	664,23	seuilmalachon, quasi maluacea beta	
senectus pigrum quem reddit	21,28	741,16	
seniorum sunt imperia 23,32		Sextius e Romanis sapientia affectatori-	
senibus		bus	5,27
conueniens baculus ex ferula	746,32	Sibylla oracula	582,13. 824,34
747,8		ficca corpora pingui indiga sunt cibo	810,1
Serenitates vitia frumentis afferunt	808,32	Siculus Siciliæ rex	808,3
Sergia bacca, siue Sergiana	452,4	siderati plantarum morbus	237,9
serendi ars diuina 13,21		sideritis Dioscoridis	669,30. 670,3
serendi tempora 646,31		siderum influxus in plantis liquido perci-	
præceptiones	821,39	piuntur 18,9	
Seres, apud Indos, lanificio silvarum nobi-		sidera tam a nantis quam	
les	4,19	agricolis obseruanda	18,14
Serica indumenta	4,18	Sidon ab Artaxerxe obfessa	441,16
seris herba 659,34		660,7	
duum gene-		660,22	
rum 660,22		seris seu chondrilla	663,2
Serpens fraxinis succum odit	122,17	ab	
Hercule interfectus, inter Arctos rela-			
tus 257,25		quercinis foliis iniectis	
moritur 156,22		serpentes punica ar-	
bore non arceri contra Africanum &			
Plinium 397,10		Serpens in vinde-	
miis viti implexus acidum prædicit			
vinum 567,30		Serpentis virus è vino	
ferrum elicit 572,22		Serpentes trifol-	
ium fugiunt 628,20		quibus depel-	
luntur 653,16		nasturtij suffitu fu-	
gantur 667,16		Serpens senectam ex-	
uens 690,3		& deinceps, serpentes ex	
hortis abigit ruta 713,20		accersit sal-	
uia		ibid.	
Serpilli an inter coronarias herbas locum			
sibi vendicare possit 621,28		unde no-	
men indispiscatur	621,37		
Serta cur Stephani dicta	580,27		
Sertula campana, seu melilotum	627,30		
& 40			

regiones, qua
siluaglandaria
siluestria satius
& siciora omni
siluestrium arboru
silurus piscis
sinapi callidiorem
sinapios vsus 708,2
species
Sinus Saronicus
sisseris enarratio 7
sit
Symbrium, odor
qua cum denom
genera 625,8
cælum 625,29
& 16 semine
tus
Symbrium, vete
ricula
situm, & setan
situm villa
siluaceæ arbores
siluax Arcadu
siluacis flos
Smyrni Dioscori
36
Smyrnon agre
Socrates per plata
vnum exstima
derat
solanum esculentu
745,18 horte
24 sponte pro
sol Elektor vocita
soles latiores qu
Soloni in multis
stius
solstitium per oled
28 solstitium
dat

regio-

80,22
vris ostentum
866,8
maluacea beia
tia affectatori
5,27
82,13, 824,34
a sunt cibo 810,1
808,3
bus 237,9
669,30, 670,3
is liquido perci
n a nautis quam
18,14
sa 441,16
675,15
595,34
618,28 ferula
759,22
55,5, 205,13
17 tritici deli
urbani habitus
dicitur 848,27
850,12
01,39 siliqua hi
164,34
891,29
let 714,19 sili
714, ibid.
8,17
appellati 11,35
equitus 3,15 & d.
acula 4,5 numi
ne sanitati confe
tignorum duplex
la 62,6 silua quid
62,34 silvis que
regio-

regiones, qua loca abundant 63,11
siluaglandaria 147,6
siluestria satinis priora 61,27 acriora
Et sicciora omnia 797,35
siluestrium arborum natura 65,37
silurus piscis 561,1
sinapi calidiorum esse 709,9
sinapios usus 708,20 deriuatio 709,13
species 709,18
Sinus Saronicus 12,8
siferis enarratio 785,2 quando seripos
sit 785,21
silymbrium, odorata planta 624,35
qua eius denominatio 624,40 qua
genera 625,8 eius descriptio ibid. 11
caelum 625,29 solum Et satio ibid. 33
Et 36 semine caret 625,35 eius cul
tus 626,1
Silymbrium, veteribus comediis mere
tricula 625,1
sitium, Et setanium 840,37
situs villa 31,11
smilaces arbores 148,35
smilax Arcadium 152,8
smilacis flos 618,23
smyrnijs Dioscoridei descriptio 687,26 Et
36
smyrnion agreste 688,34
Socrates per platanum iurat 131,5 deum
unum existimat 153,18 per quercum
deierat ibid.
solanum esculentum 745,16 hortense
745,18 hortense quot generum 745,
24 sponte pronenit 745,34
sol Elector vocitatus 137,36
soles latiores quando sint 8,1
Soloni in multis adiutor Epimenides Pha
stius 442,22
solstitium per oleam indicatur 448,6 &
28 solstitium astinum quando inci
dat 813,22

solum idoneum 32,16. 809,25 solum
fugiendum 36,7 soli vitia ut emen
dentur 37,6 ad solum fundi necessa
ria 44,5 soli qualitates explorandi
ratio 810,11. 811,2
somnia vera videri laurus efficit 113,38
somnos allicientes flores 581,10 somnus
hedypnoide conciliatur 664,19
sonchos, σόνχος 665,5
soporifera vis papaueris 737,17
sorbi genus siluestre 174,15 vsui medico
aptius 174,19
sorbis, Et sorbum 296,35
sorices a vincis abigendi ratio 561,14
Sospiter Paphius quando floruerit 734,
19
de Spanachis percunctatio 741,3
sparagus apharesi, asparagus 728,17
species alia in aliam naturaliter non com
meat 835,23 specierum mutationes
sunt in propinqua genera 837,6
spelta siue spentria 847,19
Spermophagi unde dicti 2,35
sphaceli delineatio 713,38
sphacos, salvia species 714,4
spica nardi 633,32
spina alba 174,37 spina siluestris 174,
39 spina nuptialis 175,4 spina E
gyptia 619,28 Theophrasto ἀκιστος
619,32 Dioscoridi spina Arabica
ibid. 33 duarum specierum, candida
Et nigra 620,3 ubi nascatur 620,8
spiritus silens sensu perspicuus 453,30
spiritus vegetiores nascuntur reddun
tur 667,14
splenetico homini remedium tamarice
121,40
spleni medetur myrica 122,7
sponse olim asparago in coronis use 727,
19
spuma Gracis ἀππος 801,9

IN VILLAM

temporatus primum
temporis ratio p
134, 6 temp
pretantur phy
temulentia a refini
rum odor § 81
brafficam pol
mulentia § 81
temulentia percon
terebinthus arbor
101, 37 tereb
genere 102, 1
refina 103, 5
fii
terebra quibus
terebratione infer
terra cultura qu
mandata 2,
bores 2, 8 ter
fat § 11 sine
terra mater
rarum plant
2 § 2, 14 ter
textrices, venerin
14
Thales Milesi
thelyphiboron
thelythamnon
Themis Atlant
Themistocles à
honoratus
Theodori versio
Theophrasti hor
theriaca sine thy
Thefi, demit
Thefens magna
441, § 44
Thefo jonch
Themophora,
cupata § 807
Theffali regio

M I N D E X .

tempestatis prænuncia oxyss 678,5
temporis ratio per populum indicata
134,6 tempus per Herculem inter-
pretantur physici 134,11
temulentia restinguit hedera 581,4 flo-
rum odor 581,7 contra temulentiam
brassicam pollere 715,25 & 32 te-
mulentia & crapula discrimen 716,20
temulentis percommoda baccaris 631,26
terebinthus arbor nomen unde sumperit
101,37 terebinthus maris & femina
genere 102,1 terebinthi insitio 103,1
resina 103,5 terebinthus Theophra-
sti 431,35
terebra quibus vites perforantur 551,15
terebiratione inferendi modus 218,23
terra cultura quæ qualisq; Adamo de-
mandata 2,7 terrâ antiquiores ar-
bores 2,8 terra imperium non recu-
sat 5,11 sine usura nihil reddit 5,12
terra mater & Ceres dicta 10,15 ter-
rarum plantis aptiorum optima quæ
252,14 terra a terra differt 809,1
textrices, veneri maxime opportune 749,
14 (471,1
Thales Milesius Astrologus 5,19.18,40.
thelyphthoron 620,23
thelythamnon 620,23
Themis Atlanti quid prædixerit 257,28
Themistocles à Græcis oleaginea corona
honoratus 440,30
Theodori versio notata 82,37
Theophrasti hortus 9,34
theriaca sine thyriaca vitis 556,10 & 21
Thefei, denicto Minotauro, corona 11,5
Theseus magna sacra Athenis instituit
441,5. 442,28
Theseo sonchon apponit Hecale 665,6
Thesmophora, latrrix legum Ceres nun-
cupata 807,22 (Etæ 453,12
Thessalia regio, emisso lacu, frigidior fa-

Thessali ad Achillis tumultum quid insti-
tuerint 609,23
Thessalus Pisistrati filius 445,32
Thetidis cum Peleo nuptia 124,19
Thracia montes sisymbrio scatet 625,31
Thracius lapis aqua accenditur 443,30
oleo restinguitur ibid.
Thrasibulus corona oleaginea insignitus
440,39
thunni, marini porci 155,3
thuris ubertas apud Arabes 6,1 apud
Sabeos 6,3 thure diis nil gratius 632,
20
Tharii, olim Sybari 154,23
Thurius ager quercu insignis 154,8 &
thyma Galeno quid 695,26 (16
thymbra quid 695,24 & 30
Thymbra oppidum 696,20 in quo tem-
plum Apollini sacrum ibid.
Thymbræus fl. 696,22
thymos 623,22 unde dictus ibid. 34 cur
eius fructus in Attico solo acris 623,
Thyna, Thracia locus 624,17 (39
Tiberius Cæs. ad villam transmigrat 9,
22 Tiberij Cæs. pons naumacharius
100,22 & 32 Tiberio Cæsari tota
anno cucumis præbetur 754,9 Tibe-
rio Claudio principi venenum à con-
iuge datum 766,8 Tiberius princeps
è Germania quid afferri iussit 785,2
Tiburtes Romanis antiquiores 149,13
Tiburtus Tiburtum conditor 149,15 si-
lius Amphiarai ibid. 16
tilia, sine phillyra 125,11 ubi proveniat
126,26 tilia omnia pomorum genere
onusta iuxta Tiburtes 126,30 tilia-
ceis tabulis ob imbecillitatem, homi-
nes circumdari 81.127,9
tinctorum herba 902,1
tinus, lauri species 119,24 apud Theo-
phrastum quidam 119,34

I N V I L L A M

<i>tipha duplex, palustris</i> & <i>cerealis</i> 842,9	840,26 <i>tritium quadraginta die-</i>
<i>tipha cerealis</i> 842,11 <i>diuersa ab oly-</i>	<i>rum</i> 841,2 <i>siluestre, & exile</i> 843,13
<i>ra</i> 842,25	<i>triticū Indicum</i> 849,14 <i>Turcicum</i>
<i>tipha quando feratur</i> 843,21	849,19 <i>Indicum quo modo ab Indis</i>
<i>tipha cerealis descriptio</i> 842,40	<i>feri soleat</i> 849,37
<i>tirunculus ut senex contemnitur</i> 21,26	<i>tritici vitium cantharis</i> 823,40 <i>triti-</i>
<i>Tiryntij pyris siluestribus vescuntur</i> 2,29	<i>tici commentatio</i> 827,38 <i>tritici dif-</i>
<i>Tmolus, Cilicia mons</i> 604,17	<i>ferentia</i> 328,4 <i>delineatio</i> 829,20
<i>aduersus Tonitrua remediū laurus</i> 116,	<i>varia celi qualitates tritico conuenien-</i>
29 <i>tonitru ob vbertatem pracogno-</i>	<i>tes</i> 830,9 <i>consilio ibid.</i> 23 <i>mutatio-</i>
<i>scendam obseruatu dignum</i> 254,15	<i>nes in lolium</i> 835,20 <i>tritici & tipha</i>
<i>tonitrus & fulguris noxā a vino quid</i>	<i>transmutatio</i> 843,27
<i>abigat</i> 571,29 <i>tonitru terram hiare,</i>	<i>triumphaturi. Casares laureas unde de-</i>
<i>quasi in solatione ac aeris impulsu</i> 768,	<i>cerpserint</i> 115,23.119,2
40 <i>tonitrus & fulminis prodigia</i>	<i>triumphantium ministri oleagineis co-</i>
<i>quadam cacas habent causas</i> 769,5	<i>rollis cur vfi</i> 580,28
<i>torcular</i> 53,22	<i>trobellum quid Pollux dicat</i> 451,12
<i>toxica unde dicta</i> 109,15	<i>truncus quid</i> 188,14 <i>trunco feruntur</i>
<i>tragum ex olyra faciendi ratio</i> 849,9	<i>& arbores & herbae</i> 188,16 <i>trunci fi-</i>
<i>tranquillitas animi in villa queritur</i> 9,15	<i>gnificatio</i> 458,28
<i>Transpadana Italia arbuta</i> 539,13	<i>tubercula corporum ex calore ac sangui-</i>
<i>Trebula, solo aquata</i> 503,3	<i>ne</i> 769,12
<i>tributa varia</i> 6,1	<i>tuber terra</i> 617,14
<i>Trifolius collis</i> 502,37 <i>mons Neapoli</i>	<i>tuber acerinum</i> 128,11
<i>imminens</i> 629,2	<i>tuberes, e mespilorum genere</i> 386,10
<i>trifoliorum multitudo</i> 502,38	<i>tuberum tractatio</i> 768,18 <i>tuberes</i>
<i>trifolium asphaltites, quorum nominum</i>	<i>nil nisi radices sunt</i> 768,23 <i>tuberum</i>
<i>628,19 uti describatur</i> 628,25 <i>quo</i>	<i>usus</i> 768,25 <i>tuberibus aliqua cum</i>
<i>soloproducatur</i> 629,1 <i>trifoliū pra-</i>	<i>caelo cognatio</i> 768,36 <i>tuberes cur</i>
<i>tense</i> 678,9	<i>tonante Ioue nascantur</i> 768,39 <i>tu-</i>
<i>Triptolemus aratri inuentor</i> 814,31	<i>berum forma</i> 769,30 <i>tuberum qua-</i>
<i>reiodinos abies</i> 75,2.76,33	<i>dam arenosa, quadam sincera</i> 770,4
<i>triticeum genus quouis caelo & solo luxu-</i>	<i>tuberum seminaria</i> 770,14
<i>riat</i> 808,10	<i>turdi myrtum suis nidis ingerunt</i> 388,24
<i>tritium omnium stirpium nobilissimum</i>	<i>Tusculanus secessus</i> 10,1
<i>806,18 triticum ferendi tempus</i> 821,	<i>Tusculana quaestiones a disputationis loco</i>
11 <i>tritium omne conuerti in siliginem</i>	<i>indigitata</i> 10,2
<i>837,18 triticum trimestre</i> 839,39	<i>Tyli insula lanificium</i> 4,25
<i>840,4 & 30 bimestre</i> 840,6 & 8.	<i>typha distinguitur a tipha cereali</i> 842,
<i>841,1 & 8 triticum trimestre nul-</i>	26
<i>lum esse</i> 840,12 <i>tritium vere satum</i>	<i>Tzezis Lycophronis interpres</i> 171,41
	<i>Vacci-</i>

V Accinium
quid
vacerra, clatroru
bore, quercu
valetudo inoffen
Valentius in patib
21
vappa nobilis, vini
vappa unde fiat
in Vaticano illex
vbertatis futura p
1826,35
vbolimam Libya
vestes ilignes & ap
vestigalia arboru
Vientana filia
Venasiani agrioli
venenosa animali
venenum terra 6
omnia antidot
neni antidoton
venereus remediis
veneri simulanda
nerem sedat cu
Venetia arbuta
venti optimi
venire dolores v
ventris morbu
169,5 & 20
venuculum ruti
Venus punicum se
crata arboru
tit 22,41 Ad
737,15 horti
venustus per Ado
verba cupressis sin
Vergiliarum occa
32 per excell
819,24
vere calor exigua

INDEX.

V

Vaccinium, unde dictum 593, 13
quid sit 593, 31
vacerra, clatrorum genus 156, 14. ex ro-
bore, quercu & subere ibid.
valetudo inoffensa ut retineatur 443, 20
Valentius in patibulo cupressus confita 81,
21
vappa nobilis, vini Surrentinum 502, 13
vappa unde fiat 566, 17. 567, 4
in Vaticano ilex 149, 12
vbertatis futura prognostica 148, 18. 254,
1826, 35
vbolima in Libya 554, 7
vetes ilignei & aquifolij 149, 23
vetigalia arborum 5, 41
Veientana silua 115, 35
Venafrani agri oliuetum 453, 14
venenosa animalia 329, 55. 6, 7
venenum terra 617, 20 contra venena
omnia antidoton 628, 20 & 32. ve-
neni antidoton, ruta 710, 32
venereis remediis quid conferat 13, 31
veneri simulanda nata eruca 666, 3 ve-
nerem sedat cucumis 748, 35. 749, 14
Venetia arbusa 539, 15
venti optimi 255, 36. 825, 35
ventris dolores virgā myrica sedare 122, 1
ventris morbis lotophagos immunes
169, 5 & 20
vennuculum rutilum 845, 13
Venus punicum seuit 13, 18 Venerisa-
crata arbores 13, 31 cogitationes irre-
tit 22, 41 Adonim luget 612, 25.
737, 15 hortorum tuxix 641, 26
venustas per Adonim figurata 612, 32
verba cupressis similia; prouerb. 83, 6
Vergiliarum occasus 819, 19 & 21. 820,
32 per excellentiam satius appellatur
819, 24
vere calor exiguus 452, 33 ver & autu-

mnus sese imitantur 464, 40
vermiculatio, plantarum morbus 238,
10 olea morbus 472, 9
vermiculorum plantas infestantium spe-
cies 472, 17
verni aeris qualitas aequalis autumuali
547, 39
Vertumnus Pomonam adamat 250, 31
veruactum quid 814, 21
veru iuniperinum 104, 28
vespertilionis tactu oua ciconiarum ste-
rilescunt 130, 39 vespertilio per pla-
tanum torpescit 131, 1 vespertilioes
hedera suffitu necantur 635, 37
Vestaliū virginum capillus 169, 35
vestes ab arboribus prabentur 4, 10 a
plantarum corticibus 4, 15 vestibus
prodest amaranthus 609, 19
Vesuius mons 500, 40. 767, 28
vicinorum ob iniurias qui suas sedes reli-
querint 443, 5
victorum insigne 10, 30 & 36. 440, 18.
& 21
vidua & femina & arbores 537, 23
villa illecebra 6, 8 villa operarij quales
esse debeant 26, 17 villa celum 28, 5
stius 31, 11 solum idoneum 32, 16
villicationis praefectus instituitur 21, 17
villica qualis esse debeat 24, 4
villici boni officium 21, 17 & d. villi-
cus malus, peior, pessimus 23, 37
Vinalia 254, 31
vincaperuinca 618, 3 & 6
vinculi genera ad insitionem 548, 33
vindemia quando agenda 563, 10. 564,
14 quomodo facienda 464, 29. 565, 8
vindemiarum leges 564, 23
vindemiator, stella 564, 19
vineatica falcis figura 528, 7
vineae nouella follio 519, 22 pampina-
tio 520, 7 ablaqueatio ibid. 39 re-

IN VILLAM

secatio § 21, 20 putatio § 21, 32 plantatio & alligatio § 22, 25 vinea per se stantis cultura § 34, 16 ite brachiate, ac capitata ibid. prostrata & characata § 36, 1 vinea pedamina & vimina § 36, 27 vinea species qua vino innititur pedamento § 37, 20 vinearum quastus § 30 & § 36 genera § 25, 29 ut ab animalibus defendantur § 61, 12 vineum amineum unde dicatur § 00, 34 vinum etiam ab arboribus potatur § 33, 12 diis equiparatu § 92, 15 remedium senectutis § 92, 19 quos producat effectus § 92, 32. § 93, 1 anon unde dictum § 94, 27 vinum dendrogaleum § 97, 26 tiarenu § 97, 27 tianum ibid. Heracleoticum ibi. Gracum vulgare § 00, 35 Gaurianum, Fanstinum, Falernum § 01, 37 Albanum § 02, 8 Surrentinum § 02, 10 Calenum § 02, 22 Cæcubum § 02, 27 Mamertinum § 02, 32 Trifolinum § 02, 37 Trebellium § 03, 2 Creticum siue maluaticum § 03, 9 monobastis ibid. § 12 Rheticum § 03, 18 phthorium § 06, 6 ne superfundatur, media § 06, 18 ut elutrietur § 06, 38 vinum gustandi modus & tempus § 08, 15 dulce quomodo fiat § 08, 38 vinum aquam habere cognoscendi experimenta § 70, 1 & d. 6 § 9, 21 quibusdam locis iterum sponte feruet § 71, 32 diuturnius ut fiat § 72, 6 florem ne habeat § 72, 27 citra uuam § 74, 5 album ut fuscum, nigrum ut album euadat § 74, 17 aquam habere, edera non probat § 39, 21 vini fabulosa origo § 94, 41. § 95, 10 vbertas, bonitas aut prauitas unde prænoscatur § 62, 29 in vappam con-

uersi signum § 65, 38 acescentis remedia § 71, 10 vini remedia aduersus fulgura § 71, 29 in vappam peruersi remedia § 71, 33. § 72, 2 turbulentia ut resideat § 72, 11 situm olentis remedium § 72, 18 aut asperginem sentientis ibi. vini, in quod animal cecidit, remedium § 72, 24 vina nobilia non nisi arbutis gignuntur § 38, 5 & § 19 non comprehendunt deuterias § 65, 38 operaria quæ § 65, 40 quando laborent § 68, 33 vinorum prognostica § 67, 12 viola § 93, 2 & § 10. § 95, 24 violarum genera § 93, 26 viola flore triplicis coloris § 97, 30 flore duplicis coloris § 97, 38 flammea § 97, 19 viola flammea satio § 97, 40 vipera fago tacto obstupescit § 63, 19 viperis noxium allium § 10, 34 antidotus, ruta ibid. virginibus olea colenda § 38, 20 viridis color visui per commodus § 14, 3 vir muliere a Deo fortior factus & audacior § 24, 13 viscus ex aquifolio § 107, 35 visum fouet viridis color § 14, 3 ex acuit organos § 699, 3 vita pia & utilis eorum, qui terram colunt § 10, 16 vitiarium constituendum ut sit § 23, 7 vitis medium quoddam inter fruticem ac suffruticem herbam § 91, 28 arbor Theophrasto § 91, 31 vitis laudes § 92, 7 utilitas § 93, 35 vitis & vini inuentum § 94, 9 vitis origo fabulosa ibid. vitis nomen § 96, 5 genera § 96, 20 vitis genus satium aut ad escam, aut ad effusionem § 97, 1 vitis Apiana § 97, 11 myrsitis § 97, 25 vitis figura & descriptio § 03, 22 vitis

is & malleolis formatio § 12, bus non inungit stina plantatio duplex § 47, 1 bruma temporis prehendit § 47, 1 terebrationem tionem § 52, 3 13 vitis eadem habeat vna § naturalis concolicata § 6, 2 contra animalia § 6, 10 pugnentaria siue materis § 78, 1 aternius vitis & brassica § 71, 21 vitis quæ arbor vitis praeoces § 9 triferæ siue in § 9 Thafæ & cula & nemesis semina, & talanicostratia vitis arboribus § 37, 23, § 38, mitatis anida borea omnibus quem agrum eum in se trahit fructuosa ut § 39 ne fructu ne algore intergine & pruina vitium plantatio § 27 pastinatio los § 14, 8 celestis genera v

I N D E X.

is & malleoli electio 510, 16 *vitis*
 formatio 522, 10 *vitis* ulmi radici-
 bus non iungitur 543, 13 *vitis* arbu-
 stina plantatio 544, 11 *vitis* insitio
 duplex 547, 19 triplex 548, 9 *vitis*
 bruma temporibus aliquando com-
 prehendit 547, 31 *vitis* insitio per
 terebrationem 551, 35 per infolia-
 tionem 552, 3 per inoculationem 552,
 13 *vitis* eadem ut candida & nigra
 habeat uvas 552, 26 *vitis* & olea
 naturalis concordia 554, 1 *vitis* me-
 dicata 556, 2 *theriaca* 556, 13, 21
 contra animalia venenum eiuculan-
 tia 556, 10 purgatoria 556, 30 un-
 guentaria sine odorifera 557, 6 *vitis*
 materies 578, 36 *vitis* ligno nullum
 aternius 579, 5
vitis & brassica odia 562, 8. 698, 25.
 715, 21
viti qua arbores cōueniant 539, 1 & 11
Vites praecoces 497, 6 dactylides 499, 19
 trisera, siue insana 499, 7 bisera 499,
 9 *Thasia* & *Libyca* 499, 23 *venu-*
cula & *nemesiana* ibid. *etesiaca*, con-
 semina, & *talpana* 499, 24 *staphy-*
la, *nicostriatig* ibid. *gracula* 503, 15
vites arboribus maritantur 543, 5.
 537, 23. 538, 1 & 32 *natura* subli-
 mitatis auida 538, 8 & 33 *vites* ar-
 boreae omnibus commodiores 538, 25
 quem agrum expetant 540, 16 alie-
 num in se trahunt saporem 556, 3 in-
 fructuose ut fecunda fiant 559, 30 &
 39 ne fructum putrefaciant 560, 7
 ne algore intereant 560, 13 ne arubi-
 gine & pruina ledantur 560, 19
vitium plantatio 509, 36 *sarmenta* 511,
 27 *pastinatio* 512, 8 *satio* per malleo-
 los 514, 8 *celer* radicatio 517, 9 di-
 versa genera uti plantanda 518, 7 *vi-*

tium putationis tepus 527, 5 *vitium*
pampinatio 531, 7 *propagatio* 532, 9
physiognomoniam 538, 33 *morbi* eo-
rumq, *medela* 557, 11
vitibus caelum conueniens 504, 24 ac-
 commoda soli qualitas 506, 18 *viti-*
bus pulvis excitandus 533, 24 *viti-*
bus proficuum, singulis resoluti annis
 544, 38
viniradix quid 185, 5
vinum omne cū suo vino sociabile 552, 31
ulmus, siluestris arbor 138, 13
ulmi generum descriptio 138, 29 *vitem*
patitur 539, 4 *ulmi* & *populi* diffe-
 rentia 539, 24 ab arbutu reicitur
 539, 28
ulmorum umbra nouerca 539, 33 *ul-*
mus quando in arbutu conserenda
 540, 14 in arbutu uti formetur
 542, 5 & 22 *ulmi* radices *vitem* e-
 necant 543, 13 *ulmi* plerumq, tres ra-
 mi 546, 37
ulmeis frondibus oues ali 3, 11
umbilicus terra 617, 17
unedo & *arbutus* diuersa 166, 17 *unedo*
epimelidis fructus 166, 32 & 35
unguentum *Cyrenaicum*, suauissimum
 596, 41. 597, 2
Vocontij, Gallie *Narbonensis* 569, 39
volucra ne pampinos uasque praeodant
 561, 16
voluptate cum utilitate coniuncta nulla
 maior 6, 13 *voluptas* primi hominis
 6, 16 *voluptas* ex agricultura 6, 20
urbana vita serior rustica 10, 9
urbes arte humana aedificantur 10, 14 si-
 ne ludicris & cauidicis artibus felices
 14, 26
vrbs, domicilium *sophistarum*, para-
 sitorum 14, 32
uredo quid 474, 31 *uredine* qua maxi-

IN VILLAM INDEX.

<i>me infestentur</i>	474,33	<i>uxor nimia zelotypia demacratur</i>	540,5
<i>urina difficultatis remedium</i>	687,20	X	
<i>urinus adeps viti confert</i>	558,19	X <i>Erxes platani amore captus</i>	130,27
<i>uva spina. siue crispa enarratio</i>	396,19	X <i>Xerxis aduentu platani Laodicee</i>	
<i>uva staphylis</i>	494,28	<i>in oleam mutata</i>	131,6
<i>escaria</i>	497,2	<i>X litera, antiquis decussis</i>	197,10
<i>moschatula</i>	497,36	<i>xylon, & ligna xylinea</i>	900,6
<i>duracina</i>	498,3	Z	
<i>pergulana</i>	498,11	Z <i>Ambac Mauritanis, iasme</i>	598,14
<i>bumamma</i>	498,	Z <i>Zamia quid</i>	89,36
<i>19 bumammia & bimammia</i>	498,	<i>Zeae in arenam mutata causa</i>	836,40
<i>27 ceraunia</i>	498,30	<i>Zeae in aliud genus facile transit</i>	842,14
<i>corneola ibid.</i>		<i>Zeae Theophrasti</i>	842,37
<i>uncialis</i>	498,33	<i>Zeae & tiphe</i>	
<i>tripedanea, cuius</i>		<i>ad frumentum ut redeunt</i>	843,5
<i>multa species</i>	498,35	<i>Zeae satio</i>	843,21
<i>stephanita</i>	498,	<i>Zeae in farris locum suc-</i>	
<i>38 capnia Theophrasti</i>	499,4	<i>cedit</i>	844,30
<i>insa-</i>		<i>Zeae idem Gracis quod</i>	
<i>na ibid. & uua complura acinorum ut</i>		<i>Latinis far</i>	844,33
<i>genera habeat</i>	552,24	<i>Zeae tractatio sin-</i>	
<i>uva myrtea</i>		<i>gularis</i>	846,39
<i>554,15</i>		<i>Zeae aquinocum no-</i>	
<i>una praecox ut nascatur</i>	554,	<i>men</i>	847,19
<i>20 ut serotina</i>	54,28	<i>Zeae quibus enascatur</i>	
<i>una vinaceis</i>		<i>regionibus</i>	847,33
<i>vacua</i>	554,31	<i>Zeae in cibum ve-</i>	
<i>sex tantum dies matu-</i>		<i>nit</i>	848,8
<i>ra perdurat</i>	564,1	<i>Zeae Herodoti</i>	848,31
<i>una ad effusionem</i>	499,26	<i>Zeae Boeota rapas appellant</i>	778,34
<i>qua elique-</i>		<i>zelotypia nimia uxore demacrat</i>	540,5
<i>scunt in potum</i>	499,27	<i>zephyrus refrigerantem inspirat auram</i>	
<i>aminea ibid.</i>		<i>7,15</i>	Clorim violat
<i>28 gemina seu gemella</i>	500,4	<i>Zeopyron</i>	582,9
<i>lana-</i>		<i>ziziber caninum</i>	847,41
<i>ta ibid. 12 heluola</i>	501,5	<i>zizipha alba</i>	714,28
<i>oleaginea</i>		<i>ziziphus</i>	170,34
<i>501,20</i>		<i>ziziphi duplex genus, ca-</i>	
<i>alopecides</i>	501,22	<i>didum acrutulum</i>	382,33
<i>Corin-</i>		<i>Zygia, aceris genus</i>	127,28
<i>thiaca, pusillis acinis</i>	555,38		
<i>ut sua</i>			
<i>vite ad ver usque permaneant</i>	574,35		
<i>uuarum morbus, crambus</i>	558,12		
<i>ma-</i>			
<i>turitas</i>	563,9		
<i>varia conditura</i>	576,3		
<i>uuarum passarum faciendarum ra-</i>			
<i>tio</i>	578,12		
<i>Vulcanale Romuli</i>	169,36		
<i>Vulturnus transfuatur</i>	12,1		

INDICIS FINIS.

natur 40, 1

otus 130, 27

us Laodicea

131, 6

197, 10

900, 6

me 598, 14

89, 36

36, 40 2ea

842, 14

2ea 843, 15 2ea

locum suc-

Gracis quod

ratatio fin-

inocum no-

s enascatur

gibum ve-

848, 31

ant 778, 34

nat 40, 1

at auram

582, 9

847, 41

714, 28

170, 34

ex genus, ca-

382, 33

127, 28

